

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “N” DENGAN
IKTERUS FISILOGI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU KOTA
MAKASSAR**



KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :

FATIMAH

NIM : 70400114012

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**


2017

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 30 Juli, 2018

Penyusun,



Fatimah
NIM:70400114012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fatimah
Nim : 70400114012
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny "N" dengan Ikterus
Fisiologi di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, 30 Juli, 2018

Pembimbing I



DR.Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb

Pembimbing II



dr. Nadyah, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny”N” Dengan Ikterus Fisiologi Di Puskesmas Jumpangang Baru Kota Makassar Tahun 2018”**, yang disusun oleh **Fatimah, Nim: 70400114012**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelah Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata 8 Agustus 2018 M

24 Dzulkaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT.,M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Hj. Sitti Saleha, S,SiT.,SKM.,M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Nadyah,M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rini Fitriani,M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny “N” dengan Ikterus Fisiologi Di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan kepada Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Terimah kasih penulis kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya atas cinta dan kasih sayangnya serta do'a yang tak terhingga, bakti seumur hidup saya tak akan pernah cukup untuk membalas ketulusanmu.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
4. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
5. Kepala Ruangan perinatologi dan stafnya serta staf rekam medik di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar yang telah membantu dalam pengambilan data dan studi kasus yang penulis butuhkan.

6. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb, selaku Ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus penguji yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran.
7. Ibu dr. Nadyah, M.Kes selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
8. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes, selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Bapak Ustad Dr. Dudung Abdullah, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
10. Ibunda dr. Nurhira Abd Kadir, MP.H selaku Pembimbing Akademik dan orang tua yang telah memberikan banyak waktu dan ilmu nya demi membimbing saya.
11. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
12. Teman-teman mahasiswi kebidanan 2014 dan kakanda kebidanan 2012 dan kebidanan 2013 yang telah mengukir banyak cerita, tawa, masalah, dan kisah yang tak akan terlupakan oleh masa.
13. Pihak-pihak yang tak sempat disebutkan, terimah kasih atas bantuan dan dukungannya yang tak terhingga.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari kekurangan yang tak dapat dihindari pada karya tulis ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Samata-Gowa, 30 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penulisan.....	5
E. Manfaat Penulisan.....	6
F. Metode Penulisan.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEOERITIS.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir.....	10

B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Ikterus Fisiologi	12
C. Tinjauan Tentang Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	47
D. Tinjauan Islam Tentang Bayi.....	57
BAB III STUDI KASUS	61
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	61
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual	67
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa /Masalah potensial.....	70
D. Langkah IV Tindakan Segera atau Kolaborasi	70
E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	70
F. Langkah VI Implementasi	72
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan	73
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP).....	74
BAB IV PEMBAHASAN	91
BAB V PENUTUP	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran 2 : Surat Izin/rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar
- Lampiran 3 : Surat rekomendasi izin penelitian dari pemerintah kota makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar
- Lampiran 4 : Surat Keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRACT

**MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JULY 2018**

Name : Fatimah
Student Reg. No. : 70400114012
Title : **Midwifery Care Management on a Physiologic Jaundice of the Newborn Infant Delivered by Mrs. "N" in Jumpandang Baru Health Centre, Makassar**
Supervisor 1 : **Dr.Hj. Sitti Saleha, S,SiT.,SKM.,M.Keb**
Supervisor 2 : **Hj.dr. Nadyah,M.Kes**

Physiologic jaundice or neonatal jaundice is a yellowish discoloration on a baby's skin and sclera due high levels of bilirubin. This case study focuses on providing 7-step Varney and SOAP midwifery treatments on Ms. "N's" newborn infant who suffers from physiologic jaundice in Jumpandang Baru Health Centre, Makassar.

This case study about physiologic jaundice of a newborn infant in Jumpandang Health Centre, Makassar, discovers some significant findings. First, the midwifery treatment procedures prepared for the Ms. "N's" newborn who suffered from physiologic jaundice were carried out without significant obstacles with a total of four monitoring. The infant was diagnosed with yellowish discoloration on the skin and sclera as well as weak suction and swallowing reflexes which led to the newborn's difficulties in breastfeeding. As a result, the infant did not receive enough nutrition. However, on the last session of midwifery treatment on 30 March 2018, the yellowish discoloration on the infant's skin and sclera were not visible anymore.

This study concludes that the 7-step Varney and SOAP midwifery treatments on Ms. "N's" newborn infant who suffered from physiologic jaundice have been conducted successfully in Jumpandang Baru Health Centre, Makassar. The analysis from the treatment procedures further suggest that the infant does not exhibit any symptoms of pathological jaundice or kern jaundice.

Bibliography : 30 (2012-2016)

Keywords : newborn infant, physiologic jaundice



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data WHO (2014) mayoritas dari semua kematian neonatal (73%) terjadi pada minggu pertama kehidupan dan sekitar 36% terjadi 24 jam pertama. Di Indonesia sendiri penurunan, angka kematian bayi sangat sedikit, yaitu dalam 1000 kelahiran setiap tahunnya didapatkan 15 kematian bayi pada tahun 2011, 15 kematian bayi pada tahun 2012, dan 14 kematian bayi pada tahun 2013 (WHO,2014).

World Health Organization (WHO), bahwa didunia ini setiap perempuan meninggal karena komplikasi yang terkait dalam kehamilan dan persalinan, begitu juga dengan angka kematian balita terutama pada masa neonatal masih cukup tinggi dan menjadi masalah kesehatan baik secara global, regional, maupun di indonesia. Itulah sebabnya tujuan keempat *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengurangi jumlah kematian. Ibu dan jumlah kematian balita. Secara global setiap tahunnya 120 juta bayi lahir di dunia, secara global 4 juta (33 per 1000) bayi lahir mati dan 4 juta (33 per 1000) lainnya meninggal dalam usia 30 hari (neonatal lanjut) (WHO, 2012).

Angka Kematian Bayi (AKB) di Negara *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) seperti Singapura 3/1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5/1000 kelahiran hidup, Thailand 17/1000 kelahiran hidup, Vietnam 18/1000 kelahiran

hidup dan Philipina 26/1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia adalah angka tertinggi di Negara ASEAN. Kematian bayi tersebut terutama di Negara berkembang sebesar 99 % dan 40.000 bayi tersebut adalah bayi di Negara Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskerdas, 2015) menunjukkan angka hiperbilirubin pada bayi di Indonesia sebesar 51,47% bayi cukup bulan yang mengalami perubahan warna kulit, mukosa dan mata menjadi kekuningan (ikterus), dan pada bayi kurang bulan (*prematuur*) kejadiannya lebih sering, yaitu 75%. Di provinsi Sulawesi Selatan angka kematian bayi mencapai 42,5% dengan faktor penyebabnya antara lain asfiksia 51%, BBLR 42,9%, gangguan pernafasan (37%), prematuritas 34%, kelainan kongenital 2,8%, sepsis 12%, kelainan darah/Ikterik (10%), postmatur (3%), hipotermi (7%).

Dalam upaya mewujudkan visi “Indonesia sehat” maka salah satu tolak ukur adalah menurunnya angka mortalitas dan morbiditas neonatus dengan proyeksi pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi (AKB) dapat turun menjadi 18 per 1000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir adalah ensefalopati bilirubin (kern ikterus).

Banyak bayi baru lahir, terutama bayi kecil (bayi dengan berat lahir <2500 gram atau usia gestasi <37 minggu) mengalami ikterus pada minggu pertama kehidupannya. Data epidemiologi menunjukkan bahwa lebih 50% bayi baru lahir menderita ikterus yang dapat dideteksi secara klinis dalam minggu pertama

kehidupannya. Ikterus pada bayi baru lahir dapat merupakan suatu gejala fisiologi atau dapat merupakan hal yang patologis, misalnya pada inkompatibilitas rhesus dan ABO sepsis, penyumbatan saluran empedu dan sebagainya (sarwono, 2012).

Ikterus pada bayi baru lahir merupakan masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Kurang lebih 50% bayi cukup bulan akan mengalami ikterus pada minggu pertama kehidupannya. Warna kuning pada kulit dan sklera terjadi akibat akumulasi bilirubin dalam darah. Peningkatan kadar bilirubin pada bayi baru lahir merupakan fase transisi yang normal, tetapi peningkatan kadarnya dalam darah yang berlebih dapat menyebabkan kern ikterus, yang memerlukan penanganan khusus. Sebagai bidan harus menginformasikan atau memberi bimbingan kepada klien atau ibu hamil untuk mengetahui lebih jauh tentang ikterus pada bayi, untuk mengetahui tentang sebab terjadinya ikterus, dan untuk mengetahui penatalaksanaan pada bayi yang mengalami ikterus. Bagaimana sebab, tanda, dan gejala pada bayi ikterus, serta bagaimana cara mencegah dan penatalaksanaan ikterus pada bayi (Nurhayati, dkk, 2013).

Data dari Puskesmas Jumpandang Baru pada tahun 2014 Angka kejadian Ikterus dari 1020 jumlah persalinan terdapat 12 bayi mengalami ikterus 7 diantaranya ikterus fisiologi, 5 diantaranya mengalami ikterus patologi, sedangkan pada tahun 2015 angka kejadian ikterus mengalami peningkatan dari 1010 jumlah persalinan terdapat 18 bayi mengalami ikterus, 6 diantaranya mengalami ikterus patologi, 12 diantaranya mengalami ikterus fisiologi, dan pada

tahun 2016 angka kejadian ikterus di puskesmas Jumpandang baru, mengalami penurunan yaitu dari 918 jumlah persalinan terdapat 10 bayi mengalami ikterus, 7 diantaranya mengalami ikterus fisiologi, 3 diantaranya mengalami ikterus patologi, pada awal tahun 2017 sampai pada saat bulan agustus dari 677 persalinan terdapat 8 bayi yang mengalami ikterus, 7 diantaranya mengalami ikterus fisiologi, 1 diantaranya mengalami ikterus patologi.

Dari uraian diatas untuk mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB) maka dengan cara mengurangi angka kejadian ikterus . Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan dengan penanganan yang tepat agar tidak terjadinya komplikasi melalui asuhan kebidanan. Mengingat hal itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Neonatus dengan Ikterus Fisiologi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana asuhan kebidanan pada bayi dengan ikterus fisiologi

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah asuhan kebidanan dengan kasus ikterus fisiologi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Di Laksanakannya asuhan kebidanan pada bayi dengan ikterus fisiologi berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

Dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi Ny”N” dengan ikterus fisiologi di puskesmas jumpandang makassar baru dengan menggunakan proses asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisa data pada bayi “N” dengan bayi ikterus fisiologi di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.
- b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual pada bayi “N” dengan bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru pada tanggal Tahun 2018.
- c. Merumuskan diagnosa/masalah potensial pada bayi “N” dengan bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.
- d. Melaksanakan tindakan dalam asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.
- e. Merencanakan tindakan dalam asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.
- f. Mengevaluasi asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.

g. Mendokumentasikan semua tindakan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada bayi “N” dengan Bayi ikterus di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2018.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Teoritis

Hasil Penulisan ini dapat menjadi sumber Informasi dan Memperkaya Khasanah Ilmu dan Pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Pendidikan

Untuk menambah Wacana bagi Pembaca di Perpustakaan dan berbagai masukan bagi Program Studi D3 Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman Ilmiah yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang perawatan bayi ikterus Fisiologi.

F. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan tentang bayi ikterus fisiologi

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi : Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

a. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi.

b. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi.

Yaitu studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dari dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu:

Pada Bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada Bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang persalinan, tinjauan khusus tentang inersia uteri tinjauan persalinan menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi dengan ikterus fisiologi. Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Bayi Baru Lahir (*Neonatus*)

- a. Bayi baru lahir (*neonatus*) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik (Marmi dan Rahardjo, 2015:1).
- b. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada kehamilan cukup bulan (dari kehamilan 37-42 minggu) dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram dan tanpa tanda-tanda asfiksia dan penyakit penyerta lainnya (Anggaraini, 2014).
- c. Neonatus adalah individu yang baru saja mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterine (Dewy, 2013:12).

2. Masa Neonatal

Masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran (Rahardjo, Kukuh & Marmi, 2015:3).

- a. Neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir.

- b. Neonatus dini : usia 0-7 hari.
- c. Neonatus lanjut : usia 0-28 hari.

3. Ciri-ciri bayi baru lahir

- a. Berat badan : 2500-4000 gram.
- b. Panjang badan : 48-52 cm.
- c. Lingkar kepala : 33-35 cm.
- d. Lingkar dada : 30-38 cm.
- e. Frekuensi jantung : 120-160 x/menit.
- f. Pernafasan : 40-60 x/menit.
- g. Kulit berwarna kemerahan dan licin karena jaringan subkutan cukup.
- h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna.
- i. Kuku agak panjang dan lemas.
- j. Genetalia : Perempuan labia mayora telah menutupi labia minora, jika laki-laki testis telah turun, skrotum sudah ada.
- k. Refleks hisap dan menelan telah terbentuk dengan baik.
- l. Refleks moro atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik.
- m. Refleks grasps atau menggenggam sudah baik.
- n. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Rahardjo.Kukuh, Marmi, 2015:8)

B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Ikterus Fisiologi

1. Pengertian Bayi Ikterus

a. Ikterus adalah warna kuning dikulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Produksi bilirubin sebagian besar berasal dari pemecahan sel darah merah yang menua (80%), (Maryunani A,2014,hal. 98).

b. Ikterus adalah keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan kuning pada kulit, sklera, akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan. Ikterus secara klinis akan mulai tampak pada bayi baru lahir bila kadar bilirubin darah 5-7mg/dl. Sedangkan hiperbilirubinemia adalah ikterus dengan konsentrasi bilirubin serum yang menjurus kearah terjadinya kern-ikterus atau ensefalopati bilirubin bila kadar bilirubin tidak di kendalikan (Manggiasih&Jaya,2016).

Ikterus terjadi apabila terdapat akumulasi bilirubin dalam darah, Pada sebagian besar neonatus, ikterus akan ditemukan dalam minggu pertama kehidupannya. Dikemukakan bahwa angka kejadian ikterus terdapat pada 60% bayi cukup bulan dan pada 80% bayi kurang bulan. Ikterus pada sebagian penderita dapat berbentuk fisiologi dan sebagian lagi mungkin bersifat patologis yang dapat menimbulkan gangguan yang menetap atau menyebabkan kematian. Karenanya setiap bayi dengan ikterus harus mendapatkan perhatian, terutama apabila ikterus ditemukan dalam 24 jam pertama kehidupan bayi atau

bila kadar bilirubin meningkat lebih dari 5 mg/dl dalam 24 jam. Proses hemolisis darah, infeksi berat, ikterus yang berlangsung lebih dari 1 minggu serta bilirubin lebih dari 1 mg/dl juga merupakan keadaan yang menunjukkan kemungkinan adanya ikterus patologis. Dalam keadaan tersebut penatalaksanaan ikterus harus dilakukan sebaik-baiknya agar akibat buruk ikterus dapat dihindarkan. (Krishnan Elanggo, dkk, 2016).

Hiperbilirubinemia adalah kadar bilirubin yang dapat menimbulkan efek patologi. Tingginya kadar bilirubin yang dapat menimbulkan efek patologi pada setiap bayi berbeda-beda. Dapat juga diartikan sebagai ikterus dengan konsentrasi bilirubin, yang serumnya mungkin menjurus kearah terjadinya kern ikterus bila kadar bilirubin tidak dapat dikendalikan (Rukiyah, Yulianti,2013).

Bilirubin merupakan zat hasil pemecahan hemoglobin (protein sel darah merah yang memungkinkan darah mengangkut oksigen). Hemoglobin terdapat dalam eritrosit (sel darah merah) yang dalam waktu tertentu selalu mengalami destruksi (pemecahan). Proses pemecahan tersebut menghasilkan hemoglobin menjadi zat heme dan globin. Dalam proses berikutnya, zat-zat ini akan berubah menjadi bilirubin bebas atau indirect. Dalam kadar tinggi bilirubin bebas ini bersifat racun, sulit larut dalam air dan sulit dibuang. Untuk menetralsirnya, organ hati akan mengubah bilirubin indirect menjadi direct yang larut dalam air. Masalahnya, organ hati sebagian bayi baru lahir belum dapat berfungsi optimal

dalam mengeluarkan bilirubin tersebut. Masa matang organ hati pada setiap bayi berbeda. Namun umumnya, pada hari ketujuh organ hati mulai biasa melakukan fungsinya dengan baik. Itulah mengapa, setelah berumur 7 hari rata-rata kadar bilirubin bayi sudah kembali normal. Tapi, ada juga yang menyebutkan organ hati mulai biasa berfungsi pada usia 10 hari.

2. Klasifikasi Bayi Ikterus

Dibedakan menjadi 3 tipe ikterus fisiologis, ikterus patologi kern ikterus:

a. Ikterus Fisiologi

Tidak melewati kadar yang membahayakan atau yang mempunyai potensi menjadi kern ikterus dan tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi. Ikterus fisiologi bisa juga disebabkan karena hati dalam bayi tersebut belum matang, atau disebabkan kadar penguraian sel darah merah yang cepat. Adanya metabolisme normal bilirubin pada bayi baru lahir usia minggu pertama. Peningkatan kadar bilirubin pada hari-hari pertama kehidupan dapat terjadi pada sebagian besar neonatus. Hal ini disebabkan karena tingginya kadar eritrosit neonatus dan umur eritrosit yang lebih pendek (80-90 hari) dan fungsi hepar yang belum matang. Peningkatan bilirubin ini tidak melebihi 10mg/dl pada bayi cukup bulan dan 12mg/dl pada bayi kurang bulan yang terjadi pada hari 2-3, dan mencapai puncaknya pada hari ke 5-7, kemudian menurun kembali pada hari ke-14, Selain itu bisa karena pemberian minum yang belum mencukupi. Bayi

yang puasa panjang atau asupan kalori/cairan yang belum mencukupi akan menurunkan kemampuan hati untuk memproses bilirubin (Saleha,2012)

b. Ikterus patologi

Ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia. Dasar patologi ini misalnya jenis bilirubin saat timbulnya dan menghilangnya ikterus dan penyebabnya. Ikterus diikuti dengan adanya tanda – tanda penyakit yang mendasari pada setiap bayi (muntah, letargi, malas menetek, penurunan berat badan yang cepat, dan suhu yang tidak stabil). Ikterus bertahan setelah 8 hari pada bayi cukup bulan atau setelah 14 hari pada bayi kurang bulan. Ikterus yang kemungkinan menjadi patologi atau dapat dianggap sebagai hiperbilirubinemia ialah:

- 1) Ikterus terjadi pada 24 jam pertama sesudah kelahiran
- 2) Peningkatan konsentrasi bilirubin 5 mg% atau lebih setiap 24 jam
- 3) Konsentrasi bilirubin serum sewaktu 10 mg% pada neonatus kurang bulan dan 12,5 mg% pada neonatus cukup bulan
- 4) Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim G6PD dan sepsis) (Marmi, Rahardjo. 2012).

c. Kern Ikterus

Kern mengacu pada ensefalopati bilirubin yang berasal dari deposit bilirubin terutama pada batang otak (brainstem) dan nucleus serebrobasal.

Warna kuning (jaundis pada jaringan otak) dan nekrosis neuron akibat toksik bilirubin tidak terkonjugasi (unconjugated bilirubin) yang mampu melewati sawar darah otak karena kemudahannya larut dalam lemak (high lipid solubility). Kern ikterus bisa terjadi pada bayi tertentu tanpa disertai jaundis klinis, tetapi umumnya berhubungan langsung pada kadar bilirubin total dalam serum (Marmi, Rahardjo, 2012).

3. Jenis-Jenis Ikterus

a. Ikterus Hemolitik

Hal ini disebabkan oleh inkompatibilitas rhesus, ABO, golongan darah, kelainan eritrosit kongenital, atau defisiensi enzim G6-PD

1) Inkompatibilitas rhesus

Bayi dengan Rh positif dan Rh negative tidak selamanya menunjukkan gejala klinik pada waktu lahir (15-20%). Gejala klinik yang dapat terlihat ialah ikterus makin lama makin berat pula. Bila mana sebelum kelahiran terdapat hemosis yang berat, maka bayi dapat lahir dengan edema umum disertai ikterus dan pembesaran hepar dan lien (hidrosfoetalis). Terapi ditunjukkan untuk memperbaiki anemia dan mengeluarkan bilirubin yang berlebihan dalam serum agar tidak terjadi kern ikterus.

2) Inkompatibilitas ABO

Ikterus dapat terjadi pada hari pertama dan kedua dan sifatnya biasanya ringan, Bayi tidak tampak sakit, anemia ringan, hepar dan lien tidak membesar. Kalau hemolisisnya berat, seringkali diperlukan juga transfuse tukar untuk mencegah terjadinya kern ikterus. Pemeriksaan yang perlu dilakukan ialah pemeriksaan kadar bilirubin serum sewaktu-waktu.

3) Ikterus hemolitik karena inkompatibilitas golongan darah lain.

Pada neonatus dengan ikterus hemolitik di mana pemeriksaan kearah inkompatibilitas Rh dan ABO hasilnya negative sedangkan coomb test positif, kemungkinan ikterus akibat hemolisis inkompatibilitas darah lain harus dipikirkan.

4) Penyakit hemolitik karena kelainan eritrosit kongenital

Golongan penyakit ini dapat menimbulkan gambaran klinik yang menyerupai eritroblastis fetalis akibat iso-imunitas

b. Ikterus Obstruktiva

Obstruktiva terjadi karena sumbatan penyaluran empedu dapat terjadi didalam hepar dan di luar hepar. Akibat obstruktiva itu terjadi penumpukan bilirubin langsung melebihi 1 mg% maka kita harus curiga akan hal-hal yang menyebabkan obstruksi misalnya sepsis, hepatitis neonatorum, atau obstruksi saluran empedu.

1) Hepatitis Neonatal

Penyakit hepar pada masa bayi baru lahir disebabkan oleh infeksi maupun bukan infeksi, hepatitis neonatal ini mencakup bayi-bayi yang menderita ikterus obstruktiva tanpa tanda dan gejala klinis hepatitis virus.

a) Gejala klinik

Akibat penumpukan bilirubin direk. Ikterus dapat terjadi pada waktu lahir dengan peninggian kadar bilirubin direk pada darah umbilikus. Biasanya terdapat hepatomegali dan splenomegali. Obstruksi total bilirubin dapat terjadi yang ditandai dengan feses yang akolis. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan biopsi hati ditemukan hepatitis yang besarnya ireguler dan banyak ditemukan disel darah. Dan terdapat nekrosis dengan tanda-tanda peradangan. Sel kupfer membengkak dan mengandung besi, pigmen empedu dan lipofuchsin (pada atresia biliaris) yang membedakan hanyalah proliferasi duktus biliaris portal hanya terdapat pada atresia biliaris

2) Hepatitis Virus

Ibu hamil dapat diserang oleh virus hepatitis A,B atau non A dan non B. Pada hepatitis A transmisi trans plasenta belum pernah dilaporkan dan hepatitis B atau non A dan non B sering terjadi. Transmisi ini terjadi pada akhir kehamilan. Pada infeksi akut transmisi

ini terjadi pada post partum bila ibu mendapat hepatitis B pada kehamilan, bayi dapat lahir dengan HB sAg yang positif, transmisi terjadi melalui sekresi vagina, tetapi bisa juga dari ASI.

b) Gejala Klinik

Bayi mendapat infeksi hepatitis B dari ibunya biasanya gangguan fungsi hepar biasanya minimum, gejala klinis seperti ikterus dapat terjadi dan disertai pembesaran hepar. Bayi ini akan menjadi pembawa kuman yang infeksius dan menjadi sumber penularan untuk yang lain.

c. Ikterus yang disebabkan oleh hal lain

Pengaruh hormon atau obat yang mengurangi kesanggupan hepar untuk mengadakan konjugasi bilirubin misalnya pada ikterus karena ASI ibu disebabkan karena hormon yang dihasilkan dalam ASI ibu menghalangi penyingkiran bilirubin melalui usus. Ini bermula pada hari keempat hingga hari ketujuh dan menghilang selepas hari ke 3 sama 10 minggu (Krishnan Elango,dkk,2016).

4. Metabolisme Bilirubin

Metabolisme mempunyai tingkatan sebagai berikut:

a. Produksi

Bilirubin merupakan produksi yang bersifat toksis dan harus dikeluarkan oleh tubuh. Sebagian besar bilirubin tersebut berasal dari

degradasi hemoglobin darah dan sebagian lagi dari hemoglobin bebas atau proses eritropoesis yang tidak efektif. Pembentukan bilirubin tadi dimulai dengan proses oksidasi yang menghasilkan biliverdin disertai beberapa zat lain. Biliverdin inilah yang mengalami reproduksi dan menjadi bilirubin bebas atau bilirubin IX alfa. Zat ini sulit larut dalam air tetapi larut dalam lemak karena mempunyai sifat lipofilik yang sulit di ekspresikan dan mudah melalui membran biologi seperti plasma.

b. Transportasi

Bilirubin bebas tersebut kemudian bersenyawa dengan albumin dan di bawah ke hepar. Dalam hepar terjadi mekanisme sehingga masuk ke dalam sel hati. Segera setelah ada dalam sel hati terjadi persenyawaan dalam ligandin (protein-Y), protein-Z dan glutation hati lain yang membawa ke retikulum endoplasma hati, tempat terjadi konjugasi.

c. Konjugasi

Didalam hepar bilirubin mengalami proses konjugasi, proses ini timbul karena adanya enzim glukoronil transferase yang kemudian menghasilkan bentuk bilirubin direk. Jenis bilirubin ini dapat larut dalam air dan pada kadar tertentu dapat dieksresikan melalui ginjal.

d. Eksresi

Sebagian besar bilirubin yang terkonjugasi ini dieksresikan melalui duktus hapatikus ke dalam saluran pencernaan dan selanjutnya menjadi

urobilinogen dan keluar dengan tinja sebagai sterkobilin. Dalam usus sebagian di absorpsi kembali ke mukosa usus dan terbentuklah proses enterohepatik. Pada janin sebagian bilirubin yang diserap kembali dieksresi melalui plasenta. Pada BBL eksresi melalui plasenta terputus, karena itu bila fungsi hepar belum matang atau terdapat gangguan dalam fungsi hepar akibat hipoksia, asidosis, atau bila terdapat kekurangan enzim glukoronil transferase atau kekurangan glukosa, maka kekurangan bilirubin indirek dalam darah dapat meninggi.

Masalah akan timbul apabila produksi bilirubin ini terlalu berlebihan atau konjugasi hati menurun, sehingga terjadi akumulasi di dalam darah, peningkatan bilirubin yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan sel tubuh tertentu, misalnya kerusakan sel otak yang akan mengakibatkan gejala sisa di kemudian hari. Karena itu bayi penderita ikterus sebaiknya baru dianggap patologi, sehubungan dengan hal tersebut, maka pada konsentrasi tertentu (hiperbilirubinemia), pemeriksaan lengkap harus dilakukan untuk mengetahui penyebabnya sehingga pengobatan pun dapat dilaksanakan secara dini. Kadar bilirubin yang menimbulkan efek patologi ini disebut hiperbilirubinemia. (Rukiyah Yeyeh Ai dan Lia Yulianti,2013).

5. Etiologi Bayi Ikterus

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, OBO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, pyruvate kinase, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukoronil transferasi (*cringler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terkait terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salsilitas, sulfatfurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam sekresi, gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau structural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan diri bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.

f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI), ikterus akibat ASI merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini untuk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam ASI (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan diresorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian. (Marmi dan Rahardjo, 2012).

6. Patofisiologi Ikterus

a. Patofisiologi Ikterus Fisilogi

Sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak akan dipecah menjadi bilirubin, yang oleh hati akan dimetabolisme dan dibuang melalui feses. Didalam usus juga terdapat banyak bakteri yang mampu mengubah bilirubin sehingga mudah dikeluarkan oleh feses. Hal ini terjadi secara normal pada orang dewasa. Pada bayi baru lahir, jumlah bakteri

pemetabolisme bilirubin ini masih belum mencukupi sehingga ditemukan bilirubin yang masih beredar dalam tubuh tidak dibuang bersama feses. Begitu pula dalam usus bayi terdapat enzim *glukorinil transferase* yang mampu mengubah bilirubin dan menyerap kembali bilirubin kedalam darah sehingga makin memperparah akumulasi bilirubin dalam badannya. Akibatnya pigmen tersebut akan disimpan dibawah kulit, sehingga kulit bayi menjadi kuning. Biasanya dimulai dari wajah, dada, tungkai dan kaki menjadi kuning. Biasanya hiperbilirubinemia dan sakit kuning akan menghilang setelah minggu pertama. Kadar bilirubin yang sangat tinggi biasanya disebabkan pembentukan yang berlebihan atau gangguan pembuangan bilirubin. Kadang pada bayi cukup umur yang diberi susu ASI, kadar bilirubin meningkat secara progresif pada minggu pertama, keadaan ini disebut *jaundice* ASI. Penyebabnya tidak diketahui dan hal ini tidak berbahaya, jika kadar bilirubin sangat tinggi mungkin perlu dilakukan terapi yaitu terapi sinar dan transfusi tukar (Maryunani, 2014: 103-104).

b. Patofisiologi Ikterus Patologi

Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban pada sel hepar yang terlalu berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eritrosit, polisitemia, memendeknya umur eritrosit janin atau bayi, meningkatnya bilirubin dari sumber lain,

atau terdapatnya peningkatan sirkulasi enterohepatik.

Gangguan pemecahan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan kadar bilirubin tubuh, hal ini dapat terjadi apabila kadar protein Y dan Z berkurang, atau pada bayi hipoksia, asidosis. Keadaan lain yang memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar atau neonatus yang mengalami gangguan eksresi, misalnya sumbatan saluran empedu. Pada derajat tertentu bilirubin ini akan bersifat toksik dan merusak jaringan tubuh. Toksisitas terutama ditemukan ada bilirubin indirek yang bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak. Saat ini memungkinkan terjadinya efek patologis pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat menembus darah otak. Kelainan yang terjadi pada otak disebut kernikterus. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan pada syaraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin indirek lebih dari 20 mg/dl (Rukiyah, Yulianti. 2013).

7. Tanda Gejala Bayi Ikterus (Hiperbilirubenemia)

- a. Kulit jaundice (kuning).
- b. Pucat, sering berkaitan dengan anemia hemolitik (misalnya ketidakcocokan golongan darah ABO, rhesus, defisiensi G6PD) atau kehilangan darah ekstravaskular.
- c. Sklera ikterik.

- d. Peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg% pada neonatus yang cukup bulan dari 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan.
- e. Kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori.
- f. Asfiksia.
- g. Hipoksia.
- h. Sindrom gangguan pernafasan.
- i. Pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit.
- j. Feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologist dapat ditemukan adanya kejang.
- k. Epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung).
- l. Terjadi pembesaran hati.
- m. Dehidrasi, asupan kalori tidak kuat misalnya (kurang minum, dan muntah-muntah).
- n. Letargi.
- o. Refleks moro lemah atau tidak ada sama sekali.
- p. Tampak ikterus, sclera, kuku, kulit dan membran mukosa, kuning pada 24 jam pertama yang disebabkan oleh penyakit hemolitik waktu lahir, sepsis, atau ibu dengan infeksi (Lockhart Anita, Saputra Lyndon. 2014).

8. Penyebab Ikterus

Penyebab ikterus pada bayi dapat berdiri sendiri ataupun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Ikterus Prahepatik

Produksi bilirubin yang meningkat terjadi pada hemolisis sel darah merah, peningkatan pembentukan bilirubin dapat disebabkan oleh:

- 1) Kelainan sel darah merah
- 2) Infeksi seperti malaria, dan sepsis.
- 3) Toksin yang berasal dari luar tubuh seperti : obat-obatan, maupun yang berasal dari dalam tubuh seperti yang terjadi pada reaksi transfuse dan eritroblastosis fetalis.

b. Ikterus Pascahepatik

Bendungan pada saluran empedu akan menyebabkan peninggian bilirubin konjugasi yang larut dalam air. Akibatnya bilirubin akan mengalami regurgitasi kembali ke dalam sel hati dan terus memasuki peredaran darah, masuk ke ginjal dan dieksresikan oleh ginjal sehingga ditemukan bilirubin dalam urin. Sebaliknya karena ada bendungan pengeluaran bilirubin ke dalam saluran pencernaan berkurang sehingga tinja akan berwarna dempul karena tidak mengandung sterkobilin.

c. Ikterus Hepatoseluler

Kerusakan sel hati menyebabkan konjugasi bilirubin terganggu sehingga

bilirubin direk akan meningkat dan juga menyebabkan bendungan didalam hati sehingga bilirubin darah akan mengadakan reguritasi ke dalam sel hati yang kemudian menyebabkan peninggian kadar bilirubin konjugasi didalam aliran darah. Kerusakan sel hati terjadi pada keadaan seperti : hepatitis, tumor, bahan kimia, dan lain-lain (Yunanto & Ari, 2014)

Penyebab Ikterus pada bayi baru lahir dapat berdiri sendiri ataupun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Produksi yang berlebihan, misalnya pada pemecahan darah (hemolisis) yang berlebihan pada incompatibilitas (ketidak sesuaian) darah bayi dan ibunya.
- 2) Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi akibat dari gangguan fungsi liver.
- 3) Gangguan Transportasi karena kurangnya albumin yang mengikat bilirubin.
- 4) Gangguan Eksresi yang terjadi akibat sumbatan dalam liver (karena infeksi atau kerusakan sel liver) (Khadijah, dkk, 2013).

Faktor Resiko untuk timbulnya ikterus fisiologi adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Maternal
 - a) Ras atau kelompok etnik tertentu (Asia, Amerika, Yunani).
 - b) Komplikasi kehamilan (DM, incompatibilitas ABO dan Rh).
 - c) Penggunaan infus oksitosin dalam larutan hipotonik.

d) Masa gestasi, riwayat persalinan.

e) ASI

2) Faktor Perinatal

a) Trauma lahir (sefalhematom, ekimosis).

b) Infeksi (bakteri, virus, protozoa)

3) Faktor Neonatus

a) Prematur.

b) Faktor genetik.

c) Polisitemia.

d) Obat (streptomisin, kloramfenikol, benzyl alkohol).

e) Rendahnya asupan ASI.

f) Hipoglikemia.

g) Hipoalbuminemia.

9. Komplikasi

Terjadi kern ikterus yaitu kerusakan otak akibat perleketaan bilirubin indirek pada otak. Pada kern ikterus gejala klinik pada permulaan tidak jelas antara lain: bayi tidak mau menghisap, letargi, mata berputar-putar, gerakan tidak menentu, kejang tonus otot meninggi, leher kaku, dan akhirnya opistotonus (Dewi Lia Nanny, 2013).

10. Diagnosa

Anamnesis ikterus pada riwayat obstetri sebelumnya sangat membantu dalam menegakkan diagnosis hiperbilirubnemia pada bayi. Termasuk anamnesis mengenai riwayat inkompabilitas darah, riwayat transfusi tukar atau terapi sinar pada bayi sebelumnya. Disamping itu faktor resiko kehamilan dan persalinan juga berperan dalam diagnosis dini ikterus/hiperbilirubinemia pada bayi. Faktor resiko itu antara lain adalah kehamilan dengan komplikasi, obat yang diberikan pada ibu selama hamil/persalinan, kehamilan dengan diabetes mellitus, gawat janin, malnutrisi intrauterine, infeksi intranatal, danlain-lain.

Secara klinis ikterus pada bayi dapat dilihat segera setelah lahir atau setelah beberapa hari kemudian. Pada bayi dengan peninggian bilirubin indirek, kulit tampak berwarna kuning terang sampai jingga, sedangkan pada penderita dengan gangguan obstruksi empedu warna kuning kulit tampak kehijauan. Penilaian ini sangat sulit dikarenakan ketergantungan dari warna kulit bayi sendiri. Tanpa mempersoalkan usia kehamilan atau saat timbulnya ikterus, hiperbilirubinemia yang cukup berarti memerlukan penilaian diagnostik lengkap, yang mencakup penentuan fraksi bilirubin langsung (direk) dan tidak langsung (indirek) hemoglobin, hitung lekosit, golongan darah, tes Coombs dan pemeriksaan apusan darah tepi. Bilirubinemia indirek, retikulositosis dan sediaan apusan memperlihatkan petunjuk adanya hemolisis akibat nonimunologik. Jika terdapat hiperbilirunemia direk, adanya hepatitis, fibrosis

kistis dan sepsis. Jika hitung retikulosit, tes coombs dan bilirubin indirek normal, maka mungkin terdapat hiperbilirubinemia indirek fisiologis atau patologis.

a. Pendekatan menentukan kemungkinan penyebab

Menetapkan penyebab ikterus tidak selamanya mudah dan membutuhkan pemeriksaan yang banyak dan mahal, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan khusus untuk dapat memperkirakan penyebabnya.

1) Ikterus yang timbul pada 24 jam pertama

Penyebab ikterus yang terjadi pada 24 jam pertama menurut besarnya kemungkinan dapat disusun sebagai berikut:

- a) Inkompatibilitas darah Rh, ABO atau golongan lain
- b) Infeksi intra uterin (oleh virus, toxoplasma, dan kadang-kadang bakteri).
- c) Defisiensi G6PD.

2) Ikterus yang timbul 24-72 jam sesudah lahir

- a) Biasanya ikterus fisiologi
- b) Masih ada kemungkinan inkompatibilitas darah ABO atau Rh atau golongan lain. Hal ini dapat diduga kalau peningkatan kadar bilirubin cepat, misalnya melebihi 5 mg% per 24 jam.
- c) Defisiensi enzim G6PD.
- d) Polisitemia.

- e) Hemolisis perdarahan tertutup (perdarahan subaponeurosis, perdarahan hepar subkapsuler dan lain-lain).
 - f) Hipoksia.
 - g) Sferositosis, elipssitosis, dan lain-lain.
 - h) Dehidrasi Asidosis.
 - i) Defisiensi enzim eritrosit lainnya.
- 3) Ikterus yang timbul sesudah 72 jam pertama sampai akhir minggu pertama
- a) Biasanya karena infeksi (sepsis)
 - b) Dehidrasi asidosis
 - c) Defisiensi enzim G6PD.
 - d) Pengaruh obat.
 - e) Sindrom Crigler-Najjar.
 - f) Sindrom Gilbert.
- 4) Ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama dan selanjutnya
- a) Biasanya karena obstruksi
 - b) Hipotiroidisme.
 - c) Infeksi
 - d) Neonatal hepatitis.
- Pemeriksaan yang perlu dilakukan:
- a) Pemeriksaan bilirubin (direk dan indirek) secara berkala.

- b) Pemeriksaan darah tepi.
 - c) Pemeriksaan penyaring G6PD
 - d) Pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan kemungkinan penyebab.
- b. Ikterus baru dapat dikatakan fisiologis sesudah observasi dan pemeriksaan selanjutnya tidak menunjukkan dasar patologis dan tidak mempunyai potensi berkembang menjadi kern ikterus (manggiasih,dkk, 2016).
- WHO dalam panduannya menerangkan cara menentukan ikterus dari inspeksi, sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan dilakukan dengan pencahayaan yang cukup (disiang hari dengan cahaya matahari) karena ikterus bisa terlihat lebih parah bila dilihat dengan pencahayaan buatan dan bisa tidak terlihat pada pencahayaan yang kurang.
 - 2) Tekan kulit bayi dengan lembut dengan jari untuk mengetahui warna dibawah kulit dan jaringan subkutan.
 - 3) Tentukan keparahan ikterus berdasarkan umur bayi dan bagian tubuh yang tampak kuning.
- c. Pemeriksaan bilirubin serum merupakan baku emas penegakan diagnosis ikterus neonatorum serta untuk menentukan perlunya intervensi lebih lanjut. Beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan serum bilirubin adalah tindakan ini merupakan tindakan

invasif yang di anggap dapat meningkatkan morbiditas neonatus. Umumnya yang di periksa adalah bilirubin total. Beberapa senter menyarankan pemeriksaan bilirubin direk, bila kadar bilirubin total >20mg/dL atau usia bayi >2 minggu (anggaraini Yetti,2014).

11. Penatalaksanaan


a. Nasehat untuk ibu

Mengingat kemungkinan bahwa 60% bayi baru lahir akan menderita kuning, maka bidan dan perawat harus dapat memberi nasehat pada para ibu mengenai penanganan ikterus fisiologi dan memberitahu gejala dini ikterus patologik sebelum memulangkan bayi atau pada saat perawatan antenatal care. Isi nasehat tersebut antara lain :

- 1) Pada waktu hamil, ibu hamil sebaiknya tidak minum obat, ramuan, atau jamu-jamuan yang diketahui sering berakibat kuning pada bayi.
- 2) Jika bayi yang dilahirkan normal, maka ibu harus mengusahakan agar bayinya menerima cukup asupan kalori dan cairan. Dirumah bersalin/rumah sakit agar diusahakan ruang bayi cukup mendapatkan sinar matahari pagi.
- 3) Pada saat memulangkan bayi pada umur bayi 3-4 hari, nasehat yang diberikan adalah menganjurkan ibu untuk mrnyusui bayinya sesering mungkin dan menjemur bayinya pada pagi hari selama 30 menit, tanpa baju, sampai bayi berumur 10-14 hari. Ibu diberitahu untuk tidak

memberi kamfer pada baju bayi.

- 4) Bayi yang sudah banyak menyusui dan sudah dijemur namun masih nampak kuning, ibu dianjurkan untuk membawa bayinya ke puskesmas /dokter/rumah sakit.
 - 5) Ibu diberitahu tentang terapi sinar yang diberikan bila kadar bilirubin total lebih dari 12 mg% dan transfusi tukar bila kadar bilirubin indirek lebih dari 20 mg%.
 - 6) Bayi yang pada umur 2-3 minggu masih kuning tetapi tidak begitu tinggi, kemungkinan bayi mengalami gangguan metabolik, kelainan hepar atau kuning karena ASI. Maka ibu dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter.
 - 7) Penilaian bayi ikterus (Maryuni anik,2014).
- b. Pengamatan ikterus kadang-kadang agak sulit apalagi dalam cahaya buatan. Paling baik pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari dan dengan menekan sedikit kulit yang akan diamati untuk menghilangkan warna karena pengaruh sirkulasi darah. Ada beberapa cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan resiko terjadinya kern ikterus dengan cara klinis (Kramer) yang dilakukan dibawah sinar biasa (*daylight*). (Marmi dan Rahardjo,2012).



Gambar 1 Gambar rumus Kramer
(sumber: Marmi dan Rahardjo,2012)

Tabel 2 Rumus Kramer

Daerah Gambar	Luas icterus	Kadar bilirubin
1	Kepala dan leher	5
2	Daerah 1 (+) Badan bagian atas	9
3	Badan 1,2 (+) Badan bagian bawah dan tungkai	11
4	Daerah 1,2,3 (+) Lengan dan kaki dibawah dengkul	12
5	Daerah 1,2,3,4 (+) Tangan dan kaki	>12,5

(Sumber: Marmi dan Rahardjo,2012)

SOP Bayi Ikterus PKM Jumpandang Baru Makassar

1. Pengertian	Ikterus adalah warna kuning di kulit, konjungtiva, dan mukosa yang terjadi akibat meningkatnya kadar bilirubin dalam darah
2. Tujuan	Untuk mencegah terjadinya ikterus pada bayi
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan klinis.
4. Referensi	Buku pedoman pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di puskesmas jumpandang baru
5. Prosedur	<p><u>PERSIAPAN</u></p> <p>Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senter 2. Stetoskop 3. Termometer 4. Masker 5. Handscoon 6. Alat tulis
6. Langkah-langkah	<p><u>PROSEDUR KERJA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Anamnesa pasien 3. Mengecek tanda-tanda vital 4. Menilai deraja ikterus <ol style="list-style-type: none"> a. Ikterus normal b. Ikterus fisiologis c. Ikterus patologis 5. Pencatatan dan pelaporan
7. Bagan Alir	
8. Unit terkait	

c. Pemeriksaan diagnostic

- 1) Test coombs pada tali pusat baru lahir : hasil ositif test coombs indirek menandakan adanya antibody Rh-positif, anti A atau anti B dalam darah ibu. Hasil positif dari test coombs direk menandakan adanya sensitasi (Rh-positif, anti A, anti B) SDM dari neonatus.
- 2) Golongan darah bayi dan ibu : mengidentifikasi inkompatibilitas ABO.
- 3) Bilirubin total : kadar direk (terkonjugasi) bermakna jika melebihi 1,0-1,5 mg/dL, yang mungkin dihubungkan dengan sepsis. Kadar indirek (tidak terkonjugasi) tidak boleh melebihi peningkatan 5 mg/dL dalam 24 jam atau tidak boleh lebih dari 20 mg/dL pada bayi cukup bulan atau 15 mg/dL pada bayi preterm (tergantung pada berat badan)
- 4) Protein serum total : kadar kurang dari 3,0 mg/dL menandakan penurunan kapasitas ikatan, terutama pada bayi preterm.
- 5) Hitung dalam darah lengkap : hemoglobin (HB) mungkin rendah (kurang dari 14 mg/dL) karena hemolysis hematocrit (HT) mungkin meningkat (kurang dari 45%) dengan hemolysis dan anemia berebihan.
- 6) Glukosa : kadar dextrosit mungkin kurang dari 45% glukosa darah lengkap kurang dari 30 mg/dL atau tes glukosa serum kurang dari 40 mg/dL bila bayi baru lahir hipoglikemia dan mulai menggunakan simpanan lemak dan melepaskan asam lemak (Marmi dan Rahardjo,2012).

12. Penanganan Bayi Ikterus

a. Ikterus fisiologi

- 1) Pemberitahuan kepada keluarga tentang kondisi bayi.
- 2) Berikan obat oral yang telah di Instruksikan oleh dokter dengan prinsip 5B, benar obat, benar dosis, benar pasien, benar dosis, benar pasien, benar cara pemberian, benar waktu pemberian.
- 3) Jemur bayi tiap pagi dibawah sinar matahari dengan menutup mata dan genital bayi memakai kertas karbon yang dilapisi kain kassa, dan posisi bayi selalu dirubah untuk mencegah decubitas dan sinar ultraviolet dapat merata keseluruhan tubuh.
- 4) Berikan ibu penjelasan pentingnya pemberian minum secara adekuat dan berikan ASI saja dan bantu ibu saat memberi ASI. (Rukiyah Yeyeh Ai, dkk tahun 2012 hal 275).

b. Ikterus patologi

1) Terapi sinar

Terapi sinar dilakukan selama 24 jam atau setidaknya sampai kadar bilirubin dalam darah kembali ke ambang batas normal. Dengan fototerapi bilirubin dalam tubuh bayi dapat dipecah dan menjadi mudah larut dalam air tanpa harus diubah dahulu oleh organ hati, terapi sinar juga berupaya menjaga kadar bilirubin agar tidak meningkat sehingga menimbulkan resiko yang fatal, sinar yang

muncul dari lampu tersebut kemudian diarahkan pada tubuh bayi, seluruh pakaiannya dilepas kecuali mata dan alat kelamin harus ditutup dengan kain yang berwarna hitam yang bertujuan untuk mencegah efek cahaya berlebihan dari lampu tersebut.

Beberapa hal yang harus perlu diperhatikan dalam pelaksanaan terapi sinar adalah :

- a) Lampu yang dipakai sebaiknya tidak digunakan lebih dari 500 jam, untuk menghindari turunnya energy yang dihasilkan oleh lampu yang digunakan.
- b) Pakaian bayi dibuka agar bagian tubuh dapat seluas mungkin terkena sinar matahari.
- c) Kedua mata ditutup dengan penutup yang dapat memantulkan cahaya untuk mencegah kerusakan retina. Penutup mata dilepas saat pemberian minum dan kunjungan orang tua untuk memberikan rangsangan visual pada neonatus. Pemantauan iritasi mata dilakukan setiap 6 jam dengan membuka penutup mata.
- d) Daerah penutup kemaluan ditutup, dengan penutup yang dapat memantulan cahaya untuk melindungi daerah kemaluan dari cahaya fototerapi.
- e) Posisi lampu diatur dengan jarak 20-30 cm diatas tubuh bayi, untuk mendapatkan energy yang optimal.

- f) Posisi bayi diubah tiap 8 jam agar tubuh mendapatkan penyinaran seluas mungkin.
- g) Suhu tubuh di atur 4-6 jam sekali atau sewaktu-waktu bila perlu.
- h) Pemasukan cairan dan minuman dan pengeluaran feces, urin dan muntah diukur, dicatat dan dilakukakan pemantauan tanda dehidrasi.
- i) Lamanya terapi sinar di catat.

Apabila dalam evaluasi kadar bilirubin berada dalam ambang batas normal, terapi sinar dihentikan. Jika kadar bilirubin masih tetap atau tidak banyak berubah, perlu dipikirkan adanya beberapa kemungkinan, antara lain lampu yang tidak efektif atau bayi yang menderita dehidrasi, hipoksia, infeksi, gangguan metabolisme dan lain-lain. Keadaan demikian memerlukan tindakan kolaborasi dengan tim medis. Pemberian terapi sinar dapat menimbulkan efek samping. Namun, efek samping tersebut bersifat sementara yang dapat dicegah atau ditanggulangi dengan memperhatikan tata cara penggunaan terapi sinar dan diikuti dengan pemantauan keadaan bayi secara berkelanjutan. Kelainan yang mungkin timbul pada neonatus yang mendapat terapi sinar adalah

- a) Peningkatan kehilangan cairan yang tidak teratur (insensible water loss) Energi fototerapi dapat meningkatkan suhu lingkungan dan menyebabkan peningkatan penguapan melalui kulit, terutama bayi premature atau berat lahir sangat rendah. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan pemberian cairan tambahan.
- b) Frekuensi defekasi meningkat. Meningkatnya bilirubin indirek pada usus akan meningkatkan pembentukan enzim laktase yang dapat meningkatkan peristaltic usus. Pemberian susu dengan kadar laktosa rendah akan mengurangi timbulnya diare.
- c) Timbul kelainan kulit “flea bite rash” di daerah muka badan dan ekstrimitas. Kelainan ini akan segera hilang setelah terapi dihentikan. Dilaporkan pada beberapa terjadi “Bronze baby syndrom” hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu mengeluarkan dengan segera hasil terapi sinar. Perubahan warna kulit ini bersifat sementara dan tidak mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi
- d) Peningkatan suhu. Beberapa neonatus yang mendapat terapi sinar, menunjukkan kenaikan suhu lingkungan yang meningkat atau gangguan pengaturan suhu tubuh bayi, pada bayi premature fungsi termosta yang belum matang. Pada keadaan ini fototerapi dapat dilanjutkan dengan mematikan sebagian lampu yang digunakan dan dilakukan pemantauan suhu tubuh neonatus dengan jangka

waktu yang lebih singkat.

- e) Kadang ditemukan kelainan, seperti gangguan minum, lateragi, dan iritabilitas. Keadaan ini bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya.
- f) Pada neonatus yang mendapat terapi sinar, gangguan pada retina dan fungsi penglihatan lainnya serta gangguan tumbuh kembang tidak dapat dibuktikan dan belum ditemukan, walaupun demikian diperlukan kewaspadaan perawat tentang kemungkinan timbulnya keadaan tersebut.

2) Transfusi tukar (*exchange transfusion*)

Jika setelah menjalani fototerapi tidak ada perbaikan dan kadar bilirubin terus meningkat hingga mencapai 20 mg/dl atau lebih, maka perlu dilakukan terapi transfuse darah. Dikhawatirkan kelebihan bilirubin dapat menimbulkan kerusakan sel saraf otak (kern ikterus). Efek inilah yang harus diwaspadai karena anak biasa mengalami beberapa gangguan perkembangan. Misalnya keterbelakangan mental, cerebrel palsy, gangguan motorik dan bicara, serta gangguan penglihatan dan pendengaran. Untuk itu, darah bayi yang sudah teracuni akan dibuang dan ditukar dengan darah lain. Penggantian darah sirkulasi neonatus dengan darah dari donor dengan cara mengeluarkan darah neonatus dan dimasukkan darah donor secara

berulang dan bergantian melalui suatu prosedur. Jumlah darah yang diganti sama dengan yang dikeluarkan. Pergantian darah bisa mencapai 75-85% dari jumlah darah neonatus.

Tujuan transfuse tukar adalah untuk menurunkan kadar bilirubin indirek, mengganti eritrosit yang dapat dihemolisis, membuang antibody yang menyebabkan hemolisis, dan mengoreksi anemia. Transfusi tukar akan dilakukan oleh dokter pada neonatus dengan kadar bilirubin indirek sama dengan atau lebih tinggi dari 20mg% atau sebelum bilirubin mencapai kadar 20mg%. Pada neonatus dengan kadar bilirubin tali pusat lebih dari 4 mg% dan kadar hemoglobin tali pusat kurang dari 10 mg%, peningkatan kadar bilirubin 1 mg% tiap jam. Darah yang digunakan sebagai darah pengganti (darah donor) ditetapkan berdasarkan penyebab hiperbilirubinemia. Transfusi tukar dilakukan, tetapi sebelumnya label darah harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan permintaan dan tujuan transfusi tukar. Darah yang digunakan usianya harus kurang dari 27 jam. Darah yang akan dimasukan harus dihangatkan dulu, 2 jam sebelum transfuse tukar bayi dipuasakan, bila perlu dipasang pipa nasogastrik, lalu bayi dibawa keruang aseptik untuk menjalani prosedur transfuse tukar.

Prosedur transfuse tukar : Bayi ditidurkan diatas meja dengan fiksasi longgar, pasang monitor jantung dengan alarm jantung diatur diluar

batas 100-180 kali/menit, masukkan kateter kedalam vena umbilikalis, melalui kateter darah bayi dihisap sebanyak 200 cc lalu dikeluarkan, kemudian darah pengganti sebanyak 200 cc dimasukkan kedalam tubuh bayi. Setelah menunggu 20 detik, lalu darah bayi diambil lagi sebanyak 200 cc dan dikeluarkan. Kemudian dimasukan darah pengganti dengan jumlah yang sama. Demikian siklus pergantian tersebut diulangi sampai selesai. Kecepatan menghisap dan memasukkan darah kedalam tubuh bayi diperkirakan 1,8 kg/cc BB/menit. Jumlah darah yang ditransfuse tukar berkisar 140-180 bergantung pada tinggi rendahnya kadar bilirubin sebelum transfuse tukar. Saat transfusi tukar, darah donor dihangatkan sesuai suhu temperatur ruang. Pemanasan darah dapat merusak eritrosit yang akan menghemolisis dan menghasilkan bilirubin. Pemanasan tidak boleh dilakukan secara langsung dan tidak boleh menggunakan microwave. Darah dihangatkan dengan koil penghangat yang dirancang untuk tujuan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan selama transfusi tukar berlangsung, perawat bertanggung jawab membantu dan mencatat tanda penting tiap 15 menit. Pemeriksaan kadar kalsium dan glukosa darah dilakukan selama transfusi tukar. Segera setelah transfusi tukar selesai, dilakukan pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, elektrolit, dan bilirubin, kemudian diulangi tiap 4-8 jam atau sesuai anjuran dokter. Selama dan

sesudah transfusi tukar dapat terjadi komplikasi emboli udara dan trombosis udara dan trombosis, aritmia, hipervolemia, henti jantung, hipernatremia, hiperkalemia, hipokalsemia, asidosis dan alkalosis post transfusi tukar, trombositopenia, perdarahan dan kelebihan heparin, bakterimia, pasti hepatitis virus B (Wahyuni, dan Sari,2012).

3) Terapi Obat-obatan

Terapi lainnya adalah dengan obat-obatan. Misalnya phenobarbital atau luminal untuk meningkatkan pengikatan bilirubin di sel-sel hati sehingga bilirubin yang sifatnya indirect berubah menjadi direk. Ada juga obat-obatan yang mengandung plasma atau albumin yang berguna untuk mengurangi timbunan bilirubin dan mengangkut bilirubin bebas ke organ hati. Biasanya terapi ini dilakukan bersamaan dengan terapi lain, seperti fototerapi. Jika sudah tampak perbaikan, maka terapi obat-obatan ini dikurangi bahkan dihentikan. Efek sampingnya adalah mengantuk dan akibatnya bayi jadi banyak tidur dan kurang minum ASI sehingga dikhawatirkan terjadi kekurangan kadar gula dalam darah yang justru memicu peningkatan bilirubin. Oleh karena itu, terapi obat-obatan bukan menjadi pilihan utama untuk menangani hiperbilirubin karena biasanya dengan fototerapi bayi sudah bias ditangani.

4) Menyusui Bayi dengan ASI

Bilirubin juga dapat pecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urine, untuk itu bayi harus mendapatkan cukup ASI. Seperti diketahui, ASI memiliki zat-zat terbaik bagi bayi yang dapat memperlancar buang air besar dan buang air kecilnya. Akan tetapi, pemberian ASI juga harus dibawah pengawasan dokter karena pada beberapa kasus, ASI justru meningkatkan kadar bilirubin bayi (breast milk jaundice). Kejadian ini biasanya muncul diminggu pertama dan kedua setelah bayi lahir dan akan berakhir pada minggu ke-3. Biasanya untuk sementara ibu tidak boleh menyusui bayinya. Setelah kadar bilirubin bayi normal, baru boleh disusui lagi.

5) Terapi Sinar Matahari

Terapi dengan sinar matahari hanya merupakan terapi tambahan. Biasanya dianjurkan setelah bayi selesai dirawat dirumah sakit. Caranya, bayi dijemur selama setengah jam dengan posisi yang berbeda-beda. Caranya seperempat jam dalam keadaan terlentang, misalnya, seperempat jam kemudian telungkup. Lakukan antara jam 07.00 sampai 09.00. Inilah waktu dimana sinar surya efektif mengurangi kadar bilirubin. Di bawah jam tujuh, sinar ultraviolet belum cukup efektif, sedangkan diatas jam sembilan kekuatannya sudah terlalu tinggi sehingga akan merusak kulit. Hindari posisi yang

membuat bayi melihat langsung ke matahari karena dapat merusak matanya. Perhatikan pula situasi disekeliling, keadaan udara harus bersih (Nurhayati, dkk.2013).

C. Tinjauan Tentang Proses Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa proses berpikir dan bertindak yang terlibat, tetapi juga tingkat perilaku dalam setiap langkah yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/pelayanan yang aman dan menyeluruh.

Proses asuhan kebidanan ada tujuh langkah yang secara periodik disaring ulang, itu mulai dengan pengumpulan data dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah terdiri dari kerangka yang menyeluruh dan dapat diterapkan dalam setiap situasi. Setiap langkah bagaimanapun dapat diuraikan dalam tugas yang terbatas dan ini bervariasi sesuai dengan kondisi pasien.

2. Tahapan dalam Manajemen Kebidanan

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pengumpulan data dasar secara komprehensif untuk evaluasi pasien. Data dasar ini termasuk riwayat kesehatan, hasil; pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjau catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Tinjauan singkat dari data laboratorium dan pemeriksaan tambahan lainnya, semua informasi pasien dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien. Bidan kumpulan data awal yang menyeluruh walaupun pasien itu ada komplikasi yang akan dibutuhkan yang akan di ajukan kepada dokter.

Dalam pengumpulan data dasar pada khusus bayi ikterus fisiologi bayi tersebut biasanya mengalami demam, terlihat kuning, susah menghisap, sering tidur. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : Melakukan anamnesa berupa tanya jawab dengan keluarga pasien : Identitas bayi, Umur bayi, jenis kelamin, Berat badan, Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang lalu, Serta Riwayat Penyakit ibu. Kadang-kadang langkah I mungkin tumpang tindih dengan langkah 5 dan 6 karena data yang diperlukan diperoleh hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan lainnya. Kadang-kadang bidan perlu memulai langsung dari langkah keempat dalam rangka untuk mengumpulkan data awal yang lengkap untuk diajukan ke dokter.

b. Langkah Ke II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Dikembangkan dari data dasar : interpretasi dari data ke masalah atau diagnosa khusus yang teridentifikasi. Kedua kata masalah maupun diagnosa dipakai, karena beberapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat wacana yang menyeluruh untuk pasien. Masalah pada bayi baru lahir dengan ikterus fisiologi adalah gangguan pernafasan, kurangnya masukan nutrisi, karena bayi malas minum.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan masalah yang sudah ada adalah suatu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengakhiran apapun. Langkah ini sangat vital untuk asuhan yang aman. Diagnosis potensial pada bayi baru lahir dengan ikterus fisiologi adalah potensial terjadinya kern ikterus yang berhubungan dengan peningkatan kadar bilirubin serta potensial kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan terapi sinar. Antisipasi tindakan yang dilakukan oleh bidan yaitu dengan cara perbaikan KU dengan pemberian ASI secara adekuat.

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Beberapa data menunjukkan situasi emergency dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Kebutuhan terhadap tindakan segera pada kasus ikterus fisiologi adalah kolaborasi maupun konsultasi terhadap tim kesehatan lain dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kolaborasi mungkin dapat dilakukan dengan dokter spesialis anak dalam pemberian terapi serta petugas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penunjang.

e. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan yang komprehensif, ditentukan oleh langkah sebelumnya, adalah suatu perkembangan dari masalah atau diagnosa yang sedang terjadi atau terantisipasi dan juga termasuk mengumpulkan informasi tambahan atau tertinggal untuk data dasar. Suatu rencana asuhan yang komprehensif tidak saja mencakup apa yang ditentukan oleh kondisi pasien dan masalah yang terkait, tetapi juga menggarisbawahi bimbingan yang terantisipasi (*anticipatory guide*.)

Penyuluhan pasien dan konseling, dan rujukan-rujukan yang perlu untuk masalah sosial, ekonomi, agama, keluarga, budaya, atau masalah psikologi. Dengan kata lain meliputi segala sesuatu mengenai semua aspek dari asuhan kesehatannya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan dan wanita itu agar efektif, karena pada akhirnya wanita itulah yang akan melaksanakan rencana itu atau tidak. Oleh karena itu tugas dalam langkah ini termasuk membuat dan mendiskusikan rencana dengan keluarga pasien begitu juga termasuk penegasannya akan persetujuannya. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar, berlandaskan pengetahuan teori yang berkaitan, sesuai, dan pengetahuan teori yang up to date serta difalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan keluarga pasien tersebut dan apa yang dia tidak inginkan, rasional yang berdasarkan asumsi-asumsi dari perilaku pasien yang tidak di validasi, pengetahuan teoritis yang salah atau tidak memadai, atau data dasar yang tidak lengkap adalah tidak sah dan akan menghasilkan asuhan pasien yang tidak mungkin juga tidak aman.

Perencanaan asuhan yang diberikan kepada bayi ikterus fisiologi yaitu, melakukan seperti lainnya, berikan asuhan kepada keluarga untuk menjemur bayinya tiap pagi selama kurang lebih 30 menit pada pukul 07:00-09:00 WITA, dibawah sinar matahari dengan menutup mata dan

genitalia bayi, menjelaskan kepada keluarga pemberian ASI sedini dan sesering mungkin.

f. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh wanita tersebut, bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu : memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dari asuhan pasien. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan oleh bidan yang menangani bayi sesuai dengan rencana asuhan yang direncanakan. Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa dengan mengecek kadar bilirubin dan darah pada bayi.

g. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi langkah terakhir ini sebenarnya adalah merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam

masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak. Sekali lagi, dengan mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut (Sudarti dan Afroh, 2012:177-182).

Evaluasi yang diharapkan pada bayi baru lahir dengan ikterus fisiologi yaitu: keefektifan dalam pemberian terapi sudah sesuai dengan kebutuhan pasien, warna pada kulit bayi sudah normal kemerahan tidak kuning bayi sudah dapat menyusui dengan adekuat, dan setelah dilakukan fototerapi tidak terdapat efek samping yang terjadi pada bayi.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi asuhan dalam pelayanan kebidanan adalah bagian dari kegiatan yang harus dikerjakan oleh perawat dan bidan setelah memberi asuhan kepada pasien. Dokumentasi merupakan suatu informasi lengkap meliputi status kesehatan kesehatan pasien, kebutuhan pasien, kegiatan asuhan kebidanan serta respons pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Dengan demikian dokumentasi kebidanan mempunyai porsi yang besar dari

catatan klinis pasien yang menginformasikan faktor tertentu atau situasi yang terjadi selama asuhan dilaksanakan. Disampingkan itu catatan juga dapat sebagai wahana komunikasi dan koordinasi antar profesi (*Interdisipliner*) yang dapat dipergunakan untuk mengungkap suatu fakta aktual untuk dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan sesuai standar. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan standar dengan baik merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap tenaga kebidanan agar mampu membuat dokumentasi kebidanan secara baik dan benar. Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, sehingga langkah-langkah dalam manajemen merupakan alur pikir bidan dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan klinis.

a. Subjektif

Subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah 1 varney. Subjektif (S) ini merupakan informasi yang diperoleh langsung dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkas yang berhubungan dengan diagnosa. Data subyektif pada kasus bayi dengan ikterus fisiologi didapatkan dari hasil wawancara dengan keluarga

mengenai perubahan setelah dilakukan evaluasi hasilnya.

b. Objektif

Objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnosa lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment sebagai langkah 1 varney. Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium, USG, dan lain-lain. Apa yang dapat diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan. Data objektif pada kasus bayi baru lahir dengan dengan ikterus fisiologi adalah berupa hasil observasi keadaan umum dan vital sign, berat badan, refleks menghisap, keaktifan gerak, pola nutrisi, eliminasi, dan hasil laboratorium kadar bilirubin bayi.

c. Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi : 1. Diagnosa atau masalah (Diagnosa adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi klien : hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat. Masalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan atau kesehatan tetapi tidak masuk dalam diagnosa. 2. Antisipasi diagnosa atau

masalah potensia. Perlunya tindakan segera oleh Bidan atau Dokter, konsultasi atau kolaborasi atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney. Pada kasus ikterus fisiologi, diagnosis yang dapat ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif, masalah yang dapat timbul yaitu keadaan umum lemah dan malas minum.

d. Planning

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan dan evaluasi berdasarkan assesment sebagai langkah 5,6,7. Penatalaksanaan mencatat seluruh perencanaan, dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan, antara lain sebagai berikut : memonitor keadaan umum dan tanda-tanda vital, serta menimbang berat badan, jika refleks menghisap sudah baik dan pengeluaran ASI kuat dapat diberikan kembali secara on demand, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melanjutkan terapi dan tindakan hingga bayi sembuh dari ikterus.

4. Tinjauan Islam Tentang Bayi Ikterus

a. Firman Allah SWT dalam Q,S An-Nahl (16) :78.

أَخْرَجَكُم مِّن بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لِيَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَلْوَاعَ

بَشَائِرُونَ

Terjemahannya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014).

Tafsir Ilmiah :

(Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun) jumlah kalimat laa ta'lamuuna syain berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan (Dan dia memberi kalian pendengaran) lafas as-sam'u bermakna jamak sekalipun lafalnya murtad (penglihatan dan hati) kalbu (agar kalian bersyukur) kepada-Nya atas hal-hal tersebut, oleh karenanya kalian beriman kepada-Nya.

b. firman Allah SWT dalam Q,S Luqman (31) :14.

ووصينا آل عمران بوالدته حملة أهم وهذا على ومن ونصراه نبي عامين أن اشكر لي ولوالدتك إلي
المصير

Terjemahannya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014).

Tafsir Ilmiah:

(Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya) maksudnya Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua tahun hendaknya) Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali.

c. firman Allah SWT dalam Q,S Al-Ahqaf (46) :15.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أهم كرها ووضع عنه كرها وحمله ونصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فآله ب أوزعزي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي نبي ذريتي إني نبت إليك وإني من المسلمون

Terjemahannya:

Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014).

Tafsir Ilmiah :

(Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya) menurut suatu qiraat lafal Ihsaan dibaca Husnan; maksudnya: Kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lafal Ihsaan adalah Mashdar yang dinashabkan oleh Fi'ilnya yang diperkirakan keberadaannya; demikian pula penjabarannya bila dibaca Husnan (ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah pula) artinya penuh dengan susah payah. (Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu lama masa penyusuan yang maksimal. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan, maka sisanya adalah masa penyusuan (sehingga) menunjukkan makna Ghayah bagi jumlah yang diperkirakan keberadaannya, yakni dia

hidup sehingga (apabila dia telah dewasa) yang dimaksud dengan pengertian dewasa ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh tiga tahun atau tiga puluh tahun (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh tahun, dalam usia ini seseorang telah mencapai batas maksimal kedewasaannya (ia berdoa, "Ya Rabbku!) dan seterusnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai empat puluh tahun sesudah dua tahun Nabi saw. diangkat menjadi rasul. Lalu ia beriman kepada Nabi saw. lalu beriman pula kedua orang tuanya, lalu menyusul anaknya yang bernama Abdurrahman, lalu cucunya yang bernama Atiq (Tunjukilah aku) maksudnya berilah ilham (untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan) nikmat tersebut (kepadaku dan kepada ibu bapakku) yaitu nikmat tauhid (dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridai) maka Abu Bakar segera memerdekakan sembilan orang hamba sahaya yang beriman; mereka disiksa karena memeluk agama Allah (berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada cucuku) maka semua anak cucunya adalah orang-orang yang beriman. (Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.)"

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN
IKTERUS FISILOGI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
MAKASSAR TANGGAL 27 JANUARI – 31 JANUARI 2018

No.Register : 46xxxx
Tanggal Masuk : 27 Januari 2018 Pukul : 13.30 WITA
Tanggal Lahir : 27 Januari 2018 Pukul : 17.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 28 Januari 2018 Pukul : 14.30 WITA
Nama pengkaji : Fatimah

A. Langkah 1 (Identifikasi data dasar)

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"

Tanggal Lahir : 27 Januari 2018

Umur : 1 Hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny. "N" / Tn. "B"

Umur : 39 tahun/41 tahun

Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Buruh Harian
Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa

2. Keluhan Utama

- a. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 28 Januari 2018
- b. Ibu pasien mengatakan bahwa bayinya malas menyusui sejak tanggal 28 Januari 2018

3. Riwayat Obstetri

- a. Ibu pasien mengatakan bahwa ini merupakan anaknya yang ketiga dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.
- b. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 04 April 2017
- c. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan menderita penyakit apapun.
- d. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah mengonsumsi obat apapun dan jamu.

4. Riwayat Persalinan

- a. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang ketiga pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 13.30 WITA, di puskesmas jumpandang baru makassar, ditolong oleh bidan, secara spontan, bayi lahir tunggal,

keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.

Tabel. 3.1 : Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu

No	Tahun	Penolong Persalinan	Jenis persalinan	Tempat persalinan	BBL	PBL	Jenis kelamin	Umur kehamilan
1	2008	Bidan	Spontan	PKM	2600 gram	49 cm	Perempuan	Aterem
2	2013	Bidan	Spontan	PKM	2950 gram	50 cm	Laki-laki	Aterem
3	2018	Bidan	Spontan	PKM	2700 gram	48 cm	Laki-laki	Aterem

(Sumber: Data primer)

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun seperti DM, hipertensi dan tidak ada penyakit menular seperti TBC hepatitis dan riwayat PMS.
- b. Ibu pasien mengatakan dirinya dan anak-anak sebelumnya tidak ada yang mengalami penyakit kuning.

6. Riwayat kesehatan pasien di puskesmas

Bidan di puskesmas jumpandang baru makassar mengatakan KU bayi baik, refleks menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning.

7. Pola kebiasaan pasien

- a. Pola nutrisi

Jenis nutrisi yang diberikan adalah ASI

- b. Pola eliminasi

Pasien BAK rata-rata 5-7 kali dalam sehari warna jernih dan BAB 4 -5 kali sehari warna kuning dempul.

c. Pola aktivitas

Gerakan pasien cukup aktif.

d. Pola kebersihan diri

Pasien diwashlap sebanyak 1 kali sehari tiap pagi hari.

e. Pola istirahat

Pasien tidur dalam sehari rata-rata ± 19 jam yaitu tidur malam ± 10 jam dan tidur siang ± 9 jam.

8. Riwayat psikologis, sosial dan ekonomi orang tua

a. Ekspresi wajah ibu dan keluarga nampak cemas.

b. Ibu menggunakan kartu BPJS untuk membayar biaya perawatan.

9. Data spiritual orang tua

a. Ibu dan keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.

b. Ibu dan keluarga rajin melaksanakan shalat 5 waktu.

10. Pemeriksaan

a. KU bayi lemah

b. Kesadaran composmentis

c. Gestasi 39 minggu 2 hari

d. Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 130x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,7 derajat celcius

e. Pemeriksaan *head to toe*

Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada caput succedaneum.

Wajah : Tidak ada oedema.

Mata : Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterik

Hidung : Tidak ada sekret.

Mulut : Bibir kering, tidak ada kelainan.

Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen.

Leher : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.

Abdomen : Tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat.

Genitalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang uretra

Anus : Terdapat lubang pada anus.

Ekstremitas atas : Jari - jari lengkap, tidak ada kelainan.

Ekstremitas bawah : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan.

Kulit : Nampak kuning.

f. Refleks

Refleks *moro* : Kuat, apabila dikagetkan lengan dan kaki terangkat.

Refleks *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan ditelapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam

Refleks *sucking* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif

Refleks *rooting* : Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan

Refleks *swallowing* : Lemah, bayi tidak dapat menelan secara aktif

g. Pengukuran antropometri

BB : 2700 gram

PB : 48 cm

LK : 34 cm

LD : 36 cm

LP : 35 cm

LILA : 11 cm

h. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek

B. Langkah II (Identifikasi diagnosa atau masalah aktual)

1. Diagnosa aktual : Bayi "N",BCB,SMK, dengan ikterus patologi

a. BCB,SMK

Data dasar

Data subjektif :

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 04 juli 2017
- 2) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 27 Maret 2018 pukul 13.30

WITA.

Data objektif :

- 1) BBL : 2700 gram
- 2) PBL : 49 CM

Analisa dan interpretasi data:

- 1) Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37 – 42 minggu (Sarwono, 2014: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi "N" hari pertama haid terakhir ibu pada tanggal 04 April 2017 sampai bayi lahir tanggal 27 Januari 2018 berarti bayi lahir pada usia kehamilan 38 minggu sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB).
- 2) Bayi lahir sesuai dengan masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir 2500 – 4000 gram dengan usia gestasi 37 – 42 minggu (Sarwono, 2014: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi "N" lahir pada usia kehamilan 39 minggu 2 hari dengan berat badan lahir 2700 gram. Berdasarkan

kurva pertumbuhan berat badan lahir bayi “N” dengan usia kehamilan 39 minggu 2 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK).

b. Ikterus Fisiologi

Data Dasar

Data subjektif :

- 1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning.
- 2) Ibu pasien mengatakan bayinya malas minum.

Data objektif :

- 1) Kulit bayi terlihat kuning
- 2) Refleks menghisap dan menelan lemah

Analisa dan interpretasi data:

Ikterus adalah warna kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Produksi bilirubin sebagian besar berasal dari pemecahan sel darah merah yang menua (80%), (Maryunani A,2014,hal. 98).

Ikterus Fisiologi tidak melewati kadar yang membahayakan atau yang mempunyai potensi menjadi kern ikterus dan tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi. Ikterus fisiologi bisa juga di sebabkan karena hati dalam bayi tersebut belum matang, atau di sebabkan kadar penguraian sel darah merah yang cepat. Adanya metabolisme normal bilirubin pada bayi baru lahir usia minggu pertama. Peningkatan kadar bilirubin pada hari-hari pertama

kehidupan dapat terjadi pada sebagian besar neonatus. Hal ini disebabkan karena tingginya kadar eritrosit neonatus dan umur eritrosit yang lebih pendek (80-90 hari) dan fungsi hepar yang belum matang (Marmi, Rahardjo, 2012).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "N" didapatkan kulit bayi nampak kuning, bayi malas minum yang ditandai dengan refleks menghisap dan menelan bayi lemah, artinya bayi tersebut mengalami Ikterus.

2. Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Data dasar

Data subjektif :

Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 Januari 2018

Data objektif :

Refleks isap dan menelan bayi lemah

Analisa dan interpretasi data :

Masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan ikterus adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks isap dan menelan minuman (Manuaba, 2012: 72). Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "N" bayi malas minum, refleks isap dan menelannya lemah.

C. Langkah III (Identifikasi diagnosa atau masalah potensial)

Diagnosa potensial : ikterus patologi

Data subjektif :

- 1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning
- 2) Ibu pasien mengatakan bayinya malas minum

Data objektif :

- 1) Kulit bayi terlihat kuning
- 2) Refleks menghisap dan menelan lemah

Analisa dan interpretasi data :

Apabila bayi dengan Ikterus tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus (Herawati dan Maya, 2017: 68). Pada kasus bayi “N” diantisipasi terjadinya ikterus patologi.

D. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Kolaborasi dengan bidan untuk merencanakan asuhan

E. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Diagnosa aktual : Bayi “N”, BCB, SMK, dengan ikterus fisiologi

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Tujuan : Ikterus fisiologi dan masalah gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi teratasi

Kriteria :

- 1) KU bayi baik
- 2) Tanda-tanda vital dalam batas normal:

Frekuensi jantung : 120-160x/i

Pernapasan : 40-60x/i

Suhu : 36,5-37,5 derajat celcius

- 3) Refleks isap dan menelan Lemah
- 4) Kulit bayi tampak kuning

Intervensi tanggal 28 Maret 2018, pukul 14:30 WITA

- 1) Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Rasional : Untuk mencegah terjadinya infeksi

- 2) Observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam

Rasional : Untuk memantau keadaan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi.

- 3) Berikan intake ASI

Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan memberikan cukup ASI karena bilirubin dapat pecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urin.

- 4) Jaga kehangatan bayi

Rasional : Untuk mempertahankan suhu bayi.

- 5) Berikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi “N” tentang kondisi bayi “N” saat ini.

Rasional : Untuk meningkatkan pemahaman, menurunkan rasa takut agar keluarga mengetahui kondisi bayi “N” saat ini.

F. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Tanggal 28 maret 2018, pukul: 14:30 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 130x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,6 derajat *celcius*

3. Memberikan intake ASI tiap 3 jam.

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 3 jam.

4. Menjaga kehangatan bayi.

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah.

5. Memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi “N” tentang kondisi bayi “N” saat ini

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti

G. Langkah VII (Evaluasi)

Tanggal 28 Maret 2018, pukul 17:30 WITA

1. KU bayi sedang

2. Tanda-tanda vital:


Frekuensi jantung : 136x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,9 derajat *celcius*

3. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi ditandai dengan bayi minum ASI per 3 jam

4. Popok bayi sudah diganti



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS FISILOGI
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 28 JANUARI 2018**

No.Register : 46xxxx
 Tanggal Masuk : 27 Januari 2018 Pukul : 13.30 WITA
 Tanggal Lahir : 27 Januari 2018 Pukul : 17.30 WITA
 Tanggal Pengkajian : 28 Januari 2018 Pukul : 14.30 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
 Tanggal Lahir : 27 Januari 2018
 Umur : 1 Hari
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny. "N" / Tn. "B"
 Umur : 39 tahun/41 tahun
 Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMP/SMP
 Pekerjaan : IRT/Buruh Harian
 Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak 28 Januari 2018
2. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 28 Januari 2018.
3. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien merupakan anaknya yang ketiga dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.

Tabel. 3.2 : Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu

No	Tahun	Penolong persalinan	Jenis persalinan	Tempat persalinan	BBL	PBL	Jenis kelamin	Umur kehamilan
1	2008	Bidan	Spontan	PKM	2600 gram	49 cm	Perempuan	Aterem
2	2013	Bidan	Spontan	PKM	2950 gram	50 cm	Laki-laki	Aterem
3	2018	Bidan	Spontan	PKM	2700 gram	48 cm	Laki-laki	Aterem

(Sumber: Data primer)

4. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang ketiga pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 13.30 WITA, di puskesmas jumpandang baru makassar ditolong oleh bidan, secara spontan, bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.
5. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan tidak pernah menderita penyakit apapun.
6. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah mengkonsumsi obat apapun dan jamu.
7. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 04 juli 2017.
8. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun dan tidak ada riwayat PMS.

9. Ibu pasien mengatakan anak-anak sebelumnya tidak ada yang mengalami penyakit kuning.
10. Bidan di puskesmas jumpandang baru makassar mengatakan KU bayi baik, refleks menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning.
11. Ibu pasien mengatakan menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatan.
12. Ibu pasien dan keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.

Data Objektif (O)

1. KU bayi lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 39 minggu 2 hari
4. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 130x/i
 - Pernapasan : 44x/i
 - Suhu : 36,6 derajat celcius
5. Pemeriksaan head to toe
 - Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada caput
sucsadenum
 - Wajah : Tidak ada oedema
 - Hidung : Tidak ada sekret
 - Mulut : Bibir kering,tidak ada kelainan
 - Telinga : Simetris kiri dan kanan,tidak ada serumen
 - Leher : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

Dada	: Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
Abdomen	: Tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat
Genetalia	: Testis sudah turun semua,terdapat lubang pada penis
Anus	: Terdapat lubang pada anus
Ekstremitas atas	: Jari-jari lengkap,tidak ada kelainan.
Ekstremitas bawah	: Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan
Kulit	: Nampak kuning

6. Refleks

Refleks <i>moro</i>	: Kuat, apabila dikagetkan lengan dan kaki terangkat
Refleks <i>grasping</i>	: Kuat,apabila benda diletakkan ditelapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam
Refleks <i>sucking</i>	: Lemah,pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif
Refleks <i>rooting</i>	: Lemah,apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan.
Refelks <i>swallowing</i>	: Lemah,bayi tidak dapat menelan secara aktif.

7. Pengukuran antropometri

BBS	: 2800 gram
PBS	: 48 cm
LK	: 34 cm
LD	: 36 cm
LP	: 35 cm
LILA	: 11 cm

8. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek.

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi "N", BCB, SMK, dengan ikterus fisiologi

Masalah aktual : Gangguan kebutuhan pemenuhan nutrisi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 28 Januari 2018, pukul:18.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 130x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,6 derajat celcius

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : terlaksana, telah diberikan intake ASI per 3 jam

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah

5. Memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi “N” tentang kondisi bayi “N” saat ini.

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS FISILOGI
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 29 JANUARI 2018**

No.Register : 46xxxx
 Tanggal Masuk : 27 Januari 2018 Pukul : 13.30 WITA
 Tanggal Lahir : 27 Januari 2018 Pukul : 17.30 WITA
 Tanggal Pengkajian : 28 Januari 2018 Pukul : 14.30 WITA

2. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
 Tanggal Lahir : 27 Januari 2018
 Umur : 2 Hari
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
 Umur : 39 tahun/41 tahun
 Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMP/SMP
 Pekerjaan : IRT/Buruh Harian
 Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa

Data Subjektif (S)

1. Bidan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar mengatakan KU Bayi sedang, kulit dan sklera masih tampak kuning
2. Bidan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar mengatakan bayi sudah BAK dan BAB

Data Objektif (O)

1. KU bayi sedang
2. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 146x/i
 - Pernapasan : 44x/i
 - Suhu : 37,3 derajat *celcius*
3. BBS : 2600 gram
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - Kepala : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - Mata : Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
 - Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
 - Abdomen : Tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat
 - Kulit : Nampak kuning
5. Refleks *sucking* : Mulai kuat
- Refleks *rooting* : Mulai kuat
- Refleks *swallowing* : Mulai kuat

6. Eliminasi

BAB (+)

BAK (+)

Assesment (A)

Diagnosa aktual : BCB, SMK, dengan ikterus Fisiologi

Diagnosa Potensial : Potensial terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 29 Januari 2018, pukul 09.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi sedang

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 146x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 37,3 derajat celcius

3. Menimbang berat badan bayi

Hasil : Terlaksana, BB sekarang 2600 gram

4. Memberitahu ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil : Terlaksana

5. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil : Terlaksana, bayi sudah BAB dan BAK



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS FISILOGI
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 30 JANUARI 2018**

No.Register : 46xxxx
Tanggal Masuk : 27 Januari 2018 Pukul : 13.30 WITA
Tanggal Lahir : 27 Januari 2018 Pukul : 17.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 28 Januari 2018 Pukul : 14.30 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
Tanggal Lahir : 09 Januari 2018
Umur : 3 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
Umur : 39 tahun/41 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ±15 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Korban 40.000 jiwa

Data Subjektif (S)

1. Bidan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar mengatakan KU bayi sudah baik, kadar kulitnya sudah tidak kuning.
2. Bidan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar mengatakan bayinya sudah diwashlap dan ditimbang dengan BBS 2600 Gram

Data Objektif (O)

1. KU bayi baik
2. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 142x/i
 - Pernapasan : 46x/i
 - Suhu : 36,7 derajat celcius
3. Pemeriksaan fisik terfokus
 - Kepala : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - Mata : Konjungtiva merah muda, sklera nampak putih
 - Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
 - Abdomen : Tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat.
 - Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan, infus sudah dilepas
 - Kulit : Nampak kemerahan
4. Refleks
 - Refleks *sucking* : Kuat
 - Refleks *rooting* : Kuat
 - Refleks *swallowing* : Kuat

5. Eliminasi

BAB (+)

BAK (+)

Assesment (A)

Bayi "N" BCB, SMK, dengan keadaan normal

Planning (P)

Tanggal 30 Januari 2018, Pukul 10.30 WITA

7. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

8. Mengobservasi KU bayi

Hasil : KU bayi baik

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 146x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 37,3 derajat celcius

9. Mendampingi Bidan dalam mengobservasi

Hasil : Terlaksana, bayi sudah diperbolehkan pulang


10. Memberitahu kepada orang tua bayi bahwa hari ini bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang.

Hasil : Terlaksana, orang tua bayi nampak senang dengan informasi yang disampaikan tentang kondisi bayinya

11. Memberikan HE pada orang tua bayi mengenai:

- a. Pemberian ASI
- b. Pencegahan ikterus
- c. Pencegahan hipotermi
- d. Tanda-tanda bayi sakit
- e. Personal hygiene
- f. imunisasi

Hasil : Ibu mengerti, dan mau mengikuti saran yang diberikan



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI
NY "N" DENGAN IKTERUS FISILOGI
DI RUMAH JL. KORBAN 40.000 JIWA
TANGGAL 4 FEBRUARI 2018**

Tanggal Kunjungan : 4 Februari 2018 pukul 10.45 wita

Nama Pengkaji : Fatimah

A. SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi telah membaik dan sudah bisa menghisap puting susu dan menelan dengan baik.
2. Warna kuning pada kulit bayi tampak menghilang,
3. Bayi sudah BAB dan BAK.
4. Bayi diberi ASI Setiap 2-3 jam

B. OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik.
2. Kesadaran komposmentis
3. Berat badan sekarang: 2700 gram
4. Tanda-tanda vital:
 - a. Suhu : 36,7 °C
 - b. Denyut jantung : 149 x/menit
 - c. Pernapasan : 50 x/menit
5. Konjungtiva tidak ikterik
6. Refleks menghisap dan menelan cukup baik
7. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi

8. Abdomen tampak bersih.
9. Gerakan tangan dan kaki aktif
10. Bayi di bedong

C. ASSESMENT (A)

Bayi "N" BCB, SMK, dengan keadaan normal

D. PLANNING (P)

Tanggal 4 Februari 2018, pukul 10.45 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
 Hasil: ibu dan keluarga sudah mengetahui keadaan umum bayinya baik dan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal.
2. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara *on demand* pada bayi
 Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
3. Menganjurkan ibu memberi bayi MP ASI setelah 6 bulan
 Hasil: ibu bersedia
4. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, lembab dan basah
 Hasil: ibu telah melaksnakannya
5. Mengingatkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.
 Hasil: ibu biasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan.
6. Memberitahu ibu untuk menjemur bayi dibawah sinar matahari, sebaiknya dibawah jam 10 pagi selama 10-15 menit/hari dan bayi menggunakan topi, dan kacamata kecil untuk bayi, untuk melindungi retina mata bayi.
 Hasil : Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayi dengan membedong bayi

Hasil: bayi telah dibedong.

8. Menganjurkan ibu untuk kontrol tumbuh kembang bayi dan imunisasi sesuai Hasil: ibu bersedia dan akan datang sesuai pada jadwal imunisasi yang diberikan

9. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tanda-tanda bahaya pada bayi dan segera membawanya ke puskesmas atau rumah sakit.

- a. Bayi tidak mau minum
- b. Bayi kelihatan lemas
- c. Bayi menangis tidak kuat
- d. Bayi diare
- e. Suhu tubuh bayi tinggi (Sudarti dan Afroh. F, 2013: 61)

Hasil: ibu dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan membawanya bayi ke puskesmas atau rumah sakit jika salah satu dari atas terjadi.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan Ikterus Fisiologi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu, pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan, dan evaluasi. Adapun penatalaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dasar

Pada langkah ini kita menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan dan memilih informasi yang tepat diperlukan analisa. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnesa, meliputi:

Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi, biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan riwayat operasi.

2) Pemeriksaan Fisik, meliputi:

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus fisiologi adalah tidak melewati kadar yang membahayakan atau yang mempunyai potensi menjadi kern ikterus dan tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi, Ikterus fisiologi bisa juga disebabkan karena hati dalam bayi tersebut belum matang, atau disebabkan kadar penguraian sel darah merah yang cepat, Dalam kadar tinggi bilirubin bebas ini bersifat racun sulit larut dalam air, Masalahnya organ bayi sebagian bayi baru lahir belum dapat berfungsi optimal dalam mengeluarkan bilirubin tersebut. Barulah setelah beberapa hari, organ hati mengalami pematangan dan proses pembuangan bilirubin bisa berlangsung lancar, Masa “matang” organ hati pada setiap hati berbeda-beda, Namun umumnya pada hari ketujuh organ hati mulai melakukan fungsinya dengan baik (Marmi,Rahardjo. 2012).

Adapun tanda-tanda ikterus Fisiologi diantaranya Gejala kuning muncul pada 24 jam pertama, kenaikan kadar bilirubin <5 mg/dl, bayi tidak mau menyusu/tidur terus menerus ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12 mg/dl, peningkatan bilirubin 5 mg/dl atau lebih dari 24 jam, konsentrasi bilirubin serum melebihi 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan, ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis, ikterus yang disebabkan oleh bayi kurang dari 2000 gram yang disebabkan karena usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 36 minggu,

asfiksia, hipoksia, syndrome gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, dan hiperosmolaritas darah sepsis (Maulida,2014:40).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor, Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (*cringler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya *salsilitas*, *sulfatfurazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.

- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2012: 278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

- a. Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk

memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2014: 39).

Menurut Maryuanik tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg % pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5 % selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejan, epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung), terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks isap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2014: 104).

Ikterus dianggap patologis apabila waktu muncul, lama, atau kadar bilirubin serum yang ditentukan berbeda secara bermakna dari ikterus fisiologis. Peningkatan bilirubin darah khususnya bilirubin indirek yang bersifat toksik bisa disebabkan oleh produksi yang meningkat dan ekskresinya melalui hati terganggu. Berbagai faktor resiko yang merupakan penyebab dari hyperbilirubinemia bisa dari faktor ibu maupun faktor bayi. Yang sering ditemukan antara lain dari faktor maternal seperti komplikasi kehamilan (inkompatibilitas golongan darah ABO dan Rh) dan pemberian air susu ibu (ASI). Faktor perinatal seperti infeksi, dan trauma lahir (cephalhermaton) dan faktor neonatus seperti prematuritas, rendahnya asupan ASI, hipoglikemia, dan faktor genetik (Faiqah, Syajaratuddur, 2014: 1355-1357).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "N" dengan ikterus patologi melalui anamnesa didapatkan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 Januari 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 Januari 2018, ibu pasien mengatakan bayinya lahir cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning refleks menghisap dan menelan lemah.

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada tahap pengkajian dengan teori Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012: 27). Hiperbilirubinemia adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan. Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun di:sebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (*cringler najjar*

syndrome). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.

- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya *salsilitas*, *sulfatfurazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang

mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2012: 278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a. Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh

Ber macam infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2014: 39).

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubi serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg % pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5 % selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejan, epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung), terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks isap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2014: 104).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “N” ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 Januari 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 Januari 2018, ibu pasien mengatakan HPHT tanggal 4 April 2017 dan bersalin tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan hasil perhitungan berarti bayi lahir pada usia kehamilan 39 minggu 2 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB), ibu pasien mengatakan berat badan lahir bayinya 2700 gram, berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan lahir bayi “N” dengan usia kehamilan 38 minggu sudah, Sesuai Masa Kehamilan (SMK) dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning refleks menghisap dan menelan lemah, Sehingga pada kasus bayi “N” ditegakkan diagnosa bayi lahir cukup bulan, sesuai dengan masa kehamilan,

ikterus fisiologi dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah potensial terjadi. Apabila ikterus fisiologi tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus (Herawati dan Maya, 2017: 68). Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Kondisi hiperbilirubinemia yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat menimbulkan komplikasi yang berat seperti kern ikterus akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat (Mastiningsih, Putu, 2012: 15). Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir adalah kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang dapat menimbulkan gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi, paralisis dan displasia dental yang sangat mempengaruhi kualitas hidup (Maulida, Luluk Fajria, 2014: 39)

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dengan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka 75% bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia 80% dari bayi yang hidup akan mengalami keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Pada kasus bayi "N" telah dilakukan observasi penanganan umum dan penanganan segera dengan pemberian ASI sehingga masalah potensial (kern ikteus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik, Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Masalah-masalah yang bisa terjadi pada bayi ikterus ini, maka ibu dan keluarga berhak untuk mengetahuinya, oleh karena itu bidan berperan untuk tetap memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan keluarga agar tetap berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT, agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi.

4. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter dan juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan yang paling tepat. Pada kasus

ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan segera dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119). Pada kasus bayi "N" dengan ikterus fisiologi dilakukan kolaborasi dengan bidan di puskesmasdalam melakukan setiap tindakan. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

Agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi disini bidan melakukan tindakan segera/kolaborasi dan tetap memberikan dukungan psikologis maupun spiritual kepada ibu dan keluarga agar tetap berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT.

5. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi dan pada langkah ini reformasi data yang tidak lengkap bisa dilengkapi. Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. Pada kasus bayi dengan ikterus fisiologi rencana asuhan yang dilakukan adalah observasi KU umum yang bertujuan untuk memantau agar keadaan bayi tidak mencapai nilai yang menimbulkan kern ikterik, penuhi kebutuhan nutrisi secara baik karena bayi malas minum serta mencegah bayi tidak dehidrasi karena pengaruh sinar lampu, kolaborasi dengan dokter spesialis anak, observasi BAB dan BAK, juga lingkungan sekitar bayi dijaga agar tetap bersih dan hangat (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119).

Perencanaan asuhan yang dilakukan pada bayi dengan hiperbilirubinemia adalah fototerapi transfusi pengganti, fototerapi bila neonatus dipapar dengan cahaya berintensitas tinggi, tindakan ini dapat menurunkan bilirubin dalam kulit dan transfusi pengganti digunakan untuk mengatasi anemia akibat eritrosit yang rentan terhadap antibodi eritrosit maternal, menghilangkan eritrosit yang tersensitisasi, mengeluarkan bilirubin serum, serta meningkatkan albumin yang masih bebas bilirubin dan meningkatkan keterikatannya dengan bilirubin (Mathindas, dkk, 2013: S8).

Pada kasus bayi "N" dengan ikterus fisiologi perencanaan yang dilakukan antara lain: cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan kolaborasi dengan dalam melakukan tindakan, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

6. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi dia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus fisiologi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang

berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari petugas kesehatan.

Pentalaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan ikterus fisiologi adalah Pemberian ASI secara optimal perlu diingat bahwa bilirubin dapat dipecah apabila bayi mengeluarkan feses dan urin. Sehingga pemberian ASI harus diberikan sebab ASI sangat efektif dalam memperlancar BAB dan BAK. Namun demikian, pemberiannya harus tetap dalam pengawasan dokter (Maulida, Fajria Luluk, 2014: 41-43).

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dengan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka 75% bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia 80% dari bayi yang hidup akan mengalami keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Pada kasus bayi 'N' dengan ikterus fisiologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menjaga kehangatan bayi, Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan

intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, Penatalaksanaan tanggal 30 Maret 2017 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberi tahu keluarga bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, dan memberikan HE pada orang tua bayi, Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

7. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada teori bayi dengan hiperbilirubinemia keadaan yang ingin dicapai adalah KU bayi baik, kenaikan berat badan bayi, warna kuning pada kulit bayi sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan bayi terpenuhi, refleks isap baik (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119).

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan ikterus fisiologi. Pada kunjungan pertama tanggal 28 Januari 2018, masalah yang dialami klien akan diatasi dengan memberikan nutrisi ASI dan susu formula dengan cara disendoki untuk merangsang refleks hisap, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi, tanggal 29 Januari 2018 KU bayi sedang, refleks isap dan menelan bayi sudah mulai kuat, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dan tindakan tanggal 30 Januari 2017 keadaan bayi sudah mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan sklera dan kulit bayi sudah mulai tidak kuning dan kadar bilirubin bayi sudah menurun dan sudah dianjurkan untuk pulang. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan pada asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan ikterus Fisiologi di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan Ikterus Fisiologi.

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi “N” dengan ikterus Fisiologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subyektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya berwarna kuning, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit dan sklera bayi nampak kuning, refleks isap dan menelan bayi lemah.
2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi “N”, BCB, SMK dengan ikterus fisiologi yang disertai dengan masalah kekurangan kebutuhan nutrisi.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat.
4. Perlunya tindakan segera atau kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan bidan di puskesmas dalam melakukan tindakan.

5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini.
6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi "N" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.
7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 3 hari pada kasus bayi "N" dengan ikterus fisiologi didapat hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi.
8. Penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan ikterus fisiologi dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengambil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikterus fisiolog secara cepat, tepat dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini Yetti. *Hubungan antara Persalinan Premature dengan Hiperbilirubin pada Neonatus*. Lampung: *Jurnal Kesehatan*, Volume V, Nomor 2, Oktober 2014, hlm 109-112.2014.
- Dewi Lia Nanny. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Timur. 2013.
- Faiqah, Syajaratuddur. *Hubungan Usia Gestasi dan Jenis Persalinan Dengan Kadar Bilirubinemia pada Bayi Ikterus di RSUP NTB: Jurnal Kesehatan Prima*, Vol 8, No.2.Agustus 2014.
- Indrayani dan Moudy Emma Unaria Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2013.
- Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2013.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015.
- Khadijah, Rahmawati dwi, Mahmudah. 2015. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Ikterus Fisiologi pada Bayi Baru Lahir*. Banjarmasin: *Dinamika Kesehatan*, Vol.6 No. 2. 2013.
- Krishnan Elango, dkk.2016. *Evaluation Of Cord Bilirubin and Hemoglobin Analysis in Predicting Pathological Jaundice in Term Babies at Introduction Risk of ABO Incompatibility*. *International Journal of Research in Medical Sciences*. 2016. Vol 4. Issue 10. Page 4545.
- Mala, Viya Yanti. *Analisa Penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) Intervensi Program KKB mencapai sasaran MDG'S.2015*
- Manggiasih, Vidia Atika dan Pongki Jaya. *Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media. 2016.
- Maryuni, dan Anik. *Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Pra-sekolah: In Media*. 2014.
- Marmi, dan Kukuh Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Media. 2012.
- Maulida, Luluk Fajria. *Ikterus Neonatorum: PROFESI*. Vol.10, No.3. September, 2013-Februari 2014.
- Maulike, Novie dan Nurjannah Ade. *Faktor-Faktor Pada Ibu Bersalin Yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir. Jurnal Kesehatan Kartika*.Vol.8 No.4 Maret 2013.
- Nadyah, *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Alauddin University Press, 2013.

- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka. 2012.
- RN Lochart Anita, dan Lyndon Saputra. *Asuhan Kebidanan Neonatus Normal dan Patologi*. Tangerang Selatan: Pustaka Pelajar. 2014.
- Rohsiswatmo, dan Rina. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawihardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2014.
- Rukiyah Yeyeh Ai, dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Cv. Trans Info Media. 2013.
- Saleha, Sitti, *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita*, Alauddin University Press, 1 :2012
- Setyaningsih Rahayu, Ersya Trianingsih. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Hiperbilirubinemia dengan Sikap dan Perilaku Menjemur Bayi*. Surakarta: JIK. Vol. 4. 2. 2016.
- Shetty Anil dan Binoop Kumar. *Study Of Neonatal Hyperbiliubinemia In A Tertiary Care Hospital: International Journal of Medical Sciene and Public Health*. Vol.3, Issue 10. 2014.
- Sondakh. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Erlangga: Jakarta. 2013
- Sudarti, dan Afroh Fauziah. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Anak Balita*. Yogyakarta: Nuha Media. 2012.
- Suryandari Eka Artathi, Agustina Eko Ely. *Perbedaan Waktu Pemberian Colostrum Terhadap Kejadian Ikterus Fisiologi pada Bayi Baru Lahir*. Purwekerto: Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 3. No.5. 2013.
- Wahyuni, Sari. *Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Penuntun Belajar Praktek Klinik*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2012.
- Walyani, Elisabeth Siwi. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Pustaka Baru: Yogyakarta. 2015.
- Yongki, dkk. *Asuhan Pertumbuhan Kehamilan dan Persalinan, Neonatus, Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Yunanto, dan Ari. *Buku Ajar Neonatologi*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI. 2014.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penelitian

Nama : Fatimah
Nim : 70400114012
T.T.L : Tarakan 30 Januari 1997
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Btn Andi Tonro Permai Gowa

Nama Orang Tua

a. Ayah : Ismail Azis
b. Ibu : Nurhaena

B. Riwayat Pendidikan

SDN 006 Tg Palas Barat Kab Bulungan (Kaltara) : 2003-2008
SMPN 1 Tg Palas Barat Kab Bulungan (Kaltara) : 2008-2011
SMAN 6 Palopo : 2011-2014
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017