

**IDENTIFIKASI DAN POLA SEBARAN MAKROALGA DI PERAIRAN
PANTAI PUNAGA KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Biologi
pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar



Oleh:

ST. MARDHATILLAH

NIM. 60300114145

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Mardhatillah
NIM : 60300114145
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto/30 Desember 1996
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Kompleks Gerhana Alauddin Blok E No. 36, Makassar
Judul : Identifikasi dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai
Punaga Kabupaten Takalar

Saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau dalam klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 21 November 2018

Penyusun,



ST. Mardhatillah

NIM: 60300114145



UNIVERSITAS ISLAM NE
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "*Identifikasi dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai Punaga Kabupaten Takalar*", yang disusun oleh ST. Mardhatillah, NIM: 60300114145, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 M, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 21 November 2018 M.
13 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd.	(..... )
Sekretaris	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(..... )
Munaqisy I	: Isna Rasdianah Asis, S.Si., M.Sc.	(..... )
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.	(..... )
Pembimbing I	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(..... )
Pembimbing II	: Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes.	(..... )

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag.
NIP. 196912051993031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **ST. Mardhatillah**, NIM: 60300114145, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama proposal skripsi berjudul, “*Identifikasi dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai Punaga Kabupaten Takalar*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 November 2018

Pembimbing I



Hasyimuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 198705202015031004

Pembimbing II



Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes.
NIDN. 2003038601

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Identifikasi dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai Punaga Kabupaten Takalar*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Serta terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, H. Mustafa A.ma dan Hj. Sadriah Manronta yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas do’a, restu dan kepercayaan serta dukungan moril juga materi yang tak pernah surut selama saya menuntut ilmu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih, doa dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerjasama maupun bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.

3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang dengan sabar membimbing kami memberi kami motivasi-motivasi, kemudahan dalam setiap urusan akademik kami, yang selalu memperjuangkan mahasiswa BIOLOGI agar mudah dalam menyelesaikan studinya.
4. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, bimbingan dan pengarahannya kepada penulis selama penyelesaian skripsi. Terima kasih pula telah dengan tulus hati meluangkan waktu membimbing dan selalu memberi motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat selama penulis menyusun skripsi ini, yang selalu memberi kemudahan kepada penulis.
5. Bapak Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing II dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, maupun masukan baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag. selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terima kasih kepada Bapak yang telah rela meluangkan waktunya demi menghadiri setiap pelaksanaan ujian penulis.
8. Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. selaku Dosen Sekretaris yang selalu dengan senang hati meluangkan waktunya untuk menghadiri setiap pelaksanaan ujian penulis.

9. Ibu St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. selaku Dosen Sekretaris yang selalu dengan senang hati meluangkan waktunya untuk menghadiri setiap pelaksanaan ujian penulis. Terima kasih pula atas segala kebaikan, motivasi, dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Jurusan Biologi.
10. Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. dan Ibu Nurlaila Mappanganro, S.P.,M.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran, bimbingan dan pengarahannya kepada penulis selama studi di Jurusan Biologi. Terima kasih pula telah dengan tulus hati meluangkan waktu membimbing dan selalu memberi motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat selama ini.
11. Bapak Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Oseanologi Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Laboratorium Oseanologi Universitas Hasanuddin.
12. Ibu Dr. Ir. Daisy Wowor, M.Sc. selaku Kepala Laboratorium Crustacea Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Laboratorium Crustacea LIPI.
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd., selaku Dosen Pengajar atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Dosen yang

amat sabar dalam menghadapi penulis selama menjalani studi di Jurusan Biologi. Terima kasih, Bu, jasa Ibu tidak akan pernah kami lupakan.

15. Seluruh Karyawan dan Staf dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus surat-menyurat selama penulis menjalani studi sebagai Mahasiswa Jurusan Biologi.
16. Kakak Ihwana Mustafa, Kakak Irvan Affandi, Kakak Ilham Amrizal dan keluarga telah memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya. Terima kasih telah menjadi salah satu inspirasi saya dalam setiap hal. Terima kasih atas segala kebaikan, arahan, dukungan, kasih sayang maupun motivasi selama ini.
17. Sahabat-sahabatku; Dino, Mippo, Sajeng, Cicong, Eka, Anha dan Bombong yang telah menjadi sahabat yang selalu ada. Terima kasih untuk 11 tahun persahabatan.
18. Teman-teman seangkatan “LACTEAL 14” yang sangat saya sayangi (Nurman, Gamal, Aso, Chum, Andika, Ari, Salim, Wahid, Saiful, Aksan, Khaliq, Haidir, Uga, Kurni, Puja, Irhamniah, Tari, Inang, Susan, Nunu, Fira, Almik, Uni Hakim, Inna, Ame, Sinwa, Nini, Eka, Wiwi, Pipit, Nabila, Risma, Ria, Eni, Jumania, Uni, Adin, Adys, Nana, Yaya, Nirwana, Fitria, Nurul, Nuka, Nini, Siti Fatima, Ima, Titi, Annisa, Dina, Ratih, Mida, Rasti, Cahaya, Sisil, dan Fhia) telah membawa kebahagiaan selama 4 tahun ini. Terima kasih telah berjuang bersama, juga menemani dalam suka maupun duka.

19. Teman-teman terdekat; Almik, Adin, Adys, Uga, Inna dan Nini. Terima kasih telah menemani dan berjuang bersama di Biologi.


Semoga Allah swt. memberikan balasan atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin yaa robbal alaamiin.*

Makassar, 21 November 2018

Penulis

ST. Mardhatillah

Nim: 60300114145



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Peneltian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Islam tentang Tumbuhan	10
B. Tinjauan Umum Pola Sebaran	12
C. Tinjauan Umum Alga	15
D. Tinjauan Umum Kabupaten Takalar	19
E. Kerangka Pikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel.....	26
D. Variable Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional Variabel	27
F. Metode Pengumpulan Data.....	27
G. Alat dan Bahan	28
H. Prosedur Kerja	28

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
	A. Hasil Penelitian.....	33
	B. Pembahasan	36
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65



DAFTAR TABEL

4.1.	Hasil Identifikasi Jenis Makroalga.....	33
4.2.	Pola Sebaran Makrolaga	35
4.3	Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan	36



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Jenis Makroalga di Perairan Pantai Punaga	72
LAMPIRAN 2.	Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai Punaga	77
LAMPIRAN 3.	Cek Lokasi Penelitian.....	82
LAMPIRAN 4.	Lokasi Penelitian	83
LAMPIRAN 5.	Proses Pemasangan Transek, Plot, dan Pengambilan Sampel ..	84
LAMPIRAN 6.	Proses Pengukuran Parameter Lingkungan.....	85
LAMPIRAN 7	Alat dan bahan.....	86



ABSTRAK

Nama : ST. Mardhatillah
NIM : 60300114145
Judul Skripsi : “Identifikasi dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Pantai Punaga Kabupaten Takalar”

Makroalga termasuk salah satu sumber daya hayati laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Makroalga memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena memiliki peranan penting baik dari segi ekologis maupun ekonomis. Penelitian mengenai identifikasi dan pola sebaran makroalga di perairan Pantai Punaga Kecamatan Mangara'bombong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis dan pola sebaran makroalga yang ada di pantai Punaga kecamatan Mangara'bombong Kabupaten Takalar dengan mengidentifikasi makroalga yang ditemukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *line transect*. Pengambilan sampel dilakukan pada empat titik stasiun dengan menggunakan plot berukuran 1x1 m. Pada setiap plot dihitung jumlah spesies alga yang ditemukan serta jumlah individu/koloni. Identifikasi jenis dilakukan di lapangan dengan menggunakan buku identifikasi *Seaweed of India* dari Bhavanath ja *et al.* Data dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui pola sebaran jenis makroalga. Parameter lingkungan yang diukur meliputi suhu, salinitas, pH, DO, intensitas cahaya, kecepatan arus dan kekeruhan arus. Dari hasil penelitian diperoleh 15 spesies makroalga yang terdiri dari 8 jenis alga merah (Rhodophyceae), 4 jenis alga coklat (Phaeophyceae) dan 3 jenis alga hijau (Chlorophyceae). Jenis Makroalga dominan yaitu alga merah *Dermonema virens* dan jenis makroalga yang sedikit ditemukan yaitu *Sargassum polycystum*. Pola sebaran jenis makroalga diperoleh nilai Indeks Morisita yaitu 12 (mengelompok).

Kata Kunci: *Makroalga, Identifikasi, Pola Sebaran, Pantai Punaga*

ABSTRACT

Name : ST. Mardhatillah

NIM : 60300114145

Title of thesis : “Identification and Distribution Pattern of Macroalgae at Punaga Beach of Takalar Regency”

Macroalgae is one of marine biological resources that are widely found in Indonesian waters. Macroalgae has great potential to develop because it has an important role both ecologically and economically. Research of identification and distribution pattern of Macroalgae at Punaga Beach of Takalar Regency South Sulawesi Province has been conducted from October to November 2018. The purpose of this research is to provide an information about species and distribution pattern of macroalgae at Punaga Beach of Takalar Regency. Methods of data collection is done by using line transect method. Execute sampling at four station points by using 1x1 m of plot and repeating 3 times throwing at each points. Data were analyzed to know the distribution pattern of macroalgae. Environmental parameters including temperature, salinity, pH, DO, light intensity, water speed and water turbidity. The result of identification and distribution pattern of macroalga at Punaga Beach of Takalar Regency is found 15 species macroalgae consisting of 8 species of red algae (Rhodophyceae), 4 species of brown algae (Phaeophyceae) and 3 species of green algae (Chlorophyceae). The dominant species that found is *Dermonema virens* and the fewest species that found is *Sargassum polycystum*. The distribution pattern of macroalga was obtained 12 of Morisita Index (clumped).

Keywords : *Macroalgae, Identification, Distribution Pattern, Punaga Beach*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejumlah besar pulau-pulau tersebut (10.000 buah) merupakan pulau-pulau berukuran kecil. Pada setiap pulau terdapat tumbuhan, hewan dan jasad renik yang tinggi. Dari satu pulau dengan pulau yang lain bahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dari pulau yang sama terdapat keadaan alam yang berbeda. Perpaduan antara sumber daya alam dan hayati dan tempat hidupnya yang berbeda, menumbuhkan berbagai ekosistem di dalamnya (Suhendang, 2002).

Perairan laut Indonesia kaya akan berbagai biota laut baik flora maupun fauna yang memiliki nilai potensial dan memiliki peranan penting secara ekologi dan ekonomi. Alga termasuk bagian dari flora yang terdiri atas banyak jenis dan memiliki peranan penting pada lingkungan laut (Palallo, 2013).

Alga merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang di laut secara luas. Alga termasuk kelompok tumbuhan yang berklorofil yang bisa memiliki satu sel atau banyak sel dengan membentuk koloni. Alga memiliki kandungan bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral dan juga senyawa bioaktif (Yanuhar, 2016). Tumbuhan ini dapat hidup dan bertahan dengan kondisi yang beragam dengan pola pertumbuhan dan adaptasi yang sangat baik. Alga laut merupakan kelompok yang hidup di perairan laut, baik itu perairan dangkal maupun

perairan dalam yang masih disinari oleh cahaya matahari. Berdasarkan ukurannya, alga dibagi dalam dua kelompok utama yaitu mikroalga dan makroalga (Kasim, 2016).

Menurut Luning (1990), Indonesia memiliki tidak kurang dari 628 jenis makroalga dari 8000 jenis makroalga yang ditemukan di seluruh dunia.

Makroalga pada laut memiliki manfaat dan itu merupakan karunia Allah *subhanahu wa ta'ala* seperti yang disebutkan dalam QS al-Nahl/16:14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ
 ۱ ٤

Terjemahnya:

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (Kementerian Agama, 2012).

Menurut tafsir al-Misbah (2012) melalui surat al-Nahl ayat 14, diuraikan apa yang terdapat “di dalam air” lagi tertutup olehnya. Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan Dia*, yakni Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian *agar kamu dapat* menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam di sana sehingga kamu dapat *memakan darinya daging yang segar*, yakni binatang-binatang laut itu, *dan kamu dapat mengeluarkan*, yakni mengupayakan dengan cara

bersungguh-sungguh untuk mendapatkan *darinya*, yakni dari laut dan sungai itu *perhiasan yang kamu pakai*, seperti permata, mutiara, merjan dan sebagainya.

Dalam ayat yang lain hal tersebut juga disebutkan dalam QS al-Maidah/5:96 yang berbunyi:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَالسِّيَّارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan” (Kementerian Agama, 2012).

Dalam tafsir Jalalain (1990), dijelaskan penguraian surat al-Maidah ayat 96 yaitu (dihalalkan bagimu) hai umat manusia sewaktu kamu berada dalam keadaan halal/tidak ihram atau sedang ihram (binatang buruan laut) kamu boleh memakannya. Binatang buruan laut ialah binatang yang hidupnya hanya di laut/di air, seperti ikan. Berbeda dengan binatang yang terkadang hidup di laut dan terkadang hidup di darat seperti kepiting (dan makanan yang berasal dari laut) binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati (sebagai makanan yang lezat) untuk dinikmati (bagimu) kamu boleh memakannya (dan bagi orang-orang yang bepergian) orang-orang yang musafir dari kalangan dengan menjadikannya sebagai bekal mereka. (Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat) yaitu binatang yang hidup di darat dari jenis binatang yang boleh dimakan, kamu dilarang memburunya (selagi kamu dalam keadaan ihram) jika yang memburunya itu adalah orang yang tidak sedang ihram, maka orang yang sedang

ihram diperbolehkan memakannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sunah. (Dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu kembali).

Makroalga mempunyai peranan penting bagi ekosistem laut dan air tawar. Hal ini karena makroalga merupakan produktivitas primer yang dapat menyokong kehidupan konsumen tingkat pertama dan seterusnya. Secara ekologi, komunitas makroalga berperan sebagai tempat pembesaran dan perlindungan bagi jenis-jenis ikan tertentu dan merupakan makanan alami ikan-ikan dan hewan herbivora lainnya. Jika ditinjau dari segi biologi, makroalga laut memegang peranan sebagai produsen primer, penghasil bahan organik, dan oksigen di lingkungan perairan. Dari segi ekonomi, banyak jenis alga laut yang merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat nilai gizi dan manfaat yang dikandungnya (Kasim, 2016). Di Indonesia data keragaman, kepadatan Makroalga belum terpola di beberapa perairan Pulau kecil maupun besar, karena kehadiran Makroalga di beberapa perairan masih banyak yang belum teridentifikasi (Setyawan, dkk., 2015).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi rumput laut, dan rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan daerah ini. Areal budidaya rumput laut daerah ini mencapai seluas 193.700 ha untuk budidaya di laut dan 32.000 ha untuk budidaya di tambak. Potensi produksinya mencapai 785.306 ton, yang terdiri dari *Eucheuma cottonii* 465.306 ton dan *Gracillaria varrucosa* 320.000 ton (Mahatama dan Farid, 2013). Kabupaten Takalar merupakan penghasil rumput laut terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan produksi mencapai 500 ribu ton (Rahadiati, 2018).

Kabupaten Takalar terletak antara 5°30' sampai 5°38' LS dan antara 119°22' sampai 119°39' BT dengan luas wilayah 566,51 km². Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 289.978 jiwa yang terdiri atas 139.381 jiwa penduduk laki-laki dan 150.597 jiwa penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2017). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat disana adalah sebagai nelayan, dengan memanfaatkan kekayaan laut, daerah dengan kawasan pantai yang begitu luas bukan hanya menarik untuk berwisata namun juga cocok untuk lokasi perlindungan biota laut, namun mereka tidak banyak mengetahui keberadaan dan pemanfaatan Makroalga.

Mayoritas penduduk di sekitar pantai Punaga berprofesi sebagai nelayan yang sebagian besar membudidayakan rumput laut yang kemudian dipanen dan dijual. Namun, penelitian dan eksplorasi tentang kekayaan laut pantai Punaga baik dari segi keanekaragaman makroalga maupun komoditas lain belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan untuk melengkapi data Makroalga tentang pola penyebaran yang dilakukan di perairan dalam kondisi biofisik yang berbeda. Maka dari itu, penelitian tentang keanekaragaman dan pola sebaran makroalga di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar masih perlu dilakukan.

Mengingat bahwa Makroalga berperan penting bagi ekosistem perairan, serta pada saat ini penelitian tentang Makroalga di kawasan perairan pantai Punaga

Kabupaten Takalar masih belum dilakukan maka perlu dilakukan penelitian sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran keanekaragaman dan pola sebaran makroalga.

B. Rumusan Masalah

1. Makroalga apa saja yang terdapat di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana pola sebaran makroalga di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel berupa makroalga yang diambil bersama dengan nelayan di sekitar perairan pantai Punaga, Desa Punaga, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui ciri morfologi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Oseanografi Universitas Hasanuddin pada bulan Oktober-November 2018.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sinyo Y, dkk. (2013) dengan judul Studi Keanekaragaman Jenis Makroalga di Perairan Pantai Pulau Dofamuel Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten

Halmahera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 9 jenis makroalga yang tergolong dalam 3 divisi, yaitu: *Halimeda incrasata*, *Halimeda macroloba*, *Halimeda opuntia*, *Halimeda selendrica*, *Ceratodictyon spongiosum*, *Padinata australis*, *Eucheuma sp*, *Laurencia sp* dan *Crytonemia cranulata*. Keanekaragaman jenis makroalga di stasiun I dan II yaitu: jenis *Halimeda makroloba* dengan nilai keanekaragaman (0,357), di katagorikan tinggi, jenis *Halimeda opuntia* dengan nilai keanekaragaman (0,344), di kategorikan rendah, dan jenis *Crytonemia cramulata* dengan nilai keanekaragaman (0,030) di kategorikan rendah.

2. Nurkiama, dkk. (2015) dengan judul Keanekaragaman dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Laut Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ditemukan 13 jenis makroalga (rumput laut) yaitu jenis *Turbinaria ornata*, *Padina australis*, *Sargassum polycystum*, *Sargassum binderi*, *Glacillaria coronopifolia*, *Eucheuma spinosum*, *Acanthophora spicifera*, *Codium geppi*, *Halimeda macrophysa*, *Eucheuma alvarezii*, *Boergerenia forbessi*, *Galaxaura kjellmani*, *Caulerva racemosa*. Untuk kerapatan dan penutupan makroalga pada kelas *Phaeophyta* (alga coklat) yang tertinggi di Perairan Pulau Pucung dengan spesies *Turbinaria ornata* yaitu bernilai 3,35 koloni/m² dan 14,52, koloni/m² dan pada kelas *Clorophyta* (alga hijau) yang terendah dengan spesies *Calerva racemosa* yaitu bernilai 0,06 %, dan 0,20 %. Untuk komposisi makroalga yang tertinggi pada spesies *Turbinaria ornata* yaitu 20,35 % dan terendah *Calerva racemosa* yaitu 0,39 %. Untuk

indeks ekologi makroalga pada indeks keanekaragaman di kategorikan *Tinggi bernilai (3,09)*, indeks keseragaman di kategorikan *tinggi bernilai (0,79)*, dan pada indeks dominansi di kategorikan rendah bernilai *(0,14)*. Untuk pola sebaran makroalga *mengelompok*, pada kualitas perairan Suhu berada pada kisaran 26 - 27°C, Derajat keasaman (pH) berada pada kisaran 7,30 - 7,84, Oksigen terlarut berada pada kisaran 5,57 - 6,17, salinitas berada pada kisaran 33 - 34‰, kedalaman berada pada kisaran 1,27 – 143 m, dan kekeruhan berada pada kisaran 1,51 - 3,74 NTU. Kecepatan arus berada pada kisaran 0,0178 - 0,0135 m/dtk relatif rendah, dimana parameter tersebut dikategorikan optimal untuk pertumbuhan makroalga. Untuk kondisi substrat perairan Laut Pulau Pucung yang dominan ialah jenis pasir kasar.

3. Awalia R. (2017) dengan judul Biodiversitas Makroalga di Pantai Puntondo Kecamatan Mangara'Bombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan diperoleh 12 spesies Makroalga yang terdiri dari 3 kelas diantaranya alga merah (Rhodophyceae) yang terdapat 3 spesies yaitu *Gracilaria salicornia*, *Amphiroa rigida* dan *Eucheuma spinosum*. Alga coklat (Phaeophyceae) terdapat *Padina boergesenii*, *Sargassum tenerrimum*, *Sargassum cinereum*, *Sargassum prismaticum*, *Sargassum Vulgare* dan *Sargassum polycystum*. Dan pada alga hijau (Chlorophyceae) terdapat *Halimeda macroloba*, *Halimeda opuntia* dan *Eucheuma denticulatum*. Jenis Makroalga yang umumnya dominan pada penelitian ini yaitu alga coklat *Padina*

boergesonii dan jenis spesies makroalga yang sedikit ditemukan yaitu *Amphiroa rigida* dan *Sargassum polycystum*. Rata-rata indeks keanekaragaman (H') pada pantai Puntondo 0,083 dikategorikan rendah, indeks keseragaman (E) yaitu 0,033 dikategorikan tertekan. Dan indeks dominansi pada pantai Puntondo yaitu 0,023 dikategorikan rendah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makroalga apa saja yang terdapat di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui pola sebaran makroalga di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi dan referensi mengenai jenis keanekaragaman makroalga dan pola sebarannya.
2. Sebagai informasi pemanfaatan makroalga bagi masyarakat setempat.
3. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam tentang Tumbuhan

Organisme diciptakan oleh Tuhan tidak hanya satu jenis, tetapi berbagai jenis yang berbeda. Keragaman organisme yang banyak itu, menuntut manusia untuk dapat mengetahui agar mengenalnya, salah satunya adalah makroalga. Makroalga termasuk tumbuhan tingkat rendah yang hidup di air, setidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS Thaha/20:53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama, 2012).

Menurut Tafsir al-Misbah (2012) melalui surat Thaha ayat 53, dijelaskan bahwa ayat ini menyatakan bahwa: Dialah Tuhan yang menganugerahkan nikmat kehidupan dan pemeliharaan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu, membuka jalan-jalan untuk kamu lalui dan menurunkan hujan di atas bumi sehingga terciptalah sungai-sungai. Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda warna, rasa, dan

manfaatnya. Ada yang berwarna putih dan hitam, ada pula yang rasanya manis dan pahit.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan berbagai macam tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu dihidupkan atau ditumbuhkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan air. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara air dengan tumbuhan. Interaksi yang terjalin antara tumbuhan dan air adalah sebuah fenomena ekologis yang terdapat di alam, yaitu interaksi antara organisme (tumbuhan) dengan lingkungannya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir (2002), disebutkan *mahdan* (bukan mihadan) yang artinya tempat menetap bagi kalian; kalian dapat berdiri, tidur, dan bepergian di permukaannya. *Dan Yang telah menjadikan bagi kalian di bumi itu jalan-jalan.* Yakni Dia telah menjadikan bagi kalian jalan-jalan agar kalian dapat berjalan di segala penjurunya. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam surah al-Anbiya ayat 31: *dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.* Yaitu berbagai macam tumbuhan berupa tanaman dan buah-buahan, ada yang rasanya masam, ada yang manis, dan ada yang pahit, serta berbagai jenis lainnya dari hasil tanam-tanaman dan buah-buahan.

B. Tinjauan Umum Pola Sebaran

Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan atau manusia ke suatu daerah dimana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan untuk mencari makan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin dan faktor fisik lainnya (Umar, 2011).

Informasi kepadatan populasi saja belum cukup untuk memberikan suatu gambaran yang lengkap mengenai keadaan suatu populasi yang ditemukan dalam suatu habitat. Dua populasi mungkin dapat mempunyai kepadatan yang sama, tetapi mempunyai perbedaan yang nyata dalam pola penyebaran spatialnya (tempat). Kepadatan populasi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pola penyebaran populasinya (Umar, 2011).

Perubahan-perubahan dalam jenis habitat juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam pola penyebaran, dan dalam habitat yang sama, spesies-spesies yang berada biasanya memperlihatkan perbedaan pola penyebaran (Umar, 2011).

Di alam, pola penyebaran secara teratur sangat jarang ditemukan, tetapi umumnya berpola mengelompok. Penyebaran individu dalam populasi merupakan salah satu aspek dari pengaturan ruangan bagi individu di alam populasinya (Umar, 2011).

Secara umum populasi dapat dianggap sebagai suatu kelompok organisme yang terdiri atas individu-individu yang tergolong dalam satu jenis atau varietas,

ekotipe, atau satu unit taksonomi lain yang terdapat pada suatu tempat. Populasi memiliki karakteristik yang khas untuk kelompok yang tidak dimiliki oleh masing-masing dari anggotanya. Karakteristik ini antara lain adalah kepadatan, natalitas (laju kelahiran), mortalitas (laju kematian), potensi biotik, penyebaran umur dan bentuk pertumbuhan (Resosoedarmo, 1990).

Natalitas dan mortalitas menentukan pertumbuhan populasi. Populasi tumbuh apabila natalitas melebihi mortalitas. Dalam suatu daerah atau ekosistem, pertumbuhan dipengaruhi oleh imigrasi dan emigrasi (Resosoedarmo, 1990).

Populasi sebagai suatu individu yang dinamis dapat bertumbuh dalam perjalanan ruang dan waktu. Penanaman populasi dapat mengalami kenaikan atau penyusutan kepadatannya, tergantung pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Bila daya dukung lingkungan tidak mendukung suatu kepadatan populasi, maka kepadatan populasi dapat mengalami penyusutan, sebaliknya jika daya dukung lingkungan itu menunjang, sehingga kebutuhan populasi akan makanan, habitat serta kebutuhan lain terpenuhi maka akan meningkatkan populasi. Dengan kata lain adanya interaksi-interaksi antar individu di dalam populasi itu maupun dengan individu lain dari luar populasi maka populasi merupakan suatu kesatuan yang dinamis yang dikenal dengan istilah seleksi alam (Resosoedarmo, 1990).

Terdapat dua ciri dasar dari suatu populasi yaitu ciri biologi, yang merupakan ciri yang dipunyai oleh suatu individu pembangun populasi itu, serta ciri statistik yang merupakan ciri uniknya sebagai himpunan atau kelompok dari individu-individu. Seperti halnya suatu individu organisme suatu populasi pun memiliki

struktur dan organisme tertentu, yang sifatnya ada yang konstan ada pula yang mengalami perubahan sejalan dengan waktu, memiliki ontogeni atau sejarah perkembangan kehidupan, dapat dikenai dampak faktor-faktor lingkungan dan dapat memberikan respon terhadap faktor-faktor lingkungan (Heddy, 1986).

Ruang dan tersedianya bahan-bahan yang diperlukan jenis untuk hidupnya berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi. Pertumbuhan cenderung untuk melaju terus dengan cermat apabila ruang dan bahan-bahan berlimpah, dan akan mundur apabila kedua faktor tersebut berkurang yang kemudian akan mendatar bila ruang dan bahan-bahan menjadi terbatas (Heddy, 1986).

Penyebaran populasi dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui tiga pola yaitu (Umar, 2011):

1. Emigrasi, yaitu pergerakan individu keluar daerah populasinya ke tempat lainnya dan tinggal secara permanen.
2. Imigrasi, yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya dan tinggal secara permanen.
3. Migrasi, yaitu pergerakan secara dua arah suatu individu dari suatu daerah ke daerah populasi lainnya secara periodik.

Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran demikian yang terjadi dalam alam secara kasar dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu (Michael, 1994):

1. Penyebaran teratur atau seragam (*regular dispersion*), dimana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Penyebaran ini terjadi bila ada


persaingan yang keras sehingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama.

2. Penyebaran secara acak (*random dispersion*), dimana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi, hal ini terjadi jika lingkungan homogen.
3. Penyebaran berkelompok/berumpun (*clumped dispersion*), dimana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam, karena adanya kebutuhan akan faktor lingkungan yang sama.

Penyebaran secara teratur (*regular dispersion*) dengan individu-individu yang kurang lebih berjarak sama satu dengan yang lain, jarang terdapat di alam, tetapi umumnya di dalam suatu ekosistem yang dikelola, dan disini tanaman atau pohon memang sengaja diatur seperti itu yaitu jarak yang sama untuk menghasilkan produk yang optimal (Setiono, 1999).

Penyebaran acak (*random dispersion*) juga sangat jarang terjadi di alam. Penyebaran semacam ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungannya sangat seragam untuk seluruh daerah dimana populasi berada, selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dan organisme tersebut, dalam tumbuhan ada bentuk-bentuk organ tertentu yang menunjang untuk terjadinya pengelompokan tumbuhan (Azhari, 2007).

Penyebaran secara berkelompok (*clumped dispersion*) dengan individu-individu yang bergerombol dalam kelompok-kelompok adalah yang paling umum terdapat di alam, terutama untuk hewan (Hastuti, 2007).



Gambar 2.1. Pola Penyebaran Populasi (Frianto dan Novriyanti, 2016)

Dari ketiga kategori ini, rumpun/berkelompok adalah pola yang paling sering diamati di alam dan merupakan gambaran pertama dari kemenangan dalam keadaan yang disukai lingkungan. Pada tumbuhan penggerombolan disebabkan oleh reproduksi vegetatif, susunan benih local dan fenomena lain. Dimana benih-benih cenderung tersusun dalam kelompok. Pada tumbuhan, penyebaran acak adalah umum dimana penyebaran benih disebabkan angin (Michael, 1994).

Pola penyebaran dianalisis dengan rumus indeks Morisita dengan rumus (Nurkiama, 2015):

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

Dimana:

$I\delta$ = Indeks Morisita

- n = Jumlah transek pengambilan sampel
 N = Jumlah seluruh individu dalam total n
 x = Jumlah seluruh individu pada seluruh stasiun penelitian

Nilai Indeks Morisita yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut:

$I\delta < 1$, berarti penyebaran individu cenderung merata;

$I\delta = 1$, berarti penyebaran individu cenderung acak;

dan

$I\delta > 1$, berarti penyebaran individu cenderung mengelompok.

C. Tinjauan Umum Alga

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang tinggi, termasuk keanekaragaman hayati lautnya. Salah satu organisme laut yang banyak dijumpai di hampir seluruh pantai di Indonesia adalah makroalga. Makroalga merupakan alga yang berukuran besar, dari beberapa centimeter sampai bermeter-meter. Alga sendiri adalah organisme yang masuk ke dalam Kingdom Protista mirip dengan tumbuhan, dengan struktur tubuh berupa thallus. Alga mempunyai pigmen klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Alga kebanyakan hidup di wilayah perairan, baik perairan tawar maupun perairan laut (Marianingsih, 2013).


Berdasarkan ukurannya, alga dibagi dalam dua kelompok utama yaitu mikroalga dan makroalga (Kasim, 2016). Mikroalga adalah mikroorganisme bersel satu atau disebut pula dengan organisme multisel dengan struktur sederhana.

Beberapa mikroalga yang multisel tersebut tersusun dengan struktur kompleks yang terdiri dari dinding sel, membran sel, kloroplas, mitokondria, ribosom dan inti sel. Mikroalga tersebut memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, baik yang bersifat prokariotik ataupun eukariotik. Mikroalga ini dapat tumbuh dengan baik dan cepat di lingkungan perairan air laut atau air tawar, dimana dengan menggunakan zat pati di dalam kloroplas yang dikandungnya dapat mengkonversi energi dari sinar matahari, air dan karbon dioksida menjadi biomassa (Yanuhar, 2016).

Makroalga adalah tumbuhan thallus (*Thallophyta*) dimana merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang, bunga, dan daun sejati dengan artian bahwa kelompok tumbuhan yang hanya mempunyai semacam daun, batang, bunga, dan akar sebagai bagian dari morfologi tubuhnya. Secara ekologi, komunitas makroalga berperan sebagai tempat pembesaran dan perlindungan bagi jenis-jenis ikan tertentu dan merupakan makanan alami ikan-ikan dan hewan herbivora lainnya. Jika ditinjau dari segi biologi, makroalga memegang peranan sebagai produsen primer, penghasil bahan organik, dan oksigen di lingkungan perairan. Dari segi ekonomi, banyak jenis makroalga yang merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat nilai gizi dan manfaat yang dikandungnya. Sebagian besar makroalga di Indonesia bernilai ekonomis tinggi yang dapat digunakan sebagai makanan dan secara tradisional digunakan sebagai obat-obatan oleh masyarakat khususnya di wilayah pesisir. Dari ratusan jenis makroalga yang tumbuh dan berkembang di perairan Indonesia, hanya beberapa jenis yang telah diusahakan

secara komersial, yaitu *Gracilaria* sp., *Gelidium* sp., *Hypnea* sp., *Eucheuma* sp., dan *Sargasum* sp. (Kasim, 2016).

Makroalga sebagian besar hidup di perairan laut. Untuk dapat tumbuh, makroalga tersebut memerlukan substrat untuk tempat menempel/hidup. Makroalga epifit pada benda-benda lain seperti, batu, batu berpasir, tanah berpasir, kayu, cangkang molluska, dan epifit pada tumbuhan lain atau makroalga jenis yang lain. Klasifikasi makroalga menurut Dawes (1981), terdiri dari 3 divisio yaitu *Chlorophyta* (alga hijau), *Rhodophyta* (alga merah), dan *Phaeophyta* (alga coklat). *Chlorophyta* memiliki pigmen dominan hijau. Pigmen tersebut berasal dari klorofil yang dikandung alga. *Rhodophyta* adalah alga berwarna merah. Warna merah pada *Rhodophyta* dikarenakan oleh cadangan fikorietrin yang lebih dominan, dibanding pigmen lain. *Rhodophyta* juga memiliki pigmen lain yaitu klorofil, karotenoid dan pada jenis tertentu terdapat fikosianin. Sementara itu, *Phaeophyta* adalah alga berwarna coklat. Warna coklat dikarenakan oleh pigmen fikosantin yang dominan. *Phaeophyta* juga mengandung pigmen lain yaitu klorofil a dan b, karoten serta santofil. *Phaeophyta* adalah alga yang mempunyai ukuran lebih besar apabila dibandingkan *Chlorophyta* dan *Rhodophyta* (Marianingsih, 2013).



Gambar 2.2. Morfologi Makroalga (Afrianto dan Liviawati, 1993).

Alga merupakan organisme autotrof yang dapat mensintesis makanannya sendiri dengan melakukan proses fotosintesis pada siang hari, saat terdapat cahaya matahari. Karbondioksida digunakan sebagai sumber karbon untuk mensintesis sel-sel baru dan oksigen. Pada saat gelap alga membutuhkan oksigen untuk respirasi dan senyawa organik untuk pertumbuhan. Pertumbuhan alga pada siang dan malam hari distimulasi oleh garam-garam, fosfor dan nitrat. Jadi kuantitas nutrisi dan pencahayaan fotosintesis merupakan faktor penting bagi pertumbuhan alga dalam kolam oksidasi. Karbondioksida merupakan salah satu dari produk yang dihasilkan oleh metabolisme bakteri. Karbondioksida ini digunakan oleh alga selama proses fotosintesis dan sebaliknya bakteri memanfaatkan oksigen yang dihasilkan oleh alga untuk mengoksidasi bahan organik dalam limbah. Kondisi pencahayaan, kondisi operasional (pH, komposisi dan konsentrasi nutrisi yang ada, waktu retensi hidrlik) dan parameter-parameter biologis (adaptasi alga, penyemaian alga, dan parasit) (Taufik, 2016).

Struktur tubuh alga laut terdiri dari 3 bagian utama, pertama dikenal dengan sebutan *blade*, yaitu struktur yang menyerupai daun pipih yang biasanya lebar. Kedua *stipe*, yaitu struktur yang menyerupai batang yang lentur dan berfungsi sebagai penahan guncangan ombak. Dan ketiga *holdfast*, yaitu bagian yang menyerupai akar dan berfungsi untuk melekatkan tubuhnya pada substrat (Sumich, 1992).

Makroalga memiliki banyak manfaat, baik manfaat secara ekologis maupun ekonomis bagi masyarakat. Manfaat ekologis makroalga yaitu menyediakan habitat untuk beberapa jenis biota laut seperti jenis *Crustacea*, *Mollusca*, *Echinodermata*, ikan maupun alga kecil yang lainnya. Bentuknya yang rimbun mampu memberikan perlindungan terhadap ombak dan juga menjadi makanan bagi biota laut. Nilai ekonomis makroalga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan baku industri, dan bahan untuk laboratorium seperti bahan awetan basah, bahan media untuk perkembangbiakan bakteri dan jamur guna menghasilkan antibiotik, serta ada pula jenis makroalga yang digunakan sebagai obat-obatan (Marianingsih, 2013).

Untuk alga yang sepenuhnya autotrofik, semua yang diperlukan untuk pertumbuhan adalah cahaya, CO₂, air, nutrisi, dan trace elemen. Dengan cara fotosintesis alga akan mampu mensintesis semua senyawa biokimia yang diperlukan untuk pertumbuhan. Namun, hanya sebagian kecil ganggang yang sepenuhnya autotrofik; banyak yang tidak dapat mensintesis senyawa biokimia tertentu (vitamin tertentu, misalnya) (Barsanti, 2006).

Parameter terpenting yang mengatur pertumbuhan alga adalah kuantitas dan kualitas nutrisi, cahaya, pH, salinitas, dan suhu. Parameter yang paling optimal dan

rentang yang ditoleransi adalah spesies spesifik dan berbagai faktor mungkin saling bergantung dan parameter yang optimal untuk satu set kondisi belum tentu optimal untuk yang lainnya (Barsanti, 2006).

Adapun parameter lingkungan pada pertumbuhan alga adalah sebagai berikut:

1. Suhu

Suhu di mana kultur dipertahankan idealnya sedekat mungkin dengan suhu di mana organisme dikumpulkan; organisme polar ($<10^{\circ}\text{C}$); beriklim sedang ($10\text{-}25^{\circ}\text{C}$); tropis ($<20^{\circ}\text{C}$). Spesies yang paling umum dari mikroalga mentolerir suhu antara 16 dan 27°C , meskipun hal ini dapat bervariasi dengan komposisi media kultur, spesies, dan strain yang dibudidayakan. Nilai tengah $18\text{-}20^{\circ}\text{C}$ paling sering digunakan. Inkubator yang dikontrol suhu biasanya menggunakan suhu konstan (transfer ke suhu yang berbeda harus dilakukan dalam langkah 2°C per minggu), meskipun beberapa model memungkinkan siklus suhu. Suhu yang lebih rendah dari 16°C akan memperlambat pertumbuhan, sedangkan yang lebih tinggi dari 35°C mematikan untuk sejumlah spesies.

2. Cahaya

Pada tumbuhan, cahaya adalah sumber energi yang mendorong reaksi fotosintesis pada alga dan dalam hal ini intensitas, kualitas spektral, dan fotoperiode perlu dipertimbangkan. Intensitas cahaya memiliki peran penting, tetapi persyaratannya sangat bervariasi dengan kedalaman kultur dan kepadatan kultur alga : pada kedalaman yang lebih tinggi dan konsentrasi sel, intensitas cahaya harus ditingkatkan untuk menembus melalui kultur. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi

(misalnya sinar matahari langsung, wadah kecil dekat dengan cahaya buatan) dapat menyebabkan hambatan cahaya. Paling sering digunakan intensitas cahaya berkisar antara 100 dan 200 $\mu\text{E dt}^{-1} \text{ m}^{-2}$, yang sesuai sekitar 5-10% dari cahaya matahari penuh (2000 $\mu\text{E dt}^{-1} \text{ m}^{-2}$). Selain itu, terlalu panas karena pencahayaan alami dan buatan harus dihindari. Cahaya mungkin alami atau dipasok oleh tabung fluoresen yang memancarkan cahaya biru atau spektrum cahaya merah, karena ini adalah bagian paling aktif dari spektrum cahaya untuk fotosintesis. Intensitas dan kualitas cahaya dapat dimanipulasi dengan filter.

3. pH

Kisaran pH untuk spesies alga yang paling berbudaya adalah antara 7 dan 9, dengan kisaran optimal menjadi 8.2-8.7, meskipun ada spesies yang tinggal di lingkungan yang lebih asam/dasar. Keruntuhan kultur lengkap akibat gangguan banyak proses seluler dapat diakibatkan oleh kegagalan mempertahankan pH yang dapat diterima. Dalam kasus kultur alga dengan kepadatan tinggi, penambahan karbon dioksida memungkinkan untuk mengoreksi pH yang meningkat, yang dapat mencapai nilai pembatas hingga pH 9 selama pertumbuhan alga.


4. Salinitas

Ganggang laut sangat toleran terhadap perubahan salinitas. Kebanyakan spesies tumbuh terbaik di salinitas yang sedikit lebih rendah daripada habitat asli mereka, yang diperoleh dengan menipiskan air laut dengan air keran. Salinitas 20-24 g l^{-1} ditemukan optimal.

D. Tinjauan Umum Kabupaten Takalar

Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara $5^{\circ} 30'$ sampai $5^{\circ} 38'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 22'$ sampai $119^{\circ} 39'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $566,51 \text{ km}^2$. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2017).


Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2017).



Gambar 2.3. Peta Wilayah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2017).

Secara administratif Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa/kelurahan yang terletak di 9 kecamatan, yaitu Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Polombangkeng Selatan, Pattallassang, Polombangkeng Utara, Galesong Selatan, Galesong, dan Galesong Utara. Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 289.978 jiwa yang terdiri atas 139.381 jiwa penduduk laki-laki dan 150.597 jiwa penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2017).

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif didasarkan pada menggambarkan karakteristik morfologi dari makroalga yang berasal dari perairan laut pantai Punaga Kabupaten Takalar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan September-Oktober 2018. Pengambilan sampel dilakukan di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Botani, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata-Gowa.

C. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini makroalga yang berasal dari Kabupaten Takalar merupakan populasi. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian makroalga yang diambil dari perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu jenis makroalga yang berasal dari perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar.

E. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis makroalga yaitu dengan proses identifikasi yang dilakukan dengan mengamati ciri morfologi makroalga berupa bentuk batang, bentuk daun, bentuk bunga dan bentuk akar. Pola sebaran makroalga diketahui dengan mengukur jumlah individu makroalga dengan menggunakan metode line transek di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar dan dihitung dengan menggunakan rumus Indeks Morisita.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode secara sengaja atau *Purposive Sampling*, pengambilan sampel pada 3 stasiun. Setiap plot dihitung jumlah spesies alga yang ditemukan, serta jumlah individu/koloni. Identifikasi jenis dilakukan di lapangan dengan mengukur ukuran alga yang didapat.

G. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, mistar, plot ukuran 1 x 1 m², GPS (*Global Positioning System*), termometer, pH meter, kamera digital, tali rafia ukuran 50 m, toples, ember, gunting, meteran, dan alat *snorkeling*.

2. Bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alga (ganggang laut), label, aquadest, buku-buku identifikasi maupun jurnal lainnya, kertas HVS, dan larutan formalin 4%.

H. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah:


1. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan observasi kembali untuk mendapatkan gambaran kondisi lokasi penelitian dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan.

2. Penentuan titik stasiun penelitian

Penentuan titik stasiun dilakukan dengan menyurvei terlebih dahulu lokasi penelitian tersebut. Survei penelitian dilakukan agar peneliti dapat menentukan titik stasiun pada lokasi. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 4 titik stasiun. Titik stasiun pertama pada substrat berbatu sekitar pemukiman warga, titik stasiun kedua pada substrat berpasir sekitar pemukiman warga, titik stasiun ketiga pada substrat

berbatu sekitar wisata pantai dan titik stasiun keempat pada substrat berpasir sekitar wisata pantai.




Gambar 3.1. Peta lokasi penelitian

3. Pengambilan sampel makroalga

Metode pengambilan sampel menggunakan metode garis transek (*line transect*) dengan teknik *sampling* kuadran (English *et al.* 1997). Lokasi pengambilan sampel dibedakan menjadi tiga stasiun. Penentuan ketiga stasiun tersebut berdasarkan perbedaan tipe substratnya, yaitu stasiun I dengan substrat berpasir, stasiun II dengan zona lamun, dan stasiun III dengan substrat berbatu. Pada setiap stasiun terdapat 3 transek, dimana setiap 1 transek dibuat tegak lurus garis pantai ke arah tubir (*slope*) menggunakan tali rafia sepanjang 50 m dengan 5 kuadran (plot ukuran 1 x 1 m²).

Jarak antar kuadran dalam satu garis transek 10 m serta jarak antar transek 10 m. Pengambilan sampel dilakukan pada saat air surut dengan menggunakan tangan dan gunting untuk memotong maupun mengambil makroalga, dan dibantu dengan alat *snorkelling*. Dilakukan pengukuran faktor lingkungan yang meliputi suhu, pH, intensitas cahaya, DO (*Dissolved Oxygen*), salinitas, jenis substrat, kekeruhan air, dan kecepatan arus. Setiap jenis makroalga yang ditemui di dalam plot pengamatan, dimasukkan ke dalam toples, sampel yang telah diberi label sesuai dengan titik pengamatan lalu dihitung jumlah koloninya. Dalam pengamatan makroalga, satu koloni dianggap satu individu, jika satu koloni dari jenis yang sama dipisahkan oleh satu koloni lainnya maka setiap bagian yang terpisah itu dianggap sebagai satu individu tersendiri.



4. Identifikasi makroalga

Setelah dilakukan pengambilan sampel, dilanjutkan dengan proses identifikasi. Identifikasi makroalga dilakukan di Laboratorium Botani berdasarkan buku-buku identifikasi dan dari jurnal lainnya. Sampel makroalga diidentifikasi dengan memperhatikan ciri atau karakter yang ada pada setiap sampel makroalga.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menentukan pola penyebaran dengan menggunakan rumus indeks morisita:

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

Dimana:

$I\delta$ = Indeks Morisita

n = Jumlah transek pengambilan sampel

N = Jumlah seluruh individu dalam total n

x = Jumlah seluruh individu pada seluruh stasiun penelitian

Nilai Indeks Morisita yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut:

$I\delta < 1$, berarti penyebaran individu cenderung merata;

$I\delta = 1$, berarti penyebaran individu cenderung acak;

dan

$I\delta > 1$, berarti penyebaran individu cenderung mengelompok.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hasil identifikasi Makroalga di Pantai Punaga Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pantai Punaga diperoleh 15 spesies makroalga terdiri dari 8 jenis alga merah (Rhodophyceae), 4 jenis alga coklat (Phaeophyceae) dan 3 jenis alga hijau (Chlorophyceae). Pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) terdapat 126 individu, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) sebanyak 16 individu, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) terdapat 86 individu, dan pada stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) terdapat 28 individu. Adapun hasil pengamatan jenis makroalga pada tiap-tiap stasiun dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Hasil identifikasi jenis makroalga di perairan pantai Punaga kecamatan Punaga Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.


Kelas	Nama Spesies	Stasiun				Jumlah individu
		I	II	III	IV	
Rhodophyceae	<i>Tricleocarpa fragilis</i>	9	-	4	-	13
	<i>Acanthophora spicifera</i>	-	4	2	8	14
	<i>Botryocladia leptopoda</i>	3	2	-	-	5
	<i>Halymenia durvillei</i>	2	4	4	1	11
	<i>Halymenia floresia</i>	-	-	2	2	4
	<i>Chondracanthus acicularis</i>	39	-	13	-	52
	<i>Eucheuma spinosum</i>	2	-	2	-	4
	<i>Dermonema virens</i>	43	-	30	-	73
Phaeophyceae	<i>Padina boergesenii</i>	11	-	15	-	26
	<i>Sargassum swartzii</i>	-	5	-	13	18
	<i>Sargassum cinereum</i>	4	-	4	-	8
	<i>Sargasum polycystum</i>	-	-	2	-	2

Chlorophyceae	<i>Codium geppiorum</i>	10	1	-	-	11
----------------------	-------------------------	----	---	---	---	----

Lanjutan tabel 4.1.

Kelas	Nama Spesies	Stasiun				Jumlah individu
		I	II	III	IV	
Chlorophyceae	<i>Codium dwarkense</i>	2	-	4	4	10
	<i>Halimeda macroloba</i>	-	-	4	-	4
Jumlah		126	16	86	28	255
Jumlah spesies		10	5	12	5	

Adapun komposisi jenis makroalga di perairan pantai Punaga kecamatan Punaga Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:



Gambar 4.1. Diagram pie komposisi jenis makroalga di perairan pantai Punaga kecamatan Punaga Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pola sebaran Makroalga di Pantai Punaga Kabupaten Takalar

Pola sebaran makroalga di perairan pantai Punaga disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Pola sebaran makroalga di pantai Punaga Kabupaten Takalar

Kelas	Jenis	n	N	Σx^2	Id	Keterangan
Rhodophyceae	<i>Tricleocarpa fragilis</i>	12	13	169	12	Mengelompok
	<i>Acanthophora spicifera</i>	12	14	196	12	Mengelompok
	<i>Botryocladia leptopoda</i>	12	5	25	12	Mengelompok
	<i>Halymenia durvillei</i>	12	11	121	12	Mengelompok
	<i>Halymenia floresia</i>	12	4	16	12	Mengelompok
	<i>Chondracanthus acicularis</i>	12	52	2704	12	Mengelompok
	<i>Eucheuma spinosum</i>	12	4	16	12	Mengelompok
	<i>Dermonema virens</i>	12	73	5329	12	Mengelompok
Phaeophyceae	<i>Padina boergesenii</i>	12	26	676	12	Mengelompok
	<i>Sargassum swartzii</i>	12	18	324	12	Mengelompok
	<i>Sargassum cinereum</i>	12	8	64	12	Mengelompok
	<i>Sargassum polycystum</i>	12	2	4	12	Mengelompok
Chlorophyceae	<i>Codium geppiorum</i>	12	11	121	12	Mengelompok
	<i>Codium dwarkense</i>	12	10	100	12	Mengelompok
	<i>Halimeda macroloba</i>	12	4	16	12	Mengelompok

3. Hasil parameter lingkungan

Pengukuran parameter lingkungan meliputi pengukuran suhu, salinitas, pH, DO, intensitas cahaya, kecepatan arus dan kekeruhan air disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Hasil data pengukuran parameter lingkungan di pantai Punaga Kabupaten Takalar.

Parameter Lingkungan	Stasiun I	Stasiun II	Stasiun III	Stasiun IV
Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	29	31	30	31
Salinitas (‰)	35	40	37	42
pH	7.39	7.4	7.63	7.69

Lanjutan tabel 4.3.

Parameter Lingkungan	Stasiun I	Stasiun II	Stasiun III	Stasiun IV
DO (mg/l)	6.32	6.35	6.40	6.43
Intensitas Cahaya (cm)	125	123	131	135
Kecepatan Arus (cm/s)	0.038	0.052	0.039	0.047
Kekeruhan Air (NTU)	10.63	10.64	2.66	2.62

B. Pembahasan

1. Identifikasi Makroalga di Perairan Pantai Punaga Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pantai Punaga diperoleh 15 spesies makroalga terdiri dari 8 jenis alga merah (Rhodophyceae), 4 jenis alga coklat (Phaeophyceae) dan 3 jenis alga hijau (Chlorophyceae), dimana jumlah individu yang paling banyak ditemukan yaitu pada spesies *Dermonema virens* dengan jumlah 73 individu. Sedangkan yang paling sedikit ditemukan yaitu pada spesies *Sargassum polycystum* dengan jumlah 2 individu.

Pada penelitian jenis makroalga yang dilakukan di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar, *Dermonema virens* merupakan spesies dengan individu terbanyak. Hal ini disebabkan karena spesies tersebut umumnya tumbuh dan melekat pada substrat berbatu dan sejenisnya, sementara substrat yang mendominasi di pantai Punaga sendiri yaitu substrat berbatu. Dasar perairan yang keras, kokoh dan kuat yang tidak dapat dipindahkan oleh gelombang atau pengaruh lain, seperti batu-batuan dan batu karang merupakan substrat yang baik bagi kehidupan alga yang merupakan bagian terbesar dari vegetasi laut. Sedangkan spesies yang paling banyak ditemukan

pada substrat berpasir yaitu *Sargassum swartzii*. Pada substrat berpasir sendiri tidak begitu banyak ditemukan karena mayoritas makroalga tumbuh pada substrat berbatu dan sejenisnya. Dasar perairan yang lemah dan gembur kurang baik bagi kehidupan alga, tetapi banyak dihuni oleh alga berukuran kecil.

Pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) ditemukan 10 jenis spesies makroalga, dimana terdapat 3 kelas yaitu Rhodophyceae, Phaeophyceae dan Chlorophyceae. Pada kelas Rhodophyceae terdapat 6 jenis spesies diantaranya *Tricleocarpa fragilis*, *Botryocladia leptopoda*, *Halymenia durvillei*, *Chondracanthus acicularis*, *Eucheuma spinosum* dan *Dermonema virens*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 2 jenis spesies yaitu *Padina boergesenii* dan *Sargassum cinereum*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 2 jenis spesies, yaitu *Codium geppiorum* dan *Codium dwarkense*.

Pada stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) ditemukan 5 jenis spesies makroalga. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 3 kelas yaitu Rhodophyceae, Phaeophyceae dan Chlorophyceae. Pada kelas Rhodophyceae terdapat 3 jenis spesies diantaranya *Acanthophora spicifera*, *Botryocladia leptopoda* dan *Halymenia durvillei*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 1 jenis spesies yaitu *Sargassum swartzii*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 1 jenis spesies pula yaitu *Codium geppiorum*.

Pada stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) ditemukan 12 jenis spesies makroalga. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 3 kelas yaitu Rhodophyceae, Phaeophyceae dan Chlorophyceae. Pada kelas Rhodophyceae

terdapat 7 jenis spesies diantaranya *Tricleocarpa fragilis*, *Acanthophora spicifera*, *Halymenia durvillei*, *Halymenia floresia*, *Chondracanthus acicularis*, *Eucheuma spinosum* dan *Dermonema virens*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 3 jenis spesies yaitu *Padina boergesenii*, *Sargassum cinereum* dan *Sargassum polycystum*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 2 jenis spesies, yaitu *Codium dwarkense* dan *Halimeda macroloba*.

Pada stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) ditemukan 5 jenis spesies makroalga. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 3 kelas yaitu Rhodophyceae, Phaeophyceae dan Chlorophyceae. Pada kelas Rhodophyceae terdapat 3 jenis spesies diantaranya *Acanthophora spicifera*, *Halymenia durvillei* dan *Halymenia floresia*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 1 jenis spesies yaitu *Sargassum swartzii*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 1 jenis spesies pula yaitu *Codium dwarkense*.

a. Alga merah (Rhodophyceae)

1) *Tricleocarpa fragilis* (Linnaeus) Huisman & Townsend

Memiliki thallus yang dapat mencapai 7 cm berbentuk silindris, dengan permukaan yang licin dan berwarna merah muda pucat ke abu-abuan. Berkapur ringan dengan panjang permukaan annulate 6–11 mm, berdiameter 1.5-2.0 mm dan semakin pendek sampai ujungnya. Segmen sedikit membulat di kedua ujungnya. Korteks dengan 3 atau 4 lapisan sel; sel-sel terdesin meningkat dan tidak berwarna, dengan gradasi ke sel-sel kortikal luar berpigmen yang lebih kecil. Jenis ini sering ditemukan pada substrat berbatu seperti pada karang, coral yang telah mati dan rumah

kerang di area yang dangkal. Jenis ini hidup pada kedalaman hingga 50 meter. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanah asam (Parker, 2016).

Adapun klasifikasi *Tricleocarpa fragilis* menurut Huisman & Townsend (1993) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Nemaliales
 Famili : Galaxauraceae
 Genus : *Tricleocarpa*
 Spesies : *Tricleocarpa fragilis*

2) *Acanthophora spicifera* (Vahl) Børgesen

Memiliki talus berbentuk silindris dengan percabangan mengarah ke segala arah dan tegak dengan tinggi dapat mencapai 20 cm. Spesies ini berwarna merah gelap keunguan, melekat pada substrat dengan cakram yang tidak beraturan. Diameter percabangan utama 1—2 mm. Cabang-cabang tidak beraturan atau bergantian. Terdapat duri-duri pendek dengan ujung runcing di permukaan talus. Panjang batang 1.5 mm, dengan jarak percabangan 2.29 mm. Ukuran luas penampang sel 41.59 mm, bagian permukaan terdiri dari 1-2 korteks dengan diameter 2.72 mm, bentuk korteks memanjang. Sel kortikal pada permukaan bentuknya memanjang dengan diameter 2.57 mm. Alga ini sering ditemukan pada substrat karang dan berpasir. Secara umum dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti

pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar dan sebagai sumber *carregeenan* untuk pasta (Oryza, dkk., 2017).

Adapun klasifikasi *Acanthophora spicifera* menurut Boergesen (1802) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Ceramiales
 Famili : Rhodomelaceae
 Genus : *Acanthophora*
 Spesies : *Acanthophora spicifera*

3) *Botryocladia leptopoda* (J. Agardh) Kylin

Tumbuhan ini berwarna merah jambu atau merah keunguan, tinggi dapat mencapai 60 cm dan tegak. Batang berbentuk silindris, tebal, padat dan memiliki cabang yang tidak beraturan. Permukaan talus ditutupi dengan vesikula sub-bulat berbentuk seperti buah anggur yang dipenuhi lendir dengan diameter 1-5 mm. Korteks dengan 2-3 lapisan sel kecil, membentuk lapisan kontinyu di atas sel meduler, medula yang terdiri dari rongga yang diisi dengan lendir. Terdapat *holdfast* sebagai alat untuk menempel pada substrat. Alga ini sering ditemukan pada substrat berbatu di daerah yang dangkal (Bhavanath, 2009).

Adapun klasifikasi *Botryocladia leptopoda* menurut Kylin (1931) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Rhodymeniales
 Famili : Rhodymeniaceae
 Genus : *Botryocladia*
 Spesies : *Botryocladia leptopoda*

4) *Halymenia durvillei* C. A. Agardh

Halymenia durvillei memiliki talus berbentuk pipih dengan panjang hingga 42 cm dan bercabang, talus pada *H. durvillei* memiliki lebar 5.4 cm serta meruncing. *H. durvillei* berwarna merah muda hingga warna merah serta memiliki permukaan talus yang licin dan halus (De Smedt et al., 2001). Percabangan berselang seling tak teratur pada kedua sisi talus atau *pinnate alternate*. Pada talus bagian bawah biasanya melebar dan mengecil ke bagian puncak, sedangkan pinggiran talus bergerigi. Rumpun dan bentuk holdfastnya yaitu cakram. Alga ini sering ditemukan pada substrat berkarang, berbatu, berpasir dan di daerah rataaan terumbu karang. Umumnya selalu terendam air laut dan terkena ombak langsung (Langoy, 2011).

Sebagian dari genus *Halymenia* tumbuh di area dengan temperature yang rendah tetapi secara umum genus ini ditemukan di area dengan temperatur yang hangat atau daerah tropis (Kantun et al., 2012). *H. durvillei* memiliki banyak manfaat

bagi masyarakat salah satunya yaitu sebagai penghasil karagenan dengan mutu terbaik yang berfungsi untuk industri pangan dan non pangan (Maghfiroh, 2016).

Adapun klasifikasi *Halymenia durvillei* menurut Bory (1828) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Halymeniales
 Famili : Halymeniaceae
 Genus : *Halymenia*
 Spesies : *Halymenia durvillei*

5) *Halymenia floresia* (Clemente) C. Agardh

Halymenia floresia merupakan alga merah yang memiliki talus yang pipih, tipis, licin, bergelatin, warna merah tua atau merah muda. Memiliki percabangan berselang seling tak teratur pada kedua sisi talus. Panjang talus dapat mencapai 15–45cm dengan lebar talus sekitar 1.5–4cm. Pada talus bagian bawah lebar dan semakin meruncing ke bagian puncak. Ujung talus *H. floresia* bercabang dan rimbun. Bentuk, ramifikasi dan ukurannya sangat bervariasi; beberapa spesimen memiliki margin datar pada keseluruhan pinggirnya, beberapa lainnya bergigi, dan yang lain sangat bergerigi. Tidak ada buah yang terlihat pada alga ini. *H. floresia* memiliki warna merah jambu-merah terang, namun warnanya akan segera hilang dan mengalami dekomposisi saat berada dalam air tawar (Harvey, 1862).

Alga ini sering ditemukan pada substrat berkarang, berbatu, berpasir dan di daerah rata-rata terumbu karang. Umumnya selalu terendam air laut dan terkena ombak langsung (Langoy, 2011). Sebagian dari genus *Halymenia* tumbuh di area dengan temperatur yang rendah tetapi secara umum genus ini ditemukan di area dengan temperatur yang hangat atau daerah tropis (Kantun *et al.*, 2012). Sama halnya dengan *Halymenia durvillei*, *Halymenia floresia* memiliki banyak manfaat bagi masyarakat salah satunya yaitu sebagai penghasil karagenan dengan mutu terbaik yang berfungsi untuk industri pangan dan non pangan (Maghfiroh, 2016).

Adapun klasifikasi *Halymenia floresia* menurut C. A. Agardh (1807) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Rhodophyta
Kelas	: Rhodophyceae
Ordo	: Halymeniales
Famili	: Halymeniaceae
Genus	: <i>Halymenia</i>
Spesies	: <i>Halymenia floresia</i>

6) *Chondracanthus acicularis* (Roth) Fredericq

Alga ini berwarna merah gelap, ungu-merah, atau kehitaman. Bentuk talus melengkung, tajam, silindris, ramping, tinggi sekitar 3-5 cm, tebal 0.5 mm, memiliki banyak cabang, tidak beraturan dan bercabang bergantian. Alga ini memiliki talus yang terdiri atas medula dan korteks antisiklinal sel (Bhavanath, 2009). Talus pada

alga ini memiliki permukaan yang licin dan halus. Basal holdfast pada *C. acicularis* memiliki bentuk cakram. Korteks pada alga ini biasanya memiliki 6-8 lapisan sel. *C. acicularis* umumnya ditemukan pada substrat berbatu intertidal yang lebih rendah (Hommersand, 1993).

C. acicularis memiliki kandungan karagenan dengan mutu yang tinggi, dimana karagenan merupakan sejenis polisakarida yang digunakan sebagai bahan kosmetik dan kapsul gelatin dan merupakan zat aditif yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan makanan (Pereira, 2009).

Adapun klasifikasi *Chondracanthus acicularis* menurut Fredericq (1993) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Gigartinales
 Famili : Gigartinaceae
 Genus : *Chondracanthus*
 Spesies : *Chondracanthus acicularis*

7) *Eucheuma spinosum* (C. Agardh) Dawson

Thallus berbentuk silindris, percabangan thallus berujung runcing dan ditumbuhi tonjolan, berupa duri lunak. Permukaan tubuhnya licin, berwarna coklat tua, hijau coklat, hijau kuning atau merah ungu. Variasi warna ini terkait dengan kemampuan adaptasi karomatik dari jenis rumput laut ini yang tergantung dari

intensitas cahaya matahari yang diterima. Tinggi *Eucheuma spinosum* dapat mencapai 30 cm dan percabangan thallus pertama dan kedua tumbuh membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari, ada yang memanjang dan ada yang melengkung. *Eucheuma spinosum* tumbuh pada perairan yang jernih, dasar perairannya berpasir atau berlumpur dan hidupnya menempel pada berbagai jenis terumbu karang (Awaliah, 2017).

Adapun klasifikasi *Eucheuma spinosum* menurut C. Agardh (1847) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Gigartinales
 Famili : Solieriaceae
 Genus : *Eucheuma*
 Spesies : *Eucheuma spinosum*

8) *Dermonema virens* (J. Agardh) Pedroche & Ávila Ortíz

Dermonema virens merupakan salah satu jenis alga rhodophyceae yang memiliki warna coklat gelap kemerahan dengan tipe talus rimbun dan berbentuk silindris. Tinggi talus sekitar 6–10cm dengan beberapa sumbu yang timbul dari basal yang berbentuk cakram. Permukaan talus agak seperti gelatin, licin dan tidak memiliki zat kapur. Sumbu secara dikotomi dan bercabang secara bertahap dan

meruncing dari pangkal ke ujung. Talus multiaxial dengan medulla lingar dan korteks. *Dermonema virens* umumnya sering menempel pada substrat berbatu intertidal dan juga terdapat pada batu koral. Alga jenis *Dermonema virens* ini umumnya dimanfaatkan sebagai makanan (Bhavanath, 2009).

Adapun klasifikasi *Dermonema virens* menurut Pedroche & Ávila Ortíz (1996) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Rhodophyta
 Kelas : Rhodophyceae
 Ordo : Nemaliales
 Famili : Liagoraceae
 Genus : *Dermonema*
 Spesies : *Dermonema virens*

b. Alga coklat (Phaeophyceae)

1) *Padina boergesenii* Allender & Kraft

Bentuk thallus seperti kipas membentuk segmen-segmen lembaran tipis (lobus) bagian atas lobus agak melebar dengan pinggir rata dan pada bagian puncak terdapat lekukan-lekukan yang pada ujungnya terdiri dari dua lapisan sel, tingginya 5-9 cm, berwarna coklat kekuningan atau kadang-kadang memutih karena terdapat perkapuran, terdiri dari beberapa *flabellate lobes* lebar *blade* 3,2 cm. Memiliki garis konsentrik ganda pada permukaan bawah, mempunyai jarak sama satu dengan yang lain berkisar 2-3 mm. Pengapuran terjadi di bagian permukaan daun, memiliki

holdfast rhizoid yang berbentuk cakram. Habitat alga ini yaitu substrat berpasir dan karang mati di daerah intertidal, biasanya tumbuh menempel pada batu di daerah rata-rata terumbu baik di tempat-tempa yang terkena hambatan ombak langsung maupun terlindung (Meicy, 2016).

Adapun klasifikasi *Padina boergesenii* menurut Allender & Kraft (1983) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Phaeophyta
 Kelas : Phaeophyceae
 Ordo : Dictyotales
 Famili : Dictyoceae
 Genus : *Padina*
 Spesies : *Padina boergesenii*

2) *Sargassum swartzii* C. Agardh

Alga ini berwarna coklat gelap dengan tinggi talus mencapai 25-30 cm dan lempengan yang berbentuk cakram. Memiliki daun dengan panjang sekitar 3-7.5 cm dan lebar 3-4 mm. Pinggiran daun bergelombang dengan gigi marijinal yang kasar. *Sargassum swartzii* memiliki vesikel-vesikel berbentuk oval atau elips dengan panjang sekitar 4 mm dan lebar 3-4 mm. Alga ini umumnya ditemukan pada substrat batuan intertidal (Bhavanath, 2009).

S. swartzii mempunyai nilai ekonomis sebagai sumber alginat. Chauhan dan Khrisnamurthy pada tahun 1971 (Vashistha, 1984) melaporkan bahwa *S. swartzii*

mengandung banyak algin yang mempunyai viskositas yang tinggi. Selain sebagai bahan makanan, rumput laut juga dapat digunakan sebagai penghasil agar-agar, alginat, carrageenan, fulceran, pupuk, dan makanan ternak (Purwanti, 2013).

Adapun klasifikasi *Sargassum swartzii* menurut C. Agardh (1820) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Phaeophyta
 Kelas : Phaeophyceae
 Ordo : Fucales
 Famili : Sargassaceae
 Genus : *Sargassum*
 Spesies : *Sargassum swartzii*

3) *Sargassum cinereum* J. G. Agardh

Memiliki type thallus Tetraticous dan holdfast bentuk bulat/kuat dan tempat hidup di temukan pada substrat pasir/karang mati (epipalik) jenis *sargassum* ini banyak tumbuh baik pada perairan dangkal dengan area yang terdapat gelombang dan arus lemah, hal ini didukung dengan type substrat pasir/karang mati jenis ini lebih menyukai intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi (Dewi, 2012).

Kandungan yang terdapat pada *Sargassum cinereum* yaitu protein, vitamin C, tanin, iodine, fenol dan alginate dan mempunyai manfaat sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik dan tekstil. Selain itu juga, *Sargassum* sp. mengandung senyawa-

senyawa aktif steroida, alkaloida, fenol, dan triterpenoid berfungsi sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur (Kusumaningrum *et al.* 2007).

Adapun klasifikasi *Sargassum cinereum* menurut J. G. Agardh (1848) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Phaeophyta
 Kelas : Phaeophyceae
 Ordo : Fucales
 Famili : Sargassaceae
 Genus : *Sargassum*
 Spesies : *Sargassum cinereum*

4) *Sargassum polycystum* C. Agardh

Morfologi *Sargassum polycystum* tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri umum Phaeophyta. Talus silindris berduri-duri kecil merapat, *holdfast* membentuk cakram kecil, tepi daun bergerigi dan di atasnya terdapat perakaran/stolon yang rimbun berekspansi ke segala arah. Memiliki batang pendek dengan percabangan utama tumbuh rimbun. Mempunyai gelembung udara (*bladder*) yang umumnya soliter, Reseptakel dan vesikel muncul dari aksil (ketiak) talus daun, panjangnya mencapai 7 meter, warna talus umumnya cokelat (Aslan 1990).

Sargassum polycystum mengandung alginat, vitamin C, vitamin E (α -tokoferol), mineral, karotenoid, klorofil, florotanin, polisakarida sulfat, asam lemak, dan asam amino. *Sargassum polycystum* juga mengandung senyawa metabolit

sekunder yaitu steroid triterpenoid (Anggadiredja, 2009). Menurut Kadi (2005), makroalga *Sargassum polycystum* memiliki kandungan protein, vitamin C, tanin, iodine, fenol dan alginat dan bermanfaat sebagai bahan pangan, obat-obatan kosmetik dan tekstil (Awaliah, 2017).

Adapun klasifikasi *Sargassum polycystum* menurut C. Agardh (1824) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Phaeophyta
 Kelas : Phaeophyceae
 Ordo : Fucales
 Famili : Sargassaceae
 Genus : *Sargassum*
 Spesies : *Sargassum polycystum*

c. Alga hijau (Chlorophyceae)

1) *Codium geppiorum* O.C. Schmidt

Codium geppiorum merupakan jenis alga yang berwarna hijau gelap. Talus dapat mencapai 3-5 cm dengan tekstur seperti spons. Alga ini memiliki holdfast sebagai alat melekat pada substratnya. Jenis percabangannya yaitu sub-dikotomi terbagi dan merayap, dan cabang berbentuk silinder dan utrikulus. *C. geppiorum* umumnya ditemukan di laut pasang surut pada substrat berbatu (Chang, 2002).

Semua spesimen *C. geppiorum* di wilayah Indo-Pasifik dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai ukuran utrikelnya. Kelompok pertama, dengan utrikel yang

lebih panjang ($> 500 \mu\text{m}$), didistribusikan di Samudra Hindia (Egerod, 1975; Vandenheede dan Coppejans, 1996), dan satu lagi, dengan utrikel yang lebih pendek ($<500 \mu\text{m}$), didistribusikan di Samudera Pasifik (Tseng, 1983).

C. geppiorum berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Berbagai jenis alga yang hidup bebas di air terutama yang tubuhnya bersel satu dan dapat bergerak aktif merupakan penyusun fitoplankton. Sebagian besar fitoplankton adalah anggota alga hijau, pigmen klorofil yang dimilikinya efektif melakukan fotosintesis sehingga alga hijau merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan (Jumin, 1992).

Adapun klasifikasi *Codium geppiorum* menurut O.C. Schmidt (1923) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Chlorophyta
 Kelas : Chlorophyceae
 Ordo : Bryopsidales
 Famili : Codiaceae
 Genus : *Codium*
 Spesies : *Codium geppiorum*

2) *Codium dwarkense* Børgesen

Codium dwarkense merupakan salah satu jenis alga chlorophyceae yang memiliki warna hijau gelap. Tipe talus yaitu remiform dan teksturnya seperti spons. Jenis *C. dwarkense* dilekatkan pada cakram dengan banyak silinder tegak kapak. Tinggi talus dapat mencapai 16 cm atau lebih tinggi. Percabangan jenis alga ini

tumbuh seara teratur dibagi secara terpolarisasi pada jarak 2–3 cm atau sedikit lebih banyak di antara keduanya divisi. Sudut antara cabang-cabang sempit, lurus dan mengarah ke atas. *C. dwarkense* biasanya melekat pada substrat berbatu intertidal dan batu berkapur. Alga jenis ini juga sering ditemukan tumbuh bersama dengan tempat tumbuhnya Sargassum. Di Australia Barat ditemukan di sepanjang pantai di daerah Kimberley dan Pilbara, jenis ini juga ditemukan di pantai lepas Afrika Timur, pulau-pulau di Samudera Hindia dan pantai di Asia Barat Daya. Tidak berbeda dengan *C. geppiorum*, pigmen klorofil yang dimilikinya efektif melakukan fotosintesis sehingga alga hijau merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan (Jumin, 1992).

Adapun klasifikasi *Codium dwarkense* menurut Boergesen (1937) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Chlorophyta
Kelas : Chlorophyceae
Ordo : Bryopsidales
Famili : Codiaceae
Genus : *Codium*
Spesies : *Codium dwarkense*

3) *Halimeda macroloba* Decaisne

Halimeda macroloba merupakan jenis alga chlorophyceae yang talusnya mengandung zat kapur, tinggi talus dapat mencapai 23 cm. Segment tebal berbentuk kipas dengan lebar mencapai 21 mm dan panjang mencapai 15 mm serta bagian pinggir bergelombang. Basal segment mencapai lebar 20 mm dan panjang mencapai 15 mm. Di antara basal segment terdapat bantalan yang merupakan tempat pertumbuhan segment. Percabangan utama *dichotomous* atau *trichotomous* kelompok dalam satu rumpun. *Holdfast* berbentuk ubi diameter mencapai 10mm dan panjang mencapai 20mm serta tulat atau bongkol sebagai alat pengikat partikel-partikel pasir atau lumpur (Kadi, 1988).

H. macroloba umumnya tumbuh subur pada substrat berpasir dan pasir berlumpur. Pertumbuhannya di alam dapat berasosiasi bersama pertumbuhan lamun. Keberadaannya juga banyak dijumpai di paparan terumbu karang dengan kedalaman kurang 2 m, pertumbuhan tahan terhadap kekeringan yang bersifat sementara waktu (Kadi, 1988).

Adapun klasifikasi *Halimeda macroloba* menurut Decaisne (1841) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Chlorophyta
Kelas : Chlorophyceae
Ordo : Bryopsidales
Famili : Halimedaceae
Genus : *Halimeda*
Spesies : *Halimeda macroloba*

2. Pola sebaran Makroalga di pantai Punaga Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pantai Punaga Kabupaten Takalar telah ditemukan 15 spesies makroalga, dimana terdapat 3 kelas makroalga yaitu alga merah (Rhodophyceae), alga coklat (Phaeophyceae) dan alga hijau (Chlorophyceae). Pada kelas Rhodophyceae terdapat 8 spesies makroalga di antaranya *Tricleocarpa fragilis*, *Acanthophora spicifera*, *Botryocladia leptopoda*, *Halymenia durvillei*, *Halymenia floresia*, *Chondracanthus acicularis*, *Euचेuma spinosum* dan *Dermonema virens*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 4 spesies makroalga di antaranya *Padina boergesenii*, *Sargassum swartzii*, *Sargassum cinereum* dan *Sargassum polycystum*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 3 jenis spesies, yaitu *Codium geppiorum*, *Codium dwarkense* dan *Halimeda macroloba*.

Berdasarkan analisis data pada penelitian pola sebaran jenis makroalga, telah diperoleh nilai Indeks Morisita pada seluruh spesies yang ditemukan di perairan pantai Punaga adalah 12. Bila didasarkan pada klasifikasi Indeks Morisita (dalam Yusron, 2001) yaitu $I_d = 1$ (pola penyebaran acak/*random*), $I_d < 1$ (pola penyebaran merata/*uniform*) dan $I_d > 1$ (pola penyebaran berkelompok/*clumped*), maka pola sebaran semua jenis makroalga yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar adalah $I_d > 1$ (mengelompok). Hal ini disebabkan keadaan pantai yang masih alami, tidak begitu tercemar oleh aktivitas warga dan pengunjung di sekitar pantai tersebut.

Menurut Soegiarto dalam Suryanti (2004), tempat hidup yang baik bagi pertumbuhan makroalga adalah pecahan karang, karang mati, dan karang hidup karena memenuhi syarat substrat dasar keras untuk melekatkan dirinya, serta masih terjangkau oleh cahaya matahari, karena cahaya ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup makroalga dalam proses fotosintesis. Substrat dasar yang keras sebagai tempat hidup makroalga, dimanfaatkan sebagai tempat untuk melekatkan diri agar tidak hanyut oleh arus yang kuat. Namun, di lain pihak, arus yang cukup kuat diperlukan untuk mengalirkan mineral-mineral sehingga kebutuhan makroalga terpenuhi (Awaliah, 2017).

Menurut Jompa dalam Oktaviani (2002) pada substrat berupa karang mati lebih banyak ditemukan makroalga dibanding substrat karang hidup karena karang hidup memiliki lendir dan sel penguat yang pada proses awalnya dihuni oleh makroalga berbentuk tabung dan disusul kemudian oleh makroalga dalam bentuk atau

ukuran yang lebih besar. Menurut Aslan (1990), *Eucheuma spinosum* mempunyai habitat khas berupa daerah yang memperoleh aliran air laut yang tetap, variasi suhu yang kecil dan substrat pada batu karang mati.

Selain itu, para nelayan maupun masyarakat di sekitar pantai Punaga yang sumber pencahariannya dari rumput laut, hanya lebih mencari makroalga jenis spesies *Eucheuma spinosum* dan *Eucheuma denticulatum* karena jenis alga ini dimanfaatkan oleh masyarakat maupun para nelayan disana untuk menjualnya ke perusahaan ataupun mengekspornya ke luar daerah. Selain itu, masyarakat disana hanya mengetahui bahwa jenis alga *Eucheuma spinosum* yang memiliki lebih banyak manfaat dibanding jenis makroalga lainnya, selain bisa dijadikan bahan dasar agar-agar jenis alga ini pula bisa dijadikan olahan makanan. Namun, masyarakat maupun para nelayan di sekitar pantai Punaga masih belum mengetahui bahwa jenis alga coklat (Phaeophyceae) maupun alga hijau (Chlorophyceae) memiliki banyak manfaat pula. Jenis alga coklat maupun alga hijau juga bisa dijadikan bahan dasar agar-agar dan jenis alga coklat bisa dijadikan bahan untuk pembuatan antibiotik.

3. Pengamatan parameter lingkungan

a. Suhu

Berdasarkan hasil pengukuran suhu yang dilakukan di perairan pantai Punaga pada 4 stasiun penelitian memiliki kisaran yang sempit dan berfluktuasi tidak terlalu besar yakni dari 29°C sampai 31°C, dimana pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) yaitu 29°C, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman

warga) 31°C, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 30°C dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 31°C.

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses metabolisme dan penyebaran organisme. Kebanyakan organisme laut seperti makroalga mengalami adaptasi untuk hidup dan berkembang biak dalam kisaran suhu yang sempit dari kisaran total antara 0–40 °C (Nybakken, 1992). Cepatnya pertumbuhan makroalga diduga karena kondisi lingkungan suhu yang tinggi, sehingga dapat mempercepat aktivitas fotosintesis makroalga. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rusaknya enzim dan hancurnya mekanisme biokimiawi dalam talus makroalga. Sedangkan, secara fisiologis, suhu rendah dapat mengakibatkan aktifitas biokimia dalam talus berhenti. Menurut Luning (1990), suhu optimal untuk pertumbuhan makroalga di daerah tropis berkisar antara 15°C–30°C. Hutagalung (1988) menyatakan batas ambang suhu untuk pertumbuhan alga hijau, alga coklat dan alga merah adalah 34.5°C, sedangkan untuk alga biru 85°C (Ayhuan, 2017).

b. Salinitas

Hasil pengukuran salinitas yang dilakukan pada 4 stasiun penelitian yakni dari 35–42‰, dimana pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) yaitu 35‰, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) 40‰, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 37‰ dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 42‰. Salinitas merupakan ukuran bagi jumlah zat padat larut suatu volume air dan dinyatakan dalam permil, di perairan samudera salinitas biasanya

berkisar antara (34– 35‰). Distribusi salinitas di perairan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain penguapan, curah hujan, pola sirkulasi air, dan kandungan air tawar yang masuk ke perairan laut. Air tawar yang masuk ke perairan laut dapat berasal dari curah hujan atau aliran permukaan dan aliran sungai (Erina, 2006). Organisme perairan mempunyai toleransi yang berbeda-beda terhadap salinitas. Perubahan dapat mempengaruhi sifat fungsional dan struktur organisme, termasuk makroalga yang hidup di laut. Luning (1990) menyatakan bahwa kisaran salinitas yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan makroalga adalah 15–38‰ (Ahyuan, 2017).

Menurut Lobban dan Harrison (1994), apabila kisaran salinitas air laut telah melebihi kisaran hidup alga, maka pertumbuhan dan perkembangan sel alga berbanding linier dan terbalik (negatif) dengan kenaikan salinitas. Salinitas menurunkan laju pertumbuhan melalui pengurangan laju pembesaran sel pada bagian-bagian talus. Pengaruh salinitas tinggi terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur alga antara lain lebih kecilnya ukuran stomata, sehingga penyerapan hara dan air berkurang pada akhirnya menghambat pertumbuhan alga baik pada tingkat organ, jaringan maupun sel. Menurut Seob *et al.* (2010) alga akan mengalami pertumbuhan yang lambat, apabila salinitas terlalu rendah (kurang 15 ppt) atau terlalu tinggi (lebih 35 ppt) dari kisaran salinitas yang sesuai dengan syarat hidupnya hingga jangka waktu tertentu. Menurut Seob *et al.* (2010) perbedaan salinitas mempengaruhi mekanisme fisiologi dan biokimia, sebab proses perubahan tekanan osmosis berkaitan erat dengan peran membran sel dalam proses transpor nutrient (Awaliah, 2017).

c. Derajat keasaman (pH)

Hasil pengukuran pH yang dilakukan pada 4 stasiun penelitian yakni dari 7.39–7.69, dimana pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) yaitu 7.39, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) 7.4, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 7.63 dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 7.69. Derajat keasaman (pH) merupakan faktor lingkungan kimia air yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Nilai pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena berperan mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan dalam air. Nilai pH merupakan suatu ekspresi dari konsentrasi ion hydrogen (H^+) di dalam kolom air. Variasi pH umumnya bisa disebabkan oleh proses-proses kimia dan biologis yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat asam maupun alkalis. Variasi pH juga bisa disebabkan masukkan limbah yang bersifat asam atau alkalis dari daratan (Sanusi 2009).

Lunning (1990) menyatakan pertumbuhan makroalga yang baik tumbuh pada kisaran pH 6.8–9.6. Sementara Aslan (1998) mengemukakan nilai optimal untuk persyaratan lokasi budidaya rumput laut kisaran pH 7.5–8.0. Perubahan nilai pH dapat mempengaruhi keseimbangan kandungan karbon dioksida (CO_2) yang secara umum dapat membahayakan kehidupan biota air laut dari tingkat produktivitas primer perairan (Ahyuan, 2017). Derajat keasaman (pH) berkisaran 7.1–7.3 menandakan keadaan netral sedikit basah (Setyawan, 2015). Chapman (1962) dalam Supit (1989) menyatakan bahwa hampir seluruh alga menyukai kisaran pH 6.8–9.6 sehingga pH bukanlah masalah bagi pertumbuhannya. Selanjutnya Kylin (1927)

dalam Supit (1989) menemukan daya tahan alga laut yang tersebar yaitu pada pH 3.6-10. Namun menurut Rao dan Mehta (1973) dalam Supit (1989), ada alga laut yang memerlukan kondisi pH perairan yang khas baginya (Awaliah, 2017).

d. Oksigen terlarut (DO)

Hasil pengukuran pH yang dilakukan di perairan pantai Punaga pada stasiun I sampai stasiun IV diperoleh kisaran nilai DO yakni pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) berkisar 6.32 mg/l, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) 6.35 mg/l, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 6.40 mg/l dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 6.43 mg/l. Oksigen merupakan faktor yang paling penting bagi organisme air. Semua tumbuhan dan hewan yang hidup dalam air membutuhkan oksigen yang terlarut. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari udara dan hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang ada dalam air. Oksigen yang berasal dari hasil fotosintesis tergantung pada kerapatan tumbuh-tumbuhan air dan lama serta intensitas cahaya sampai ke badan air tersebut. Oksigen terlarut (DO) dalam air laut dapat berasal dari hasil difusi dari udara (proses aerasi) dan hasil proses fotosintesis di siang hari (Hutagalung & Rozak, 1997).

Atmadja (1996) menyatakan bahwa kisaran DO yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan makroalga yaitu >6 mg/l. Kadar pengukuran oksigen terlarut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, respirasi dan fotosintesis (Boyd, 1988). Dikatakan oleh Zottoli (1972) dalam jurnal Papilia (2013) bahwa konsentrasi DO air laut bervariasi, di laut lepas bisa mencapai 9.9 mg/l, sedangkan di wilayah pesisir konsentrasi DO akan semakin berkurang tergantung kepada kondisi

lingkungan sekitar. Konsentrasi DO di permukaan air laut dipengaruhi oleh suhu, semakin tinggi suhu maka kelarutan gas akan semakin rendah. Selanjutnya Brown (1978) dalam Effendi (2003) menyatakan bahwa peningkatan suhu sebesar 1°C dapat meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% (Armita, 2011).

e. Intensitas cahaya

Hasil pengamatan tingkat kecerahan yang dilakukan di perairan pantai Punaga dengan menggunakan secchi disc yaitu pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) berkisar 125 cm, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) 123 cm, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 131 cm dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 135 cm. Kecerahan air suatu perairan merupakan faktor yang penting untuk kehidupan biota dalam perairan air laut. Tingkat kecerahan air yang rendah dapat menurunkan nilai produktivitas perairan (Nybakken, 1992). Kecerahan perairan menentukan jumlah intensitas sinar matahari yang masuk ke suatu perairan. Kemampuan daya tembus sinar matahari ke perairan sangat ditentukan oleh warna perairan, kandungan bahan-bahan organik maupun anorganik yang tersuspensi di perairan, kepadatan plankton, jasad renik dan detritus (Wardoyo, 1981). Menurut Sulistijo dan Atmadja dalam Schaduw *et al.*, (2013), kecerahan air untuk aktivitas fotosintesis dari makroalga berkisar antara 0.6-5 meter atau dapat lebih.

f. Kecepatan arus

Menurut Hutabarat dan Evans (1986), arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang

sangat tinggi luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Di samping itu juga, arus adalah suatu gerakan air yang menyebabkan air permukaan berpindah secara horizontal (Nurkiama, 2015). Arus dan gelombang merupakan faktor pendukung pertumbuhan makroalga, karena gelombang memiliki pengaruh yang besar terhadap aerasi, transport nutrisi dan pengadukan air (Ahyuan, 2017). Hasil kecepatan arus di permukaan yang telah diukur berkisar (0,038–0.052 m/dtk). Nilai tersebut menandakan bahwa kecepatan arus di perairan pantai Punaga relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan angin sangat mempengaruhi kecepatan arus pantai Punaga, selain itu kecepatan arus di perairan pantai Punaga juga dipengaruhi oleh pasang surut.

Perairan yang agak tenang justru tidak baik bagi habitat makroalga, karena akan menyebabkan terjadinya akumulasi silt (endapan lumpur) dan epifit yang melekat sehingga menghambat pertumbuhan makroalga. Soegiarto *et al.* (2011) mengatakan semakin kuatnya arus maka pertumbuhan makroalga akan semakin cepat karena difusi nutrisi ke dalam sel tanaman makroalga semakin banyak sehingga metabolisme dipercepat, kisaran kecepatan arus yang baik dalam daerah areal budidaya rumput laut untuk pertumbuhan berkisar antara 0.2 m/d-0.35 m/d (Ahyuan, 2017).

g. Kekeruhan air

Hasil pengukuran kekeruhan di perairan pantai Punaga yang dilakukan pada 4 stasiun penelitian yakni dari 2.62–10.64 NTU, dimana pada stasiun I (substrat berbatu sekitar pemukiman warga) yaitu 10.63 NTU, stasiun II (substrat berpasir sekitar pemukiman warga) 10.64 NTU, stasiun III (substrat berbatu sekitar wisata pantai) 2.66 NTU dan stasiun IV (substrat berpasir sekitar wisata pantai) 2.62 NTU. Kekeruhan merupakan faktor pembatas bagi proses fotosintesis dan produksi primer karena mempengaruhi penetrasi cahaya dimana kekeruhan perairan merupakan gambaran sifat optik dari suatu media air yang ditentukan berdasarkan banyaknya sinar cahaya yang dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada dalam kolom perairan (Boyd, 1988).

Menurut Sutika (1989) dalam Armita (2011), mengatakan bahwa kekeruhan dapat mempengaruhi terjadinya gangguan respirasi, dapat menurunkan kadar oksigen dalam air dan terjadinya gangguan terhadap habitat. Menurut Walhi (2006) dalam Armita (2011), menyatakan bahwa kekeruhan standar untuk lingkungan makroalga sebesar 20 mg/l. Dari hasil pengamatan kekeruhan pada stasiun I dan II memperoleh kisaran 10.63–10.64 NTU, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan pada stasiun I dan II kurang optimal bagi pertumbuhan makroalga. Sedangkan pada stasiun III dan IV memperoleh kisaran 2.62–2.66 NTU hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan pada stasiun III dan IV optimal bagi pertumbuhan makroalga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pantai Punaga Kabupaten Takalar telah ditemukan 15 spesies makroalga, dimana terdapat 3 kelas makroalga yaitu alga merah (Rhodophyceae), alga coklat (Phaeophyceae) dan alga hijau (Chlorophyceae). Pada kelas Rhodophyceae terdapat 8 spesies makroalga di antaranya *Tricleocarpa fragilis*, *Acanthophora spicifera*, *Botryocladia leptopoda*, *Halymenia durvillei*, *Halymenia floresia*, *Chondracanthus acicularis*, *Eucheuma spinosum* dan *Dermonema virens*. Pada kelas Phaeophyceae terdapat 4 spesies makroalga di antaranya *Padina boergesenii*, *Sargassum swartzii*, *Sargassum cinereum* dan *Sargassum polycystum*. Sedangkan pada kelas Chlorophyceae terdapat 3 jenis spesies, yaitu *Codium geppiorum*, *Codium dwarkense* dan *Halimeda macroloba*.
2. Nilai Indeks Morisita pada seluruh spesies yang ditemukan di perairan pantai Punaga adalah 12, maka pola sebaran semua jenis makroalga yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di perairan pantai Punaga Kabupaten Takalar adalah $Id > 1$ (mengelompok).

B. *Saran*

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

Sebaiknya masyarakat maupun petugas yang berada di Pantai Punaga tetap menjaga kelestarian makroalga karena memiliki banyak manfaat yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat maupun pengunjung di Pantai Punaga sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan sekitar pantai agar tetap bisa menjadi tempat wisata yang nyaman bagi pengunjung.



KEPUSTAKAAN

- Afrianto, E., & Liviawati, E. *Budidaya Rumput Laut dan Cara Pengolahannya*. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1993.
- Al-Mahally, Imam Jalaluddin, & Imam Jalaluddin As-suyutti. *Tafsir Jalalain: Berikut Asbab An-nujulnya, Jilid I*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Anggadiredja, T., Zalnika, A., Heri, P., & Istini, S. *Rumput Laut*. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2009.
- Armita, D. *Analisis Perbandingan Kualitas Air di Daerah Budidaya Rumput Laut dengan Daerah tidak ada Budidaya Rumput Laut, di Dusun Melelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangara Bambang, Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.
- Aslan, L. *Budidaya Alga Laut*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 1998.
- Atmadja, W., Kadi, A., Sulistijo, & Rachmaniar. *Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Oseanologi LIPI, 1996.
- Awalia, R. *Biodiversitas Makroalga di Pantai Puntondo Kecamatan Mangara'bombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri, 2017.
- Ayhuan, H.C., Zamani, N.P., & Soedharma, D. "Analisis Struktur Komunitas Makroalga Ekonomis Penting di Perairan Intertidal Manokwari, Papua Barat (Structure Analysis of Makroalgae Community at Intertidal Coastal Area in Manokwari, West Papua)". Bogor: Teknologi Perikanan dan Kelautan, 2017.
- Azhari, S. "Bencana Air Karena Salah Urus". Indonesia: Jurnal Sositoknologi, 2007.
- Bhavanath, J., Reddy C., Thekur, M., & Rao, M. *Seaweeds of India. The Diversity and Distribution of Seaweed of the Gujarat Coast. Development in Applied Phycology*. New York: Springer Science Business Media, 2009.
- Boyd, C. *Water Quality in Pond for Aquaculture*. Amerika Serikat: Agricultural Experiment Station, Auburn University, 1988.
- Chang, S., Dai, C., & Chang, J. "A Taxonomic and Karyological Study of the *Codium geppiorum* Complex (Chlorophyta) in Southern Taiwan, including the Description of *Codium nanwanense* sp. nov.". Taiwan: Botanical Bulletin of Academia Sinica, 2002.

- Dewi, R., Sanjayasari, D., & Wijayanto. *Adaptasi Morfologi (Thallus dan Holdfast) Rumput Laut Dengan Variasi Substrat di Perairan Teluk Awur Kabupaten Jepara*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Sains dan Teknik UNSOED Purwokerto, 2012.
- Effendi, H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Egerod, L. "Marine Algae of the Andaman Sea Coast of Thailand: Chlorophyceae". Denmark: Botanica Marina, 1975.
- English, S., Wilkinson, C., Baker, V. *Survey Manual for Tropical Marine Resources 2nd Edition*. Townsville: Australian Institute of Marine Science. 1997.
- Erina, Y. *Keterkaitan antara Komposisi Perifiton pada Lamun *Enhalus azoroides* dengan Tipe Substrat Lumpur dan Pasir di Yeluk Banten*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Frianto, D., & Novriyanti, E. "Pola Penyebaran dan Potensi Kerapatan *Taxus sumatrana* di Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi (The Distribution Pattern and the Density Potential of *Taxus sumatrana* in Mount Tujuh, Kerinci District, Jambi)". Riau: Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman, 2016.
- Harvey, W. *Phycologia Australica, or a History of Australian Seaweeds*. London: L. Reeve & Co., Henrietta Street, Covent Garden, 1862.
- Hastuti, L. "Asal-usul Domestikasi Dalam Latar Belakang Ekologi". Sumatera Utara: Jurnal Ilmu Pertanian, 2007.
- Heddy, S. *Pengantar Ekologi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Hutabarat, S., & Evans, S. *Pengantar Oseanografi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Hutagalung, H. "Pengaruh Suhu terhadap Kehidupan Organisme Laut". Jakarta: Pewarta Oseana, 1988.
- Hutagalung, H., & Rozak, A. "Penentuan Kadar Oksigen Terlarut". Didalam: Hutagalung, H., Setiapermana, D., & Riyono H. *Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota. Buku 2*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI, 1997.
- Hommersand, M., Guiry, M., Fredericq, S., & Leister, G. "New Perspectives in the Taxonomy of the Gigartinales (Gigartinales, Rhodophyta)". Belgia: Kluwer Academic Publishers, 1993.
- Jumin, Hasan Basri. *Ekologi Tanaman*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Kantun, J., Sherwood, A., Rodriguez, R., Huisman, J., & Clerck, D. "Branched *Halymenia* Species (Halymeniaceae, Rhodophyta) in the Indo-Pacific Region, Including Descriptions of *Halymenia hawaiiiana* sp. nov. and *H. tondoana* sp. nov". Eropa: European Journal of Phycology, 2012.
- Kasim, M. *Makro Alga*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kusumaningrum, I., Hastuti, R., & Haryanti, S. "Pengaruh Perasan *Sargassum crassifolium* dengan Konsentrasi yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (*Glycine max* (L) Merrill)." Diponegoro: Buletin Anatomi dan Fisiologi, 2007.
- Langoy, M., Saroyo. Dapas, F., Katili, D., & Hamsir, S. "Deskripsi Alga Makro di Taman Wisata Alam Batuputih, Kota Bitung". Manado: Jurnal Ilmiah Sains, 2011.
- Lobban, C., & Harrison, P. *Seaweed Ecology and Physiology*. Inggris: Cambridge University Press, 1994.
- Luning, K. *Seaweeds Their Environment, Biogeography and Ecophysiology*. New York: John Wiley & Sons, 1990.
- Maghfiroh, Y. *Pengaruh Penggunaan Isopropanol dengan Konsentrasi yang Berbeda terhadap Nilai Rendemen Keraginan yang diekstraksi dari Rumput Laut Halymenia durvillei*. Skripsi. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2016.
- Mahatama, E., & Farid, M. "Daya Saing dan Saluran Pemasaran Rumput Laut: Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Seaweed Competitiveness and Marketing Channels: The Case of Jeneponto Regency, South Sulawesi). Jakarta Pusat: Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 2013.
- Mandal, F.B. 2012. *Invertebrates Zoology*. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2016.
- Manginsella, F., Salaki, M.S., Batangas, Y.K., Rangan, J.D., Lalita, & Lintang A. *Kepadatan Pola Penyebaran dan Keanekaragaman Rumput Laut di Pantai Kalasey, Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1991.
- Marianingsih, P., Amelia, E., & Suroto, T. "Inventarisasi dan Identifikasi Makroalga di Perairan Pulau Untung Jawa". Lampung: Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 2013.

- Meicy, M. “Inventarisasi Makroalga di Perairan Pesisir Pulau Menthage Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara”. Manado: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 2016.
- Michael, P.E. *Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Nurhadi, & Yanti, F. *Buku Ajar Taksonomi Invertebrata*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Nurkiama, L., Muzahar, & Idris, F. “Keanekaragaman dan Pola Sebaran Makroalga di Perairan Laut Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan”. Riau: Universitas Maritim, 2015.
- Nybakken, J. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis (Terjemahan Bangen D G, Koesoebiono dan Ediman H)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Resosoedarmo, S. *Pengantar Ekologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Soegiarto, A., Sulistijo, & Wanda, S. *Rumput Laut (Algae). Manfaat, Potensi dan Usaha Budidayanya*. Jakarta: Penerbit Lembaga Oseanologi Nasional, 2011.
- Oktaviani, D. *Distribusi Sapsial Makroalga di Perairan Kepulauan Spermonde*. Makassar: Jurusan Ilmu kelautan, Universitas Hasanuddin, 2002.
- Oryza, D., Mahanal, S., dan Sari, M.S. “Identifikasi Rhodophyta Sebagai Bahan Ajar di Perguruan Tinggi”. Malang: Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 2017.
- Palallo, A. *Distribusi Makroalga Pada Ekonomis Lamun dan Terumbu Karang di Pulau Bonebatang Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Barang Lompo*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Papalia S., & Hairati, A. “Produktivitas Biomassa Makroalga di Perairan Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan”. Bogor: Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, 2013.
- Parker, C. *Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Townsend. Scientific Description*. Australia: Flora Base, the Western Australian Flora, 2016.
- Pereira, L., Critchley, A., Amado, A., & Claro, P. “A Comparative Analysis of Phycocolloids Produced by Underutilized Versus Industrially Utilized Carrageenophytes (Gigartinales, Rhodophyta)”. Irlandia: Journal of Applied Phycology, 2009.
- Purwanti, Ani. “Optimasi Kondisi Proses Pengambilan Asam Alginat dari Alga Coklat”. Yogyakarta: Jurnal Teknologi Technoscientia, 2013.

- Sanusi, H., & Putranto, S. "Kimia Laut dan Pencemaran. Proses Fisik Kimia dan Interaksinya dengan Lingkungan. Edisi Pertama". Bogor: Penerbit Departemen 38 Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 2009.
- Schaduw, J., Ngangi, & Mudeng, J. "Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara". Manado: Aquatic Science & Management, Jurnal Ilmu dan Manajemen Perairan, 2013.
- Seob, C., Kang, E., Ju-Hyoung K., & Kwang, K. *Effect of Salinity on Growth and Nutrient Uptake of Ulva Pertusa (Chlorophyta) From and Eelgrass Bed*. Korea: Departement of Oceanography, Chonnam National University, Gwangju, 2010.
- Setiono, D. "Keberadaan Taman Nasional Baluran Terancam *Acacia nilotica* (Akasia Duri)". Jawa Timur: Jurnal Nasional Taman Baluran, 1999.
- Setyawan, I.B., Prihanta, W., & Purwanti, E. "Identifikasi Keanekaragaman dan Pola Penyebaran Makroalga di Daerah Pasang Surut Pantai Pidakan Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi". Malang: Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 2015.
- Shihab, M.Q. *Al-Lubab*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Sinyo, Y., & Nurita, S. *Studi Keanekaragaman Jenis Makroalga di Perairan Pantai Pulau Dofamuel Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Smedt, D., Clerck, D., Leliaert, F., Copejans, E., & Liao, M. "Morphology and Systematics of the Genus *Halymenia* C. Agardh (Halymeniales, Rhodophyta) in the Philipipines". Eropa: Nova Hedwigia, 2001.
- Suhendang, E. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor: Fakultas Kehutanan, 2002.
- Sumich, J.L. *Introduction to the Biology of Marine Life*. WM. C. New York: Brown Company Publisher, 1992.
- Supit, S. *Karakteristik Pertumbuhan dan kandungan Caragenan Rumput Laut (Eucheuma cattonii) yang berwarna Abu-abu Cokelat dan Hijau yang ditanam di Goba lambungan Pasir Pulau Pari*. Karya Ilmiah. Bogor: Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, 1989.
- Tampubolon, A. "Biodiversitas Alga Makro di Lagun Pulau Pasige, Kecamatan Tagulandang, Kapubaten Sitaro". Manado: Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 2013.
- Taufik, A. *Struktur Komunitas Makroalga di Perairan Pulau Lae-Lae Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

- Tjitrosoepomo, G. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Tseng, K. *Common Seaweed of China*. Beijing: Science Press, 1983.
- Umar, R. *Penuntun Praktikum Ekologi Umum*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.
- Vandenhede, C., & Coppejans, E. "The genus *Codium* (Chlorophyta, Codiales) from Kenya, Tanzania (Zanzibar) and the Seychelles". Eropa: Nova Hedwigia, 1996.
- Vashishta, B. *Botany for Degree Student (algae)*. New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 1984.
- Wardoyo, S. *Pengelolaan Kualitas Air. Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1981.
- Yanuhar, U. *Mikroalga Laut Nannochloropsis Oculata*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Yusron, Eddy. "Struktur Komunitas Teripang (Holothuroidea) di Rataan Terumbu Karang Perairan Pantai Morella Ambon. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi-LIPI, 2001.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap ST. Mardhatillah, lahir di Jeneponto, 30 Desember 1996. Memiliki nama panggilan Mardha. Beralamat lengkap di Borongtala, Kec. Arungkeke Pallantikang, Kab. Jeneponto. Beragama Islam. Merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan H. Mustafa A.Ma dan Hj. Sadriah Manronta.

Mengawali pendidikan di jenjang SD (Sekolah Dasar) pada tahun 2002-2008 yakni di SD Negeri 26 Arungkeke, dan Alhamdulillah lulus dalam waktu 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang ke lebih tinggi yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada tahun 2008-2011 yakni di SMP Negeri 1 Arungkeke. Kemudian ke jenjang yang lebih tinggi lagi di tahun 2011-2014 yakni di SMA Negeri 1 Batang. Kemudian secara resmi pada tahun 2014 lulus dari SMA dan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK), Jurusan Biologi dan *Alhamdulillah* hingga saat ini.

LAMPIRAN

Lampiran I. Jenis makroalga di perairan pantai Punaga

a. Alga merah (Rhodophyceae)



Gambar 1. *Tricleocarpa fragilis* (Linnaeus) Huisman & Townsend



Gambar 2. *Acanthophora spicifera* (Vahl) Børgesen



Gambar 3. *Botryocladia leptopoda* (J. Agardh) Kylin



Gambar 4. *Halymenia durvillei* C. A. Agardh



Gambar 5. *Halymenia floresia* (Clemente) C. Agardh



Gambar 6. *Chondracanthus acicularis* (Roth) Fredericq




Gambar 7. *Eucheuma spinosum* (C. Agardh) Dawson



Gambar 8. *Dermonema virens* (J. Agardh) Pedroche & Ávila Ortíz

b. Alga coklat (Phaeophyceae)



Gambar 1. *Padina boergesenii* Allender & Kraft



Gambar 2. *Sargassum swartzii* C. Agardh



Gambar 3. *Sargassum cinereum* J. G. Agardh



Gambar 4. *Sargassum polycystum* C. Agardh

c. Alga hijau (Chlorophyceae)



Gambar 1. *Codium geppiorum* O.C. Schmidt



Gambar 2. *Codium dwarkense* Børgesen



Gambar 3. *Halimeda macroloba* Decaisne

Lampiran II. Pola sebaran makroalga di pantai Punaga Kabupaten Takalar

Tabel 1 Pola sebaran makroalga di pantai Punaga Kabupaten Takalar

Kelas	Jenis	n	N	Σx^2	Id	Keterangan
Rhodophyceae	<i>Tricleocarpa fragilis</i>	12	13	169	12	Mengelompok
	<i>Acanthophora spicifera</i>	12	14	196	12	Mengelompok
	<i>Botryocladia leptopoda</i>	12	5	25	12	Mengelompok
	<i>Halymenia durvillei</i>	12	11	121	12	Mengelompok
	<i>Halymenia floresia</i>	12	4	16	12	Mengelompok
	<i>Chondracanthus acicularis</i>	12	52	2704	12	Mengelompok
	<i>Eucheuma spinosum</i>	12	4	16	12	Mengelompok
	<i>Dermonema virens</i>	12	73	5329	12	Mengelompok
Phaeophyceae	<i>Padina boergesenii</i>	12	26	676	12	Mengelompok
	<i>Sargassum swartzii</i>	12	18	324	12	Mengelompok
	<i>Sargassum cinereum</i>	12	8	64	12	Mengelompok
	<i>Sargassum polycystum</i>	12	2	4	12	Mengelompok
Chlorophyceae	<i>Codium geppiorum</i>	12	11	121	12	Mengelompok
	<i>Codium dwarkense</i>	12	10	100	12	Mengelompok
	<i>Halimeda macroloba</i>	12	4	16	12	Mengelompok

Analisis data pola sebaran makroalga di pantai Punaga Kabupaten Takalar dengan menggunakan rumus Indeks Morisita:

a. *Tricleocarpa fragilis*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(169 - 13)}{13(13 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 156}{13 \times 12}$$

$$I\delta = \frac{1872}{156}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

b. *Acanthophora spicifera*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(196 - 14)}{14(14 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 182}{14 \times 13}$$

$$I\delta = \frac{2184}{182}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

c. *Botryocladia leptopoda*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(25 - 5)}{5(5 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 20}{5 \times 4}$$

$$I\delta = \frac{240}{20}$$

d. *Halymenia durvillei*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(121 - 11)}{11(11 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 110}{11 \times 10}$$

$$I\delta = \frac{1320}{110}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

e. *Halymenia floresia*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N-1)}$$

$$I\delta = \frac{12(16 - 4)}{4(4 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 12}{4 \times 3}$$

$$I\delta = \frac{144}{12}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

f. *Chondracanthus acicularis*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N-1)}$$

$$I\delta = \frac{12(2704 - 52)}{52(52 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 2652}{52 \times 51}$$

$$I\delta = \frac{31824}{2652}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

f. *Eucheuma spinosum*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(16 - 4)}{4(4 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 12}{4 \times 3}$$

$$I\delta = \frac{144}{12}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

g. *Dermonema virens*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(16 - 4)}{4(4 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 12}{4 \times 3}$$

$$I\delta = \frac{144}{12}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

h. *Padina boergesinii*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(676 - 26)}{26(26 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 650}{26 \times 25}$$

$$I\delta = \frac{7800}{650}$$

i. *Sargassum swartzii*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(16 - 4)}{4(4 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 12}{4 \times 3}$$

$$I\delta = \frac{144}{12}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

$I\delta > 1$ (Mengelompok)

j. *Sargassum cinereum*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(64 - 8)}{8(8 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 56}{8 \times 7}$$

$$I\delta = \frac{672}{56}$$

$$I\delta = 12$$

$I\delta > 1$ (Mengelompok)

k. *Sargassum polycystum*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(4 - 2)}{2(2 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 2}{2 \times 1}$$

$$I\delta = \frac{24}{2}$$

$$I\delta = 12$$

$I\delta > 1$ (Mengelompok)

l. *Codium geppiorum*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(121 - 11)}{11(11 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 110}{11 \times 10}$$

$$I\delta = \frac{1320}{110}$$

m. *Sargassum dwarkense*

$$I\delta = \frac{n(\Sigma x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(100 - 10)}{10(10 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 90}{10 \times 9}$$

$$I\delta = \frac{1080}{90}$$

$$I\delta = 12$$

$I\delta > 1$ (Mengelompok)

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$

n. *Halimeda macroloba*

$$I\delta = \frac{n(\sum x^2 - N)}{N(N - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12(16 - 4)}{4(4 - 1)}$$

$$I\delta = \frac{12 \times 12}{4 \times 3}$$

$$I\delta = \frac{144}{12}$$

$$I\delta = 12$$

$$I\delta > 1 \text{ (Mengelompok)}$$



Lampiran III. Cek lokasi peneltian



Gambar 1. Lokasi penelitian sekitar pemukiman warga



Gambar 2. Lokasi penelitian sekitar wisata pantai

Lampiran IV: Lokasi penelitian



Gambar 1. Stasiun I (Substrat berbatu sekitar pemukiman warga)



Gambar 2. Stasiun II (Substrat berpasir sekitar pemukiman warga)



Gambar 3. Stasiun III (Substrat berbatu sekitar wisata pantai)



Gambar 4. Stasiun IV (Substrat berpasir sekitar wisata pantai)

Lampiran V. Proses pemasangan transek, plot, dan pengambilan sampel



Gambar 1. Proses pemasangan transek



Gambar 2. Proses pemasangan plot



Gambar 3. Proses pengambilan sampel

Lampiran VI. Proses pengukuran parameter lingkungan



Gambar 1. Pengukuran kecepatan arus



Gambar 2. Pengukuran pH dan kekeruhan air

Lampiran VII. Alat dan bahan



Gambar 1. Tali rapia



Gambar 2. Meteran



Gambar 3. Pisau



Gambar 4. Plot



Gambar 5. Secchi disc




Gambar 6. Layang-layang arus



Gambar 7. Penggaris



Gambar 8. Toples



Gambar 9. Termometer



Gambar 10. Salinometer



Gambar 11. Turbidimeter



Gambar 12. pH meter