

**SKRINING AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI KULIT BUAH DURIAN**

*(Durio zibhetinus M)*



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
**WA SINTA**  
NIM: 70100114081

**JURUSAN FARMASI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2018**

**SKRINING AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI KULIT BUAH DURIAN**

*(Durio zibhetinus M)*



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**WA SINTA**  
NIM: 70100114081  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**JURUSAN FARMASI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wa Sinta  
Nim : 70100114081  
Tempat/tgl.Lahir : Fakfak / 28 Agustus 1997  
Jur/prodi/konsentrasi : Farmasi  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No.36  
Judul : Skrining Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah  
Durian (*Durio zibhetinus M.*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Desember 2018

Penyusun



Wa Sinta

NIM: 70100114081

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Skrining Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah Durian (*Durio zibethinus M*)**” yang disusun oleh **Wa Sinta, Nim : 70100114081**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 16 November 2018 M yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 16 November 2018 M  
8 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si.,M.Si.,Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si.,M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc. MA.	(.....)

Diketahui oleh :  
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001



## KATA PENGANTAR

لَرَحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradap dan manusiawi. Skripsi dengan judul “**Skrining Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M*)**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Sembah sujud kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda Suriadi dan Ibunda Wa Nya juga adik kandung saya Hidayatserta kk saya Irfan Laabu dan Yamin Lakule. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasehat, kesabaran, dukungan sepenuhnya, baik berupa materi, semangat, dan doa restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga penulis berikan kepada keluarga besar yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang senantiasa memberikan restu dan do'anya kepada penulis sehingga

penulis dapat sampai menyelesaikan tahap penyelesaian pendidikan sampai disini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababasari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr. Mardan,M.Ag.,selaku Rektor Wakil I, Bapak Prof.H.Lomba sultan, M.A., selaku wakil Rektor II, Ibu Prof. Siti Aisyah,M.A.,Ph.D., selaku Wakil Rektor III, Bapak Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D, selaku wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku wakil Dekan I (Bidang Akademik), Ibu Dr. A. Susilawaty,S.Km.,M.Kes., selaku wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua jurusan serta pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt, selaku Sekertaris jurusan Farmasi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu luangnya untuk mengarahkan serta mengoreksi hal-hal yang

perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini, yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian.

8. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberi arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nurlaela Abbas, Lc. Ma., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Para Laboran Farmasi UIN Alauddin Makassar Kak Azwar Nazir, S.Farm., Apt. yang selalu sabar membimbing dan memberikan saran, Kak Sukri, S.Farm., Apt. yang telah memberikan arahan dalam penelitian penulis.
12. Keluarga besar GALENICA 2014, yang selama empat tahun terakhir telah mengukir banyak cerita, kisah yang tak akan habis untuk dikenang, tawa bersama, senang selalu, dukungan, nasehat, kebersamaan, kepedulian. Kalian luar biasa.
13. Teman-teman penelitianku di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Erni, Bajiah Fatima Mansyur, Risnawati Habra dan Nadia Fajri atas kerjasama yang sangat baik selama penelitian dan penyusunan tugas akhir.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semoga Allah SWT senantiasa memberi imbalan pahala yang berlipat ganda.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah SWT dan memberi manfaat bagi masyarakat. *Aamiin ya Rabbil aalamin.*

Samata-Gowa, Desember 2018

Penyusun,



**Wa Sinta**

70100114081



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<i>i</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<i>ii</i>
PENGESAHAN .....	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR .....	<i>iv</i>
DAFTAR ISI .....	<i>viii</i>
DAFTAR TABEL .....	<i>x</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xi</i>
DAFTAR GAMBAR .....	<i>xii</i>
ABSTRAK .....	<i>xiii</i>
ABSTRACT .....	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Uraian Tanaman .....	8
B. Uraian Mikroba Uji .....	11
C. Uraian Umum Antiakteri.....	12
D. Metode Sterilisasi.....	16
E. Ekstraksi Simplisia.....	18
F. Fraksinasi .....	22

G. Metode Pemisahan Secara KLT .....	23
F. KLT-Bioautografi.....	25
I. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Instrumen Penelitian .....	33
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Durian.....	38
2. Hasil Skrininh Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Durian Terhadap Bakteri Uji.....	38
3. Hasil Identifikasi KLT Ekstrak Metanol Kulit Buah Durian .....	39
4. Fraksinasi Ekstrak Kulit Buah Durian .....	39
5. Skrining Fraksinasi Metanol Kulit Buah Durian Terhadap Bakteri Uji....	40
6. Hasil Uji KLT- <i>Bioautografi</i> Fraksi Metanol Ekstrak Kulit Buah Durian Terhadap Bakteri Uji.....	40




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Penelitian.....	52
a. Maserasi Kulit Buah Durian.....	52
b. Pengujian Skrining Antibakteri .....	53
c. Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Kulit Buah Durian .....	55
d. KLT- <i>Bioautografi</i> .....	56
e. Identifikasi Senyawa Kimia.....	57
2. Perhitungan.....	58
3. Lampiran Gambar.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Buah Durian .....	8
2. Pengolahan Simplisia .....	59
3. Proses Ekstraksi.....	60
4. Hasil Ekstraksi .....	60
5. Proses Kromatografi Cair Vakum.....	61
6. Uji Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi.....	62
7. Hasil Uji Fraksi KLT- <i>Bioautografi</i> .....	62
8. Golongan Senyawa Yang Aktif .....	63



## ABSTRAK

Nama : Wa Sinta

Nim : 70100114081

Judul : Skrining Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah Durian (*Durio zibethinus* M)

---

Telah dilakukan penelitian tentang Skrining Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah Durian (*Durio zibethinus* M) Terhadap Bakteri *Escherhicia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penghambatan ekstrak kulit buah durian terhadap bakteri *Escherhicia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus*, untuk mengetahui fraksi yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherhicia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus* dan untuk mengetahui golongan senyawa yang paling aktif terhadap aktivitas antibakteri. Fraksi pada kulit buah durian (*Durio zibethinus* M) dilakukan dengan metode kromatografi cair vakum. Ekstrak etil asetat dan metanol memiliki aktivitas antibakteri ditandai dengan adanya zona hambat bening di daerah paper disk, untuk ekstrak n-heksan tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri. Adapun hasil daya hambat dari ekstrak etil asetat yaitu 17,13 mm yang bertanda kuat untuk bakteri *Escherhicia coli* dan daya hambat sedang 7,34 untuk bakteri *Staphylococcus aureus*. Sedangkan hasil daya hambat ekstrak metanol yaitu 15,11 mm yang berarti kuat untuk bakteri *Escherhicia coli* dan daya hambat kuat 11,45 mm untuk bakteri *Staphylococcus aureus*. Fraksi 2 memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* ditandai dengan adanya zona hambat bening di daerah piper disk, Sedangkan pada bakteri *Escherhicia coli* tidak ada fraksi yang menghambat. Adapun hasil daya hambat dari fraksi 2 yaitu 9,96 mm yang berarti sedang untuk bakteri *Staphylococcus aureus*. Pada hasil identifikasi Fraksinasi kulit buah Durian (*Durio zibethinus* M) menunjukkan bahwa yang berperan sebagai antibakteri yaitu senyawa Flavonoid dan Alkaloid.

**Kata kunci** : Kulit Buah durian, Kromatografi Cair Vakum, *Escherhicia coli*, *Staphylococcus aureus*

## ABSTRACT

Name : Wa Sinta

NIM : 70100114081

Title : Antibacterial Activity Screening of Durian Fruit Skin Fraction (*Durio zibethinus* M)

---

A screening study of antibacterial activity of *Durio zibethinus* M fraction on *Escherhicia coli* bacteria and *Staphylococcus aureus* bacteria has been carried out. This study aims to determine the inhibitory effect of durian peel extract on *Escherhicia coli* bacteria and *Staphylococcus aureus* bacteria, to determine the most active fraction in inhibiting the growth of *Escherhicia coli* bacteria and *Staphylococcus aureus* bacteria and to find out the most active class of compounds against antibacterial activity. The fraction on *Durio zibethinus* M was carried out by vacuum liquid chromatography method. Ethyl acetate and methanol extract have antibacterial activity characterized by the presence of clear inhibition zones in the paper disk area, for n-hexane extract does not have a inhibitory effect on bacteria. The results of the inhibition of ethyl acetate extract, which is 17.13 mm are strongly marked for *Escherichia coli* bacteria and moderate inhibitory capacity of 7.34 mm for *Staphylococcus aureus* bacteria. Whereas the inhibitory results of methanol extract were 15.11 mm which means that it is strong for *Escherichia coli* bacteria and strong inhibition power of 11.45 mm for *Staphylococcus aureus* bacteria. Fraction 2 has antibacterial activity in *Staphylococcus aureus* bacteria characterized by the presence of clear inhibition zones in the piper disk area, whereas in *Escherichia coli* bacteria there is no inhibiting fraction. The results of the inhibition of fraction 2 is 9.96 mm which means that it is medium for *Staphylococcus aureus* bacteria. On the results of identification fractionation of *Durio zibethinus* M fruit skin showed function as an antibacterial, namely the *Flavonoid* compound.

*Keywords: Durian Fruit Skin, Vacuum Liquid Chromatography, Escherhicia coli, Staphylococcus aureus*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Dalam dunia tumbuhan, flora di wilayah Indonesia termasuk bagian dari flora dari Malaysia yang diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia. Indonesia menempati urutan Negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat dan telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional (Kusmana dan Hikmat, 2015:187).

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin canggih tidak dapat menggeser peran obat tradisional. Selama ini, kita tidak sadar bahwa banyak tanaman yang mempunyai manfaat, baik berupa tanaman liar, gulma atau bahkan limbah sekalipun dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia (Fajar Hidayanto dkk, 2015:2).

Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangan-serangga, bakteri dan jamur. Setidaknya 12 ribu senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia, namun jumlah ini hanya 10% dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi dari seluruh tumbuhan obat (Hidayanto dkk, 2015:2).

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan protozoa (Mulyati, 2009: 1). Infeksi

merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia.

Berbagai obat anti-infeksi seperti antibiotik merupakan salah satu kelompok yang paling banyak dipilih. Timbulnya resistensi telah menyebabkan salah satu kelompok antibiotik tertentu tidak lagi digunakan dalam terapi, disisi lain harga antibiotik yang mahal menyebabkan masyarakat kalangan ekonomi lemah tidak mampu membelinya sehingga penggunaan berbagai tumbuhan dalam pengobatan penyakit infeksi dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia (Wibowo dkk, 2008:1).

Antibakteri yaitu zat yang membunuh maupun yang menekan pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Suatu zat antibakteri yang ideal harus memiliki sifat toksisitas selektif, artinya bahwa suatu obat berbahaya terhadap parasit tetapi tidak membahayakan tuan rumah. Zat bakteri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) dan antibakteri yang dapat membunuh bakteri (bakteriosid) (Tristiyanto, 2009: 30).

Penelitian antibakteri telah banyak dilakukan terutama dari berbagai jenis tanaman. Namun, para ilmuwan terus berusaha untuk mencari sumber antibakteri baru, tentunya tanaman yang mudah tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang digunakan untuk obat tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian antibakteri, karena pada umumnya memiliki senyawa aktif yang sangat berperan penting dalam bidang kesehatan. Penggunaan obat antibiotik semakin berkembang pesat seiring dengan banyaknya penggunaan antibiotik, Dari hal tersebut maka perlu digali antibakteri yang baru.

Durian adalah tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. Bagian tanaman yang dikonsumsi adalah bagian daging buahnya, Sedangkan yang tersisa adalah limbah kulit buah durian. Salah satu yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit infeksi adalah limbah kulit buah durian (*Durio Zibhetinus*M). Tanaman ini merupakan tanaman yang sangat diminati masyarakat. Menurut riset badan statistik pada tahun 2011, Indonesia mampu mencapai 1.818.949 ton untuk produksi durian. Dari segi struktur, durian terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian dari daging sekitar 20-30%, biji durian sekitar 5-15% dan bagian terbesar adalah kulit durian sekitar 60-75%. Pada saat musim durian, maka masalah lingkunganpun terjadi akibat dari limbah kulit buah durian yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis.

Menurut Setyowati (2014), juga dilaporkan bahwa ekstrak metanol kulit buah durian (*Durio zibethinus* M) positif mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, steroid dan terpenoid, hal ini membuktikan bahwa ekstrak metanol dapat mempunyai aktifitas antibakteri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian tentang skirining aktivitas antibakteri fraksi kulit buah durian (*Durio zibethinus*M). Sebagai antibakteri terhadap bakteri yang menginfeksi tubuh manusia yaitu *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ekstrak kulit buah durian (*Durio zibethinus*M) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*?

2. Fraksi apa yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* ?
3. Golongan senyawa kimia apa yang paling aktif sebagai antibakteri?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah durian (*Durio zibethinus*M) terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.
- b. Untuk mengetahui fraksi apa yang paling aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.
- c. Untuk mengetahui golongan senyawa yang paling aktif terhadap aktivitas antibakteri.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat ilmiah sebagai dasar penelitian mengenai pemanfaatan kulit buah durian (*Durio zibethinus*M) bahan alam yang berperan sebagai antibakteri.
- b. Manfaat praktis yaitu dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan tanaman kulit buah durian (*Durio zibethinus*M) sebagai antibakteri.

### **D. Defenisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, dengandemikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Antibakteri yaitu zat yang membunuh maupun yang menekan pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Suatu zat antibakteri yang ideal harus memiliki sifat toksisitas

- selektif, artinya bahwa suatu obat berbahaya terhadap parasit tetapi tidak membahayakan tuan rumah. Zat bakteri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) dan antibakteri yang dapat membunuh bakteri (bakteriosid)
- b. Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, virus) yang terdapat didalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi *biocidal agent* atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme.
  - c. Ekstraksi atau penyaringan merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, yang semula berada didalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik jika permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas.
  - d. Fraksi adalah suatu hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak yang dipisahkan dengan menggunakan kromatografi cair vakum.
  - e. Skrining adalah suatu upaya dalam menduga ciri-ciri suatu penyakit atau kelainan yang belum diketahui dengan cara menguji, memeriksa atau prosedur lain yang dapat dilakukan cepat.
  - f. Maserasi bertingkat adalah seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendapkan tuangkan dan peras, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini menggunakan kulit buah durian (*Durio zibethinus M*) sebagai sampel yang akan diekstraksi dan difraksinasi sehingga diperoleh hasil fraksi lalu

yang selanjutnya diujikan terhadap bakteri untuk melihat potensinya dalam menghambat bakteri.

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Dari penelitian Setyowati (2014) dengan judul “Skrining Fitokimia dan Identifikasi komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (*Durio zibethinus* M) Varietas Petruk. dilaporkan bahwa ekstrak metanol kulit buah durian (*Durio zibethinus* M) positif mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, steroid dan terpenoid. hal ini membuktikan bahwa ekstrak metanol kulit buah durian memiliki potensi sebagai antibakteri.
2. Kulit buah durian (*Durio Zibhetinus* M) memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti dilaporkan Juariah (2016) bahwa ekstrak kulit durian aktif terhadap jamur *Trichophyton mentagrophytes* (Juaria, 2016: 5).
3. Telah dilakukan penelitian oleh Wildan Nur Fadilla., dkk. 2015 dengan judul “Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri dengan Metode Bioautografi KLT Terhadap Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (*Colocasia Esculenta* (L.) Schott). Tentang senyawa-senyawa pada tangkai daun talas yang mempunyai aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode bioautografi. Dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan air.
4. Berdasarkan penelitian Duazo, Nero O dan Jing R Bautista dkk dengan judul penelitian “Crude Methanolic Extract Activity From Rinds And Seeds Of Native Durian (*Durio Zibethinus* M) Against *Eschericia coli* And *Staphylococcus aureus*” mendapatkan hasil bahwa ekstrak kasar methanol dari durian menunjukkan penghambatan pertumbuhan terhadap bakteri uji

*Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus* menggunakan metode difusi cakram Kirby-baur ditunjukkan dengan adanya zona penghambatan yang ditunjukkan oleh ekstrak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanolik durian memiliki aktivitas antibakteri terhadap dua patogen tersebut.

5. Berdasarkan penelitian Romadanu dan Siti Hanggita Rachmawati dkk dengan judul “Pengujian Aktivitas Antioksidan Ekstrak Bunga Lotus (*Nelumbo nucifera*)”mendapatkan hasil bahwa ekstrak metanol menunjukan hasil tertinggi dan memiliki kandungan tannin, Sedangkan ekstrak etil asetat dan n-heksan tidak menunjukan aktivitas antioksidan. Dengan menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan metanol.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tanaman

##### 1. Klasifikasi (Tjitrosoepomo, 2013:275-276)



**Gambar 1. Buah Durian (Foto pribadi)**

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Magnoliophyta

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Malvales

Family : Bombacaceae

Genus : Durio

Spesies : *Durio zibethinus* M

## 2. Nama daerah

*Durio zibethinus* Mdikenal di Indonesia dan dinegara lain dengan nama yang berbeda. Beberapa daerah misalnya, duren di (Jawa, Betawi, gayo), kadu di (Sunda, Banten), duriang di manado, duliang di Toraja dan rulen di pulau seram timur. Di Sumatera Selatan durian disebut dengan duhian, dikota Ambon dan kepulauan lease disebut doriang (Tirtawinata, 2016:8).

## 3. Morfologi

Durian sebagai tumbuhan dikotil memiliki perakaran diantaranya akar tunggang (primer) tumbuh tegak lurus dari batang utama ke bagian dalam tanah untuk menopang tegaknya tumbuhan dan akar sekunder tumbuh pada leher akar atau daerah perbatasan antara bagian di atas dan di bawah tanah sebagai pendukung berdirinya tanaman (Tirtawinata, 2016: 15) .

Batang durian umumnya berbentuk silindirs dan dapat mencapai tinggi 40 – 50 m dengan diameter batang lebih dari100 cm. pada bagian bawah batang tanaman dewasa yang berasal dari biji tumbuh banir-banir yang merupakan perkembangan lanjut dari akar sekunder yang berhubungan dengan batang. . (Tirtawinata, 2016: 7).

Daun durian merupakan daun tunggal yang tersusun berselang-seling pada sisi kiri dan kanan ranting. Ukurannya bervariasi mulai dari panjang 9-11 cm dan lebar 2-3 cm hingga yang besar mencapai panjang 17-20 cm dan lebar 4-5 cm. (Tirtawinata, 2016: 7).

Buah durian merupakan organ yang paling bervariasi mulai dari bulat, oval, lonjong, sampai tidak beraturan. Warna kulit buah umumnya hijau coklat. Bobot durian juga bervariasi umumnya 0,5 – 7 kg (Tirtawinata, 2016: 6).

#### 4. Kandungan Kimia

Berdasarkan jurnal “Skrining fitokimia dan identifikasi komponen utama ekstra methanol kulit durian (*Durio zibethinus* M)” ekstrak metanol kulit durian mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid dan tannin (Setyowati dkk, 2014: 9).

#### 5. Kegunaan

Dilaporkan menurut Hatta (2007) durian memiliki kulit buah yang keras dan tebal. Apabila dilihat dari karakteristik bentuk dan sifat-sifat kulitnya, sebenarnya banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari kulit buahnya misalnya untuk bahan campuran papan partikel, papan semen, arang briket, arang aktif, filler, campuran untuk bahan baku obat nyamuk dan lain-lain.

Sedangkan dengan laporan Nasril (2010) bagian kulit buah durian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pektin, yaitu pada bagian kulit dalam durian yang berwarna putih yang disebut juga dengan mesocarp. Kandungan pektin dalam kulit buah durian sebesar 2,56%.

Durian menimbulkan aroma yang sangat tajam dan masih tercium kuat pada tangan meskipun telah dicuci dengan berbagai macam sabun beberapa kali, ternyata ada resep sederhana dari aroma menyengat tersebut yang lebih efektif, yaitu dengan menggenangkan air pada cekungan kulit durian lalu mencuci tangan kita pada cekungan kulit durian, dengan melakukan hal tersebut dapat menghilangkan 95% aroma durian pada kulit tangan. Hal ini mengidentifikasi bahwa kulit durian mengandung senyawa antibakteri (Arlofa, 2015:1).

## **B. Uraian Mikroba Uji**

### **1. *Escherichia coli***

#### a. Klasifikasi (Murwani, 2017: 101)

Domain : Bacteria  
Filum : Proteobacteria  
Kelas : Gammaproteobacteria  
Bangsa : Enterobacteriales  
Suku : Enterobacteriaceae  
Marga : *Escherichia*  
Jenis : *Escherichia coli*

#### b. Sifat dan morfologi

*Escherichia coli* adalah bakteri Gram-negatif, bersifat anaerob fakultatif, berbentuk batang berukuran panjang sekitar 20  $\mu\text{m}$ , volume sel 0,6-0,7  $\mu\text{m}$ , tidak membentuk spora, dan motil dengan flagella peritrikus. E.coli mempunyai antigen permukaan: O antigen, merupakan bagian dari lapisan LPS; H antigen: flagellin; K antigen: kapsul (Murwani, 2017:101-102)

### **2. *Staphylococcus aureus***

#### a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-187)

Domain : Bacteria  
Filum : Firmicutes  
Kelas : Bacilli  
Bangsa : Bacillales  
Suku : Staphylococcaceae  
Marga : *Staphylococcus*

Jenis : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan morfologi

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu jenis peracun makanan yang sering terjadi. Sel bakteri *Staphylococcus aureus* berbentuk Gram positif tersusun dalam tandan khas. *Staphylococcus aureus* dapat tumbuh baik pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikroba lain yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe antigenik yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh *Staphylococcus aureus* tidak didalam tubuh tetapi nampak diluar tubuh, biasanya didalam tubuh dan bisul-bisul (Ali, 2005).

**C. Uraian Umum Antibakteri**

**1. Defenisi antibakteri**

Antibakteri adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi bakteri pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, preservatif.

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksit terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksit terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2006).

## **2. Sifat Antibakteri**

### **a. Bakteriostatik**

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah organisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang biak. Contoh sulfonamide, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin.

### **b. Bakteriosida**

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak. Contoh penisilin, sefalosporin, dan neomisin (Saskiawan, 2015:1108).

## **3. Prinsip Kerja Antibakteri**

Suatu antibakteri memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksis terhadap mikroorganisme (bakteri) dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme (bakteri) atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada biokimia penting dalam sel parasite lebih unggul dari pada pengaruhnya terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme (bakteri) berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Djide, M. Natsir & Sartini, 2008).

## **4. Mekanisme Antibakteri**

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (Syarif, 1995) :

### **a. Mengganggu metabolisme sel bakteri**

Antibakteri yang termasuk dalam golongan ini adalah sulfonamide, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS), dan sulfon yang memberikan efek bakteriostatik.

bakteri membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan mamalia yang mendapatkan asam folat dari luar, kuman patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari asam amino para benzoat (PABA). Apabila sulfonamid atau sulfon menang dalam persaingan dengan PABA untuk diikuti sertakan dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk analog asam folat yang nonfungsional. Akibatnya kehidupan mikroba akan terganggu.

Untuk dapat bekerja, dihidrofolat harus diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu asam tetrahidrofolat. Enzim dihidrofolat reduktase yang berperan disini dihambat oleh trimetoprim, sehingga asam dihidrofolat tidak dapat direduksi menjadi asam tetrahidrofolat yang fungsional.

PAS merupakan analog PABA, dan bekerja dengan menghambat sintesis asam folat pada *M. Tuberculosis*. Sulfonamid tidak efektif terhadap *M. Tuberculosis*, dan sebaliknya PAS tidak efektif terhadap bakteri yang sensitif terhadap sulfonamide. Perbedaan ini mungkin disebabkan perbedaan enzim untuk sintesis asam folat yang bersifat sangat khusus bagi masing-masing jenis bakteri.

#### b. Menghambat sintesis dinding sel bakteri

Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosponn, basitrasin, vankomisin, sikloserin. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida (glikopeptida). Sikloserin menghambat reaksi paling dini dalam proses sintesis dinding sel, diikuti berturut-turut basitrasin, vankomisin dan di akhiri oleh penisilindan sefalosponn, menghambat reaksi terakhir

(transpeptidasi) dalam rangkaian reaksi tersebut. Oleh karena tekanan dalam sel kuman lebih tinggi daripada di luar sel maka kerusakan dinding selnya akan menyebabkan lisis, yang merupakan dasar efek bakterisida pada kuman yang peka.

c. Mengganggu permeabilitas membrane sel bakteri

Obat yang termasuk kelompok ini adalah polimiksin, golongan polien serta berbagai antibakteri kemoterapeutik, umpamanya *surface aktif agen*. Polimiksin sebagai senyawa ammonium kuartener dapat merusak membrane sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membrane sel bakteri. Polimiksin tidak efektif terhadap kuman Gram Positif karena jumlah fosfor bakteri ini rendah. Kuman Gram positif yang menjadi resisten terhadap polimiksin, ternyata jumlah fosfornya menurun. Antibiotik polien bereaksi dengan struktur sterol yang terdapat dalam membran sel sehingga mempengaruhi permeabilitas selektif membran tersebut. Bakteri tidak sensitif terhadap antibiotik polien karena tidak memiliki struktur sterol pada membrane selnya. Antiseptik yang mengubah tegangan permukaan dapat merusak permeabilitas selektif dari membran sel mikroba. Kerusakan membrane sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain.

d. Menghambat sintesis protein sel bakteri dan

e. Menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel bakteri

### 5. Uji Efektivitas Anti Mikroba

Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi (pengenceran) atau dengan metode difusi (Pratiwi, 2008:191).

a. Metode Dilusi

Zat antibakteri dengan konsentrasi yang berbeda-beda dimasukkan pada media cair. Media tersebut langsung diinokulasi dengan bakteri dan diinkubasi. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi terkecil suatu zat antibakteri dapat dihambat pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Metode dilusi agar membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan sehingga jarang digunakan

#### b. Metode Difusi

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode ini adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteriyang terjadi akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri didalam media padat melalui pencadangan. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah jernih disekitar cakram. Luas daerah berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakteri maka semakin luas daerah hambatnya.

### **D. Metode Sterilisasi**

#### **1. Pengertian**

Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, *mycoplasma*, virus) yang terdapat didalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi *biocidal agentn* atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme (Pratiwi, 2008: 136).

#### **2. Sterilisasi**

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekani, fisik dan kimiawi (Djide, 2008:190-194) :

- a. Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik.
- b. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran :
  - 1) Pemijaran (dengan api langsung): membakar alat pada api secara langsung, Contoh alat: jarum inoculum, pinset.
  - 2) Panas kering: pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, sterilisasi dengan oven kira-kira  $160-180^{\circ}\text{C}$  selama 1,5-2 dengan system udara yang statis. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri.
  - 3) Uap air panas: konsep ini mirip dengan mengukus. Air mendidih ataupun uap air pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dapat membunuh bentuk vegetative dari mikroorganisme dan virus dalam waktu 5 menit. Masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.
  - 4) Uap air panas bertekanan: menggunakan autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit. Ini digunakan untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Cara ini dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang tidak tahan pemanasan seperti spuit.
  - 5) Radiasi: Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety cabinet dengan disinari lampu UV. Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan mempunyai aktivitas mutagenic pada sel-sel yang masih hidup.

Sinar Ultra Violet (UV) yang dipancarkan dari lampu uap merkuri sering digunakan untuk menyinari ruangan-ruangan tertentu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi mikroorganisme diudara dalam ruangan bedah dirumah sakit dan ruang pengolahan di pabrik-pabrik obat.

c. Sterilisasi secara kimiawi

Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya antara lain alkohol dan formalin.

## **E. Ekstraksi Simplisia**

### **1. Pengertian**

Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagi tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM, 1979: 30).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa dilakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 2014: 42).

Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa (analit) dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Prinsip ekstraksi adalah

pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan demikian pelarut yang digunakan harus mampu menarik komponen analit dari sampel secara maksimal (Leba, 2017: 1).

## **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi adalah untuk menyari semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat kedalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Mulyati,2009: 11).

## **3. Jenis-jenis Ekstraksi**

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dibagi kedalam dua cara yaitu (Enda, 2009: 23) :

a. Cara dingin, yaitu:

1) Maserasi adalah proses dimana bahan alam secara keseluruhan berupa serbuk kasar ditempatkan dalam wadah tertutup dan ditambahkan pelarut dalam wadah tertutup pada suhu kamar dalam jangka waktu minimal 3 hari dengan pergantian pelarut baru. campuran kemudian disaring dan dianginkan hingga diperoleh ekstrak kental (Handa dkk, 2008: 132).

Kelebihan ekstraksi ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat sederhana,dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kelemahannya adalah menggunakan banyak pelarut (Leba, 2017: 3).

Metode maserasi dapat dilakukan dengan modifikasi diantaranya (Irawan, 2010:11) :

a) Modifikasi maserasi digesti

Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40 – 50°C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan pada simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan diperoleh keuntungan diantaranya: kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan

Adapun kelemahan dari digesti adalah hanya dapat dilakukan pada simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.

b) Maserasi dengan mesin pengaduk

Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam. Kelebihannya yaitu maserasi dengan menggunakan alat (mesin). Kelemahannya yaitu sebaiknya maserasi diaduk sesekali.

c) Remaserasi

Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendapkan tuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Adapun kelebihan remaserasi yaitu alat yang digunakan sederhana. Kelemahannya yaitu menggunakan pelarut yang cukup banyak.

d) Maserasi melingkar

Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Kelebihan dari metode ini adalah cairan penyari akan didistribusikan secara seragam sehingga akan memperkecil kepekaan setempat dan waktu yang diperlukan lebih pendek.

Adapun kelemahan dari maserasi melingkar adalah penyarian tidak dapat digunakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi.

e) Maserasi melingkar bertingkat

Pada maserasi melingkar penyarian tidak dapat digunakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat yang akan didapatkan serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyarian dengan cairan penyari baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Kelebihannya yaitu mendapatkan pengekstrakkan sempurna.

2) Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan dilakukan pada temperature ruangan (kamar). Simplisia ditempatkan pada bejana silinder yang dibagian bawah diberi sekat berpori, cairan akan turun dan ditampung dalam wadah penampung.

b. Cara Panas, yaitu:

1) Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur pada titik didihnya, selama waktu tertentu dalam jumlah pelarut terbatas yang relative konstan dengan adanya pendingin balik.

2) Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan teknik ekstraksi kontinyu dengan pelarut-pelarut yang polaritasnya meningkat. Biomassa ditempatkan dalam wadah soxhlet yang dibuat dari kertas saring, melalui alat ini pelarut akan terus direfluks. Alat soxhlet akan mengosongkan isinya ke dalam labu dasar bulat setelah pelarut mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui pendingin refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomassa secara efektif

ditarik kedalam pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut (Heinrich dkk, 2010: 118).

3) Digesti adalah maserasi kinetic (dengan pengadukan kontinyu), pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50<sup>0</sup>C.

4) Infus adalah ekstraksi dengan air pada temperature penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperature terukur 96-98<sup>0</sup>C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama ( $\geq 30$  menit) dan temperature sampai titik didih air (Enda, 2009: 24).

#### **F. Fraksinasi**

Fraksinasi merupakan metode pemisahan campuran menjadi beberapa fraksi yang berbeda susunannya. Fraksinasi diperlukan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lainnya. Fraksinasi merupakan suatu prosedur pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kepolarannya. Metode pemisahan yang paling banyak digunakan adalah metode ekstraksi cair cair dan kromatografi biasanya menggunakan tiga pelarut yang berbeda kepolarannya yaitu n-hexan (nonpolar), etil asetat (semi polar) dan etanol (polar) (Fadlila, 2015: 586).

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam fraksinasi adalah Kromatografi Vakum Cair (KCV). Kromatografi cair merupakan jenis kromatografi yang menggunakan zat cair sebagai fase geraknya. Fase gerak yang digunakan dapat berupa satu jenis pelarut atau campuran dari dua pelarut dengan perbandingan tertentu. Fase diam yang digunakan adalah zat cair maupun zat padat.

Keuntungan KCV dibandingkan dengan yang lain adalah terletak pada jumlah fase gerak yang digunakan pada KCV, konsumsi fase gerak hanya 80% atau lebih sedikit dibandingkan dengan kromatografi lainnya. Prosedur kerja KCV menggunakan alat bantu yang berupa pompa vakum untuk mempercepat laju alir fase gerak selama proses pemindahan zat terlarut. Kolom kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Pompa vakum dihentikan dan pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan kembali. Kolom dihisap sampai kering dan telah siap dipakai. Cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok dimulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering dan setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu kromatografi vakum cair menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak .

Adapun tujuan fraksinasi pada penelitian ini adalah untuk menarik senyawa yang terkandung dalam sampel. Selain itu untuk menyederhanakan komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Dalam proses penyederhanaan ekstrak senyawa-senyawa dalam ekstrak akan terpisahkan oleh pelarut berdasarkan kepolarannya (Leba, 2017: 36).

#### ***G. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis***

Kromatografi yaitu pemisahan campuran senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan yang diletakkan pada permukaan fase pendukung. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan (Rubiyanto, 2017: 9).

Kromatografi lapis tipis adalah teknik kromatografi yang berdasar pada prinsip adsorpsi. Bedanya dengan kromatografi kolom yaitu konfigurasi KLT yang terbentuk planar (plate). Fase diam berupa padatan yang diaplikasikan berbentuk datar pada permukaan kaca atau aluminium sebagai penyangganya sedangkan fase gerak berupa zat cair seperti yang digunakan dalam kromatografi kolom dan kromatografi kertas (Rubiyanto, 2017: 26).

Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah (Leba, 2017: 44).

- a. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan
- b. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus
- c. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap

Setelah proses kromatografi berlangsung dilakukan identifikasi terhadap hasil kromatografi berdasarkan kedudukan noda terhadap permukaan pelarut yang dikenal dengan nilai  $R_f$ . Nilai  $R_f$  merupakan parameter karakteristik kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Harga ini merupakan kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram dan pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik.

$$R_f = \frac{\text{Jarak noda dari titik awal}}{\text{Jarak yang ditempuh pelarut dari titik awal}}$$

(Leba, 2017: 44).

Nilai  $R_f$  nilai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Rubiyanto, 2017: 38-39):

- a. Struktur kimia senyawa yang dipisahkan
- b. Sifat dari adsorben dan derajat aktivitasnya
- c. Tebal dan kerataan permukaan adsorben
- d. Kemurnian pelarut
- e. Derajat kejenuhan uap pelarut dalam bejana pengembang

- f. Temperatur
- g. Jumlah cuplikan

Kromatografi lapis tipis (KLT) memiliki beberapa kelebihan yaitu keserbagunaan, kecepatan dan kepekaannya. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk memisahkan golongan senyawa atau golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lainnya yang ditandai dengan adanya bercak noda pada plat lempeng KLT.

#### **H. KLT-Bioautografi**

Bioautografi termasuk dalam metode skrining mikrobiologis yang biasa digunakan untuk mendeteksi aktivitas antimikroba. Kelebihan bioautografi yaitu sederhana, murah, menghemat waktu dan tidak memerlukan peralatan canggih. Metode penyaringan bioautografi didasarkan pada aktivitas biologis misalnya antibakteri, antijamur, dan antiprotozoa dari zat yang diuji. Metode pendeteksian ini biasanya dikombinasikan dengan kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi lapis tipis berkinerja tinggi (HPLC) (Choma, 2011: 2684).

Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan pada metode difusi agar .dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan disekeliling dari spoit dari KLT yang telah ditempatkan pada media agar. Zona hambat ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Fadlila, 2015: 585) .

Fase diam yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30  $\mu m$ . Semakin kecil ukuran

rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam. Maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensinya dan resolusinya. Lapisan tipis yang digunakan sebagai penjerap juga dapat terbuat dari silika yang telah dimodifikasi. Salah satu keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan metode lain seperti difusi agar dan pengenceran adalah dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa yang kompleks, terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba, selain untuk pemisahan dan identifikasi. Kelebihan lainnya, metode bioautografi tersebut cepat, mudah untuk dilakukan, murah, hanya membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan akurat.

KLT-Bioautografi dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu (Djide, 2006: 307).

a. Bioautografi Langsung

Metode ini dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung diatas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu.

b. Bioautografi Kontak

Metode ini dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Lempeng kromatografi ini disemprotkan di atas permukaan medium nutrient agar yang telah

diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisa. Setelah 15-30 menit lempeng kromatografi kemudian dipindahkan dari permukaan medium. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari kromatogram ke dalam medium agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan tempat temperatur yang tepat, hingga noda yang menghambat tampak pada permukaan.

c. Bioautografi Pencelupan (Bioautografi Imersi)

Metode ini dimana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri yang telah dituang di atas lempeng kromatografi lapis tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah lempeng kromatografi yang telah dielusi diletakkan dalam cawan petri sehingga permukaan tertutupi oleh medium agar yang berfungsi sebagai based layer. Setelah medium agar memadat, selanjutnya dituang medium agar yang telah diinokulasi pada suhu dan waktu yang sesuai.

**I. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat**

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, *masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat* (Masood, 2009; 7).

Oleh karena itu Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan. Namun demikian perlu disadari bahwa bagaimanapun ahlinya seseorang

dalam pengobatan tetap Allah SWT yang Maha menyembuhkan Q.S. Asy Syu'ara:

80

يَشْفِينِ فَهُوَ مَرَضْتُ وَإِذَا

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan diriku” (Kementerian Agama RI, 2014: 370).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir al-Misbah volume 10 yang disusunnya, Ayat tersebut dijelaskan tentang penyembuhan kesemuanya tidak dapat dilakukan kecuali Allah SWT. Ini perlu ditekankan, apabila dihadapan mereka yang tidak mengakui keesaan Allah SWT.

Penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menemukan senyawa obat baru akan terus dilakukan. Hal ini didasarkan oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Ra. Dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ

اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga” (HR. Bukhari: 5246)


Hadist ini mengandung penegasan dan perintah bagi yang sakit untuk berobat serta penjelasan bahwa pengebotan adalah sebab kesembuhan, bahwa obat tidak lain hanyalah sebab yang diciptakan Allah SWT sebagai sarana untuk mendapatkan

kesembuhan dan sebagai media ikhtiar demi mematuhi sunnatullah atau hukum alam yang berlaku.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat Negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis bermanfaat bagi kesehatan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'ara:7:


  
 كَرِيمِ زَوْجِ كُلِّ مِّنْ فِيهَا أَنْبَتْنَا كَمَا الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ أَوْلَمَ

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik” (Kementerian Agama RI, 2014: 367).

Lebih lanjut disebutkan pula dalam al-Qur'an Q.S Al-An'am :99 yaitu:

تَامِنَهُ نُخْرَجُ خَضِرًا مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا شَيْءًا كُلِّ نَبَاتٍ بِهِ ۚ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلِ الَّذِي وَهُوَ  
تَبَهَا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ وَأَعْنَابٍ مِّنْ وَجَنَّتِ دَانِيَةً قِنَوَانٌ طَلَعَهَا مِنَ النَّخْلِ وَمِنْ مُتْرَاكِبًا حَبَّ  
يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَيَنْعِهِ ۚ أَثْمَرٌ إِذَا ثَمَرَهُ ۚ إِلَى أَنْظُرُوا مُتَشَبِهٍ وَغَيْرِ مُشَبَّهِ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2014: 140)

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir al-Misbah volume 3 yang disusunnya, Ayat ini masih merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah SWT. Ayat-ayat yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah SWT Maha Esa dan kehadiran Hari Kiamat adalah keniscayaan. Yang dipaparkan untuk diamati pada ayat-ayat yang lalu adalah hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji dan benih atau yang berkaitan dengan langit, serta dampak dan peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia asal usul dan kehadirannya di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selainnya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu kami, yakni Allah, mengeluarkan, menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu *tanaman yang menghijau*.

Tumbuhan yang bermacam-macam jenis dapat digunakan sebagai obat penyakit dan merupakan anugerah Allah SWT, karena Allah SWT tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan.

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tanaman kulit buah durian (*Durio ZibhetinusM*) sebagai antibakteri yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia.


Islam mengenalkan beberapa cara pengobatan dalam menyembuhkan penyakit, Di antaranya, penyembuhan dengan air, bekam, do'a, dan obat-obat tradisioanl. Manusia dapat hidup tanpa obat-obatan, akan tetapi, tidak seorang pun yang bisa hidup tanpa air, karena lebih dari setengah (75%) tubuh manusia berupa air. Apabila semua orang dapat menggunkan air dengan sebak-baiknya, maka jumlah penyakit dan kematian dapat di hindari.


Di samping itu, bahan-bahan tradisiaonal juga bisa digunakan sebagi obat, karena memang sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat dan biasa dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kunyit, temulawak, daun sirih, kayu manis, cengkeh, buah mengkudu dan lain sebagainya. Bahan-bahan seperti ini mudah ditanam sebagai tanaman obat keluarga yang memang dipersiapkan untuk anggota keluarga.

Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Bila ditinjau kembali tentang hukum mempelajari ilmu tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah bereksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu lainnya.

Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaannya. Diiringi keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah lah yang menjadikan semua itu. Oleh karena itu, mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat dengannya hukumnya mubah (Ar-Rumaikhon, 2008: 99).





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimental Laboratorium

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan aktivitas penghambatan sampel terhadap bakteri uji.

#### ***C. Instrumen Penelitian***

##### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan adalah seperangkat alat maserasi, autoklaf , cawan petri, cawan porselin, chamber, gelas Erlenmeyer 250 ml (*pyrex*) , beaker gelas 250 ml (*pyrex*), gelas ukur (*pyrex*) 5 ml , 10 ml dan 50 ml, inkubator, kompor, lampu spiritus, lampu UV 254 nm dan 366 nm, Laminary Air Flow (LAF), lemari pending (kulkas), mikropipet (*socorex*)1-10, 10-100, 100-1000  $\mu$ l, ose bulat, ose lurus, oven, penangas air, rotary evaporator, spoit, tabung reaksi (*pyrex*), timbangan analitik, water bath, vial, vortex mixer (*K*) dan blender.

##### **2. Bahan yang digunakan**

Bahan yang digunakan adalah air suling, biakan murni bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus*, DMSO (Dimetil sulfoksida), **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%**,

lempeng silica gel 60 GF<sub>254</sub>, medium Nutrient Agar (*ekstrak beef, proton, NaCl, aquadest, agar*), sampel ekstrak metanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan kulit buah durian.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

##### **1. Penyiapan sampel**

###### **a. Penyiapan Sampel**

Kulit buah durian bagian dalam (*Durio zibethinus M*) sebanyak 800 g.

###### **b. Pengolahan Sampel**

Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu kulit buah durian yang telah diambil disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Setelah proses sortasi basah, kulit buah durian dicuci dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir, proses pencucian juga membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit durian. Setelah proses pencucian, kulit di angina-anginkan di ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam kulit buah durian. Tujuan pengeringan kulit buah durian agar mengurangi kadar air dalam kulit, karena kadar air yang tinggi dapat membuat simplisia cepat rusak, selain itu mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada simplisia.

##### **2. Ekstraksi sampel**

Ekstraksi dari kulit lunak buah durian (*Durio zibethinus M*) dilakukan dengan metode maserasi bertingkat. Sampel yang telah kering ditimbang sebanyak 800 g dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan dengan n-heksan sampai sampel terendam keseluruhan dan ditutup rapat. Dibiarkan selama 1x24 jam sambil

diaduk sesekali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Filtratnya dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* sehingga mendapatkan ekstrak n-heksan, kemudian ampas yang diperoleh dimasukkan kembali ke dalam wadah maserasi. Dilakukan remaserasi sebanyak 2 kali. Hal yang sama pula dilakukan untuk pelarut etil asetat dan metanol.

### **3. Sterilisasi Alat**

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah maserasi dibersihkan dengan merendam menggunakan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat yang dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka, setelah kering, dibungkus dengan aluminium foil. Tabung reaksi dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180<sup>0</sup>C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121<sup>0</sup>C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung sehingga memijar.

### **4. Penyiapan Bakteri Uji**

Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini meliputi bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus*. Bakteri yang berasal dari kultur bakteri Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring yang diinkubasi selama 1×24 jam pada suhu 37<sup>0</sup>C.

## **5. Skrining Aktivitas Antibakteri**

### **a. Penyiapan Larutan uji 10%**

Sebanyak 1g ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO, kemudian dilarutkan dengan air steril hingga volume akhir 10 ml.

### **b. Uji Aktivitas Antibakteri**

Sebanyak 20 ml medium NA ditambahkan bakteri uji sebanyak 20  $\mu$ l. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Sampel ditetaskan diatas paper disk kemudian diletakkan diatas medium yang telah diinokulasi bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

## **6. Fraksinasi ekstrak metanol dengan Kromatografi Cair Vakum (KCV)**

Ekstrak metanol kulit buah durian yang memiliki aktivitas antibakteri yang paling besar ditimbang sebanyak 2 gram dan ditambahkan bubuk silika gel sebanyak 20 gram. Dilarutkan ekstrak aktif yang diperoleh yaitu ekstrak metanol dengan pelarut metanol secukupnya lalu ditambahkan sedikit demi sedikit bubuk silika gel sehingga ekstrak mengering seperti serbuk. Dimasukkan silika gel dan serbuk ekstrak ke dalam gelas kromatografi cair vakum (KCV) dan dimampatkan dengan pompa vakum kemudian dielusi dengan eluen yang pertama yaitu eluen tunggal etil asetat. Cairan pengelusi dibuat dengan gradient kepolaran yang meningkat berdasarkan profil KLT. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian dilihat profil KLT-nya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan nilai RF yang sama digabung menjadi satu kemudian dibuatkan konsentrasi 1000 ppm setelah itu di dapatkan fraksi teraktif lalu diuji aktivitas antibakteri dengan metode KLT-Bioautografi.

Adapun eluen yang digunakan pada proses fraksinasi ini adalah eluen etil asetat dan metanol. Pada proses ini menggunakan sebanyak 14 variasi eluen. Adapun variasi eluen yang digunakan dengan perbandingan eluen etil asetat 50 ml, eluen etil asetat : metanol 20:1 ,15:1 ,10:1 ,5:1 perlakuan dilakukan sebanyak dua kali ,1:1 ,1:5 ,1:10 dan metanol 50 ml sebanyak 2 kali

#### **7. Pengujian Antibakteri Hasil Fraksinasi Secara KLT-Bioautografi**

Sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA. campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan diatas permukaan medium yang memadat. Setelah 30 menit lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya diinkubasi selama 1×24 jam pada suhu 37°C. Setelah 24 jam dilakukan pengamatan dengan pengukuran zona hambat.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Hasil ekstrak Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M*)

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 800 gram simplisia kulit buah durian (*Durio zibhetinus M*) yang dimaserasi dengan menggunakan metode maserasi bertingkat dengan diperoleh ekstrak kering. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan metanol. Data dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 : Hasil ekstraksi Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M.*)

Sampel	Berat Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak (gram)	% Rendamen
Kulit Buah Durian	800 gram	n-heksan	1,3	0,163
		etil asetat	2,3	0,287
		metanol	16,35	2.043

#### 2. Hasil skrining aktivitas antibakteri ekstrak Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M.*)

Pada pengujian aktivitas antibakteri kulit buah durian (*Durio zibhetinus M*) dengan menggunakan ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak methanol terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Data dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2: Hasil skrining aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah durian (*Durio zibhetinus M*) terhadap bakteri uji

Ekstrak	Bakteri	Konsentrasi	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 3 (mm)	Rata-rata
n-heksan	EC	10%	-	-	-	-
	SA	10%	-	-	-	-
Etil asetat	EC	10%	25,4	13,3	12,71	17,13
	SA	10%	7,45	8,12	6,45	7,34
Metanol	EC	10%	19	11,33	15	15,11
	SA	10%	11,23	11,56	11,56	11,45

Keterangan : EC = *Escherichia coli*  
SA = *Staphylococcus aureus*

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol yang akan dilanjutkan sebagai pengujian fraksinasi dengan metode Kromatografi Cair Vakum.

### 3. Identifikasi KLT

Tabel 3. Hasil identifikasi KLT ekstrak metanol kulit buah durian (*Durio zibhetinus M*)

Ekstrak	UV 254 nm		UV 366 nm		Perbandingan
	Noda	Rf	Noda	Rf	
Metanol	1	0,7	1	0,69	Metanol : Etil 7 : 3
	2	0,96	2	0,92	

### 4. Hasil Fraksi Ekstrak Metanol melalui Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Fraksinasi ekstrak metanol kulit buah durian (*Durio zibhetinus M*) melalui kromatografi cair vakum menggunakan campuran perbandingan eluen hasil profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil kromatografi cair vakum, diperoleh 14 hasil fraksi dengan bobot berbeda-beda (lihat pada tabel 4), kemudian dielusi dengan campuran eluen Metanol : Etil sehingga diperoleh 4 gabungan fraksi yang sama melalui penandaan bercak lampu UV 254 nm dan UV 366 nm.

Tabel 4. Fraksinasi kulit buah Durian (*Durio zibhetinus M*)

No	Fraksi	Mangkok	Berat (gram)
1	F1	1-2	4,3
2	F2	3-9	0,5
3	F3	10-12	0,9
4	F4	13-14	0,09

### 5. Pengujian skrining Aktivitas Hasil Fraksi

Pengujian skrining aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dengan mengamati zona bening. Hasil fraksinasi dilakukan pengujian terhadap bakteri *Escherichia coli* dan bakteri *Staphylococcus aureus*. Diperoleh bahwa hasil dari gabungan fraksi tersebut, fraksi yang memberikan aktivitas antibakteri yang paling baik dibandingkan dengan fraksi lain dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Skrining Fraksinasi Metanol Ekstrak Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M*) Terhadap Bakteri Uji.

Fraksi	Bakteri	Konsentrasi (ppm)	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 3 (mm)	Rata-rata
Fraksi 1	EC	1000	-	-	-	-
	SA	1000	7,8	8,24	8,42	8,15
Fraksi 2	EC	1000	-	-	-	-
	SA	1000	12,34	8,42	9,12	9,96
Fraksi 3	EC	1000	-	-	-	-
	SA	1000	8,12	8,93	7,45	8,16
Fraksi 4	EC	1000	-	-	-	-
	SA	1000	8,23	7,63	7,83	7,89

Keterangan : EC = *Escherichia coli*  
SA = *Staphylococcus aureus*

## 6. Hasil uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Senyawa

Lempeng Kromatografi Fraksi 2 kemudian diuji dengan KLT-Bioautografi kontak pada 1 bakteri uji (*Staphylococcus aureus*). Hasil pengujian menunjukkan fraksi 2 mampu menghambat pertumbuhan dari satu bakteri yang ditandai dengan adanya zona hambat bening pada area sekitar noda pada lempeng yang diinokulasi pada medium. Fraksi paling efektif kemudian diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan pereaksi warna semprot Lieberman buhardat, Dragendorf, Besi (III) klorida, Aluminium klorida, dan penampakan bercak H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Hasil dapat dilihat pada table 6.

Tabel 6. Hasil uji KLT-Bioautografi fraksi Metanol Kulit Buah Durian (*Durio zibhetinus M*) Terhadap bakteri uji.

Bakteri	Pereaksi	Senyawa	Rf
<i>Staphylococcus aureus</i>	AlCl <sub>3</sub>	Flavonoid	0,92

## B. Pembahasan

Antibakteri yaitu zat yang membunuh maupun yang menekan pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Suatu zat antibakteri yang ideal harus memiliki sifat toksisitas selektif, artinya bahwa suatu obat berbahaya terhadap parasit tetapi tidak membahayakan tuan rumah. Zat bakteri dibagi menjadi dua kelompok yaitu antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) dan antibakteri yang dapat membunuh bakteri (bakteriosid) (Tristiyanto, 2009:30).

Sebelum dilakukan penyarian dan maserasi, terlebih dahulu kulit buah durian yang diambil dilakukan sortasi basah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari simplisia. Setelah proses sortasi basah, kemudian kulit durian dicuci dengan air yang bersih dan mengalir untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada simplisia. Setelah proses pencucian, kemudian kulit buah durian dikeringkan dengan diangin-anginkan pada tempat yang terlindungi dari sinar matahari hingga kadar air yang terkandung pada sampel berkurang karena dapat merusak zat aktif. Selain itu, dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kulit yang telah kering di buat serbuk untuk memperluas permukaan, sehingga pada proses ekstraksi, penarikan senyawa lebih efektif.

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, yang semula berada didalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Metode ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam hal ini maserasi bertingkat. Maserasi bertingkat bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki tingkat kepolaran berbeda.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 800 gram maserasi dengan sampel dipotong-potong kecil lalu di blander kemudian dimasukkan kedalam 2 toples yang

berukuran 3 liter kemudian ditambahkan pelarut 5 liter untuk 2 toples dengan waktu  $1 \times 24$  jam dengan diaduk sesekali. Pisahkan ampas dengan filtrat pada proses penyarian. Filtrat yang diperoleh dipisahkan menggunakan rotavapor sehingga diperoleh ekstrak kental. Tujuan pemakaian rotary evaporator adalah memekatkan konsentrasi larutan sehingga akan didapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Akan diperoleh ekstrak yang kental. Kemudian ampas direndam kembali menggunakan pelarut yang sama hasil dari rotavapor, perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan remaserasi, tujuan dari remaserasi adalah untuk memisahkan dan menarik senyawa yang terkandung dalam sampel. Senyawa yang ditarik adalah senyawa yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Ketika hanya dilakukan satu kali maserasi ditakutkan masih ada senyawa yang tertinggal oleh karena itu dilakukan remaserasi. Proses yang sama dilakukan pula untuk pelarut etil asetat dan metanol.

Pada tahap pertama maserasi digunakan pelarut yang bersifat non polar yaitu pelarut n-heksan tujuannya untuk menarik senyawa yang bersifat non polar. Pemakaian pelarut pada tahapan kedua yaitu menggunakan etil asetat tujuannya untuk menarik senyawa yang tidak tertarik oleh pelarut pertama. Etil asetat dapat menarik senyawa yang bersifat semi polar. Pada tahapan ketiga maserasi digunakan pelarut metanol tujuannya untuk menarik senyawa yang bersifat polar. Dapat dikatakan senyawa telah tertarik dalam sampel ditandai dengan sampel sudah jernih ketika diberi pelarut.

Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak n-heksan 1,3 gram, ekstrak etil asetat 2,3 gram, dan ekstrak metanol 16,35 gram. Adapun persen

rendamen yang diperoleh yaitu pada ekstrak n-heksan 0,163 %, ekstrak etil asetat 0,287 %, dan ekstrak metanol 2.043%.

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji penapisan atau skrining aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol kemudian diujikan pada bakteri *Escherichis coli* dan *Staphylococcus aureus*. Inokulasi adalah perpindahan bakteri dari medium satu ke medium lain. Tujuan skrining antibakteri ini adalah untuk melihat bakteri apa saja yang dapat dihambat oleh ekstrak. Adapun alasan pemilihan bakteri yaitu menggunakan bakteri gram positif dan bakteri gram negative untuk mengetahui efektivitas ekstrak dalam menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki membran plasma tunggal dan 90% peptidoglikan. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki membrane ganda dan dinding selnya tebal. Maka dari itu ingin dilihat bagaimana aktivitas ekstrak terhadap bakteri. Selain itu bakteri yang digunakan adalah bakteri yang terdapat di sekeliling kita.

Bakteri *Eschericia coli* dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan diantaranya sakit perut dan diare sedangkan *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan jerawat, bisul, dan pneumonia (Pelczar, 2008: 930-956).

Pengujian penapisan dilakukan untuk mengetahui ekstrak paling aktif diantara ketiga ekstrak tersebut diantaranya ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol dengan cara mengamati zona hambat atau zona bening disekitaran *paper disk* dengan konsentrsi 10%.

DMSO (Dimetil Sulfoxida) merupakan salah satu pelarut sampel yang dapat melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun maupun non-polar. Selain itu,

DMSO tidak memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri (Lestari, 2016: 4).

Zona hambat atau bening menandakan bahwa bakteri memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Menurut David dan Stout (1971) ketentuan besarnya zona hambat antibakteri adalah sebagai berikut: daerah hambatan 20 mm atau lebih berarti sangat kuat, daerah hambatan 10 - 20 mm berarti kuat, 5 - 10 mm berarti sedang dan daerah hambatan 5 mm atau kurang berarti lemah.

Hasil yang diperoleh pada uji skrining antibakteri yaitu ekstrak metanol dengan daerah zona hambat yakni pada bakteri *Staphylococcus aureus* (11,45 mm) yang berarti kuat dan bakteri *Eschericia coli* (15,11 mm) yang berarti kuat, untuk ekstrak etil asetat *Staphylococcus aureus* (7,34 mm) yang berarti sedang dan *Eschericia coli* (17,13 mm) yang berarti kuat. Untuk ekstrak n-heksan tidak memiliki daya hambat terhadap aktivitas antibakteri.

Ekstrak metanol memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak n-heksan dan etil asetat, karena pelarut metanol mampu menarik senyawa-senyawa polar seperti yang dijelaskan pada jurnal "Skrining fitokimia dan identifikasi utama ekstrak metanol kulit durian (*Durio zibethinus M*)", bahwa ekstrak metanol mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan steroid, ini dapat berfungsi sebagai antibakteri. Jika dibandingkan dengan kedua pelarut lainnya ekstrak metanol memiliki persen rendamen yang lebih besar pula, ini membuktikan bahwa pelarut metanol mampu menarik lebih banyak senyawa.

Setelah diperoleh hasil demikian kemudian dilanjutkan ke tahap fraksinasi. Fraksinasi adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Fraksinasi yang

dilakukan menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV) yang dimana fase diam adalah silika gel GF254 dan fase gerak yang merupakan eluen dengan gradient kepolaran. Adapun kelebihan dari kromatografi cair vakum yaitu alatnya lebih sederhana, mudah jika dibandingkan dengan kromatografi kolom. Adapun profil KLT ekstrak metanol yang digunakan yaitu dengan perbandingan eluen metanol : etil asetat (7:3) yang diperoleh sebelumnya. Kemudian dilakukan penggabungan noda yang sama berdasarkan jarak noda dan warna yang sama. Hasil yang diperoleh pada fraksinasi ini adalah didapatkan empat penggabungan noda yang sama. Diantaranya disebut sebagai fraksi 1, 2, 3 dan 4. Kemudian, keempat fraksi ini di ujikan pada bakteri uji dengan konsentrasi 1000 ppm. Pada uji ini menggunakan bakteri *Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Alasan penggunaan 2 jenis bakteri yaitu untuk mewakili bakteri gram positif dan bakteri negatif.

Adapun hasil yang diperoleh untuk kekuatan penghambatan bakteri *Staphylococcus aureus* yaitu fraksi 1 (8,15 mm) yang berarti sedang, fraksi 2 (9,96 mm) yang berarti sedang, fraksi 3 (8,16 mm) yang berarti sedang, fraksi 4 (7,89 mm) yang berarti sedang, sedangkan pengujian pada bakteri *Eschericia coli* yaitu fraksi 1, 2, 3 dan 4 negatif.

Fraksi yang paling aktif berdasarkan besarnya penghambatan dalam menghambat bakteri *Staphylococcus aureus* adalah fraksi 2. Pada hasil uji aktivitas fraksi dapat dilihat dari besarnya daya hambat terhadap bakteri tersebut.

Selanjutnya dilanjutkan kemetode KLT Bioautografi. KLT merupakan suatu teknik pemisahan dengan menggunakan adsorben (fase stasioner) berupa lapisan tipis yang disalutkan pada permukaan bidang datar berupa lempeng kaca, plat aluminium atau plat plastik. Bioautografi adalah suatu metode pendekatan untuk menemukan

suatu senyawa antibakteri yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisasi aktivitas antibakteri tersebut pada suatu kromatogram (Choma, 2015:2684).

Pengembangan kromatografi terjadi ketika fase gerak tertapis melewati adsorben. Metode ini didasarkan pada difusi agar dimana senyawa antibakteri akan berdifusi dari lapisan lempeng kromatografi ke medium agar yang masing – masing telah diinokulasi dengan bakteri uji. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram ke media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri dan membentuk zona hambat bening pada medium agar setelah diinokulasi selama  $1 \times 24$  jam.

Adapun fraksi yang dilanjutkan disini yaitu fraksi 2 dengan menggunakan eluen metanol : etil asetat (7:3) pada pengerjaan metode KLT Bioautografi bagian ujung lempeng kromatogram yang telah dilusi dibengkokkan hingga garis batas bawah, hal ini dilakukan untuk memudahkan pada saat menempelkan lempeng pada medium ataupun saat lempeng dikeluarkan. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatogram diangkat dari permukaan medium kemudian diinokulasi selama  $1 \times 24$  jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ .

Hasil yang diperoleh pada KLT Bioautografi yaitu pada bakteri *Staphylococcus aureus* fraksi 2 (RF 0,92) . penghambatan bakteri ini ditandai dengan adanya zona bening pada cawan petri yang telah ditempelkan dengan lempeng KLT yang telah dototol sebelumnya. Adapun fungsi nilai Rf (*Retention factor*) adalah menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam sehingga juga disebut faktor retensi.

Selanjutnya dilakukan identifikasi senyawa dengan bantuan pereaksi penampak bercak. Penampak bercak di sini bertujuan untuk mengidentifikasi

senyawa yang terdapat dalam kromatogram hasil elusi KLT yang memiliki aktifitas antibakteri dengan melihat perubahan warna dari bercak noda pada kromatogram.

Penampak bercak  $H_2SO_4$  menandakan warnah coklat kehitaman pada kromotogram yang menandakan positif. Pereaksi *Liebermen Buchard* memberikan warnah noda cokelat berfluorosensi yang menandakan positif triterpenoid. Pereaksi kalium hidroksida tidak memberikan perubahan warnah noda menjadi merah maka dikatakan negatif. Pereaksi Aluminium Klorida ( $AlCl_3$ ) memberikan warnah noda berfluorosensi kuning menandakan positif mengandung flavonoid. Pereaksi Besi (III) klorida ( $FeCl_3$ ) memberikan warnah hijau hingga biru menandakan positif mengandung fenol. Pereaksi dragendorf tidak menandakan adanya noda berwarnah kuning dengan latar jingga sehingga negatif.

Hasil yang diperoleh pada uji identifikasi golongan senyawa yaitu fraksi 2 mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid.

Adapun mekanisme flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Selain berperan dalam inhibisi pada sintesis DNA-RNA dengan interkalasi atau ikatan hydrogen dengan penumpukan basa asam nukleat, flavonoid juga berperan dalam menghambat metabolisme energi dengan cara yang mirip dengan menghambat system respirasi. Karena dibutuhkan energy yang cukup untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul (Ngajow, 2013:131).

Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Selain itu

didalam senyawa alkaloid terdapat gugus basa yang mengandung nitrogen akan bereaksi dengan senyawa asam amino yang menyusun dinding sel bakteri dan DNA bakteri. Reaksi ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan susunan asam amino yang akan menimbulkan perubahan keseimbangan genetic pada rantai DNA sehingga akan mengalami kerusakan dan mendorong terjadinya lisis bakteri yang akan menyebabkan kematian sel pada bakteri (Arlofa nina, 2015:20).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol dari kulit buah durian memiliki aktivitas antibakteri dengan diameter zona daya hambat dari ekstrak etil asetat yaitu 17,13 mm untuk bakteri *Eschericia coli* dan 7,34 mm untuk bakteri *Staphylococcus aureus*. Sedangkan hasil daya hambat ekstrak metanol yaitu 15,11 mm untuk bakteri *Eschericia coli* dan 11,45 mm untuk bakteri *Staphylococcus aureus*.
2. Fraksi 2 memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus*, Tetapi tidak pada bakteri *Eschericia coli*. Adapun hasil daya hambat dari fraksi 2 yaitu 9,96 mm untuk bakteri *Staphylococcus aureus*.
3. Pada hasil identifikasi Fraksinasi kulit buah Durian (*Durio zibethunus M*) menunjukkan bahwa yang berperan sebagai antibakteri yaitu senyawa Flavonoid dan alkaloid.


#### **B. Saran**

Disarankan untuk para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isolasi metabolit sekunder fraksi metanol Kulit Buah Durian (*Durio zibethinus M*) dan penerapannya dalam bentuk sediaan.

## DAFTAR PUSTAKA


- Ali, A. 2005. *Mikrobiologi Dasar Jilid I*. Jurusan Biologi UNM. Makassar
- Choma, Irena M dan Grzelak Edyta M. 2011. *Bioautography detection in thin-layer Chromatography*. Curie-Skłodowska University. Lublin: Poland A.
- Dirjen POM. 1997. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen POM. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Djide, M.N, Sartini. 2006. *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Djide, M. Natsir, dkk. 2008. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Eko Setyowati, Widiastuti Agustina, dkk. 2014. *Skrining Fitokimia dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (Durio zibenhinus Murr)*. Surakarta: Pmipa Fkip Uns.
- Fadlila, Wildan Nur dan Kiki Mulkiya, Livia Syafnir. 2015. *Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri Dengan Metode Bioautografi Klt Terhadap Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (Colocasia Esculenta. L) Schott*. Bandung: Unisba ISSN 2460-6472.
- Garrity, G. M., Bell. J.A dan Liburn. T. G. 2004. *Taxonomic Outline of The prokaryotes Bergey's Manual Of Systematic Bacteriologi, 2th Edition*. United States of America, Springer: New York Berlin Hendelberg.
- Hidayanto, Fajar, dkk. 2015. *Tanaman Herbal Sebagai Tanaman Hias Dan Tanaman Obat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia ISSN 2089-3086.
- Irawan, Bambang. 2010. *Peningkatan Mutu Minyak Niam Dengan Ekstraksi Dan Destilasi Pada Berbagai Komposisi Pelarut*. Tesis. Semarang: Universitas diponegoro.
- Kusmana, Cecep & Hikmat Agus. 2015. *Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Leba, Maria Aloisia Uron. 2017. *Ekstraksi dan Real Kromatografi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mastuti, Retno. 2016. *Metabolit Sekunder Dan Pertahanan Tumbuhan*. Malang: Universitas Brawijaya
- Mulyati, Endah Sri. 2009. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Ceremal (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) Terhadap Staphylococcus aureus dan Escherechia coli dan Bioautografinya*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Murwati Sri, Qosimah Dahliatul, dkk. 2017. *Penyakit Bakterial Pada Ternak Hewan Besar dan Unggul*. Malang: Ub Press.

- Ngajow, Mercy dan Jemmy Abidjulu, 2013 Vanda S. Kamu. *Pengaruh Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Matoa (Pometia pinnata) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus*. Manado: FMIPA
- Pelczar. Michael J, and Chan. E.C.S.2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan Oleh Hadioetomo, Ratna Sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rubiyanto, Dwiasrso. 2017. *Metode Kromatografi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Saskiawan, Iwan dan Nurhasanah. 2015. *Aktivitas Antimikroba Dan Antioksidan Senyawa Polisakarida Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostearus)*. Jakarta: Pusat Penelitian Biologi ISSN 2407-8050
- Tirtawinata, Muh R. 2016 *Durian (Pengetahuan Dasar Untuk Pecinta Durian)*. Jakarta: Penebar Suadaya.
- Tjitrosoepomo, Gembong. 2013 *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: UGM Press
- Tristiyanto. 2009. *Studi Aktivitas Antibakteri Dan Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Aktif Antibakteri Buah Gamba (Luffa acutangula Roxb)*. Surakarta: Universitas 11 maret
- Wibowo, Marliana Singgih, dkk.2008. *Uji Aktivitas Infusum Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa. L)*. Tasikmalaya: Stikes BTH Tasikmalaya.


**Lampiran 1. Skema Kerja Penelitian****a. Maserasi Kulit Buah Durian (*Durio zibethinus M*)**

**b. Pengujian Skrining Antibakteri**


## 1. Penyiapan Stok Larutan Uji





## 2. skrining Aktivitas Antimikroba



c. Uji Aktivitas Fraksi Ekstrak Kulit Buah Durian(*Durio zibhetinus M*)



**d. KLT-Bioautografi**

**e. Identifikasi Senyawa Kimia**

## Lampiran 2. Perhitungan

### 1. Perhitungan Persen Rendamen

$$\% \text{ rendamen} = \frac{\text{jumlah ekstrak yang dihasilkan}}{\text{jumlah simplisia sebelum diolah}} \times 100\%$$

$$\text{n-heksan} = \frac{1,3 \text{ gram}}{800 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 0,163\%$$

$$\text{etil asetat} = \frac{2,3 \text{ gram}}{800 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 0,287\%$$

$$\text{metanol} = \frac{16,35 \text{ gram}}{800 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 2,043\%$$

### 2. Perhitungan Konsentrasi

Dibuat konsentrasi 10%

$$10\% = \frac{10 \text{ gram}}{100 \text{ ml}} = \frac{1 \text{ gram}}{10 \text{ ml}}$$

Dibuat 1000 ppm

$$\text{Ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}} = \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$$

$$1000 \text{ ppm} = \frac{10.000 \mu\text{g}}{10 \text{ ml}} = \frac{10 \text{ mg}}{10 \text{ ml}}$$

Jadi untuk konsentrasi 1000 ppm, ditimbang ekstrak sebesar 10 mg dalam

10 ml aquadest.


## Lampiran 3. Gambar



Gambar 2. Pengolahan sampel




Gambar 3. Hasil ekstraksi




Gambar 4. Uji skrining aktivitas antibakteri



**Gambar 5. Proses kromatografi cair vakum (KCV)**



*Escherichia coli*



**Gambar 6. Uji aktivitas antibakteri hasil fraksinasi**



*Staphylococcus aureus*

**Gambar 7. Hasil uji fraksi KLT**



**Bioautografi**



**Gambar 8. Golongan senyawa yang aktif**



**RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Wa Sinta. Ia biasa disapa dengan panggilan Rara. Ia lahir di Kabupaten Fakfak pada tanggal 28 Agustus 1997. Ia dilahirkan dari pasangan Suriadi dan Wanya sebagai anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 1 Fakfak. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Fakfak dan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Tahun 2014, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan.

