

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN TEMBAKAU
(*Nicotiana tabacum* L.) TERHADAP BAKTERI *Mycobacterium tuberculosis*



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
RUDY ADYAKSYAH
NIM. 70100114062

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Adyaksyah
Nim : 70100114062
Tempat/tgl.Lahir : Mamuju / 02 Desember 1995
Jur/prodi/konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Raihan Residence Blok B.2
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tembakau
(*Nicotiana Tabacum* L.) Terhadap Bakteri
Mycobacterium tuberculosis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Makassar, November 2018
ALAUDDIN Penyusun
M A K A S S A R

RUDY ADYAKSYAH

70100114062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.” yang disusun oleh Rudy Adyaksyah, NIM: 70100114062, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, di uji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 yang bertepatan dengan 8 Rabi’ul Awwal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, Januari 2019 M
Rabi’ul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt. (.....)

Pembimbing I : Muh. Fitrah, S.Si., M. Farm., Apt. (.....)

Pembimbing II : M. Rusdi, S. Si., M. Si. (.....)

Penguji I : Aliffia Putri Febriyanfi, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. (.....)

Penguji II : Dra. Audah Mannan, M. Ag. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. Sc.
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum* L.) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayahanda H. Burgan dan ibunda Hj.Syamsiah S.ST dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus. Kakak saya Reza Pebriansyah dan Adik Retno Chintya dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat, restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababasari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.Mardan,M.Ag.,selaku Rektor Wakil I, Bapak Prof.H.Lomba sultan, M.A., selaku wakil Rektor II, Ibu Prof. Siti Aisyah,M.A.,Ph.D., selaku

Wakil Rektor III, Bapak Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D, selaku wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku wakil Dekan I (Bidang Akademik), Ibu Dr. A. Susilawaty, S.Km., M.Kes., selaku wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua jurusan dan Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt, selaku Sekertaris jurusan Farmasi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm., Apt, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M.Rusdi S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu luangnya untuk mengarahkan serta mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini, yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian
8. Ibu Alifia Putri Febriyanti, S. Farm., M.Farm., Klin., Apt selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberi arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dra. Audah Mannan, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Para Laboran Farmasi UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing saya dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar tercinta GALENICA, Eratnya hubungan kekeluargaan sejak penerimaan mahasiswa baru 2014 silam membuat saya semangat hidup di kampus peradaban ini, kisah dan segala sesuatunya terjadi sulit untuk dilupakan.
13. Seluruh keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar baik para kaka senior dan seluruh adik-adik yang tengah menjalani proses perkuliahan.
14. Teman-teman penelitian di Lab Biologi Farmasi, Kherun Nisa, Sri Ayu Ningsi dan Ayu Lisna Ningsih atas semangat dan kerjasama yang sangat baik selama penelitian dan penyusunan tugas akhir.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan-khususnya kedua orang tuaku, semoga Allah SWT senantiasa memberi imbalan pahala yang berlipat ganda.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun


RUDY ADYAKSYAH

70100114062

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Uraian Tanaman	8
B. Uraian Mikroba Uji	17
C. Ekstraksi Simplisia	19
D. Antimikroba.....	24
E. Tuberkulosis	28
F. Metode Pengujian	33
G. Tinjauan Islam	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Instrumen Penelitian	40
D. Prosedur Kerja.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
1. Hasil ekstraksi daun tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L).....	45
2. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak n-hexan	46
3. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Etil Asetat	46
4. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Etanol 96%	47
5. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Air.....	47
6. Hasil Uji Skrining Fitokimia.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar


Halaman

1. Tanaman Tembakau.....	9
2. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	11
3. Preparasi Sampel.....	70
4. Proses Ekstraksi	71
5. Ekstrak Daun Tembakau.....	71
6. Pengujian pada Bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	72
7. Hasil Pengamatan Pengujian Kontrol Positif dan Negatif.....	73
8. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Air.....	74
9. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Etanol 96%.....	75
10. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak n-hexan.....	76
11. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Etil Asetat	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Alur Penelitian	63
2. Skema Proses Ekstraksi Sampel Daun Tembakau.....	64
3. Uji Aktivitas Antituberkulosis	65
4. Skirining Fitokimia	68
5. Gambar Proses Ekstraksi	70
6. Gambar Pengujian pada Bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	72
7. Gambar Hasil Pengujian <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	73
8. Perhitungan Pembuatan Seri Konsentrasi.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Rudy Adyaksyah
Nim : 70100114062
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) Terhadap Bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*

Penelitian tentang ekstraksi senyawa antituberkulosis dari ekstrak n-heksan, etil asetat, etanol 96% dan air pada daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penghambatan ekstrak n-heksan, etil asetat, etanol 96% dan air daun tembakau terhadap bakteri penyebab tuberkulosis serta golongan senyawa yang berpotensi sebagai antituberkulosis. Ekstrak n-hexan, etil asetat, etanol 96% dan air dari daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* melalui pengujian yang dilakukan dengan metode MODS serta golongan senyawa yang terkandung pada ekstrak yang memiliki efek penghambatan terhadap *Mycobacterium tuberculosis*.

Sampel di ekstraksi dengan metode ekstraksi bertingkat menggunakan tiga pelarut yakni ekstrak n-heksan, etil asetat, etanol 96%. Kemudian dilanjutkan ke metode refluks dengan pelarut air. Kemudian hasil ekstrak di uji penghambatan pertumbuhan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv dengan metode MODS. Dan dilakukan uji identifikasi golongan senyawa. Hasil uji penghambatan pertumbuhan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* menunjukkan bahwa ekstrak n-hexan, etil asetat, etanol 96% dan air dari daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) dengan masing-masing pada konsentrasi 2000 ppm menunjukkan aktivitas antituberkulosis, dibuktikan dari jumlah cord yang lebih sedikit setelah diamati di bawah mikroskop. yang menunjukkan efek penghambatan dilihat dari sedikitnya jumlah cord yang nampak setelah diamati pada mikroskop, sedangkan ekstrak n-hexan, etil asetat, etanol 96% dan air pada konsentrasi 400 ppm dan 800 ppm, 1200 ppm dan 1600 ppm tidak menunjukkan adanya penghambatan terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dilihat dari jumlah cord yang banyak dan menghampiri jika dibandingkan dengan kontrol negatif. Setelah itu dilakukan identifikasi senyawa. Golongan senyawa yang terkandung pada ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) setelah dilakukan identifikasi golongan yaitu ekstrak n-hexan mengandung senyawa flavanoid, ekstrak etil asetat mengandung senyawa steroid dan fenolik, ekstrak etanol 96% mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, terpenoid, dan fenolik, sedangkan ekstrak air mengandung alkaloid dan fenolik.

Kata kunci : Daun Tembakau, Ekstrak n-heksan, Ekstrak Etil Asetat, Ekstrak Etanol 96%, Ekstrak Air, *Mycobacterium tuberculosis*, MODS

ABSTRACT

Nama : Rudy Adyaksyah
Nim : 70100114062
Judul : Antibacterial Activity Test of Tobacco Leaf Extract (*Nicotiana tabacum* L.) Against *Mycobacterium Tuberculosis* Bacteria

Research on the extraction of antituberculosis from n-hexane, ethyl acetate, 96% ethanol and water on tobacco leaves (*Nicotiana tabacum* L.). This study aims to determine the inhibitory effect of n-hexane, ethyl acetate, ethanol 96% extract and tobacco leaf water on tuberculosis-causing bacteria and compounds that have the potential to be antituberculosis. N-hexan extract, ethyl acetate, ethanol 96% and water from tobacco leaf (*Nicotiana tabacum* L) have the potential to inhibit the growth of *Mycobacterium tuberculosis* through testing carried out using the MODS method and the class of compounds contained in the extract which have an inhibitory effect on *Mycobacterium tuberculosis*.

The sample was extracted by a multilevel extraction method using three solvents namely n-hexane extract, ethyl acetate, 96% ethanol. Then proceed to the reflux method with water solvent. Then the results of the extract were tested for inhibition of the growth of the bacterium *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇Rv using the MODS method. And the identification of compound groups is carried out. The test results of inhibition of growth of *Mycobacterium tuberculosis* showed that n-hexan extract, ethyl acetate, ethanol 96% and water from tobacco leaf leaves (*Nicotiana tabacum* L) with each concentration of 2000 ppm showed antituberculosis activity, as evidenced by fewer cords after being observed under a microscope. which showed an inhibitory effect seen from the small number of cords that were seen after being observed on the microscope, while n-hexan extract, ethyl acetate, ethanol 96% and water at concentrations of 400 ppm and 800 ppm, 1200 ppm and 1600 ppm did not show any inhibition of the bacteria tuberculosis is seen from a large number of cords and approaches when compared to negative controls. After that identification of compounds is carried out. The group of compounds contained in tobacco leaf extract (*Nicotiana tabacum* L) after identification of groups namely n-hexan extract containing flavanoid compounds, ethyl acetate extract containing steroid and phenolic compounds, ethanol 96% containing alkaloids, flavonoids, terpenoids and phenolic compounds , while the water extract contains alkaloids and phenolics.

Kata kunci : Tobacco Leaves, n-hexane Extract, Ethyl Acetate Extract, 96% Ethanol Extract, Water Extract, Mycobacterium tuberculosis, MODS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang menjadi masalah di dunia. Tuberkulosis menjadi penyebab kematian ke-9 di seluruh dunia dan penyebab utama dari agen infeksi. Pada tahun 2016 diperkirakan 10,4 juta orang menderita tuberkulosis, 90% orang dewasa, 65% laki-laki, dan 10% yang disertai dengan HIV. Secara global angka kematian turun 3% setiap tahunnya. Penderita tuberkulosis turun sekitar 2% per tahun dan 16% meninggal akibat tuberkulosis. Sebagian besar kematian akibat tuberkulosis dapat dicegah dengan diagnosis dini dan penanganan yang tepat. Jutaan orang didiagnosis dan berhasil diobati setiap tahun (53 juta, 2000 – 2016), namun masih banyak kesenjangan dalam deteksi dan pengobatan (WHO, 2017).

TB (Tuberkulosis) adalah penyebab kematian urutan kesembilan terbanyak di dunia yang dapat diperparah dengan adanya HIV/AIDS. Pada tahun 2016 diperkirakan ada sekitar 1,3 juta kematian penderita TB. Diperkirakan 10,4 juta orang terinfeksi TB di Indonesia pada tahun 2016 yang didominasi oleh orang dewasa (WHO, 2017).

Penderita Tuberkulosis yang mengalami resistensi menjadi ancaman baru yang terus berlanjut. Pada tahun 2016, ada sekitar 600.000 kasus baru yang telah resisten terhadap Rifampisin, sementara obat ini adalah obat lini pertama yang paling efektif. Selain itu terdapat 490.000 kasus yang resisten terhadap multidrug (TB MDR) (WHO, 2017).

Di Indonesia, TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut Riskesdas 2013, prevalensi TB di Indonesia berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis kasus TB oleh tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2013)

Maka dari itu diperlukan pencarian dan penemuan obat antituberkulosis dengan tingkat keamanan dan keefektifan optimal. Mengingat meningkatnya TB-MDR (*Tuberculosis Multidrug Resistance*), penelitian obat antituberkulosis baru berdasarkan perawatan yang terjangkau dan lebih efektif telah dimulai. Studi tentang ekstrak tanaman alternatif yang inovatif dari nilai obat perlu ditekankan karena tanaman merupakan sumber penting agen antimikroba baru, dengan sedikit toksisitas dapat mengganti obat yang telah terjadi resistensi (Dini, 2011). Salah satunya dengan pemanfaatan bahan kimiawi tumbuhan. Adanya keragaman tanaman di Indonesia mulai dikembangkan sebagai obat herbal. Di mana pengembangan tersebut memiliki potensi untuk ditemukannya senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba (Ramadhani, 2015).

Bangsa Indonesia sejak dahulu memanfaatkan hasil alam untuk kelangsungan hidup. Salah satu hasil alam yang telah dikembangkan adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit (Supardi, 2010).

Daun tembakau diantaranya mengandung bahan aktif, bahan aktif tersebut antara lain golongan fenol berupa flavonoid, golongan alkaloid berupa nikotin

golongan saponin berupa steroid dan juga mengandung golongan minyak atsiri berupa terpenoid (Rusli, dkk. 2011).

Secara umum daun tembakau dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok dan telah menjadi kontroversi karena dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. dalam Sidang Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) ke-56 pada 2003. FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) memberikan rujukan tentang betapa pentingnya pengendalian tembakau dalam produksi rokok di seluruh dunia. Dengan rujukan ini diharapkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mengesahkan FCTC menjadi hukum atau kebijakan nasionalnya masing-masing, sehingga menjadi bagian dari negara-negara peserta (*states parties*) atas FCTC. Setiap negara diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi dampak penggunaan tembakau pada rokok terhadap kesehatan, karena memprioritaskan terhadap hak setiap orang untuk menjaga kesehatan. Namun jika ditinjau dari sisi pengobatan, justru daun tembakau itu memiliki peluang besar untuk di jadikan sebagai salah satu bahan alternatif obat herbal. Hal ini telah terbukti dari beberapa penelitian bahwa daun tembakau dapat digunakan sebagai antibakteri atau anti mikroba untuk beberapa bakteri. (Rahul Shivaji, 2015)

Beberapa alasan tersebut diatas mendorong peneliti untuk melakukan pengujian golongan senyawa dan uji aktivitas antituberkulosis ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis* ?
2. Berapa konsentrasi dari ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis* ?
3. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis*.

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut

b. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat.

c. Identifikasi

Identifikasi adalah suatu reaksi kimia yang dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan suatu zat (ion/gugus) dalam suatu sampel.

d. Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Micobacterium tuberculosis*, yang pada umumnya dimulai dengan membentuknya benjolan-benjolan kecil di paru-paru dan ditularkan lewat organ pernafasan.

e. Antibakteri

Antibakteri merupakan kemampuan ekstrak daun tembakau dalam menghambat perkembangan *Mycobacterium tuberculosis*.

f. Kultur *Mycobacterium tuberculosis*

Merupakan biakan parasit uji yang diperoleh dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar.

g. Tembakau

Tembakau adalah tumbuhan keluarga *Solanaceae* dengan spesies (*Nicotiana tabacum* L.) yang diperoleh dari daerah Soppeng Sulawesi Selatan.

2. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) kemudian dilakukan uji antibakteri pada bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang telah dikembang biakkan sebelumnya dalam medium.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan Rahul Shivaji et al (2015), dengan judul “*Comparative Study Of Antimicrobial Compounds Extracted From Leaves Of Nicotiana Tabacum And Cigarette*” penelitian yang berkaitan dengan ekstraksi dan karakterisasi senyawa antimikroba dari tanaman tembakau *Nicotiana tabacum* L. pada proses identifikasi senyawa ekstrak yang digunakan adalah dua pelarut organik yakni etil asetat dan etanol. Ekstrak etil asetat dari tembakau ini menunjukkan adanya steroid, tanin dan saponin. Sedangkan ekstrak etanol keduanya menunjukkan adanya steroid, flavonoid, tanin, kumarin, fenol dan saponin. Adapun aktivitas antimikroba dari ekstrak tersebut diuji terhadap bakteri *Proteus vulgaris*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, *Bacillus cereus*, *Penicillium chrysogenum* dan *Aspergillus niger*. Ekstrak etil asetat dari sampel menunjukkan efek kisaran inhibisi yang signifikan terhadap bakteri *Proteus vulgaris*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium* dan *Bacillus cereus* dan adapun ekstrak etanol juga demikian lebih efektif menghambat. Dengan demikian, hasil ini mengkonfirmasi bahwa terdapat senyawa senyawa antibakteri dari tanaman tembakau *Nicotiana tabacum* L.

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan Joseph M et al (2016), dengan judul “*Antimycobacterial and cytotoxic activity of selected medicinal plant extracts*” Hasil dari penelitian ini cukup menarik, Hasil yang diamati membenarkan ekstraksi beberapa tanaman yang diujikan dari beberapa spesies tanaman membutuhkan adanya melawan bakteri penyebab tuberkulosis. Data ini memberikan bukti bahwa ekstrak etanol 80% daun daun *Solanum torvum* dari family *solanaceae* memiliki aktivitas sedang terhadap bakteri *mycobacterium tuberculosis* strain H37Rv dan memiliki petunjuk dapat dijadikan obat untuk

tuberkulosis. Oleh karena itu studi lebih lanjut dibutuhkan tujuan mengisolasi senyawa antimikobakteri yang berkhasiat dan aman. Adapun dari hasil penelitian diatas memberikan gambaran bagi peneliti untuk menggunakan tumbuhan lain dari family *solanaceae* seperti daun tembakau *Nicotiana tabacum* L guna untuk menguji apakah juga pada tumbuhan lain pada spesies yang sama mampu memberikan hasil yang sama.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis*
- b. Mengetahui konsentrasi berapa dari ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis*
- c. Mengetahui golongan senyawa apa yang terkandung dalam daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Mycobacterium tuberculosis*

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagai antituberkulosis.
- b. Memberikan data ilmiah mengenai aktivitas ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) terhadap aktivitas antibakteri sebagai salah satu alternatif pengobatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman

- a. Nama Indonesia : Tembakau
- b. Nama local : Tambako (Makassar)
- c. Klasifikasi (Listyanto, 2010)
 - Kingdom : Plantae
 - Subkingdom : Tracheobionta
 - Super Divisi : Spermatophyta
 - Divisi : Magnoliophyta
 - Kelas : Magnoliopsida
 - Sub Kelas : Asteridae
 - Ordo : Solanales
 - Famili : Solanaceae
 - Genus : *Nicotiana*
 - Spesies : *Nicotiana tabacum* L.

2. Morfologi Tanaman

Tembakau dicirikan dengan keadaan tanaman yang kokoh dan besar dengan ketinggian tanaman sedang, daunnya tipis dan elastisitas, bentuk daun bulat lebar, bermahkota slinder dan daunnya berwarna cerah, tembakau berhabitus disemak, semusim, tinggi kurang lebih 2 cm.



Gambar 1 Tanaman Tembakau (Susilowati, 2006)

Tanaman tembakau memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak tapi kuat, makin ke ujung makin kecil. Daun tanaman tembakau memiliki bentuk bulat lonjong (oval) atau Bulat Bulat, tergantung pada varietasnya. Memiliki bunga majemuk, tumbuh diujung batang, kelopak berbulu, benang Sari lima, kepala sari abu, kepala putik satu, mahkota berbentuk terompet berwarna merah muda. Memiliki bentuk buah Kotak, bulat telur, masih muda hijau setelah tua coklat. Biji kecil, warna coklat, tanaman tembakau berakar tunggang tumbuh tegak ke pusat bumi (Listyanto, 2010).

Daun tembakau secara umum diklasifikasikan berdasarkan letaknya pada batang, yang dimulai dari bawah ke atas, yaitu : daun pasir (zond blad lugs), kaki (voet blade cutters), tengah (midden blad/leaf) dan atas (top blad/tips) (Susilowati, 2006).

3. Kandungan Kimia Tembakau

Hasil uji pendahuluan daun tembakau bagian atas diantaranya mengandung bahan aktif, antara lain fenol, alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan juga mengandung steroid, sedangkan daun bagian bawah hanya mengandung alkaloid, flavonoid dan terpenoid (Rusli, dkk. 2011, Susanto dkk, 2010; Susanti, 2012).

a. Flavanoid

Flavanoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein di luar sel yang mengganggu kekuatan membran sel bakteri. Kandungan flavanoid dapat menekan sitokin, yakni penyebab peradangan dalam saluran pencernaan serta bertindak sebagai antioksidan dan antikarsinogenik (Utami dan Desti, 2013)

Flavanoid adalah senyawa polifenol yang secara umum mempunyai struktur phenylbenzopyrone ($C_6-C_3-C_6$). Flavanoid dan derivatnya terbukti memiliki aktivitas biologi yang cukup tinggi sebagai *cancer prevention*. Berbagai data dari studi laboratorium, investigasi epidemiologi, dan uji klinik kepada manusia telah menunjukkan bahwa flavanoid memberikan efek signifikan sebagai *cancer chemoprevention* dan pada kemoterapi (Suryo, 2010).

Flavanoid terdiri atas dasar 2-feni-benso- δ -piran atau inti flavon dimana dua cincin benzen dihubungkan oleh cincin piran yang mengandung oksigen. Flavonid dibagi atas flavanol, flavon, flavan, dan isoflavon. Beberapa contoh yang terdapat dalam pangan adalah mirisetin, quersetin, luteolin, apieginin, genistein, dan krisin (Silalahi, 2006).

Flavanoid memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat sebagai reduktor, flavanoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas (Silalahi, 2006).

Flavanoid dapat membentuk kompleks (kelat) dengan ion logam transisi, misalnya besi, sehingga tidak lagi bertindak sebagai prooksidan. Dengan demikian, oksidasi vitamin C dapat dicegah (Silalahi, 2006).

Senyawa flavanoid seperti quersetin, mortin, mirisetin, kaempferol, asam tanat, dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006).

Flavanoid banyak terdapat di dalam tumbuhan, terutama daun teh, bawang, apel, dan anggur merah. Konsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya akan flavanoid akan menurunkan resiko kanker dan PJK (Silalahi, 2006).

b. Tanin

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Robinson, 1995). Tannin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel (Cowan, 1994). Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati (Sari, 2011).

Tanin adalah senyawa polifenol dari kelompok flavanoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, anti peradangan dan antikanker (*anticarcinogenik*). Tanin dikenal juga sebagai zat semak untuk pengawetan kulit (Yuliarti, 2009).

Tanin merupakan senyawa organik polifenol dengan rasa pahit yang kuat dan efek adstringen. Umumnya asam galat adalah penyusun banyak tanin. Tanin bisa mengubah bentuk pori-pori kulit, pengendapan protein dan pembentukan senyawa tidak larut dengan nya. Pada konsentrasi rendah senyawa tani bisa digunakan lokal menyebabkan penurunan signifikan pada permeabilitas vascular. Jika diberikan dalam dosis tinggi tanin bisa menyebabkan kaustik yang menyebabkan perubahan yang mendalam pada struktur protein. Dalam terapi tanin yang digunakan sebagai obat luar (produk pencuci mulut dan kumur) sebagai adstringen dan hemostatik. Tanin juga digunakan sebagai adstringen pada pembuluh darah rectal, seperti yang dipakai dalam pengobatan hemoroid. Pada jaman dulu tanin digunakan sebagai antiseptik yang sekarang kadang digunakan sebagai lotion anti ketombe. Tumbuhan yang banyak mengandung tanin diantaranya daun *Aesculus hippocastanum*, daun *Hamamelis virginiana*, akar *Krameria triandra*, dan rimpang *Potentilla erecta*. Pada tumbuhan tanin ditemukan dalam bentuk kompleks tannoids dan kadang berikatan dengan gula (tannosides). Tanin dibagi menjadi 2 kelompok: *hidrosilable tanin* yang membentuk molekul yang sederhana pada pengobatan dengan asam atau enzim. Dan *kondensasi tanin* (catekin tanin disebut juga proantosianidin) yang memberikan produk kompleks yang tidak larut dan mirip dengan pengobatan.

Prosianidin merupakan senyawa yang bisa terbentuk pada perlakuan asam pada suhu tinggi, disebut juga dimetrik proantosianidin (Supriyanto dkk, 2014).

c. Steroid/terpenoid

Mekanisme kerja steroid sebagai antibakteri berhubungan dengan membran lipid dan sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran pada liposom bakteri (Madduluri dkk, 2011). Steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah menyebabkan sel rapuh dan lisis.

Saat ini ditemukan 118 terpenoid yang bersal dari tanaman sintesis dan alami yang memiliki tingkat sedang hingga tinggi aktivitas antimikobakteri *Mycobacterium tuberculosis* (Kumar et al, 2010).

Steroid adalah salah satu kelas utama dari lipid yang memiliki struktur yang sama sekali berbeda dari kelas-kelas lipid yang lain. Fitur utama dari steroid adalah tiga sistem cincin sikloheksan dan satu siklopentana dalam sistem cincin yang menyatu. Pada steroid ada berbagai gugus fungsional yang mungkin menempel. Fitur utama, seperti dalam semua lipid, yakni sejumlah besar karbon-hidrogen yang membuat senyawa non-polar. Steroid paling dikenal dan paling banyak dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol ini adalah senyawa utama yang ditemukan di batu empedu dan garam empedu. Kolesterol juga berkontribusi terhadap pembentukan deposit pada dinding dalam pembuluh darah. Deposit tersebut akan mengeras dan menghambat aliran darah. Kondisi ini, yang dikenal

sebagai aterosklerosis yang menyebabkan berbagai penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi (Sumbono, 2016).

Definisi lengkap dari steroid adalah senyawa yang memiliki kerangka siklopentana fenantrena atau kerangka yang berasal satu atau lebih ikatan *sciccions* atau ekspansi cincin atau kontraksi. Gugus metil biasanya berada di atom C-17. Sterol adalah steroid membawa kelompok hidroksil pada atom C-3 dan sebagian besar kerangka kolestan. Atom karbon tambahan mungkin berada pada posisi rantai samping (Sumbono, 2016).

Steroid adalah keluarga lipid yang mencakup kolesterol, hormon steroid, dan garam empedu. Steroid merupakan molekul amphipathik (mengandung daerah baik hidrofobik dan hidrofilik). Steroid dasar terdiri dari tiga cincin beranggotakan enam atom C (sikloheksana) dan satu cincin beranggota lima atom C. Cincin sikloheksana masing-masing memiliki konformasi kursi. Beberapa jenis lipid yang berbentuk steroid yakni : kolesterol, estradiol, testosteron, vitamin D, ergosterol, progesteron dan estrogen (Sumbono, 2016).

d. Alkaloid

Alkaloid berfungsi sebagai antibakteri dengan mengganggu komponenn pembentuk dinding sel bakteri sehingga lapisan dinding sel bakteri tidak terbentuk secara utuh (Utami dan Desti, 2013). Alkaloid adalah senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai sistem lingker heterosiklik dengan nitrogen sebagai hetero atomnya (Sumardjo, 2009).

Alkaloid murni mengandung aktivitas antimikobakteri. Ditemukan 23 senyawa murni alkaloid yang memiliki aktivitas antimikobakteri. Semua alkaloid diekstraksi dari berbagai bagian tanaman seperti akar, rimpang dan semuanya berasal dari karbazol dan alkaloid indol. Salah satu alkaloid yang ditemukan adalah indoloquinoline yang memiliki aktivitas yang signifikan terhadap *M. fortuitum*. Selain itu, alkaloid benzoksazol yang merupakan metabolit laut juga memiliki aktivitas yang kuat terhadap *Micobacterium tuberculosis* (Kumar et al, 2010).

Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Alkaloid yang struktur kimianya tidak mengandung oksigen hanya ada beberapa saja. Ada pula alkaloid yang mengandung unsur lain selain keempat unsur yang telah disebutkan. Adanya nitrogen dalam lingkaran pada struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid tersebut bersifat alkali. Oleh karena itu, golongan senyawa-senyawa ini disebut alkaloid (Sumardjo, 2009).

Tumbuhan dikotil adalah sumber utama alkaloid. Cara ekstraksi digunakan untuk mendapatkan alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Kini beberapa alkaloid dengan struktur kimia yang sederhana telah dapat dibuat secara sintesis di dalam laboratorium (Sumardjo, 2009).

Beberapa cara telah digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid, misalnya mikroskopik kristal, kelarutan dalam berbagai jenis pelarut, spektrum absorpsi dan perputaran optis atau sifat farmakologis. Reaksi warna juga sering digunakan walaupun tidak spesifik (Sumardjo, 2009).

Alkaloid yang sampai saat ini telah dikenal digolongkan atau diklasifikasikan atas beberapa cara. Cara-cara yang umum dipakai ialah membagi alkaloid berdasarkan struktur kimia, sumber-sumber tumbuhan yang diperoleh, atau aktivitas farmakologis (Sumardjo, 2009).

e. Fenol

Senyawa seperti fenol yang merupakan senyawa semipolar diketahui mampu melisiskan sel dengan berinteraksi lewat dinding sel bakteri dan melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen (Bruneton, 1993). Fenol akan bekerja efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan dimana lapisan fosfolipid di sekeliling sel dalam kondisi yang sangat tipis sehingga fenol dapat dengan mudah merusak isi sel (Volk and Wheller, 1984).

Fenol adalah suatu senyawa aromatik, yang struktur kimianya diturunkan dari benzena jika satu atau lebih atom hidrogen yang terikat pada inti benzena diganti dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Jadi pada fenol, gugus hidroksil terikat langsung pada inti benzena dan disebut gugus hidroksil fenolik (Sumardjo, 2009).

f. Saponin

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar. Senyawa ini berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, lalu mengikat membran sitoplasma dan mengganggu dan mengurangi kestabilan itu. Hal ini menyebabkan sitoplasma

bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida (Cavalieri et al, 2005).

4. Kegunaan Tembakau

Daun tembakau secara umum hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok dan telah lama menjadi kontroversi karena dikenal bisa menyebabkan dampak negatif seperti gangguan pada jantung, terjadinya penyakit kanker paru-paru, sesak nafas, perubahan warna gigi menjadi lebih kuning, kerusakan jaringan, penurunan kemampuan indra pengecap, leukoplakia dan resiko kanker mulut. Di sisi lain, daun tembakau mengandung bahan yang bersifat antibakteri dan antijamur. Bahan aktif tersebut antara lain golongan fenol berupa flavonoid, golongan alkaloid berupa nikotin, golongan saponin berupa steroid dan juga minyak atsiri berupa terpenoid (Fathiazad F, 2005).

B. Uraian Mikroba Uji

1. Klasifikasi Bakteri (Tresnaasih, 2017)

Kingdom : Bacteria

Filum : Actinobacteria

Ordo : Actinomycetales

Kelas : Actinomycetes

Family : Mycobacteriaceae

Genus : Mycobacterium

Spesies : *Mycobacterium tuberculosis*

2. Sifat dan Morfologi

Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882, sehingga diberi nama basil Koch. Bakteri ini berbentuk batang agak bengkok dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai Batang Tahan Asam (BTA) (Yahya, 2012).

Pewarnaan Ziehl-Neelsen digunakan untuk identifikasi BTA. Bakteri ini tumbuh lambat, sehingga koloni tampak setelah lebih kurang dua minggu bahkan kadang-kadang setelah 6-8 minggu. BTA tumbuh pada suhu optimum 37 °C, tidak tumbuh pada suhu 25 °C atau lebih dari 40 °C. Medium padat yang biasa dipergunakan adalah Lowenstein-Jensen pada pH optimum 6,4-7,0 (Yahya, 2012).

Mycobacterium tuberculosis tidak tahan panas, akan mati pada suhu 60 °C selama 15-20 menit. Biakan *M. tuberculosis* dapat mati jika terkena sinar matahari langsung selama dua jam. Bakteri ini dapat bertahan di dalam dahak selama 20-30 jam. Basil dalam percikan bahan dapat bertahan hidup selama 8-10 hari. Biakan basil ini pada suhu kamar dapat hidup 6-8 bulan dan dapat disimpan dalam lemari pada suhu - 20 °C selama dua tahun (Yahya, 2012).



(Sumber: Yahya, 2012)

Gambar 2. *Mycobacterium tuberculosis*

Bakteri ini juga tahan terhadap berbagai bahan kimia dan desinfektan seperti phenol 5%, asam sulfat 15%, asam sitrat 3% dan NaOH 4%. Basil ini dapat dihancurkan dengan yodium tinctur dalam lima menit, sedangkan dengan alkohol 80% akan hancur dalam 2-10 menit. Bahan-bahan alami, termasuk herbal digunakan sebagai terapi pengobatan tuberkolosis karena terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut (Yahya, 2012).

Mycobacterium tuberculosis berupa bakteri berbentuk batang nonmotile, dengan panjang 2-4 μm dan lebar 0,2-0,5 μm . Bakteri ini termasuk dalam bakteri aerobik obligat, dan merupakan parasit intraseluler fakultatif. Media untuk pertumbuhan *M. tuberculosis* antara lain media berbasis agar dan media berbasis telur. Pertumbuhan optimum bakteri ini pada suhu 35-37°C. *Mycobacterium tuberculosis* bersifat tahan terhadap suhu rendah. Pada suhu 4°C hingga -70°C, *M. tuberculosis* dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Selain itu, *Mycobacterium tuberculosis* sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet dimana paparan langsung terhadap sinar ultraviolet dapat menyebabkan sebagian besar *Mycobacterium tuberculosis* mati dalam waktu beberapa menit. *Mycobacterium tuberculosis* dapat hidup selama 20-30 jam dalam dahak. (Tresnaasih, 2017).

C. Ekstraksi Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa

hewan utuh, bagian hewan, atau zat yang dihasilkan oleh hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM, 1979: 30).

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995).

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang sebagai bahan awal, bahan antara ataupun bahan produk jadi. Ekstrak sebagai bahan awal dianalogkan dengan komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh penderita (Dirjen POM, 2000: 6).

Proses untuk mendapatkan ekstrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut (Dirjen POM, 1986: 10).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang akan diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa

yang tidak dapat larut dan mempunyai struktur kimia yang berbeda-beda yang dapat memengaruhi kelarutan dan stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap suhu, udara, cahaya, dan logam berat (Dirjen POM, 2000: 9).

Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa-senyawa kimia dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain menggunakan pelarut tertentu. Pemilihan metoda ekstraksi tergantung pada tekstur, kandungan air dan jenis senyawa yang diisolasi dari suatu tumbuhan atau hewan, sehingga senyawa kimia yang diekstraksi dapat tertarik sempurna tanpa mengalami perubahan sifat dan strukturnya. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk memilih pelarut yang akan dipakai dalam ekstraksi harus diketahui sifat kandungan kimia metabolit sekunder yang akan diisolasi. Senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar mudah larut dalam non polar (Harborne, 1987: 6).

1. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 2000).

2. Mekanisme Ekstraksi

Proses ekstraksi didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara otomatis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel, mengakibatkan

terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif ke luar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harborne, 1987: 6).

3. Jenis-Jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi.

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Ditjen POM, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes, 2007).

b. Refluks

Refluks adalah metode penyarian dengan cara cairan penyari dipanaskan hingga mendidih, penyari akan menguap ke atas melalui serbuk simplisia, uap penyari pengembun karena didinginkan oleh pendingin balik (kondensor). Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap berulang hingga pelarut jenuh (Ditjen POM, 2000).



D. Antimikroba

1. Pengertian Antimikroba

Mikroba merupakan organisme berukuran mikroskopis yang terdiri atas bakteri, fungi, dan virus. Selain berinteraksi dengan spesies yang sama, mikroba juga dapat berinteraksi secara interspesies dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam interaksinya dengan manusia, mikroba tersebut ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Mikroba yang merugikan atau sering kali disebut mikroba patogen dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Untuk menghambat atau mengurangi aktivitas mikroba tersebut, diperlukan zat antimikroba (Hermanto, 2012).

Antimikroba adalah substansi yang menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri atau mikroorganisme lain (organisme mikroskopik termasuk bakteri, virus, jamur, protozoa, dan riketsia. Secara teknik, istilah antibiotik mengacu pada zat kimia yang dihasilkan oleh satu macam mikroorganisme yang menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme yang lain (Kee Joyce dan Evelyn, 1996).

Beberapa obat, termasuk agen-agen antiinfeksi dan kemoterapi, mempunyai kerja yang serupa dengan agen-agen antibakterial dan antimikroba. Obat-obat antibakterial tidak bekerja sendiri dalam menghancurkan bakteri. Pertahanan tubuh alami, prosedur pembedahan untuk membuang jaringan yang terinfeksi, dan penggantian pembalut luka mungkin diperlukan seiring dengan pemakaian obat-obat antibakterial untuk melenyapkan bakteri yang menginfeksi (Kee Joyce dan Evelyn, 1996).

Obat-obat antibakterial kini dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok: penisilin, sefalosporin, makrolid, tetrasiklin, linkosamid, aminoglikosida, kloramfenikol, peptida, dan vankomisin (Kee Joyce dan Evelyn, 1996).

2. Sifat Antimikroba

a. Bakteriostatik

Yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi atau berkembang biak. Beberapa obat antibakterial, seperti tetrasiklin dan sulfonamid, mempunyai efek bakteriostatik (Kee Joyce dan Evelyn, 1996).

b. Bakteriosida

Yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak. Beberapa obat antibakterial, seperti penisilin dan sefalosporin, mempunyai efek bakterisidal (Kee Joyce dan Evelyn, 1996).

3. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksis terhadap mikroorganisme dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (Kee Joyce dan Evelyn,

1996).

4. Mekanisme Kerja Antimikroba

Mekanisme kerja agen antimikroba adalah sebagai berikut (Murwani, 2015) :

a. Merubah permeabilitas membran mikroba atau dinding sel

Sitoplasma sel diselubungi oleh membran sitoplasma (membran plasma). Membran plasma berada di sebelah dalam dari dinding sel, dan merupakan target dari beberapa agen antimikroba.

Membran plasma merupakan salah satu pelindung sel, dan sebagai barier selektif yang berfungsi untuk meregulasi masuknya nutrisi. Selain itu mempunyai fungsi dalam transpor aktif, beberapa komponen secara aktif ditransfer melalui membran, dan terkonsentrasi di dalam sel. Membran plasma dapat mengendalikan komposisi komponen sel. Di dalam membran terdapat enzim yang diperlukan dalam biosintesis komponen-komponen selubung sel. Bahan-bahan yang terkonsentrasi pada permukaan sel mikroba dan dapat merubah sifat fisik dan kimiawi membran, dan menyebabkan matinya atau hambatan pertumbuhan sel. Rusaknya lipid atau protein membran plasma oleh gen antimikroba, menyebabkan kandungan seluler keluar sel dan dapat mengganggu pertumbuhan sel.

Dinding sel berperan dalam mempertahankan struktur sel dan mencegah sel dari lisis karena perbedaan tekanan osmotik. Lisozim merupakan salah satu agen yang dapat merusak dinding sel dan penisilin dapat mencegah proses sintesis dinding sel. Kedua agen tersebut dapat menyebabkan lisisnya mikroba.

b. Merusak protein (denaturasi protein) mikroa

Enzim secara alami dan fungsional berbentuk suatu lipatan dan membentuk tiga dimensi dengan ikatan kovalen intramolekuler disulfida dan melalui beberapa ikatan non-kovalen seperti ionik, hidrofobik, dan ikatan hidrogen. Bentuk tersebut merupakan struktur tersier dari protein. Struktur protein dapat dirusak secara sepat oleh agen-agen fisik dan kimiawi, yang menyebabkan protein menjadi tidak berfungsi. Proses rusaknya struktur tersier protein disebut denaturasi.

Enzim merupakan protein yang memegang peran sangat penting pada semua aktivitas seluler. Gangguan produksi protein dalam jumlah maupun jenis enzim, dapat mengganggu proses metabolisme sel, yang dapat berakibat terganggunya proses pertumbuhan, kematian sel atau terjadinya mutilasi sel.

c. Merusak asam nukleat (DNA) mikroba

Asam nukleat DNA merupakan pembawa informasi genetik sel, dan sangat berperan dalam pembentukan protein dan replikasi sel. Kerusakan asam nukleat oleh panas, radiasi ionisasi, radiasi UV, bahan-bahan yang berinteraksi dengan DNA, antara lain agen alkilasi dan bahan yang dapat berikatan secara kovalen dengan basa purin dan pirimidin membentuk *DNA adduct* atau terjadi ikatan antara pita tunggal atau kedua pita DNA. Radiasi maupun bahan kimia dapat menyebabkan kematian sel bakteri melalui terbentuknya lesi DNA, sehingga mengganggu replikasi DNA.

d. Melepas group sulfhidril bebas

Enzim yang mengandung sistein mempunyai rantai samping yang diakhiri dengan group sulfhidril. Pada enzim tersebut ditambahkan koenzim, seperti koenzim A dan dihidrolipoat yang mengandung group sulfhidril bebas. Enzim dan koenzim tersebut tidak berfungsi tanpa adanya group sulfhidril yang tetap bebas. Agen yang dapat menyebabkan oksidasi (oksidator), mengikat sulfhidril di dekatnya pada jembatan disulfida, sehingga dapat menyebabkan metabolisme sel. Di dalam sel bakteri terdapat beberapa enzim sulfhidril, sehingga dengan adanya reduktor dan logam berat dapat menyebabkan kerusakan sel mikroba secara luas.

e. Bahan kimiawi antagonis

Bahan kimiawi antagonis merupakan agen bahan kimiawi yang ditujukan untuk mengganggu reaksi normal. Mekanisme kerja bahan kimiawi antagonis, yaitu pada reaksi antara enzim spesifik dengan substratnya.

Antagonis sevara kompetitif berikatan dengan beberapa tempat holoenzim (protein apoenzim atau aktivator nmineral, atau koenzim), sehingga substrat tidak dapat berikatan pada bagian-bagian penting enzim.

E. *Tuberculosis* (TBC)

1. Epidemiologi Tuberkulosis

Tuberkulosis lebih banyak menyebabkan kematian di seluruh dunia dibandingkan dengan infeksi lain. Kebanyakan infeksi muncul di daerah tropis tetapi jumlah penderita meningkat di Eropa dan Amerika Serikat, sebagai kasus-kasus yang terjadi pada orang kurang mampu, sering pada para trunawisma dan

para penderita HIV. Pandemi HIV telah menyebabkan peningkatan jumlah kasus secara global, terutama di daerah Afrika sub Sahara (Davey, 2006: 296).

Sekitar 75% penderita TB adalah kelompok manusia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 tahun). Diperkirakan seorang pendrita TB dewasa akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya sekitar 3-4 bulan. Hal tersebut berpengaruh pada kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika ia meninggal akibat TB maka akan kehilangan pendapatannya selama sekitar 15 tahun. Selain merugikan secara ekonomis, TB juga memberikan dampak buruk lainnya secara social, seperti stigma bahkan dikucilkan di masyarakat (Kemenkes, 2014: 1).

Mycobacterium tuberculosis disebabkan melalui droplet pernapasan, transmisi muncul akibat kontak erat dengan individu yang terinfeksi. Kontak dengan pasien yang telah terbukti memiliki *Mycobacterium tuberculosis* dalam sputumnya memiliki resiko 25% untuk menjadi terinfeksi. Penyakit muncul pada 5-15% dari mereka yang terinfeksi, dan resiko ini meningkat pada HIV (Davey, 2006: 296).

2. Pengertian Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya (Kemenkes, 2011: 1)

Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menular dari individu satu ke individu lainnya melalui udara. TB biasanya

menginfeksi paru-paru, tetapi dapat juga menginfeksi organ tubuh yang lain seperti otak dan ginjal (CDC: 1).

3. Kuman Penyebab Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium tuberculosis* (Kemenkes, 2014: 2).

Terdapat beberapa spesies *Mycobacterium* antara lain : *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium leprae*, dan sebagainya, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam (BTA). *Mycobacterium* selain *Mycobacterium tuberculosis* yang bias menimbulkan gangguan pada saluran napas disebut sebagai MOTT (*Mycobacterium Other Than Tuberculosis*) yang biasa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TB. Untuk itu, pemeriksaan bakteriologis yang mampu melakukan identifikasi terhadap *Mycobacterium tuberculosis* menjadi sarana diagnosis ideal untuk TB (Kemenkes, 2014: 2).

Secara umum sifat kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*) antara lain sebagai berikut (Kemenkes, 2014: 2):

- a. Berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, lebar 0,2-0,6 mikron
- b. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen
- c. Memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein Jensen, Ogawa
- d. Kuman Nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop

- e. Tahan terhadap suhu rendah, sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4°C sampai minus 70°C
- f. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet
- g. Paparan langsung dengan sinar ultraviolet, sebagian besar kuman akan mati dalam jangka waktu beberapa menit
- h. Dalam dahak pada suhu antara 30 - 37°C akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu
- i. Kuman dapat bersifat dorman (tidur/tidak berkembang)

4. Tuberculosis Resistensi Obat

TB Resistensi Obat anti TB (OAT) pada dasarnya adalah suatu fenomena buatan manusia, sebagai akibat pengobatan yang tidak adekuat dan penularan dari pasien TB MDR tersebut. Pengobatan yang tidak adekuat biasanya akibat dari satu atau lebih dari kondisi berikut ini (Jurnal Tuberkulosis Indonesia, 2010) :

- a. Regimen, dosis, dan cara pemakaian yang tidak benar
- b. Ketidakteraturan dan ketidakpatuhan pasien untuk minum obat
- c. Terputusnya ketersediaan OAT
- d. Kualitas obat rendah

1. Fase-Fase Pengobatan TB MDR

- a. Fase Pengobatan Intensif

Fase Intensif adalah fase pengobatan dengan menggunakan obat injeksi (kanamisin atau kapreomisin) yang digunakan sekurang-kurangnya 6 bulan atau 4 bulan setelah terjadi konversi biakan.

b. Fase rawat inap di Rumah Sakit 2-4 minggu

Pada fase pengobatan ini, pengobatan dimulai dan pasien diamati untuk :

- 1) Menilai keadaan pasien secara cermat
- 2) Tatalaksana secepat mungkin bila terjadi efek samping
- 3) Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang intensif

c. Fase rawat jalan

Selama fase intensif baik obat injeksi dan obat minum diberikan oleh petugas kesehatan dengan disaksikan PMO kepada pasien. Pada fase rawat jalan ini obat oral ditelan di rumah pasien hanya pada hari libur.

d. Fase Pengobatan Lanjutan

- 1) Fase setelah pengobatan injeksi dihentikan
- 2) Fase lanjutan minimum 18 bulan setelah konversi biakan
- 3) Pasien yang memilih menjalani pengobatan di RS Rujukan TB MDR mengambil obat setiap minggu dan berkonsultasi dengan dokter setiap 1 bulan
- 4) Perpanjangan lama pengobatan hingga 24 bulan diindikasikan pada kasus-kasus kronik dengan kerusakan paru yang luas

F. Metode Pengujian Tuberkulosis

Metode kultur cair MODS (*Microscopic-observed drug susceptibility assay*) akhir-akhir ini diketahui bisa untuk diagnosis TB secara lebih cepat dibanding metode kultur lain dengan harga yang lebih murah. Metode kultur cair yang disebut dengan MODS ini ditemukan oleh Luz Caviedes saat melakukan eksperimen di laboratorium di Lima, Peru. MODS ini dikembangkan berdasarkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. *M. Tuberculosis* tumbuh lebih cepat pada media cair daripada media padat.
2. Pada media cair, *M.Tuberculosis* tumbuh dengan karakteristik *tangles and cording*, yaitu membentuk *cord factor*, yang dapat terlihat di bawah mikroskop.
3. Penambahan obat-obat anti-TB dalam media kultur sejak awal dapat digunakan sebagai tes sensitivitas sampel sputum sekaligus bersamaan (Caviedes & Moore, 2007).

Setelah ditemukan, metode ini diteliti lebih lanjut sebagai penelitian operasional di Peru dengan melibatkan 3760 sampel sputum dari pasien TB, suspek TB dan TB-HIV dan membandingkan tiga metode kultur yaitu MODS, automated technique dan kultur L-J. Hasilnya didapatkan sensitivitas untuk ketiga metode tersebut, secara berurutan 97,8%, 89% dan 84%. Waktu yang diperlukan untuk sampai konfirmasi hasil adalah 7 hari (MODS), 13 hari (automated technique) dan 26 hari (kultur L-J). Waktu untuk hasil sensitivitas obat adalah 7

hari (MODS), 22 hari (automated technique) dan 68 hari (kultur L-J) (Caviedes & Moore, 2007).

Metode MODS merupakan metode biakan untuk kuman *M. tuberculosis* dengan media *Middlebrook 7H9* yang sekaligus dapat mendeteksi kepekaan obat TB secara mikroskopik. Uji kepekaan tersebut difasilitasi dengan *Middlebrook 7H9* ditambah obat anti-TB. Metode MODS mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode biakan yang lain dan dapat mendeteksi lebih cepat pertumbuhan *M. tuberculosis* dengan biaya yang relatif lebih murah serta cara yang mudah (Dewi, 2011). Metode MODS dapat digunakan untuk mendiagnosis yang sensitif (DST), monoresisten dan multidrug resisten MDR) dengan cepat dibandingkan dengan pengujian konvensional. Metode MODS telah dilaporkan memiliki kepekaan 97,8%, dan spesifitas 99,6% (Hardy Diagnostics 2012).

Terdapat pula metode lain yang menggunakan medium padat yaitu metode Ogawa. Metode ini merupakan metode biakan yang banyak digunakan saat ini sebagai baku emas. Metode Ogawa lebih banyak digunakan di negara berkembang karena lebih ekonomis dan bahan yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga lebih murah dan lebih mudah dibuat dibandingkan dengan metode LJ. Kekurangan metode Ogawa adalah waktu yang diperlukan cukup lama untuk mendapatkan hasil yang positif (Dewi dkk. 2011).

G. Tinjauan Islam Tumbuhan dalam Bidang Kesehatan

Allah Swt menciptakan manusia dan alam semesta bukanlah tanpa sebab, melainkan agar manusia dapat mengambil hikmah dan manfaat semaksimal mungkin dari alam semesta. Manfaat tersebut baik digunakan untuk dikonsumsi maupun sebagai pengobatan. Firman Allah Swt yang menyatakan bahwa segala ciptaanNya dapat dimanfaatkan untuk manusia tertuang dalam QS. Al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama, 2013).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya yang meliputi segala-galanya dan menunjukkan kepada makhluknya betapa banyak karunia yang telah Dia berikan dengan menjadikannya sebagai bekal dan persediaan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) yang dimanfaatkan sebagai obat antibakteri alami.

Agar pemanfaatan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya diperlukan penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memiliki

validalitas yang tinggi. Perintah membaca pun tertuang dalam QS. Al-Alaq/96: 1, Allah Swt berfirman:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Terjemahan:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
(Kementrian Agama, 2013).

Kata *iqra'* berasal dari kata *qara'a* yang pada mulanya berarti *menghimpun*. Hal ini berarti pula *menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu*, dan sebagainya yang bermuara pada arti *menghimpun* (Shihab, 2009: 454). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi acuan kehidupan termasuk dalam mengobati berbagai penyakit.

Allah Swt dalam segala kekuasaannya mampu menurunkan penyakit kepada hambaNya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Atas keadilan dari Allah Swt kepada makhlukNya pula, Allah Swt menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan obat yang paling sempurna untuk berbagai macam penyakit. Penyakit tidak akan sanggup menanggungkan kalamullah (Al- Qur'an) bagi orang-orang yang yakin dan memahami kandungan Al-Qur'an sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ketauhidan, puji-pujian, kesempurnaan tawakkal, segala kekuasaanNya, dan permasalahan yang akhirnya berpulang hanya kepada Allah Swt serta berisikan

permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya kesembuhan dari penyakit. Dari uraian beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt dengan kekuasaannya menurunkan penyakit kepada makhlukNya, dan atas kekuasaannya pula Allah Swt yang menyembuhkan.

Sebagaimana Rasulullah Saw juga memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana dari Nabi Saw bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

“Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad alZubairiy menceritakan kepada kami, „Umar bin Sa“id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: „Atha“ bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk


pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qardhawi, 2002).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan semakin bertambah. Allah Swt. yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah yang memberi kesembuhan. Akan tetapi, Allah Swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya sehingga mendorong kesembuhan bagi yang mengidap penyakit.

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menyimpannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya.

Dengan demikian, khususnya bagi orang – orang yang berkecimpung di bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium berdasarkan pada model penelitian true experimental yakni masuk dalam bentuk *post test-only design*

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium HUM-RC Rumah Sakit Wahidin Makassar

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan juni – 13 september 2018

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu, penelitian kualitatif

C. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah autoklaf (*Hirayama*), bejana maserasi, chamber (*Lamag*), center glass, corong pisah, inkubator (*Memmert*), gelas kimia, gelas arloji, gelas ukur, Laminan Air Flower (LAF) (*ESCO*), lemari pendingin (*Modena*), mangkok, mikroskop, neraca analitik, vortex mixer, pipet mikro (*Socorex*), plat 24 well, rotary evaporator (*Heidolph*), sendok besi, timbangan analitik (*Kern*), dan vial

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah Air suling (Aquadestillata), Aluminium Klorida, Biakan Murni (*Mycobacterium tuberculosis*), Daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.), DMSO, Etanol, Etil Asetat, Kertas saring, *Middlebrook 7H9*, n-heksan, Nutrien OADC (oxalid acid, albumin, destrosa, dan katalase), Nutrient PANTA, Pereaksi (Liebermann-Buchard, FeCl_3 , Dragendroff)

D. Prosedur kerja

1. Penyiapan Sampel (ekstrak daun tembakau)

a. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 09.00 WITA. Daun yang digunakan adalah daun yang bagus, tidak rusak, tidak berjamur dan tidak berwarna kuning atau terlalu tua.

b. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun. Setelah itu sampel dirajang kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, terlindung dari sinar matahari kemudian diproses hingga menjadi simplisia.

2. Ekstraksi dengan metode Maserasi bertingkat

Sampel daun tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum* L) yang telah kering ditimbang sebanyak 800 g untuk di maserasi bertingkat menggunakan 3 pelarut yaitu n-heksan, etil asetat, etanol 96%, Sampel dimasukan kedalam bejana maserasi kemudian sampel direndam dengan pelarut n-heksan sebanyak 8000 ml.

Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam di tempat yang terlindung sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas di maserasi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama, dilakukan sebanyak 3 kali. Ekstrak n-heksan cair yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak n-heksan kental. Ampas diangin-anginkan untuk menghilangkan sisa pelarut. Ampas dimaserasi kembali menggunakan pelarut etil asetat sebanyak 8000 ml, dilakukan prosedur yang sama hingga diperoleh ekstrak etil asetat. Kemudian dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 8000 ml, dilakukan prosedur yang sama hingga diperoleh ekstrak etanol 96%. Selanjutnya sampel direfluks

3. Ekstraksi dengan Metode Refluks

Setelah proses maserasi bertingkat selesai dilakukan selanjutnya metode terakhir yaitu refluks dengan menggunakan pelarut aquades dilakukan selama 4 jam. Setelah itu sampel disaring dan dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ekstrak yang diperoleh kemudian diuapkan. Masing – masing ekstrak yang telah kering digunakan untuk diujikan ke *Mycobacterium tuberculosis*.

4. Uji Golongan Senyawa

a. Uji alkaloid

Ekstrak ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorff dan bagian berikutnya ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Mayer. Endapan merah bata yang terbentuk oleh pereaksi Dragendorf dan endapan putih oleh pereaksi Meyer menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Fransworth, 1996).

b. Uji Flavonoid

Ekstrak dilarutkan dalam 5 mL air panas, dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat yang didapat lalu ditambah bubuk Mg secukupnya, 1 ml asam sulfat pekat dan 2 mL etanol. Dikocok kuat dan biarkan terpisah. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan etanol menunjukkan adanya senyawa flavonoid (Tiwari, 2011).

c. Uji Triterpenoid

Ekstrak dilarutkan dalam kloroform dan disaring. Kemudian filtrat ditambahkan beberapa tetes asam sulfat dan dikocok. Terbentuknya warna kuning emas mengindikasikan adanya senyawa triterpen (Tiwari, 2011).

d. Uji Fenol

Ekstrak dilarutkan dengan 2 mL etanol 96% dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl. Terbentuknya warna hitam kebiruan mengindikasikan adanya senyawa fenol (Tiwari 2011).

5. Prosedur Pengujian Antituberkulosis

a. Pembuatan media cair MiddleBrook 7H9

Ditimbang 0,327 g *MiddleBrook 7H9* dan casitone 0,069 g kemudian dimasukkan dalam wadah, ditambahkan 0,172 ml gliserol ke dalam wadah dan dicukupkan dengan aquadest hingga 50 ml. dikocok sampai homogen, disterilisasi menggunakan autoklaf \pm 20 menit pada suhu 121 °C.

b. Pembuatan stok larutan ekstrak

Dibuat Larutan stok ekstrak 2000 ppm, kemudian di encerkan sebanyak 400 ppm, 800 ppm, 1200 ppm, 1600 ppm dan 2000 ppm lalu masing-masing dimasukkan ke dalam wadah vial. Ekstrak dilarutkan menggunakan aquadest for

injection sebanyak 500 µl ke dalam masing-masing vial, kemudian dihomogenkan dengan magnetik stinger. sampel disimpan sebagai larutan stok ekstrak.

c. Suspensi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*

Diambil larutan media cair *MiddleBrook7H9* sebanyak 25 ml, dan ditambahkan OADC 2,5 ml ; PANTA + 4 OADC 0,5 ml dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇RV sebanyak 1 ml, dan disuspensikan kedalam tabung steril yang berisi 25 ml media *MiddleBrook7H9* dan dihomogenkan.

d. Metode MODS (Microscopically Observed Drug Susceptibility)

Disiapkan plate 24 well untuk strain H₃₇RV. Dipipet 50 µl DMSO kemudian ditambahkan ke plate H₃₇RV (masing-masing duplo) sebagai kontrol negatif. Dipipet 50 µl obat Isoniazid kemudian ditambahkan ke plate H₃₇RV (masing-masing duplo) sebagai kontrol positif. Selanjutnya dipipet 50 µl setiap konsentrasi ekstrak uji kedalam masing-masing well H₃₇RV (masing-masing duplo) kecuali kontrol. Setelah itu, ditambahkan 950 µl suspensi bakteri kedalam seluruh well pada plate lalu dihomogenkan. Kemudian diinkubasi selama 7 hari dengan suhu 30 °C dan diamati pada mikroskop (Marieke et al. 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil ekstraksi 800 g simplisia daun tembakau (*Nicotiana tabacum L*) menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat, etanol 96% dan air.

1. Ekstraksi Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L*)

Tabel 1. Hasil ekstraksi daun tembakau (*Nicotiana tabacum L*)

Simplisia 800 g	Bobot Ekstrak	% Rendamen
n-Heksan	22,4 g	2,8 %
Etil Asetat	21,4 g	2,67 %
Etanol 96%	39,5 g	4,94 %
Air	20,2 g	2,52 %

2. Hasil Uji Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L*) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Pengujian aktivitas antibakteri beberapa ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum L*) terhadap bakteri uji *Mycobacterium tuberculosis* sebagaimana yang tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak n-hexan Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*) terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Perlakuan	Ekstrak N-Hexan		Keterangan
	1	2	
Kontrol -	-	-	Tidak menghambat
Kontrol +	++	++	Menghambat
Konsentrasi 2000 ppm	+	+	Menghambat lemah
Konsentrasi 1600 ppm	-	-	Tidak Menghambat
Konsentrasi 1200 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 800 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 400 ppm	-	-	Tidak menghambat

Tabel 3. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Etil Asetat Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*) terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Perlakuan	Ekstrak Etil Asetat		Keterangan
	1	2	
Kontrol -	-	-	Tidak menghambat
Kontrol +	++	++	Menghambat
Konsentrasi 2000 ppm	+	+	Menghambat lemah
Konsentrasi 1600 ppm	-	-	Tidak Menghambat
Konsentrasi 1200 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 800 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 400 ppm	-	-	Tidak menghambat

Tabel 4. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Etanol 96% Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L*) terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Perlakuan	Ekstrak Etanol 96%		Keterangan
	1	2	
Kontrol -	-	-	Tidak menghambat
Kontrol +	++	++	Menghambat
Konsentrasi 2000 ppm	+	+	Menghambat lemah
Konsentrasi 1600 ppm	-	-	Tidak Menghambat
Konsentrasi 1200 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 800 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 400 ppm	-	-	Tidak menghambat

Tabel 5. Hasil Uji Antituberkulosis Ekstrak Air Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L*) terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Perlakuan	Ekstrak Air		Keterangan
	1	2	
Kontrol -	-	-	Tidak menghambat
Kontrol +	++	++	Menghambat
Konsentrasi 2000 ppm	+	+	Menghambat lemah
Konsentrasi 1600 ppm	-	-	Tidak Menghambat
Konsentrasi 1200 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 800 ppm	-	-	Tidak menghambat
Konsentrasi 400 ppm	-	-	Tidak menghambat

Keterangan :

- : Ada pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* (banyak)
- + : Ada pertumbuhan (Sedikit)
- ++ : Tidak ada pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis*
- Kontrol + : Isoniazid
- Kontrol - : Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

3. Hasil Pengujian Skrining Fitokimia

Berdasarkan uji skrining fitokimia terhadap ekstrak daun tembakau, maka hasil yang didapatkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil uji skrining fitokimia ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L)

Ekstrak	Senyawa	Pereaksi	Hasil
N-heksan	Alkaloid	Dragendorf	Kuning (-)
	Terpenoid/ Steroid	LB	Kuning (-)
	Fenolik	FeCl ₃	Orange (-)
	Flavanoid	AlCl ₃	Kuning (+)
Etil asetat	Alkaloid	Dragendorf	Hijau (-)
	Terpenoid/ Steroid	LB	Hijau (+) Steroid
	Fenolik	FeCl ₃	Hitam (+)
	Flavanoid	AlCl ₃	Bening (-)
Etanol 96%	Alkaloid	Dragendorf	Jingga (+)
	Terpenoid/ Steroid	LB	Coklat (+)
	Fenolik	FeCl ₃	Hitam (+)
	Flavanoid	AlCl ₃	Kuning (+)
Air	Alkaloid	Dragendorf	Jingga (+)
	Terpenoid/ Steroid	LB	Kuning (-)
	Fenolik	FeCl ₃	Hitam (+)
	Flavanoid	AlCl ₃	Coklat (-)

B. Pembahasan

Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.

Strain *Mycobacterium tuberculosis* H₃₇Rv adalah strain tuberkulosis yang paling banyak digunakan di laboratorium penelitian. Pertama kali diisolasi oleh Dr. Edward R. Baldwin pada tahun 1905. Seiring waktu, bakteri ini memiliki virulensi yang bervariasi pada hewan coba berdasarkan media yang ditumbuhkan. Koch pertama kali menemukan *Mycobacterium tuberculosis* sebagai penyebab tuberkulosis pada tahun 1892 namun strain yang diteliti tidak diawetkan dan merupakan genom pertama yang diterbitkan pada tahun 1998.

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen laboratorium berdasarkan pada model penelitian true eksperimental yakni masuk dalam bentuk *posttest-only design*. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Siswanto dkk, 2014).

Pada penelitian ini digunakan sampel daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L). Daun diambil dengan cara dipetik. Daun yang digunakan adalah daun yang bagus, tidak rusak, dan tidak berwarna kuning atau terlalu tua. Sampel yang telah diperoleh disortasi untuk dipisahkan dari pengotor atau yang bukan daun tembakau. Setelah itu sampel dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah cukup kering dilakukan perajangan atau dipotong kecil-kecil menjadi beberapa bagian

untuk mempermudah pengeringan selanjutnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperluas kontak antara sampel dan cairan penyari, sehingga mempermudah penyarian komponen kimia yang terdapat pada sampel. Tujuan pengeringan juga dimaksudkan untuk menghindari pertumbuhan mikroba ataupun jamur, sebagaimana diketahui bahwa media berair atau lembab lebih mudah ditumbuhi mikroba atau jamur.

Ekstraksi dilakukan dengan cara ekstraksi bertingkat menggunakan tiga pelarut n-heksan, etil asetat, etanol 96% dan metode refluks untuk pelarut air. Metode yang pertama yaitu maserasi bertingkat. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan simplisia tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Maserasi bertingkat maksudnya adalah proses dari maserasi yang menggunakan sampel yang sama secara berulang menggunakan pelarut yang berbeda. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. dimana ketiga pelarut yakni n-heksan, etil asetat, etanol 96 sedangkan pelarut air menggunakan metode refluks. Refluks adalah metode penyarian dengan cara cairan penyari dipanaskan hingga mendidih, penyari akan menguap ke atas melalui simplisia, uap penyari pengembun karena didinginkan oleh pendingin balik (kondensor). Embun turun melalui simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap berulang hingga pelarut jenuh.

Adapun prinsip dari metode maserasi adalah penyarian komponen zat aktif dari simplisia, dengan cara merendam simplisia dengan cairan penyari dalam wadah yang sesuai. Cairan penyari akan masuk ke dalam rongga sel melalui

dinding sel dan melarutkan zat aktif yang terdapat di dalam sel. Karena perbedaan konsentrasi antara zat aktif di luar dan di dalam menyebabkan terjadinya difusi sehingga zat aktif di dalam sel akan keluar sel. Demikian seterusnya sampai terjadi kesetimbangan (Ditjen POM. 2000). Maserasi bertingkat bertujuan untuk memisahkan antara ekstrak polar, ekstrak semipolar, dan ekstrak nonpolar. Setelah proses maserasi berakhir sampel lalu diuapkan dengan cara refluks. Prinsip dari metode refluks yaitu, penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara memasukkan sampel ke dalam labu alas bulat beserta cairan penyari kemudian dipanaskan, uap-uap cairan penyari akan terkondensasi pada kondensor menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna (Ditjen POM. 2000). Refluks bertujuan untuk menarik sisa-sisa komponen kimia yang belum tertarik oleh cairan sebelumnya.

Ekstraksi daun tembakau digunakan sebanyak 800 gram. Pertama-tama simplisia daun tembakau dimaserasi menggunakan cairan penyari n-heksan selama 2 x 24 jam. Setelah itu, simplisia diangin-anginkan untuk menguapkan sisa cairan penyari yang terdapat pada simplisia. Maserasi kedua menggunakan cairan penyari etil asetat selama 2 x 24 jam. Selanjutnya simplisia diangin-anginkan kembali. Maserasi ketiga menggunakan cairan penyari etanol 96% selama 2 x 24 jam, kemudian simplisia diangin-anginkan kembali. Selanjutnya, simplisia direfluks menggunakan aquadest selama 4 jam.

Setelah diperoleh hasil maserasi n-heksan, etil asetat, dan etanol 96%, maka dipekatan dengan menggunakan *Rotary evaporator*. Prinsip pemekatan ekstrak pada alat ini adalah dengan memisahkan cairan penyari dengan pelarutnya berdasarkan titik didihnya, sehingga akan didapatkan ekstrak yang lebih pekat

atau ekstrak yang lebih kental. Sedangkan hasil dari maserasi air dipekatkan menggunakan water bath hingga didapatkan ekstrak yang lebih pekat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1. Hasil ekstraksi daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L), ekstrak yang diperoleh yaitu; ekstrak n-heksan 22,4 gram, ekstrak etil asetat 21,4 gram, ekstrak etanol 96% 39,5 gram, dan ekstrak air 20,2 gram.

Hasil ekstraksi kemudian di uji antituberkulosis menggunakan metode MODS. Dalam hal ini metode yang digunakan dalam uji antituberkulosis adalah metode *Microscopically Observed Drug Susceptibility*, disingkat MODS, karena pada metode ini memiliki beberapa kelebihan yaitu karena metode ini mudah, cepat, mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi, serta biaya yang relatif lebih murah, dan penggunaan media cair (*middlebrook 7H9*) sehingga bakteri lebih cepat tumbuh. Terdapat kandungan nutrisi pada media cair yaitu OADC (*oxalid acid, albumin, destrosa, dan katalase*) sebagai nutrisi pertumbuhan bakteri dan PANTA (*polymyxin, amphotericin B, nalidixic acid, trimethoprim and azlocillin*) sebagai antibiotik agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri lain, waktu pengerjaan berlangsung cepat, sekitar 7-14 hari. Dan dilakukan pengamatan langsung di bawah mikroskop.

Metode MODS merupakan metode biakan untuk kuman *Mycobacterium tuberculosis* dengan media *Middlebrook 7H9* yang sekaligus dapat mendeteksi kepekaan obat tuberkulosis secara mikroskopik. Uji kepekaan tersebut difasilitasi dengan *Middlebrook 7H9* ditambah obat antituberkulosis. Metode MODS mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode biakan yang lain dan dapat mendeteksi lebih cepat pertumbuhan *Mycobacterium*

tuberculosis dengan biaya yang relatif lebih murah serta cara yang mudah. Metode MODS dapat digunakan untuk mendiagnosis yang sensitif (DST), monoresisten dan multidrug resisten (MDR) dengan cepat dibandingkan dengan pengujian konvensional.

Metode MODS telah dilaporkan memiliki kepekaan 97,8%, dan spesifitas 99,6% (Hardy Diagnostics 2012). *Mycobacterium tuberculosis* yang digunakan adalah strain H₃₇R_V adalah strain tuberkulosis yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Bakteri ini pertama kali diisolasi oleh Dr. Edward R baldwin pada tahun 1905. Strain ini berasal dari seorang pasien berusia 19 tahun dengan penyakit tuberkulosis paru klinis di New-York. Seiring waktu, strain ini memiliki virulensi yang bervariasi. H₃₇R merupakan strain yang kurang ganas, H₃₇S merupakan strain yang ganas, dan H₃₇R_V merupakan strain yang lebih ganas. Media yang digunakan adalah media cair *middlebrook 7H9* yang mengandung *middlebrook, casitone, glycerol, dan aquadest* yang memiliki peran penting untuk pertumbuhan bakteri. Media cair dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dalam kurun waktu 7-14 hari. OADC sebagai nutrisi *Mycobacterium tuberculosis*. PANTA sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

Setelah pembuatan larutan uji dimana sampel dilarutkan dengan aquadest destilasi water, larutan uji kemudian ditambahkan kedalam well lalu diinkubasi. Setelah diinkubasi selama 7 hari kemudian diamati dengan mikroskop dan dilihat penghambatan pertumbuhannya.

Uji aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan, etil asetat, dan etanol 96% dan air kemudian diujikan pada bakteri *Mycobacterium tuberculosis* strain H₃₇R_V.

Pengujian skrining ini dilakukan tujuannya untuk mengetahui *ekstrak* aktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara mengamati pertumbuhan bakteri (cord) pada well dalam plate dengan dibuat konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 400, 800, 1200, 1600 dan 2000 ppm. Perbedaan konsentrasi dibuat untuk mengetahui tingkat efektivitas ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri. Dibuat Larutan stok ekstrak 1000 ppm, kemudian di encerkan sebanyak 500 ppm, dan 1000 ppm, lalu masing-masing dimasukkan ke dalam wadah vial. *Ekstrak* dilarutkan menggunakan dimetil sulfoksida sebanyak 500 μ l ke dalam masing-masing vial, kemudian dihomogenkan dengan magnetik stirrer. Sampel disimpan sebagai larutan stok *ekstrak*.

Adapun hasil yang didapatkan setelah inkubasi selama 7 hari yaitu menunjukkan bahwa kontrol negatif (-) dengan perlakuan + 50 μ l DMSO + 950 μ l media + *Mycobacterium tuberculosis* terdapat pertumbuhan bakteri yang banyak terlihat pada pengamatan mikroskop, untuk kontrol positif (+) dengan perlakuan + 50 μ l ddH₂O + obat isoniazid + 950 μ l media + *Mycobacterium tuberculosis* tidak terdapat pertumbuhan bakteri sama sekali. Adapun ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* adalah ke empat ekstrak yakni ekstrak n-heksan, etil asetat, dan etanol 96% dan air masing-masing pada konsentrasi 2000 ppm. Ekstrak tersebut menunjukkan adanya penghambatan yang cukup kuat pada pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* dilihat dari penampakan mikroskop dengan hasil telah nampak penghambatan pertumbuhan bakteri ditandai dengan jumlah cord yang lebih sedikit dibandingkan ke empat ekstrak yakni ekstrak n-heksan, etil asetat, dan etanol 96% dan air pada

konsentrasi 400 ppm , 800 ppm , 1200 ppm dan 1600 ppm tidak adanya penghambatan sama sekali terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis* Sehingga penghambatan pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* yang paling baik ditemukan pada masing-masing ekstrak pada konsentrasi 2000 ppm. Daya hambat dilihat dengan adanya pertumbuhan cord.

Cord atau biasa disebut dengan trehalosa dimikolat merupakan salah satu penyusun dinding sel merupakan salah satu penyusun dinding sel *Mycobacterium tuberculosis*. Cord terlibat dalam mekanisme imunomodulator utama yang bertanggung jawab untuk virulensi *Mycobacterium tuberculosis* (Simeao et al, 2009). Cord inilah yg terlihat dalam mikroskop, bentuknya seperti ekor.

Berdasarkan hasil penelitian pada Table 6. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak n daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) pada konsentarsi 2000 ppm yang memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis* tersebut mengandung senyawa sebagai berikut, ekstrak n-hexan mengandung senyawa flavanoid, ekstrak etil-asetat mengandung senyawa steroid dan fenolik, eksrtak etanol 96% mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, terpenoid, dan fenolik, sedangkan ekstark air mengandung alkaloid dan fenolik.

Sebagaimana Rasulullah Saw juga memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad alZubairiy menceritakan kepada kami, „Umar bin Sa“id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: „Atha“ bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).

menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menyimpannya. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan

eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qardhawi, 2002).

Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menyimpannya.

Jadi, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt. pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Pengobatan hukumnya mubah (dibolehkan) karena hal ini telah dilakukan oleh pemimpin kita Rasulullah Muhammad saw, sehingga sama sekali tidak perlu dipersoalkan untuk dilakukannya pengobatan (Shihab, 2011).

Dengan demikian, khususnya bagi orang – orang yang berkecimpung di bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa :

1. Ekstrak n-hexan, etil asetat, etanol 96% dan air dari daun daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* melalui pengujian yang dilakukan dengan metode MODS.
2. Ekstrak n-hexan, etil asetat, etanol 96% dan air dari daun daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) dengan masing-masing pada konsentrasi 2000 ppm menunjukkan aktivitas antituberkulosis yang hampir sama pada pengujian terhadap penghambatan *Mycobacterium tuberculosis*, tidak dibuktikan dari jumlah cord yang lebih sedikit setelah diamati di bawah mikroskop. Sedangkan pada konsentrasi 400 ppm, 800 ppm 1200 ppm dan 1600 ppm pada masing-masing ekstrak tidak terdapat penghambatan terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
3. Golongan senyawa yang terkandung pada ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum* L) setelah dilakukan identifikasi golongan yaitu ekstrak ekstrak n-hexan mengandung senyawa flavanoid, ekstrak etil asetat mengandung senyawa steroid dan fenolik, ekstrak etanol 96% mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, terpenoid, dan fenolik, sedangkan ekstrak air mengandung alkaloid dan fenolik.

F. Saran

Diharapkan adanya penelitian selanjutnya mengenai uji aktivitas antituberkulosis ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tabacum L*) dengan mempertimbangkan konsentrasi daya hambatnya pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA


- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press. 2007.
- Andareto, O. *Apotik Herbal di Sekitar Anda*, Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta. 2015.
- Atun, S. *Metode isolasi dan identifikasi stuktur senyawa organik bahan alam*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur. 2014.
- Caviedes L, Moore DA. *Introducing MODS: a low-cost, low-tech tool for high-performance detection of tuberculosis and multidrug resistant tuberculosis*. Indian J Med Microbiol. 2007.
- Dewi, S., Winarsih, S., dan Natasha, D.P., *Uji Efektivitas Kulit Buah Delima (Punica Granatum) Sebagai Antimikroba Staphylococcus aureus Penyebab Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak di Rumah Sakit dan Komunitas Secara In Vitro*. Malang : Universitas Brawijaya. 2011.
- Dini, et al. *The Potential Role Of Garlic (Allium Sativum) Against The Multi-Drug Resistant Tuberculosis Pandemic: A Review*. Institut Superiore di Sanita: Italy. 2011.
- Dirjen POM. *Pengawasan Obat dan Makanan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional*. Jakarta. 2000.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Penerbit ITB. Bandung. 1987.
- Hardy, *Fleming's Life Saving Discovery*, Hardy Diagnostics, Santa Maria. 2011.
- Hermanto, S., L. Sugoro, Ikmalia. *Profil Protein Escherichia coli Hasil Inaktivasi Iradiasi Gamma Sebagai Bahan Vaksin Mastitis*. Jurnal. Pusat Aplikasi Tenaga Isotop dan Radiasi BATAN. 2012.
- Joseph M Nguta et al. *Antimycobacterial and cytotoxic activity of selected medicinal plant extract*. University of Ghana. Ghana. 2016
- Kee, Joyce L., & Evelyn R. Hayes (Ed. Yasmin Asih, Skp.). *Farmakologi. Pendekatan Proses Keperawatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 1996.
- Kemenkes RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Bakti Husada. 2017.
- Kemenkes RI. *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2013*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. 2013.

- Kemenkes RI. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014.
- Kemenkes, R.I. *Petunjuk Teknis Manajemen TB Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2013
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013.
- Leba, Maria Aloisia Uron. *Ekstraksi Dan Real Kromatografi*. Deepublish: Yogyakarta. 2017.
- Listyanto. *Budidaya Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum L.) Menggunakan Pupuk Hayati Bio P 2000 Z. PT. Alam Lestari Maju Indonesia*. 2010.
- Martindale. *The Complete Drug Reference Thirty Sixth Edition*,: Pharmaceutical Press. London. 2009.
- Murwani Sri. *Dasar- Dasar Mikrobiologi Veteriner*. Universitas Brawijaya Press.Malang.2015
- Nursalam Hamzah, dkk. *Aktivitas Inhibisi Pertumbuhan Mycobacterium Tuberculosis dan Plasmodium Falciparum dari Ekstral Metanol Daun Botto-Botto (Chromolaena odorata Linn)*. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Rahul Shivaji et al. *Comparative Study Of Antimicrobial Compounds Extracted From Leaves Of Nicotiana Tabacum*.Departement of Microbiologi. India. 2015
- Ramadhani, Ikha. *Uji Aktivitas Antituberkulosis Fraksi Dan Ekstrak Etil Asetat Batang Brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) Secara In Vitro*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. 2015.
- Rusli, M. S, dkk. *Antibacterial activity of temanggung tobacco extract variety* Gadjah Kemloko. institute pertanian bogor: Bogor. 2011.
- Sudjadi. *Metode Pemisahan Edisi Pertama*. Yogyakarta : Kansius. 1988.
- Suharmiati dan Herti. *Khasiat Dan Manfaat Daun Dewa Dan Sambung Nyawa*. Agromedia Pustaka: Jakarta. 2003.
- Supardi S, Susyanty AL. *Penggunaan obat tradisional dalam upaya pengobatan sendiri di Indonesia (Analisis Data Susenas 2007)*. Buletin Penelitian Kesehatan. 2010.


- Suriyai Mohamad et al. *Antituberculosis potential of some ethnobotanically selected Malaysian plants*. School of Biological Sciences. Malaysia. 2010
- Susilowati, E. Y. *identifikasi Nikotin dari Daun Tembakau (Nicotiana tabacum) kering dan uji efektifitas ekstrak Daun Tembakau sebagai insektisida penggerak batang padi (Scirpopaga Innonata)*. Semarang: Universitas negeri semarang. 2006.
- Tiwari, P. B. *Phytochemical Screenig and Extraction : A Review. International Pharmaceutical Science. Internationale Pharmaceutica Sciencia*, 1(1), 98-106. 2011.
- Tresnaasih, Nanan. *Aktivitas Anti-Tuberkulosis Ekstrak Larut Etil Asetat Daun Kenikir (Cosmos Caudatus H.B.K) Secara In Vitro*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. 2017.
- WHO. *Global Tuberculosis Report*. World Health Organization. 2017
- Yahya, Rithoa. *Karakteristik Mikrobiologis Dan Aktivitas Antimikroba Susu Kuda Fermentasi Koumiss Terhadap Salmonella typhimurium Dan Mycobacterium tuberculosis*. Institut Pertanian Bogor: Bogor. 2012

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian




Lampiran 2. Skema Ekstraksi sampel (Ekstraksi Bertingkat).





Lampiran 3. Uji Aktivitas Antituberkulosis


a. Pembuatan Media cair *middlebrook* 7H9



b. Pembuatan larutan stok Uji ekstrak




c. Suspensi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

d. Metode MODS (*Microscopically Observed Drug Susceptibility*)

Lampiran 4. Skirining Fitokimia

a. Uji Tanin




b. Uji Fenolik




c. Uji Flavonoid



d. Uji Steroid



e. Uji Khumarin



Lampiran 5. Gambar Proses Ekstraksi



Gambar 3. Preparasi sampel

Keterangan :

1 : Daun Tembakau

2 : Perajangan

3 : Pencucian


4 : pengeringan



Gambar 4. Proses Ekstraksi

Keterangan :

- 1: Maserasi
- 2: Evaporasi Sampel




Gambar 5. Ekstrak Daun Tembakau

Keterangan :

- 1 : Ekstrak n-heksan
- 2 : Ekstrak etanol
- 3 : Ekstrak etil asetat
- 4 : Ekstrak air

Lampiran 6. Gambar Pengujian pada Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*




Gambar 6. Pengujian Pada Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Keterangan :

- A : Medium Middlebrook 7H9 pada metode MODS
- B : Proses pengujian ekstrak
- C : Plate yang berisi hasil ekstraksi, medium dan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*
- D : Pengamatan yang dilakukan pada mikroskop

Lampiran 7. Gambar Hasil Pengujian *Mycobacterium tuberculosis*




Gambar 7. Hasil Pengamatan Pengujian Kontrol Positif Dan Negatif Pengujian Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Keterangan :


A. kontrol positif

B. kontrol negatif




Gambar 8. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Air Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*
Keterangan :

- A : Ekstrak konsentrasi 400 ppm
- B : Ekstrak konsentrasi 800 ppm
- C : Ekstrak konsentrasi 1200 ppm
- D : Ekstrak konsentrasi 1600 ppm
- E : Ekstrak konsentrasi 2000 ppm



Gambar 9. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Etanol 96% Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
Keterangan :


- A : Ekstrak konsentrasi 400 ppm
- B : Ekstrak konsentrasi 800 ppm
- C : Ekstrak konsentrasi 1200 ppm
- D : Ekstrak konsentrasi 1600 ppm
- E : Ekstrak konsentrasi 2000 ppm



Gambar 10. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak n-hexan Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

Keterangan :

- A : Ekstrak konsentrasi 400 ppm
- B : Ekstrak konsentrasi 800 ppm
- C : Ekstrak konsentrasi 1200 ppm
- D : Ekstrak konsentrasi 1600 ppm
- E : Ekstrak konsentrasi 2000 ppm



Gambar 11. Hasil Pengamatan Pengujian Ekstrak Etil Asetat Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

- Keterangan :
 A : Ekstrak konsentrasi 400 ppm
 B : Ekstrak konsentrasi 800 ppm
 C : Ekstrak konsentrasi 1200 ppm
 D : Ekstrak konsentrasi 1600 ppm
 E : Ekstrak konsentrasi 2000 ppm

Lampiran 8. Perhitungan Pembuatan Seri Konsentrasi

1. Pembuatan larutan stok

$$\text{Stok } 2000 \text{ ppm} = \frac{20.000 \mu\text{g}}{10 \text{ ml}} = \frac{20 \text{ mg}}{10 \text{ ml}}$$

a. Untuk konsentrasi 400 ppm (dibuat dalam 5 ml)

$$\begin{aligned} V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 2000 \text{ ppm} &= 5 \text{ ml} \times 400 \text{ ppm} \\ V_1 &= \frac{5 \text{ ml} \times 400 \text{ ppm}}{2000 \text{ ppm}} \\ V_1 &= \frac{2000 \text{ ml}}{2000} \\ V_1 &= 1.0 \text{ ml (dicuplik dari stok) + 4.0 ml Air Steril} \end{aligned}$$

b. Untuk konsentrasi 800 ppm (dibuat dalam 5 ml)

$$\begin{aligned} V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 2000 \text{ ppm} &= 5 \text{ ml} \times 800 \text{ ppm} \\ V_1 &= \frac{5 \text{ ml} \times 800 \text{ ppm}}{2000 \text{ ppm}} \\ V_1 &= \frac{4000 \text{ ml}}{2000} \\ V_1 &= 2,0 \text{ ml (dicuplik dari stok) + 3,0 ml Air Steril} \end{aligned}$$

c. Untuk konsentrasi 1200 ppm (dibuat dalam 5 ml)

$$\begin{aligned} V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\ V_1 \times 2000 \text{ ppm} &= 5 \text{ ml} \times 1200 \text{ ppm} \\ V_1 &= \frac{5 \text{ ml} \times 1200 \text{ ppm}}{2000 \text{ ppm}} \\ V_1 &= \frac{6000 \text{ ml}}{2000} \\ V_1 &= 3,0 \text{ ml (dicuplik dari stok) + 2,0 ml Air Steril} \end{aligned}$$

d. Untuk konsentrasi 1600 ppm (dibuat dalam 5 ml)

$$\begin{aligned}V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\V_1 \times 2000 \text{ ppm} &= 5 \text{ ml} \times 1600 \text{ ppm} \\V_1 &= \frac{5 \text{ ml} \times 1600 \text{ ppm}}{2000 \text{ ppm}} \\V_1 &= \frac{8000 \text{ ml}}{2000} \\V_1 &= 4,0 \text{ ml (dicuplik dari stok) + 1,0 ml Air Steril}\end{aligned}$$

Sisa dari larutan stok digunakan untuk pengujian pada konsentrasi 2000 ppm.



BIOGRAFI



Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah dalam keadaan teman - teman membaca biografi ini juga awalan yang sangat luar biasa yang saya rasakan dengan menuliskannya lewat perkenalan.

Rudy Adyaksyah itulah nama lengkap saya, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Mamuju 02 Desember 1995, adalah mahasiwa Farmasi Fakultas Kedokteran

Dan Ilmu Kesehatan, salah satu jurusan favorit yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebelum masuk kuliah di UIN Alauddin Makassar riwayat penddikan saya adalah bersekolah di SDN Inpres Rimuku, SMPN 02 Mamuju dan SMAN 1 Mamuju, Menjadi seorang mahasiswa sejak peralihan jadi siswa adalah hal unik dan menyenangkan yang dibalut dalam tanggungjawab besar dari amanah orang tua dikampung dan bagi bangsa ini, bagaimana tidak kita yang sejatinya adalah agen perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat juga menjadi tanggung jawab besar kepada kedua orang tua yang menginginkan anaknya menjadi mahasiswa yang sukses menempuh kuliahnya tepat waktu dan berjalan lancar. Menjadi seorang mahasiswa sangatlah luar biasa disini ada begitu banyak cerita yang menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan- kehidupan yang akan datang. Semangat berjuang dan berproses. Allahuakbar !!!