

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “H”
DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI GAWAT JANIN
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TANGGAL 23-30 JULI
TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

SRI HASMIKA LESTARI

NIM. 70400115041

**JURUSAN DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Hasmika Lestari**

Nim : 70400115041

Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 16 Mei 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Benteng Somba Opu

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “H”
dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23-30 Juli
Tahun 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa Agustus 2018

Sri Hasmika Lestari
NIM: 70400115041

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sri Hasmika Lestari
Nim : 70400115041
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "H" dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Gawat Janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 23-30 Juli 2018.


Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.SiT, M.Keb


dr. Andi Tihardimanto, M.Kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "H" Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Gawat Janin Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Pada Tanggal 23-30 Juli Tahun 2018. Yang disusun oleh Sri Hasmika Lestari NIM : 70400115041, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Agustus 2018 M
08 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb**

Pembimbing I : **Anieq Mumtiah Al-kautzar, S.SiT, M.Keb**

Pembimbing II : **dr. Andi Tihardimanto, M.Kes**

Penguji I : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb**

Penguji II : **Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assaalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) Disertai Gawat Janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 23-30 Juli Tahun 2018”**. Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Sembah sujudku kepada orang tuaku tercinta yang tiada hentinya selalu memberi do'a dan dukungan kepada saya, ayahanda Abdul Rasyid dan ibunda Jaharia.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan
5. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang senangtiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
6. Bapak dr. Andi Tihar Dimanto M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb, selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Bapak ustadz Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.pd selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
11. Kepada saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

12. Kepada sahabatku tercinta Andi Aisyah Dzati Iffa, Nurlinda, Indah Damayanti, Suriati, Asmidar yang selalu membantu, mendo'akan dan memberi motivasi dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi-Nya.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "*Innamal a'malu bin niyyah*" (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata, Agustus 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Ruang lingkup penulisan	4
C. Tujuan penulisan	4
D. Manfaat penulisan	6
E. Metode penelitian	7
F. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang KPD	12
1. Pengertian KPD.....	12
2. Insiden KPD	13
3. Etiologi KPD.....	14
4. Faktor resiko KPD	16
5. Mekanisme pecahnya selaput ketuban	16
6. Tanda dan gejala KPD	18
7. Penilaian klinis KPD	18

8. Pemeriksaan penunjang KPD.....	21
9. Prognosis KPD.....	22
10. Penanganan KPD.....	23
B. Tinjauan tentang Gawat Janin.....	24
1. Pengertian gawat janin.....	24
2. Etiologi gawat janin.....	25
3. Diagnosis gawat janin.....	26
4. Penatalaksanaan Gawat janin.....	28
C. Tinjauan Islam terkait KPD.....	29
D. Teori Manajemen Kebidanan.....	35
BAB III STUDI KASUS	
KALA I.....	48
1. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	48
2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	59
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	65
4. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi.....	67
5. Langkah V. Rencana tindakan.....	67
6. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	71
7. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	74
KALA II.....	75
1. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	75
2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	76
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	77
4. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi.....	77
5. Langkah V. Rencana tindakan.....	77
6. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	83
7. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	87
KALA III.....	88
1. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	88

2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	88
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	89
4. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	89
5. Langkah V. Rencana tindakan	89
6. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan	93
7. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan	95
KALA IV.....	96
1. Langkah I. Identifikasi data dasa	96
2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	96
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	97
4. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	97
5. Langkah V. Rencana tindakan	97
6. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan	99
7. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan	102
8. Pendokumentasian SOAP	103
BAB IV PEMBAHASAN.....	154
BAB V PENUTUP.....	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penatalaksanaan KPD	24
Tabel 3.1 Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu.....	50
Tabel 3.2 Observasi TD, Nadi, Suhu, DJJ, His.....	72
Tabel 3.3 Observasi TD, Nadi, Suhu, DJJ, His.....	73
Tabel 3.4 Evaluasi jumlah perdarahan	100
Tabel 3.5 Observasi TTV, TFU, Kontraksi uterus dan Kandung kemih pasca persalinan.....	101
Tabel 3.6 Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang lalu.....	105
Tabel 3.7 Observasi TD, Nadi, Suhu, DJJ, His.....	114
Tabel 3.8 Observasi TD, Nadi, Suhu, DJJ, His.....	115
Tabel 3.10 Observasi TTV, TFU, Kontraksi uterus dan Kandung kemih pasca persalinan	129
Tabel 3.11 Kunjungan rumah.....	142
Tabel 3.12 Apgar <i>Score</i>	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ketuban pecah dini.....	13
Gambar 2.2 Perubahan keadaan serviks.....	15



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Partograf
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran III : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran IV : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran V : Surat Keterangan Selesai Penelitian dan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2018

SRI HASMIKA LESTARI, 70400115041

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Pembimbing II : Andi Tihardimanto

Judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "H" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23-30 Juli Tahun 2018"

Ketuban Pecah Dini (KPD) atau *spontaneous/early/premature rupture of the membrane* (PPROM) adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu, yaitu pada pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. Sedangkan pada gawat janin terjadi bila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami hipoksia.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny "H" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil yang didapatkan pada manajemen asuhan kebidanan intranatal pada NY "H" dengan persalinan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018. Dengan dilakukannya penatalaksanaan yang sesuai pada kasus persalinan KPD disertai gawat janin dengan penatalaksanaan kala I sampai IV

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala I hingga kala IV semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Daftar Pustaka: 27 (2002-2016)

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini (KPD), Gawat Janin, 7 langkah varney.

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JULY 2018

SRI HASMIKA LESTARI, 70400115041

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Supervisor II : Andi Tihardimanto

Title : "The Intranatal Obstetric Care Management on Mrs. "H" with Premature Rupture of Membrane accompanied by Fetal Distress at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital on July 23-30, 2018"

The premature rupture of membrane or spontaneous/early/premature rupture of the membrane is a rupture of the membranes prior to the delivery, that is less than 3 cm at the opening of the cervix and less than 5 cm in multiparas. Whereas the fetal distress occurs when the fetus does not receive enough oxygen, so it experiences hypoxia.

This Scientific paper is aimed at implementing the Obstetric Care Management on Mrs. "H" with Premature Rupture of Membrane accompanied by the fetal distress at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 using a 7-step obstetric care management approach according to Helen Varney and documentation in the form of SOAP.

The results of the intranatal obstetric care management on Mrs. "H" with the Premature Rupture of Membrane accompanied by the fetal distress at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018, by applying an appropriate management in the delivery case of Premature Rupture of Membrane accompanied by the fetal distress from the first to the fourth stages of management.

The conclusions of a case study with the 7-step-Varney care management and documentation in the form of SOAP are all normally conducted without complications from the first to the fourth stages, no fetal and maternal complications or problems observed, and both the mother's and baby's conditions are well identified by the vital signs within the normal limits.

Bibliography: 27 (2002-2016)

Keywords: Premature Rupture of Membrane, Fetal Distress, 7-step-Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal dan sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga. Dalam hal ini asuhan kebidanan dalam persalinan bertujuan untuk melindungi keselamatan ibu dan Bayi Baru Lahir (BBL), memberi dukungan pada persalinan normal, mendeteksi dan penatalaksanaan komplikasi secara tepat waktu, serta memberi dukungan serta cepat bereaksi terhadap kebutuhan ibu, pasangan dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran bayi (Walyani dan purwoastuti, 2015 :3).

Ketuban Pecah Dini (KPD) atau *spontaneous / early / premature rupture of the membrane* (PPROM) adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu, yaitu pada pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. KPD sering kali menimbulkan konsekuensi seperti morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi terutama kematian perinatal yang cukup tinggi. Sebelum kematian janin yang dilahirkan akan mengalami asfiksia dan jika berlanjut akan mengalami kematian. Kematian perinatal yang cukup tinggi ini antara lain disebabkan karena kematian akibat kurang bulan dan kejadian infeksi yang meningkat karena partus tak maju, partus lama dan partus buatan yang sering dijumpai pada pengelolaan kasus KPD terutama pada pengelolaan konservatif (Mochtar, 2010 :255-256).

Menurut *World Health Organization* (WHO) memperkirakan, diseluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 ibu meninggal saat hamil atau bersalin salah satu penyebab kematian ibu adalah infeksi yang dapat disebabkan oleh KPD. Ketuban pecah dini merupakan komplikasi kehamilan 10% kehamilan aterm dan 4% kehamilan preterm. Angka kejadian KPD di dunia mencapai 12,3% dari total persalinan. Sebagian besar KPD terjadi di negara berkembang seperti di Asia (Syaifuddin, 2010 :5).

Menurut WHO (2013) angka kejadian KPD di Indonesia sebanyak 50-60% pada tahun 2013 sebanyak 35%. Insiden KPD di Indonesia berkisar 4,5%-7,6% dari seluruh kehamilan tahun 2011, sedangkan diluar negeri (di negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, India, insiden KPD antara 6%-12% (Nita, 2013 :211). Pada kehamilan dengan KPD sebagian besar kasus ditemukan mulut rahim yang belum matang, 30-40% mengalami gagal induksi sehingga diperlukan tindakan operasi, sedangkan sebagian lainnya mengalami hambatan kemajuan persalinan dengan resiko infeksi pada ibu dan janin. Kejadian amnionitis dilaporkan 15-23% pada penderita hamil dengan KPD (Erni, 2011 :122).

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012), memperlihatkan bahwa 54% dari kelahiran tidak mengalami komplikasi selama persalinan. Wanita yang mengalami persalinan lama dilaporkan sebesar 35% kelahiran, KPD lebih dari 6 jam sebelum kelahiran dialami oleh 15% kelahiran, perdarahan berlebihan sebesar 8%, dan demam sebesar 8%. Komplikasi lainnya dan kejang dialami juga pada saat persalinan (masing-

masing 5 dan 2%). Sementara itu, partus lama dan perdarahan merupakan dampak yang bisa ditimbulkan oleh KPD (SDKI, 2012).

Menurut survey yang dilakukan di Kabupaten Gowa bahwa kejadian KPD tahun 2008 sebanyak 248 kasus, tahun 2009 sebanyak 312 kasus, tahun 2010 sebanyak 384 kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 457 kasus. Hal ini berarti kejadian KPD di Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan (Dinkes Kabupaten Gowa, 2011 :25-29).

Berdasarkan data rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, pada tahun 2014 sebanyak 25 kasus dari 1956 ibu yang melahirkan, pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus dari 1804 ibu yang melahirkan dan pada tahun 2016 sebanyak 16 kasus dari 1578 ibu yang melahirkan, pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus dari 2012 ibu yang melahirkan. Selain itu, angka kejadian KPD di RSUD Syekh Yusuf Gowa merupakan peringkat kelima dari kasus patologi yang ada di kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf Gowa. Urutan peringkat tersebut yaitu: perdarahan, abortus, *preeklamsi*, *serotinus*, KPD, plasenta *previa*, persalinan *preterm*, dan *molahidatidosa*.

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam bidang kesehatan dari salah satu kasus obstetri yang menjadi penyebab terbesar dan berkaitan dengan persalinan prematur dan terjadinya infeksi *corioamnionitis* sampai *sepsis*. KPD termasuk salah satu penyebab infeksi, dan kematian ibu disebabkan oleh infeksi yaitu sebanyak 11%. Namun penyebab KPD belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi

adalah infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban ataupun *asenderen* dari vagina atau *serviks*.

Peran bidan dalam penanganan KPD dengan memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin secara tepat, cepat dan komprehensif, karena jika ibu bersalin dengan KPD tidak mendapat asuhan yang sesuai, maka resikonya akan berakibat pada ibu maupun janin. Dengan harapan setelah dilakukannya asuhan kebidanan yang cepat dan tepat, maka kasus ibu bersalin dengan KPD dapat di tangani dengan baik.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah ketuban pecah dini (KPD) dengan judul “Asuhan kebidanan intranatal pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018.

B. Ruang lingkup penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Manajemen Asuhan kebidanan pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa

C. Tujuan penulis

1. Tujuan umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny”H” dengan ketuban pecah dini disertai dengan gawat janin di rumah sakit syekh yusuf Kab. Gowa dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- b. Dilakukannya interpretasi data pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat Janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- c. Diidentifikasinya diagnosis potensial pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- d. Dilakukannya antisipasi penanganan segera pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- e. Direncanakannya tindakan asuhan kebidanan pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- g. Dilakukannya evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat jawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa

- h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ny”H” dengan Ketuban Pecah Dini disertai dengan Gawat janin di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa
- i. Didiskusikannya kesenjangan antara teori dengan kasus KPD disertai dengan gawat janin yang didapatkan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- j. Dilakukannya integrasi nilai-nilai ke-Islaman kepada pasien dengan kasus KPD disertai dengan gawat janin.

D. Manfaat penulisan

1. Manfaat akademik

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir

2. Manfaat ilmiah

Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan alam yang telah di peroleh khususnya tentang Ketuban Pecah Dini.

3. Manfaat praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program baik di Kemenkes, maupun pihak rumah Sakit Syekh Yusuf dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program upaya pencegahan ketuban pecah dini.

4. Manfaat bagi peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan ketuban pecah dini.

5. Manfaat bagi institusi

Merupakan input dalam memberikan bekal bagi mahasiswa agar berhasil dalam menetapkan manajemen asuhan kebidanan.

E. Metode penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode :

1. Studi kepustakaan

Mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet, antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan ketuban pecah dini, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/maslah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan evaluasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Anamnesa/wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan suami maupun keluarganya, bidan, dokter di kamar bersalin yang dapat membantu dan memberikan keterangan atau info yang dibutuhkan dalam pemberian asuhan kebidanan.

1. Data Subjektif

Data yang diperoleh dari klien, menanyakan riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

2. Data Objektif

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bidan, yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan inspekulo, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan suatu diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium dengan uji kertas nitrazin yang akan berubah warna menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihat adanya tanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan lain-lain.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah, sedangkan lenek digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing, baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk melancarkan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini tersusun dari BAB I (pendahuluan), BAB II (tinjauan pustaka), BAB III (studi kasus), dan pada BAB IV (pembahasan).

BAB I terdiri dari pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari tinjauan materi, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tentang KPD, tinjauan umum KPD menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

BAB III yaitu studi kasus yang akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosis/masalah aktual, identifikasi diagnosis/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

BAB IV terdiri dari pembahasan yang akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek

yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan dengan KPD disertai dengan Gawat Janin.

BAB V yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, yang memuat daftar literatur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ketuban Pecah Dini

1. Pengertian Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) atau ketuban pecah dini (KPD) atau ketuban pecah prematur (KPP) adalah keluarnya cairan dari jalan lahir/vagina sebelum proses persalinan (Fadlun, Feryanto, 2013,113). Sumber lain mengatakan bahwa KPD adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan (Sukarni dan Margareth, 2013 :251).

Khafidoh (2013:22) mendefinisikan KPD sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu atau sebelum adanya tanda-tanda persalinan pada trimester ke tiga. Sumber yang sama juga menjelaskan KPD sebagai salah satu masalah morbiditas ibu bersalin terbesar dari seluruh kasus patologis. Komplikasi yang terjadi pada KPD salah satunya adalah gawat janin. Ibu yang mengalami KPD harus dipercepat persalinannya agar terhindar dari komplikasi baik ibu maupun pada janin.

Di sisi lain Nugroho (2012:150) menyatakan KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan/sebelum inpartu, pada pembukaan < 4 cm (fase laten). Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD preterm adalah KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. KPD yang memanjang adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan.

KPD adalah komplikasi yang terlihat pada kehamilan. Sebagian penyebabnya tidak diketahui dan diikuti oleh PROM sebelumnya. Hal ini terlihat kebanyakan pada ibu rumah tangga. Kelompok usia 20-30 adalah kelompok yang paling sering terjadi KPD (Mishra dan joshy, 2015 : 147).

Gambar 2.1
Ketuban Pecah Dini



Sumber: Google Image

2. Insidensi

Insidensi KPD berkisar antara 8-10% dari semua kehamilan. Pada kehamilan aterm, insidensinya bervariasi antara 6-19%. Sedangkan pada kehamilan preterm, insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. KPD

berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Marmi dkk, 2016 : 103).

3. Etiologi


Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui.

a. Infeksi

Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan terjadinya KPD.

b. Servik yang inkompetensi, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada serviks uteri (akibat persalinan, curetage).

Gambar 2.2
Perubahan keadaan serviks



Sumber: Google Image

- c. Tekanan intra uterin yang tinggi atau meningkat secara berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, gemeli.
- d. Trauma yang didapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun amniosintesis menyebabkan terjadinya KPD karena biasanya disertai infeksi
- e. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang di dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah.
- f. Keadaan sosial ekonomi faktor lain

1. Faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan termasuk kelemahan jaringan kulit ketuban.
2. Faktor disproporsi antar kepala janin dan panggul ibu.
3. Faktor multi graviditas, merokok dan perdarahan antepartum.
4. Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat (Vitamin C).

(Nugroho, 2012 : 150-151).

4. Faktor resiko KPD

Pada sebagian besar kasus, penyebabnya belum ditemukan. Faktor yang disebutkan memiliki kaitan dengan KPD yaitu riwayat kelahiran prematur, merokok, dan perdarahan selama kehamilan. Beberapa faktor risiko dari KPD yaitu: Inkompetensi serviks (leher rahim), polihidramnion (cairan ketuban berlebih), riwayat KPD sebelumnya, kelainan atau kerusakan selaput ketuban, kehamilan kembar, trauma, serviks (leher rahim) yang pendek (>25mm) pada usia kehamilan 23 minggu, infeksi pada kehamilan seperti bakterial vaginosis (Norma dan Dwi, 2013 :248).

5. Mekanisme pecahnya selaput ketuban

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi *ekstraselular matriks*. Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen

menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah. Faktor risiko untuk terjadinya KPD adalah:

- a. Berkurangnya *asam askorbik* sebagai komponen kolagen 25
- b. Kekurangan tembaga dan *asam askorbik* yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal karena antara lain merokok.

Degradasi kolagen dimediasi oleh matriks metaloproteinase (MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease. Mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP dan TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstra seluler dan membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat menjelang persalinan.

Pada penyakit *periodontitis* dimana terdapat peningkatan MMP, cenderung terjadi KPD. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda, dan pada trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Pada trimester akhir terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya selaput ketuban pada kehamilan *aterm* merupakan hal yang fisiologis. KPD pada prematur disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina. KPD prematur sering terjadi pada *polihidromnion*, *inkompeten serviks*, *solusio plasenta* (Prawirohardjo, 2014 :678).

6. Tanda dan gejala KPD

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, kemungkinan cairan tersebut masih merembes atau menetes, adapun cirinya seperti pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi jika klien dalam keadaan duduk atau berdiri, maka kepala janin yang sudah terletak dibawah biasanya akan mengganjal atau menyumbat kebocoran untuk sementara. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut. Denyut jantung janin bertambah cepat yang merupakan tanda-tanda infeksi terjadi (Norma dan Dwi, 2013 :248-249).

7. Penilaian klinis KPD

Ada beberapa hal yang harus ditentukan untuk menganalisis bahwa cairan yang keluar merupakan cairan air ketuban. Adapun cara untuk menilai bahwa cairan yang keluar dari jalan lahir itu merupakan cairan air ketuban adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa adanya cairan yang berisi mekonium, verniks kaseosa, rambut lanugo, atau apabila telah terinfeksi akan berbau
- b. Inspekulo; lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis servikalis dan apakah ada bagian yang sudah pecah
- c. Gunakan kertas lakmus : Bila menjadi biru (basaa) adalah air ketuban, dan apabila menjadi merah (asam) adalah air kemih (urin)

- d. Pemeriksaan pH forniks posterior pada KPD pH adalah basa (air ketuban)
- e. Pemeriksaan histopatologi air (ketuban)
- f. Aborization dan sitologi air ketuban.

KPD berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan. Jarak antara pecahnya ketuban dan permulaan dari persalinan disebut periode laten = LP = *lag periode*. Semakin muda umur kehamilan maka akan semakin memanjang LP-nya. Sedangkan lamanya persalinan lebih pendek dari biasa, yaitu pada primi 10 jam dan multi 6 jam (Pranoto dkk, 2013 :126-127).

- g. Tentukan ada tidaknya infeksi, tanda-tanda infeksi : suhu ibu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, air ketuban keruh dan berbau. Pemeriksaan air ketuban dengan tes LEA (*Leukosit Esterase*), leukosit darah $> 15.000/\text{mm}^3$, janin yang mengalami *tachicardi*, mungkin mengalami infeksi *intra uterine*.
- h. Tentukan tanda-tanda *inpartu*, tentukan adanya kontraksi yang teratur, periksa dalam dilakukan bila akan dilakukan penanganan aktif (terminasi kehamilan) antara lain untuk melihat skor pelvile (Pudiastuti, 2012 :45-46).

Secara klinis diagnosis KPD tidaklah sulit untuk dibuat suatu anamnesis. Pada klien dengan keluarnya air seperti urine dengan tanda-tanda yang khas sudah dapat dinilai bahwa hal tersebut mengarah ke ketuban pecah dini. Untuk menentukan betul tidaknya ketuban pecah dini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Adanya cairan yang berisi mekonium (kotoran janin, verniks kaseosa (lemak putih), rambut lanugo (bulu-bulu halus) dimana bila telah terinfeksi akan tercium bau.
- b. Pemeriksaan inspekulo, lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis servikalis pada bagian yang sudah pecah atau terdapat cairan ketuban pada forniks posterior
- c. USG: volume cairan amnion berkuraang/oligohidramnion
- d. Terdapat infeksi genital (sistemik)
- e. Gejala chorioamnionitis

Secara umum dapat ditemukan pada ibu yaitu demam (takikardia), *uterine tenderness*, cairan amnion yang keruh dan berbau, leukositosis (peningkatan sel darah putih) meninggi, *leukosit esterase* (LEA) meningkat, kultur darah/urine. Pada bayi takikardia, kardiogram, profilbiofisik, volume cairan ketuban berkurang, dan pada cairan amnion yaitu tes cairan amnion, diantaranya dengan kultur/*gram stain*, fetal fibronectin, glukosa, leukosit esterase (LEA), dan sitokin. Jika terjadi chorioamnionitis, maka angka mortalitas neonatal 4x lebih besar, angka distres pernapasan, sepsis neonatal, dan perdarahan intraventrikular 3x lebih besar.

- a. Dilakukan tes valsava, tes nitrazin, dan tes fern.

Nilai normal pH cairan vagina adalah 4,5-5,5 dan normal pH cairan amnion 7,0-7,5.

- b. Dilakukan uji kertas lakmus/tes nitrazine

Jadi biru (basa): air ketuban dan jadi merah (asam): urine (Fadlun dan Feryanto, 2013 :114-115).

8. Pemeriksaan penunjang KPD

a. Pemeriksaan laboratorium

Cairan yang keluar dari vagina perlu diperiksa : warna, konsentrasi, bau dan pH nya. Cairan yang keluar dari vagina ini kecuali air ketuban mungkin juga urine atau sekret vagina.

Sekret vagina ibu hamil pH :4-5, dengan kertas nitrazin tidak berubah warna, tetap kuning.

1) Test lakmus (tes nitrazin), jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis). pH air ketuban 7-7,5, darah dan infeksi vagina dapat menghasilkan tes yang positif palsu.

2) Mikroskopik (tes pakis), dengan meneteskan air ketuban pada gelas objek dan dibiarkan kering. Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan daun pakis.

b. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri. Pada kasus KPD terlihat jumlah cairan ketuban yang sedikit. Namun sering terjadi kesalahan pada penderita oligohidromnion. Walaupun pendekatan diagnosis KPD cukup banyak macam dan caranya, namun pada umumnya KPD sudah bisa

terdiagnosis dengan anamnesa dan pemeriksaan sederhana (Norma dan Dwi, 2013 :250).

9. Prognosis

Pengaruh ketuban pecah dini terhadap ibu dan janin adalah:

a. Prognosis ibu

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu Infeksi intrapartum/dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, partus lama/ *dry labour*, perdarahan postpartum, meningkatkan tindakan operatif obstetri (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

b. Prognosis janin

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome*, hipotermia, gangguan makan neonatus, *retinopathy of prematurity*, perdarahan intraventrikular, *necrotizing enterocolitis*, gangguan otak (dan resiko cerebral palsy), hiperbilirubinemia, anemia, sepsis). Prolaps funiculi/penurunan tali pusat. Hipoksia dan asfiksia sekunder (kekurangan oksigen pada bayi), yang dapat mengakibatkan kompresi tali pusat, prolaps uteri, *dry labour*/partu lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan. Sindrom deformitas janin (terjadi akibat oligohidramnion diantaranya terjadi hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat). Morbiditas dan mortalitas perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115-116).

10. Penanganan ketuban pecah dini

Beberapa langkah dalam penatalaksanaan ketuban pecah dini adalah:

a. Konservatif

- 1) Rawat di rumah sakit
- 2) Beri antibiotika : bila ketuban pecah > 6 jam berupa : Ampisillin 4 x 500 mg atau Gentamycin 1 x 80 mg.
- 3) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.
- 4) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan (hal sangat tergantung pada kemampuan perawatan bayi premature).
- 5) Nilai tanda-tanda infeksi yaitu suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intrauterine.
- 6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid selama untuk memacu kematangan paru-paru janin.

b. Aktif

- 1) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan seksio sesaria.

Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam Dekstrose 5%, dimulai 4 tetes/menit, tiap $\frac{1}{4}$ jam dinaikkan 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/menit.

- 2) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan seksio sesaria.

- 3) Bila ada tanda-tanda infeksi: beri antibiotik dosis tinggi dan persalinan diakhiri (Kemenkes RI, 2013).

Penatalaksanaan KPD

KETUBAN PECAH

<37 MINGGU		≥ 37 MINGGU	
Infeksi	Tidak ada infeksi	Infeksi	Tidak ada infeksi
Berikan penisilin, gentamisilin dan metronidazol	Amoksilin + eritomisilin untuk 7 hari	Berikan penisilin, gentamisilin dan metronidazol	Lahirkan bayi
Lahirkan bayi	Steroid untuk pematangan paru	Lahirkan bayi	Berikan penisilin atau ampisilin

ANTIBIOTIKA SETELAH PERSALINAN

Profilaksis	Infeksi	Tidak ada infeksi
Stop antibiotik	Anjurkan untuk 24-48 jam setelah bebas nafas	Tidak perlu antibiotik

Sumber : Pudiastuti, 2012 : 47

B. Tinjauan Tentang Gawat Janin

1. Pengertian Gawat Janin

Gawat janin terjadi bila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi kronik (dalam jangka waktu lama), atau akut selama persalinan menunjukkan hipoksia (kurang oksigen) pada janin. Tanpa oksigen yang adekuat. Pengendalian frekuensi

denyut jantung janin secara fisiologis terdiri atas beragam mekanisme yang saling berkaitan dan bergantung pada aliran darah serta oksigenasi. Selain itu, aktivitas mekanisme-mekanisme pengendali ini dipengaruhi oleh keadaan oksigenasi sebelumnya, seperti tampak pada insupisiensi plasenta kronik (Rukiyah dan Yulianti, 2010 :276).

Purwanti dkk (2013:199) mendefinisikan gawat janin adalah suatu gangguan pada janin dapat terjadi pada masa antepartum atau intrapartum. Terjadi bila janin tidak menerima oksigen cukup, sehingga mengalami hipoksia. Menimbulkan bradikardia janin persistem (denyut jantung janin < 100 x/ menit) yang bila tidak diperbaiki akan menimbulkan dekompresi respon fisiologis dan menyebabkan kerusakan permanen SSP dan organ lain serta kematian.

2. Etiologi

Penyebab gawat janin yaitu terdiri dari berbagai hal baik dari faktor ibu maupun faktor janin sehingga memicu terjadinya gawat janin. Berikut ini adalah etiologi gawat janin:

a. Insufisiensi uteroplaster akut

Insufisiensi uteroplaster akut adalah kurangnya aliran darah uterus plasenta dalam waktu singkat. Hal tersebut biasanya akibat aktivitas uterus yang berlebihan, hiperkronik uterus, dapat dihubungkan dengan pemberian oksitosin; hipotensi ibu, dan kompresi vena cava pada posisi terlentang, perdarahan ibu, solusio plasenta dan plasenta previa.

b. Insufisiensi uteroplasenter kronik

Insufisiensi uteroplasenter kronik adalah kurangnya aliran darah uterus plasenta dalam waktu lama berupa penyakit hipertensi. Pada hipertensi khususnya preeklamsi dan eklamsi terjadi pasovasme yang merupakan akibat dari kegagalan infasi propoblas kedalam lapisan otot pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengalami kerusakan dan menyebabkan aliran darah ke plasenta menjadi terhambat dan menimbulkan hipoksia pada janin yang akan menjadikan gawat janin.

c. Diabetes militus

Pada ibu yang menderita DM maka kemungkinan pada bayi akan mengalami hipoglikemia karena pada ibu yang diabetes mengalami toleransi glukosa terganggu, dan sering kali disertai hipoksia.

d. Akibat lainnya adalah isoimunisasi Rh, posmaturitas atau dismaturitas, kompresi (penekanan tali pusat) (Rukiyah dan Yulianti, 2010 :276-277).

3. Diagnosis

Diagnosis gawat janin saat persalinan didasarkan pada denyut jantung janin yang abnormal. Diagnosis lebih pasti jika disertai air ketuban hijau dan kental/sedikit.

a. Adapun denyut jantung janin (DJJ) normal.

- 1) DJJ normal, dapat melambat sewaktu his, dan segera kembali normal setelah relaksasi

- 2) DJJ lambat (kurang dari 100/menit, saat tidak ada his, menunjukkan adanya gawat janin)
- 3) DJJ cepat (lebih dari 180/menit yang disertai takikardi ibu, dapat karena ibu demam, efek obat, hipertensi atau amnionitis. Jika denyut jantung ibu normal, denyut jantung janin yang cepat sebaiknya dianggap sebagai tanda gawat janin (Nugroho, 2012 :177-178)

b. Mekonium

Mekonium adalah kotoran atau feses yang dihasilkan bayi selama di dalam rahim.

Adanya mekonium pada cairan ketuban lebih sering terlihat saat janin mencapai maturitas dan dengan sendirinya bukan merupakan tanda-tanda gawat janin. Sedikit mekonium tanpa di barengi dengan kelainan ada denyut jantung janin merupakan suatu peringatan untuk pengawasan lebih lanjut.

Mekonium kental merupakan tanda pengeluaran mekonium pada cairan amniom yang berkurang dan merupakan indikasi terlihat persalinan dan merupakan indikasi perlunya persalinan yang lebih cepat dan penanganan mekonium pada saluran nafas atas neonatus untuk mencegah aspirasi mekonium.

Pada persentasi sungsang, mekonium dikeluarkan pada saat persalinan akibat kompresi abdomen janin pada persalinan. Hal ini

bukan merupakan tanda kegawatan kecuali jika hal ini terjadi pada awal persalinan (Rukiyah dan Yulianti, 2010).

4. Penatalaksanaan

a. Umum

Secara umum dapat diberikan penanganan seperti : pasien dibaringkan miring ke kiri, berikan oksigen, dan hentikan infus oksitosin (jika sedang diberikan).

b. Khusus

Jika DJJ diketahui tidak normal, dengan atau tanpa kontaminasi mekonium pada cairan amnion, lakukan hal seperti berikut:

- 1) Jika sebab dari ibu diketahui (seperti demam, obat-obatan) mulailah penanganan yang sesuai.
- 2) Jika sebab dari ibu tidak diketahui dan DJJ tetap abnormal sepanjang paling sedikit 3 kontraksi lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin: Jika terdapat perdarahan dengan nyeri yang hilang timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan solusio plasenta. Jika terdapat tanda-tanda infeksi (demam, sekret, vagina berbau tajam) berikan antibiotik untuk amnionitis. Jika tali pusat terletak di bawah bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan prolaps tali pusat .
- 3) Jika DJJ tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin (mekonium kental pada cairan amnion), rencanakanlah persalinan:

- a) Jika serviks telah berdilatasi dan kepala janin tidak lebih dari 1/5 di atas simfisis pubis atau bagian teratas tulang kepala janin pada stasion 0, lakukan persalinan dengan ekstraksi vakum.
- b) Jika serviks tidak berdilatasi penuh dan kepala janin berada lebih dari 1/5 di atas simfisis pubis atau bagian teratas tulang kepala janin berada diatas stasion 0, lakukan persalinan dengan seksio sesaria (Nugroho, 2012).

C. Tinjauan Islam terkait persalinan

Air ketuban merupakan suatu media yang sangat ajaib yang dibuat khusus oleh Allah untuk melindungi janin selama 9 bulan pada kehamilan normal. Ini adalah salah satu tanda kebesaran kuasa Tuhan.

Firman Allah dalam Qs. Al-Fatir Ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (*lawh Mahfuz*). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”

(Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2015).

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari pembuktian tentang kuasa Allah yang membangkitkan manusia. Di sini dinyatakan, setelah sebelumnya menegaskan kuasa Allah mengirimkan angin, lalu ia menggerakkan bahwa: *Dan, disamping hal tersebut menjadi bukti kuasa-Nya. Allah menciptakan asal usul kamu, yakni Adam as, dari tanah kemudian menciptakan kamu semua dari sperma yang asal usulnya pun bersumber antara lain dari makanan yang dihasilkan oleh tanah, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung janin dan tidak pula melahirkan anak melainkan dengan seizin dan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan tercatat dalam Kitab Lauh Mahfuz atau pengetahuan Allah. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah* (Shihab, 2002 : 30).

Firman Allah SWT dalam surah az-Zumar/39 : 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ
ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا تَحْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ
ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصَوِّرُونَ

Terjemahnya :

“Dia menciptakan kamu dari satu nafs kemudian Dia jadikan darinya pasangannya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan macam yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Milik-Nya semua kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat

dipalingkan?” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2015).

Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dia menciptakan kamu dari satu nafs* yakni Adam as. *Kemudian Dia jadikan dirinya* yakni nafs itu *pasangannya* yakni istrinya Hawwa dan *Dia menurunkan untuk kamu delapan macam berpasangan dari binatang ternak* yaitu unta, sapi, domba dan kambing. *Dia menjadikan kamu dalam perut* yakni rahim *ibu kamu kejadian demi kejadian* yang sangat mengagumkan yakni tahap demi tahap *dalam tiga kegelapan*. Kegelapan perut, rahim dan plasenta. *Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan pemelihara dan pembimbing kamu. Milik-Nya sendiri semua kerajaan, kepemilikan yang sempurna dan menyeluruh. Dia juga satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan penguasa dan pengendali alam raya dan yang herhak disembah selain Dia; maka bagaimana kamu wahai yang mempersekutukan-Nya dapat dipalingkan oleh satu dan lain hal? Sikap kamu itu sungguh merupakan sesuatu yang tidak masuk akal!* (Shihab, 2002 : 187-188).

Sebagaimana halnya firman Allah dalam QS. Yunus ayat 57 yang artinya “Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Di dalam kitab al-qur’an tersimpul pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Di dalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-ancaman-Nya. Ayat ini menyimpulkan tujuan-tujuan al-qur’an al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia pada 4

perkara, yaitu: *Mau'idzah* (nasehat) berupa pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka terbimbing mencintai yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat, sehingga pelajaran ini betul-betul dapat tergambar dalam perbuatan mereka. *Syifa'* (penyembuh) bagi penyembuh hati. *Huda* (sumber petunjuk) kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari i'tikad yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar beri'tikad yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti ke jalan Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas itu serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dihindarkan dan rahman bagi orang yang beriman.

Ibnu Katsir mengatakan :

Syifa bagi penyakit-penyakit dalam dada artinya penyakit syubhat, keraguan hatinya dibersihkan dari setiap najis dan kotoran.

Dalam QS. fussilat ayat 44 yang artinya “Dan jikalau kami jadikan Al-qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan : Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?. Apakah (patut Al-qur’an) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: Al-qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-qur’an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh.

Dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh bagi semua penyakit hati. Baik berupa penyakit syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau penyakit Syubhat. Yang mengotori aqidah dan keyakinan. Karena dalam Al-qur'an terdapat nasehat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman, yang akan memicu perasaan harap dan sekaligus takut, bagi para hamba.

Jika muncul dalam perasaannya, motivasi untuk berbuat baik, dan rasa takut untuk maksiat, dan itu terus berkembang karena selalu mengkaji makna al-qur'an, itu akan membimbing dirinya untuk lebih mendahulukan perintah Allah dari pada bisikan nafsunya. Sehingga dia menjadi hamba yang lebih mencari ridha Allah dari pada nafsu syahwatnya.

Ketika hati itu sehat, tidak banyak berisi penyakit syahwat dan syubhat, keadaannya akan diikuti oleh anggota badannya. Karena anggota badan akan jadi baik, disebabkan kebaikan hati. Dan menjadi rusak disebabkan rusaknya hati.

Dalam QS. Al-isra ayat 82 dijelaskan dan Kami turunkan dari Al-qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Demikian ayat di atas menegaskan bahwa semua kandungan Al-qur'an merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dalam QS. An-Nahl ayat_69 yang artinya "kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah

dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Pada ayat di atas, Allah swt meminta perhatian para hamba-Nya agar memperhatikan lebah. Allah telah memberikan instink kepada lebah sehingga mempunyai kemahiran untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan dari rumah-rumah yang didirikan manusia. Seorang yang mau memperhatikan bagaimana kemahiran lebah membuat sarangnya tentulah ia akan merasa heran karena takjub. Diambilnya bahan-bahan yang serupa lilin dari seludang ikan dan bunga-bunga kemudian dari bahan itu dibuatnya sarang-sarangnya yang sangat mengagumkan bentuknya.

Sesudah itu Allah swt meminta perhatian para hamba-Nya agar memikirkan bagaimana Allah telah memberikan kemahiran kepada para lebah itu mengumpulkan sari makanan dari berbagai macam buah-buahan dan bagaimana pula Allah swt memberikan ilham kepadanya sehingga lebah-lebah itu mempunyai kemampuan mengumpulkan sari-sari makanan dari buah-buahan dan diubahnya menjadi madu yang tahan dan awet tidak mudah busuk.

Di antara manfaat dari madu ialah sebagai obat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mungkin berguna sebagai ketahanan tubuh dan mungkin sebagai obat terhadap sesuatu penyakit. Hal ini dapat diterima oleh ilmu pengetahuan, karena madu itu termasuk sejenis makanan yang mudah dicerna dan banyak mengandung berbagai macam vitamin bahkan seluruh

macam vitamin berada dalam madu itu. Hal ini sangat berguna bagi ketahanan tubuh sehingga menyebabkan orang tahan terhadap berbagai macam penyakit. Di samping itu pula menjadi obat bagi seseorang yang sedang ditimpah oleh sesuatu penyakit, terutama bagi orang yang diserang beberapa penyakit kekurangan vitamin.

Dan dijelaskan pula dalam QS. Asy-syu'ara ayat 80 yang artinya “dan apabila aku sakit. Dialah yang menyembuhkan aku”.

Sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim, sekalipun pada kenyataannya berasal dari takdir Allah dan ketetapan-Nya, juga sebagai ciptaan-Nya, tetapi sengaja disandarkan kepada diri Ibrahim sebagai etika sopan santun terhadap Allah swt. pemberian nikmat dan hidayah disandarkan kepada Allah. Bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain-Nya yang dapat menyembuhkanku dengan berbagai macam saranaa pengobatan apa pun yang menjadi penyebab kesembuhan.

D. Manajemen kebidanan pada kasus persalinan dengan KPD dan Gawat

Janin

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah, dkk, 2014 : 125).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Heryani, 2011 : 111).

2. Tujuh langkah manajemen kebidanan

Langkah-langkah manajemen kebidanan menurut Varney (2002) adalah:

Langkah I : pengumpulan Data Dasar

Melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan secara akurat dengan kondisi klien. Pada kasus KPD disertai gawat janin data yang perlu dikumpulkan yaitu data subjektif dan objektif, dimana data subjektif adalah data utama yang diperoleh dari klien, menanyakan riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Selain itu, data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bidan, yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, pemeriksaan inspekulo, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan suatu diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium dengan uji

kertas nitrazin, kemudian pemeriksaan *ultrasonografi* (USG), dan pemeriksaan darah untuk melihat adanya tanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

Pada riwayat utama dilakukan pengkajian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut dapat berupa adanya pengeluaran air dari jalan lahir (pasien merasakan sejak kapan, berapa sering dan berapa banyak), dan ibu merasakan rasa nyeri saat janin bergerak. Sedangkan pada riwayat lainnya yaitu riwayat menstruasi (menarche, siklus, durasi), riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang (G P A, HPHT, HTP, Gestasi), riwayat KB, riwayat penyakit ginekologi, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu. Sedangkan pada kasus gawat janin kemungkinan yang didapatkan yaitu pergerakan janin berkurang/pergerakan janin terlalu sering.

Selain itu, data objektif pun termasuk data pendukung dalam asuhan kebidanan pada ketuban pecah dini disertai gawat janin. Data objektif dapat berupa hasil pemeriksaan umum ibu, kesadaran komposmentis, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan penunjang : uji kertas nitrazin/lakmus (apabila warna berubah menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion), pemeriksaan USG : untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam cavum uteri. Sedangkan pada kasus gawat janin kemungkinan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan bidan adalah DJJ : > 180/menit atau < 100/menit dan air ketuban keruh,

Langkah II : interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

Melakukan interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah. Berdasarkan interpretasi data yang akurat atas data-data yang telah dikumpulkan (Tresnawati, 2013)

Pada kasus KPD disertai gawat janin diagnosis ditegakkan dengan mengidentifikasi adanya data subjektif dan data objektif seperti pada langkah 1.

Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial dirumuskan berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Langkah ini memerlukan tindakan antisipasi. Diupayakan adanya tindakan pencegahan jika keadaannya dapat dilakukan, sambil mengobservasi kondisi pasien. Bidan dapat menyiapkan diri dan alat jika

diagnosis/masalah potensial ini benar-benar aktual terjadi (Pranoto dkk, 2013).

Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartum/dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, partus lama/*dry labour*, perdarahan postpartum (Caughey, 2008).

Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome*, hipotermia, gangguan makan neonatus, gangguan otak (dan resiko cerebral palsy), hiperbilirubinemia, anemia, sepsis). Prolaps funiculi/penurunan tali pusat.

Hipoksia dan asfiksia sekunder (kekurangan oksigen pada bayi), yang dapat mengakibatkan terjadinya gawat janin, kejang, kerusakan otak, asidosis, hipoksemia (tubuh kekurangan oksigen) gangguan paru-paru, lemah denyut jantung hingga pada tahap kematian bayi, skor APGAR rendah, Morbiditas dan mortalitas perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115-116).

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional/ logis. Kaji ulang diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

Langkah IV : Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Tindakan segera merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada kasus persalinan dengan KPD disertai gawat janin, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk tindakan induksi uterotonika dan pemberian antibiotik, berikan steroid untuk memacu kematangan paru-paru janin jika usia kehamilan 32-34 minggu, bila kehamilan > 35 minggu, dan apabila terjadi gawat janin pasien dibaringkan miring ke kiri, berikan oksigen, dan hentikan oksitosin (jika sedang terpasang).

Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien, agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Oleh karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama klien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya (Rukiyah dan Yulianti, 2012).

Adapun rencana asuhan yang diberikan pada klien dengan KPD disertai gawat janin yaitu memberikan penjelasan bahwa KPD dapat terjadi karena kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh. Sementara itu terjadinya gawat janin dikarenakan kurangnya suplay oksigen yang didapatkan janin. Menjelaskan pada klien bahwa akan dilakukan tindakan/penanganan seperti pemberian infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotik, berikan steroid untuk memacu kematangan paru-paru janin jika usia kehamilan 32-34 minggu, apabila terjadi gawat janin pasien dibaringkan miring ke kiri, berikan oksigen, dan hentikan oksitosin (jika sedang terpasang). Tujuan diberikan asuhan tersebut agar klien tetap semangat dan sabar dalam menghadapi pesalinan.

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan

Perencanaan merupakan rencana asuhan dan dilakukan dengan efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien dengan komplikasi, keterlibatan klien dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama secara menyeluruh.

Dalam manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghemat biaya serta akan meningkatkan mutu asuhan klien dengan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD disertai dengan gawat janin sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah VII ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien. Pada beberapa pertimbangan pada asuhan kebidanan dengan efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah. Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menghambat terhadap keberhasilan dari asuhan yang telah diberikan.

3. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP

Pendokumentasian merupakan catatan manajemen kebidanan tentang asuhan yang akan dan telah dilakukan pada klien. Pendokumentasian ini mencerminkan pola pikir seorang bidan secara sistematis dalam mengatasi keadaan pasien berdasarkan langkah-langkah dalam manajemen kebidanan.

Pendokumentasian dapat diterapkan dengan metode SOAP. Pada metode SOAP, S adalah data subjektif, O adalah data objektif, A adalah *analysis/assesment*, dan P adalah *planning*. Prinsip dari metode SOAP ini merupakan proses pemikiran penatalaksanaan manajemen kebidanan.

Subjektif (S)

Data subjektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesa. Data subjektif ini berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan pasien dari sudut pandang pasien.

- a. Ibu datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan adanya pengeluaran air dari jalan lahir (merasakan sejak kapan, berapa sering, berapa banyak)
- b. Ibu mengatakan rasa nyeri saat janin bergerak
- c. Hari pertama haid terakhir
- d. Ibu tidak mempunyai riwayat ginekologi

- e. Ibu tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan dan penyakit menular seksual.

Objektif (O)

Data objektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pada langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang didapatkan dari hasil pengamatan secara jujur, pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik lain. Data ini sebagai bukti gejala klinis pasien dan fakta yang menjadi data dasar dalam membuat diagnosis.

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. kesadaran composmentis
- c. Pemeriksaan TTV normal
- d. Pemeriksaan *Head to toe*

1. Mata

Inspeksi : sclera putih

Palpasi : konjungtiva merah muda

2. Wajah

Inspeksi : tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada oedema

3. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

4. Payudara

Inspeksi : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol,

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan

5. Abdomen

Inspeksi : pembesaran perut sesuai usia kehamilan,

Palpasi :

Leopold I : Menentukan TFU, LP, serta bagian tubuh apa yang terdapat dalam fundus uteri

Leopold II : Untuk menentukan dimana punggung janin dan dimana letak bagian-bagian kecil janin

Leopold III : Menentukan bagian terendah janin

Leopold IV : Menentukan bagian bawah dalam rahim dan seberapa masuknya bagian bawah tersebut ke dalam PAP

6. Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : Pemeriksaan dalam : vulva dan vagina, portio, pembukaan persentasi, penurunan, ketuban, molase, penumbungan, kesan panggul, pelepasan

7. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

8. Ekstremitas bawah

Inspeksi : tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema dan nyeri tekan

e. Tampak keluar cairan dari jalan lahir berbau khas, jernih

f. Pemantauan His dan DJJ

g. Pemeriksaan laboratorium : uji kertas lakmus

h. Pemeriksaan USG : untuk mengetahui jumlah air ketuban

Assesment (A)

Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) berdasarkan data subjektif dan objektif. Analisis/assesment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pada langkah kedua, ketiga dan keempat. Sehingga assesment terdiri dari: Diagnosis/masalah kebidanan/kebutuhan, diagnosis/masalah potensial, serta tindakan segera untukantisipasi diagnosis/masalah potensial.

Kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi sesuai kewenangan bidan. Tindakan tersebut terdiri atas: tindakan mandiri, tindakan kolaborasi, dan/atau tindakan rujukan.

Assesment : Ny "H" intrauterin, tunggal, hidup PUKA, situs memanjang, kepala, BDP, inpartu kala I fase laten dengan ketuban pecah dini disertai gawat janin.

Planning (P)

Menurut pranoto dkk (2013 : 324-327) *Planning*/perencanaan adalah membuat rancangan asuhan saat ini dan yang akan datang. Sedangkan Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data (Saleha, 2009).

1. Memberikan penjelasan pada klien bahwa KPD dapat terjadi karena kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh. Sementara itu terjadinya gawat janin dikarenakan kurangnya suplay oksigen yang didapatkan janin
2. Memberitahu ibu hasil dari pemeriksaan
3. Menjelaskan pada klien bahwa akan dilakukan tindakan/penanganan seperti pemasangan infus dan pemberian antibiotik
4. Mengajarkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut.
5. Menganjurkan ibu miring kiri atau miring kanan agar suplay oksigen ke janin tidak terhambat, berikan oksigen pada penanganan gawat janin.
6. Pemantauan DJJ pada gawat janin tiap 30 menit.
7. Pemantauan suhu untuk menilai adanya tanda-tanda infeksi

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “H”
GESTASI 37-38 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI
DISERTAI GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA TANGGAL 23-30 JULI 2018**

KALA I

Nomor Register : 44xxxx
Tanggal masuk rumah sakit : 23 – 07 – 2018 jam 08 : 05 wita
Tanggal pengkajian : 23 – 07 – 2018 jam 08 : 05 wita
Tanggal partus : 23 – 07 – 2018 jam 16 : 53 wita
Nama pengkaji : Sri Hasmika Lestari

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas ibu/ suami

Nama : Ny “H” / Tn “A”
Umur : 34 tahun / 29 tahun
Nikah/ lamanya : 1X / ± 3 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / SMA
Pekerjaan : Guru / Wiraswasta
Alamat : Romang polong

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. pada tanggal 23 Juli 2018, jam 04.00 wita (\pm 4 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang dan tidak ada kontraksi/his. Sebelum masuk di ruangan bersalin, ibu sebelumnya berada di IGD maternal dan tindakan yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan dalam dan pemasangan infus.

c. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari
5. Teratur/ tidak teratur : teratur
6. Sifat darah : encer
7. Disminore : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn "A" pada tahun 2015, saat Ny "H" berusia 30 tahun dan Tn "A" berusia 26 tahun.

Tabel. 3.1
Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

No.	Tahun	BBL	PBL	Jenis kelamin	Jenis persalinan	Penolong	Tempat bersalin	Keadaan
1	2016	2.400 gram	47 cm	perempuan	Normal	Bidan	RS	Baik

Sumber : Data Primer 2018

e. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan keatas.

f. Riwayat kehamilan sekarang

1. Hari pertama haid terakhir tanggal 02 november 2017
2. Hari taksiran persalinan tanggal 09 agustus 2018
3. Umur kehamilan 37 minggu 4 hari
4. Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
5. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
6. Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas samata

Trimester I :2x

Trimester II :2x

Trimester III : 2x

1. Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali

TT I : tanggal 22 maret 2018 di puskesmas samata

TT II : tanggal 25 april 2018 di puskesmas samata

Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah di pagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

2. Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

- g. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

1. Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
2. Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
3. Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
4. Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.

- h. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, asma dan penyakit keturunan lainnya.

- i. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

1. Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
2. Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
3. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
4. Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

j. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2016 ibu mulai menjadi akseptor KB suntik 3 bulan (depo progestin)

k. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan :

a) Pola makan : nasi, sayur, lauk

b) Frekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan minum : 6 – 8 gelas per hari

Selama inpartu : Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda.

b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning

Selama inpartu:

a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok

b) BAB : Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 05.30 di rumahnya)

3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore)
- b) Sikat gigi : 2 kali sehari
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

- a) Kebiasaan

Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

- b) Selama inpartu

Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan fisik (data objektif)

a. Pemeriksaan umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran composmentis
- 3) Hari taksiran persalinan tanggal 09 agustus 2018
- 4) Usia gestasi 37 minggu 4 hari
- 5) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

- Nadi : 80x/menit
- Suhu : 36,6 °C
- Pernapasan : 24x/menit
- 6) Tinggi badan : 157 cm
- 7) BB sebelum hamil : 51 kg
- 8) BB sekarang : 62 kg
- 9) Lingkar lengan atas (LILA) : 26 cm

b. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

1. Kepala

- Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam
- Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok dan tidak ada nyeri Tekan

2. Wajah

- Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah
- Palpasi : tidak teraba adanya *oedema*

3. Mata

- Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

4. Hidung

- Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret
- Palpasi : tidak ada *oedema*, tidak ada nyeri tekan tidak nampak adanya polip

5. Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6. Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan

7. Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan vena jugularis

8. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, hiperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol.

Palpasi : tidak teraba adanya massa dan nyeri tekan, kolostrum ada saat areola di tekan

9. Abdomen

Inspeksi : nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, nampak striae alba dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi dan otot perut kendur

- Palpasi :
- Leopold I : 3 jari dibawah *processus xiphoideus*, (tinggi fundus uteri 33 cm), teraba bokong
- Leopold II : punggung kanan (puka)
- Leopold III : Kepala
- Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)
- Lingkar perut : 92 cm
- Tafsiran berat janin : 3.036 gram
- Denyut jantung janin : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah dengan frekuensi 160 x/menit
- His : tidak ada
10. Genetalia
- Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban
- Palpasi : tidak ada benjolan tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan
11. Anus
- Inspeksi : tidak ada hemoroid
- Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
12. Ekstremitas
- Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan dalam

vaginal toucher (VT) tanggal 23 juli 2018, jam 08.25 wita

1. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
2. Portio : tebal/lunak
3. Pembukaan : 1 cm
4. Ketuban : jernih
5. Penurunan : hodge 1
6. Persentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
7. Penumbungan : tidak ada
8. Molase : tidak ada
9. Kesan panggul : normal
10. Pelepasan : air ketuban

d. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.30 wita

Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis

e. Pemeriksaan tes kertas lakmus

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.38 wita

Hasil pemeriksaan kertas lakmus yaitu kertas lakmus merah berubah menjadi biru yang menandakan adanya air ketuban (basa).

f. Pemeriksaan penunjang

1. Pemeriksaan USG

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.00 wita oleh dokter A Sp.OG di ruang USG

- a) GII PI A0, gravid tunggal, hidup
- b) Letak : kepala
- c) FHR : 168 kali per menit
- d) TBJ : 3.030 gram
- e) UK : ± 36-37 minggu, TP: ± 26 agustus 2018
- f) Plasenta di *posterofundal grade 1*
- g) Oligohidramnion

2. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.15 wita

- a) WBC : $13.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- b) RBC : $3.21 \times 10^3 \mu\text{L}$
- c) HGB : 10,5g/dl
- d) HCT : 29.05%
- e) MCV : 90.3fL
- f) MCH : 32.7pg
- g) MCHC : 36.2g/dL
- h) Protein : negatif
- i) Reduksi : negatif
- j) HbsAg : negatif

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

GII PI A0, gestasi 37 minggu 4 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD

1. GII PI A0

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan kehamilan yang kedua dan sebelumnya tidak pernah keguguran,

Data objektif : nampak linea nigra, striae alba dan otot perut sudah kendur, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data : Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 37 minggu 4 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir 02 november 2017

Data objektif : pemeriksaan Leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah *processus xiphoides*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 09 Agustus 2018, berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data : Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan sangat kuat saat ini dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil janin.

Analisa dan interpretasi data : Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa

nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin. (Baety, 2012 : 9).

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : -

Data objektif : Pada Leopold I, teraba bokong di fundus yang bulat dan lunak serta tidak melenting, pada Leopold II teraba punggung kanan, pada Leopold III teraba bagian bulat dan melenting (kepala), dan auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, dan semakin kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 160 kali per menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data : Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, sangat

kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu.

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya biasanya 12 kali dalam sehari.

Data objektif : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 160 kali per menit

Analisa dan interpretasi data : Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. janin dalam keadaan normal, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya 160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

6. Keadaan ibu dan janin

Dasar

Data subjektif : tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan

Data objektif : keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 160 kali per menit dan pemeriksaan *head to toe* konjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 10,5 g/dl menandakan ibu tidak anemia. konjungtiva merah muda, hemoglobin yang normal, tidak adanya oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

Analisa dan interpretasi data : Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin (DJJ) dalam batasan tidak normal menandakan keadaan ibu baik dan janin keadaan normal, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dl.

7. Inpartu kala I fase laten dengan KPD

Data subjektif : ibu mengatakan ada pengeluaran air hingga satu sarung basah.

Data objektif : pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, pada *vernix caseosa* dan berbau amis, belum ada kontraksi. Selain itu, ada pun hasil pemeriksaan lainnya antara lain:

a. Hasil pemeriksanan dalam jam 08.25 wita

- 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- 2) Portio : tebal/ lunak
- 3) Pembukaan : 1 cm
- 4) Ketuban : jernih
- 5) Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
- 6) Penurunan : hodge 1
- 7) Molase : tidak ada
- 8) Penumbungan : tidak ada
- 9) Kesan panggul : normal
- 10) Pelepasan : air ketuban

b. Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis.

c. Hasil pemeriksaan kertas lakmus yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

- a. Adanya pelepasan air pervaginam, jernih, dan terdapat *vernix caseosa* dengan bau amis yang menandakan telah terjadi pelepasan air ketuban
- b. Pemeriksaan inspekulo membuktikan terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis (Norma dan Dwi, 2013 :250).
- c. Pemeriksaan tes lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115).
- d. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya, dimana pada primipara pembukaan serviks kurang 3 cm, dan pada multipara kurang dari 5 cm (Mochtar, 2010 : 255).
- e. Dilatasi serviks 1-3 cm merupakan kala I fase laten (Aisyah dan Oktarina, 2012 :4).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal,
2. Pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR

rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah.

Data objektif : tampak pengeluaran air ketuban dari jalan lahir, warna jernih, ada *vernix caseosa* dan bau amis. pergerakan janinnya semakin lemah.

Analisa dan interpretasi data:

- a) KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruang rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada jalan lahir
- b) KPD memberi pengaruh/ komplikasi kepada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadi infeksi *intrapartum*/dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan, Masalah potensial yang akan terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome*, hipotermia, gangguan makan neonatus, *retinopathy of prematurity*, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*), *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy,

perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115-166).

**D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA /
KOLABORASI**

Kolaborasi dengan dokter:

1. Pemasangan infus RL 28 tetes per menit

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemberian oksitosin 1/5 ampul

Rasional : untuk membantu kontraksi uterus

3. Pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus

4. Injeksi antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV

Rasional : mencegah resiko terjadinya infeksi

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : KPD

2. Masalah potensial : potensial terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric*

(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, dan potensial terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematur, perdarahan intraventrikular, *enterocolitis necrotizing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

Tujuan:

- a. Persalinan dapat berlangsung dengan normal, keadaan ibu dan janin baik.
 - b. Mencegah terjadinya masalah potensial.
3. Kriteria
- a. Keadaan umum baik
 - b. TTV dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah normal
 - a) systole 100-120 mmHg

- b) diastole 60-90 mmHg
 - 2) Suhu normal 36,5 – 37,5 °C
 - 3) Nadi normal 60- 100x/ menit
 - 4) Pernapasan normal 16-24x/ menit
 - c. Kala I untuk multipara tidak lebih dari 7 jam dan untuk primipara 13 jam
 - d. Denyut jantung janin (DJJ) normal (120-160 kali per menit)
4. Rencana tindakan
- a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga
Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaannya dan memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.
 - b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)
Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga dapat mempermudah melakukan tindakan.
 - c. Observasi denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit
Rasional : saat ada kontraksi, denyut jantung janin (DJJ) bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat

diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

- d. Observasi *vaginal toucher* (VT) kontrol tiap 2 jam/ 4 jam, atau jika ada indikasi

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan.

- e. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks

- f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

- g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional:

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar
- 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu

- h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, oksitosin 1/5 ampul, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/ IV sesuai intruksi dokter

Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemasangan misoprostol dapat membantu pematangan serviks/ dilatasi serviks serta pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi.

- i. Berikan intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

- j. Menganjurkan kepada ibu untuk senang tiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Rasional : agar ibu berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018, jam 08:45 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

Tabel: 3.2**Observasi TD Suhu tiap 4 jam, nadi, DJJ dan His tiap 30 menit**

No.	Jam	TD (WITA) (mmHg)	Nadi (X/menit)	Suhu (axilla)	DJJ (X/menit)	His (Frekuensi-Durasi)
1	08.25	110/70	84	36.6	160	-
2	08.55		80		152	-
3	09.25		82		158	2x dalam 10 menit (25-30)
4	09.55		82		160	2x dalam 10 menit (25-30)
5	10.25		84		156	2x dalam 10 menit (25-30)
6	10.55		82		150	3x dalam 10 menit (30-35)
7	11.25		84		158	3x dalam 10 menit (30-35)
8	11.55		84		158	3x dalam 10 menit (30-35)

Sumber : Data Primer 2018

3. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 23 juli 2018 jam 12.25

wita

- a. Vulva dan vagina : normal
- b. Portio : tebal
- c. Pembukaan : 4 cm
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : Hodge II
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada

- i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his

Tabel: 3.3

Observasi TD, Suhu tiap 4 jam, nadi, DJJ dan His tiap 30 menit

No	Jam	TD (WITA) (mmHg)	Nadi (X/menit)	Suhu (axillah) (X/menit)	DJJ (X/menit)	His (Frekuensi-Durasi)
1	12.25	110/70	82	36.7	170	3x dalam 10 menit (30-35)
2	12.55		80		168	3x dalam 10 menit (35-40)
3	13.25		84		172	3x dalam 10 menit (35-40)
4	13.55		84		170	4x dalam 10 menit (35-40)
5	14.25		86		164	4x dalam 10 menit (35-40)
6	14.55		82		164	4x dalam 10 menit (40-45)
7	15.25		82		168	5x dalam 10 menit (40-45)
8	15.55		84		170	5x dalam 10 menit (40-50)
9	16.25	110/80	84	36.6	164	5x dalam 10 menit (40-50)

Sumber : Data Primer 2018

5. Segera memasang oksigen untuk ibu dalam jumlah 6-8 l/menit, kemudian hentikan pemberian cairan infus RL.

Hasil: Terlaksana

6. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 23 juli 2018, jam 16.10 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm
 - d. Ketuban : kering
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil dibawah symphysis
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : tidak ada
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir dan darah
7. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut
 8. menganjurkan ibu miring ke kiri agar suplay oksigen ke janin tidak terhambat
 9. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
 10. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
 11. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti
 12. Mencatat dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juli 2018, jam 16.10 wita

1. Keadaan ibu baik dan janin dalam pengawasan yang ditandai dengan:
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal:

Tekanan darah : 110/80 mmHg
 Suhu : 36,6°C (axilla)
 Nadi : 84 kali per menit
 Pernapasan : 22 kali per menit

b. Denyut jantung janin (DJJ) 170 kali permenit dan pergerakan janinnya semakin lemah

2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:

- a. His yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik
- b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 4 jam setelah *vaginal toucher* (VT) kedua dan penurunan kepala hodge IV
- c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
- d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : sakitnya bertambah kuat dan tembus ke belakang, ibu merasa ingin BAB, adanya dorongan kuat untuk meneran, serta adanya tekanan pada anus.

Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir dan darah.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 16.25 wita

1. Vulva dan vagina : membuka
2. Portio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm
4. Air ketuban : kering
5. Presentasi : ubun-ubun kecil dibawah sympisis
6. Penurunan : Hodge IV
7. Molase : tidak ada
8. Penumbungan : tidak ada
9. Kesan panggul : normal
10. Pelepasan : lendir dan darah

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa : perlangsungan kala II Masalah aktual : nyeri akibat kontraksi

Data subjektif : ada penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya sering dan bertambah sakit.

Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir dan darah.

Analisa dan interpretasi data:

Nyeri merupakan hal yang fisiologis yang dirasakan oleh ibu akibat adanya kontraksi yang justru akan mempercepat proses persalinan, tekanan yang hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu magedan yang berlangsung secara refleksi (Kuswanti dan Melina, 2014 : 13).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

Masalah potensial : tidak ada data penunjang

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa penyulit

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama \pm 10 menit tanpa ada penyulit

2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas tanpa bantuan, tidak bergerak dengan aktif, fleksi pada ekstremitas, dan seluruh badan berwarna merah muda.

Rencana tindakan: Tanggal 23 juni 2018, jam 16.25 wita

- a. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimperan meneran

- b. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah diri dari infeksi nosokomial

- c. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

- d. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi

- e. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

- f. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

- g. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

- h. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

- i. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

- j. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin dan DJJ abnormal (160-190 per menit)

- k. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin abnormal, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional : agar sedikit tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

- l. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.

Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

- m. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

- n. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

- o. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

- p. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

- q. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan Bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

r. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

s. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, di bawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum)

Rasional : dengan menyokong yang baik, maka akan mengurangi trauma dan mencegah terjadinya ruptur perineum

t. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional : membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

u. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi luar

v. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan

lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional : membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

w. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional : dengan teknik sanggah susur akan membantu pengeluaran tubuh bayi seluruhnya dan mencegah agar bayi tidak jatuh

x. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

y. Melakukan penilaian selintas :

1) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

2) Apakah bayi bergerak aktif ?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

z. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk

basah dengan handuk/ kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018, jam 16.25 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:
 - a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.
 - b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nalvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang
 - c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Di luar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, *handscoon*, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik.
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
 - a. Vulva dan vagina : membuka
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm
 - d. Air ketuban : kering

- e. Presentasi : ubun-ubun kecil di bawah symphysis
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : tidak ada
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir dan darah
9. Menceleupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
 10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
 11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam pengawasan, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
 12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
 13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
 14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan
18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dngan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).
20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.
21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di

bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.
24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)
25. Melakukan penilaian selintas :
 - a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
 - b. Apakah bayi bergerak aktif ?
26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juli 2018 , jam 16.53 wita

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit

Bayi lahir spontan Tanggal 23 juli 2018 , jam 16.53 wita menangis lemah, bernapas tanpa bantuan, bayi tidak bergerak aktif, terdapat fleksi pada ekstremitas dan APGAR *score* 7/10.

2. Perdarahan ± 220 cc
3. Terjadi ruptur tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

- Data subjektif : ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah
- Data objektif : bayi lahir spontan pada tanggal 23 Juli 2018, jam 16.53 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan \pm 220 cc, kala II berlangsung selama \pm 10 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

- Data subjektif : ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya
- Data objektif : bayi lahir spontan tanggal 23 juli 2018, jam 16.53 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih nampak di vulva.
- Analisa dan interpretasi data : Pada waktu kala III, volume uterus telah berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan

memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), keadaan ibu baik dan keadaan bayi lemah.
2. kriteria : Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit, plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) serta keadaan ibu baik dan keadaan bayi lemah.

Rencana tindakan : M A K A S S A R

Tanggal 23 juli 2018, jam 16.55 wita

- 1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

- 2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Rasional : mempercepat proses pengeluaran plasenta

- 3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus untuk pengeluaran plasenta

- 4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

- 5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan penggungtingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

- 6) Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

- 7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

9) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokrinal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

11) Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran

searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yg akan terjadi

19) Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juli 2018, jam 16.55 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
7. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi
8. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
9. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.
10. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial.
11. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangn tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
12. Melakukan peregangn dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).
13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

14. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.
16. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
18. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.
20. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi Tanggal 23 juli 2018, jam 17.03 wita

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap Tanggal 23 juli 2018, jam 17.03 wita
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat

4. Perdarahan kala III \pm 280 cc
5. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
6. Keadaan ibu baik dan keadaan bayi lemah.

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : kala III berlangsung \pm 10 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 23 juli 2018, Jam 17.03 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan \pm 280 cc dan kandung kemih kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya

Data objektif : kala III berlangsung \pm 10 menit, plasenta lahir lengkap tanggal Tanggal 23 juli 2018, jam 17.03 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan \pm 280 cc dan kandung kemih kosong

Analisa dan interpretasi data : Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum. Kelelahan disebabkan oleh penggunaan energi dan cairan yang banyak saat persalinan.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : kala IV berlangsung dengan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, kesadaran composmentis, dan tanda-tanda vital dalam batas normal
2. Kriteria : tidak terjadi perdarahan, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Rencana tindakan :

Tanggal 23 juli 2018, jam 17.18 wita

- 1) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Rasional : mencegah terjadinya perdarahan pervaginam

- 2) Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Rasional : agar kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

- 3) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 jam pada jam kedua pasca persalinan

Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

- 4) Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

- 5) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Rasional : agar bayi dalam keadaan aman dan nyaman

- 6) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

- 7) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

8) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DTT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

9) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

10) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Rasional : untuk membunuh kuman

11) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

12) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

13) Melengkapi partograf

Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juli 2018, jam 17.18 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

2. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan

Tabel: 3.4**Evaluasi Jumlah Pendarahan**

Jam ke	Waktu (wita)	Jumlah perdarahan
I	17.18	± 50 cc
	17.33	± 30 cc
	17.48	± 20 cc
	18.03	± 10 cc
II	18.33	± 10 cc
	19.03	± 10 cc

Sumber : Data Primer 2018

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Tabel: 3.5

Observasi TTV, TFU dan Kontraksi serta kandung kemih setiap 15 menit jam pertama dan 30 menit jam kedua pasca persalinan

Jam Ke	Waktu (wita)	TD (mmHg)	Nadi (X/menit)	Suhu (°C)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih
I	17.18	110/70	80	36,6	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.33	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.48	110/80	78		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	18.03	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong
II	18.33	110/70	80	36,6	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	19.03	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong

Sumber : Data Primer 2018

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.
6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

10. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
13. Melengkapi partograf.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juli 2018, jam 17.18 wita

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan \pm 130 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 110/70 mmHg Suhu : 36,6°C (axilla)

Nadi : 80x/ menit Pernapasan : 20x/ menit

5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan bayi baik

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY "H" DENGAN KETUBANPECAH DINI (KPD) DI SERTAI
GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 23-30 JULI 2018**

No register : 44xxxx

Tanggal masuk : 23 juli 2018 jam 08.05 wita

Tanggal pengkajian : 23 juli 2018 jam 08.05 wita

Tanggal partus : 23 juli 2018 jam 16.53 wita

Nama pengkaji : SRI HASMIKA LESTARI

Identitas istri/ suami

Nama : Ny "H"/ Tn A"

Umur : 34 tahun / 29 tahun

Nikah/ lamanya : 1x / ± 3 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : Guru / Wiraswasta

Alamat : Romang polong

A. KALA I

DATA SUBJEKTIF

1. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. pada tanggal 23 Juli 2018, jam 04.00 wita (\pm 4 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang dan tidak ada kontraksi/his. Sebelum masuk di ruangan INC, ibu sebelumnya berada di IRD dan tindakan yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan dalam dan pemasangan infus.

c. Riwayat menstruasi

- 1) Menarche : 13 tahun
- 2) Siklus : 28-30 hari
- 3) Lamanya : 5-7 hari
- 4) Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari
- 5) Teratur/ tidak teratur : teratur
- 6) Sifat darah : encer
- 7) Dismenore : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn "A" pada tahun 2015, saat Ny "H" berusia 30 tahun dan Tn "A" berusia 26 tahun

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

Tabel: 3.6**Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu**

No	Tahun	BBL	PBL	Jenis kelamin	Jenis persalinan	Penolong	Tempat bersalin	Keadaan
1	2016	2.400	47 cm	Perempuan	Normal	Bidan	RS	Baik

gram

Sumber: Data Primer 2018

f. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresibsetelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan ke atas.

g. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 02 november 2017
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 09 agustus 2018
- 3) Umur kehamilan 37 minggu 4 hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya berkurang dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
- 6) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas samata

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

- 7) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali

TT I : tanggal 22 maret 2018 di puskesmas samata

TT II : tanggal 25 april 2018 di puskesmas samata

Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah di pagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

- 8) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

- h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

- 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
- 2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
- 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
- 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

- i. Riwayat penyakit keluarga

- 1) Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, asma dan penyakit keturunan lainnya.

- j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

k. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2016 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan

l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan :

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- a) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok

b) BAB : Ibu belum BAB (BAB terakhir ibu pada jam 05.00 wita dirumahnya)

3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore)
- b) Sikat gigi : 2 kali sehari
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan : Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu : Ibu tidak pernah tidur

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 09 agustus 2018
4. Gestasi 37 minggu 4 hari
5. Tanda-tanda vital:

TD : 110/80 mmHg	P : 20 x/i
N : 80 x/i	S : 36,6°C
6. Tinggi badan : 157 cm
7. Berat badan sebelum hamil : 51 kg

8. Berat badan sekarang : 62 kg.
9. Lingkar lengan atas (LILA) : 26 cm
10. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)
- a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
 - b. Wajah : tidak pucat, tidak ada *chloasma gravidarum*, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan
 - c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, sclera putih, kelopak mata tidak bengkak
 - d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip
 - e. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal
 - f. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
 - g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis
 - h. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan,

terdapat pengeluaran kolostrum jika puting susu ditekan.

i. Abdomen : pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, tidak ada bekas operasi

Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 33 cm), teraba bokong

Leopold II : punggung kanan (puka)

Leopold III : kepala

Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)

LP : 92 cm

TBJ : 3.036 gram

Denyut jantung janin : terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 160 kali per menit

His : tidak ada

j. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

k. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema

l. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemorroid

11. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 23 juli 2018, jam 08.25 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tebal/ lunak
- c. Pembukaan : 1 cm
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : Hodge I
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : air ketuban

12. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.30 wita

Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis.

13. Pemeriksaan uji kertas lakmus

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.38 wita

Hasil pemeriksaan uji lakmus yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban.

14. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan USG

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.00 wita oleh dokter A Sp.OG di ruang

USG

- 1) GII PI A0, gravid tunggal, hidup

- 2) Letak : kepala
- 3) FHR : 172 kali per menit
- 4) TBJ : 3.030 gram
- 5) UK : \pm 36-37 minggu, TP : \pm 26 agustus 2018
- 6) Plasenta di *posterofundal grade 1*
- 7) Oligohidramnion

b. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.15 wita

- 1) WBC : $13.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- 2) RBC : $3.21 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- 3) HGB : 10,5g/dl
- 4) HCT : 29.05%
- 5) MCV : 90.3fL
- 6) MCH : 32.7pg
- 7) MCHC : 36.2g/dL
- 8) Protein : negatif
- 9) Reduksi : negatif
- 10) HbsAg : negatif

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : GII PI A0, gestasi 37 minggu 4 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin dalam pengawasan, inpartu kala I fase laten dengan KPD.

Masalah aktual : KPD

Masalah potensial : Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, sedangkan pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, *prolaps funiculli* / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

PLANNING (P)

Tanggal 23 juli 2018, jam 08.45 wita

1. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga
 Hasil : ibu telah mengetahui keadaannya sekarang
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

Tabel: 3.7**Observasi TD, Suhu tiap 4 jam Nadi, DJJ, His tiap 30 menit**

No	Jam (wita)	TD (mmHg)	Nadi (x/menit)	Suhu (°C)	DJJ (x/menit)	His
1	08.25	110/70	84	36.6	160	-
2	08.55		80		152	-
3	09.25		82		158	2x dalam 10 menit (25-30)
4	09.55		82		160	2x dalam 10 menit (25-30)
5	10.25		84		156	2x dalam 10 menit (25-30)
6	10.55		82		150	3x dalam 10 menit (30-35)
7	11.25		84		158	3x dalam 10 menit (30-35)
8	11.55		84		158	3x dalam 10 menit (30-35)

Sumber : data primer 2018

3. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 23 juli 2018, jam 12.25 wita
- Vulva dan vagina : normal
 - Portio : tebal
 - Pembukaan : 4 cm
 - Ketuban : jernih
 - Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
 - Penurunan : Hodge II
 - Molase : tidak ada
 - Penumbungan : tidak ada

- i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban
4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his

Tabel : 3.8**Observasi TD, Suhu tiap 4 jam Nadi, DJJ, His tiap 30 menit**

No	Jam (wita)	TD (mmHg)	Nadi (x/menit)	Suhu (°C)	DJJ (x/menit)	His
1	12.25	110/70	82	36.7	170	3x dalam 10 menit (30-35)
2	12.55		80		168	3x dalam 10 menit (35-40)
3	13.25		84		172	3x dalam 10 menit (35-40)
4	13.55		84		170	4x dalam 10 menit (35-40)
5	14.25		86		164	4x dalam 10 menit (35-40)
6	14.55		82		164	4x dalam 10 menit (40-45)
7	15.25		82		168	5x dalam 10 menit (40-50)
8	15.55		84		170	5x dalam 10 menit (40-50)
9	16.25	110/80	84	36,6	164	5x dalam 10 menit (40-50)

Sumber : data primer 2018

5. Segera memasang oksigen untuk ibu dalam jumlah 6-8 l/menit, kemudian hentikan pemberian cairan infus RL.
- Hasil: Terlaksana
6. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 23 juli 2018, jam 15.25 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - d. Ketuban : kering
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil dibawah symphysis
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : tidak ada
 - h. Penumbangan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah
7. Mengajarkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut
 8. Mengajarkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
 9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
 10. Mengajarkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti
 11. Mencatat dalam partograf

A. KALA II

DATA SUBJEKTIF

1. Sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang
2. Ibu merasa ingin buang air besar
3. Adanya dorongan kuat untuk meneran

4. Adanya tekanan pada anus

DATA OBJEKTIF

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
4. Pembukaan 10 cm (lengkap)
5. Penurunan kepala hodge IV (0/5)
6. Pelepasan lendir, darah, mekonium dan air ketuban

ASSESSMENT

Perlangsungan kala II

PLANNING

Tanggal 23 juli 2018

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Hasil : tanda dan gejala kala II telah dirasakan

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu :

a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Di luar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik

Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : perhiasan telah disimpan dan tangan telah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : oksitosin 1 ampul telah berada didalam wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi, dengan gerakan vulva ke perineum.

Hasil : vulva dan perineum telah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Periksa dalam tanggal 23 Juli 2018, jam 16.25 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Air ketuban : kering
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil dibawah symphysis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir dan darah

9. Mencecupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin dalam batas normal (120 – 160 kali per menit).

Hasil : denyut jantung janin terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 174 kali per menit.

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam pengawasan, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

Hasil : ibu dalam posisi setengah duduk

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena sakitnya yang bertambah sering

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Hasil : *underpad* telah terpasang dibawah bokong ibu

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Hasil : alat telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada kedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenam (perasat untuk melindungi perineum dngan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 23 Juli 2018, jam 15.36 wita, dengan bayi segera menangis, bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan tidak aktif, terdapat fleksi pada ekstremitas dan APGAR *score* 7/10.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu

Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk bersih dan kering, serta telah berada diatas perut ibu

B. KALA III

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah melahirkan
2. ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Bayi lahir spontan tanggal 23 juli 2018, jam 16.53 wita
2. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 220 cc
5. Kala II berlangsung sealama \pm 10 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva

ASSESSMENT

Perlangsungan kala III

PLANNING

Tanggal 23 juli 2018, jam 16.55 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu bersedia untuk disuntik

3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 paha atas bagian distal lateral

4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah dijepit

5. Memotong dan mengikat tali pusat (dengan satu tangan mengangkat tali pusat yang telah dijepit, kemudian melakukan pengguntingan tali pusat sambil melindungi perut bayi diantara 2 klem

Hasil : tali pusat telah dipotong

6. Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan

mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau menjepit tali pusat dengan penjepit tali pusat

7. Hasil : tali pusat telah dijepit
8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang di kepala

9. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Hasil : klem telah dipindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

11. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : dorso kranial telah dilakukan

12. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : plasenta telah terlepas dari tempat implantasinya

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

14. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 23 Juli 2018, jam 17.03 wita

16. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : terjadi ruptur tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 10 jahitan secara jelujur

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : uterus berkontraksi baik (teraba keras dan bundar)

18. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Hasil : IMD telah dilakukan

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil : berat bayi lahir 3.200 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingk kepala 33 cm, lingk dada 32 cm, lingk perut 33 cm, APGAR score 7/10, dan telah disuntik vitamin K (IM) dipaha kiri anterolateral

20. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Hasil : hepatitis B telah disuntikkan dipaha kanan anterolateral

KALA IV

Data Subyektif

1. Ibu lelah setelah selesai persalinannya
2. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah

Data Obyektif

1. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya
2. Plasenta lahir lengkap tanggal 23 Juli 2018, jam 17.03 wita
3. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
4. Tinggi fundus uteri setinggi pusat

5. Perdarahan \pm 280 cc
6. Kandung kemih kosong

Assesment

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Planning

Tanggal 23 Juli 2018, jam 17.18 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
2. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
3. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Table: 3.10

Observasi TD, Nadi, Suhu, TFU dan kontraksi serta kandung kemih tiap 15 menit jam pertama dan tiap 30 menit jam kedua pasca persalinan

Jam ke	Waktu (wita)	TD (mmHg)	Nadi (x/menit)	Suhu (°C)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih	Perdarahan
I	17.18	110/70	80	36.6	Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 50 cc
	17.33	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 30 cc
	17.48	110/80	78		Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 20 cc
	18.03	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 10 cc
II	18.33	110/70	80	36.6	Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 10 cc
	19.03	110/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong	± 10 cc

Sumber : data primer 2018

- Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas dengan normal yaitu 50 kali per menit

5. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih

6. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sapah.

7. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih

8. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum

9. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Hasil : tempat bersalin telah di dekontaminasikan

10. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

Hasil : sarung tangan telah dicelupkan didalam larutan klorin 0,5 % dalam keadaan terbalik

11. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : kedua tangan telah bersih

12. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi



**MANAJEMEN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL CARE
PADA NY "H" DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DI RSUD SYEKH
YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 23-30 JULI 2018**

No. Register : 44xxxx

Tanggal masuk : 23 juli 2018 jam 08.05 wita

Tanggal partus : 23 juli 2018 jam 16.53 wita

Tanggal pengkajian : 23 juli 2018 jam 18.30 wita

Nama pengkaji : Sri Hasmika Lestari

IDENTITAS ISTRI / SUAMI

Nama : Ny "H" / Tn "A"

Umur : 34 tahun / 29 tahun

Nikah : 1x

Suku : Makassar / makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : Guru / wiraswasta

Alamat : Jl. Romang polong

Data Subyektif (S)

1. Ibu melahirkan tanggal 23 juli 2018, jam 16.53 wita
2. Ibu mengeluh nyeri pada daerah perineum
3. Ibu mengatakan ini anak yang ke dua
4. Ibu memberi ASI sejak lahir
5. Ibu sudah BAK dan belum BAB

6. Ibu tidak mempunyai riwayat penyakit seperti jantung, asma, diabetes militus, hipertensi serta penyakit serius lainnya

Data Obyektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg S : 36.6°C

Nadi : 80 x/i P : 22 x/i

4. Pemeriksaan fisik (*head to toe*)

- a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak ada rambut rontok, tidak ada benjolan dan nyeri tekan
- b. Wajah : tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema dan nyeri tekan
- c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
- d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, tidak ada polip, tidak ada nyeri tekan
- e. Mulut dan gigi: bibir tampak kering, tidak ada caries, tidak ada gigi tanggal
- f. Telinga : tidak ada pengeluaran seruman, tidak ada benjolan, tidak adanya nyeri tekan
- g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

- h. Payudara : simetris kiri dan kanan, hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan, pengeluaran ASI (+)
- i. Abdomen : tidak ada bekas operasi, ada massa dan nyeri tekan, kontraksi uterus baik (uterus teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat
- j. Genetalia : tidak ada oedema, tidak ada varices, tampak pengeluaran lochea rubra, tidak ada tanda-tanda infeksi, tampak jahitan masih basah
- k. Ekstremitas : tidak ada oedema, tidak ada varices, gerakan aktif

Assessment (A)

PII A0 post partum hari pertama dengan nyeri luka perineum

Planning (P)

Tanggal 23 juli 2018 jam 18.40 wita

1. Meminta persetujuan ibu dan keluarga atas tindakan yang akan dilakukan

Hasil : ibu mengerti dan setuju atas tindakan yang akan dilakukan

2. Menjelaskan pada ibu penyebab luka perineum bahwa nyeri terjadi karena uterus atau rahim kembali mengecil keukuran semula seperti sebelum hamil

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* (sesuai keinginan bayi) yaitu bukan hanya pada saat bayi menangis karena lapar melainkan setiap ± 2 jam

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI eksklusif pada bayinya karena ASI merupakan kebutuhan bayi 100%. ASI mengandung zat pelindung yang dapat melindungi bayi dan berbagai penyakit infeksi. Pemberian ASI juga mempunyai pengaruh emosional yang luar biasa yang dapat mempengaruhi hubungan batin antara ibu dan anak

Hasil : ibu bersedia memberikan ASI eksklusif bayinya

5. Memberikan konseling pada ibu tentang cara perawatan payudara yang benar agar payudara tetap bersih dan kering

a. Pengurutan ke – 1

- 1) Licinkan kedua tangan dengan minyak/baby oil, tempatkan kedua tangan dibawah diantara kedua payudara
- 2) Arah urutan dimulai dari atas kemudian kesamping (telapak tangan disisi kanan dan sebaliknya)
- 3) Arah gerakan terakhir adalah melicinkan dibawah payudara kemudian tangan dilepas secara terguncang

b. Pengurutan ke – 2

Satu telapak tangan menopang payudara, tangan lainnya menggunakan sisi jari kelingking kemudian mengurut payudara dan pangkal menuju puting

c. Pengurutan ke – 3

- 1) Satu tangan menopang payudara, tangan lainnya menggenggam dengan menggunakan persediaan jari-jari tangan mengurut payudara dan pangkal menuju puting
- 2) Kompres payudara dengan air hangat dan air dingin secara bergantian, kemudian payudara diketuk-ketuk dengan ujung jari-jari tangan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Memberikan penjelasan tentang *Health Education* (HE) tentang :

a. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makan yang bergizi seimbang dan berprotein seperti telur, daging, tahu, tempe, buah-buahan, dll.

b. Istirahat

Istirahat yang cukup tidur siang minimal 2 jam dan tidur malam minimal 6 jam dan tidak melakukan aktivitas berat

c. Personal Hygiene

Mandi minimal 1x/hari, menggosok gigi minimal 2x/hari, dan menganjurkan ibu menjaga kebersihan daerah genitalia dan sesering mungkin mengganti pembalut.

Hasil : ibu mengerti dan melakukan nasehat yang diberikan

7. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar
 - a. Bayi diletakkan menghadap payudara ibu dengan perut bayi menempel pada perut ibu
 - b. Beri rangsangan pada bayi untuk membuka mulut dengan menyentuh pipi bayi dengan puting/jari ibu
 - c. Setelah bayi membuka mulut dekatkan payudara dengan puting dan areola dimasukkan ke mulut, usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi hingga puting berada dibawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan dan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak dibawah areola.
 - d. Setelah menyusui usahakan payudara sampai terasa kosong dan ganti dengan payudara lainnya
 - e. Cara melepas isapan bayi dengan jari kelingking ibu dimasukkan disudut mulut bayi dan dagu ditekan kebawah
 - f. Setelah selesai menyusui sendawakan dengan digendong tegak dan bersandar dibahu ibu kemudian punggung ditepuk perlahan-lahan atau dengan bayi tidur tengkurap dipangkuan ibu kemudian ditepuk bagian punggung perlahan-lahan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
8. Mengajarkan ibu cara perawatan luka perineum
 - a. Mencuci tangan
 - b. Lepas pembalut dan cebok dari arah depan ke belakang

- c. Waslap dibasahi dan buat busa sabun lalu gosokkan perlahan waslap yang sudah ada busa sabun tersebut keseluruh lokasi luka jahitan. Jangan takut dengan rasa nyeri, jika tidak dibersihkan dengan benar maka darah kotor akan menempel pada luka jahitan dan menjadi tempat kuman berkembangbiak
 - d. Bilas dengan air hangat dan ulangi sekali lagi sampai yakin bahwa luka benar-benar bersih
 - e. Kenakan pembalut baru yang bersih dan nyaman dan celana dalam yang bersih, jangan menggunakan celana dalam yang bisa menimbulkan reaksi alergi
 - f. Segera mengganti pembalut jika terasa sudah penuh, semakin bersih luka jahitan maka akan semakin cepat sembuh dan kering
 - g. Luka tidak perlu di kompres dengan obat antiseptik cair tanpa seizin dokter atau bidan
 - h. Cuci tangan kembali
- Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
9. Memberitahu ibu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri
- a. Berbaring, agar tekanan pada bawah tubuh berkurang
 - b. Tempel kompres dingin dengan es batu dalam plastik yang dibungkus pada kain flanel bersih pada perineum
 - c. Beristirahat dan beri waktu untuk penyembuhan
 - d. Mandi dengan air hangat

- e. Lakukan latihan kegel, hal ini dapat mempercepat penyembuhan dan melancarkan aliran darah pada area tersebut
- f. Siram dengan air hangat area ini setelah buang air kecil, hal ini dapat membilas urin dan mengurangi rasa perih serta menjaga area perineum tetap kering, keringkan dengan tisu toilet setelahnya

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menjelaskan kepada ibu dan jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan serta manfaat dan waktu pemberian imunisasi, seperti :

a. Hepatitis B

Manfaat : mencegah penyebaran hepatitis B dan membangun kekebalan tubuh bayi, dimana hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan hati.

Waktu pemberian : dalam waktu 0 – 12 jam setelah lahir.

Dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 hingga 6 bulan dengan jarak antara 2 imunisasi Hb0 minimal 4 minggu

b. BCG (*Bacillus calmette gonerin*)

Manfaat : mencegah terjadinya *tuberculosis* yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri *micobakterium tuberculosis*

Waktu pemberian : sejak bayi berusia 0 – 2 bulan

c. Polio

Manfaat : melindungi bayi terhadap virus polio yang menyebabkan kelumpuhan

Waktu pemberian : diberikan pada saat pertama setelah lahir, selanjutnya diberikan 3 kali saat bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan

d. DPT (*Difteri, pertusis, tetanus*)

Manfaat : mencegah 3 penyakit yaitu difteri (infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri), pertusis (batuk kejang yang berlangsung dalam waktu yang lama), tetanus (infeksi bakteri pada bagian tubuh yang terluka)

Waktu pemberian : diberikan pertama kali pada saat berumur lebih dari 6 minggu, pemberian selanjutnya pada usia 4 dan 6 bulan serta booster 18 bulan.

e. Campak

Manfaat : melindungi bayi dari penyakit campak

Waktu pemberian : diberikan pertama kali pada usia 9 bulan dan campak ke dua pada usia 6 tahun melalui program bias.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia memberikan imunisasi kepada bayinya sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi.

11. Memberikan konseling KB yang tidak mempengaruhi proses menyusui, seperti :

- a. Pil mini : yang hanya mengandung hormon progesteron yang dapat membantu produksi ASI, namun pil mini harus dikonsumsi setiap hari
- b. Suntikan 3 bulan : suntikan ini juga aman untuk ibu menyusui karena hanya mengandung hormon progesteron yang tidak akan mengganggu produksi ASI, namun kelemahannya adalah kesuburan lebih sulit untuk kembali setelah berhenti mendapatkan suntikan ini.
- c. Implant/susuk : implant ini mengandung hormon progesteron (progestin) dan dipasang dibawah kulit pada lengan atas, cara ini dapat dipakai untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun karena hanya mengandung hormon progesteron sehingga penggunaan implant tidak akan mempengaruhi produksi ASI.
- d. *IUD*/AKDR : merupakan alat KB jangka panjang 3 atau 5 tahun, alat kontrasepsi ini juga mengandung hormon progesteron sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI, alat kontrasepsi ini dipasang dalam rahim.

Hasil : ibu mengerti, ibu dan suami memilih alat kontrasepsi KB implant.

12. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang pada 1 minggu ke depan untuk memastikan involusio uteri berjalan normal, uterus berkontraksi baik, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang.

Tabel: 3.11

KUNJUNGAN RUMAH

No.	Tanggal	TTV	TFU	Kontraksi uterus	Lochea	ASI
1.	27 juli 2018, pukul 09.15 WITA di rumah pasien	TD : 110/70 mmHg N : 80x/menit S : 36.7°C P : 20x/menit	TFU 3 jari di bawah pusat	Kontraksi baik, teraba keras dan bundar	sanguilenta	ASI sudah keluar tapi masih sedikit
2.	31 juli 2018, pukul 15.00 WITA di rumah pasien	TD : 120/80 mmHg N : 82x/menit S : 36,6°C P : 22x/menit	TFU pertengahan pusat dan simpisis	Kontraksi baik, teraba keras dan bundar	serosa	ASI banyak dan lancar

Sumber : data primer 2018

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA NY “H” DENGAN BCB/SMK/PBK/SPT
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 23-30 JULI 2018**

No . Register : 44xxxx

Tanggal masuk : 23 juli 2018 jam 08.05 wita

Tanggal partus : 23 juli 2018 jam 16.53 wita

Tanggal pengkajian : 23 juli 2018 jam 17.53 wita

Nama pengkaji : Sri Hasmika Lestari

IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Bayi

Nama : bayi Ny “H”

Tanggal lahir : 23 juli 2018

Jenis kelamin : laki-laki

Anak ke : 2 (dua)

B. Identitas orang tua

Nama : Ny”H” / Tn”A”

Umur : 34 tahun / 29 tahun

Nikah : 1x

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : Guru / wiraswasta

Alamat : Romang Polong

Data Subyektif (S)

1. Ibu melahirkan tanggal 23 Juli 2018
2. Usia kehamilan saat melahirkan \pm 9 bulan
3. Bayi ibu berjenis kelamin laki-laki
4. HPHT 02 November 2017
5. Ibu mengatakan ini anak ke dua

Data Obyektif (O)

1. Keadaan umum bayi
2. Kesadaran composmentis
3. Penilaian sepintas : bayi segera menangis, bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan lemah, terdapat fleksi pada ekstremitas
4. Gestasi pada saat melahirkan 37 minggu 4 hari
5. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - HR : 128 x/menit
 - Suhu : 36.6°C
 - Pernapasan : 46 x/menit
6. Apgar *score* : 7/10

Tabel : 3.12**Apgar Score**

No.	Tanda	Nilai			Score	
		0	1	2		
1	<i>Appearance</i>	Seluruh tubuh biru	Kulit tubuh merah mudah, ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah mudah	2	2
2	<i>Pulse</i>	Tidak ada	< 100x/menit	>100x/menit	2	2
3	<i>Grimace</i>	Tidak ada	Meringis/ menangis	Meringis/bersin/batuk	1	2
4	<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerak	Gerakan aktif	1	2
5	<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah/tidak teratur	Menangis kuat, pernapasan baik dan teratur	1	2
JUMLAH					7	10

Sumber : data primer 2018

7. Pemeriksaan antropometri

- a. BBL : 3.200 gram
- b. PBL : 49 cm
- c. LK : 33 cm
- d. LD : 32 cm
- e. LP : 33 cm
- f. LILA : 12,4 cm

8. Pemeriksaan fisik (*Head to toe*)

- a. Kepala : rambut tipis, tidak ada *succedeneum*, tidak ada benjolan

- b. Mata : simetris kiri dan kanan, tidak ada secret
- c. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen, tidak ada kelainan, lunak dan elastis, jika dilipat akan kembali ke bentuk semula
- d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak secret, tidak ada polip, tidak ada benjolan
- e. Mulut dan bibir : tidak ada kelainan pada bibir dan palatum, refleks hisap baik, bibir tampak kemerah-merahan
- f. Leher : tidak ada benjolan
- g. Tangan : simetris kiri dan kanan, jumlah jari lengkap, refleks menggenggam kurang baik
- h. Dada : bentuk dada rata, puting susu terbentuk
- i. Perut : tali pusat masih tampak basah dan sudah dijepit dengan penjepit tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi
- j. Genitalia : tidak ada kelainan, testis sudah turun dalam scrotum
- k. Anus : terdapat lubang anus, terdapat pengeluaran mekonium berwarna hitam kecoklatan
- l. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, gerakan normal, jumlah jari-jari lengkap
- m. Kulit : tampak kemerahan

Assesment (A)

Bayi Ny "H" 0 hari dengan BCB/SMK/PBK/SPT

Planning (P)

Tanggal 23 juli 2018, jam 18.00 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan

Hasil : ibu mengerti

2. Mengenakan sarung tangan dan pakaian bersih dan kering pada bayi

Hasil : bayi telah dikenakan pakaian dan telah dibedong

3. Memberitahu ibu untuk tetap memberi ASI eksklusif dan menjelaskan keuntungan dan pentingnya ASI untuk bayi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia memberi ASI pada bayinya

4. Memberitahu ibu untuk mengganti pakaian bayi setiap habis BAK/BAB

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Memberitahu ibu untuk selalu merawat tali pusat bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada bayi yang harus diwaspadai

- a. Bayi tidak mau menyusui
- b. Bayi kejang
- c. Bayi tidak BAK selama 24 jam dan BAB selama 3 hari
- d. Bayi lemah bergerak jika dipegang
- e. Suhu tubuh $> 37^{\circ}\text{C}$ atau suhu tubuh $< 36,5^{\circ}\text{C}$
- f. Bayi diare, mata kuning, cekung
- g. Kulit bayi terlihat kuning

Hasil : ibu mengerti dengan apa yang di jelaskan

7. Menjelaskan pada ibu tanda-tanda infeksi

- a. Kalor : rasa panas
- b. Dubor : kemerahan
- c. Tumor : pembengkakan
- d. Dolor : rasa nyeri

Hasil : ibu mengerti penjelasan yang diberikan

8. Menganjurkan ibu agar memandikan bayinya tiap hari dengan air hangat

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Meminta izin pada iibu untuk imunisasi bayinya (hepatittis B)

Hasil : ibu memberi izin untuk imunisasi bayinya

10. Menganjurkan iu datang kembali untuk imunisasi selanjutnya setelah bayi berumur 1 bulan

Hasil : ibu bersedia datang kembali membawa bayinya untuk imunisasi selanjutnya.

KUNJUNGAN RUMAH KE- I

Tanggal partus : 23 juli 2018 jam 16.53 wita

Tanggal kunjungan : 27 juli 2018 jam 09.15 wita

Tanggal pengkajian : 27 juli 2018 jam 09.20 wita

Data Subyektif (S)

1. Bayi tertidur pulas dan jarang menangis
2. Bayi kuat menghisap
3. Ibu mengatakan bayinya sudah BAB dan BAK
4. Ibu sudah menyusui bayinya sesering mungkin
5. Asinya sudah ada tapi masih kurang

Data Obyektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

P : 42x/menit

S : 36.7°C

HR: 132x/menit

4. Bayi tertidur pulas
5. Tali pusat tampak sudah kering
6. Warna kulit bayi kemerahan

Assesment (A)

Bayi Ny "H" umur 5 hari

Planning (P)

Tanggal 27 juli 2018, jam 09.25 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi

Hasil : tangan sudah dicuci dengan bersih

2. Memberitahu ibu hasil dari pemeriksaan

Hasil : ibu mengerti

3. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat

Hasil : tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, dan berbau busuk

4. Memandikan bayi dengan air bersih dan hangat

Hasil : bayi telah dimandikan

5. Memakaikan pakaian pada bayi seperti gurita, loyor, dan baju serta membedongnya

Hasil : pakaian sudah dipakaikan pada bayi

6. Menganjurkan ibu untuk membersihkan payudara apabila akan menyusui bayinya dengan menggunakan kapas yang dibasahi dengan air DTT, atau menekan puting payudara agar ASI keluar dan mendesinfektan area puting

Hasil : ibu sudah melakukan apa yang dianjurkan

7. Menganjurkan ibu menyusui bayinya secara *on demand*

Hasil : ibu menyusui bayinya sesering mungkin

8. Mengajarkan ibu cara menyusui bayinya dengan benar

Hasil : ibu sudah mengetahui cara menyusui yang benar

9. Mengajarkan ibu cara menjaga kebersihan bayi, yaitu dengan mengganti pakaian dalam dan luar jika basah atau lembab

Hasil : ibu mengerti

10. Memberitahu ibu tanda bahaya bayi baru lahir, yaitu :

- a. Bayi tidak mau menyusui
- b. Kejang dan merintih
- c. Demam dan lemah
- d. Mata bayi bernanah banyak
- e. Bayi diare
- f. Mata cekung
- g. Hipotermi/hipertermi
- h. Kulit bayi terlihat kuning

Hasil : ibu mengetahuinya dan tidak menemukan tanda-tanda bahaya pada bayinya

11. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

KUNJUNGAN RUMAH KE-II

Tanggal partus : 23 juli 2018 jam : 16.53 wita

Tanggal kunjungan : 31 juli 2018 jam : 15.00 wita

Tanggal pengkajian : 31 juli 2018 jam : 15.05 wita

Data Subyektif (S)

1. Bayi kuat menghisap
2. Bayi sudah BAB dan BAK
3. ASI sudah lancar keluar

Data Obyektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

P : 42x/menit

S : 36.6°C

HR: 140x/menit

4. Bayi bergerak aktif
5. Tali pusat telah pupus
6. Warna kulit bayi kemerahan

Assesment (A)

Bayi Ny "H" umur 9 hari

Planning (P)

Tanggal 31 juli 2018, jam 15.10 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi

Hasil : tangan sudah dicuci bersih

2. Memandikan bayi dengan air bersih dan hangat

Hasil : bayi sudah dimandikan

3. Memberitahu ibu untuk selalu menjaga kebersihan bayi dan kehangatan bayi

Hasil : ibu mengerti dan telah melakukan anjuran bidan

4. Memberitahu ibu untuk mengenali tanda-tanda bahaya bayi baru lahir pada bayinya dan segera membawanya ke pusat pelayanan kesehatan terdekat jika salah satu tandanya terjadi pada bayinya

Hasil : ibu mengenali tanda-tanda bahaya BBL dan akan membawanya jika hal tersebut terjadi pada bayinya.

5. Memberitahu ibu untuk datang ke puskesmas untuk imunisasi selanjutnya setelah bayi berumur 1 bulan

Hasil : ibu bersedia datang kembali membawa bayinya untuk imunisasi selanjutnya

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny "H" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 23 Juli 2018. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah Varney.

Kala I

1. Langkah I identifikasi data dasar

Pada langkah I dilakukan pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang apakah kehamilan normal atau tidak. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan keadaan ibu dan janin. Jika tidak didapatkan kelainan pada ibu dan janin maka harus diyakini bahwa kehamilan ibu adalah masuk dalam kategori kehamilan normal.

Berdasarkan penerapan pada asuhan kebidanan Ny "H" didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 23 juli 2018, pukul 08.05 wita dengan keluhan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir sejak tanggal 23 juli 2018, pukul 04.00 wita, ibu mengatakan ini kehamilan ke dua dan tidak pernah mengalami keguguran, hari pertama haid terakhir tanggal 02 november 2017, pergerakan janin kuat dirasakan pada perut kanan bawah, ibu sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 2 kali di puskesmas samata, ibu

mengatakan usia kehamilannya sekarang 9 bulan, ibu melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas samata, ibu sebelumnya menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak kelahiran anak pertama, ibu tidak mempunyai riwayat penyakit seperti jantung, asma, diabetes melitus, hipertensi dan penyakit serius lainnya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa persalinan dengan ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan (Sukarni dan Margareth, 2013 :251).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I yaitu TFU 3 jrbpx, 33 cm, teraba bokong, Leopold II teraba punggung kanan (PUKI), Leopold III didapatkan kepala, Leopold IV didapatkan bergerak dalam panggul (BDP), 4/5, keadaan janin abnormal yang ditandai dengan terdengarnya DJJ 170 x/i, lingkaran perut 92 cm, tafsiran berat janin 3.036 gram, tidak ada his. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 08.25 wita yaitu vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban jernih, penurunan Hegde I, persentase UUK kanan lintang, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan air ketuban. Selanjutnya dilakukan observasi tekanan darah, suhu tiap 4 jam, his, DJJ, nadi tiap 30 menit, dan observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala I. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan inspekulo terdapat pengeluaran air

ketuban, pemeriksaan kertas lakmus terdapat kertas lakmus berubah menjadi biru, pemeriksaan USG cairan amnion *oligohidramnion*.

Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 37 minggu 4 hari, Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 279).

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu.

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. janin dalam keadaan normal, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya 160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

Pada pemeriksaan inspekulo lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis servikalis dan apakah ada bagian yang sudah pecah (Pranoto dkk, 2013).

Pada pemeriksaan test lakmus jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban. Cara melakukan uji kertas lakmus yaitu :

1. Lakukan pemeriksaan inspekulo, nilai apakah ada cairan keluar melalui ostium uteri eksternum (OUE) atau terkumpul di forniks posterior
2. Dengan pinset panjang atau klem panjang masukkan kertas lakmus kedalam serviks
3. Jika kertas lakmus berubah warna menjadi biru maka tes lakmus positif atau menunjukkan adanya cairan ketuban (alkalis) (Norma dan Dwi, 2013).

Pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri. Pada kasus KPD terlihat jumlah cairan ketuban yang sedikit. Namun sering terjadi kesalahan pada penderita *oligohidramnion*. Walaupun pendekatan diagnosa KPD cukup banyak macam dan caranya, namun pada umumnya KPD sudah bisa terdiagnosis dengan anamnesa dan pemeriksaan sederhana (Norma dan Dwi, 2013).

Pada pemeriksaan USG ini bertujuan untuk menegakkan suatu diagnosa khususnya pada kasus KPD disertai gawat janin. Tindakan yang dilakukan yaitu memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his, DJJ dan pembukaan serviks, menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga, menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan ibu, mendampingi ibu selama proses persalinan, memberikan support dan motivasi kepada ibu ketika

tidak ada kontraksi, mengobservasi his, DJJ, melakukan pemeriksaan dalam, melakukan pemasangan oksigen, menganjurkan ibu dan keluarga senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. agar diberikan kesabaran dan ketabahan hati serta kemudahan dalam proses persalinan, melakukan pemeriksaan dalam, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut, menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin, memberikan makan dan minum jika tidak ada his, menganjurkan ibu miring kiri agar suplay oksigen ke janin tidak terhambat, mengajarkan ibu untuk meneran ketika ada his, menyiapkan peralatan persalinan.

KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Mochtar, 2010 :255-256). Sedangkan, Gawat janin terjadi bila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami hipoksia (Rukiyah dan Yulianti, 2010 :276). Pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dilapangan.

2. *Langkah II identifikasi diagnosa/ masalah aktual*

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data

yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

Pada kasus Ny”H”, telah dilakukan pengumpulan data subjektif, data objektif, maupun data penunjang, sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD disertai gawat janin. Oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

3. Langkah III antisipasi diagnosa/ masalah potensial

Pada perumusan diagnosa/ masalah potensial akan dibahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah aktual tidak segera ditangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome*, hipotermia, gangguan makan neonatus, *retinopathy of prematurity*, perdarahan intraventrikular, *necrotizing enterocolitis*, gangguan otak (dan

resiko cerebral palsy), hiperbilirubinemia, anemia, sepsis). Prolaps funiculli/penurunan tali pusat. Hipoksia dan asfiksia sekunder (kekurangan oksigen pada bayi), yang dapat mengakibatkan kompresi tali pusat, prolaps uteri, *dry labour*/partu lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan. Sindrom deformitas janin (terjadi akibat oligohidramnion diantaranya terjadi hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat). Morbiditas dan mortalitas perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115-116).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu maupun janin karena penanganan

ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infus, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotik telah sesuai dengan teori dan tindakan yang dilakukan pada gawat janin yaitu dilakukan pemberian oksigen pada ibu dan hentikan pemberian infus oksitosin, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

4. *Langkah IV identifikasi perlunya tindakan segera/ kolaborasi*

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih professional (dokter obgyn). Pada tinjauan pustaka, tindakan segera/ kolaborasi pada KPD disertai gawat janin adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus, pemberian uterotonika, pemberian antibiotik dan pemberian oksigenasi.

Pada studi Ny “H” tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD disertai gawat janin yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/ IV, pemberian oksigen 6-8 L/menit dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan yang ditemukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny “H” yang tetap mengacu pada tindakan yang rasional sesuai kebutuhan klien.

5. *Langkah V rencana tindakan*

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Pada studi kasus Ny “H”, penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemberian antibiotik cefotaxime untuk mencegah terjadinya infeksi, induksi oksitosin untuk membantu kontraksi uterus, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus dan dilakukan pemberian oksigen pada kasus gawat janin dan dihentikan pemberian infus oksitosin jika sedang terpasang (Nugroho, 2012).

Dalam penanganan persalinan KPD disertai gawat janin yang perlu diperhatikan adalah keadaan ibu yang meliputi nadi tiap 30 menit tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, memantau keadaan jani yang meliputi denyut jantung janin dan kontraksi uterus tiap 30 menit, pemberian antibiotik diperlukan karena ketuban sudah pecah oleh karena itu diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Pemberian oksitosin untuk membantu kontraksi uterus, pemberian cytotec untuk pematangan serviks, dan pemberian oksigen untuk penanganan pada kasus gawat janin, ibu disarankan untuk miring kiri agar suplay oksigen ke janin tidak terhambat serta peredaran darah lancar ke uterus dan ibu juga sudah tidak bisa berjalan karena ketuban sudah pecah. Selain itu, perlu juga diperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi pada ibu. Kemudian dilanjutkan pemantauan keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny "H", tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

6. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

7. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan data inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan lengkap pada pukul 16.25 wita, ibu merasa ada dorongan ingin meneran, ibu merasa ingin BAB, tampak tekanan pada anus, vulva membuka, DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 164 x/i, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil evaluasi bahwa pembukaan sudah lengkap pada pukul 16.25 wita, keadaan ibu dan janin dalam pengawasan.

8. Pendokumentasian SOAP

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan data subjektif bahwa ibu masuk tanggal 23 juli 2018, pukul 08.05 wita dengan keluhan adanya pengeluaran air dari jalan lahir sejak tanggal 23 juli 2018, pukul 04.00 wita, ibu mengatakan ini kehamilan ke dua dan tidak pernah mengalami keguguran, hari pertama haid terakhir tanggal 02 november 2017, pergerakan janin kuat dirasakan pada perut kanan bawah, ibu sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 2 kali di puskesmas samata, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 9 bulan, ibu melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali di puskesmas samata, ibu sebelumnya menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak kelahiran anak pertama, ibu tidak mempunyai riwayat penyakit seperti jantung, asma, diabetes melitus, hipertensi dan penyakit serius lainnya.

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I yaitu TFU 3 jrbpx, 33 cm, teraba bokong, Leopold II teraba punggung kanan (PUKI), Leopold III didapatkan kepala, Leopold IV didapatkan bergerak dalam panggul (BDP), 4/5, keadaan janin abnormal yang ditandai dengan terdengarnya DJJ 170 x/i, lingkaran perut 92 cm, tafsiran berat janin 3.036 gram, tidak ada his. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 08.25 wita yaitu vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban jernih, penurunan hodge I, persentase UUK kanan lintang, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan air ketuban.

Assesment yaitu hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" ditegakkan diagnosa GIPIAO, gestasi 37 minggu 4 hari, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin dalam pengawasan kala I fase laten dengan KPD disertai gawat janin.

Planning merupakan pendokumentasian yang menggambarkan pendokumentasian untuk semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesment* yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" telah dilakukan intervensi dan implementasi sesuai dengan teori dan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada pukul 16.25 wita, ibu mempunyai dorongan ingin

meneran, terasa ingin BAB, dengan his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, tanda-tanda vital dalam batas normal, DJJ tidak normal.

Kala II

1. Langkah I Pengumpulan dan Analisa Data Dasar

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien dan untuk mendapatkan informasi tersebut diperlukan anamnesis. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu ingin terasa ingin BAB. Sedangkan data objektif didapatkan perineum menonjo dan vulva, vagina dan anus membuka. DJJ tedengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 164 x/i, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, dilakukan pemeriksaan dalam pada pukul 16.25 wita didapatkan vulva dan vagina normal, portio melesap, pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk dibawah simpisis, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir da darah.

2. Langkah II Merumuskan Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan dalam diagnosa dalam lingkup praktek kebidanan. Teori meng atakan bahwa tanda dan gejala kala II yaitu bila ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan vagina, perineum menonjol, vulva dan anus membuka,

Pada kasus Ny “H” didapatkan tanda dan gejala kala II yaitu ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu ingin merasa BAB. Sedangkan data objektif didapatkan perineum menonjo dan vulva, vagina dan anus membuka. DJJ tedengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 164 x/i, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-50 detik, dilakukan pemeriksaan dalam pada pukul 16.25 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio melesap, pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk dibawah simpisis, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendi dan darah.

Diagnosis kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada vulva dengan diameter 5-6 cm.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial

Pada penjelasan teori yang telah dijelaskan bahwa masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan KPD disertai gawat janin adalah masalah potensial pada ibu yaitu infeksi *intrapartum*/dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan, Masalah potensial yang akan terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome*, hipotermia, gangguan makan neonatus, *retinopathy of prematurity*, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*),

hiperbilirubinemia, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013 :115-166).

Pada kasus Ny “H” tidak didapatkan masalah potensial baik ibu maupun janin seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka.

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkah ini dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Tindakan ini diambil berdasarkan indikasi yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Pada kasus Ny “H” tidak dilakukan kolaborasi dengan dokter anak karena pada saat bayi lahir bayi segera menangis dan bernapas tanpa kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa bayi tidak mengalami asfiksia.

Berdasarkan teori intervensi yang telah dilakukan pada persalinan KPD disertai gawat janin pada kala II yaitu, melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah ibu, lakukan pimpinan meneranjika kepala telah membuka vulva 5-6 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, kemudian lanjut untuk melahirkan bahu depan dan belakang, setelah bahu bayi lahir lakukan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir

jepit dan potong tali pusat, lakukan penilaian sepintas dan nilai *apgar score* serta *ballard score* bayi, letakkan bayi diatas perut ibu untuk inisiasi menyusui dini (IMD).

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Berdasarkan teori intervensi yang telah dilakukan terhadap persalinan KPD disertai gawat janin pada kala II yaitu, melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan underpad dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan, kemudian lanjut melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir lakukan penilaian sepintas dan penilaian *apgar score* di menit pertama dan menit kelima, letakkan bayi diatas perut ibu untuk IMD. Pada kasus Ny “H” intervensi sesuai dengan teori yang ada, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Implementasi yang dilakukan pada kasus Ny “H” sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap pada pukul 16.25 WITA, portio melesap, ketuban kering, presentase uuk dibawah simpisis, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan darah dan lendir.

Alat dan bahan telah dipersiapkan dan telah dilakukan pempinan meneran pada pukul 16.25 WITA, bayi lahir tanggal 23 Juli 2018, pukul 16.53 WITA, bayi lahir segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan, bergerak dengan lemah, sedikit refleks. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 3.200 gram, panjang badan lahir 49 cm, dengan nilai APGAR *score* 7/10.

7. Langkah VII evaluasi

Kala II berlangsung normal pada kasus Ny “H” dengan bayi lahir spontan pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 16.53 WITA bayi lahir segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan, bergerak dengan lemah sedikit refleks, berat badan lahir bayi 3.200 gram, panjang badan lahir 49 cm berjenis kelamin laki-laki, dan tinggi fundus uteri setinggi pusat.

Kala III

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Berdasarkan teori yang telah didapatkan bahwa pada kala III persalinan, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan rongga uterus atau berkurangnya ukuran tempat implantasi plasenta. Tanda-tanda terlepasnya plasenta mencakup perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah tiba-tiba. Pada kala III, otot uterus berkontraksi mengikuti penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta.

Karena tempat perlekatan semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah janin lahir, uterus mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan permukaan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta akan lepas dari tempat implantasinya (Eka dan Kurnia, 2013 : 90-91).

Pada kasus Ny "H" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah, dari data objektif didapatkan tampak adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat semakin panjang, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

2. Langkah II merumuskan diagnosa atau masalah aktual

Berdasarkan teori yang dijelaskan mengenai persalinan kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampailahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit dan kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. Penerapan asuhan kebidanan pada kasus Ny "H" berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan, maka dapat ditegakkan diagnosa yaitu perlangsungan kala III.

3. Langkah III identifikasi masalah atau diagnosa potensial

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada kasus Ny "H" maka tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan. Dilihat dari teori yang dijelaskan maka kala III menunjukkan dalam keadaan normal yaitu proses pengeluaran plasenta tidak lebih dari 30 menit dan tidak ada penyulit.

4. Langkah IV melakukan tindakan segera atau kolaborasi

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada kasus Ny “H” maka tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera ataupun kolaborasi. Dilihat dari penjelasan teori bahwa proses pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny “H” maka tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah dilakukan intervensi yang sesuai yaitu melakukan pemberian oksitosin, masase uterus, dan peregangan tali pusat terkendali. Pemberian oksitosin diberikan dalam 1 menit setelah bayi lahir. Namun harus dipastikan dengan memeriksa tinggi fundus uteri untuk memastikan bahwa kehamilan tunggal. Pemberian oksitosin yaitu di sepertiga lateral paha ibu secara IM yang bertujuan untuk membantu agar kontraksi uterus baik, untuk membantu lahirnya plasenta dan mengurangi kehilangan darah karena memperbaiki kontraksi uterus.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Berdasarkan kasus Ny “H” telah dilakukan implementasi berdasarkan teori yaitu dengan melakukan pemberian oksitosin secara IM di sepertiga lateral paha ibu, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali sambil melakukan dorsocranial, setelah plasenta lahir dilakukan masase uterus. Pelepasan dan pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit yaitu berlangsung selama 10 menit lahir lengkap dengan kotiledon yaitu pukul 17.03 WITA, dengan perdarahan kurang lebih 280 cc.

7. *Langkah VII evaluasi*

Sebagaimana implementasi yang telah dilakukan pada Ny "H" didapatkan hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan normal yang ditandai dengan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan kurang lebih 280 cc berarti dalam batas normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

8. *Pendokumentasian SOAP*

Data subjektif yang meliputi pendokumentasian dengan pengumpulan data pasien dan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil anamnesis, pada kasus Ny "H" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah.

Data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny "H" didapatkan tanda-tanda pelepasan plasenta dengan adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.

Assessment yaitu hasil analisis dari data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera. Pada kasus Ny "H" ditegakkan diagnosa perlangsungan kala III.

Planning yaitu hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil yang telah dilakukan. Pada kasus Ny "H" telah dilakukan tindakan

asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan plasenta lahir lengkap pukul 17.03 WITA, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan perdarahan kurang dari 280 cc.

Kala IV

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Pada kasus Ny "H" didapatkan data subjektif ibu telah lelah setelah persalinan dan data objektif plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, tanda-tanda vital dalam batas normal. Berdasarkan teori yang dijelaskan pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan adalah kontraksi uterus baik, pemeriksaan serviks, vagina dan perineum yang berguna untuk mengetahui apakah ada robekan jalan lahir atau tidak, perlu juga diperhatikan adalah bahwa plasenta lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa sedikitpun dalam uterus serta benar-benar dijamin tidak terjadi perdarahan berlanjut (Fitria Melia, 2014 : 8).

2. Langkah II merumuskan diagnosa atau masalah aktual

menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan plasenta lahir, selain itu penyebab lain adalah jika ada robekan di jalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah bisa menjadi pemicu perdarahan postpartum Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus Ny "H" maka diagnosis yang dapat ditegakkan adalah perlangungan kala IV, hal ini sesuai dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap pukul 17.03 WITA dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnose potensial

Pada kasus Ny “H” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan postpartum, infeksi masa nifas. Berdasarkan teori pada kala IV disebut dengan kala pengawasan selama 2 jam postpartum, karena kala ini rentan terjadi perdarahan postpartum, perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya kontraksi uterus yang.

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kolaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III berlangsung normal yaitu kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

5. Langkah V melaksanakan asuhan secara komprehensif

Pada kasus Ny “H” intervensi yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan tinggi fundus uteri, pemantauan kontraksi uterus, pemantauan perdarahan, dan kandung kemih ibu. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. Selain itu, dilakukan pemantauan suhu 1 kali tiap jam. Setelah pemantauan kala IV selesai, ibu dipindahkan ke ruangan nifas. Teori menjelaskan bahwa sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian ibu disebabkan oleh infeksi, dan perdarahan. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam postpartum sangat penting dilakukan.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny "H" implementasi yang dilakukan yaitu memantau tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit pada jam pertama yaitu pukul 17.18 WITA sampai 18.03 WITA dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kandung kemih ibu kosong, serta perdarahan kurang 10-50 cc, selanjutnya melakukan pemantauan setiap 30 menit pada jam kedua yaitu pukul 18.33 WITA sampai 19.03 WITA didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong, TFU setinggi pusat, serta perdarahan 10 cc. keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, selanjutnya mendokumentasikan hasil pemantauan kedalam partograf. Setelah itu ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

7. Langkah VII evaluasi

Pada kasus Ny "H" didapatkan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kandung kemih ibu kosong, jumlah perdarahan kurang lebih 130 cc, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemantauan kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui

anamnesis. Berdasarkan kasus Ny “H” didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan.

Data objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan yang didapatkan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala III berlangsung normal kurang lebih 10 menit, plasenta lahir lengkap dan selaput utuh, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

Assessment adalah hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan kasus Ny “H” maka *assessment* yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.

Planning yang meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, yang ditandai dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan ketuban pecah dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 23 Juli 2018, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan data dasar pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin pada data subjektif didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 23 juli 2018 pukul 08.05 wita dengan keluhan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir sejak tanggal 23 juli 2018 pukul 04.00 wita. Sedangkan pada data objektif didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada abdomen didapatkan leopold I yaitu TFU 3 jrbpx, 33 cm, teraba bokong, leopold II teraba punggung kanan (PUKA), leopold III didapatkan kepala, leopold IV didapatkan bergerak dalam panggul (BDP), 4/5 keadaan janin abnormal yang ditandai dengan terdengarnya DJJ 170 x/i. Pada pemeriksaan dalam didapatkan vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban jernih, penurunan hodge I, persentase UUK kanan lintang, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan air ketuban. Selanjutnya dilakukan observasi tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, his DJJ, nadi tiap 30 menit, dan observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala I. Pada pemeriksaan inspekulo

terdapat pengeluaran air ketuban, pemeriksaan kertas lakmus terdapat kertas lakmus berubah menjadi biru, dan pemeriksaan USG cairan amnion *oligohidramnion*.

2. Perumusan diagnosa/masalah aktual pada Ny “H” di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan pengumpulan data seperti TTV, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dalam, pemantauan DJJ dan his, pemeriksaan inspekulo, pemeriksaan kertas lakmus, dan pemeriksaan USG sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “H” dengan ketuban pecah dini disertai gawat janin.
3. Perumusan diagnosa/masalah potensial pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 yaitu mengantisipasi terjadinya partus lama, infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), sedangkan pada janin mengantisipasi terjadinya prematuritas, hipotermia, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia. Namun masalah potensial tidak akan terjadi apabila penanganan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi dengan pemberian infus RL 28 tetes/menit, oksitosin ½ ampul, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV,

pemberian oksigen 6 L/menit dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil perencanaan asuhan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “H” dengan KPD disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil yaitu keadaan ibu baik dan janin dalam pengawasan yang ditandai dengan TTV dalam batas normal, DJJ 170 x/i, kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan His yang semakin adekuat, pembukaan lengkap (10 cm), tidak ada tanda-tanda infeksi.

Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 23 Juli 2018, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu dan keadaan ibu baik yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 80x/ menit, pernapasan: 20x/ menit, S: 36,8°C. Sedangkan keadaan janin dalam abnormal dilihat bahwa denyut jantung janin dengan frekuensi 170x/menit. Ibu melahirkan pada tanggal 23 Juli 2018 pukul

16.53 wita dengan berat bayi lahir 3.200 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingkaran kepala 33 cm, lingkaran dada 32 cm, lingkaran perut 33 cm.

Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “H” mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk bidan

- a. Bidan dalam memberikan asuhan harus sesuai kewenangannya, untuk itu manajemen asuhan kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang membantu seorang bidan dalam memecahkan masalah klien dalam berbagai situasi.
- b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan, bidan harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, guna mencegah terjadinya infeksi pada ibu, juga perlindungan bagi diri sendiri.
- c. Diharapkan seseorang bidan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya disiplin waktu dalam memberikan asuhan kepada klien.

2. Saran untuk Rumah sakit

Sebaiknya pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin

dengan KPD disertai gawat janin secara optimal melalui penanganan yang cepat dan tepat.

3. Saran untuk institusi

Adapun saran untuk institusi yaitu:

- a. Menyediakan tenaga pengajar yang profesional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- b. Perlu peningkatan pembelajaran di laboratorium khususnya penanganan KPD disertai gawat janin sehingga dapat melakukan suatu tindakan penanganan pada kasus tersebut karena praktek laboratorium sangatlah bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesional.

4. Saran untuk klien

Adapun saran untuk klien yaitu:

- a. Setiap ibu hamil harus segera datang ke petugas kesehatan bila didapati adanya pengeluaran air yang banyak dari jalan lahir dengan bau amis/bau khas.
- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB.
- c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan kebutuhan emosional dan saling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. Aini Oktaria : / *Jurnal Midpro*. Perbedaan Kejadian Ketuban Pecah Dini antara Primipara dan Multipara, Universitas Islam Lamongan edisi 1 2012
- Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Erni, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2011
- Fadlun dan Feryanto, *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta : Salemba Medika, 2013.
- Heryani, Reni. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. DKI Jakarta : CV Trans Info Media, 2011.
- Khafidoh, *Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Kejadian Gawat Janin dalam persalinan*. Purwokerto : universitas muhammadiyah, 2013.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (jakarta: Dharma art, 2015).
- Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi Pertama 2013
- Kuswanti, Ina dan Melina, Fitria. *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta : PustakaPelajar, 2014
- Marmi, dkk, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Mishra, Seemadanjoshymamta. "Premature Rupture of Membrane- Risk Factors: A Clinical Study". Journal of Contemporary Medical Research Vol| Issue 1 | January 2017 | ICV (2015): 77.83. <http://www.ijcmr.com>.
- Mochtar, *Persalinan patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Nadya, *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Alauddin University P. 2013
- Nita, *persalinan patologi*. Jakarta : Bina Pustaka, 2013
- Norma dan Dwi, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Nugroho, *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2012
- Pranoto, dkk, *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta : Fitramaya, 2013
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Pustaka, 2014

- Pudiastuti, Dwi, *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Patologi*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Purwanti, dkk, *Kejadian Gawat Janin Pada Proses Persalinan Kala I Fase Laten*. *Jurnal Ilmiah Kebidanan* : 2013.
- Rukiyah dan Yulianti, *Asuhan Kebidanan Patologi 4*. Purwakarta : Trans Info Media, 2010.
- Saleha, Sitti, *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta : Salemba Medika, 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sukarni dan Margareth, *Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Syaifuddin, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Nuha Meduka, 2010.
- Yulifah, dkk, *Konsep Kebidanan*. Jakarta Selatan : SalembaMedika, 2014.
- Walyani dan purwoastuti, *Asuhan Persalinan Fisiologi*, jakarta : Nuha Medika, 2015.

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 25-07-2018
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
 - Rumah Ibu Puskesmas
 - Polindes Rumah Sakit
 - Klinik Swasta Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
 - Bidan Teman
 - Suami Dukun
 - Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y (+)
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 - Ya, Indikasi
 - Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
 - Suami Teman Tidak ada
 - Keluarga Dukun
15. Gawat Janin :
 - Ya, tindakan yang dilakukan :
 - a. Dukun dan pada ibu
 - b.
 - c.
 - Tidak
16. Distosia bahu :
 - Ya, tindakan yang dilakukan
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : 4-10 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 - Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 - Ya, alasan
 - Tidak
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 - Ya
 - Tidak, alasan

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan	
1	17-16	110/70 mmHg	80 x/i	36,6 °C	seleksi purat	Baik	Kering	± 50 cc
	17-33	110/70 mmHg	80 x/i		seleksi purat	Baik	Kering	± 30 cc
	17-48	110/80 mmHg	78 x/i		seleksi purat	Baik	Kering	± 20 cc
	18-05	110/70 mmHg	80 x/i		seleksi purat	Baik	Kering	± 10 cc
2	18-33	110/70 mmHg	80 x/i	36,6 °C	seleksi purat	Baik	Kering	± 10 cc
	19-03	110/70 mmHg	80 x/i		seleksi purat	Baik	Kering	± 10 cc

Masalah kala IV :
 Penatalaksanaan masalah tersebut :
 Hasilnya :

24. Masase fundus uteri ?
 - Ya
 - Tidak, alasan
25. Plasenta lahir lengkap (intact) (Ya) Tidak
 - Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 - a.
 - b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya (Tidak)
 - Ya, tindakan :
 - a.
 - b.
 - c.
27. Laserasi :
 - Ya, dimana : perineum
 - Tidak
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 2 3 4
 - Tindakan :
 - Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 - Tidak dijahit, alasan
29. Atoni uteri :
 - Ya, tindakan
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
30. Jumlah perdarahan : ± 20 ml
31. Masalah lain, sebutkan
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan : 5.200 gram
35. Panjang : 39 cm
36. Jenis kelamin : L P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik ada penyulit
38. Bayi lahir :
 - Normal, tindakan :
 - mengeringkan
 - menghangatkan
 - rangsang taktil
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan :
 - mengeringkan bebaskan jalan napas
 - rangsang taktil menghangatkan
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - lain - lain sebutkan
 - Cacat bawaan, sebutkan :
 - Hipotermi, tindakan :
 - a.
 - b.
 - c.
39. Pemberian ASI
 - Ya, waktu : jam setelah bayi lahir
 - Tidak, alasan
40. Masalah lain, sebutkan :
 Hasilnya :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samat -Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-2165 /FKIK/PP.00.9/08/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 20 Agustus 2018

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'ataikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Sri Hasmika Lestari
NIM : 70400115041
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Gawat Janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa

Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.SiT., M.Keb.
2. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 19 Juli 2018

Kepada

Nomor : 070/1237 /BKB.P/2018
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 2806/S.01/PTSP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SRI HASMIKA LESTARI
Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono, 16 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Benteng Somba Opu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "*MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY X DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018*"

Selama : 18 Juli s/d 30 Agustus 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. ...



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 164/Diklat.RSUD-SY/VIII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Sri Hasmika Lestari
N i m : 70400115041
I n s t i t u s i : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin (INC) RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny " H " Dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) Disertai Gawat Janin Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018* pada Tanggal 23 Juli 2018 S/D 23 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 02 Agustus 2018

An. Ketua Diklat
Koordinator bagian Penelitian


Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS
NIP. 19630101987032019

RIWAYAT HIDUP



Nama : **Sri Hasmika Lestari**
Tempat/ Tanggal Lahir : Ciniayo, 16 Mei 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Bontorannu, Kec. Bangkala, Jeneponto

Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Sunggumanai Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 3 Bangkala Lulus Tahun 2011
3. SMK Prima Negara Jeneponto Lulus Tahun 2014
4. DIII Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2015