

SKRIPSI

**HUBUNGAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN KEJADIAN DIARE
DI DESA LABUAJA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE
TAHUN 2011**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

ST. NURZALZALINA

70200107068

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Teriring pujian dan rasa syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat iman, umur, kesehatan, akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian penyakit diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011”. Tidak lupa pula penyusun menghaturkan salawat serta salam kepada Baginda Rasulullah saw., beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang mutlak dipenuhi untuk menyelesaikan studi guna meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan dan rintangn. Namun, berkat dorongan semangat, masukan berupa saran, nasehat, bahkan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, sehingga akhirnya penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Mengawali lembaran awal skripsi ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan memberi banyak pelajaran serta nasehat yang teramat berharga bagi penulis khususnya, dan kepada Ibu Fatmawati Mallapiang, SKM., M.Kes., selaku pembimbing I, bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes., selaku pembimbing II, bapak dr. Muchlis Manguluang, M.Kes., selaku penguji I, dan bapak Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., selaku penguji II, yang di tengah kesibukan beliau telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Selain itu, penyusun juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang ada di Labuaja, Makassar, Kalimantan, Kendari, Lampung, utamanya kepada saudara penulis, Marsudi, Marsus, Marlina, Marlaela, Muh. Takdir, Zoul yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penyusun mulai dari pertama kuliah sampai pada akhirnya penyusun menyelesaikan kuliah.

Selanjutnya, penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bapak Kepala Tata Usaha beserta para staf Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Kakanda-kakanda, teman-teman seperjuangan, teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar angkatan Ke-46, (teman-teman himpunan mahasiswa Islam (HMI), teman-teman Magang, serta teman-teman asrama Fajar Mas (Emy, Nadz, Ca-one, Dila, Wana Farm, Ammi, Ria, Asri) yang selama ini membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penyusun menerima kritikan dan saran dari para pembaca yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini. Besar harapan penyusun kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat ridho dan pahala dari-Nya. Amin...*Resopa Temmangngingi Namalomo Naletai Pammase Dewata Nuun Wal Qalami Wamaa Yasthuruun*

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2011

Penyusun,

St. Nurzalzalina

NIM. 70200107068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Air	8
B. Tinjauan Umum Tentang Kejadian Diare	23
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Risiko Kesmas Terhadap Diare	30
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	38
B. Hubungan Variabel Yang Diteliti	41
C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif	42
D. Hipotesis.....	44

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian45

B. Populasi dan Sampel46

C. Pengumpulan Data46

D. Instrumen Penelitian47

E. Pengolahan dan Analisis Data48

F. Penyajian Data50

G. Jadwal Penelitian50

BAB V PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....50

B. Pembahasan.....65


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ada 17 masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, salah satunya masalah yang paling serius adalah air. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari.

Selain itu, dalam al-Qur'an banyak surat yang menjelaskan tentang sumber air bersih. (Q.S.al-Anfaal : 11).

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan diturunkannya hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan air hujan itu dan menghilangkan dari kamu kotoran setan dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguh dengannya telapak kaki (kamu)” (Departemen Agama RI, 2005)

Selain ayat tersebut, dalam al-Qur'an terdapat pula ayat lain yang menjelaskan tentang sumber-sumber air bersih yaitu terdapat pada Q.S. al-Furqaan : 48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan” (al-Furqaan : 48).

Adapaun maksud atau kesimpulan dari kedua ayat tersebut yaitu pada Q.S.al-Furqaan : 48 yaitu Allah menyebut nikmat-nikmatnya yang lain guna menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya serta kewajaran-Nya untuk disembah. Sedangkan maksud atau kesimpulan dari Q.S.al-Anfaal : 11 yaitu menguraikan nikmat lain yang dianugerahkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk menanamkan ketentraman hati, memperteguh hati, dan menyucikan kamu dengannya, serta memperkuat hati yang ditandai dengan nikmat yang diperintahkan untuk diingat (Shihab, 2002).

Berdasarkan No.907/MENKES/SK/VII/2000 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas air yang disebut sebagai air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum, Sedangkan yang disebut sebagai air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kualitas air secara fisika, kimia dan biologi sedangkan syarat kualitas yang harus dimiliki adalah bebas dari mikroorganisme dan bebas dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan.

Kualitas air secara mikrobiologis yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat adanya bakteri *E.Coli* atau *Coli tinja* di dalam air bersih tersebut. Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan

yaitu penyakit diare dimana penularannya bersifat fecal-oral (anus-mulut). Karena itu, penyakit diare dapat ditularkan melalui beberapa jalur, di antaranya jalur yang melalui air dan jalur yang melalui alat-alat dapur yang dicuci dengan air (Rina mutiara ginting, 2008).

Menurut WHO penyebab lain dari penyakit diare adalah infeksi dari berbagai bakteri yang disebabkan oleh kontaminasi makanan maupun air minum, Infeksi berbagai macam virus, alergi makanan, khususnya susu atau laktosa (makanan yang mengandung susu), parasit yang masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang kotor. Sehingga, masyarakat ditekankan untuk melakukan gerakan mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada lima waktu penting sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan.

Di Indonesia, diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan menimbulkan banyak kematian terutama pada bayi dan balita, serta sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2003, penyakit diare menempati urutan kelima dari 10 penyakit utama pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit dan menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di Rumah Sakit. Berdasarkan data tahun 2003 terlihat frekuensi KLB penyakit diare sebanyak 92 kasus dengan 3865 orang penderita, 113 orang meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) 2,92%. Kasus diare akut

yang ditangani di praktek sehari-hari berkisar 20% dari total kunjungan untuk usia di bawah 2 tahun dan 10% untuk usia di bawah 3 tahun (Depkes RI, 2007).

Di Indonesia, berdasarkan laporan Kabupaten/Kota pada tahun 2008 diperoleh angka kesakitan diare sebesar 27,97 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan diare pada tahun 2009 sebesar 27,25 per 1000 penduduk. Pada data di atas, Kabupaten/ Kota dengan angka kesakitan diare tertinggi pada tahun 2009 (36,87-55,13 per 1000 penduduk) yaitu Kab. Takalar, dan peringkat terendah adalah Kabupaten Bone (1,16-19,40 per 1000 penduduk).

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota pada tahun 2008, kasus diare kembali mengalami penurunan yaitu 209.153 kasus, tertinggi masih di Kota Makassar (45.929 kasus) dan terendah di Kab.Enrekang (400 kasus). Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 226,961 kasus, tertinggi di Kota Makassar (45.014 kasus) dan terendah di Kabupaten Selayar (Sudarianto, 2010).

Berdasarkan data dari Dinas Kabupaten Bone Jumlah penderita diare yang dapat dihimpun melalui laporan dari 36 Puskesmas selama tahun 2008 sebesar 10.845 penderita. Puskesmas yang terlihat menunjukkan cakupan penemuan penderita tertinggi adalah Puskesmas Sibulue (677 Penderita) IR = 2,21 % dan yang terendah adalah Puskesmas Lonrong (39 Penderita) (IR = 0,53 %).

Selain itu, berdasarkan data penyakit yang diperoleh dari Puskesmas Kahu Palattae bahwa penyakit diare merupakan kasus terbesar ke-10 sebanyak 459 jumlah kasus dibawah kasus Influenza (Data Puskesmas Kahu Palattae, 2010).

Sedangkan menurut data kualitas air bersih yang diperoleh dari seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan (PKL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum sampai dengan tahun 2007 baru mencapai 62,51 % dan 37,49 % rumah 19 rumah tangga belum tercakup air bersih.

Begitu pula halnya dengan kualitas air sumur gali yang ada di Desa Labuaja. Keberadaan sumur gali (SGL) yang ada di Desa Labuaja baik dari segi konstruksinya, maupun jarak peletakan terhadap sumber pencemaran masih sangat memprihatinkan sehingga mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya pencemaran kualitas air baik yang berasal dari jamban, sampah dan dari air buangan lainnya (Profil Puskesmas Kahu, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya air terhadap kesehatan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk mengetahui hubungan sarana kesling, kualitas air sumur gali, dan hubungan keberadaan bakteri *E.Coli* dalam air dengan kejadian diare, mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah yang masih menggunakan sumur gali yang letaknya berada di tengah sawah dan pinggiran sungai sebagai sarana air bersih dalam kehidupan sehari-hari padahal keadaan sumur tersebut masih ada yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka timbul permasalahan, yaitu bagaimana hubungan sarana kesehatan lingkungan (konstruksi sumur gali), kualitas air sumur gali (keberadaan bakteri *E.Coli* dalam air) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan sarana kesehatan lingkungan (konstruksi sumur gali) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.
- b. Mengetahui hubungan kualitas air sumur gali (keberadaan bakteri *E.Coli* dalam air) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini kami harapkan :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam upaya pengendalian penyakit diare dan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

2. Manfaat Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu kesehatan dan lingkungan dan sebagai referensi bagi mahasiswa terutama mengenai kejadian penyakit diare dan kualitas air sumur gali yang sesuai dengan syarat kesehatan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan sarana pengembangan teori yang telah didapat dalam perkuliahan sehingga diperoleh pengalaman langsung khususnya mengenai hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian diare yang ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi masyarakat di Desa Labuaja Kecamatan Kahu tentang kejadian penyakit diare dan kualitas air sumur gali daerah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Air

1. Pengertian Air

Air adalah bagian dari permukaan bumi. Bagi kehidupan mahluk, air bukan merupakan hal yang baru, karena tanpa adanya air tidak satu pun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung. Oleh karena itu, air dikatakan sebagai benda mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dari jumlah yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya maupun diperolehnya air. Air mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair, dan uap. Air dalam bentuk padat adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa sedangkan air yang berbentuk uap adalah awan, embun. Air terdiri dari unsur kimia, yaitu ion hydrogen dan ion oksigen. Unsur- unsur inilah yang kemudian membentuk air.

Air penting bagi kehidupan manusia, Oleh karena itu secara kuantitas dan kualitas harus memenuhi kebutuhan manusia. Air secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan kesehatan akan mengganggu pemakainya. Air secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beberapa penyakit dalam garis besarnya.

Dalam menangani masalah penyediaan air bersih dan khususnya air minum, perlu diketahui kualitas dari air yang dikonsumsi. Sehingga dengan demikian akan dapat diketahui mana kualitas air yang layak dan mana kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Seperti yang terkandung dalam Q.S.al-Waqia'ah : 68 Allah berfirman.

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

Terjemahnya:

”Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum”
(Departemen Agama RI, 2005).

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang proses air sehingga menjadi tawar, asin, lalu menurunkannya awan dalam keadaan yang enak untuk diminum. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak semua awan dapat mengakibatkan turunnya hujan tetapi, hanya awan tertentu yang mengandung benih-benih lainnya. Dalam ayat ini pula Allah menunjukkan kuasanya bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur turunnya hujan, dan ada juga sistem dan hukum-hukum tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk maksud tersebut (Quraish Shihab, 2002).

Pentingnya air di dalam tubuh dapat dilihat berikut ini :

1. Apabila suatu saat tubuh kehilangan seluruh cadangan lemak dan juga kehilangan setengah dari cadangan protein, hal ini tidak akan membahayakan manusia, namun apabila terjadi kehilangan 20% saja air

dari dalam tubuh akan dapat menyebabkan kematian. Hal yang sama pun dapat berlaku bagi makhluk hidup lainnya.

2. Jika pada musim kemarau manusia merasa kekurangan air, hal ini adalah wajar, karena memang pada saat itu sangat sulit memperoleh air, karena hal ini jumlahnya sangat sedikit. Tetapi tidak sedikit pula orang pada musim penghujan akan kekurangan air, pada saat itu air berlimpah-limpah dijumpai dimana-mana. Kejadian seperti ini sudah sering dijumpai, air yang dibutuhkan manusia sebenarnya bukanlah sembarang air, tetapi air yang benar-benar sehat yang tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah dikemukakan dalam (Q.S.an-Nahl : 1) yaitu :

أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ سُبْحٰنَهُۥ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” (Departemen Agama, 2005).

Maksud ayat tersebut yaitu Allah melarang manusia untuk durhaka dan dengan tujuan mengejek, dan jangan juga kamu percaya guna memuaskan dendam meminta agar disegerakan datangnya ketetapan yang dijanjikan Allah itu, atau janganlah meminta Allah untuk mempercepatnya. Selain itu dalam ayat ini pula Allah melarang suatu kaum untuk mempersekutukan Allah yakni berhala karena dengan demikian maka tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya (Shihab, 2002).

2. Jenis dan syarat-syarat air

1. Air permukaan

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi termasuk didalamnya yaitu air sungai, air danau dan air telaga buatan (sumur sederhana). Adapun sifat/ karakteristik air yang ada pada umumnya dijumpai di daerah tropis.

2. Air tanah

Air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengikisan atau penambahan secara terus menerus oleh alam. Karena di dalam tanah air dalam keadaan yang bergerak, walaupun secara pelan, Bergeraknya air tersebut melalui bagian yang bersifat poros ataupun patahan/ retakan pada lapisan tanah, dan bila air bergerak ini keluar lagi dari permukaan tanah akan muncul sebagai sumber air. yang tergantung kedalamannya biasa disebut air tanah dangkal atau air tanah dalam.

3. Air angkasa

Air angkasa yaitu air yang berasal dari atmosfer seperti salju, es dan hujan. Kualitas air sebagai sumber air tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam serta aktifitas manusia disekitarnya. Air tanah dangkal dan permukaan dapat berkualitas baik jika lingkungan sekitarnya tidak tercemar, oleh karena itu permukaan dan air tanah dangkal sangat bervariasi kualitasnya. Air permukaan dapat mengandung banyak zat organik yang mudah terurai yang

merupakan makanan bagi bakteri. Semuanya itu sangat mempengaruhi kualitas air tersebut. Air tanah dalam pada umumnya tergolong bersih dilihat dari segi mikrobiologisnya, namun demikian kadar kimia air tanah dalam maupun artesis tergantung dari formasi litosfir yang dilaluinya.

Air dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas yaitu :

1. Air kelas I, yaitu air yang tidak perlu pengolahan, air tanah atau air laut, air permukaan dengan tidak ada kontaminasi.
2. Air kelas II, yaitu air yang hanya perlu desinfeksi, air tanah atau air permukaan dengan kemungkinan kontaminasi kecil, jernih.
3. Air kelas III, yaitu air yang perlu penyaringan disertai chlorinasi, semua sumber memerlukan penyaringan untuk menjernihkan dan chlorinasi untuk desinfektan.
4. Air kelas IV, yaitu air yang perlu pengolahan lengkap selain penyaringan diperlukan pula chlorinasi dan presedimentasi.
5. Air kelas V, yaitu air yang perlu pengolahan spesifik misalnya air sumur harus mempunyai kedalaman minimal 4 meter.

Untuk kepentingan masyarakat sehari-hari, persediaan air harus memenuhi standar air minum dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Kualitas air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum pun seharusnya tidak mengandung kuman pathogen dan segala makhluk yang membahayakan kesehatan manusia. Tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak dapat

diterima secara estetis dan dapat merugikan secara ekonomis. Air itu seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya (Soemirat,2007).

Seperti halnya yang telah dikemukakan dalam (Q.S.al-Anbiya: 30) Allah berfirman :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”(Departemen Agama, 2005).

Ayat di atas menjelaskan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi pepohonan, kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi (Shihab, 2002)

Atas dasar pemikiran tersebut dibuat standar air minum yaitu suatu peraturan yang memberi petunjuk tentang konsentrasi berbagai parameter yang sebaiknya diperbolehkan ada dalam air minum agar tujuan penyediaan air bersih dapat tercapai.

Menurut WHO, standar-standar air minum yang harus dipenuhi agar suatu persediaan air dapat dinyatakan layak sebagai air minum :

1. Memenuhi persyaratan fisik
2. Memenuhi persyaratan biologis
3. Mengandung zat- zat kimia
4. Mengandung radioaktif

Negara maju lebih menekankan standar kimia, sedangkan negara berkembang lebih menekankan standar biologis (Chandra, 2007).

a. Persyaratan kualitas air

Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan biologis. Berikut persyaratan air bersih sesuai dengan peraturan Permenkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih harus memenuhi syarat fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2000 tentang syarat-syarat kualitas air menyatakan bahwa syarat mikrobiologis air bersih yang digunakan harus terhindar dari kemungkinan mengandung kuman-kuman yang bersifat parasit dan patogenik. Untuk persyaratan mikrobiologi air bersih dinyatakan baik, bila total *Coliform* = 50 ppm (memenuhi syarat), dan tidak baik, bila Total *Coliform* = > 50 ppm (tidak memenuhi syarat).

1) Persyaratan fisika Air

a) Tidak berwarna

Air untuk rumah tangga harus jernih, air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

b) Tidak berbau

Bau air tergantung dari sumbernya. Bau air dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ganggang, plankton, atau tumbuhan dan hewan air baik hidup ataupun yang sudah mati.

c) Tidak berasa

Secara fisik air bias dirasakan oleh lidah, air yang tidak terasa asin, manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan oleh garam-garam tertentu yang larut dalam air sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

d) Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan padatan sehingga memberikan warna yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan meliputi tanah liat, lumpur, dan bahan-bahan organik.

e) Temperaturnya normal

Air yang baik harus memiliki temperature yang sama dengan temperature udara (20-26⁰C).

2) Persyaratan kimia

- a) Ph netral, derajat keasaman air minum harus netral. Tidak boleh bersifat asam atau basah. Air murni mempunyai ph 7, apabila ph di bawah 7 berarti bersifat asam, sedangkan di atas 7 bersifat basa.
- b) Tidak mengandung zat kimia beracun, seperti sianida, sulfide dan fenolik. Dan tidak mengandung ion logam seperti Fe, Mg, Ca, dan sebagainya.
- c) Kesadahan rendah, tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut di dalam air.
- d) Tidak mengandung bahan-bahan organik, kandungan organik yang terlarut dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

3) Persyaratan biologi

Air sebaiknya tidak mengandung bakteri pathogen yang mengganggu kesehatan. Standar yang dipakai adalah total bakteri *Coliform* (MPN) pada sarana air bersih bukan perpipaan tidak boleh lebih 50/100 ml sedangkan pada sarana air bersih system perpipaan tidak boleh lebih dari 10/100 ml air.

4) Syarat radioaktif

Yaitu adanya batas tertinggi yang diperkenankan adanya aktifitas Alpha dan Beta tidak boleh lebih dari 0,1 Bq/L. Pengadaan air bersih untuk

berbagai keperluan hidup manusia dapat berasal dari berbagai sumber dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda.

Syarat-syarat Air Minum:

1. Syarat kuantitas

Kebutuhan air untuk daerah perkotaan diperkirakan 150-300 liter/orang/hari. Sedangkan untuk daerah pedesaan sekitar 100-15 liter/orang/hari.

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Minum | : 5 liter |
| 2) Memasak | : 5 liter |
| 3) Mencuci/membersihkan | : 15 liter |
| 5) Mandi | : 30 liter |
| 6) Kakus | : 45 liter |

Jumlah : 100 liter/hari/kapita

2. Syarat kualitas terdiri dari :

- 1) Syarat Fisik : Suhu, Warna, Rasa, Bau, Kekeruhan, Solid, Konduktifitas, dan sebagainya.
- 2) Syarat Kimia : Total Solid, Sulfat, Klorida, Fluorida, dll.
- 3) Syarat Mikrobiologi : Meliputi kuman-kuman parasit, kuman-kuman penyakit, dan bakteri golongan *Coli*.
- 4) Syarat Radioaktifitas : Meliputi benda-benda radioaktif yang terkandung dalam air. Radioaktifitas yang terdapat dalam suatu air

dapat berasal dari kebocoran dari industri-industri nuklir, pusat pembangkit tenaga nuklir dari sampah-sampah radioaktif yang dapat bersatu dengan pasir atau lumpur dalam kehidupan biologis atau terlarut dalam air.

3) Jenis penyediaan air bersih

Jenis sarana air bersih yang ada pada masyarakat antara lain sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur artesis dan infiltrasion galleries, jenis sarana ini biasanya diterapkan di pedesaan. Pada daerah perkotaan jenis sarana air bersih yang biasanya ada pada masyarakat antara lain sumur gali, sumur pompa tangan dan jaringan perpipaan dari PDAM.

Sumur dengan konstruksi tidak memenuhi syarat namun memiliki kualitas kimia air yang memenuhi syarat, dapat memberikan indikasi bahwa sumur pada konstruksi tidak memenuhi syarat biasanya masih bersifat tradisional sehingga hasil yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh berbagai kemungkinan pencemaran dari bahan kimia. Selain itu, keadaan tanah turut mempengaruhi dimana pada penelitian ini tidak dibatasi pada keadaan jenis tanah dan jika dihubungkan dengan hal tersebut dapat memberi interpretasi bahwa dominan sumur memiliki konstruk dengan kemampuan filterisasi maksimal terhadap kandungan berbagai bahan kimia sehingga menghasilkan air dengan kualitas kimia yang memenuhi syarat.

Konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah aspek pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik sumur terhadap dampak konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, aspek pengetahuan yang lain mencakup ketidaktahuan pemilik sumur tentang konstruksi sumur yang memenuhi syarat juga turut mempengaruhi.

Aspek lain yang mempengaruhi konstruksi sumur tidak memenuhi syarat adalah keadaan perekonomian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air dimana untuk membuat sumur dengan konstruksi sumur yang memenuhi syarat membutuhkan dana yang lebih besar seperti pengadaan semen dalam pembuatan lantai, dan dinding sumur.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap sarana air bersih, maka diperlukan persyaratan dari masing-masing sarana tersebut, yaitu :

- a. Untuk sumur gali, konstruksinya :
 - 1) Terletak jauh dari sumber pencemaran secara horizontal dalam tanah.
 - 2) Dinding sumur yang kedap air, 3 meter dari permukaan tanah, ini mencegah terjadinya pencemaran secara vertikal.
 - 3) Mempunyai bibir sumur rapat air setinggi 70 cm untuk mencegah terjadinya pencemaran secara vertikal.
 - 4) Lantai sumur yang kedap air berukuran minimal 1 m dari dinding sumur dan terbuat agak miring ke saluran pembuangan air kotor, serta ditinggikan minimal 20 cm dari permukaan tanah.

- 5) Saluran pembuangan air kotor kedap air sepanjang minimal 11 m dan dilengkapi dengan sarana pembuangan air limbah.
- 6) Letak sumur gali harus di atas dari sumber pengotoran pada arah aliran tanah.
- 7) Harus ada lapisan tanah yang mengandung air sepanjang masa.

b. Untuk sumur pompa tangan/ sumur bor, konstruksinya :

- 1) Dapat berfungsi dengan baik dan mudah mempergunakannya.
- 2) Terletak minimal 11 m dari sumber pencemaran.
- 3) Dilengkapi dengan lantai kedap air minimal 11 m dari sisinya.
- 4) Debit yg mencukupi untuk keperluan sepanjang tahun.
- 5) Jaringan perpipaan/PDAM

Umumnya kualitas dari PDAM sudah memenuhi syarat hanya saja kebutuhan akan air dan PDAM bagi masyarakat tertentu hanya cukup untuk kebutuhan dan minum, sehingga untuk keperluan lain diambil dari sarana yang lain, yang kualitasnya memenuhi syarat.

4. Fungsi air bagi kehidupan manusia

Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi proses dan kelangsungan hidup manusia. Tubuh manusia sebagian terdiri dari air, sekitar 60-70% dari berat badannya. Oleh karena itu air merupakan unsur yang sangat penting. Adapun fungsi air di dalam tubuh adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pelarut yang baik
- b. Untuk membantu proses pencernaan.

- c. Untuk membentuk cairan tubuh.
- d. Sebagai alat pengangkutan terutama pengangkut unsur- unsur gizi
- e. Sebagai alat pengangkut sisa-sisa pembakaran yang tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh.
- f. Sebagai pengatur panas tubuh.
- g. Sebagai bahan pembentuk protoplasma.
- h. Sebagai bahan yang mengambil bagian pada proses fotosintesis.

Di samping sebagai air minum, air juga berfungsi atau berperan sangat penting di dalam menunjang kelangsungan hidup manusia misalnya untuk pertanian. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari, manusia amat tergantung pula pada air. Karena di samping sebagai air minum, air juga dipergunakan untuk mencuci, mandi, dan membersihkan. Manfaat lain dari air berupa sumber pembangkit tenaga, sebagai bahan irigasi, alat transportasi, olah raga, dan rekreasi. Selain fungsi air tersebut, air juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Air penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu secara kuantitas dan kualitas harus memenuhi kebutuhan manusia. Air secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan kesehatan akan mengganggu pemakai. Air secara langsung dapat menyebabkan beberapa penyakit. Dalam garis besarnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibedakan atas penyakit infeksi dan non infeksi.

Menurut Slamet (2008) dalam liris Mardiana (2009) mengemukakan bahwa air yang ditemukan di Indonesia, dapat digolongkan berdasarkan agent penyebabnya dan jenis yang ditimbulkannya, berupa :

a. Agent penyebab berupa virus, terdiri dari :

- 1) Rota virus, menyebabkan diare
- 2) Virus hepatitis A menyebabkan hepatitis A
- 3) Virus poliomyelitis menyebabkan disenteriae

b. Agent penyebab berupa bakteri, terdiri dari :

- 1) *Vibrio cholera* menyebabkan cholera
- 2) *Escherchia coli* menyebabkan diare/dysentri
- 3) *Salmonella typhi* menyebabkan thypus abdominalis

c. Agent penyebab berupa protozoa, terdiri dari :

- 1) *Entamoeba histolityca*, menyebabkan disentry amoeba
- 2) *Balatidia coli* menyebabkan balantidiasis
- 3) *Giardia lamblia* menyebabkan giardiasis

d. Agent penyebab berupa metazoan, terdiri dari :

- 1) *Ascariasis lumbricoides* menyebabkan ascariasis
- 2) *Clonorchis sinensis* menyebabkan cholonchiasis
- 3) *Diphylobotrium* menyebabkan dyphilobothriasis

B. Tinjauan Umum Tentang Kejadian Penyakit Diare

1. Pengertian

Hampir semua orang pernah menderita suatu penyakit, dari yang ringan sampai berat, bahkan berakibat fatal berupa cacat maupun kematian (Anies, 2006).

Menurut Depkes RI Dirjen P2M dan PLP, diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya disertai dengan adanya perubahan bentuk dan konsistensi tinja dari penderita yang bersangkutan.

Diare diartikan sebagai keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi atau lebih dari 3 kali pada anak dimana konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja (Ngastiyah, 2005).

Diare adalah sebuah penyakit dimana penderita mengalami buang air besar yang sering dan masih memiliki kandungan air berlebihan. Di dunia, diare adalah penyebab kematian paling umum kematian balita, membunuh lebih dari 1,5 juta orang per tahun (Budi, 2008).

Beberapa faktor penyebab diare yaitu faktor infeksi, faktor malaborasi, faktor makanan, faktor psikologi yang meliputi rasa takut dan kecemasan, serta faktor lingkungan. Faktor-faktor penyebab diare tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Penyebab

Secara umum penyebab diare dapat dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu: (Depkes RI, 2003).

a. Faktor infeksi

1) Infeksi enteral

- a) Bakteri, seperti *vibrio E. Coli*, *Salmonella*, *Shigella*.
- b) Virus, seperti *Enterovirus*, *Adenovirus*, *Coxsackie*, *Rotavirus*.
- c) Parasit, termasuk cacing, protozoa, dan jamur.

2) Infeksi parental

Infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti otitis media akut, tonsillitis, tonsilofaringitis. Keadaan ini terutama pada bayi dan anak-anak.

b. Faktor malabsorpsi

- 1) Malabsorpsi karbohidrat.
- 2) Malabsorpsi lemak.
- 3) Malabsorpsi protein.

c. Faktor makanan

Termasuk makanan basi, beracun, dan alergi terhadap makanan.

d. Faktor psikologi

Seperti rasa takut dan cemas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare adalah :

1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian diare adalah penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat-syarat, pembuangan air limbah, dan pembuangan tinja yang tidak saniter.

2) Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kejadian diare adalah meliputi pendidikan dan taraf ekonomi berpengaruh kepada kemampuan penyediaan sarana air bersih, jamban keluarga, pembuangan air limbah, dan pembuangan sampah.

3) Faktor sosial budaya

Yang termasuk dalam faktor sosial budaya disini adalah pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat.

4) Keadaan gizi bila keadaan gizi seseorang kurang baik maka akan dapat mempengaruhi kondisi atau daya tahan tubuh seseorang. Hal ini memungkinkan untuk terkena penyakit yang lebih tinggi.

Sebagai tambahan, beberapa faktor yang berhubungan dengan bertambahnya kecenderungan untuk dijangkiti penyakit diare dan tingginya insiden penyakit adalah:

1) Gizi kurang

2) Kurang kekebalan atau menurunnya daya tahan tubuh

3) Berkurangnya keasaman lambung

4) Menurunnya mortalitas usus

5) Faktor genetik (Abas. 2008).

Diare menurut proses berlangsungnya yaitu :

1) Diare akut

Bila penderita buang air besar dengan frekuensi tinja yang lebih lembek atau cair, kejadian bersifat mendadak, dan berlangsungnya dalam kurung waktu dua minggu.

2) Diare kronis

Bila berlangsungnya sampai dua minggu atau lebih , umumnya bersifat lambat dan berlangsungnya dalam kurung waktu lama.

2. Sumber penularan (Reservoir)

Agent penyebab penyakit yang akan menginfeksi manusia sebelum berpindah ke host, berasal dari sumber penularan yang disebut reservoir. Sebelum memasuki jalur penularan agent penyebab penyakit diare hidup dan berkembang biak pada manusia, binatang piaraan, termasuk tikus, kucing, jenis unggas, kura-kura, dan anjing.

a. Cara keluar masuk kuman dari sumber penularan

Kuman penyebab diare keluar dari tubuh reservoir melalui saluran pencernaan, baik bersama ludah, muntah, maupun bersama tinja.

b. Cara penularan dan faktor resiko

Agent infeksius yang menyebabkan penyakit diare biasanya ditularkan melalui jalur *felacoral* terutama karena :

1) Makanan atau air yang menelan terkontaminasi

2) Kontak dengan tangan yang terkontaminasi

3. Manifestasi Klinik

Mula-mula pasien cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan kurang atau tidak sama sekali, kemudian timbul diare. Tinja cair, mungkin disertai lendir dan darah. Warna tinja makin lama berubah kehijau-hiajauan karena bercampur empedu (Depkes RI, 2003).

4. Akibat Diare

Akibat diare adalah kekurangan cairan tubuh dan garam-garam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Makin lama seseorang terkena penyakit diare semakin banyak dan cepat kehilangan cairan. Akibatnya akan menimbulkan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian (Depkes RI, 2003).

5. Pedoman Panatalaksanaan Penyakit Diare

Prinsip penatalaksanaan penyakit diare adalah: (Depkes RI, 2003)

- a. Diare cair membutuhkan penggantian cairan dan elektrolit tanpa melihat etiologinya. Tujuan terapi rehidrasi untuk mengoreksi kekurangan cairan dan elektrolit secara cepat kemudian mengganti cairan yang hilang sampai diarenya berhenti. Jumlah cairan yang diberi harus sama dengan jumlah cairan yang telah hilang karena diare dan/atau muntah (PWL), ditambah dengan banyaknya cairan yang hilang melalui keringat, urine, dan

pernafasan (NWL), ditambah dengan banyaknya cairan yang hilang melalui tinja dan muntah yang masih terus berlangsung (CWL). Jumlah ini tergantung pada derajat dehidrasi dan berat badan anak atau golongan umur.

- b. Makanan harus diteruskan bahkan ditingkatkan selama diare untuk menghindari efek buruk pada status gizi.
 - c. Antibiotik dan antiparasit tidak boleh digunakan secara rutin, tidak ada manfaatnya untuk kebanyakan kasus, termasuk diare berat dan diare dengan panas, kecuali pada disentri, suspek kolera dengan dehidrasi berat dan diare persisten.
 - d. Obat-obatan antidiare meliputi antimotilitas (misalnya *Loperamid*, *Difenoksilat*, *Kodein*), adsorben (misalnya *Norit*, *Kaolin*, *Attapulgit*). Anti muntah termasuk *Prometazin* dan *Klorpromazin*.
6. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Diare
- Dalam usaha agar tidak terserang penyakit gastroenteritis/diare, maka upaya yang dilakukan adalah: (Depkes RI, 2003)
- a. Menggunakan sumber air minum yang bersih.
 - b. Makanan dan minuman yang dimasak disimpan di tempat yang tertutup supaya terhindar dari lalat.
 - c. Buang air besar di jamban atau di kakus yang sehat.

- d. Menjaga kebersihan perorangan, seperti mencuci tangan setiap kali selesai buang air besar, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kuku tangan dijaga kebersihannya dan tidak panjang.
- e. Selalu menjaga kebersihan alat-alat rumah tangga.
- f. Mengonsumsi makanan yang bergizi.
- g. Menjaga agar lingkungan tempat tinggal tetap bersih.
- h. Sanitasi lingkungan yang ada, antara lain jamban keluarga dan penyuluhan untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap sumber air, tanah, makanan, dan lingkungan pemukiman lainnya.
- i. Imunisasi campak pada anak-anak (bayi). Imunisasi diberikan pada bayi berusia kurang dari 9 bulan, dan kegiatan ini perlu terus-menerus diperhatikan terutama tentang dampaknya terhadap kesakitan dan kematian terhadap diare.

2. Tinjauan Umum Tentang Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat Terhadap Kejadian Penyakit Diare

a. Kualitas Air

Syarat-syarat air minum yang sehat meliputi syarat fisik, syarat kimia, dan syarat bakteriologis. Ke tiga syarat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Syarat fisik

Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening (tidak berwarna), tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Cara mengenal air yang memenuhi persyaratan fisik tidak sukar.

2. Syarat bakteriologis

Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara ini untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen, adalah dengan memeriksa sampel air tersebut. Dan bila dari pemeriksaan 100 cc air terdapat kurang dari 4 bakteri *E. Coli* maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan.

3. Syarat kimia

Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia dalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Bahan-bahan atau zat kimia yang terdapat dalam air yang idealnya antara lain: Flour (1-1,5), Chlor (250), Arsen (0,05), Tembaga (1,0), Besi (0,3), Zat organic (10), Ph (6,5-9,0), CO₂ (0).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu:

- a. Syarat fisik: suhu ($\pm 3^{\circ}\text{C}$), warna (15 TCU), kekeruhan (5 NTU), tidak berbau dan berasa
- b. Syarat kimia: kimia anorganik dan kimia organik (yang memberikan pengaruh pada kesehatan dan yang memberikan keluhan pada konsumen), pestisida, desinfektan, dan hasil sampingannya.
- c. Syarat mikrobiologi: jumlah *E. Coli* dan total bakteri *Coliform* harus 0 dalam 100 ml sampel (air minum, air yang masuk sistem distribusi, air pada distribusi)
- d. Syarat radioaktifitas : *gross alpha activity* (0,1 Bq/l) dan *gross beta activity* (1 Bq/l)

Penyakit-penyakit yang sering menular dengan perantara air yaitu meliputi kuman-kuman parasit, kuman-kuman penyakit dan bakteri golongan *Coli* sehingga menimbulkan penyakit diare.

Adapun air rumah tangga dikatakan memenuhi syarat bakteriologis apabila :

- a) Tidak mengandung suatu bibit penyakit
- b) Tidak mengandung bakteri *Eschereria Coli*
- c) Bakteri saprophyt tidak lebih dari 100/ ml air (Entjang, 2000).

Kualitas bakteriologi air di alam, baik di angkasa, di permukaan, maupun air tanah mengandung kuman. Jumlah dan jenis kuman tersebut bervariasi dan berada sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhinya. Kualitas bakteriologis air yang tidak memenuhi syarat dapat dipengaruhi oleh keadaan konstruksi sumur gali dimana konstruksi yang tidak memenuhi syarat

memungkinkan air yang dihasilkan dapat terkontaminasi oleh bahan-bahan kontaminan yang mengandung mikrobiologi pathogen.

Keberadaan faecal material di dalam air dapat membahayakan jika mengandung mikroorganisme pathogen. Penyakit-penyakit yang ditransmisikan melalui faecal material dapat disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, dan metazoa. Oleh karena itu, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagai air minum harus bebas dari kuman-kuman pathogen. *Bakteri E.Coli* adalah penyebab infeksi saluran pencernaan. *E.Coli EPEC* (Enteropathogenic) Infeksi *E.Coli* biasanya masuk lewat mulut melalui makanan yang terkontaminasi sehingga bisa menyebabkan keracunan makanan yang serius serta mengakibatkan diare pada manusia dan hewan. *E.Coli* itu berasal dari kotoran manusia. biasanya terdapat di sumur yang berdekatan dengan septic tank, semakin dekat sumur tersebut terhadap septic tank semakin banyak kandungan *E.Colinya* (Soenarjo, 2005).

Di samping itu bakteri golongan *Escherichia Coli* berasal dari saluran pencemaran manusia sehingga apabila ditemukan dalam jumlah besar maka air tersebut telah mengalami pencemaran. Juga bakteri golongan *E.Coli* paling tahan terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, sehingga apabila bakteri lain sudah mati, bakteri golongan *E.Coli* masih bertahan hidup. Yang termasuk bakteri golongan *E. Coli* ialah bakteri dari genus *Escherichia*, *Citro bacter*, *Enterobacter* dan *Klebsiella*.

Penggunaan bakteri *Coli* sebagai indikator pencemaran masih perlu dilengkapi dengan analisa bakteri golongan *Coli tinja*, karena sebagian dari spesies bakteri golongan *E.Coli* mempunyai habitat pada tanah. Oleh karena itu, Analisa bakteri golongan *Coli tinja* ini akan lebih menjamin kemantapan hasil analisa. Adapun analisa jumlah kuman yang digunakan untuk mengetahui kepadatan bakteri aerob dan anaerob dari bakteri Heterotropik dalam air. Tujuan analisa bakteri golongan *E.Coli* dan bakteri golongan *Coli tinja* adalah untuk mengetahui adanya pencemaran dari manusia dan hewan berdarah panas pada sungai, saluran air minum, tempat-tempat pemandian dan sumur, sedangkan jumlah kuman digunakan untuk mengawasi apakah suatu sistem pengolahan berjalan baik, dan diperuntukkan pula bagi pengawasan kualitas air.

Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen, adalah dengan memeriksa sampel (contoh air) tersebut. Dan bila dari pemeriksaan 100 cc air terdapat kurang dari 4 bakteri *E. Coli*, Maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan (Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo).

b. Pemanfaatan Jamban

Menurut Notoatmodjo (2007), yang dimaksud dengan kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja (*feces*), air seni (*urine*), dan CO₂.

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi. Karena kotoran manusia (*feces*) adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber pada feces dapat melalui berbagai jalan atau cara. Untuk mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (Notoatmodjo, 2007)

1. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut.
2. Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya.
3. Tidak mengotori air tanah di sekitarnya.
4. Tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya.
5. Tidak menimbulkan bau.
6. Mudah digunakan dan dipelihara.
7. Sederhana desainnya.
8. Murah.
9. Dapat diterima oleh pemakainya.

Agar persyaratan-persyaratan ini dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Notoatmodjo, 2007)

1. Sebaiknya jamban tersebut tertutup, artinya bangunan jamban terlindung dari panas dan hujan, serangga, dan binatang-binatang lain, terlindung dari pandangan orang (*privacy*) dan sebagainya.
2. Bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai yang kuat, tempat berpijak yang kuat, dan sebagainya.
3. Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan bau, dan sebagainya.
4. Sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih.

Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk membersihkan lingkungannya dan melarang manusia untuk mengotori lingkungan terutama membuang hajat di tempat berlalunya manusia. Rasulullah saw. bersabda:

“Takutlah kamu kepada tiga hal terkutuk, yaitu : berak pada saluran air, pada tempat berteduh, dan pada tempat berlalunya manusia” (HR. Muslim).

Dalam hadist tersebut, terlihat bahwa Islam sungguh-sungguh tegas menyuarakan agar tidak mengotori sumber air bersih yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang membuang sampah, najis, dan kotoran ke dalamnya, bahkan perbuatan tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah swt (Al Fanjari, 2006).

c. Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan manusia itu berperilaku, Karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas atau perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar (Notoatmodjo, 2007).

Begitu pula halnya dengan perilaku masyarakat yang ada di desa Labuaja terutama dalam hal perilaku pemanfaatan sarana sumur gali sebagai sumber air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat setempat memiliki perilaku atau kebiasaan yang kurang baik terutama pada saat menimba dan mandi dalam keadaan berdiri dimana, secara tidak langsung air tersebut dapat tercemar oleh sisa-sisa sabun yang mereka gunakan.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Berdasarkan penjelasan dari tinjauan pustaka mengenai hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian penyakit diare, maka ada beberapa variabel yang terkait di dalamnya yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel independent yaitu : Sarana kesling yang meliputi konstruksi sumur gali, kualitas Biologis (*E.Coli*) air bersih, dan variabel dependennya adalah kejadian diare. Secara sistematis kedua variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sarana air bersih (kesehatan lingkungan)

Sarana air bersih (kesehatan lingkungan) meliputi konstruksi sumur gali. Konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah aspek pengetahuan dan ketidaktahuan yang dimiliki oleh pemilik sumur terhadap dampak konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat. Aspek lain yang mempengaruhi konstruksi sumur tidak memenuhi syarat adalah keadaan perekonomian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air dimana untuk membuat sumur dengan konstruksi sumur yang memenuhi syarat membutuhkan dana yang lebih besar seperti pengadaan semen dalam pembuatan lantai, dan dinding sumur.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap sarana air bersih, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut :

Untuk sumur gali, konstruksinya :

- a) Terletak jauh dari sumber pencemaran secara horizontal dalam tanah.
 - b) Dinding sumur yang kedap air, 3 meter dari permukaan tanah, ini mencegah terjadinya pencemaran secara vertikal.
 - c) Mempunyai bibir sumur rapat air setinggi 70 cm untuk mencegah terjadinya pencemaran secara vertikal.
 - d) Lantai sumur yang kedap air berukuran minimal 1,5 m dari dinding sumur dan terbuat agak miring ke saluran pembuangan air kotor, serta ditinggikan minimal 20 cm dari permukaan tanah.
 - e) Saluran pembuangan air kotor kedap air sepanjang minimal 11 m dan dilengkapi dengan sarana pembuangan air limbah.
 - f) Letak sumur gali harus di atas dari sumber pengotoran pada arah aliran tanah.
 - g) Harus ada lapisan tanah yang mengandung air sepanjang masa.
2. Kualitas Biologis (*E.Coli*) air bersih

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap makhluk hidup. Keadaan yang digunakan sehari-hari baik langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena air dapat menjadi media perantara bagi penyebaran penyakit seperti diare, kolera, demam, tifoid, leptospirosis dan hepatitis A.

Adapun dampak kesehatan yang bisa muncul akibat air yaitu:

- a. Dalam penyebaran penyakit menular, sumber-sumber air yang digunakan oleh masyarakat dapat menjadi penyebar mikroba patogen (*true water borne disease*). Contoh penyakit yang ditimbulkan adalah diare, kolera, *typhus*, dan *paratyphus*
- b. Air dapat menjadi sarang insekta penyebar penyakit (*water related vector borne disease*). Contoh penyakit dari golongan ini adalah demam berdarah dan malaria.
- c. Air berperan sebagai sarang hospes sementara penyakit *water based borne disease*. Contoh dari golongan ini adalah *dracontiasis* dan *schistomiasis*.

Selain hal di atas, batas standar kualitas dari masing-masing jenis air tercantum pada Permenkes tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Air bersih

MPN bakteri golongan *Coliform* 10/100 ml air untuk air yang berasal dari perpipaan dan 50/100 ml air bersih non perpipaan.

- b. Air minum


MPN bakteri *Coliform* 0/100 ml air.

MPN bakteri *Coliform tinja* 0/100 ml air

3. Kejadian diare

Kejadian diare adalah gejala dari suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan perubahan bentuk tinja menjadi encer, berair, dan biasanya berwarna putih pucat bercampur darah. Akibat diare adalah kekurangan cairan tubuh dan garam-garam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Makin lama seseorang terkena penyakit diare semakin banyak dan cepat kehilangan cairan. Akibatnya akan menimbulkan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian (Depkes RI, 2003).

B. Hubungan variabel yang diteliti



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Defenisi Operasional

a. Sarana Air Bersih (Kesling)

Sarana Air bersih (kesehatan lingkungan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi bagaimana keadaan dari pada konstruksi sumur gali yang diteliti yang dilihat dari kondisi bibir sumur, lantai sumur, dinding sumur, dan saluran pembuangan air bekas.

b. Kualitas air (bakteri *E. Coli* dalam air)

Kualitas air bersih yang diteliti adalah kualitas air sumur gali yang dijadikan sebagai air bersih ditinjau dari parameter mikrobiologis yaitu bakteri *E. Coli* yang diperiksa di laboratorium dengan menggunakan sistem tabung ganda. Standar yang digunakan sesuai dengan permenkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002.

c. Diare

Yang dimaksud diare adalah meningkatnya frekuensi buang air besar berkali-kali (lebih dari 3 kali sehari) dengan konsistensi tinja yang encer dan kadang disertai muntah.

2. Kriteria Objektif

a. Sarana Air Bersih Meliputi Konstruksi sumur gali

1. Dinding sumur harus terbuat dari tembok yang kedap air (disemen).
2. Bibir sumur gali dibuat dari tembok dengan tinggi minimal 3 m.

3. Lantai sumur dibuat dari tembok yang kedap air sekitar 1,5 meter dari dinding sumur, dan sekitar 20 cm dari permukaan tanah.

4. Memiliki saluran pembuangan air bekas di sekitar lantai sumur.

Memenuhi syarat : Jika jumlah skor risiko hasil observasi lebih dari 9-12.

Tidak memenuhi syarat : Jika jumlah skor risiko hasil observasi kurang dari 0-8.

b. Kualitas Air (Bakteri *E.Coli*)

Ada : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium terdapat *E.Coli* dengan jumlah kuman di atas jumlah batas toleransi yaitu 50/100 ml sampel air (Permenkes No.907/Menkes/SK/VII/2002).

Tidak ada : Apabila tidak memenuhi syarat diatas.

e. Diare

Menderita diare : Menderita jika kepala/anggota keluarga pernah BAB > 3 kali sehari selama tiga bulan terakhir sampai dengan pada saat penelitian.

Tidak menderita diare : Apabila tidak memenuhi kriteria di atas.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- b. Ada hubungan keberadaan bakteri *E.Coli* dengan kejadian penyakit diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

2. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- b. Tidak ada hubungan keberadaan bakteri *E.Coli* dengan kejadian penyakit diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survai analitik (*observational analytic*) dengan rancangan *cross sectional* yaitu untuk melihat adanya hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian diare. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung serta pemeriksaan sampel air di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu bertempat di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah karena di lingkungan ini banyak terjadi kasus diare pada penduduknya dan banyak penduduk yang memiliki sanitasi dasar serta penyediaan air bersih yang berasal dari sumur gali yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Selain itu kondisi desa tersebut tergolong dalam suatu hunian yang padat penduduknya dengan jumlah 438 jumlah KRT serta kondisi tekstur tanah yang padat. Semakin padat jumlah penduduk pada suatu daerah, maka semakin besar pula potensi terjadinya pencemaran lingkungan terutama dalam hal pemanfaatan sumur gali sebagai sarana air bersih bagi masyarakat setempat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua KRT yang memakai sumur gali sebagai sarana air bersih yang ada di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011 sebanyak 438 KRT.

2. Sampel

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 210 KRT, besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{4}{1+4(0,05^2)}$$

$$n = 210 \text{ KRT}$$

Keterangan:

N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,05)

D. Metode Pengumpulan data

Data Primer : Data diperoleh dengan cara observasi langsung pada variabel yang akan diteliti dan pengisian kuesioner pada masyarakat desa labuaja serta melalui pemeriksaan sampel air yang diperiksa di Laboratorium Dinkes Kabupaten Bone yang

pemeriksaan bakteriologisnya menggunakan sistem tabung ganda.

Data Sekunder : Data penyakit diare, data umum mengenai pembagian wilayah dan demografi diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Puskesmas Kahu Palattae, dan Instansi terkait di wilayah penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan alat-alat untuk wawancara seperti kuesioner (daftar pertanyaan), lembar observasi dan peralatan laboratorium untuk pemeriksaan sampel air. Adapun peralatan yang digunakan yaitu:

1. Peralatan

Komponen pemeriksaan(peralatan) yang digunakan meliputi:

- a. Water bath
- b. Inkubator
- c. Autoclave
- d. Tabung reaksi
- e. Tabung durham
- f. Botol sampel
- g. Volume pipet
- h. Rak tabung reaksi

- i. Ose
 - j. Bunzen/lampu Spirtus
2. Media/bahan
- a. Komponen media

Media adalah suatu yang terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dalam hal ini yang digunakan adalah:

- a) LB (lactose broth)
 - b) BGLB (Brilian green lactose bile broth)
- b. Bahan
- a) Sampel air sumur gali yang diambil dengan menggunakan botol sampel yang stern yang bervolume 250 ml.
 - b) Aquades sebagai pengencer

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pada proses pengolahan data digunakan sistem komputerisasi melalui alat bantu program SPSS versi 16,00 untuk memperoleh nilai statistik dalam bentuk tabel dari data hasil wawancara dan observasi.

Berikut beberapa tahapan dalam proses pengolahan data:

1. Editing

Adalah untuk mengoreksi data, yang meliputi kelengkapan pengisian jawaban, konsistensi atas jawaban, dan keseragaman prosedur.

2. Koding Koesioner

Adalah kegiatan pemberian kode data pada variabel penelitian untuk mempermudah dalam proses pengelompokan.

3. Entry Data

Adalah memasukkan data yang telah diperoleh kedalam komputer.

4. Analisis Data

- a. Analisis univariat untuk mendeskripsikan variabel kualitas air sumur gali dengan kejadian diare yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel.
- b. Analisis biavariat Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. Uji statistik yang digunakan adalah *chi-square*. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 95% dengan nilai kemaknaan $\alpha = 0,05$ (Stang, 2005)

Rumus *chi-square* (X^2) untuk 2x2

$$X^2 = \frac{n(a-d - \frac{ad}{n})^2}{(a+b)(c+d)(u+l)(D+d)} = 1$$

Interpretasi:

H_0 ditolak apabila X^2 hitung $> X^2$ tabel atau $p < \alpha$ berarti ada hubungan.

G. Penyajian Data

Adapun penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan-penjelasan dan data tabel analisa Variabel dependent dan Variabel independent dengan kejadian penyakit diare (Eko Bodiarto, 2008).

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan sekitar 1 minggu pada tanggal 11-17 Juli 2011.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Labuaja merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang terdiri dari 4 Dusun, antara lain:

- a. Dusun Dumme'e
- b. Dusun Pattiro Bellu
- c. Dusun Aming
- d. Dusun Labuaja

Desa tersebut merupakan salah satu tempat atau wilayah penelitian yang telah dilakukan pada bulan Juli 2011. Dimana hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan lembar kuesioner, observasi, dan pemeriksaan sampel di Laboratorium Dinkes Kabupaten Bone. Banyaknya sampel sebanyak 210 KRT yang diambil dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Sedangkan pengambilan sampel air dilakukan sehari atau kurang dari 24 jam. Adapun waktu pengambilan sampel yaitu pada pagi hari pukul 06.30-07.35 WITA.

Luas wilayah Desa Labuaja adalah 811 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 7.750 orang, dimana laki-laki sebanyak 3.820 orang dan perempuan sebanyak 3.930 orang. Jumlah KRT sebanyak 438 KRT, yang tersebar pada 4

Dusun dan tiap-tiap Dusun terdiri dari RT dan RW. Untuk Dusun Dumme'e dengan jumlah KRT sebanyak 101 KRT yang tersebar di 3 RT/RW. Untuk RT/RW I berjumlah 33, RT/RW II berjumlah 37, dan untuk RT/RW III berjumlah 31, Dusun Pattiro Bellu berjumlah 77 KRT yang tersebar di 2 RT/RW. Untuk RT/RW I berjumlah 48 KRT, RT/RW II berjumlah 29 KRT, sedangkan Dusun Aming berjumlah 69 KRT yang tersebar di 3 RT/RW yaitu RT/RW I berjumlah 35 KRT, RT/RW II, sedangkan Dusun Aming berjumlah 69 KRT yang tersebar di 3 RT/RW yaitu RT/RW I berjumlah 35 KRT, RT/RW II berjumlah 34 KRT, dan RT/RW III berjumlah 23 KRT, Dan untuk Dusun Labuaja berjumlah 168 KRT yang tersebar di 4 RT/RW. Untuk RT/RW I berjumlah 53 KRT, RT/RW II berjumlah 39 KRT, RT/RW III berjumlah 35 KRT, dan untuk RT/RW IV berjumlah 41 KRT. Mata pencaharian masyarakat di Labuaja sebagian besar adalah petani.

Batas-batas Desa Labuaja adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Balle
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Arallae
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Camilo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cakkela

2. Karakteristik responden

a. Kelompok Umur Responden

Kelompok umur responden dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Di
Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Kelompok Umur (Tahun)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
< 20	3	1,4%
21-30	12	5,7%
31-40	60	28,6%
41-50	62	29,5%
> 51	73	34,8%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh kelompok umur yang tertinggi adalah pada rentang umur > 51 sebanyak 73 responden (34,8%), dan kelompok umur responden yang terendah adalah pada rentang umur < 20 sebanyak 3 responden (1,4%).

b. Tingkat Pendidikan

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh data tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah SD sebanyak 87 responden (41,4%), dan tingkat pendidikan responden yang paling sedikit adalah PT sebanyak 11 responden (5,2%).

Tingkat pendidikan responden dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di
Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Tidak Sekolah	35	16,7
SD	87	41,4
SMP	26	12,4
SMA	51	24,3
PT	11	5,2
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

c. Pekerjaan

Tingkat pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Desa
Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Petani	158	75,2
PNS	14	6,7
ABRI/POLRI	2	1,0
Wiraswasta	26	12,4
dll	10	4,8
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh pekerjaan responden terbanyak adalah petani sebanyak 158 responden (75,2%), dan pekerjaan responden yang paling sedikit adalah ABRI/POLRI sebanyak 2 responden (1,0%).

3. Analisa univariat

- a. Sarana air bersih (Konstruksi sumur gali) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sarana Air Bersih Yang Digunakan (Konstruksi Sumur Gali) Di Desa Labuaja Kecamatan KahuKabupaten Bone Tahun 2011

Sarana Air Bersih (Konstruksi Sumur Gali)	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Memenuhi syarat	79	76,7%
Tidak memenuhi syarat	24	23,3%
Jumlah (n)	103	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 103 responden yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih diperoleh hasil yang tertinggi adalah responden dengan konstruksi sumur gali yang memenuhi syarat sebanyak 79 responden (76,7%), dan yang terendah adalah responden dengan konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat kesehatan sebanyak 24 responden (23,3%).

- b. Keberadaan bakteri *E.Coli*

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 210 KRT, diperoleh KRT yang menggunakan air bersih yang kualitas airnya mengandung bakteri *E.Coli* sebanyak 140 KRT (66,7%), dan sebanyak 70 KRT (3,33%) yang menggunakan air yang kualitasnya tidak mengandung bakteri *E.Coli*.

Keberadaan bakteri *E.Coli* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kualitas Air (Keberadaan Bakteri *E.Coli*) Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Kualitas Air Bersih	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Ada	140	66,7
Tidak Ada	70	3,33
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

c. Kepemilikan Sumur Gali

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Sumur Gali Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Status Kepemilikan Sumur Gali	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Pribadi	105	50,0%
Tetangga	2	1,0%
Umum	103	49,0%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden diperoleh status kepemilikan sumur gali yang terbanyak adalah sumur Pribadi sebanyak 105 SGL (50,0%), dan yang paling sedikit adalah sumur tetangga sebanyak 2 SGL (1,0%).

d. Kondisi air

Kondisi air yang digunakan setiap hari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kondisi Air Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Kondisi Air	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Jernih	203	96,7%
Tidak jernih	7	3,3%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden kondisi air yang terbanyak yang digunakan responden adalah kondisi air jernih sebanyak 203 responden (96,7%), dan jumlah responden yang menggunakan air dengan kondisi tidak jernih adalah sebanyak 7 responden (3,3%).

e. Sumber air bersih

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Semua responden (100%) menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih keluarga.

f. Penyediaan air minum

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 210 responden penyediaan air sebelum minum yang terbanyak adalah dimasak sebanyak

203 responden (96,7%) dan yang terendah yaitu penyediaan air minum yang tidak dimasak sebanyak 7 responden (3,3%).

Penyediaan air minum yang disediakan keluarga sebelum diminum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyediaan Air Minum keluarga Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Penyediaan Air Minum	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Masak	203	96,7%
Tidak masak	7	3,3%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

g. Jarak sumber air bersih

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh jarak sumber air bersih dengan sptic tank yang digunakan responden tertinggi yaitu pada jarak >10 m sebanyak 205 responden (97,6%), dan yang terendah yaitu jarak <10 m sebanyak 5 responden (2,4%).

Jarak sumber air bersih dengan septic tank dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jarak Sumber Air Bersih Dengan Septic Tank Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Jarak Sumber Air Bersih Dengan Septic Tank	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
>10 m	205	97,6%
<10 m	5	2,4%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

h. Jarak rumah dari sumber air bersih

Jarak rumah dari sumber air bersih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jarak Rumah Dari Sumber Air Bersih Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Jarak Rumah Dari Sumber Air Bersih	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
>30 m	112	53,3%
<30 m	98	46,7%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh jarak rumah dari sumber air bersih yang digunakan responden

tertinggi yaitu pada jarak >30 m sebanyak 112 responden (53,3%), dan yang terendah yaitu jarak rumah <30 m sebanyak 98 responden (46,7%).

i. Kejadian diare

Kejadian diare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kejadian Diare Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Kejadian Diare	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Diare	122	58,1%
Tidak Diare	88	41,9%
Jumlah (n)	210	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh responden yang mengalami diare sebanyak 122 responden (58,1%), dan responden yang tidak mengalami diare sebanyak 88 responden (41,9 %).

j. Jumlah penderita diare di Rumah Tangga

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 122 responden yang menderita diare, diperoleh jumlah penderita tertinggi yaitu <3 orang sebanyak 121 responden (57,6%), dan jumlah penderita yang terendah yaitu >3 orang sebanyak 1 responden (0,5%).

Jumlah penderita diare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penderita Diare
Di Rumah Tangga Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone
Tahun 2011

Jumlah Penderita Diare	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
<3 orang	121	57.6%
>3 orang	1	0,5 %
Jumlah (n)	122	100

Sumber: Data Primer, 2011

k. Umur penderita diare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Diperoleh hasil bahwa umur penderita diare (100%) berumur > 5 tahun.

l. Gejala Diare

Gejala diare yang muncul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Gejala Diare Yang
Muncul Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Tahun 2011

Gejala Diare	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
1 Gejala	43	35,2%
2 Gejala	29	23,8%
3 Gejala	9	7,4%
>3 Gejala	41	33,6%
Jumlah (n)	122	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 122 responden, diperoleh jumlah gejala diare pada setiap responden yaitu penderita diare dengan 1 gejala yaitu sebanyak 43 responden (35,2%), dan yang menderita diare dengan 2 gejala yaitu sebanyak 29 responden (23,8%), sedangkan yang menderita diare dengan 3 gejala yaitu sebanyak 9 responden (7,4%), dan jumlah gejala diare >3 yaitu sebanyak 41 responden (33,6%).

4. Pengobatan Diare

Pada tabel 5.15 menunjukkan bahwa dari 122 KRT, diperoleh pengobatan diare tertinggi yaitu diobati sendiri sebanyak 93 KRT (76,2%), dan yang berobat ke Puskesmas sebanyak 18 KRT (14,8%), sedangkan pengobatan yang terendah yaitu KRT yang berobat ke dukun sebanyak 11 KRT (9,0%).

Pengobatan diare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tempat Pengobatan Diare Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Pengobatan Diare	Frekuensi (f)	Persentasi (%)
Diobati sendiri	93	76,2
Puskesmas	18	14,8
Dukun	11	9,0
Jumlah (n)	122	100

Sumber: Data primer, 2011

5. Analisis bivariat

- a. Hubungan sarana air bersih (Konstruksi sumur gali) dengan kejadian Diare

Tabel 5.16
Hubungan Sarana Air Bersih (Konstruksi Sumur Gali) Dengan Kejadian Diare Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Sarana Air Bersih (Konstruksi sumur gali)	Kejadian diare				Total		P
	Diare		Tidak Diare		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	95	55,6	76	44,4	88	100	0,150
Tidak memenuhi syarat	27	69,2	12	30,8	39	100	
Total	122	58,1	88	41,9	210	100	

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 210 responden, diperoleh responden dengan konstruksi sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan dan mengalami diare sebanyak 95 responden (55,6%), dan 76 responden (44,4%) yang menunjukkan konstruksi sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan dan tidak mengalami diare. Selain itu diperoleh data bahwa responden dengan konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat kesehatan sebanyak 27 responden (69,2%) dan mengalami diare, dan sebanyak 12 responden (30,8%) dengan konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak mengalami diare.

Dari hasil uji *chi-square* yang telah dilakukan diperoleh nilai $p=0,150$ lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Interpretasi : Tidak ada hubungan sarana kesehatan lingkungan (konstruksi sumur gali) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.

- b. Hubungan Kualitas Air (bakteri *E.Coli* dalam air) dengan kejadian diare

Tabel 5.17
Analisis Hubungan Kualitas Air (Bakteri *E.Coli* Dalam Air) Dengan Kejadian Diare Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011

Kualitas Air Bersih (Bakteri <i>E.Coli</i> Dalam Air)	Kejadian diare				Total		P
	Diare		Tidak Diare		n	%	
	n	%	n	%			
Ada	79	56,4	61	43,6	140	100	P=0,55
Tidak Ada	43	61,4	27	38,6	70	100	
Total	122	58,1	88	41,9	210	100	

Sumber: Data Primer, 2011

Pada tabel 5.17 menunjukkan bahwa dari 210 KRT yang menggunakan air sumur gali sebagai sumber air bersih yang mengandung bakteri *E.Coli* dan menderita diare terdapat sebanyak 79 KRT (56,4%), dan KRT yang menggunakan air yang terdapat *E.Coli* tetapi tidak diare sebanyak 61 KRT (43,6%), sedangkan KRT yang menggunakan air yang tidak mengandung bakteri *E.Coli* dan menderita diare sebanyak 43 KRT (61,4%), dan sebanyak 27 KRT (38,6%) yang menggunakan air yang tidak mengandung bakteri *E.Coli* dan tidak menderita diare.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chis-Square pada tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh nilai $p = 0,0554$ dalam hal ini berarti nilai p lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Interpretasi : Tidak ada hubungan antara kualitas air bersih (keberadaan *E.Coli* dalam air) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.

B. Pembahasan

1. Hubungan Sarana Air Bersih (Kesehatan Lingkungan) meliputi konstruksi sumur gali) Dengan Kejadian Diare

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan chi square dari 4 sumur gali yang digunakan oleh responden didapatkan nilai $p = 0,150 > 0,05$ hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada hubungan antara sarana air bersih (konstruksi sumur gali) dengan kejadian penyakit diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan di Desa Labuaja, hasil observasi ditentukan dengan skor resiko didapatkan 95 responden (55,6%) menderita diare dan konstruksi sumur yang digunakan memenuhi syarat. Menurut Depkes RI (2007), secara mekanis tujuan konstruksi sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan adalah untuk menjaga kualitas dari pada air bersih karena konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi memenuhi

syarat kesehatan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit diare. Sejalan dengan penelitian Fianti Andua 2006, pada kesimpulannya mengemukakan bahwa kondisi sumur yang memenuhi syarat kesehatan belum tentu dapat menghasilkan kualitas air yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Penelitian ini memberikan makna bahwa keadaan konstruksi sumur gali bukan merupakan faktor mutlak penyebab terjadinya diare akan tetapi banyak hal lain yang menyebabkan terjadinya diare seperti kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar, pola makan yang salah, tidak higienisnya makanan yang dimakan sehingga bakteri penyebab diare banyak terdapat di makanan dan berpotensi menyebabkan diare.

Hasil lain diperoleh sebanyak 76 responden (44,4%) yang tidak diare dan sumur yang digunakan memenuhi syarat kesehatan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin bagus konstruksi sumur gali yang digunakan maka warga cenderung terhindar dari penyakit diare.

Selain itu, hasil lain yang diperoleh yaitu sebanyak 27 responden (69,2%) yang menggunakan sumur dengan konstruksi tidak memenuhi syarat dan mengalami diare. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adi (2010), bahwa diare dapat disebabkan oleh penyediaan air minum, kondisi atau konstruksi sumur, dan higienis. Artinya konstruksi

sumur yang kurang baik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit diare.

Kemudian sebanyak 12 responden (30,8%) yang menggunakan sumur gali dengan konstruksi tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak diare. Hal ini terjadi karena adanya faktor lain yang mempengaruhi kualitas air tersebut seperti faktor dari perilaku pengguna sumur tersebut atau kondisi sumur tersebut memenuhi syarat, resiko yang terjadi sedikit, tetapi resiko tersebut berskala besar sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap penyakit diare. Selain itu, hal tersebut di atas dapat pula terjadi karena resiko yang terjadi banyak tetapi resiko tersebut tidak berpengaruh besar atau bisa juga dari kondisi sumur tersebut tidak memenuhi syarat tetapi telah dilakukan upaya desinfeksi sehingga kualitas air yang tadinya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat karena upaya desinfeksi tersebut efektif (banyak membunuh bakteri pathogen yang penyebarannya melalui air).

Ada beberapa sumur gali yang diobservasi dalam kondisi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, tetapi jarak sumur yang digunakan sebagai sumber air bersih dengan sumber pencemar misalnya kotoran hewan, air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah kurang dari 10 meter. Padahal kita ketahui bahwa jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar secara bakteriologis dapat mempengaruhi kualitas dari sumur, sebab perjalanan jenis mikroorganisme pathogen dalam tanah dapat mencapai radius 11 meter dari sumber pencemar. Sedangkan kenyataan yang didapatkan di

lokasi penelitian, jarak antara sumur dengan sumber pencemar masih banyak yang beresiko mengenai hal tersebut.

Dalam ajaran Islam, manusia dilarang untuk membuang air limbah seperti kencing ke dalam sumber air bersih manusia. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَبُولُن أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاعِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَاِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَءَةِ مِنْهُ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu kencing pada tempat genangan air kemudian berwudhu di dalamnya, sesungguhnya daripadanya banyak menimbulkan masalah” (H.R. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah).

Dari hadist tersebut di atas, manusia diingatkan mengenai masalah yang dapat timbul dari pembuangan air limbah di sumber air. Kebanyakan wabah seperti kolera, thypoid, infeksi pada usus besar, menular melalui perantara air dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu, maka para ulama menyatakan bahwa air yang bercampur dengan najis tidak boleh digunakan untuk berwudhu, mandi, dan minum (al- Fanjari 2006).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianti Andua (2006) tentang fakto-faktor yang mempengaruhi Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali yang menyatakan bahwa penyimpanan standar kualitas bakteriologis disebabkan oleh kondisi sumur yaitu konstruksi sumur, yang meliputi bibir, lantai, dinding, dan jarak sumber pencemaran, walaupun sudah memenuhi syarat tetapi membiarkan timba tergantung di dalam sumur dan juga pada saat

pengambilan air kadang-kadang tangan dalam keadaan kotor. Pada kesimpulannya mengemukakan bahwa kondisi sumur yang memenuhi syarat kesehatan belum tentu dapat menghasilkan kualitas air yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit.

Selain itu, dapat dilihat juga dari kebanyakan responden yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan kemungkinan penghasilan mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan bagaimana membangun sumur dengan kondisi yang memenuhi syarat kesehatan, apalagi dilihat dari status kepemilikan sumur yang rata-rata sumur yang digunakan adalah sumur umum. Dengan demikian pengangkutan air dari sumur gali ke rumah agak jauh apalagi pada saat proses pengangkutan tepat yang digunakan sebagai wadah adalah yang tidak tertutup, sehingga berpotensi untuk terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti halnya dengan penyakit diare.

2. Hubungan Kualitas Air Bersih (Keberadaan Bakteri *E.Coli* dalam Air) dengan Kejadian Diare

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji chi square, dari 4 sumur gali yang digunakan oleh responden didapatkan nilai $p = >$ dari 0.05 hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara keberadaan bakteri *E.Coli* dalam air dengan kejadian diare.

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone bahwa dari hasil pengambilan sampel air sumur gali yang kemudian diperiksa di laboratorium Dinkes Bone, didapatkan hasil bahwa semua KRT yang berjumlah 210 KRT yang menggunakan sumur gali sebagai akses air bersih terdapat 122 KRT yang anggota keluarganya ada yang menderita diare dan 88 KK yang tidak ada anggota keluarganya yang menderita diare, sedangkan sumur yang dipergunakannya 3 diantaranya terdapat Bakteri *E.Coli* yang melebihi batas toleransi yang ditentukan dan 1 yang memenuhi standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan Permenkes yang telah ditentukan, dan KRT yang menggunakan sumur yang bakteri *E.Coli*-nya melebihi batas standar yang telah ditentukan terdapat 79 KRT (56,4%) yang mengandung bakteri *E.Coli* dan menderita diare,

Hasil tersebut diatas sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Liris Mardiyuni (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Kualitas Air Sumur Gali Dengan Kejadian Diare Di Kelurahan Samata yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air yang digunakan mempengaruhi adanya kejadian penyakit diare, karena air merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya mikroorganisme pathogen dan non pathogen, dimana penyakit diare yang berkaitan dengan air dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu melalui air minum, air cucian, melalui mikroorganisme dan melalui serangga yang sebagian besar hidupnya di air.

Hasil lain dari KRT yang menggunakan air yang terdapat *E.Coli* tetapi tidak diare sebanyak 61 KRT (43,6%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kualitas air dapat ditentukan dari cara pengambilan, pengolahan yang baik sehingga dapat menentukan kualitas dari pada air tersebut. Penelitian ini memberikan makna bahwa kualitas air yang kurang bukan merupakan factor penyebab terjadinya diare pada warga.

Sedangkan KRT yang menggunakan air yang tidak mengandung bakteri *E.Coli* dan menderita diare sebanyak 43 KRT (61,4%). Hal tersebut di atas bisa terjadi karena dari air sumur yang tidak terdapat *E.Coli* dilihat dari cara penempatan airnya misalnya ember yang digunakan sebagai tempat penampungan yang tidak bersih, timbah yang digunakan terutama ketika selesai buang air besar, maka air yang digunakan sebelumnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat lagi karena telah tercemar, sehingga dapat menunjang terjadinya diare. Begitupun sebaliknya, air yang memenuhi syarat, bila ditangani atau diolah dengan baik sebelum dikonsumsi, tidak akan menunjang terjadinya diare. Misalnya, tangan dan tempat penampungan air harus bersih, merebus air sampai mendidih kemudian diamkan sampai 5 menit sebelum diangkat, untuk ketinggian < 1000 m dari muka laut dan untuk ketinggian > 1000 m, diamkan lebih dari 5 menit sebelum diangkat kemudian letakkan dalam wadah yang tertutup.

Kemudian hasil lain sebanyak 27 KRT (38,6%) yang menggunakan air yang tidak mengandung bakteri *E.Coli* dan tidak menderita diare. Dari

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas air yang digunakan maka, semakin besar pula potensi untuk terhindar dari penyakit diare.

Selain itu, dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 7 responden (3,3%) yang tidak memasak air sebelum minum namun menderita diare. Secara psikologi, diare tersebut disebabkan oleh adanya faktor stress pada responden terutama pada responden dengan umur > 30 tahun. Adapun gejala utama yang dialami oleh responden yang menderita diare yaitu berak encer, sakit perut, dan muntah. Sedangkan jumlah penderita diare setiap KRT yaitu < 3 orang sebanyak 121 responden (57,6%), dan > 3 orang sebanyak 1 responden (0,5%). Setiap responden yang menderita diare mengalami gejala yang dengan jumlah yang berbeda-beda seperti responden dengan dua gejala diare yaitu berak encer dan sakit perut, sedangkan responden dengan 3 gejala diare yaitu berak encer, sakit perut, dan muntah, serta responden dengan gejala diare >3 yaitu berak encer, sakit perut, muntah, ada darah, dan sebagainya.

Selain itu, dalam penelitian ini yang diteliti dari parameter fisik yaitu kondisi atau warna air dengan alasan bahwa kualitas air bersih yang ada di daerah tersebut dari segi rasa dan bau sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Air bersih yang berasal dari sarana air bersih sampai dapat diminum melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pengambilan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan, dan tahap pengambilan dari penyimpanan,

tahap pemasakan, tahap penyimpanan air masak, kemudian tahap penyajian air masak. Masing-masing tahap tersebut mempunyai resiko terkontaminasi. Proses kontaminasi yang terjadi ini sangat tergantung pada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam penanganan air bersih terutama untuk keperluan minum.

Beberapa faktor penyebab diare seperti faktor infeksi, malabsorpsi, makanan, dan psikologis. Diare disebabkan oleh infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Selain itu, diare dapat ditularkan secara fecal-oral yaitu diare dapat dipindahkan ke mulut melalui cairan atau benda yang tercemar oleh kotoran seperti air minum yang kotor, tangan kotor, makanan yang disiapkan dalam panci yang dicuci dengan air tercemar, selain itu faktor lain yang dapat menunjang terjadinya penyakit diare yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar.

Sedangkan menurut WHO, pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara membiasakan cuci tangan dengan sabun pada lima waktu penting yaitu (sebelum makan dan sesudah BAB, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan), meminum air minum sehat, atau air yang telah diolah, antara lain dengan cara merebus, pemanasan dengan sinar matahari atau proses klorinasi, pengelolaan sampah yang baik

supaya makanan tidak tercemar oleh serangga, membuang air besar dan air kecil pada tempatnya, sebaiknya menggunakan jamban dengan tangki septik.

Adapun tindakan pencegahan terhadap diare dan penularannya yaitu dengan menjaga kebersihan perorangan ataupun umum terutama makanan serta lingkungan sekitar bagi keluarga dan masyarakat.

Penularan penyakit diare dapat terjadi karena kontak dengan tinja yang terinfeksi secara langsung, seperti :

1. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi, baik yang sudah dicemari oleh serangga atau kontaminasi oleh tangan yang kotor.
2. Penggunaan sumber air bersih yang sudah tercemar dan tidak memasak air dengan benar.
3. Pencucian dan pemakaian botol susu yang tidak bersih
4. Tidak mencuci tangan dengan bersih setelah selesai buang air besar atau membersihkan tinja anak yang terinfeksi, sehingga mengkontaminasi perabotan dan alat-alat yang dipegang.

Dalam agama Islam, manusia dianjurkan untuk membersihkan lingkungannya dan melarang untuk mengotori lingkungan terutama membuang hajat di tempat berlalunya manusia. Rasulullah saw. Bersabda :

تَقْوُ الْمَلَأَعْنَ الثَّلَاثِ الْمَوَارِدِ فِي الظِّلِّ وَفِي طَرِيقِ النَّاسِ

Terjemahnya :

“Takutlah kamu kepada tiga hal yang terkutuk, yaitu : berak pada saluran air, pada tempat berteduh dan pada tempat berlalunya manusia.” (HR.Muslim).

Dalam hadist tersebut, terlihat bahwa Islam sungguh-sungguh keras menyuarakan agar tidak mengotori sumber air bersih yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang membuang sampah, najis, dan kotoran ke dalamnya, bahkan perbuatan tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah (Al Fanjari, 2006).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam sebagai ajaran agama paripurna banyak mempersoalkan masalah kualitas air terutama dalam hal pemakaian air bersih. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, air itu suci lagi menyucikan. Olehnya itu, Islam menganjurkan untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan seperti halnya dengan menjaga kebersihan dan kualitas air yang dijadikan sebagai sumber air bersih. Sesungguhnya kebersihan itu adalah bagian dari Iman.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada bulan Juli 2011 dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada hubungan antara sarana air bersih kesehatan lingkungan (konstruksi sumur gali) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2011.
2. Tidak ada hubungan antara Kualitas air bersih (keberadaan bakteri *E.Coli* dalam air) dengan kejadian diare di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Tahun 2011.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, ternyata hasil yang didapat tidak sesuai dengan teori. Olehnya itu maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengorganisasian penggerakan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan lingkungan khususnya mengenai penyediaan sumber air bersih melalui lembaga kemasyarakatan yang ada, baik itu puskesmas maupun tokoh masyarakat yang ada.
2. Meningkatkan pemanfaatan sarana air bersih melalui pemberian informasi kesehatan.
3. Peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti kualitas air khususnya parameter kimia mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang penduduknya bermata pencaharian petani.
4. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti beberapa variabel yang lebih cenderung menyebabkan diare yaitu kejiwaan, PAB, jamban, dan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI.2005. *AL Qur'an dan Terjemahannya*.Semarang: Toha Putra
- Abidin, Fadil. 2008. *Memaknai Har Air Sedunia : Air sebagai sumber kehidupan*. (<http://www.analisadaily.com/2009/03/27>). 29 Januari 2011 (14.00 wita).
- Adi. 2010. *Cuci Tangan Cara Ampuh Tangkal Penyakit*. lifestyle.okezone.com (diakses pada tanggal 26 Desember 2010)
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 2006. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam, Cet II*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarto, Eko. 2008. *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Candra, budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.
- Darmono. 2008. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-press).
- Departemen Kesehatan RI. 2007. *Angka Kejadian Diare di Indonesia Masih Tinggi*. <http://www.depkes.go.org> (diakses pada tanggal 10 Februari 2011).
- Departemen Kesehatan RI. 2007. *Bagaimana Cara Mencuci Tangan Yang Benar*. <http://www.depkes.go.org> (diakses pada tanggal 11 Februari 2011).
- Dep.Kes.RI,2000. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/MENKES/SK/VII/2000 Tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan kabupaten Bone. 2010. *Profil Kesehatan Kabupaten Bone* .
- Dinas Kesehatan Prop. Sulsel. 2008. *Profil Dinas Prop. Sulawesi Selatan Tahun 2007*. Makassar: Dinkes Prop. Sulsel.
- Ditjen. PPM & PLP,2007. *Petunjuk Pemakaian Alat, Paket A- system Tabung Ganda Untuk Pemeriksaan Bakteriologis*, Dep.kes. RI, Jakarta.

- Ginting, Mutiara, Rina. 2008. *Hubungan Tingkat Resiko Pencemaran Terhadap Kualitas Air Sumur Gali*. Skripsi. Medan: S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.
- H.S. Prodjokusumo. 2007. *Air, Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta : Penerbit usaha nasional.
- Joeharno, Skm. 2008. *Kualitas Air Berdasarkan Konstruksi Sumur Gali* . Skripsi. Makassar : S1 kesehatan masyarakat universitas muslim Indonesia.
- Maulanusantara. 2008. *Awas Bakteri E-Coli*. [http://www. Sinar harapan.co.id / berita / 0805 / 21 / jab06. Html](http://www.Sinar.harapan.co.id/berita/0805/21/jab06.html).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka cipta. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo Sokidjo. 2007. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Rismanto. 2009. *Penyakit Diare*. Dalam [http:// media penunjang medis. Dikirismanto.com/penyakit-diare.html](http://media.penunjang.medis.Dikirismanto.com/penyakit-diare.html) 8 maret diakses pada tanggal 19 januari 2011.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet, Juli Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan kedua. Penerbit Buku Gadjah Mada University Press. Jakarta.
- Stang. 2005. *Biostatistik Inferensial*. Makassar: UNHAS.
- Sudaryanto. 2010. *Situasi Penyakit Diare di sul-sel*. [http: // www. Wikimu. Com](http://www.Wikimu.Com). Diakses tanggal 11 desember 2010 13:30:02.
- World Health Organization. 2005. *Planet Kita, Kesehatan Kita. Laporan Komisi WHO Mengenai Kesehatan Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembar kuesioner
2. Lembar observasi
3. Master tabel
4. Hasil analisis
5. Dokumentasi
6. Surat izin penelitian
7. Surat keterangan telah meneliti
8. Teknik pemeriksaan kualitas air (Rujukan Dep.kes RI, Jakarta)
9. Riwayat Hidup



KETERANGAN MASTER TABEL

A. Identitas responden

Pendidikan responden

1. SD
2. SMP
3. SMA
4. Perguruan Tinggi
5. Tidak Sekolah

Pekerjaan responden

1. Petani
2. PNS
3. ABRI/POLRI
4. Wiraswasta
5. Dll

B. Data kualitas air (*E.Coli* dalam air)

1. Ada
2. Tidak ada

Sumber air bersih yang digunakan sehari-hari

1. Sumur gali
2. PAM
3. Sumur pompa tangan
4. Penampungan air hujan
5. Sungai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Kepemilikan sumur gali

1. Pribadi
2. Tetangga
3. Umum

Kondisi air yang digunakan setiap hari

1. Bersih
2. Tidak bersih

Penyediaan air bersih sebelum diminum

1. Dimasak
2. Tidak dimasak

Jarak sumber air bersih dengan septic tank

1. > 10 m
2. < 10 m

Jarak rumah dari sumber air bersih

1. > 30 m
2. < 30 m

C. Data diare

Penderita diare

1. Ada
2. Tidak ada

Jumlah penderita diare

1. < 3 Orang
2. > 3 orang



Umur penderita

1. 0-19 tahun
2. 20-50 tahun

Gejala utama penderita

1. Berak encer
2. Tidak ada darah
3. Ada lendir
4. Sakit perut
5. Mual
6. muntah

Pengobatan diare

1. Diobati sendiri
2. Ke Puskesmas
3. Rumah sakit
4. Dokter
5. Dukun

D. Observasi

Data sarana air bersih (konstruksi sumur gali)

1. Memenuhi syarat
2. Tidak memenuhi syarat



Tgl Wawancara:

INSTRUMEN PENELITIAN (KUESIONER)

**HUBUNGAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN KEJADIAN DIARE DI
DESA LABUAJA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

TAHUN 2011

A. Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Nama Kepala Keluarga :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

B. Pengadaan Air Bersih

1. Dari manakah sumber air bersih yang anda gunakan setiap hari?
 - a. Sumur Gali
 - b. PAM
 - c. Sumur Pompa Tangan
 - d. Penampungan Air Hujan
 - e. Sungai
2. Bila dari sumur gali, sumur gali tersebut milik siapa?
 - a. Pribadi
 - b. Tetangga
 - c. Umum
3. Bagaimana kondisi air yang bapak/ibu gunakan setiap hari?
 - a. Jernih
 - b. Tidak jernih
4. Apakah air minum yang disediakan keluarga dimasak terlebih dahulu sebelum diminum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Jarak sumber air bersih dengan *Septic tank*/bak WC?
 - a. > 10 m
 - b. < 10 m
6. Berapa jarak rumah anda dari sumber air bersih yang digunakan setiap hari?
 - a. > 30 m
 - b. < 30 m

C. Kejadian Diare

1. Adakah keluarga bapak/ibu menderita diare (berak encer lebih dari tiga kali sehari) atau lebih di luar dari kebiasaan sehari-hari dalam 3 bulan terakhir?
 - a. ada
 - b. Tidak ada
2. Berapa orang?
 - a. < 3 orang
 - b. > 3 orang
3. Umur berapa tahun?
 - a. 0-19 tahun
 - b. 20-50 tahun
4. Gejala utama yang muncul?

- a. Berak encer
 - b. Tidak ada darah
 - c. Ada lendir
 - d. Sakit perut
 - e. Mual
 - f. Muntah
5. Jika sakit, dimana anda berobat?
- a. Diobati sendiri
 - b. Ke puskesmas
 - c. Rumah Sakit
 - d. Dokter
 - e. Dukun



LEMBAR OBSERVASI

Nomor :

RT/RW :

Nama Responden :

Konstruksi sumur gali

- 1) Bibir sumur :
 - a) Tinggi minimal 3 meter 1. Ya 2. Tidak
 - b) Pasangan batu bata(tembok) 1. Ya 2. Tidak
 - c) Kedap air 1. Ya 2. Tidak
- 2) Lantai sumur :
 - a) Baik (tidak retak-retak) 1. Ya 2. Tidak
 - b) Luas 2x2 (jari-jari 1 m) 1. Ya 2. Tidak
 - c) Kedap air dan pengaliran lancar 1. Ya 2. Tidak
- 3) Dinding sumur :
 - a) Kedap air minimal 3 meter 1. Ya 2. Tidak
 - b) Pasangan batu bata 1. Ya 2. Tidak
- 4) Saluran pembuangan air bekas :
 - a) Jarak minimal 10 meter 1. Ya 2. Tidak
 - b) Konstruksi baik 1. Ya 2. Tidak
- 5) Letak sumur gali dari sumber pencemaran septic tank/ lubang sampah
 - a) Memenuhi syarat (> 10 m) 1. Ya 2. Tidak
 - b) Tidak memenuhi syarat (< 10 m) 1. Ya 2. Tidak



KETERANGAN

RISIKO = YA ATAU TIDAK

SKOR RISIKO PENCEMARAN :

9-16 = MEMENUHI SYARAT

0-8 = TIDAK MEMENUHI SYARAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RUJUKAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Labuaja, khususnya mengenai metode pengambilan sampel air yang kemudian di periksa di laboratorium. Metode pengambilan dan cara kerja penelitian sampel dilakukan sesuai dengan peraturan dari Departemen Kesehatan dimana, dalam metode tersebut teknik penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem tabung ganda.

Metode sistem tabung ganda yang digunakan meliputi dua tahap penelitian yaitu pada tahap pertama meliputi tahap perkiraan kemudian tahap yang kedua yaitu meliputi tahap penegasan.



HASIL OUTPUT UNIVARIAT

Data Statistik mengenai Umur KK di Desa Labuaja.

Statistics

kategori umur

N	Valid	210
	Missing	0

kategori umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 20	3	1.4	1.4	1.4
21-30	12	5.7	5.7	7.1
31-40	60	28.6	28.6	35.7
41-50	62	29.5	29.5	65.2
> 51	73	34.8	34.8	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik pendidikan KK

N	Valid	210
	Missing	0

pendidikan kepala keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	87	41.4	41.4	41.4
SMP	26	12.4	12.4	53.8
SMA	51	24.3	24.3	78.1
Perguruan tinggi	11	5.2	5.2	83.3
tdk sekolah	35	16.7	16.7	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik mengenai pekerjaan KK di Desa Labuaja

Statistics

pekerjaan kepala keluarga

N	Valid	210
	Missing	0

pekerjaan kepala keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid petani	158	75.2	75.2	75.2
PNS	14	6.7	6.7	81.9
ABRI/POLRI	2	1.0	1.0	82.9
Wiraswasta	26	12.4	12.4	95.2
dll	10	4.8	4.8	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Statistics

status kepemilikan sumur gali

N	Valid	210
	Missing	0

status kepemilikan sumur gali

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pribadi	105	50.0	50.0	50.0
tetangga	2	1.0	1.0	51.0
umum	103	49.0	49.0	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik kondisi air yg digunakan

N	Valid	210
	Missing	0

kondisi air yang digunakan sehari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jernih	203	96.7	96.7	96.7
tdk jernih	7	3.3	3.3	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik sumber air bersih yang digunakan.

N	Valid	210
	Missing	0

sumber air bersih digunakan setiap hari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sumur gali	210	100.0	100.0	100.0

Data statistik mengenai air yang disediakan keluarga dimasak atau tidak sebelum diminum

Statistics

air yang disediakan dimasak
atau tdk sebelum diminum

N	Valid	210
	Missing	0

air yang disediakan dimasak atau tdk sebelum diminum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	203	96.7	96.7	96.7
tdk	7	3.3	3.3	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik mengenai jarak sumber air bersih dengan *septic tank/ bak WC*

jarak sumber air dari septic tank/bak wc

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid >10m	205	97.6	97.6	97.6
<10m	5	2.4	2.4	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik mengenai jarak rumah dari sumber air bersih.

Statistics

jarak rmh dr sumber air bersih

N	Valid	210
	Missing	0

jarak rmh dr sumber air bersih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid >30m	112	53.3	53.3	53.3
<30m	98	46.7	46.7	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik mengenai kejadian penyakit diare.

Statistics

keluarga yg menderita diare

N	Valid	210
	Missing	0

keluarga yg menderita diare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	122	58.1	58.1	58.1
tdk ad	88	41.9	41.9	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Statistics

umur penderita diare

N	Valid	122
	Missing	0

umur penderita diare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-19 tahun	71	58.2	58.2	58.2
20-50 tahun	51	41.8	41.8	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Statistics

jumlah keluarga penderita diare

N	Valid	122
	Missing	0


jumlah keluarga penderita diare dalam satu keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 3 orang	121	99.2	99.2	99.2
> 3 orang	1	.8	.8	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Statistics

gejala utama diare yg muncul

N	Valid	210
	Missing	0



gejala utama diare yg muncul

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	88	41.9	41.9	41.9
berak encer	73	34.8	34.8	76.7
skt perut	47	22.4	22.4	99.0
muntah	2	1.0	1.0	100.0
Total	210	100.0	100.0	

Data statistik mengenai tempat pengobatan penyakit diare

Statistics

tempat berobat jika sakit

N	Valid	122
	Missing	0

tempat berobat jika sakit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid diobati sendiri	93	76.2	76.2	76.2
puskesmas	18	14.8	14.8	91.0
dukun	11	9.0	9.0	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Statistics

Sarana air bersih berdasarkan konstruksi sumur gali

N	Valid	103
	Missing	0

Sarana air bersih berdasarkan konstruksi sumur gali

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid memenuhi syarat	79	76.7	76.7	76.7
tidak memenuhi syarat	24	23.3	23.3	100.0
Total	103	100.0	100.0	

Statistics

kualitas air (bakteri *E-coli*)

N	Valid	210
	Missing	0

kualitas air (bakteri *E-coli*)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ada	140	66.7	66.7	66.7
	tidak ada	70	33.3	33.3	100.0
	Total	210	100.0	100.0	



HASIL OUTPUT BIVARIAT

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sarana lair bersih berdasarkan konstruksi sumur gali * keluarga yg menderita diare	210	100.0%	0	.0%	210	100.0%

Sarana air bersih berdasarkan konstruksi sumur gali * keluarga yg menderita diare Crosstabulation

			keluarga yg menderita diare		Total
			ada	tidak ada	
Sarana lingkungan berdasarkan konstruksi sumur gali	memenuhi syarat	Count % within Sarana lingkungan berdasarkan konstruksi sumur gali	95 55.6%	76 44.4%	171 100.0%
	tidak memenuhi syarat	Count % within Sarana lingkungan berdasarkan konstruksi sumur gali	27 69.2%	12 30.8%	39 100.0%
Total		Count % within Sarana lingkungan berdasarkan konstruksi sumur gali	122 58.1%	88 41.9%	210 100.0%

S

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.440 ^a	1	.118		
Continuity Correction ^b	1.910	1	.167		
Likelihood Ratio	2.507	1	.113		
Fisher's Exact Test				.150	.082
Linear-by-Linear Association	2.428	1	.119		
N of Valid Cases ^b	210				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.34.

Kualitas air (bakteri *E.Coli* dalam air)

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kualitas air (bakteri e-coly) * keluarga yg menderita diare	210	100.0%	0	.0%	210	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.440 ^a	1	.118		
Continuity Correction ^b	1.910	1	.167		
Likelihood Ratio	2.507	1	.113		
Fisher's Exact Test				.150	.082
Linear-by-Linear Association	2.428	1	.119		
N of Valid Cases ^b	210				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.34.

b. Computed only for a 2x2 table

kualitas air (bakteri e-coly) * keluarga yg menderita diare Crosstabulation

			keluarga yg menderita diare		Total
			ada	tidak ada	
kualitas air (bakteri e-coly)	ada	Count	79	61	140
		% within kualitas air (bakteri e-coly)	56.4%	43.6%	100.0%
	tidak ada	Count	43	27	70
		% within kualitas air (bakteri e-coly)	61.4%	38.6%	100.0%
Total		Count	122	88	210
		% within kualitas air (bakteri e-coly)	58.1%	41.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.479 ^a	1	.489		
Continuity Correction ^b	.296	1	.586		
Likelihood Ratio	.481	1	.488		
Fisher's Exact Test				.554	.294
Linear-by-Linear Association	.477	1	.490		
N of Valid Cases ^b	210				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.33.

b. Computed only for a 2x2 table



Pengambilan, pengamanan, dan pengiriman Sampel Air serta cara kerja penelitian

A. Peralatan

1. Botol sampel
2. Lampu spiritus
3. Termos
4. Alkohol
5. Korek api

B. Cara pengambilan sampel

Sampel diambil dengan botol yang diberi pemberat dibagian bawah dan dan bertali sebelum dilakukan sterilisasi, botol dibungkus seluruhnya dengan kertas. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan:

1. Tangan disterilkan dengan menggunakan alkohol
2. Membuka bungkus kertas, botol dipegang pada bagian bawah yang masih ada kertas pembungkusnya sehingga tangan tidak bersentuhan dengan botol
3. Mulut botol dosterilkan diatas lampu spiritus, tali dililitkan di tangan dan botol diturunkan pelan-pelan sampai mulut botol masuk minimal 10 cm ke dalam air.
4. Setelah terisi penuh, botol diangkat dan air dibuang sampai volume air menjadi $\frac{2}{3}$ volume botol (lebih besar dari 100 ml).
5. Botol disterilkan kembali di atas spiritus kemudian disimpan di dalam termos atau tas sampel.

C. Keterangan contoh air

Sampel air yang dikirim, harus disertai keterangan yang lengkap dari contoh air tersebut antara lain :

1. Nama dan alamat pengirim sampel air ;
2. Waktu dan tanggal pengambilan sampel air.
3. Asal sampel air yang diambil.
4. Tujuan pemeriksaan sampel air.
5. Tanda tangan pengambil sampel air.

D. Cara kerja penelitian

1. Pengambilan sampel air

Teknik pengambilan sampel air adalah sebagai berikut:

a. Persiapan pendahuluan

Di dekat sumur ikatkan batu dengan ukuran yang cukup dengan tali pada botol sampel.

b. Persiapan menurunkan botol

Ambil tali bersih sepanjang 20 m yang digulung pada kayu dan diikatkan pada botol.

c. Membuka botol-botol steril

Tali pengikat kertas pelindung warna coklat dilepas kemudian diangkat sementara teman lain yang membantu membuka bungkusannya.

a) Menurunkan botol

Turunkan botol kedalam sumur dengan pemberat batu, lepas gulungan tali pelan-pelan, jangan biarkan botol menyentuh bibir sumur.

b) Mengisi botol

Tenggelamkan botol sepenuhnya kedalam air sampai kedasar sumur.

c) Mengangkat botol

Tarik pelan-pelan gulungan tali keatas kemudian buang sebagian airnya bila terlalu penuh supaya ada ruang udara.

d) Menutup atau menyumbat botol

Teknik standar

Botol disumbat atau ditutup dengan memutar kemudian dilindungi dengan dimanteli dengan kertas coklat ditempatnya dan diikat kembali.

Teknik menutup dengan alat

Penutup diletakkan pada tempatnya kemudian dipres dengan alat penutup, kertas coklat pelindung dimanteli kemudian diikat.

E. Pembuatan media sampel

Langkah-langkah pembuatan media sampel :

1. Siapkan Erlenmeyer 1000 ml.
2. LB, BGLB ditimbang masing-masing 39 mg.
3. Lakukanlah pengenceran dengan menambahkan aquades sebanyak 200 ml hingga rata.
4. Tambahkan aquades hingga volumenya 1000 ml .
5. Panaskan diatas kompor/tungku hingga merata.
6. Setelah merata diamkan beberapa menit sampai larutan media dingin kemudian tuangkan ketabung reaksi.
7. Masukkan tabung reaksi yang sudah terisi dan masukkan kedalam tabung durham.

8. Masukkan 5 ml media kedalam tabung reaksi.
 - Media LB: untuk tes pendugaan/perkiraan
 - Media BGLB :untuk tes penegasan
9. Tutuplah tabung media dengan kapas sampai rapat.
10. Letakkan tabung reaksi yang sudah berisi media kedalam rak tabung.Masukkan kedalam autoclave untuk disterilisasi media pada suhu 121⁰ Celcius tekanan 1 S psi selama 1 menit.
11. Setelah cukup waktunya buka autoclave keluarkan tabung reaksi bersama dengan rak tabung.
12. Tabung tersebut didinginkan
13. Setelah dingin, tabung-tabung tersebut siap untuk digunakan.

Prosedur pemeriksaan

Langkah-langkah pemeriksaan bakteriologi air dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tes perkiraan (presumptive tes)

Media Lactose Broth

1. Siapkan tabung media laktose yang diperlukan sebanyak 7 tabung atau sampel (untuk sistem atau porsi 5:1:1).
2. Tabung media disusun dalam rak tabung dan diberi tanda sesuai dengan unit kode, tanggal pengambilan, tanggal pemeriksaan, dan volume dengan menggunakan spidol permanen.
3. Sampel dikocok atau dicampur agar lebih merata.
4. Masukkan contoh air secara aseptik kedalam ruang tabung sesuai dengan tulisan atau tanda pada tabung yaitu :

Sebanyak 5 tabung medium lactose diisi masing-masing 10 ml sampel air

1 tabung medium lactose diisi masing-masing 1 ml sampel air

1 tabung medium lactose diisi masing-masing 0,1 sampel air contoh air dari porsi 1-rl dan 0,1 ml sebaiknya diteteskan dekat pada permukaan media jangan pada ujung tabung.

5. Tabung reaksi terlebih dahulu dibuka tutupnya, sterilkan bibir mulut tabung diatas nyala spirtus sebelum dan sesudah diisi sampel.
6. Tabung-tabung digoyang hingga tercampur rata.
7. Dieramkan pada suhu 37°C selama 2x24 jam dinyatakan sebagai tes perkiraan positif dilanjutkan dengan tes penegasan.
8. Bila tes perkiraan negatif, tes penegasan tidak dilanjutkan.

b. Tes penegasan (confirmed tes)

Media BGLB

Semua tabung yang menunjukkan peragian positif pada tes perkiraan dalam waktu 24-48 jam dilanjutkan.

1. Berilah tanda pada tabung reaksi dengan spidol sesuai dengan ukurannya.
2. Pindahkan sebanyak 1-2 Ose penuh ke tabung reaksi yang bermedia BGLB.
3. Tutuplah tabung tersebut dengan rapat memakai kapas atau plastik.
4. Eramkan pada 37°C untuk tes penegasan coliform dan 44°C untuk tes penegasan coli tinja selama 2x24 jam.
5. Pembentukan gas diamati setiap 24 jam.

6. Bila dalam waktu 2x24 jam tidak berbentuk gas, maka tes penegasan dinyatakan negative, sedangkan jika berbentuk gas maka tes penegasan dinyatakan positif.
7. Hitunglah tes penegasan yang positif.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAHU
DESA LABUAJA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 24 / DS.LB / KH / III / 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : St. Nurzalzalina
Nim : 70200107068
Jurusan : Fakultas Ilmu Kesehatan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar
Alamat : Labuaja Desa Labuaja Kec.Kahu Kab.Bone

Nama tersebut di atas benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Labuaja. Penelitian dilakukan selama 2 minggu terhitung mulai pada tanggal 11 Juli sampai tanggal 24 Juli 2011.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuaja, 24 Juli 2011

Kepala Desa Labuaja,

Andi Amiruddin Bare



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



St. Nurzalzalina, lahir di Labuaja tanggal 21 Juni 1989, merupakan anak dari pasangan Muhtar.M dan St. Jamilah yang tinggal di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten BONE.

Penulis mengawali pendidikannya di TK Aisyah 1 Labuaja (1993-1995), SDN No. 284 Labuaja (1995-2001), SMPN 1 Kahu Palattae (2001-2004), SMAN 1 Kahu Palattae (2004-2007), dan pada tahun 2007 melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih program studi Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Lingkungan.

Selama di bangku kuliah, penulis juga menyempatkan diri dan terlibat aktif di beberapa organisasi baik intra kampus seperti HMJ maupun Organisasi ekstra kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R