

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN  
PREEKLAMPSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO**



**SKIRPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**M. NUR FAIZAL DARMADI**

**NIM : 70300114028**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

## KATA PENGANTAR

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Faizal Darmadi  
NIM : 70300114028  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 24 September 1996  
Jurusan : S1 Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Nusa Indah Blok D3 No. 39, Pallangga,  
Kabupaten Gowa  
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia  
di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten  
Jeneponto

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Gowa, Agustus 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
M. Nur Faizal Darmadi  
NIM : 70300114028

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto”, yang disusun oleh M. Nur Faizal Darmadi, NIM : 70300114028, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Juni 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Keperawatan.

Makassar, 24 Agustus 2018 M  
12 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(	)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep., Ns., M.Kes	(	)
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes	(	)
Munaqisy II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(	)
Pembimbing I	: Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes	(	)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep., Ns., M.Kes	(	)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203-198312 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini yang berjudul ”**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto**” dapat terselesaikan, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita Ayahanda **Darmadi, ST** & Ibunda **Juhaema, ST** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung **Muhammad Fadli Darmadi, Nurul Fathiah Annisa** dan **Muhammad Fayyadh Darmadi** yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti

pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** Ketua Prodi Keperawatan dan Ibu **Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes** sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Anwar Hafid., S.Kep Ns., M.Kes** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan proposal ini.
5. Ibu **Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak **Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd** selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia memberikan waktu dan memberikan masukan kepada peneliti selama penyusunan proposal ini.
6. Kepada Kepala Puskesmas Bontoramba, Bidan Koordinator dan petugas kesehatan yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta membantu selama proses penelitian berlangsung.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2014 (SIL14) atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
9. Kepada Kak **Rini Jusriani S.KM., M.Kes** yang senantiasa selalu meluangkan waktunya membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Kak **Umrah, Wani,** dan **Ulfahmi Zainul** yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
11. Kepada HMJ Keperawatan, Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin Makassar, UKM KSR-PMI Unit 107, HMI Komisariat Kesehatan yang telah

memberikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernaftaskan islam.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt juaalah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, Agustus 2018

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KEASLIHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Preeklampsia .....	12
1. Pengertian Preeklampsia .....	12
2. Klasifikasi Preeklampsia .....	13
3. Etiologi Preeklampsia.....	14
4. Tanda dan Gejala Preeklampsia .....	15



5. Patofisiologi Preeklampsia .....	16
6. Penatalaksanaan Preeklampsia .....	18
B. Faktor-faktor Kejadian Preeklampsia .....	20
1. Paritas .....	20
2. Riwayat Preeklampsia .....	23
3. Jarak Antar Kehamilan .....	24
4. Usia .....	26
5. Pendidikan .....	27
6. Pekerjaan .....	28
7. Diabetes Mellitus .....	29
8. Penyakit Ginjal .....	29
9. Radang dan Sitokin .....	30
10. Lipid Peroksida dan Antioksidan .....	32
11. Peran <i>Renin-Angiotensis-Aldosteron System</i> (RAAS) .....	33
12. Genetik .....	34
13. Peran Prostaglandin dan Trombosit .....	35
C. Pandangan Islam Tentang Preeklampsia .....	37
D. Kerangka Teori .....	40
E. Kerangka Konsep .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Desain Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42



C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Pengolahan Data .....	47
G. Analisis Data.....	48
H. Etika Penelitian.....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan .....	60
D. Keterbatasan Penelitian .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka .....	8
Tabel 4.1 Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba .....	50
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....	53
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas, Riwayat Preeklampsia, dan Jarak Antar Kehamilan dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....	54
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....	55
Tabel 4.5 Analisis Seleksi Karakteristik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....	53
Tabel 4.6 Analisis Multivariat Karakteristik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....	60

## DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	39
Bagan 2.1 Kerangka Konsep .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Instrumen (Lembar Isian)
Lampiran II	: Master Tabel
Lampiran III	: Output SPSS
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: Surat Izin Penelitian
Lampiran VI	: Surat Keterangan Telah Meneliti



## ABSTRAK

**Nama : M. Nur Faizal Darmadi**

**NIM : 70300114028**

**Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto**

---

Negara berkembang memiliki kejadian preeklampsia berkisar antara 4–18 % pada tahun 2018. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015 menyebutkan bahwa kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh preeklampsia/ekslampsia sebanyak 38%.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian adalah analitik deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* secara restrospektif. Populasi penelitian ini seluruh ibu hamil yang mengalami preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada bulan Januari 2016 sampai Juni 2018 yakni sebanyak 91 orang. Sampel yang diteliti ibu hamil yang mempunyai data sekunder yakni sebanyak 45 orang. Instrumen penelitian menggunakan lembar isian dan merupakan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan *Crosstabulation* dan uji Regresi Logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Paritas ( $p= 0,000$ ; OR = 45,000; CI=7,322-276,579) dan Usia ( $p=0,000$ ; OR=28,750; CI=5,621-147,055) memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan Riwayat preeklampsia ( $p= 0,080$ ; OR=0,338; CI= 0,098-1,171); Jarak antar kehamilan ( $p=0,787$ ; OR=1,179; CI=0,357-3,887); dan Pendidikan ( $p=0,026$ ; OR=8,929; CI=0,946-84,248), dan Pekerjaan ( $p=0,174$ ; OR=2,424; CI=0,668-8,799) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Hal ini berarti bahwa faktor paritas dan usia merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia. Sementara riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, pendidikan dan pekerjaan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi kejadian preeklampsia. Faktor yang paling mempengaruhi dengan kejadian preeklampsia adalah faktor paritas

Saran bagi peneliti selanjutnya, perlu menambahkan jumlah sampel penelitian, tempat pelayanan kesehatan yang diteliti agar hasil penelitian lebih representatif dan menggabungkan data primer.

**Kata Kunci: Preeklampsia, Paritas, Riwayat Preeklampsia, Jarak Antar Kehamilan, Usia, Pendidikan, Pekerjaan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Pada masa kehamilan, wanita membutuhkan perawatan spesial dan khusus agar anak yang dilahirkan bisa menjadi generasi sehat optimal. Sangat diperlukan perawatan dan pemantauan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan untuk kelangsungan hidup ibu dan bayinya. Namun, kondisi ini senantiasa dikelilingi oleh berbagai kondisi yang mengancam kesehatan dan kelancaran masa kehamilan, termasuk preeklamsia (Sulani, 2011).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup. Data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan 58.500 ibu meninggal akibat kehamilan dan persalinan, bahkan dari separuh jumlah seluruh kematian terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan, yang disebabkan oleh perdarahan (40-50%), infeksi (20-30%) dan preeklamsia (20-30 %) (Tari, 2014).

Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015 menyebutkan bahwa kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah

berubah dengan proporsi perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK terutama preeklamsia-eklamsia. Prevalensi preeklamsia secara nasional di Indonesia berkisar 2,1-8,5% dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Agustina 2011

Preeklamsia merupakan penyakit dengan tanda-tanda khas tekanan darah tinggi (hipertensi), pembengkakan jaringan (edema), dan ditemukannya protein dalam urin (proteimuria) yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini umumnya terjadi dalam trimester ke-3 kehamilan, tetapi dapat juga terjadi pada trimester kedua kehamilan (Rukiyah dan Yulianti, 2010). Preeklamsia merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat menyebabkan sindrom spesifik kehamilan berupa berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivasi endotel. di antara semua kehamilan, penyakit preeklamsia dijumpai pada 3,7% yang berakhir dengan kelahiran hidup dan kematian ibu akibat penyulit ini.

(Butalia *et al.* (2018)) melaporkan bahwa kejadian Hipertensi pada kehamilan adalah umum, mempengaruhi sekitar 7% kehamilan di Kanada yang berpengaruh besar terhadap komplikasi ibu, janin, dan bayi baru lahir. Untuk hipertensi ringan dalam kehamilan (tekanan darah sistolik 140-159 mm Hg dan / atau tekanan darah diastolik 80-109 mm Hg). Hipertensi berat (tekanan darah sistolik  $\geq$  160 mm Hg dan / atau tekanan darah diastolik  $\geq$  110 mm Hg) Kejadian preeklamsia di Amerika Serikat berkisar antara 2 – 6 % dari ibu hamil yang sehat. Di negara berkembang, kejadian preeklamsia berkisar antara 4 – 18 %.



Penyakit preeklampsia ringan terjadi 75 % dan preeklampsia berat terjadi 25 %. Dari seluruh kejadian preeklampsia, sekitar 10 % kehamilan umurnya kurang dari 34 minggu. Kejadian preeklampsia meningkat pada wanita dengan riwayat preeklampsia, kehamilan ganda, hipertensi kronis dan penyakit ginjal. Pada ibu hamil primigravida terutama dengan usia muda lebih sering menderita preeklampsia dibandingkan dengan multigravida.

Berdasarkan data (Profil Kesehatan Sulsel 2016) dalam laporan tahunan bidang kesehatan masyarakat tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu sebanyak 121 orang yang disebabkan oleh perdarahan sebanyak 63 orang (52,07%), pre eklampsia dan eklampsia 28 orang (1.65%), Infeksi 2 orang (0.02%), Abortus 1 orang (0.82%), Partus lama 1 orang (0,82%), karena penyebab lain sebanyak 26 orang (21,48%). Berdasarkan data (BKKBN, 2013) dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan bahwa AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pada data (Bappenas, 2014) tahun 1991 tercatat sebesar 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan setelah sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2012 AKI kembali mengalami peningkatan sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. (Bappenas, 2014). Negara Indonesia bahkan mendapat predikat terbelakang di Asia, dibandingkan dengan negara Timor Leste, Myanmar, Bangladesh, dan Kamboja, dalam melindungi kesehatan ibu (WHO, 2013; Saputra, 2013).

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2014, Penyebab AKI di Kabupaten Jeneponto disebabkan karena beberapa faktor

antara lain, yakni hipertensi sebesar 38% pendarahan sebesar 38 %, dalam kehamilan dan faktor lain yang berpengaruh sebesar 23 %. Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Jeneponto tahun 2012 sebanyak 11 orang (170 per 100.000 KH), tahun 2013 sebanyak 5 orang (82 per 100.000 KH) dan pada tahun 2014 sebanyak 13 orang (235 per 100.000 KH). Masih tingginya kematian ibu di Kabupaten Jeneponto disebabkan karena fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang dan letak geografis yang menyebabkan keterlambatan dalam pertolongan persalinan.

Preeklampsia dapat mengakibatkan kematian ibu, terjadinya prematuritas, serta dapat mengakibatkan *Intra Uterin Growth Retardation* (IUGR) dan kelahiran mati karena pada preeklampsia-eklampsia akan mengakibatkan pengapuran di plasenta yang kemudian memberikan sumbangsih terhadap berkurangnya asupan makanan dan oksigen ke janin (Benson, 2010). Namun, etiologi pre-eklampsia hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti (Tari, 2014), sehingga telah banyak peneliti melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap faktor-faktor yang paling penting untuk ibu hamil. Teori akan faktor faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia tersebut antara lain kelainan pada vaskularisasi plasenta, teori iskemik, radikal bebas, disfungsi endotel, teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin, teori adaptasi kardiovaskuler, teori defisiensi genetik, teori defisiensi gizi dan teori inflamasi. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi mengenai faktor paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan, dan pekerjaan terhadap kejadian preeklampsia.

Data Program Kesehatan Ibu dan Reproduksi Kabupaten Jeneponto periode Januari hingga Desember tahun 2015, beberapa Puskesmas (PKM) di kabupaten Jeneponto, tingginya angka kejadian preeklampsia yang menyebabkan kematian ibu di Puskesmas Bontoramba sebanyak 2 orang. Dari hasil data awal, didapatkan bahwa rekam medik periode Januari 2016 hingga Juni 2018, diketahui bahwa bahwa kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebanyak 91 orang.

Sehubungan dengan tingginya angka kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba, maka dibutuhkan upaya menurunkan angka kejadian preeklampsia. Upaya yang dapat ditempuh dengan tindakan pencegahan dan diagnosis penyakit yang dilaksanakan lebih dini serta pengobatan sesegera mungkin dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi karakteristik penderita preeklampsia di Puskesmas Bontoramba sehingga dapat diambil langkah protektif.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh Faktor paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan, dan pekerjaan dengan kejadian preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto?

### C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Objektif	Skala Ukur
1. Preeklampsia	Preeklampsia dalam penelitian ini adalah Ibu hamil yang memiliki Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan disertai proteinuria	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Preeklampsia Berat : Tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg dan proteinuria (+1) atau (+2) 2. Preeklampsia Ringan Tekanan darah: 140/90 -160/110 mmHg dan (+3) atau (+4)	Ordinal
2. Paritas	Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan responden baik hidup atau mati	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Risiko tinggi : Primipa dan Grandemultipara 2. Risiko rendah : Multipara	Ordinal
3. Riwayat Preeklampsia	Riwayat preeklampsia dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan riwayat preeklampsia sebelumnya	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Risiko tinggi : Memiliki riwayat preeklampsia 2. Risiko rendah : Tidak memiliki riwayat preeklampsia.	Ordinal
4. Jarak Antar Kehamilan	Jarak antar kehamilan dalam penelitian ini adalah jarak kehamilan ibu hamil dengan kehamilan sebelumnya.	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Risiko tinggi : 2 tahun dan atau >10 tahun 2. Risiko rendah : antara 2 sampai 10 tahun	Ordinal

5. Usia ibu hamil	Usia ibu hamil dalam penelitian ini adalah usia ibu saat hamil	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1 Risiko tinggi : <20 tahun dan >35 tahun. 2. Risiko rendah : 20-35 tahun	Ordinal
6. Pendidikan	Pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan terakhir ibu saat hamil	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Risiko tinggi : Berpendidikan rendah, yakni pendidikan terakhir ibu hamil dibawah S1 (Tidak sekolah, SD, SMP, SMA). 2. Risiko rendah : Berpendidikan tinggi, yakni pendidikan terakhir ibu hamil setara atau diatas S1/DIV (DII/DII, S1/DIV, S2, S3)	Ordinal
7. Pekerjaan	Pekerjaan dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan yang digeluti sehari-hari oleh ibu saat hamil	(Lembar Isian) <i>checklist form</i>	1. Risiko tinggi : Bekerja, yakni memiliki profesi atau mata pencaharian tertentu Risiko 2. Risiko rendah : Tidak bekerja, yakni tidak memiliki profesi atau mata pencaharian tertentu	Ordinal

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis. Disini penulis akan mengetengahkan beberapa hasil penelusuran dari beberapa penelitian maupun buku-buku pengobatan alternatif sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis (Sugiyanto, 2007).

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Socio-Demographic and Other Risk Factors of Pre Eclampsia at a Tertiary Care Hospital, Karnataka: Case Control Study	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan socio demographic dan faktor risiko lain dari pre-eklampsia	<i>Case-control study</i> , dengan penarikan sampel secara <i>non-probability purposive sampling</i> .	Usia kurang dari 20 tahun (OR = 3,8), pendapatan bulanan kurang dari \$ 4000 (OR = 6,8), usia menarche kurang dari 12 y (OR = 13,1), keluarga ber riwayat pre eklampsia (OR = 36,0) , keluarga ber riwayat Diabetes (OR = 44,9), keluarga ber riwayat hipertensi (OR = 16,7) ditemukan menjadi faktor risiko yang signifikan dari pre eklampsia.	Perbedaan penelitian ini yaitu melibatkan 100 kasus pre-eklampsia dan 200 kontrol tanpa pre eklampsia Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur pra-uji coba yang termasuk informasi terkait dengan socio-demographic dan faktor risiko pre eklampsia yang diketahui.
Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian <i>Preeklampsia</i> pada ibu hamil di poli kia Rsu anutapura palu	Untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada Ibu hamil di poli KIA RSU Anutapura Palu	Metode yang digunakan yaitu analitik dengan pendekatan Cross Sectional yang digunakan untuk mengukur variabel independen dan dependen secara bersamaan	Menunjukkan bahwa ada hubungan antara kejadian preeklampsia dengan umur ( $p = 0,000$ ) dan pengetahuan ( $p = 0,000$ ). Tidak ada hubungan antara kejadian preeklampsia dengan paritas ( $p = 0,765$ ), riwayat hipertensi ( $p = 0,060$ ) dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pengambilan sampel. Yakni dengan cara Purposive Sampling dengan rumus Slovin yang berjumlah 36 responden, Instrumen yang digunakan adalah kuisoner dan

			pemeriksaan antenatal care ( $p = 0,813$ ).	pengujian hipotesis dengan uji Chi-square.
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia di ruang bersalin blu-rsup. Prof. Dr. R.d. kandou manado provinsi sulawesi utara tahun 2013	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia di ruang bersalin BLU-RSUP. Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.	Metode yang digunakan yaitu analitik observasional dengan rancangan <i>cross sectional</i> .	Analisis secara bivariat untuk umur ibu diperoleh nilai $\rho$ value= 0,014 menunjukkan ada hubungan umur dengan preeklampsia dan hasil analisis secara bivariat paritas ibu memperoleh nilai $\rho$ value=0,470 menunjukkan tidak ada hubungan paritas dengan preeklampsia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pengambilan sampel. Yakni dengan cara data diolah menggambarkan karakteristik dari masing-masing variabel melalui tabel distribusi frekuensi. Mengetahui hubungan variabel independent dan dependent menggunakan uji statistik <i>Chi Square</i> pada tingkat kemaknaan $\alpha=0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95%.
Faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian pre eklamsi berat pada ibu hamil trimester II Di rsud kota bekasi tahun 2014	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dengan kejadian pre eklamsi berat pada ibu hamil trimester II	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>Cross sectional</i> .	Hasil penelitian bivariat menunjukkan ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian preeklamsi berat, ada hubungan pendidikan dengan preeklamsi berat, ada hubungan paritas dengan kejadian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada sampel yang diteliti ibu hamil trimester II yang mengalami preeklamsi berat



			preeklamsi berat, ada hubungan riwayat penyakit keturunan dengan kejadian preeklamsi berat, ada hubungan pekerjaan dengan kejadian preeklamsi berat.	
--	--	--	--	--

### ***E. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1. Tujuan Umum

Diketuinya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya pengaruh faktor paritas terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- b. Diketuinya pengaruh faktor riwayat preeklampsia terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- c. Diketuinya pengaruh faktor jarak antar kehamilan terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- d. Diketuinya pengaruh faktor usia terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- e. Diketuinya pengaruh faktor pendidikan terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- f. Diketuinya pengaruh faktor pekerjaan terhadap kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

## ***F. Manfaat Penelitian***

### **1. Bagi Institusi**

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia.

### **2. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang penelitian dan merupakan sumber data bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia.

### **3. Bagi Masyarakat**

Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia.

### **4. Bagi Keperawatan**

Sebagai sumber informasi bagi perawat dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dan upaya pencegahannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Preeklampsia***

##### **1. Pengertian Preeklampsia**

Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda-tanda khas tekanan darah tinggi (hipertensi), pembengkakan jaringan (edema), dan ditemukannya protein dalam urin (proteinuria) yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini umumnya terjadi dalam trimester ke-3 kehamilan, tetapi dapat juga terjadi pada trimester kedua kehamilan (Rukiyah dan Yulianti, 2010).

Preeklamsi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah paling sedikit 140/90 mmHg, proteinuria dengan atau tanpa edema. Edema tidak lagi dimasukkan dalam kriteria diagnostik, karena edema juga dijumpai pada kehamilan normal. Pengukuran tekanan darah harus diulang berselang 4 jam. Preeklamsi merupakan penyulit kehamilan yang akut dan dapat terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Dari gejala-gejala klinik preeklamsi dapat dibagi menjadi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat (Wibisono dan Dewi, 2009).

Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan oedema. Pre-eklampsia pada umumnya terjadi pada primigravida, kehamilan di usia remaja, kehamilan pada wanita yang berusia diatas 40 tahun, mengandung lebih dari satu janin, riwayat tekanan darah tinggi yang kronis sebelum kehamilan, kegemukan, riwayat kencing manis dan riwayat preeklamsia (Yeyeh, 2010).

## 2. Klasifikasi Preeklampsia

Preeklampsia dapat dibagi menjadi preeklampsia ringan dan berat. Menurut Prawiroharjo (2014), preeklampsia diklasifikasi menjadi :

### a. Preeklampsia Ringan

Preeklampsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah kehamilan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas. Penyebab preeklampsia ringan belum diketahui secara jelas. Penyakit ini dianggap sebagai "*maladaptation syndrome*" akibat vasospasme general dengan segala akibatnya. Gejala klinik preeklampsia ringan meliputi:

- 1) Kenaikan tekanan darah sistol 30 mmHg atau lebih, diastole 15 mmHg atau lebih dari tekanan darah sebelum hamil pada kehamilan 20 minggu atau lebih, atau sistol 140 mmHg sampai kurang 160 mmHg, diastole 90 mmHg sampai kurang 110 mmHg.
- 2) Proteinuria: secara kuantitatif lebih 0,3 gr/liter dalam 24 jam atau secara kualitatif (+ 1) atau (+2).
- 3) Edema pada pretibia, dinding abdomen, lumbosakral, muka atau tangan.

### b. Preeklampsia Berat

Preeklampsia berat adalah suatu komplikasi yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria.

Gejala klinis preeklampsia berat antara lain :

- 1) Tekanan darah sistolik  $>160$  mmHg, tekanan darah diastolic  $>110$ mmHg
- 2) Peningkatan kadar enzim hati atau/dan icterus
- 3) Trombosit  $<100.000/mm^3$
- 4) Oliguria  $< 400$  ml/24 jam
- 5) Proteinuria : secara kuantitatif lebih dari 2 gr/liter dalam 24 jam atau secara kuantitatif (+3) atau (+4)
- 6) Nyeri epigastrium
- 7) Skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat
- 8) Perdarahan pada retina
- 9) Odem pulmonum
- 10) Penyulit lain juga bisa terjadi, yaitu kerusakan organ-organ tubuh seperti gagal jantung, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, sindroma HELLP, bahkan dapat terjadi kematian pada janin, ibu, atau keduanya bila preeklampsia tak segera diatasi dengan baik dan benar.

### 3. Etiologi Preeklampsia

Penyebab preeklampsia tidak diketahui secara jelas sehingga disebut sebagai penyakit teoritis. Banyak teori-teori di kemukakan oleh para ahli yang mencoba menerangkan penyebabnya. Teori yang dipakai sekarang sebagai penyebab pre-eklampsia adalah teori "*iskemia plasenta*". Namun teori ini belum dapat menerangkan semua hal yang berhubungan dengan penyakit ini (Manuaba, 2008).

Etiologi yang memenuhi terjadinya preeklampsia menurut (Manuaba, 2010) yaitu :

- a. Primipa
- b. Distansi rahim berlebihan
- c. Hidramnion; hidramnion, hamil kembar, mola hidatidosa,
- d. Penyakit yang menyertai kehamilan; diabetes mellitus
- e. Kegemukan
- f. Usia ibu > 35 tahun

#### **4. Tanda dan Gejala Preeklampsia**

Tanda dan gejala preeklampsia ringan dalam kehamilan, antara lain edema (pembengkakan) terutama tampak pada tungkai, muka disebabkan ada penumpukan cairan yang berlebihan di sela-sela jaringan tubuh, tekanan darah tinggi dan dalam air seni terdapat zat putih telur (pemeriksaan urine dari laboratorium). Preeklampsia berat terjadi bila ibu dengan preeklampsia ringan tidak dirawat, ditangani dan diobati dengan benar. Preeklampsia berat bila tidak ditangani dengan benar akan terjadi kejang-kejang menjadi eklampsia (Bandiyah, 2009).

Menurut Holmes (2011) gejala-gejala yang terjadi pada penderita preeklampsia yaitu :

- a. Sakit kepala
- b. Gangguan penglihatan
- c. Nyeri epigastrik dan nyeri abdomen
- d. Oedema
- e. Asintomatik

Preeklampsia terjadinya karena adanya mekanisme imunolog yang kompleks dan aliran darah ke plasenta berkurang. Akibatnya suplai zat makanan yang dibutuhkan janin berkurang. Makanya, preeklampsia semakin parah atau berlangsung lama bisa menghambat pertumbuhan janin. Preeklampsia dapat menyebabkan bahaya pada ibu dan janin. Gejalanya adalah pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, terutama muka dan tangan. Lebih gawat lagi apabila disertai peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba serta kadar protein yang tinggi pada urin (Indiarti, 2009).

#### 5. Patofisiologi Preeklampsia

Pada awal kehamilan, sel sitotrofoblas menginvasi arterispiralis uterus, mengganti lapisan endothelial dari arteri tersebut dengan merusak jaringan elastis medial, muskular, dan neural secara berurutan. Sebelum trimester kedua kehamilan berakhir, arteri spiralis uteri dilapisi oleh sitotrofoblas, dan sel endothelial tidak lagi ada pada bagian endometrium atau bagian superfisial dari miometrium. Proses remodeling arteri spiralis uteri menghasilkan pembentukan sistem arteriolar yang rendah tahanan serta mengalami peningkatan suplai volume darah yang signifikan untuk kebutuhan pertumbuhan janin.

Pada preeklampsia, invasi arteri spiralis uteri hanya terbatas pada bagian desidua proksimal, dengan 30% sampai dengan 50% arteri spiralis dari *placental bed* luput dari proses remodeling trofoblas endovaskuler. Segmen miometrium dari arteri tersebut secara anatomis masih intak dan tidak terdilatasi. Rerata diameter eksternal dari arteri spiralis uteri pada ibu dengan preeklampsia adalah 1,5 kali lebih kecil dari diameter arteri yang sama pada



kehamilan tanpa komplikasi. Kegagalan dalam proses remodeling vaskuler ini menghambat respon adekuat terhadap kebutuhan suplai darah janin yang meningkat yang terjadi selama kehamilan. Ekspresi integrin yang tidak sesuai oleh sitotrofoblas ekstravilli mungkin dapat menjelaskan tidak sempurnanya remodeling arteri yang terjadi pada preeklampsia.

Kegagalan invasi trofoblas pada preeklampsia menyebabkan penurunan perfusi uteroplasenta, sehingga menghasilkan plasenta yang mengalami iskemi progresif selama kehamilan. Selain itu, plasenta pada ibu dengan preeklampsia menunjukkan peningkatan frekuensi infark plasenta dan perubahan morfologi yang dibuktikan dengan proliferasi sitotrofoblas yang tidak normal. Bukti empiris lain yang mendukung gagasan bahwa plasenta merupakan etiologi dari preeklampsia adalah periode penyembuhan pasien yang cepat setelah melahirkan.

Jaringan endotel vaskuler memiliki beberapa fungsi penting, termasuk di antaranya adalah fungsi pengontrolan tonus otot polos melalui pelepasan substansi vasokonstriktor dan vasodilator, serta regulasi fungsi anti koagulan, anti platelet, fibrinolisis melalui pelepasan faktor yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya gagasan bahwa pelepasan faktor dari plasenta yang merupakan respon dari iskemi menyebabkan disfungsi endotel pada sirkulasi maternal. Data dari hasil penelitian mengenai disfungsi endotel sebagai patogenesis awal preeklampsia menunjukkan bahwa hal tersebut kemungkinan merupakan penyebab dari preeklampsia, dan bukan efek dari gangguan kehamilan tersebut. Selanjutnya, pada ibu dengan preeklampsia, faktor gangguan kesehatan pada ibu yang sudah ada sebelumnya seperti

hipertensi kronis, diabetes, dan hiperlipidemia dapat menjadi faktor predisposisi atas kerusakan endotel maternal yang lebih lanjut.

## 6. Penatalaksanaan Preeklampsia

Tujuan utama penanganan preeklampsia adalah mencegah terjadinya eklampsia, melahirkan bayi tanpa asfiksia dengan skor APGAR baik, dan mencegah mortalitas maternal dan perinatal.

### a. Preeklampsia ringan

Istirahat di tempat tidur merupakan terapi utama dalam penanganan preeklampsia ringan. Istirahat dengan berbaring pada sisi tubuh menyebabkan aliran darah ke plasenta dan aliran darah ke ginjal meningkat, tekanan vena pada ekstremitas bawah menurun dan reabsorpsi cairan bertambah. Selain itu dengan istirahat di tempat tidur mengurangi kebutuhan volume darah yang beredar dan juga dapat menurunkan tekanan darah (Wiknjosastro, 2006).

Adapun perawatan obstetri pasien preeklampsiaa ringan :

- 1) Kehamilan preterm (kurang 37 minggu) : bila desakan darah mencapai normotensi selama perawatan, persalinan ditunggu sampai aterm; bila desakan darah turun tetapi belum mencapai normotensi selama perawatan maka kehamilannya dapat diakhiri pada umur kehamilan 37 minggu atau lebih.
- 2) Kehamilan aterm (37 minggu atau lebih) : persalinan ditunggu sampai terjadi onset persalinan atau dipertimbangkan untuk melakukan persalinan paa taksiran tanda persalinan. Cara persalinan : persalinan dapat dilakukan secara spontan bila perlu memperpendek kala II.

b. Preeklampsia berat

Pada pasien preeklampsia berat segera harus diberi obat sedatif kuat untuk mencegah timbulnya kejang. Penyulit lain juga bisa saja terjadi dan memperburuk keadaan karena adanya kerusakan organ-organ tubuh seperti :

- 1) Fungsi jantung yang tidak normal
- 2) Gagal ginjal
- 3) Gangguan fungsi hati
- 4) Gangguan pembekuan darah
- 5) Sindroma HELLP

Apabila sesudah 12 – 24 jam bahaya akut sudah diatasi, tindakan terbaik adalah menghentikan kehamilan. Sebagai pengobatan mencegah timbulnya kejang, dapat diberikan larutan magnesium sulfat ( $MgSO_4$ ) 20% dengan dosis 4 gram secara intravena loading dose dalam 4-5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan  $MgSO_4$  40% sebanyak 12 gram dalam 500cc ringer laktat (RL) atau sekitar 14 tetes/menit. Tambahan magnesium sulfat hanya dapat diberikan jika diuresis pasien baik, refleks patella positif dan frekuensi pernafasan lebih dari 16 kali/menit. Obat ini memiliki efek menenangkan, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan diuresis. Selain magnesium sulfat, pasien dengan preeklampsia dapat juga diberikan klorpromazin dengan dosis 50 mg secara intramuskular ataupun diazepam 20 mg secara intramuskular (Wiknjosastro, 2006).

## ***B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Preeklampsia***

### **1. Paritas**

Paritas adalah jumlah janin dengan berat badan  $\geq 500$  g yang pernah dilahirkan hidup maupun mati oleh seorang ibu. Bila berat badan tak diketahui maka dipakai umur kehamilan, yaitu 24 minggu (Siahaan, 2011).

Menurut James (2001) Paritas adalah klasifikasi wanita berdasarkan banyaknya mereka melahirkan bayi yang usia gestasinya 24 minggu. Paritas dapat di klasifikasikan menjadi 3, yaitu :

#### a. Primipara

Primipara adalah wanita yang telah melahirkan janin yang usia gestasinya lebih dari 28 minggu, baik lahir hidup maupun lahir mati

#### b. Multipara

Multipara adalah ibu yang telah melahirkan sebanyak 2 kali atau lebih.

#### c. Grandemultipara

Grandemultipara adalah ibu yang memiliki paritas tinggi, telah melahirkan lebih dari atau sama dengan empat kali.

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (diatas 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas lebih tinggi kematian maternal. Resiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan resiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan. Paritas tinggi menyebabkan uterus terlalu meregang sehingga uterus kehilangan elastisitas (Manuaba, 2008).

Pada primigravida (kehamilan pertama) sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi pada primigravida menyebabkan peningkatan pelepasan *corticotropic-releasing hormone* (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespons terhadap semua stresor dengan meningkatkan respons simpatik, termasuk respons yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah. Pada wanita dengan preeklampsia, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida-vasopeptida tersebut, sehingga peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah (Windaryani, dkk. 2013).

Pada primigravida/primipara terjadi gangguan imunologik (*blocking antibodies*) dimana produksi antibodi penghambat berkurang. Hal ini dapat menghambat invasi arteri spiralis ibu oleh trofoblas sampai batas tertentu hingga mengganggu fungsi placenta. Ketika kehamilan berlanjut, hipoksia placenta menginduksi proliferasi sitotrofoblas dan penebalan membran basalis trofoblas yang mungkin mengganggu fungsi metabolik placenta. Sekresi vasodilator prostasiklin oleh sel-sel endotial placenta berkurang dan sekresi trombosan oleh trombosit bertambah, sehingga timbul vasokonstriksi generalisata dan sekresi aldosteron menurun. Akibat perubahan ini terjadilah pengurangan perfusi plasenta sebanyak 50 persen, hipertensi ibu, penurunan volume plasma ibu, Jika vasospasmenya menetap, mungkin akan terjadi cedera sel epitel trofoblas, dan fragmen-fragmen trofoblas dibawa ke paru-paru dan mengalami destruksi sehingga melepaskan tromboplastin.

Selanjutnya tromboplastin menyebabkan koagulasi intravaskular dan deposisi fibrin di dalam glomeruli ginjal (endoteliosis glomerular) yang menurunkan laju filtrasi glomerulus dan secara tidak langsung meningkatkan vasokonstriksi. Pada kasus berat dan lanjut, deposit fibrin initerdapat di dalam pembuluh darah sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan konvulsi (Windaryani, dkk. 2013).

Faktor-faktor yang mempengaruhi paritas menurut Friedman (2008)

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin mudah dalam memperoleh menerima informasi, sehingga kemampuan ibu dalam berpikir lebih rasional. Ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih berpikir rasional bahwa jumlah anak yang ideal adalah 2 orang.

b. Pekerjaan

Pekerjaan jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan tempat pelayanan kesehatan yang diinginkan. Banyak anggapan bahwa status pekerjaan seseorang yang tinggi, maka boleh mempunyai anak banyak karena mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari.

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang tinggi mendorong ibu untuk mempunyai anak lebih karena keluarga merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d. Latar Belakang Budaya

*Cultur universal* adalah unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, ada di dalam semua kebudayaan di dunia, seperti pengetahuan bahasa dan khasanah dasar, cara pergaulan sosial, adat-istiadat, penilaian-penilaian umum. Hanya kepercayaan individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual. Latar belakang budaya yang mempengaruhi paritas antara lain adanya anggapan bahwa semakin banyak jumlah anak, maka semakin banyak rejeki.

e. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan domain dari perilaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka perilaku akan lebih bersifat langgeng. Dengan kata lain ibu yang tahu dan paham tentang jumlah anak yang ideal, maka ibu akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ketahui

## 2. Riwayat Preeklampsia

Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya merupakan faktor risiko utama. Menurut Duckitt & Harrington (2010) risiko meningkat hingga tujuh kali lipat (RR 7,19 95% CI 5,85-8,83). Kehamilan pada wanita dengan riwayat preeklampsia dan eklampsia sebelumnya berkaitan dengan tingginya kejadian preeklampsia berat, preeklampsia onset dinin dan dampak perinatal yang buruk (WHO, 2011; Steegers, 2012 ).

Angka kejadian preeklampsia akan meningkat pada ibu hamil yang mengalami riwayat preeklampsia, dikarenakan pembuluh darah plasenta sudah mengalami gangguan dan akan memperberat keadaan ibu. Sehingga



bagi ibu yang hamil yang memiliki riwayat preeklampsia sebelumnya harus mewaspadai kemungkinan terjadinya preeklampsia (Sanjay & Girija, 2014).

Hubungan antara riwayat preeklampsia sebelumnya dengan sFlt-1 yang memang belum banyak dikaji. Teori yang paling mendukung teori ini adalah teori *splicing DNA* pada mekanisme peningkatan sFlt-1 yang sifatnya menetap. *Slicing* merupakan mekanisme kehilangan intron pada tahap transkripsi, sehingga untai RNA hanya terdiri dari ekson yang siap untuk diranslasikan menjadi protein. Perubahan model penggabungan ekson ini menyebabkan peningkatan sFlt-1 dan model perubahan ini umumnya memanglah menetap (Jafar, 2013).

### 3. Jarak Antar Kehamilan

Jarak antar kehamilan yang dianggap berisiko bagi ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia yakni selang waktu jarak antar kehamilan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun. Robillard dkk melaporkan bahwa risiko preeklampsia dan eklampsia semakin meningkat sesuai dengan lamanya interval dengan kehamilan pertama (1,5 setiap 5 tahun jarak kehamilan pertama dan kedua;  $p < 0,001$  (WHO, 2011). Studi melibatkan 760.901 wanita di Norwegia, memperlihatkan bahwa wanita multipara dengan jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih memiliki risiko preeklampsia dan eklampsia hampir sama dengan nulipara (WHO, 2011; Kalam, 2016).

Jarak kelahiran merupakan praktek periode jumlah waktu diantara kelahiran. Keuntungan jarak kelahiran optimal sebagai kontribusi terhadap kesehatan dan fertilitas wanita dan kualitas kehidupan yang menyeluruh, memperbaiki kehidupan anak-anak dengan peningkatan akses mereka

terhadap makanan yang adekuat, pakaian, rumah, dan pendidikan, serta menurunkan beban kerja wanita (Rahayuningsih & Trisnawati, 2012).

Apabila jarak antara dua kehamilan > 5 tahun, disamping usia ibu yang sudah bertambah dan sesuai dengan penelitian yang ditemukan bahwa ibu hamil yang bersalin cukup banyak yang usianya lebih dari 35 tahun, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya proses degeneratif melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang sangat berpengaruh pada proses persalinan apabila terjadi kehamilan lagi dan juga akan terjadi kerusakan sel-sel endotel yang dapat mengakibatkan risiko untuk terjadinya preeklampsia lebih besar. Selain itu, organ reproduksi wanita juga akan mengalami penurunan fungsi seperti halnya penurunan fungsi pada ovarium yang salah satu fungsinya yaitu memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Padahal hormon estrogen sangat berpengaruh pada perkembangan seksual tubuh wanita, salah satunya adalah mempersiapkan rahim menerima janin. Dengan penurunan produksi estrogen maka keadaan rahim akan kurang atau tidak siap dalam menerima janin. Sehingga si ibu masuk dalam kategori berisiko tinggi yang salah satunya akan menyebabkan preeklampsia (Saputra, 2013).

Interval kehamilan yang kurang dari 2 tahun akan menyebabkan pengembalian nutrisi ibu yang belum cukup dan akan mengurangi pertumbuhan bayi. Selain itu, rahim dan kesehatan ibu belum pulih dengan baik akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban yang lebih besar. Kehamilan dalam keadaan tersebut perlu diwaspadai karena adanya kemungkinan terjadinya preeklampsia (Viktor, 2007). Sebaliknya jika

jarak antara dua kehamilan > 5 tahun, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya proses degeneratif melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang sangat berpengaruh pada proses persalinan apabila terjadi kehamilan lagi. Risiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia sangat besar, karena dapat terjadi kerusakan sel-sel endotel.

#### 4. Usia

Usia adalah usia individu dihitung mulai saat dia dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Usia sangat mempengaruhi kehamilan maupun persalinan. Usia yang baik untuk hamil atau melahirkan berkisar antara 20-35 tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal. Sebaliknya pada wanita dengan usia dibawah 20 tahun atau diatas 35 tahun kurang baik untuk hamil maupun melahirkan, karena kehamilan pada usia ini memiliki risiko tinggi seperti terjadinya keguguran, atau kegagalan persalinan, bahkan bisa menyebabkan kematian (Astuti, 2015).

Wanita yang usianya lebih tua memiliki tingkat risiko komplikasi melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih muda. Bagi wanita yang berusia 35 tahun keatas, selain fisik melemah, juga kemungkinan munculnya berbagai risiko gangguan kesehatan, seperti darah tinggi, diabetes dan berbagai penyakit lain. Menurut (Indriani, 2010), usia dibawah 20 tahun bukan masa yang baik untuk hamil karena organ-organ reproduksi belum sempurna. Hal ini tentu akan menyulitkan proses kehamilan dan persalinan. Sedangkan kehamilan diatas 35 tahun mempunyai risiko untuk mengalami

komplikasi dalam kehamilan dan persalinan antara lain perdarahan, gestosis, atau hipertensi dalam kehamilan, distosia dan partus lama.

Hipertensi dalam kehamilan paling sering mengenai wanita yang lebih tua, yaitu bertambahnya usia menunjukkan peningkatan insiden hipertensi kronis menghadapi risiko yang lebih besar untuk menderita hipertensi karena kehamilan. Wanita hamil dengan usia kurang dari 20 tahun insiden preeklampsia lebih dari 3 kali lipat. Pada wanita hamil berusia lebih dari 35 tahun dapat terjadi hipertensi laten oleh karena itu semakin lanjut usia maka kualitas sel telur sudah berkurang hingga berakibat juga menurunkan kualitas keturunan yang dihasilkan (Sutrimah, 2014)

Usia reproduksi yang optimal ialah antara usia 20-35 tahun, sebesar 38,7% angka kejadian preeklampsiaa ditemukan pada ibu dengan usia yang berisiko daripada usia ibu yang tidak berisiko. Tekanan darah yang meningkat seiring dengan pertumbuhan usia khususnya pada usia >35 tahun atau lebih rentan terjadinya berbagai penyakit dalam bentuk hipertensi dan eklampsia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa wanita yang usianya lebih tua memiliki tingkat risiko komplikasi melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih muda (Situmorang, 2016).

## **5. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu

aspek positif dan negative. Kedua aspek inilah yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang (Astuti,2015).

Hasil penelitian Astuti (2015) menyebutkan bahwa 93,9% penderita preeklampsia berpendidikan kurang dari 12 tahun. Ibu yang mengalami preeklampsia 63,1% memiliki pendidikan kurang dan ibu yang memiliki pendidikan rendah 2,19% akan mengalami kejadian preeklampsia daripada ibu yang memiliki pendidikan tinggi. Pendidikan seseorang berhubungan dengan kesempatan dalam menyerap informasi mengenai pencegahan dan faktor-faktor kejadian preeklampsia. Tetapi pendidikan ini akan dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi, atau dukungan lingkungan seseorang untuk menerapkan pencegahan dan faktor risiko preeklampsia (Djannah, 2010).

## **6. Pekerjaan**

Faktor pekerjaan dapat berpengaruh terhadap kejadian preeklampsia. Wanita yang bekerja diluar rumah memiliki risiko lebih tinggi mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Pekerjaan dikaitkan dengan adanya aktivitas fisik dan stres yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia (Indriani, 2012).

Pekerjaan dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stress yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia. Ibu hamil yang mempunyai pekerjaan pada umumnya kurang memperhatikan kondisi tubuhnya misalnya melakukan pekerjaan yang berat dan adapula ibu hamil yang tidak rutin memeriksakan kehamilannya karena disibukkan oleh pekerjaannya (Djannah, 2010).

## 7. Diabetes Melitus

Ibu bersalin dengan riwayat diabetes mempunyai risiko terjadi preeklampsia yaitu 2,53 kali dibandingkan dengan seorang ibu bersalin yang tidak memiliki riwayat diabetes (Hanum, 2013).

Perkembangan Preeklampsia pada mereka dengan yang sudah ada DM menyebabkan hambatan pertumbuhan dan penyakit yang lebih parah yang dibuktikan dengan berat badan lahir rendah dikoreksi untuk usia kehamilan dan usia kehamilan sebelumnya pada saat persalinan. Perbedaan-perbedaan ini tidak terlihat pada kehamilan di mana DM dikembangkan selama kehamilan. Pengamatan ini mendukung konsep bahwa kadar glukosa selama perkembangan plasenta pada trimester pertama dapat mengubah plasenta dan menyebabkan pembatasan kemudian dalam kehamilan ketika stimulus kedua memicu Preeklampsia (Sutrimah, 2014).

## 8. Penyakit Ginjal

Penyakit ginjal pada kehamilan merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan *irreversible* pada saat kehamilan dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah) (Kartaka, 2013).

Selama kehamilan normal, aliran darah dan laju filtrasi glomerulus meningkat cukup besar. Penyakit ginjal dapat menyebabkan perfusi ginjal dan filtrasi glomerulus menurun. Lesi karakteristik dari preeklampsia pada ginjal adalah pembengkakan dari kapiler endotel glomerular yang menyebabkan penurunan perfusi dan laju filtrasi ginjal. Pada sebagian besar wanita hamil

dengan preeklampsia, penurunan ringan sampai sedang laju filtrasi glomerulus tampaknya terjadi akibat berkurangnya volume plasma sehingga kadar kreatinin plasma hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kadar normal selama hamil (sekitar 0,5 ml/dl). Namun pada beberapa kasus preeklampsia berat, keterlibatan ginjal menonjol dan kreatinin plasma dapat meningkat beberapa kali lipat dari nilai normal ibu tidak hamil atau berkisar hingga 2-3 mg/dl. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan intrinsik ginjal yang ditimbulkan oleh vasospasme hebat intrarenal (Kartaka,2013).

Menurut Steegers (2012), risiko preeklampsia meningkat sebanding dengan keparahan penyakit pada wanita dengan penyakit ginjal. Preeklampsia merupakan 8% faktor komplikasi dalam kehamilan di dunia yang bisa saja diperburuk oleh adanya *chronic kidney disease* (CKD) yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara faktor angiogenik dan anti-angiogenik. CVD memiliki mekanisme patofisiologis yang dapat menimbulkan beberapa faktor risiko lain, seperti obesitas, penyakit ginjal dan diabetes. Bahkan preeklampsia dapat dijadikan indikator dalam menilai risiko masa CVD dan CKD di masa depan, sehingga dapat dijadikan alternatif titik pencegahan dan diagnosis dini (Tari, 2014)

## **9. Radang dan Sitokin**

Peran plasenta dalam diseminasi langsung di sitokin inflamasi tidak terbukti. Tapi, plasentasi miskin menyebabkan hipoksia dapat memperkuat rilis di rangsangan inflamasi dalam sirkulasi ibu. Leukosit di tempat tidur plasenta dan pembuluh darah rahim diaktifkan untuk melepaskan sitokin dan spesies oksigen reaktif. sel elastase-positif yang merupakan penanda aktivasi

neutrofil yang ditemukan bertambah banyak di desidua dan tidur plasenta (Yang *et al.*, 2013).

Sindrom preeklampsia umumnya dari disfungsi endotelium, dan disfungsi endotel umum ini tampaknya menjadi bagian dari respon inflamasi sistemik yang berlebihan yang melibatkan leukosit dan sitokin proinflamasi. Sistem kekebalan tubuh yang memadai melakukan invasi trofoblas dari arteri spiral memulai iskemia dan hipoksia di plasenta, sehingga peningkatan pelepasan sitokin proinflamasi di plasenta. Iskemia plasenta dan hipoksia juga menyebabkan pelepasan ditingkatkan mikropartikel trofoblas ke dalam sirkulasi ibu yang merangsang peningkatan induksi sitokin proinflamasi dan aktivasi sel endotel. Aktivasi ini menyebabkan disfungsi sel sistemik difusi endotel yang merupakan fitur patofisiologi dasar sindrom preeklampsia (Tari, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Lockwood *et al.* (2008) menemukan pewarnaan imunohistokimia secara signifikan lebih tinggi untuk IL-6 dalam sel desidua dari preeklampsia dibandingkan prematur, plasenta kontrol usia yang sama kehamilan. Sitokin pro-inflamasi yang terkait dengan asal-usul preeklampsia (yaitu, tumor necrosis factor- $\alpha$  dan interleukin-1 $\beta$ ) ditingkatkan IL-6 tingkat mRNA dan peningkatan disekresikan IL-6 tingkat di trimester leukosit bebas incubations sel desidua pertama, yang diukur dengan nyata waktu kuantitatif RT-PCR, ELISA, dan Western blotting. Oleh karena itu, desidua sel yang diturunkan IL-6 dapat berkontribusi secara berlebihan beredar IL-6 tingkat yang dapat mempromosikan baik disfungsi endotel sel (dan disfungsi vaskular berikutnya) dan patogenesis preeklampsia sedangkan



lokal peningkatan kadar IL-6 dapat berkontribusi untuk kelebihan desidua makrofag terlibat dalam dangkal invasi trofoblas ekstravili dari desidua (Lockwood *et al.*, 2008).

## 10. Lipid peroksida dan Antioksidan

Lipoprotein oksidasi (*oxidative stress*) hadir pada kehamilan normal tetapi sangat ditingkatkan pada preeklampsia (Yang *et al.*, 2013). Peroksidasi lipid dari sinsitiotrofoblas bertanggung jawab atas pelepasan metabolit oksidatif yang stabil seperti malondialdehid dan 4 hidroksinonerial yang menyebabkan tersebar luas kerusakan endotel (Yang *et al.*, 2013).

Selama kehamilan normal meningkatnya peroksidasi lipid dan pembentukan radikal bebas serta secara signifikan penurunan produksi antioksidan dalam darah ibu dapat menyebabkan patogenesis preeklampsia. Stres oksidatif akan mengakibatkan gangguan keseimbangan antara oksidan dan anti-oksidan yang ditandai dengan meningkatnya kadar lipid peroksida (oksidan/radikal bebas) disertai menurunnya aktivitas anti oksidan (Begum *et al.*, 2011)

Lipid peroksida sebagai oksidan/radikal bebas yang sangat toksis ini akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel, keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi endotel bahkan rusaknya seluruh struktur sel endotel yang disebut sebagai disfungsi endotel (*endothelial dysfunction*) sehingga memunculkan gejala-gejala klinik preeklampsia (Adiga *et al.*, 2007).

## 11. Peran *Renin-Angiotensis-Aldosteron System* (RAAS)

RAAS memberikan kontribusi terhadap tekanan darah dan cairan tubuh melalui serangkaian reaksi enzimatik yang disebabkan oleh komponen utama yaitu, renin, angiotensinogen (AGT), *angiotensin-converting enzyme* (ACE), angiotensin I (ANG I), angiotensin II (ANG II), angiotensin tipe reseptor I (AT1R), dan *angiotensin receptor* tipe 2 (AT2R) (Yang *et al.*, 2013). Plasenta iskemik diyakini berkontribusi terhadap disfungsi sel endotel dengan mengubah keseimbangan antara tingkat sirkulasi dari angiogenik dan anti-angiogenik faktor pertumbuhan (Verdonk *et al.*, 2014). Ini adalah faktor pertumbuhan endotel vaskular (VEGF), faktor pertumbuhan plasenta (PIGF), dan fms seperti larut tyrosine kinase-1 (sFlt-1). sFlt-1 diketahui mengikat dan menghambat VEGF dan PIGF aktivitas. Demikian pula, Endoglin adalah protein antiangiogenic lain terlibat dalam patogenesis preeklampsia. Kedua sFlt-1 dan Endoglin ditemukan akan dibangkitkan dalam sirkulasi ibu sebelum timbulnya preeklampsia (Yang *et al.*, 2013).

Saat ini hipotesis utama yang dapat diterima dalam menjelaskan terjadinya preeklampsiaa adalah iskemia pada plasenta, preeklampsiaa sebagai manifestasi reaksi keracunan, maladaptasi imunologi, gangguan genetik. Inadekuatnya invasi trofoblas terhadap miometrium menyebabkan gangguan pada proses vasodilatasi fisiologis dari arteri spiralis maternal. Sindrom preeklampsia maternal juga berhubungan dengan faktor tambahan invasi trofoblas yang inadekuat juga disertai dengan gangguan pertumbuhan janin tanpa penyakit maternal. Gangguan aliran darah intervillus menyebabkan perfusi yang inadekuat dan iskemia pada trimester kedua kehamilan. Hal ini

yang mungkin menyebabkan diproduksinya oksigen reaktif. Akibat antioksidan endogen normal tidak dapat mengkompensasi keadaan tersebut, akan muncul kondisi stres oksidatif. Hal inilah yang mungkin mendasari gejala klinis pada sindrom preeklampsia (Yang *et al.*, 2013).

Sistem renin-angiotensin yang mendasari perubahan patofisiologi preeklampsia disebabkan oleh tiga faktor, yaitu efek vasokonstriktor angiotensin II, stimulasi aldosteron oleh angiotensin II dan retensi sodium, dan dijumpainya angiotensin II dalam dosis besar dapat menyebabkan proteinuri. Ada kemungkinan bahwa, meskipun penurunan volume intravaskular, vasokonstriksi preeklampsia, yang menekan pelepasan renin (Yang *et al.*, 2013).

Sekarang ini, alasan yang tepat untuk disfungsi dari RAAS pada preeklampsia adalah kerusakan endotel, stres oksidatif, dan autoimunitas. Namun, dari sudut pandang epidemiologi, berbagai faktor genetik dan lingkungan telah dianggap berkontribusi pada patogenesis preeklampsia karena kecenderungan keluarga yang kuat, ditinjau dari geografis sosioekonomi, dan ras (Tari, 2014).

## 12. Genetik

Preeklampsia juga merupakan kelainan genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini ditemukan dengan frekuensi yang meningkat pada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan cucu perempuan mengalami preeklampsia. Kecenderungan untuk preeklampsia dan eklampsia di anggota keluarga telah dipelajari dengan kemungkinan bahwa itu diwariskan (Sanjay & Giriya, 2014). Sebuah warisan multifaktorial juga dianggap mungkin.

Hubungan antara HLADR4 antigen histokompatibilitas dan hipertensi proteinuria juga kemungkinan jenis HLA tertentu lebih umum pada ibu dan janin dari kehamilan preeklampsia. Beberapa bukti yang menunjukkan peran faktor genetik pada kejadian preeklampsia antara lain:

- a. Kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklampsia pada anak dan cucu ibu hamil dengan riwayat preeklampsia dan bukan pada ipar mereka.
- b. Meningkatnya prevalensi preeklampsia pada anak perempuan yang lahir dari ibu yang menderita preeklampsia mengindikasikan adanya pengaruh genotip fetus terhadap kejadian preeklampsia (Jafar, 2013).

Warisan genetik pada kehamilan dengan hipertensi dapat juga didasarkan pada adanya gen resesif tunggal atau gen dominan dengan penetrasi yang tidak lengkap (tergantung pada genotipe janin). Preeklampsia selama kehamilan dari ibu merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia selama kehamilan anak perempuan dari ibu tersebut.

### **13. Peran Prostaglandin dan Tromboksan**

Pada preeklampsia dan eklampsia didapatkan kerusakan pada endotel vaskuler, sehingga terjadi penurunan produksi prostaglandin (PGI<sub>2</sub>) yang pada kehamilan normal meningkat, aktivasi pengumpulan dan fibrinolisis, yang kemudian akan diganti thrombin dan plasmin. Thrombin akan mengkonsumsi antitrombin III, sehingga terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan tromboksan (TXA<sub>2</sub>) dan serotonin, sehingga terjadi vasospasme dan kerusakan endotel (Rukiyah, 2010).

Plasenta memegang peranan penting dalam patogenesis dan patofisiologi dalam preeklampsia. Plasentasi yang abnormal dalam preeklampsia menyebabkan terjadinya maladaptasi imun dan implantasi plasenta yang kurang sempurna, yang menyebabkan terjadinya kegagalan remodelling fisiologis dari pembuluh darah desidua dan tidak sempurnanya perkembangan vaskularisasi plasenta.

Hal penting lain yang menyebabkan terjadinya preeklampsia adalah disfungsi endotel yang menyebabkan peningkatan lipid peroksidase dan terjadinya ketidakseimbangan antara produksi vasokonstriktor tromboksan (TXA<sub>2</sub>) dan vasodilator prostasiklin PGI<sub>2</sub>) disadari sebagai faktor penting dalam peningkatan vasokonstriksi plasenta pada preeklampsia (Coskun & Ozdemir, 2008). Pada wanita hamil normal prostasiklin endotel mencapai 8-10 kali lipat lebih tinggi daripada wanita yang tidak hamil. Namun pada wanita preeklampsia peningkatan ini hanya terjadi 1-2 kali lipat.

Pada wanita preeklampsia tromboksan meningkat lebih banyak bila dibandingkan dengan wanita normal. Karena prostasiklin merupakan vasodilator dan tromboksan merupakan vasokonstriktor, kerusakan sel endotel menyebabkan peningkatan tromboksan dan penurunan prostasiklin menyebabkan terjadinya vasospasme. Peningkatan sintesis lemak menyebabkan peningkatan rasio tromboksan/ prostasiklin dan menyebabkan timbulnya sindrom preeklampsia. Itulah mengapa profil lipid yang abnormal merupakan penanda penting untuk terjadinya preeklampsia. (Lockwood, 2008)

### C. Pandangan Islam Tentang Preeklampsia

Meskipun angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi, namun hal ini erat kaitannya dengan kurangnya penanganan komplikasi selama kehamilan dan masih rendahnya status kesehatan ibu. Selama kehamilan banyak hal yang bisa terjadi yang bisa berdampak pada ibu maupun pada bayinya kelak. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S. Al-ahqaaf (46) : 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {15}

Terjemahnya :

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.*

Menurut tafsir Al-misbah ayat 15 di atas menjelaskan bahwa betapa susahnyanya ibu mengandung selama sembilan bulan, dan selama kehamilan tersebut banyak komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dan dapat berdampak pada ibu dan bayinya, belum lagi pada saat persalinan. Semua hal itu dapat berisiko yang akhirnya berdampak pada kematian. (Shihab, 2002)

Dalam pandangan Islam diketahui bahwa jika ingin memperoleh kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk

kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan Hukum Islam. Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Dalam kitab *Maqashid Asy-Syariah*, Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. Memelihara Agama

Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama. Ibu yang sedang hamil sebaiknya senantiasa untuk memelihara agamanya supaya keturunan yang dilahirkan kelak akan baik pula, karena dengan agamalah seseorang dapat menyentuh nurani manusia

2. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian ibu hamil diharapkan untuk senantiasa menjaga kandungannya misalnya tidak melakukan aborsi.

3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala yang paling sempurna, karna diberi akal dan hawa nafsu. Jadi sebaik-baik ibu adalah yang dapat memelihara akal dan fikirannya .

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin  
Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {4}

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang  
sebaik-baiknya”.*

Menurut tafsir Al-misbah ayat 4 diatas adalah salah satu bentuk  
penggambaran anugrah Allah kepada manusia dengan bentuk yang paling  
baik dan tentu tidak mungkin anugrah tersebut terbatas pada bentuk fisik.  
(Shihab, 2002)

#### 4. Memelihara keturunan

Ibu hamil hendaknya memelihara keturunannya agar kelak selama  
proses kandungan sampai proses persalinan tidak mengalami hambatan  
contohnya ibu hamil harus memperhatikan makanannya.

Hal ini pun dijelaskan dalam perintah Allah SWT yang tercantum dalam  
firmannya pada Q.S. Abasa (80): 24 :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ {24}

Terjemahnya :

*“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.*


Maksud tafsir ayat diatas adalah Allah mengisyaratkan kepada manusia  
agar senantiasa memperhatikan makanan serta merenungkan bagaimana  
proses yang dilaluinya sehingga dimakan (Shihab, 2002). Jadi ayat ini  
merupakan salah satu dasar pendidikan yang sangat mengena menjaga  
keselamatan manusia.



## 5. Memelihara harta


Bagian terakhir dari Maqashid Asy-Syariah yang dijaga oleh syari'at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta.

### D. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori Faktor-Faktor yang Berperan dalam Terjadinya Preeklampsia. Sumber : Rukiyah (2010), Yang (2013), Siahaan (2011), Najman (1989), dan Duckitt & Harrington (2005) dimodifikasi oleh Penulis.

### E. Kerangka Konsep



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan *cross sectional* yakni rancangan studi untuk melihat pengaruh antara variabel independen seperti hubungan paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan, dan pekerjaan dengan variabel dependen yaitu kejadian preeklampsia dimana faktor yang mempengaruhi ditelusuri secara retrospektif.

#### ***B. Tempat dan Waktu Penelitian***

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Juli 2018.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian atau objek yang akan di teliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dan berstatus preeklampsia di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada Januari 2016 sampai Juni 2018 yakni sebanyak 91 ibu.

## 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dan berstatus preeklampsia di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, yakni data ibu preeklampsia yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari bulan Januari 2016 sampai bulan Juni 2018 yakni sebanyak 45 ibu.

Adapun dalam penarikan sampel ditentukan beberapa kriteria yang memenuhi syarat variabel yang diteliti.

### a. Kriteria Inklusif

Kriteria inklusi penelitian ini antara lain:

- 1) Tercatat mengalami preeklampsia pada tahun 2016-2018 di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- 2) Tekanan darah  $\geq 140$  mmHg/90 mmHg
- 3) Proteinuria
- 4) Masa kehamilan 1 sampai 40 minggu

### b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien yang bertempat tinggal diluar wilayah kerja Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- 2) Pasien yang mengalami penyakit Diabetes mellitus, TBC dan PPOK

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data yang diperoleh dari puskesmas yang akan menjadi tempat penelitian dan data-data lain yang mendukung. Data sekunder pada penelitian ini adalah ibu hamil yang mengalami preeklampsia pada wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Januari 2016 sampai Juni 2018.

##### **2. Metode pengumpulan data**

- a. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat rekam medik.
- b. Melakukan pengisian pada format pengumpulan data sesuai dengan variabel yang dibutuhkan yakni paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan, pekerjaan di ruang rekam medik Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- c. Data yang diperoleh dicatat, dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar isian (*checklist form*) sebagai alat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari rekam medik pasien ibu hamil yang memeriksakan

kehamilannya di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada Januari 2016 sampai Juni 2018.

#### ***F. Pengelolah Data***

Pengelolaan data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

##### 1. Editing

Setelah lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

##### 2. Scoring

Adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang perlu diberi penilaian atau skor.

##### 3. Koding

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

##### 4. Entry data

Merupakan kegiatan memasukkan data yang sudah dilakukan pengkodean ke dalam program computer SPSS.

##### 5. Cleaning

Merupakan kegiatan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidak lengkapan, dan sebagainya.

## 6. Tabulasi data

Tahap pengelompokan data sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

## G. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini melalui prosedur bertahap antara lain (Notoatmodjo, 2010) :

### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini yakni paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan usia, pendidikan, dan pekerjaan berupa frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel.

### 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia pada ibu hamil. Analisis ini menggunakan uji statistik Regresi Logistik. Uji statistik ini berupa tabel yang menyajikan pasangan data antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Dalam penelitian dinilai besarnya variabel faktor-faktor yang mempengaruhi yakni paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan usia, pendidikan, dan pekerjaan dengan variabel kejadian preeklampsia. Variabel faktor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil jika  $p < \alpha$ . Sebaliknya, Variabel faktor dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil jika  $p \geq \alpha$ .

Besarnya pengaruh variabel faktor dapat dinilai menggunakan nilai *odds ratio* (OR). Nilai OR dengan rentang *Confident interval* (CI) yang tidak mencakup angka 1,0 maka bisa dinyatakan signifikan pada  $\alpha$  5% atau merupakan faktor risiko penyebab preeklampsia. Namun jika rentang CI mencakup 1,0 maka hasil penelitian dinyatakan tidak signifikan secara statistik pada nilai  $\alpha$  5%.

### 3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan teknik analisis pengembangan dari analisis bivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk melihat atau mempelajari pengaruh beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel dependen. Analisis multivariat dari penelitian ini menggunakan uji regresi logistik berganda karena variabel dependen berbentuk kategorik. Analisis multivariat dalam penelitian ini meliputi analisis faktor paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan, dan pekerjaan sebagai variabel independen sedangkan preeklampsia sebagai variabel dependen.

Metode yang digunakan dalam analisis multivariat adalah metode enter. Metode enter adalah metode yang tepat digunakan karena dalam pemodelan ini dapat melakukan pertimbangan aspek substansi. Metode enter dilakukan dengan memasukkan semua variabel independen dengan serentak satu langkah, tanpa melewati kriteria kemaknaan tertentu (Hastono, 2007). Langkah pertama peneliti menyeleksi variabel mana yang layak masuk model uji multivariat. Masing-masing variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen, bila hasil uji bivariat mempunyai nilai p value



$<0,25$  maka variabel tersebut masuk ke dalam model multivariat. Langkah kedua adalah pembuatan model analisis multivariat kedalam regresi logistik berganda yaitu memasukkan variabel yang layak dilakukan regresi berganda (variabel yang memiliki  $p\ value < 0,25$ ). Setelah itu  $p\ value > 0,05$  maka variabel tersebut dikeluarkan satu persatu. Pada penelitian terdapat satu variabel dengan nilai  $p\ value < 0,05$ .

#### **H. Etika Penelitian**

Penelitian adalah upaya untuk menemukan kebenaran. Etika dalam proses penelitian menjadi bagian yang esensial dalam upaya menemukan kebenaran, maka segi etika penelitian harus diperhatikan yang meliputi :

1. *Annonimity* (Kerahasiaan Nama)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subyek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

2. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Alimul, 2007).

3. *Justice and Inclusiveness* (Keadilan dan Inklusivitas)

Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketetapan, keseksamaan dan kecermatan. Menekankan kebijakan penelitian, membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. *Balance Benefits and Harm* (Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Bontoramba. Puskesmas Bontoramba merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Puskesmas Bontoramba mempunyai 7 wilayah kerja atau mencakup 1 Kelurahan dan 6 Desa, yaitu Kelurahan Bontoramba, Desa Bulusuka, Desa Bangkalaloe, Desa Balumbungan, Desa Datara, Desa Maero dan Desa Lentu. Adapun jumlah penduduk per Kelurahan atau Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

NO	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk
1	Kelurahan Bontoramba	2.180
2	Desa Bulusuka	3.285
3	Desa Bangkalaloe	3.278
4	Desa Balumbungan	2044
5	Desa Datara	3.643
6	Desa Maero	2.544
7	Desa Lentu	2.234

Puskesmas Bontoramba sebagai salah satu tempat pelayanan tentunya mempunyai visi, misi dan motto antara lain:

1. Visi

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang professional dan mandiri

## 2. Misi

- a. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- c. Meningkatkan kesehatan individu, swasta dan masyarakat
- d. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman

## 3. Strategi

- a. Mengembangkan dan menetapkan pendekatan program disetiap pelayanan
- b. Mengembangkan dan menerapkan azas kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga
- c. Meningkatkan profesionalisme petugas agar dapat mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas
- d. Mengembangkan kemandirian puskesmas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

## 4. Motto Pelayanan

***“Tiada hari tanpa pelayanan”***

## 5. Tata Nilai

***“C E R I A”***

C : Cerdas

E : Efisien dan efektif

R : Ramah dalam melayani

I : Ikhlas dalam bekerja

A : Akuntabel

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang telah dilaksanakan pada bulan juli tanggal 23-28 juli 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yakni data ibu preeklampsia yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari bulan januari 2016 sampai bulan juni 2018 adalah sebanyak 45 ibu.

Penelitian ini adalah penelitian analitik deskriptif, dengan pendekatan *cross sectional*. yakni rancangan studi untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan dan pekerjaan dengan variabel dependen yaitu kejadian preeklampsia dimana faktor yang mempengaruhi ditelusuri secara retrospektif. adapun hasil penelitian akan disajikan pada tabel-tabel berikut ini

### 1. Analisis Univariat

#### a. Distribusi Frekuensi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada preeklampsia berat sebanyak 26 orang (57,8%) dan preeklampsia ringan sebanyak 19 orang (42,2%).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat distribusi frekuensi kejadian preeklampsia pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2  
Distribusi Frekuensi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja  
Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Kategori	Frekuensi	Persentase
	(n)	(%)
<b>Kejadian Preeklampsia</b>		
Preeklampsia Berat	26	57,8
Preeklampsia Ringan	19	42,2
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>

u  
m

ber: Data Sekunder, 2018

- b. Distribusi Frekuensi Faktor Paritas, Riwayat Preeklampsia dan Jarak Antar Kehamilan pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok yang memiliki 1 paritas adalah sebanyak 8 orang (17,8%), kelompok yang memiliki 2 sampai 3 paritas adalah sebanyak 18 orang (40%), dan kelompok yang memiliki lebih dari 3 paritas adalah sebanyak 19 orang (42,2%). Pada kelompok yang memiliki riwayat preeklampsia adalah sebanyak 21 orang (46,7%), dan kelompok yang tidak memiliki riwayat preeklampsia adalah sebanyak 24 orang (53,3%). Kelompok yang memiliki jarak kehamilan dibawah 2 tahun adalah sebanyak 22 orang (48,9%), kelompok yang memiliki jarak kehamilan 2 sampai 5 tahun adalah sebanyak 8 orang (17,8%), kelompok yang memiliki jarak kehamilan 6 sampai 10 tahun adalah sebanyak 13 orang (28,9%), dan

kelompok yang memiliki jarak kehamilan diatas 10 tahun adalah sebanyak 2 orang (4,4%).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat distribusi frekuensi faktor paritas, riwayat preeklampsia, dan jarak antar kehamilan responden pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3  
Distribusi Responden berdasarkan Paritas, Riwayat Preeklampsia, dan Jarak Antar Kehamilan dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Kategori	Frekuensi	Persentase
	Berat	
<b>Paritas</b>		
1	8	17,8
2-3	18	40,0
>3	19	42,2
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>
<b>Riwayat Preeklampsia</b>		
Ya	21	46,7
Tidak	24	53,3
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>
<b>Jarak Antar Kehamilan</b>		
< 2 tahun	22	48,9
2-5 tahun	8	17,8
6-10 tahun	13	28,9
> 10 tahun	2	4,4
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Sekunder, 2018

- c. Distribusi Frekuensi Faktor Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok yang berusia dibawah 20 tahun adalah sebanyak 7 orang (15,6%), kelompok yang berusia 20 sampai 35 tahun adalah sebanyak 18 orang

(40%), dan kelompok yang berusia diatas 35 tahun adalah sebanyak 20 orang (44,4%). Pada kelompok yang pendidikan terakhir SD adalah sebanyak 7 orang (15,6%), kelompok yang berpendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 11 orang (24,4%), kelompok yang berpendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 20 orang (44,4%), kelompok yang berpendidikan terakhir DII/DIII adalah sebanyak 5 orang (11,1%), dan kelompok yang berpendidikan terakhir DIV/S1 adalah sebanyak 2 orang (4,4%). Pada kelompok yang tidak bekerja adalah sebanyak 31 orang (68,9%), kelompok yang bekerja sebagai honorer adalah sebanyak 4 orang (8,9%), kelompok yang bekerja sebagai wiraswasta adalah sebanyak 7 orang (15,6%), dan yang bekerja sebagai PNS adalah sebanyak 3 orang (6,7%)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat distribusi frekuensi faktor paritas, riwayat preeklampsia, dan jarak antar kehamilan responden pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Distribusi Responden berdasarkan Faktor Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan Ibu Hamil dengan Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto

<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Usia</b>		
< 20 tahun	7	15,6
20-35 tahun	18	40,0
>35 tahun	20	44,4
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>
<b>Pendidikan</b>		
SD	7	15,6
SMP	11	24,4



SMA	20	44,4
DII/DIII	5	11,1
DIV/S1	2	4,4
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>
<b>Pekerjaan</b>		
Tidak Bekerja	31	68,9
Honorer	4	8,9
Wiraswasta	7	15,6
PNS	3	6,7
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>

ber: Data Sekunder, 2018

## 2. Analisis Bivariat

Pada tahap ini dilakukan penyeleksian variabel independen yang layak masuk model uji multivariat. Kelayakan variabel ditentukan dengan tingkat signifikansi (sig) atau nilai  $p < 0,25$  dengan “metode enter” dalam regresi logistik sederhana antara masing-masing variabel paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan, usia, pendidikan dan pekerjaan terhadap variabel dependen preeklampsia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 5 variabel dengan  $p < 0,25$  dan hanya faktor jarak antar kehamilan yang memiliki nilai  $p > 0,25$ .

Tabel 4.5  
Analisis Seleksi Bivariat Karakteristik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Kategori	Preeklampsia		<i>p</i>	OR	95%CI
	Berat n (%)	Ringan n (%)			
<b>Paritas</b>					
Berisiko Tinggi	24 (92,3)	4 (21,1)	0,000	45,000	7,322- 276,579
Berisiko Rendah	2 (7,7)	15 (78,9)			
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			

<b>Riwayat</b>					
<b>Preeklampsia</b>					
Berisiko Tinggi	15 (57,7)	6 (31,6)	0,080	0,338	0,098-1,171
Berisiko Rendah	11 (42,3)	13 (68,4)			
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			
<b>Jarak Antar</b>					
<b>Kehamilan</b>					
Berisiko Tinggi	14 (53,8)	11 (57,9)	0,787	1,179	0,357-3,887
Berisiko Rendah	12 (46,2)	8 (42,1)			
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			
<b>Usia</b>					
Berisiko Tinggi	23 (88,5)	4 (21,1)			5,621-147,055
Berisiko Rendah	3 (11,5)	15 (78,9)	0,000	28,750	
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			
<b>Pendidikan</b>					
Berisiko Tinggi	25 (96,2)	14 (73,7)			0,946-84,248
Berisiko Rendah	1 (3,8)	5 (26,3)	0,026	8,929	
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			
<b>Pekerjaan</b>					
Berisiko Tinggi	6 (23,1)	8 (42,1)			
Berisiko Rendah	20 (76,9)	11 (57,9)	0,174	2,424	0,668-8,799
<b>Jumlah</b>	<b>26 (100,0)</b>	<b>19 (100,0)</b>			

Sumber: Data Sekunder, 2018 \*Regresi Logistik

a. Faktor Paritas

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa baik preeklampsia berat maupun preeklampsia ringan sebagian besar ibu memiliki paritas yang berisiko tinggi yaitu paritas 92,3% pada kelompok preeklampsia berat dan 21,1% pada kelompok preeklampsia ringan. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor paritas mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,000 < 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari paritas adalah 45 kali lipat. Nilai OR tidak mencakup nilai 1, maka

faktor paritas merupakan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil

b. Faktor Riwayat Preeklampsia

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor riwayat preeklampsia tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,080 > 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari riwayat preeklampsia adalah 0,338 kali lipat. Nilai OR mencakup nilai 1, maka riwayat preeklampsia bukan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

c. Faktor Jarak Antar Kehamilan

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor jarak antar kehamilan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,787 > 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari riwayat preeklampsia adalah 1,179 kali lipat. Nilai OR mencakup nilai 1, maka jarak antar kehamilan bukan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

d. Faktor Usia

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor usia mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,000 > 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari usia adalah 28,750 kali lipat. Nilai OR tidak mencakup nilai 1, maka faktor usia merupakan faktor risiko kejadian preeklampsia.

e. Faktor Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,026 > 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari pendidikan adalah 8,929 kali lipat. Nilai OR mencakup nilai 1, maka pendidikan bukan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

f. Faktor Pekerjaan

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor pekerjaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,174 > 0,05$ ). Besarnya faktor risiko dari pekerjaan adalah 2,424 kali lipat. Nilai OR mencakup nilai 1, maka pekerjaan bukan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat ini dilakukan dengan cara memilih variabel yang dianggap penting yang masuk dalam model dengan cara mempertahankan variabel yang mempunyai  $p < 0,05$  dan mengeluarkan variabel yang  $p > 0,05$ . Hasil analisis multivariat pertama dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6  
 Analisis Multivariat Karakteristik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
 Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas  
 Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Kategori	<i>B</i>	<i>p</i>	OR	95%CI
Paritas	3,801	0,042	44,763	1,157-1732,218
Riwayat Preeklampsia	1,025	0,375	2,786	0,290-26,748
Usia	-0,255	0,895	0,775	0,017-34,559
Pendidikan	2,881	0,116	17,827	0,490-648,782
Pekerjaan	-1,418	0,205	0,242	0,27-2,167

Sumber: Data Sekunder, 2018 \*Tabel Multivariat

Hasil analisis tabel 4.6 menunjukkan hanya terdapat 1 variabel yang memiliki  $p < 0,05$  dan 7 variabel yang memiliki nilai  $p > 0,05$  sehingga analisis tahap selanjutnya tidak dilakukan. Sehingga pada penelitian ini faktor paritas merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian preeklampsia

### C. Pembahasan

Pada awal penelitian ini telah didapatkan data awal dengan jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dan berstatus preeklampsia pada rekam medik di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto yakni sebanyak 45 ibu pada januari 2016 sampai juni 2018. Peneliti menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu tercatat mengalami

preeklampsia pada januari 2016 sampai juni 2018 di Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan memiliki data medis lengkap sesuai variabel. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah data rekam medik yang bertempat tinggal diluar wilayah kerja Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan data catatan medik yang tidak lengkap.

Setelah penelitian dilakukan, data hasil penelitian dikumpulkan kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan entri kedalam master tabel. Data kemudian diolah dengan menggunakan *software statistic* (SPSS). Hasil pengolahan disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

Model Analisis penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Dalam penelitian dinilai besarnya variabel faktor-faktor yang mempengaruhi yakni paritas, riwayat preeklampsia, jarak antar kehamilan usia, pendidikan, dan pekerjaan dengan variabel kejadian preeklampsia. Variabel faktor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil jika  $p < \alpha$ . Sebaliknya, Variabel faktor dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil jika  $p \geq \alpha$ .

Besarnya pengaruh variabel faktor dapat dinilai menggunakan nilai *odds ratio* (OR). Nilai OR dengan rentang *Confident interval* (CI) yang tidak mencakup angka 1,0 maka bisa dinyatakan signifikan pada  $\alpha$  5% atau merupakan faktor risiko penyebab preeklampsia. Namun jika rentang CI mencakup 1,0 maka hasil penelitian dinyatakan tidak signifikan secara statistic pada nilai  $\alpha$  5%.

Langkah selanjutnya adalah analisis multivariat ke dalam regresi logistik berganda yaitu memasukkan variabel yang layak dilakukan regresi berganda (variabel yang memiliki  $p \text{ value} < 0,25$ ). Setelah itu  $p \text{ value} > 0,05$  maka variabel tersebut dikeluarkan satu persatu.

#### 1. Faktor Paritas

Paritas merupakan jumlah janin yang pernah dikandung oleh seorang ibu dengan berat badan  $\geq 500$  g atau  $>24$  minggu yang dilahirkan hidup ataupun mati. Berdasarkan hasil analisis crosstab, diketahui bahwa pada penelitian ini, paritas dengan risiko tinggi lebih banyak dialami oleh ibu hamil sebanyak 24 ibu (92,3%) pada preeklampsia berat, dan hanya sebesar 4 ibu (21,1%) dengan preeklampsia ringan.

Berdasarkan hasil uji analisis pada tabel 4.5, nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor paritas merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian preeklampsia. Besarnya pengaruh paritas yang berisiko tinggi terhadap kejadian preeklampsia sebesar 45 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kehamilan pertama dan lebih dari 3 kali mengandung, baik kelahiran mati atau pun hidup, memiliki potensi untuk mengalami preeklampsia sebesar 45 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil dengan paritas yang berisiko rendah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Hanum (2013) yang menunjukkan bahwa dari hasil analisis uji statistik menggunakan uji *chi square* terdapat pengaruh yang signifikan antara paritas dengan kejadian preeklampsia ( $p=0,017$ ) dengan nilai OR 2,627 dengan batas bawah 1,171 dan batas atas 5,894 pada *interval confidence* 95%. Hal ini juga sesuai

penelitian Tari (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor paritas dengan kejadian preeklampsia yaitu nilai  $p = 0,000$ , dengan nilai OR 1,613 dengan batas bawah 1,071 dan batas atas 2,431 pada *interval confidence 95%*.

Faras (2010) mengungkapkan bahwa angka kejadian preeklamsia untuk tiap negara berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kehamilan pertama (primipara). Demikian pula yang diungkapkan oleh Janet (2011) bahwa insiden preeklamsia sangat dipengaruhi oleh paritas, berkaitan dengan ras (etnis) juga predisposisi genetik serta lingkungan. Pada primipara kejadian preeklamsia lebih besar karena terjadi perubahan hormonal dan ada perubahan uterus karena ibu baru hamil untuk pertama kalinya. Pada penelitian ini, kehamilan primipara juga merupakan kategori berisiko tinggi, dengan frekuensi sebanyak 8 ibu hamil (17,8%). kategori berisiko tinggi juga dapat dialami ibu hamil.

Penelitian yang dilakukan oleh Windaryani (2013) menyatakan bahwa paritas merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia pada ibu hamil. Paritas yang lebih dari 3 menjadi berisiko karena tubuh ibu telah mengalami penurunan fungsi sistem reproduksi, terlebih jika ditambah dengan faktor pemenuhan gizi yang diperlukan ibu yang tidak baik. Pada penelitian ini didapatkan bahwa frekuensi paritas lebih dari 3 yakni sebanyak 19 ibu hamil (42,2%)

Pada primipara berhubungan dengan kurangnya pengalaman dan pengetahuan ibu dalam perawatan kehamilan. Multipara merupakan paritas



paling aman. Pada penelitian ini didapatkan bahwa frekuensi paritas 2-3 yakni sebanyak 18 ibu hamil (40%).

Pada grandemultipara sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi pada grandemultipara menyebabkan peningkatan pelepasan corticotropic-releasing hormone (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespons terhadap semua stresor dengan meningkatkan respons simpatik, termasuk respons yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah. Pada wanita dengan preeklamsia/eklamsia, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida-vasopeptida tersebut, sehingga peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah (Windaryani, dkk. 2013).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berasumsi bahwa paritas berpengaruh dengan kejadian preeklamsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Pada penelitian ini dapat dilihat banyak ibu hamil yang hamil memiliki paritas yang dapat menyebabkan preeklamsia yakni primipara dan grandemultipara (60%) ibu hamil. Pada kehamilan pertama (primipara) diduga karena pada kehamilan pertama terjadi pembentukan bloking antibodi terhadap antigen plasenta tidak sempurna sehingga timbul respons imun yang tidak menguntungkan terhadap histokompatibilitas plasenta. Pada preeklamsia terjadi kompleks imun humoral dan aktivasi komplemen. Hal ini dapat diikuti dengan terjadinya pembentukan proteinuria (Tari, 2014). Begitu pula pada

kehamilan lebih dari 3 anak (grandemultipara) sangat rentan akan penyakit hipertensi dan preeklamsi, dikarenakan stress yang terjadi pada ibu hamil.

Sesuai firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْمُمًا بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}

Terjemahnya :

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”* (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013: 47).

Menurut tafsir Al-misbah ayat 233 diatas menjelaskan bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya sampai umur dua tahun apabila menginginkannya namun setiap ibu akan mendapatkan guncangan dari Allah swt apabila tidak menyusui bayinya karena alasan yang tidak dihendaki oleh keduanya (Shihab, 2002).

Seorang ibu harus menyusui anaknya sampai umur dua tahun apabila menginginkannya namun setiap ibu akan mendapatkan guncangan dari

Allah swt apabila tidak menyusui bayinya karena alasan yang tidak dihendaki oleh keduanya. Dan pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jarak kehamilan yang paling aman yaitu 2-3 tahun yang mana jika jarak kehamilan  $< 2$  tahun atau  $>3$  tahun bisa menjadi salahsatu faktor penyebab terjadinya komplikasi pada saat persalinan.

## 2. Faktor Riwayat Preeklampsia

Riwayat preeklampsia dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan riwayat preeklampsia sebelumnya. Seorang ibu hamil yang memiliki riwayat telah mengalami preeklampsia pada kehamilan sebelumnya memiliki untuk kembali mengalami preeklampsia pada kehamilan saat ini. Berdasarkan hasil analisis crosstab, diketahui bahwa pada penelitian ini, riwayat preeklampsia dengan risiko tinggi lebih banyak dialami ibu hamil sebanyak 15 ibu (57,7%) pada preeklampsia berat, dan hanya sebesar 6 ibu (31,6%) dengan preeklampsia ringan. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor riwayat preeklampsia tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,080 > 0,05$ ) dengan besar 0,338 kali lipat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara riwayat preeklampsia dengan kejadian preeklampsia dengan ( $p = 0,194$ ,  $OR = 1,627$ ). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astuti (2015) yang menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat preeklampsia pada kehamilan pertamanya memiliki risiko 5 sampai 8 kali untuk mengalami preeklampsia lagi pada kehamilan keduanya. Sebaliknya,

wanita dengan preeklampsia pada kehamilan keduanya, maka bila ditelusuri ke belakang ia memiliki 7 kali risiko lebih besar untuk memiliki riwayat preeklampsia pada kehamilan pertamanya bila dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami preeklampsia di kehamilannya yang kedua.

Angka kejadian preeklampsia akan meningkat pada ibu hamil yang mengalami riwayat preeklampsia, dikarenakan pembuluh darah plasenta sudah mengalami gangguan dan akan memperberat keadaan ibu. Sehingga bagi ibu yang hamil yang memiliki riwayat preeklampsia sebelumnya harus mewaspadaai kemungkinan terjadinya preeklampsia dengan cara melakukan antenatal care yang optimal. (Sanjay & Girija, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, lebih banyak ibu hamil yg tidak memiliki riwayat preeklampsia dengan kejadian preeklampsia dibandingkan ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Preeklampsia dalam kehamilan yang berulang biasanya dikaitkan dengan risiko preeklampsiaa pada kehamilan berikutnya yang jauh lebih tinggi daripada risiko pada ibu yang tidak memiliki preeklampsiaa pada kehamilan sebelumnya.

### 3. Faktor Jarak Antar Kehamilan

Pada variabel jarak antar kehamilan, mayoritas kedua kelompok memiliki jarak kehamilan antar kehamilan yang berisiko tinggi yakni 53,8% pada kelompok preeklampsia berat dan 57,9% pada kelompok preeklampsia ringan. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor jarak antar kehamilan tidak mempengaruhi

secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,787 > 0,05$ ) dengan besar risiko 1,179 kali lipat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Astuti (2015), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara jarak kehamilan dengan preeklampsia ( $p \text{ value} = 0,698$ ) dan nilai OR yang didapat adalah 1,163 (0,543-2,490). Jarak antar kehamilan yang dekat dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian maternal. Jarak antar kematian yang disarankan pada umumnya adalah paling sedikit dua tahun.

Interval kehamilan yang kurang dari 2 tahun akan menyebabkan pengembalian nutrisi ibu yang belum cukup dan akan mengurangi pertumbuhan bayi (Situmorang, 2016). Begitu pula dengan jarak kehamilan yang lama, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya proses degeneratif melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang sangat berpengaruh pada proses persalinan apabila terjadi kehamilan lagi. Risiko terjadinya preeklampsia dan eklampsia sangat besar, karena dapat terjadi kerusakan sel-sel endotel (Kusumawati, 2010).

Apabila jarak antara dua kehamilan  $> 10$  tahun, disamping usia ibu yang sudah bertambah dan sesuai dengan penelitian yang ditemukan bahwa ibu hamil yang bersalin cukup banyak yang usianya lebih dari 35 tahun, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya proses degeneratif melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang sangat berpengaruh pada proses persalinan apabila terjadi kehamilan lagi dan juga akan terjadi kerusakan sel-sel endotel yang dapat mengakibatkan risiko untuk terjadinya preeklampsia lebih besar (Holmes, 2011).

Dari penelitian ini didapatkan, jarak antar kehamilan dengan kejadian preeklampsia di Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto, dikarenakan dalam kasus penelitian ini lebih banyaknya ibu hamil yang melahirkan pada jarak kelahiran yang aman yakni pada jarak antara 2 sampai 10 tahun.

#### 4. Faktor Usia

Usia dalam penelitian ini adalah usia ibu saat hamil yang dilihat ada catatan rekam medik Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada januari 2016 sampai juni 2018 yang dikatakan berisiko tinggi bila usia ibu hamil  $<20$  tahun dan  $>35$  tahun, dan berisiko rendah bila usia ibu hamil 20-35 tahun.

Berdasarkan hasil analisis crosstab, diketahui bahwa pada penelitian ini, usia dengan risiko tinggi lebih banyak dialami oleh ibu hamil sebanyak 23 ibu (88,5%) pada preeklampsia berat, dan hanya sebesar 4 ibu (21,1%) dengan preeklampsia ringan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kelompok usia berisiko tinggi lebih banyak terjadi daripada usia berisiko rendah, yakni sebanyak 27 berisiko tinggi (60%), dan hanya sebanyak 18 ibu hamil normal (40%) yang berisiko rendah. Hasil Penelitian ini didukung dengan hasil penellitian terdahulu Sumarni (2014) menunjukkan bahwa sebagian responden berumur 28-35 tahun sebanyak 57%. Hal tersebut sesuai dengan kondisi sistem reproduksi yang sehat untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-35 tahun. Berdasarkan hasil uji regresi logistik, nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi

kejadian preeklampsia ( $p= 0,000$ ). Besarnya pengaruh paritas yang berisiko tinggi terhadap kejadian preeklampsia sebesar 28 kali lipat.

Usia sangat mempengaruhi kehamilan maupun persalinan. Usia yang baik untuk hamil atau melahirkan berkisar antara 20-35 tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal. Sebaliknya pada wanita dengan usia dibawah 20 tahun atau diatas 35 tahun kurang baik untuk hamil maupun melahirkan, karena kehamilan pada usia ini memiliki risiko tinggi seperti terjadinya keguguran, atau kegagalan persalinan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Wanita yang usianya lebih tua memiliki tingkat risiko komplikasi melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih muda (Carolan, 2013). Bagi wanita yang berusia 35 tahun keatas, selain fisik melemah, juga kemungkinan munculnya berbagai risiko gangguan kesehatan, seperti darah tinggi, diabetes dan berbagai penyakit lain (Gunawan S, 2010).

Pada penelitian ini dapat dilihat banyak ibu hamil yang hamil pada usia yang dapat menyebabkan preeklampsia yakni dibawah umur 20 tahun dan diatas 35 tahun sebanyak 27 (60%) ibu hamil. Hal ini disebabkan karena pada usia dibawah 20 tahun alat reproduksi belum siap dan pada saat kehamilan berlangsung akan terjadi keracunan kehamilan dalam bentuk preeklampsia begitu pula pada tahun 35 tahun keatas sangat rentan akan stress sehingga dapat menyebabkan penyakit hipertensi dan preeklampsi, dikarenakan perubahan pada jaringan-jaringan kandung dan juga jalan lahir tidak lentur lagi.

Stres dapat berkurang dengan cara ibadah, bersabar dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah swt, dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 153 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {153}

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa, kita diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah dengan cara mengukuhkan jiwa dengan sabar dan sholat. Sabar yang dimaksud adalah menahan diri dari rayuan menuju nilai rendah dan dengan sholat dimaksud mengaitkan jiwa kepada Allah swt. (Shihab, 2002).

Beratnya masalah yang dihadapi seseorang seperti penyakit yang sudah menahun bahkan dapat menyebabkan kematian, kita harus tetap menjadikan sholat dan kesabaran sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup.

##### 5. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan terakhir ibu saat hamil yang dilihat ada catatan rekam medik Puskesmas Bontoramba, yang dikategorikan berisiko tinggi bila pendidikan ibu hamil <DII/DII. Dalam analisis crosstab, diketahui bahwa kelompok berisiko tinggi berdasarkan tingkat pendidikan lebih banyak terjadi pada kelompok



preeklampsia berat, yakni sebanyak 25 ibu hamil (96,2%), dan sebanyak 14 ibu hamil (73,7%) dengan preeklampsia ringan. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,026 > 0,05$ ) dengan besar 8,929 kali lipat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gandhi & Rao (2014), dari subjek penelitian yang terkait dengan preeklampsia adalah pendidikan terakhir ibu hamil dan suami memiliki pengaruh dengan kejadian preeklampsia. Menurut Fransiska dkk. (2014), pendidikan dan pekerjaan ibu hamil akan memiliki pengaruh dengan kejadian preeklampsia meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Namun menurut Maryanti (2013) faktor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia berat.

Tingkat pendidikan yang cukup akan lebih mudah dalam mengidentifikasi stressor dalam diri sendiri maupun dari luar diri seseorang. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman tentang stimulus. Tingkat pendidikan seorang ibu hamil berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ibu hamil yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan

#### 6. Faktor Pekerjaan

Wanita yang bekerja di luar rumah dapat memiliki risiko tinggi mengalami preeklampsia bila dibandingkan dengan wanita yang bekerja

dirumah (ibu rumah tangga). Pekerjaan dapat dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stress yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia

Pekerjaan dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan yang digeluti sehari-hari oleh ibu saat hamil yang dilihat pada catatan rekam medik Puskesmas Bontoramba pada januari 2016 sampai juni 2018, yang berisiko tinggi bila ibu memiliki pekerjaan, dan berisiko rendah bila ibu hamil tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa kelompok berisiko tinggi berdasarkan pekerjaannya lebih banyak terjadi pada kelompok preeklampsia ringan, yakni sebanyak 8 ibu hamil (42,1%). Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor pekerjaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kejadian preeklampsia ( $0,174 > 0,05$ ) dengan besar 2,424 kali lipat.

Penelitian ini didukung oleh Astuti (2015) yang menunjukkan bahwa kejadian preeklampsia didominasi oleh kelompok ibu yang tidak bekerja yakni sebesar 63,5% dan variabel pekerjaan mayoritas didapatkan ibu tidak memiliki pekerjaan dengan nilai  $P = 0,166$  yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pekerjaan terhadap kejadian preeklampsia. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Indriani (2012) yang menyatakan status pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia dengan nilai  $P$  value sebesar 0,000 dan nilai OR sebesar 4,580 yang berarti ibu yang bekerja mempunyai risiko 4,580 lebih besar mengalami preeklampsia daripada ibu yang tidak bekerja.

Gandhi & Rao (2014) menyatakan bahwa yang dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia adalah salah satunya pekerjaan ibu hamil atau aktivitas fisik yang rutin dilakukan setiap harinya. Memperbaiki kualitas kehidupan ibu hamil sangatlah penting, dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menurunkan beban kerja wanita (ibu hamil) (Rahayuningsih & Trisnawati, 2012).

Dalam hasil penelitian ini ibu hamil yang memiliki pekerjaan berisiko tinggi yakni sebanyak 14 orang (31,2%) sedangkan yang memiliki pekerjaan berisiko rendah sebanyak 31 (68,9%). Jadi, lebih banyak jumlah ibu yang memiliki pekerjaan yang berisiko tinggi daripada ibu yang memiliki pekerjaan yang berisiko rendah.

#### ***D. Keterbatasan Penelitian***

Pelaksanaan penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan yang akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini, antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga validitas data penelitian sangat bergantung pada validitas data rekam medik Puskesmas
2. Adanya ibu yang mengalami preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto, akan tetapi tidak tercatat di rekam medik. Hal tersebut dikarenakan ibu hamil tersebut memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan diluar wilayah kerja Puskesmas Bontoramba.
3. Masih banyaknya faktor preeklampsia lainnya juga mampu mempengaruhi, namun tidak diteliti dalam penelitian ini karena keterbatasan dalam informasi rekam medik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Paritas merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 45 kali lipat. Riwayat preeklampsia bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 0,338 kali lipat. Jarak antar kehamilan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 1,179 kali lipat. Usia merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 28,750 kali lipat. Pendidikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 8,929 kali lipat. Pekerjaan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dengan besar risiko 2,424 kali lipat. Faktor yang paling mempengaruhi dengan kejadian preeklampsia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto adalah faktor paritas.

#### **B. Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan institusi dan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia. Bagi peneliti selanjutnya, perlu untuk menambahkan jumlah sampel penelitian, tempat pelayanan kesehatan yang diteliti agar hasil penelitian lebih representatif pada suatu wilayah dan menggabungkan data primer untuk faktor-faktor yang terbatas pada data rekam medik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai dasar pemahaman masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perawat dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia dan upaya pencegahannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya: Departemen Agama RI.
- Agustina, dkk. "Referat Preeklampsia". Purwokerto. Universitas Jendral Sudirman. 2011
- Adiga U, D'souza V, Kamath A, Mangalore N.2007."Antioxidant activity and lipid peroxidation in preeclampsia". J Chin Med Assoc; 70 (10): 435-438.
- Alimul, Aziz.2007."Metode Penelitian Kebidanan & Tehnik Analisis Data".Jakarta : Salemba Medika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010."Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek".Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti.2015."Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan". Skripsi. Jakarta : Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullan
- Bandiyah, 2010."Kehamilan, Persalinan, Gangguan Kehamilan".Jakarta : Nuha Medika.
- Begum, Ramesh, R. Mahesh, V Hazeena.2011."Effect of Sesbania grandiflora on lung antioxidant defense system in cigarette smoke exposed rats". Internasional Journal of Biological Chemistry.1(3): 141-148.
- Benson, D.2010."Hipertensi dalam kehamilan. Edisi II". Surabaya: Lab/SMF Obstetri Ginekologi, Fakultas kedokteran UNAIR/RSUD Dr Soetomo.
- Boyd, HA., Tahir, H., Wohlfahrt, J. & Melbye, M.2013."Associations of Personal and Family Preeclampsia History With the Risk of Early-, Intermediate- and Late-Onset Preeclampsia".American Journal of Epidemiology.
- Butalia Sonia, Audibert Francois, Anne-Marie, Firoz Tabassum, Logan A G, Magee LA, Mundle William, Rey Evelyne, Rabi D M, Daskalopoulou S S, Nerenberg K A. 2018. "Hypertension Canada's 2018 Guidelines for the Management of Hypertension in Pregnancy" Canadian Journal of Cardiology 34 :526-531. Canada.
- Carolan, M.2013. "Maternal age  $\geq 45$  years and maternal and perinatal outcomes": a review of the evidence.Midwifery, 29, 479-89.
- Data Program Kesehatan Ibu dan Reproduksi Kabupaten Jenepono Tahun 2015
- Departemen Kesehatan RI. 2013."Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional".

- Departemen Kesehatan RI. 2014. "*Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*".
- Departemen Kesehatan RI. 2014. "*Profil Kesehatan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan*".
- Departemen Kesehatan RI. 2016. "*Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*".
- Djannah.2010. "*Gambaran Epidemiologi Kejadian Preeklampsia/Eklampsia di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2001-2009*". Yogyakarta : Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol.13 No.4 Oktober 2010 : 378-385
- Duckitt, K., dan Harrington, D., 2005, "*Risk Factors for Pre-eclampsia at Antenatal Booking: Systematic Review of Controlled Studies*", *British Medical Journal*, 330, 565 – 567.
- Enda. 2010. "*Ilmu Perilaku Kesehatan*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Faras, Handayani.2010." *Faktor-faktor kejadian preeklampsia*". Di RS. On-line Artikel.
- Friedman.2008." *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*". Jakarta : EGC
- Gandhi & Rao.2014. "*Faktor-faktor yang berhubungan terhadap kejadian preeklampsia di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014*". Skripsi.Yogyakarta : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gunawan,2010. "*Bab-II Landasan Teori-upn Veteran Jakarta*", <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4S1kedokteran/207311168/Bab%201.pdf>.
- Hanum.2013." *Faktor Risiko yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Bersalin di RSUP dr. M. Djamil Padang Tahun 2013*". Disertasi. Padang : Poltekkes Kemenkes Jurusan Kebidanan Padang
- Hidayat.2009. "*Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*". Jakarta: Salemba Medika.
- Hodikoh Atik, Setyowati.2015. "*Kemampuan Merawat pada Ibu Pascaseksio Sesarea dan Hubungannya dengan Nilai Budaya*" Bandung : Jurnal Ners Vol.10 No.2.
- Holmes.2011. "*Buku Ajar Ilmu Kebidanan*". Jakarta : EGC.
- Indriani.2012." *Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Preeklampsia atau eklampsia pada Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum daerah Kardinah Kota Tegal Tahun 2011*". Skripsi. Depok : Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Kebidanan Komunitas.
- Indiarti, M.T.2009. "*Panduan Lengkap Kehamilan, Persalinan, dan Perawatan Bayi, Bahagia Menyambut Si Buah Hati*", Jogjakarta :Cetakan X, Diglossia Media.

- Jafar.2013. "*Faktor-faktor Risiko Terjadinya Preeklampsia Berat*". Tesis. Program Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro Semarang.
- James,D.K.2001. "*High Risk Pregnancy Management*". Jakarta : EGC
- Janet MC, Kevin E Kip, Jorn Olsen.2011."*Risk of early or severe preeclampsia related to pre-existing conditions*". International Journal of Epidemiology;36:412-9.
- Kalam.2016."*Luaran Ibu dan Perinatal pada Kehamilan dengan Preeklampsia Berat di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari - 31 Desember 2016*". Skripsi. Manado: Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Karkata.2013."*Panduan Penatalaksanaan Kasus Obstetri – Himpunan Kedokteran Feto Maternal*". Bandung.
- Koentjaraningrat.2009."*Pengantar Ilmu Antropologi*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusmiyati, Y.2008."*Perawatan Ibu Hamil*", Yogyakarta : Fitramaya.
- Kusumawati Y.2010."*Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap persalinan dengan tindakan di RS dr. Moewardi Surakarta*".Tesis Magister Epidemiologi.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lockwood, Sibai B, Dekker G., & Kupferminc M. 2008. "*Pre-eclampsia*". Lancet 365 785–799. (doi:10.1016/S0140-6736(05)71003-5)
- Lowe Mat, Chen D R, Huang S L.2016."*Social and Cultural Factors Affecting Maternal Health in Rural Gambia: An Exploratory Qualitative Study*". Department of Public Health, International Health Program, National Yang-Ming University, Taipei. Published by PLOS ONE DOI. Taiwan.
- Manuaba.2008."*Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*". Jakarta: EGC.
- Margono.2010."*Metodologi Penelitian Pendidikan*". Jakarta : Rineka Cipta.
- Michelle H., & Richard L.2011."*Pathophysiology of the Clinical Manifestations of Preeclampsia*". Clin J Am Soc Nephrol ;2:543-9.
- Najman JM, Morrison J, Williams GM, et al.1989."*Unemployment and reproductive outcome*". An Australian study. Br J Obstet Gynaecol ;96:308–13
- Notoatmodjo, S.2010. "*Metodologi Penelitian Kesehatan*". Jakarta : Rineka Cipta.
- Pasaribu R D, Setia T F.2014.Gultom Lusiana "*Sosial, Budaya serta Pengetahuan Ibu Hamil yang Tidak Mendukung Kehamilan Sehat*". Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Medan : Jurnal Ilmiah PANNMED Vol.9 No.1.
- Prawirohardjo, S. 2014. "*Ilmu Kebidanan*". Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.Edisi Keempat.



- Rahayuningsih, FB. & Trisnawati, AG.2012.”*Hubungan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Pre-eklamsia*”. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional "Kiat Menjadi Perawat Peneliti yang Handal.
- Rahmawati & Nurjaya.2010.”*Pengaruh Faktor Maternal Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Daerah Ajjatpannge Watan Sopeng Kabupaten Sopeng tahun 2010*”.Makassar : Jurnal Media Kebidanan Poltekkes Makasar.
- Robillard.2008.”*The birth interval hypothesis-does it really indicate the end of paternity hypothesis*”.J Reprod Immunol 59:245-51.
- Rukiyah Y dan Yulianti Lia.2010.”*Asuhan Kebidanan IV, Trans Info Media*”.Jakarta.
- Sanjai & Girija.2014. “*Preeclampsia–Eclampsia. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India*”, 64(1), 4–13. <http://doi.org/10.1007/s13224-014-0502-y>
- Saputra Wiko.2013.”*Angka Kematian Ibu (AKI) Melonjak, Indonesia Mundur 15 Tahun*”.Medan: Prakarsa Policy Review.
- Setiadi.2008.”*Konsep & keperawatan keluarga*”.Yogyakarta : Graha ilmu.
- Sediaoetama, A.2008.”*Ilmu Gizi Jilid I*”.Jakarta : Dian Rakyat.
- Sediaoetama, A.2009.”*Ilmu Gizi*”.Jakarta : Dian Rakyat.
- Setiawan, A. dan Saryono.2010.”*Metodologi Penelitian Kebidanan*”.Jakarta : Nuha Medika.
- Shihab, M. Quraish.2002.”*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an) Volume 1* . Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish.2002.”*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an) Volume 6* . Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish.2002.”*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an) Volume 8* . Jakarta: Lentera Hati
- Siahaan.2011.”*Luaran Ibu dan Bayi pada Penderita Preeklampsia Berat Usia Kehamilan <37 Minggu dengan Penanganan secara Ekspektatif dan Aktif*”. Tesis. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Situmorang T H.2016.”*Faktor - Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di Poli KIA RSUD Anutapura Palu*”. Palu : Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No. 1.
- Steegers, E.A., P. von Dadelszen, J. J. Duvekot, and R. Pijnenborg, “*Pre-eclampsia,*” The Lancet, vol. 376, pp. 631–644, 2012.
- Sugiyanto.2007.”*Model-Model Pembelajaran Inovatif*.Jakarta : Depdikbud.
- Sulani.2011.”*Buku Panduan untuk Pelatih, Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah untuk Bidan dan Perawat*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.

- Sumarni.2014.“*Faktor resiko kejadian preeklampsia*” Makassar : Jurnal Makara Kesehatan Vol. 15 No 1.
- Sutrimah, Mifbakhuddin & Wahyuni, D. 2014. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang
- Tari,2014.“*Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia di RSIA Pertiwi Makassar*” Tesis.Makassar : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Viktor. 2007. *Analisis faktor risiko pada kelahiran mati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2006*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wahid M A, Dhiya Alfun.2014.“*Faktor Resiko Kematian Maternal di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014*”. Skripsi.Yogyakarta : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wahyuni, Sri.2013.*Konsep Perawatan Kehamilan Etnis Makassar di Kabupaten Jeneponto*” Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Waryana.2010.“*Gizi Reproduksi*”. Yogyakarta : Pustaka Rihama.
- Wibisono & Dewi.2009.*Solusi Sehat Seputar Kehamilan*”.Jakarta.: Agromedia.
- Widayanti Ari.2012.“*Hubungan Paritas dengan Usia Menopause pada Ibu-ibu dikelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*”. Skripsi.Semarang : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Wiknjosastro H.2006.”*Ilmu Kebidanan Edisi 6*” Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Windaryani Yuyun, Sunarti Dode, & Alfrida Mallo. 2013. *Hubungan Antara Primigravida / Multigravida Dengan Angka Kejadian Preeklamsia / Eklamsia Di RSKDIA Siti Fatimah Makassar*. Volume 1 Nomor 6 Tahun 2013. ISSN : 2302-1721. Pp 1-6
- Yang, Symonds, E. Michael. (2010). *Maternal-Fetal Nutrition during Pregnancy and Lactation*. Cambridge University Press, New York
- Yeyeh, Rukiyah.2010.“*Asuhan Kebidanan 4 (Patologi)*”.Jakarta: CV Trans Info Media.

L

A

M

P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

A

N


**LAMPIRAN 1  
LEMBAR ISIAN**

No.	Nama Ibu	Tekanan Darah (mmHg)	Albuminuria	Paritas (kali)	Riwayat PE*	Jarak Antar Kehamilan (tahun)	Usia	Pendidikan	Pekerjaan

\*PE = Preeklampsia

√ = Ya

X = Tidak



**LAMPIRAN 2  
MASTER TABEL**

No	Nama	TD	Klp TD	Albumin	Klp PE	Paritas	Riwayat PE	Jarham	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	IP	140/90	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	19.0	2.0	1
2	N	180/110	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	1.0	42.0	1.0	1
3	H	140/90	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	3.0	30.0	4.0	1
4	SS	160/100	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	3.0	45.0	1.0	1
5	S	140/90	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	27.0	5.0	1
6	B	170/100	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.0	46.0	1.0	1
7	N	140/90	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	22.0	2.0	1
8	RA	160/100	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.0	42.0	2.0	3
9	RI	140/90	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	19.0	2.0	1
10	S	160/100	1.0	4.0	1.0	4.0	2.0	3.0	43.0	1.0	1
11	R	170/100	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	32.0	2.0	4
12	IR	140/90	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	19.0	3.0	1
13	R	140/90	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	27.0	2.0	3
14	Y	160/100	1.0	3.0	1.0	6.0	1.0	1.0	40.0	3.0	3
15	MM	160/110	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	1.0	38.0	2.0	4
16	RT	160/110	1.0	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0	39.0	2.0	2
17	M	170/100	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	0.0	27.0	3.0	1
18	TB	190/120	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	3.0	43.0	2.0	4
19	SW	160/100	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	3.0	38.0	3.0	1
20	SH	140/100	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	26.0	3.0	1
21	D	180/110	1.0	3.0	1.0	7.0	1.0	2.0	46.0	3.0	1
22	W	160/100	1.0	4.0	1.0	5.0	2.0	7.0	45.0	3.0	1
23	EB	140/90	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	22.0	4.0	1
24	SA	170/80	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	3.0	44.0	1.0	2
25	M	200/150	1.0	4.0	1.0	1.0	2.0	0.0	19.0	3.0	1
26	N	140/90	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	26.0	3.0	1
27	RI	160/100	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	2.0	39.0	3.0	1
28	E	140/90	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	26.0	1.0	1
29	J	140/90	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	19.0	3.0	1
30	RI	170/100	1.0	4.0	1.0	2.0	2.0	4.0	35.0	3.0	1
31	AN	160/110	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	2.0	41.0	1.0	1
32	T	140/90	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	19.0	2.0	1
33	D	140/90	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	28.0	5.0	2
34	T	170/100	1.0	4.0	1.0	5.0	1.0	2.0	44.0	4.0	1
35	MU	160/100	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	29.0	3.0	2
36	DS	140/90	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	27.0	3.0	2
37	AR	170/100	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	2.0	43.0	4.0	1
38	SB	140/90	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	27.0	3.0	2
39	T	160/90	1.0	3.0	1.0	4.0	2.0	2.0	44.0	3.0	3
40	TB	140/90	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	27.0	3.0	3
41	NA	160/100	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	2.0	38.0	3.0	1
42	SY	150/90	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	31.0	4.0	1

43	NH	140/90	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	18.0	3.0	1
44	RE	180/110	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.0	44.0	3.0	1
45	DE	170/100	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	1.0	35.0	2.0	1



Keterangan Master Tabel:

1. No. = Nomor Urut
2. Nama = Nama Inisial
3. Klp\_TD = Pengelompokan Tekanan Darah: 1.0 =  $\geq 160/110$   
2.0 = 140/90 -160/110
4. Albumin = Kadar Albumin
- 5.
6. Klp PE = Kelompok Preeklampsia 1.0 = Preeklampsia Berat  
2.0 = Preeklampsia Ringan
7. Par = Paritas  
= Pengelompokan Paritas 1.0 = 1 kali  
2.0 = 2-3 kali  
3.0 = >3 kali
8. JarHam = Jarak Antar Kehamilan
9. Usia = Usia Ibu Hamil
8. Pend = Pendidikan Terakhir Ibu Hamil:  
1.0 = SD  
2.0 = SMP  
3.0 = SMA  
4.0 = DII/ DIII  
5.0 = DIV/ S1  
6.0 = S2  
7.0 = S3
9. Pekerjaan = Pekerjaan Ibu Hami: 1.0 = Tidak Bekerja  
2.0 = Honorer  
3.0 = Wiraswasta  
4.0 = PNS

**LAMPIRAN III  
OUTPUT SPSS**

**A. Analisis Univariat**

**Statistics**

		kelompok td	Kadar Albumin
N	Valid	45	45
	Missing	0	0

**Kadar Albumin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	24.4	24.4	24.4
	2	8	17.8	17.8	42.2
	3	13	28.9	28.9	71.1
	4	13	28.9	28.9	100.0
Total		45	100.0	100.0	

**Preeklampsia Berat dan Ringan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat	26	57.8	57.8	57.8
	Ringan	19	42.2	42.2	100.0
Total		45	100.0	100.0	



## B. Distribusi Fekuensi

Statistics

		Paritas	Riwayat_pe	Jarak Hamil
N	Valid	45	45	45
	Missing	0	0	0

1. Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	17.8	17.8	17.8
	2	18	40.0	40.0	57.8
	3	19	42.2	42.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

2. Riwayat\_pe

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	21	46.7	46.7	46.7
	tidak	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

3. Jarak Hamil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2 tahun	22	48.9	48.9	48.9

2-5 tahun	8	17.8	17.8	66.7
6-10 tahun	13	28.9	28.9	95.6
>10 tahun	2	4.4	4.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

#### 4. Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <20 tahun	7	15.6	15.6	15.6
20-35 tahun	18	40.0	40.0	55.6
>35 tahun	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

#### 5. Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	7	15.6	15.6	15.6
SMP	11	24.4	24.4	40.0
SMA	20	44.4	44.4	84.4
DII/DIII	5	11.1	11.1	95.6
DIV/S1	2	4.4	4.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

#### 6. Kode\_Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Bekerja	31	68.9	68.9	68.9
Honorer	4	8.9	8.9	77.8
Wiraswasta	7	15.6	15.6	93.3

PNS	3	6.7	6.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

### C. Analisis Bivariat

#### Paritas \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
kelompok paritas	beresiko	Count	24	4	28
		% within kelompok paritas	85.7%	14.3%	100.0%
		% within v2_klp_td	92.3%	21.1%	62.2%
	rendah	Count	2	15	17
		% within kelompok paritas	11.8%	88.2%	100.0%
		% within v2_klp_td	7.7%	78.9%	37.8%
Total	Count	26	19	45	
	% within kelompok paritas	57.8%	42.2%	100.0%	
	% within v2_klp_td	100.0%	100.0%	100.0%	

### Block 1: Method = Enter

#### Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	26.008	1	.000
	Block	26.008	1	.000
	Model	26.008	1	.000

## Riwayat Preeklampsia \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
klp_rpe	resiko	Count	15	6	21
		% within klp_rpe	71.4%	28.6%	100.0%
		% within v2_klp_td	57.7%	31.6%	46.7%
	rendah	Count	11	13	24
		% within klp_rpe	45.8%	54.2%	100.0%
		% within v2_klp_td	42.3%	68.4%	53.3%
Total	Count	26	19	45	
	% within klp_rpe	57.8%	42.2%	100.0%	
	% within v2_klp_td	100.0%	100.0%	100.0%	

### Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	3.058	1	.080
	Block	3.058	1	.080
	Model	3.058	1	.080

## Jarak Antar Kehamilan \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
klp_jarham	beresiko	Count	14	11	25
		% within klp_jarham	56.0%	44.0%	100.0%
		% within v2_klp_td	53.8%	57.9%	55.6%
	rendah	Count	12	8	20
		% within klp_jarham	60.0%	40.0%	100.0%
		% within v2_klp_td	46.2%	42.1%	44.4%
Total	Count	26	19	45	
	% within klp_jarham	57.8%	42.2%	100.0%	
	% within v2_klp_td	100.0%	100.0%	100.0%	

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	.073	1	.787
	Block	.073	1	.787
	Model	.073	1	.787

## Usia \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
kelompok usia	beresiko	Count	23	4	27
		% within kelompok usia	85.2%	14.8%	100.0%
		% within v2_klp_td	88.5%	21.1%	60.0%
	rendah	Count	3	15	18
		% within kelompok usia	16.7%	83.3%	100.0%
		% within v2_klp_td	11.5%	78.9%	40.0%
Total	Count	26	19	45	
	% within kelompok usia	57.8%	42.2%	100.0%	
	% within v2_klp_td	100.0%	100.0%	100.0%	

**Block 1: Method = Enter**

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	22.418	1	.000
	Block	22.418	1	.000
	Model	22.418	1	.000

## Pendidikan \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
kelompok pendidikan	beresiko	Count	25	14	39
		% within kelompok pendidikan	64.1%	35.9%	100.0%
		% within v2_klp_td	96.2%	73.7%	86.7%
	rendah	Count	1	5	6
		% within kelompok pendidikan	16.7%	83.3%	100.0%
		% within v2_klp_td	3.8%	26.3%	13.3%
Total	Count	26	19	45	
	% within kelompok pendidikan	57.8%	42.2%	100.0%	
	% within v2_klp_td	100.0%	100.0%	100.0%	

**Block 1: Method = Enter**

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	4.963	1	.026
	Block	4.963	1	.026
	Model	4.963	1	.026

## Pekerjaan \* Kelompok Preeklampsia

Crosstab

			v2_klp_td		Total
			beresiko	rendah	
klp_pekerjaan	beresiko	Count	6	8	14
		% within klp_pekerjaan	42.9%	57.1%	100.0%
		% within v2_klp_td	23.1%	42.1%	31.1%
	rendah	Count	20	11	31
		% within klp_pekerjaan	64.5%	35.5%	100.0%
		% within v2_klp_td	76.9%	57.9%	68.9%
Total	Count	26	19	45	
	% within klp_pekerjaan	57.8%	42.2%	100.0%	

### Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1.844	1	.174
	Block	1.844	1	.174
	Model	1.844	1	.174

### D. Analisis Multivariat

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	klp_paritas	3.801	1.865	4.154	1	.042	44.763	1.157	1732.218
	klp_rpe	1.025	1.154	.789	1	.375	2.786	.290	26.748
	klp_usia	-.255	1.937	.017	1	.895	.775	.017	34.559
	klp_pendidikan	2.881	1.834	2.467	1	.116	17.827	.490	648.782
	klp_pekerjaan	-	1.118	1.609	1	.205	.242	.027	2.167



Constant	-	3.044	6.411	1	.011	.000		
	7.706							

a. Variable(s) entered on step 1: klp\_paritas, klp\_rpe, klp\_usia, klp\_pendidikan, klp\_pekerjaan.



**LAMPIRAN IV**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**





**LAMPIRAN V**  
**SURAT IZIN PENELITIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 868720 (fax 864923) Makassar  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. 1500363 (0411)841079 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-217/FKIK/PP.00.9/07/ 2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 11 Juli 2018

Kepada Yth,  
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel

di-  
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Nur Faizal Darmadi  
NIM : 70300114028  
Program Studi : Keperawatan  
Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang berhubungan Terhadap Kejadian Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  
Tempat Penelitian : Puskesmas Bontoramba Kab. Jeneponto.  
Dosen Pembimbing : 1. Hasna, S.Sit., S.kep., Ns., M.Kes  
2. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes

untuk melakukan penelitian.  
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Wassalam  
An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Dr. Nur Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.  
NIP. 198104032006042003



Terselamatkan:  
1. Masing-masing Pembimbing  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2911/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Jeneponto

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor  
: B-2212/FKIK/PP.00.9/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : M. NUR FAIZAL DARMADI  
Nomor Pokok : 70300114028  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan  
judul :

" FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Juli s/d 23 Agustus 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan  
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 17 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 17-07-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpm.d.sulselprov.go.id> Email : [p2l\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2l_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222







**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-2410044 Jeneponto

Nomor : 0167/IFT/DFMPTSP/IP/VII/2018  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 20 Juli 2018  
Kepada :  
Yth. Kepala Puskesmas Bontoramba  
Di,  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. Surat 2911/S.01/PTSP/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : M. NUR FAIZAL DARMADI  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nomor Pokok : 70300114028  
Program Studi : Ilmu Keperawatan  
Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Juata Permai Tarakan

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**"FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMIA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO"**

yang berlangsung tanggal 23 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip



Rp. 0,00

KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Hi. HERNAWATI, S.P., M. Si  
Pangkat : Pembina - IV/a  
NIP : 19771231 200212 2 015

**LAMPIRAN VI**  
**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BONTORAMBA**



*(L. Maham raja-raja bonamu kel Bontoramba Kec Bontoramba)*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NO : 199/PKM-BTR/TU/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRIDA,S.ST.SKM  
Nip : 19660117 198803 2 008  
Pangkat/Gol : Penata Tk.III/d  
Jabatan : Kepala Puskesmas Bontoramba Kec.Bontoramba  
Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : M. NUR FAIZAL DARMADI  
Nim : 70300114028  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Bontoramba Kec.Bontoramba, Kab.Jeneponto selama (6) Enam Hari terhitung mulai tanggal 23 Juli s/d 28 Juli 2018. Dengan Judul " **FAKTOR-FAKTOR YANG BEBHUBUNGAN TERHADAP KEJADIAN PREKLAMSLIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bontoramba, 30 Juli 2018

Kepala Puskesmas Bontoramba

  
FRIDA,S.ST.SKM  
NIP. 9660117 198803 2 008



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**M. Nur Faizal Darmadi**, yang akrab dipanggil Faizal ini merupakan anak pertama dari empat bersaudara, buah hati pasangan Darmadi, ST dan Juhaema, ST. Lahir di Bulukumba pada 24 September 1996. Penulis bertempat tinggal di perumahan Nusa Indah Blok D3 No. 39 Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Memulai pendidikan di TK Aisyah Bulukumba dan melanjutkan pendidikan di SDS Yaditra Tarakan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Tarakan. 3 tahun kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tarakan. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan .

Adapun pengalaman organisasi yang pernah ditempati mengabdikan oleh penulis antara lain

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ilmu Kesehatan Cabang Gowa raya
- Wakil Ketua II HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2015/2016
- Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2015/2016
- Ketua Ikatan Mahasiswa Perawat Indonesia Komisariat UIN Alauddin Makassar 2016
- Sekretaris Wilayah VI Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia (ILMIKI) periode 2018-2020
- UKM KSR PMI-Unit 107 UIN Alauddin Makassar
- Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin (MAPALASTA Makassar)