

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *POST NATAL CARE*
KEPADA NY“R” DENGAN *POST SECTIO CAESSAREA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH:

RAEIDA NOVIANTI

70400114071

**DIPLOMA KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care pada Ny”R” dengan *Post Sectio Caessaria*” di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa 2018

Terselesaikannya Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan

4. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan penuh keikhlasan
5. Ibu dr. Hj.Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr.Darmawansyih., M.kes selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak DR. Dudung Abdullah, M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberi do'a dan dukungan kepada saya, ayahanda Allo dan ibunda Hj. Harliah., S.Pd
11. Kak Dian Astriani., S.Fam selaku pembimbing Murabbiah dalam Tarbiyah mingguan yang selalu sabar dan ikhlas mengajarkan dan membagi ilmunya tentang

ajaran-ajaran islam. Dan teman-teman tarbiyah yang saling mengingatkan satu sama lain untuk menuju kebaikan

12. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014. Dan terlebih khusus kepada Nur Asia K, Rosmanengsi, Raras Puspa Dewi

13. Terima kasih untuk sepupu saya Adriani yang selalu memberikan motivasi

Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih. “Berpikir Positif Akan Menghasilkan Semangat yang Luar Biasa” kalimat-kalimat itulah yang selalu menjadikan inspirasi bagi penulis auntuk menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..Amin..Amin Yarobbal Alamin

Samata , September 2018

Penulis

Rafida Novianti


704001140071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup.....	4
C. Tujuan penulisan.....	4
D. Manfaat penulisan.....	5
E. Metode penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang masa nifas	
1. Pengertian masa nifas.....	9
2. Tahapan masa nifas.....	10
3. Perubahan masa nifas.....	11
4. Tujuan Asuhan masa nifas.....	15
5. Proses adaptasi psikologis pada masa nifas.....	17
6. Kebutuhan dasar ibu pada masa nifas.....	20

7. Tindakan post <i>operasi sectio caessaria</i>	26
8. Nutrisi masa nifas.....	27
9. Ambulansi dini.....	27
B. Konsep dasar <i>Sectio Caessaria</i>	
1. Pengertian <i>sectio caessaria</i>	29
2. Macam-macam <i>sectio caessaria</i>	30
3. Indikasi <i>sectio caessaria</i>	30
4. Komplikasi <i>sectio caessaria</i>	31
5. Penatalaksanaan	33
6. Perawatan pasca operasi.....	33
C. Tinjauan islam terhadap nifas dan <i>sectio caessaria</i>	34
D. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP).....	44
BAB III STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	46
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 07 September 2018.....	63
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 08 September 2018.....	70
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 09 September 2018.....	74
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 10 September 2018.....	78
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 15 September 2018.....	82
G. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 22 September 2018.....	89
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan kebidanan tanggal 19 Oktober 2018.....	94

I. Lembar Follow Up.....	96-103
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I: Pengumpulan data dasar.....	104
B. Langkah II: Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	105
C. Langkah III: Identifikasi diagnosa /masalah potensial.....	106
D. Langkah IV : Tindakan emergency dan kolaborasi.....	107
E. Langkah V : Intervensi.....	107
F. Langkah VI: Implementasi.....	108
G. Langkah VII : Evaluasi.....	109
H. Dokumentasi	110
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	



HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rafida Novianti

Nim : 70400114071

Tempat ,Tanggal Lahir : Sinjai, 02 November 1994

Jurusan / Prodi : Kebidanan D3

Fakultas / Progrm : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Diploma

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care pada
"R" dengan *post sectio caessaria* di RSUD Syekh Yusuf
Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau sepenuhnya, maka Karya Tulis Ini Ilmiah dan gelar diperoleh batal demi hukum

Samata-Gowa, Desember 2018

Penyusun

Rafida novianti

70400114071

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care pada Ny “R” Dengan Post Sectio Caesaria di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 07 September–10 September 2018**”. Yang disusun oleh **Rafida Novianti NIM : 70400114071**, Mahasiswi jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu 14 November 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan)

Samata, 15 September 2018
06 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)
Sekretaris : **Firdayanti, S.Si.T., M.Keb** (.....)
Pembimbing I : **Dr.Hj.Sitti Saleha,S.Si.T.,SKM.,M.Keb** (.....)
Pembimbing II : **dr.Hj.Dewi Setiawati,Sp.OG.,,M.Kes** (.....)
Penguji I : **dr. Darmawansyih, M.Kes** (.....)
Penguji II : **Dr.Dudung Abdullah,M.Ag** (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP : 19550203 198312 1 001

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, SEPTEMBER 2018

Rafida Novianti, 70400114071

Supervisor I: Sitti Saleha

Supervisor II: Dewi Setiawati

“The Postnatal Obstetric Care Management on Mrs.”R” with Post Sectio Caessaria at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018

The healing process of postpartum mothers with Sectio Caessaria surgery can be much longer than the normal labor. The wound healing time of surgery is usually three to six weeks, even more. However, when there is an infection at the surgery wound, it will extend the time of surgical wound healing. The postpartum with Sectio Caessaria delivery has a high risk for complications such as bleeding and infection.

The scientific paper is aimed at implementing the Postnatal Obstetric Care Management on Mrs. "R" with Post Sectio Caessaria at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 according to 7 steps of Varney and SOAP.

The results of a case study conducted on Mrs. "R" with Post Sectio Cessaria, no hindrances were found during the care provided. The monitoring was carried out 7 times for 6 weeks. Surgical wound pain occurred from the first to the fourth day, at six weeks postpartum there were no signs of infection and able to perform daily activities.

The conclusion of the case study was 7 steps of Varney and SOAP implemented on the obstetric problem solving process had been analyzed in the case of Mrs. "R" with Post Sectio Cessaria at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 and documentation of all the findings and actions was conducted on Mrs. "R" with the results of no gap and no infection in the surgical wound.

Keywords : Postpartum Period, Post Sectio caessaria, 7 steps of Varney

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, SEPTEMBER 2018

Rafida Novianti, 70400114071

Pembimbing I: Dr.Hj. Sitti Saleha,S.SiT.,SKM., M.Keb

Pembimbing II: dr.Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes

“Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ny”R” dengan Post Sectio Caessaria di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

Proses penyembuhan ibu nifas dengan Operasi *Sectio Cassaria* bisa jauh lebih lama dibandingkan proses persalinan normal. Biasanya waktu penyembuhan luka operasi tiga sampai enam minggu, bahkan lebih. Namun jika terjadi infeksi pada luka operasi, itu akan memperpanjang waktu penyembuhan luka operasi. Nifas dengan persalinan *sectio caessaria* mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya komplikasi yaitu perdarahan dan infeksi

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Care pada Ny”R” dengan *Post Sectio Caessaria* di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018 sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil Studi kasus yang dilakukan pada Ny”R” dengan *Post Sectio Cessaria*, tidak di temukan hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan yang dilakukan sebanyak 7 kali selama 6 minggu. Kunjungan rumah pada enam minggu masa nifas tidak terdapat tanda-tanda infeksi dan ibu juga sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Kesimpulan studi kasus yaitu 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus Ny”R” dengan *Post Sectio Cessaria* di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny”R” dengan hasil tidak ditemukannya kensenjangan dan tidak terjadi infeksi pada luka bekas operasi.

Kata Kunci : Masa Nifas, *Post Sectio caessaria*, 7 langkah Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, angka kematian Ibu di Indonesia masih yaitu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan SDKI tahun 2012, yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Diseluruh dunia setiap menit banyak perempuan meninggal karena komplikasi terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Dengan kata lain 1.400 meninggal setiap hari atau lebih dari 500.000 perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan, persalinan dan nifas. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa persalinan dengan bedah *sectio caessarea* sekitar 10-15% dari semua proses persalinan di negara-negara berkembang, peningkatan persalinan *sectio caessarea* di indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dari 5% menjadi 20% dan tercatat dari 35,7%-55,3% ibu melahirkan dengan *sectio caessaria* (Utami,2015:1)

Sectio Caessaria adalah melahirkan janin melalui irisan pada dinding perut dan dinding uterus. Ada beberapa penyebab yang sudah terjadi dan harus *sectio caessarea*

yaitu partus lama, panggul sempit, dan janin terlalu besar, sehingga jalan satu-satunya adalah *caessaria* (Nurjannah,dkk,2013:113). Persalinan dan kelahiran merupakan focus dan klimaks proses reproduksi, persalinan dan kelahiran merupakan tantangan fisik dan emosional bagi ibu. Terdapat hubungan antara "power" uterus (kontraksi). "Passage" jalan lahir (tulang panggul dan jaringan lunak pada dasar panggul dan perineum) dan "passanger" (janin) (Holmes,dkk,2012). Banyak orang beranggapan bahwa melakukan persalinan melalui operasi *sectio caessarea* memang lebih cepat dan tidak begitu sakit dibandingkan dengan melahirkan secara normal. Tetapi proses penyembuhan operasi *caesar* bisa lebih lama dibandingkan proses persalinan normal. Biasanya waktu penyembuhan operasi bisa menimbulkan infeksi yang akan memperpanjang waktu penyembuhan luka bekas operasi (maryati, 2015:1)

Walaupun menderita nyeri dan tidak nyaman, kelahiran bayi biasanya merupakan peristiwa yang menyenangkan karena masa kehamilan berakhir dan suatu kehidupan baru akan segera dimulai. Akan tetapi, kelahiran bayi juga merupakan masa yang kritis bagi kesehatan ibu, kemungkinan timbul masalah atau penyulit, yang bila tidak ditangani segera dengan efektif dapat membahayakan kesehatan atau mendatangkan kematian bagi ibu. Lebih dari separuh kematian ibu terjadi dalam masa nifas sehingga masa nifas ini sangat penting untuk dipantau oleh bidan

(Roito dkk,2013:1). Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara

perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi. (Dewi,2012:11)

Sebagian ibu merasa yakin memilih metode bedah sesar, sebagian juga dengan susah payah meyakinkan untuk menjalani bedah sesar, sedangkan sebagian lagi tiba – tiba saja disodorkan gagasan untuk menjalani bedah sesar tanpa diberi banyak kesempatan membuat pilihan (*informed choice*). Bedah sesar dapat menyelamatkan hidup ibu dan bayi, seringkali metode ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Chapman dan Charles,2013:173). Pada beberapa keadaan, tindakan Seksio Sesarea ini bisa direncanakan atau diputuskan jauh-jauh sebelumnya. Operasi ini disebut operasi sesarea elektif. Kondisi ini dilakukan apabila dokter menemukan ada masalah kesehatan pada ibu atau menderita suatu penyakit, sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal (Purwoastuti, Dkk, 2015).

Peran bidan pada pasien post operasi *sectio caesarea* diarahkan untuk mengembalikan fungsi fisiologis pada seluruh sistem secara normal, dapat beristirahat dan memperoleh rasa nyaman,meningkatkan konsep diri,serta tidak terjadi infeksi pada luka post operasi salah satu upaya untuk mencegah timbulnya komplikasi dan mengembalikan fungsi fisiologis tubuh dapat dilakukan dengan mobilisasi dini sesuai dengan kewenangan bidan MENKES RI no 938/Menkes/SK/VIII/2007 yang tercantum dalam kompetensi ke tiga dan ke empat (Maryati,2015:4)

Berdasarkan data yang diambil dari catatan rekam medik di RSUD Syekh Yusuf tahun 2012 tercatat 266 ibu bersalin dengan *sectio caessarea*, tahun 2013 tercatat 359 ibu bersalin dengan *sectio caessarea*, pada tahun 2014 tercatat 353 ibu bersalin dengan *sectio caessarea*, tahun 2015 tercatat 308 ibu bersalin *sectio caessarea*, pada tahun 2016 tercatat 250 ibu bersalin dengan *sectio caessarea*, pada tahun 2017 tercatat 443 ibu bersalin dengan *sectio caessarea*.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan post natal pada Ny “R” dengan *post sectio caesarea* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi : Manajemen Asuhan Kebidanan post natal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan postnatal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis data ibu postnatal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018
- b. Dapat merumuskan diagnosa/masalah aktual pada ibu post natal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018
- c. Dapat merumuskan diagnosa/masalah potensial pada ibu postnatal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018
- d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu post natal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018
- e. Dapat menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu postnatal pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan yang disusun pada Ibu post natalpada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018
- g. Dapat mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu postnatal care pada Ny “R” dengan *post sectio caesaria* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018

D. *Manfaat Penulisan*

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah :

1. Manfaat Praktis

Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program Postnatal Care.

2. Manfaat Institusi

Untuk menambah bahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan pada ibu post natal care khususnya dengan *post sectio caessarea*.

3. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang ibu post natal dengan *post sectio caessarea*.

E. Metode Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan post natal care khususnya dengan *post sectio caessarea*.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen Asuhan kebidanan oleh Helen Verney, dengan 7 langkah yang meliputi : Identifikasi Data Dasar, Identifikasi Diagnosa /masalah Aktual, Identifikasi diagnosa/masalah Potensial, Tindakan emergency/kolaborasi, rencana Asuhan/intervensi, Implementasi dan evaluasi Hasil Asuhan kebidanan yang diberikan.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu studi yang mempelajari status klien baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ini.

5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang nifas meliputi: pengertian masa nifas, tahapan masa nifas, perubahan masa nifas, tujuan asuhan masa nifas, peran bidan pada masa nifas, kebijakan program pada masa nifas. Tinjauan umum tentang sectio caessarea yang terdiri dari pengertian sectio cassarea, macam-macam operasi cassarea, indikasi operasi caessarea, komplikasi operasi caessara serta tinjauan umum tentang sectio caessarea dalam pandangan islam, dan proses manajemen kebidanan meliputi Pengertian Manajemen kebidanan, Tahapan, Manajemen kebidanan, Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Bab III metodologi penelitian dalam bab ini berisikan tentang jenis kasus, lokasi studi kasus, subyek studi kasus, waktu studi kasus, waktu studi kasus, dan instrumen studi kasus, serta tehnik pengumpulan data dan alat-alat yang dibutuhkan.

Bab IV tinjauan kasus dan pembahasan dalam bab ini terdiri dari tinjauan kasus dan pembahasan. Tinjauan kasus berisi tentang pengkajian, interpretasi data, diagnosa potensial, tindakan segera, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi serta data perkembangan dengan SOAP. Pembahasan berisi tentang kesenjangan studin kasus antara nyata dan teori yang diambil pada bab IV dan dasar teori yang diambil pada bab II mulai pengkajian sampai dengan evaluasi.

Bab V penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti pembahasan Asuhan Kebidanan pada ibu nifas post sectio caessarea. Saran merupakan alternatif pemecahan masalah dan tanggapan. Kesimpulan yang

berupa kensenjangan pemecahan masalah hendaknya bersifat realistis dan operasional yang artinya saran itupun dapat dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa nifas

Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi tersebut ini disebut involusi (Maritalia, 2012).

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Roito dkk,2013:1). Masa nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu (Nugroho dkk,2014)

Masa nifas atau masa puerperium adalah periode 6 minggu setelah kelahiran bayi ketika perubahan fisiologis yang sangat besar terjadi karena tubuh ibu kembali kekeadaan sebelum hamil. Puerperium ini adalah waktu ketika ibu mempelajari cara merawat bayinya dan mulai beradaptasi dengan peran sebagai ibu (Holmes dkk,2012:281)

Nifas menurut bahasa berarti melahirkan. Adapun menurut istilah syara' nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan (Hamdani,2012:137)

2. Tahapan masa nifas

Menurut Nurjannah,dkk,2013 ,Masa nifas dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

a. Puerperium dini

Merupakan masa pemulihan awal dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan pervagina tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan untuk mobilisasi segera.

b. Puerperium intermedial

Suatu masa pemulihan dimana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih enam minggu atau 42 hari.

c. Remote puerperium

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu remote puerperium berbeda untuk setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil atau persalinan.

3. Perubahan masa nifas

a. Uterus

Uterus merupakan organ reproduksi interna yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gepeng yang berukuran sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7-8 cm, lebar sekitar 5-5,5 cm dan tebal sekitar 2,5 cm. Letak uterus secara fisiologis adalah anteversiofleksio. Uterus terdiri dari 3 bagian yaitu : fundus uteri, korpus uteri, dan serviks uteri.

b. Serviks

Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga di sebut juga sebagai leher rahim. Serviks mnghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dan uterus menuju saluran vagina pada saat persalinan.

c. Vagina

Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar. Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain dengan ukuran panjang kurang lebih 6,5 cm dan kurang lebih 9 cm. Bentuk vagina sebelah dalam Berlipat-lipat dan disebut rugae. Lipatan –lipatan ini memungkinkan vagina melebar pada saat persalinan dan sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir. Sesuai dengan fungsinya sebagai bagian lunak jalan lahir dan merupakan saluran yang menghubungkan cavum uteri dengan tubuh bagian luar, vagina juga berfungsi

sebagai saluran tempat dikeluarkannya sekret yang berasal dari cavum uteri selama nifas yang disebut lochea. Secara fisiologis, lochea dikeluarkan dari cavum uteri akan berbeda karakteristiknya dari hari ke hari. Hal ini disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada dinding uterus akibat penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron seperti yang diuraikan sebelumnya (Maritalia,2012:19)

Karakteristik lochea dalam masa nifas adalah sebagai berikut:

1) Lochea rubra/kruenta

Timbul pada hari 1-2 post partum, terdiri dari darah segar bercampur sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, sisa-sisa verniks kaseosa, lanugo dan mekonium.

2) Lochea sanguinolenta

Timbul pada hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 post partum, karakteristik lochea sanguinolenta berupa darah bercampur lendir.

3) Lochea serosa

Merupakan cairan berwarna agak kuning, timbul setelah 1 minggu postpartum.

4) Lochea alba

Timbul setelah 2 minggu post partum dan hanya merupakan cairan berwarna putih.

d. Vulva

Vulva merupakan organ reproduksi eksterna, berbentuk lonjong, bagian depan dibatasi oleh clitoris, bagian belakang oleh perineum, bagian kiri dan kanan oleh labia minora. Pada vulva, dibawah clitoris, terdapat orifisium uretra eksterna yang berfungsi

sebagai tempat keluarnya urin. Sama halnya dengan vagina, vulva juga mengalami penekanan serta mengalami peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi

e. Payudara (Mammae)

Selama sembilan bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi untuk menghambatnya kelenjar pituitari akan mengeluarkan prolaktin. Sampai hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai dirasakan pembuluh darah payudara menjadi bengkak terisi darah, sehingga timbul rasa hangat, bengkak dan rasa sakit (Saleha,2009:58)

Payudara atau mammae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, diatas otot dada. Secara makroskopis, struktur payudara terdiri dari korpus (badan), areola dan papilla atau puting . fungsi dari payudara adalah memproduksi susu (Air Susu Ibu) sebagai nutrisi bagi bayi (Maritalia,2012:21)

f. Tanda-tanda vital

Tanda-tanda vital merupakan tanda penting pada tubuh yang dapat berubah bila tubuh mendapat gangguan atau masalah. Tanda-tanda vital yang dapat berubah selama masa nifas adalah :

1) Suhu tubuh

Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat sekitar $0,5^{\circ}\text{C}$ dari keadaan normal ($36^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$), namun tidak lebih dari 38°C . Hal ini

disebabkan meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan. Setelah 12 jam suhu tubuh yang meningkat tadi akan kembali seperti keadaan semula.. bila suhu tubuh tidak kembali ke keadaan normal atau semakin meningkat, maka perlu dicurigai terhadap kemungkinan terjadi infeksi.

2) Nadi

Pada saat proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan. Setelah proses persalinan selesai frekwensi denyut nadi dapat sedikit lebih lambat. Pada masa nifas biasanya denyut nadi akan kembali normal.

3) Tekanan darah

Setelah partus tekanan darah dapat sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya perdarahan pada proses persalinan.

4) Pernapasan

Frekwensi pernapasan normal berkisar antara 18-24 kali per menit. Pada saat partus frekwensi pernapasan akan meningkat karna kebutuhan oksigen yang lebih tinggi untuk tenaga ibu meneran/ mengejan dan mempertahankan agar persediaan oksigen ke janinin tetap terpenuhi. Setelah partus frekwensi pernapasan akan kembali normal (Maritalia,2012:25)

g. Hormon

Selama kehamilan terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesterone. Hormon tersebut berfungsi untuk mempertahankan agar dinding uterus tetap tumbuh dan berpoliferasi sebagai media tempat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi

(maritalia,2012). Setelah persalinan terjadi penurunan kadar estrogen sehingga aktivitas prolaktin yang juga sedang meningkat dapat mempengaruhi kelenjar mammae dalam menghasilkan ASI (Utami,2015)

h. Sistem pencernaan

Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi (sectio caesaria) biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Ibu yang melahirkan secara spontan, biasanya lebih cepat lapar karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada saat proses melahirkan (Maritalia,2012:27)

4. Tujuan asuhan masa nifas

Asuhan masa nifas bertujuan menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikis, melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayi, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian munisasi, perawatan bayi agar tetap sehat, memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) (Roito,2013:1).

Pada masa nifas ini terjadi perubahan-perubahan fisik maupun psikis berupa organ reproduksi, terjadinya proses laktasi, terbentuknya hubungan antara orang tua dan bayi dengan memberikan dukungan. Atas dasar tersebut perlu dilakukan suatu pendekatan antara ibu dan keluarga dalam manajemen kebidanan (Marmi,2012:11)

Menurut Hardiana 2016 ,Tujuan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui adalah :

Asuhan masa nifas haruslah diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis bagi ibu maupun bagi bayinya. Diperkirakan 60% kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan yang terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. selama bidan memberikan asuhan sebaiknya bidan mengetahui apa tujuan dari pemberian asuhan paada masa nifas, adapun tujuan dari pemberian asuhan masa nifas antara lain:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa nifas ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologis maka kesehatan ibu dab bayi selalu terjaga.
- b. Melaksanakan skrinning yang komprehensif (menyeluruh) dimana bidan harus memberikan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis yaitu mulai pengkajian data subjektif, objektif maupun penunjang.
- c. Setelah bidan melaksanakan pengkajian data maka bidan harus menganalisis data tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas ini dapat mendeteksi masalah yang dapat terjadi pada ibu dan bayi.
- d. Mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yakni setelah masalah ditemukan maka bidan dapat langsung masuk kelangkah berikutnya sehingga tujuan diatas dapat dilakukan.

- e. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari.

5. Proses Adaptasi Psikologis Pada Masa Nifas

Perubahan psikologi sebenarnya sudah terjadi pada saat kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang dan cemas bercampur menjadi satu. Perasaan senang timbul karena akan berubah peran menjadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayi yang telah lama dinanti-nantikan. Timbulnya perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkannya, apakah bayi akan dilahirkan dengan sempurna atau tidak.

Hal ini dipengaruhi oleh polah asuh dalam keluarga dimana wanita tersebut dibesarkan, lingkungan, adat istiadat setempat, suku, bangsa, pendidikan serta pengalaman yang didapat (Dewi Maritalia, 2012).

a. Adaptasi psikologis ibu dalam Masa nifas

Pada primipara, menjadi orang tua merupakan pengalaman tersendiri dan dapat menimbulkan stress apabila tidak ditangani dengan segera. Perubahan peran dari wanita biasa menjadi seorang ibu memerlukan adaptasi sehingga ibu dapat melakukan perannya dengan baik.

Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa Nifas antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Fase Taking in. Merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Pada fase ini, kebutuhan istirahat, asupan nutrisi dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ibu dapat mengalami gangguan psikologi berupa : kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya dan kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya.
- 2) Fase Taking Hold. Merupakan fase yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya dan ibu sensitif dan lebih mudah tersinggung. Sebagai bidan disini harus memberikan asuhan penuh terhadap kebutuhan ibu tentang cara perawatan bayi, cara menyusui yang baik dan benar, cara perawatan bekas luka sesar, mobilisasi, senam nifas, nutrisi, istirahat, kebersihan diri dan lain-lain.
- 3) Fase Letting Go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya.

b. *Postpartum blues* atau *Baby blues*

Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut dengan *Baby blues*, yang disebabkan oleh perubahan perasaan

yang dialami ibu saat hamil, sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan (Reni Heryani, 2012:50-51).

Hal yang dapat dilakukan seorang bidan, yaitu:

- 1) Menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin.
- 2) Memberikan penjelasan yang diberikan pada ibu, suami dan keluarga bahwa hal ini merupakan suatu hal yang umum dan akan hilang sendiri dalam dua minggu setelah melahirkan.
- 3) Simpati, memberikan bantuan dalam merawat bayidan dorongan pada ibu agar tumbuh rasa percaya diri.
- 4) Memberikan bantuan dalam merawat bayi.
- 5) Menganjurkan agar beristirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi

(Reni Heryani, 2012)

c. *Kemurungan masa nifas*

Kemurungan Masa Nifas disebabkan perubahan dalam tubuh selama kehamilan, persalinan dan nifas. Kemurungan dalam masa nifas merupakan hal yang umum, perasaan-perasaan demikian akan hilang dalam dua minggu setelah melahirkan. Tanda dan gejala kemurungan masa nifas antarlain: emosional, cemas, hilang semangat, mudahn marah, sedih tanpa sebab, sering menangis.

Penatalaksanaan: bicarakan apa yang dialami ibu, temani ibu, berikan kesempatan ibu untuk bertanya, berikan dorongan ibu untuk merawat bayinya, biarkan ibu bersama dengan bayinya, gunakan obat bila perlu (Reni Heryani, 2012)

6. Kebutuhan Dasar Ibu Pada masa Nifas

Dalam Masa Nifas, alat-alat reproduksi khususnya pasca operasi belum bisa berangsur pulih di bandingkan dengan ibu nifas yang melahirkan normal. Untuk membantu proses penyembuhan maka di perlukan beberapa kebutuhan dasar ibu pada Masa Nifas, yaitu diantaranya:

- a. Kebutuhan Nutrisi. Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada Masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat sekitar 25%, karena berguna untuk proses kesembuhan karena sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi semua itu akan meningkatkan tiga kali dari kebutuhan bias (Walyani, dkk., 2015:103).

Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut:

- 1) Mengkinsumsi tambahann 500 kalori tiap hari.
- 2) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral.
- 3) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari
- 4) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pasca persalinan.s

5) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melai ASI (Hardiana,2016:25)

b. Cairan

Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sedikitnya 3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air outih, sari buah, susu dan sup (Reni Heryani, 2012).

Kegunaan cairan bagi tubuh menyangkut beberapa fungsi berikut:

1. Fungsi system perkemihan.
2. Keseimbangan dan keselarasan berbagai proses did lam tubuh.
3. Sistem Urinarius (Walyani, dkk, 2015:108-110).

c. Mobilisasi dini (early mobilization)

Pada pasien Post Seksio Sesarea (SC) biasanya mulai ambulasi 24-36 jam sesudah melahirkan, jika pasien menjalani analgesia epidural pemulihan sensibilitas yang total harus dibuktikan dahulu sebelum ambulasi dimulai (Hardiana,2016:25)

Adapun manfaat mobilisasi dini pada ibu Post Seksio Sesarea (SC), yaitu:

- 1) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan ambulasi dini dengan bergerak, otot-otot dan panggul akan kembali normal sehingga otot perutnya menjadi kuat kambali dan dapat mengurangi rasa sakit. Dengan demikian ibu merasa sehat dan membantu memperoleh kekuatan, mempercepat kesembuhan serta membantu mempercepat organ-organ tubuh bekerja eperti semula (Hardiana,2016:25)

2) Mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli dengan mobilisasi sirkulasi darah normal/lancar sehingga resiko terjadinya trombosis dan tromboemboli dapat dihindari (Hardiana,2016:25)

Tahap-tahap mobilisasi dini pada pasien Post Seksio Sesarea (SC), yaitu:

- 1) Pada hari pertama dapat dilakukan miring ke kanan dan ke kiri yang dapat dimulai sejak 6-10 jam setelah ibu sadar. Latihan pernapasan dapat dilakukan ibu sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar.
- 2) Hari kedua, ibu dapat duduk dan dianjurkan untuk bernapas dalam-dalam lalu menghembuskannya disertai batuk-batuk kecil yang gunanya untuk melonggarkan pernapasan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada diri ibu bahwa ia mulai pulih, kemudian posisi tidur terlentang diubah menjadi setengah duduk.
- 3) Selanjutnya secara berturut-turut, hari demi hari ibu yang sudah melahirkan dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan kemudian berjalan sendiri pada hari ke-3 sampai 5 hari setelah operasi (Hardiana,2016:26)

d. Kebutuhan Eliminasi

- 1) Buang Air Kecil (BAK). Pada persalihan normal masalah berkemih dan buang air besar tidak mengalami hambatan apapun. Kebanyakan pasien dapat melakukan BAK secara spontan dalam 8 jam setelah melahirkan (Elisabeth Siwi Walyani, dkk. 2015. Hal 113). Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali

berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi (Hardiana, 2016:26).

Berikut ini sebab-sebab terjadinya kesulitan berkemih (retensio urine) pada ibu post partum :


- a) Berkurangnya tekanan intra abdominal.
- b) Otot-otot perut masih lemah.
- c) Edema dan uretra.
- d) Dinding kandung kemih kurang sensitive (Hardiana, 2016:26).
- e. Buang Air Besar (Defekasi). Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar (defekasi) setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau per rectal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (huknah) (Saleha, 2013).
- f. Aktivitas Seksual. Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi syarat berikut ini:
 1. Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu-satu dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap (Hardiana,2016:27)
 2. Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan.

Keputusan ini bergantung pada keputusan pasangan yang bersangkutan (Hardiana,2016:27)

g. Perawatan Payudara


Sebaiknya perawatan mammae telah dimulai sejak wanita hamil supaya putting lemas, tidak keras, dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Berikut ini cara perawatan payudara yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Sokong payudara kiri dengan tangan kiri (kanan dengan tangan kanan) dua atau tiga jari dari tangan yang berlawanan membuat gerakan memutar sambil menekan, dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu, setiap payudara minimal 2 kali gerakan (Hardiana,2016:27)




Gambar 1: Menyokong payudara

2. Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara. Urutlah dari tengah sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan kedua payudara perlahan-lahan sambil membuat sentakan kecil. Lakukan gerakan ini \pm 30 kali (Hardiana,2016:27)



Gambar 2 : Telapak tangan diantara kedua payudara

3. Sokong payudara dengan satu tangan, sedang tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan gerakan ini \pm 30 kali setiap payudara.



Gambar 3: Mengurut ke sisi puting

4. Pengompresan

Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres dingin selama 1 menit. Kompres berganti-ganti selama 3 kali berturut-turut akhiri dengan kompres hangat (Hardiana,2016:27)

7. Tindakan Post operasi Sectio Caessarea

Setelah dari ruang operasi pasien akan dibawah keruang pemulihan. Di ruang ini, berbagai pemeriksaan akan dilakukan, meliputi, pemeriksaan tingkat kesadaran, sirkulasi pernafasan, tekanan darah suhu tubuh, jumlah urin yang tertampung dalam kantong urin, jumlah darah dalam tubuh ,serta jumlah darah dan bentuk cairan lokhea.

Ini untuk tidak menemukan gumpalan darah darah yang abnormal, atau perdarahan yang berlebihan.kondisi uterus juga akan di periksa untuk memastikan dalam kondisi yang normal dan juga memantau keadaan emosional secara umum (wahyani,2013:24)

Semua pemantauan ini untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya, ketidak normalan atau gangguan kesehatan tubuh dapat diketahui melalui tanda-tanda tubuh yang muncul, serta semua alat monitoring tadi, termasuk apakah ibu dapat menyusui bayinya atau tidak. Oleh karena itu, pemeriksaan dan monitoring akan dilakukan beberapa kali sampai tubuh dinyatakan sehat. Biasanya pemeriksaan akan di lakukan setiap empat jam sekali pada hari pertama dan kedua dan dua kali sehari pada hari ketiga sampai saatnya pulang kembali kerumah (wahyani,2013:25)

Setelah operasi juga ibu tidak boleh langsung minum dan makan, kedua hal itu boleh dilakukan jika organ pencernaan kembali normal. Umumnya fungsi organ pencernaan akan kembali normal dalam 12 jam setelah operasi. Awalnya pasien akan di berikan diet cairan sedikit demi sedikit baru kemudian makanan padat beberapa saat kemudian

8. Nutrisi masa nifas

Nurtisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Makan dan minum sesuai dengan kebutuhan, hidup sehat dengan minum air putih. Minum dengan 8-9 gelas (3 liter air) standar perhari. Sebaiknya minum setiap kali menyusui. Anggapan salah jika minum air putih mengakibatkan luka sulit mengering. Tidak demikian halnya, karena jika tubuh sehat luka cepat mengering

dan sembuh. Kebutuhan gizi pada masa nifas meningkat 25% dari kebutuhan biasa karena berguna untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup (Nurjannah,dkk,2013:117)

Ibu post sectio caesarea harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia, pedas dan menimbulkan gas karena gas perut kadang-kadang menimbulkan masalah sesudah *sectio caesarea*. Jika ada gas dalam perut, ibu akan merasakan nyeri yang menusuk. Gerak fisik dan bangun dari tempat tidur, pernapasan dalam, dan bergoyang di kursi dapat membantu mencegah dan menghilangkan gas (Nurjannah,dkk,2013)

9. Ambulasi dini

Rencana awal ambulasi Setelah seksio sesar memiliki Peran penting dan bermanfaat dalam Memperbaiki kegiatan pascakelahiran Pasien *post sectio caesarea* dalam kaitannya dengan perawatan diri dan perawatan bayi baru lahir (dube,dkk,2013)

Pergerakan yang dilakukan sedini mungkin dengan melatih bagian –bagian tubuh untuk melakukan peregangan. Mobilisasi dini segera tahap demi tahap sangat berguna untuk membantu jalannya penyembuhan luka pada ibu post sectio caesaria. Mobilisasi dini dimulai dengan tubuh bagian bawah dapat merasakan sehingga dapat menggoyangkan kaki, selanjutnya mulai miring kekanan dan kekiri dapat dimulai sejak 6-10 jam secara berturut-turut duduk, berjalan di sekitar tempat tidur dan mulai

berjalan dalam jarak pendek (wahyani,2013:46). Manfaat mobilisasi bagi ibu post operasi adalah :

- 1) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan ambulasi dini. Dengan bergerak, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal, sehingga otot-otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Dengan demikian ibu akan merasa sehat dan membantu memperoleh kekuatan, mempercepat kesembuhan, faal usus dan kandung kencing lebih baik. dengan bergerak akan merangsang peristaltik usus kembali normal. Aktivitas ini juga membantu mempercepat organ-organ tubuh bekerja seperti semula.
- 2) Mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli, dengan mobilisasi sirkulasi darah normal/lancar sehingga resiko terjadinya trombosis dan tromboemboli dapat dihindarkan. Pasien sectio caessarea biasanya mulai ambulansi 24-36 jam sesudah melahirkan.

B. Konsep dasar sectio caessarea

1. Pengertian *sectio caessarea*

Operasi caesar adalah proses pengeluaran janin dengan cara mengiris dinding perut, tentu dengan metode sesuai ilmu medis (Hamdani,2012). Menurut Maulana dalam utami (2015), *sectio caessarea* merupakan suatu tindakan untuk melahirkan bayi dengan membuka dinding rahim melalui syatan pada dinding perut.

2. Macam-macam operasi *sectio caessarea*

Ada beberapa jenis Seksio Sesarea (SC), yaitu diantaranya :

- a. Jenis klasik yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis ini sudah sangat jarang dilakukan saat ini karena sangat beresiko terhadap terjadinya komplikasi.
- b. Sayatan mendatar di bagian atas dari kandung kemih sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Metode ini meminimalkan risiko terjadinya perdarahan dan cepat penyembuhannya.
- c. Histerektomi caesar yaitu bedah caesar diikuti dengan pengangkatan rahim. Hal ini dilakukan dalam kasus-kasus di mana pendarahan yang sulit tertangani atau ketika plasenta tidak dapat dipisahkan dari rahim.
- d. Bentuk lain dari Seksio Sesarea (SC) seperti extraperitoneal CS atau Porro CS (Purwoastuti, Dkk, 2015).

3. Indikasi sectio caessarea

Indikasi kebidanan adalah Kondisi yang berhubungan dengan kehamilan saat ini seperti Plasenta previa, abrupsi, plasenta akreta, tali pusat Prolaps, pre-eklampsia / eklampsia (gupta & garg,2017:2)

Dokter spesialis kebidanan akan menyarankan Seksio Sesarea (SC) ketika proses kelahiran melalui vagina kemungkinan akan menyebabkan risiko kepada sang ibu atau bayi. adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan disaran nya bedah caesar antar lain :

a. Indikasi yang berasal dari ibu

yaitu pada plasenta previa terutama pada primigravida, primi para tua disertai letak ada, *disproporsi sefalo pelvic* (disproporsi janin/panggul, sejarah kehamilan dan persalinan yang buruk, terdapat kesempitan panggul, solusio plasenta tingkat I-II, komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia-eklamsia, atas permintaan, kehamilan yang disertai penyakit (jantung, DM, gangguan perjalanan persalinan (kista ovarium, mioma uteri, dan sebagainya).

b. Indikasi yang berasal dari janin

Fetal distress/gawat janin, prolapsus tali pusat dengan pembukaan kecil, kegagalan persalinan vakum atau forseps ekstraksi (Ralph Benson, Dkk, 2013).

4. Komplikasi *sectio caessarea*

a. Syok

Peristiwa ini terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat sel-sel jaringan tidak mendapat zat-zat makanan dan O₂ dengan akibat terjadi kematiannya. Penyebab-penyebab syok adalah: hemoragi merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan bila terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik, atau kombinasi antara berbagai sebab tersebut (Hardiana,2016:39)

Gejala-gejalanya ialah nadi dan pernafasan meningkat, tensi menurun, oliguri, penderita gelisah, eksteremitas dan muka dingin, serta warna kulit keabu-abuan. Dalam hal ini sangat penting untuk membuat diagnosis sedini mungkin yang dikenal dengan sistem peringatan dini (*early warning system*), karena jika terlambat, perubahannya sudah tidak dapat dipengaruhi lagi. b. Gangguan Saluran Kemih (Hardiana,2016:40)

b. Gangguan Saluran Kemih

Pada operasi ada kemungkinan terjadi retensio urinae. Pengeluaran air seni perlu diukur, jika air seni yang dikeluarkan jauh berkurang, ada kemungkinan oliguri atau retensio urinae. Pemeriksaan abdomen seringkali dapat menentukan adanya retensi. Apabila daya upaya supaya penderita dapat berkemih tidak berhasil, maka terpaksa dilakukan kateterisasi (Hardina,2016:40)

c. Infeksi Saluran Kemih

Kemungkinan infeksi saluran kemih selalu ada, terutama pada penderita-penderita yang untuk salah satu sebab dikateter. Penderita menderita panas dan seringkali menderita nyeri pada saat berkemih, dan pemeriksaan air seni (yang dikeluarkan dengan kateter atau sebagai *midstream urine*) mengandung leukosit dalam kelompok. Hal ini dapat segera diketahui dengan meningkatnya leukosit esterase (Hardiana,2016:40)

d. Distensi Perut

Pada pasca laparatomi tidak jarang perut agak kembung akan tetapi, setelah flatus keluar, keadaan perut menjadi normal. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa distensi bertambah, terdapat timpani diatas perut pada periksa ketok, serta penderita merasa mual dan muntah (Hardiana,2016:41)

e. Infeksi *puerperal*

Pada komplikasi ini biasanya bersifat ringan, seperti kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas, bersifat berat seperti Tromboflebitis, peritonitis, sepsis dan lainnya (Hardiana,2016:41)

f. Terbukanya Luka Operasi Eviserasi

Sebab-sebab terbukanya luka operasi pasca pembedahan ialah luka tidak dijahit dengan sempurna, distensi perut, batuk atau muntah keras, serta mengalami infeksi (Hardiana,2016:41)

5. Penatalaksanaan

Menurut saifuddin dalam histriani (2012), penatalaksanaan ibu nifas post sectio caesarea meliputi :

1. Manajemen post operatif
 - a. Pasien dibaringkan didalam kamar pulih dengan pemantauan ketat tensi, nadi, nafas tiap 15 menit dalam 1 jam berikut dan selanjutnya.
 - b. Pasien tidur dengan muka kesamping dan yakinkan kepalanya agak tengadah agar jalan nafas bebas.
 - c. Letakkan tangan yang tidak diinfus disamping badan agar cairan infus dapat mengalir dengan lancar.
 - d. Mobilisasi / aktivitas

Pasien boleh menggerakkan kaki dan tangan serta tubuhnya sedikit 6-12 jam, kemudian duduk, bila mampu pada 24 jam setelah sectio caessarea pasien jalan, bahkan mandi sendiri pada hari kedua.

6. Perawatan pascaoperasi

Perawatan pascaoperasi sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi kebugaran tubuh seperti sedia kala. Pada hari pertama setelah operasi, si ibu biasanya wajib menjalani program rawat inap. Apabila diperlukan pihak medis akan memberikan beberapa jenis obat yang berdosisi rendah (yang tidak menimbulkan efek samping yang berkelanjutan) sebagai salah satu media terapi. Selain itu pihak dokter pada umumnya baru akan mengizinkan yang bersangkutan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat berat atau padat setelah 24 jam pasca operasi. Bahkan ada beberapa kasus dimana pasien harus menunda waktu makannya hingga usus mampu berfungsi dengan normal kembali, biasanya ditandai dengan keluarnya gas lewat saluran pembuangan (buang angin atau kentut)

(Purwoastuti dan Walyani, 2015)

Pada hari kedua dan seterusnya kondisi berangsur-angsur membaik meskipun biasanya sedikit mengalami perasaan tidak nyaman, terutama pada bagian perut. Sebenarnya merupakan pertanda baik bahwa organ pencernaan pasien sudah kembali beraktifitas secara normal setelah mengkonsumsi beberapa jenis antibiotik sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Periode pengembalian kondisi fisik bagi tiap-tiap orang berbeda tergantung dari seberapa besar daya tahan tubuh dan efek dari kinerja obat yang dikomsumsinya. Ada yang hanya menjalani perawatan pasca operasi caesar selama beberapa hari (Purwoastuti ,2015)

C. Tinjauan Islam Terhadap Nifas dan Sectio caessarea

1. Nifas

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu dalam keadaan Post partum agar masa nifas berjalan dengan baik dan tidak ada komplikasi yang menyertai, dalam hal ini sebaiknya ibu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatannya seperti halnya makan-makanan yang bergizi, menjaga personal hygiene terutama pada daerah luka bekas operasi agar tidak terjadi infeksi, menyusui bayinya dengan baik.

Untuk itu ibu harus tahu mengenai larangan-larangan dalam masa nifas yaitu:

- a. Larangan melakukan shalat. Larangan ini berdasarkan atas hadits Nabi SAW yang diwariskan oleh Fatimah Binti Abi Hubaisy yang artinya : "Apabila haid, tinggalkan shalat" (HR. Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi dan An-Nasa'i).
- b. Larangan melakukan puasa dengan ketentuan puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas harus diqada dihari lainnya.
- c. Larangan melakukan tawaf. Larangan ini didasarkan atas hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada Aisyah RA. "Apabila engkau dalam keadaan haid, kerjakanlah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang haji lainnya, tetapi engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah kecuali setelah suci" (HR. Bukhari, Muslim).
- d. Larangan membaca al-Qur'an. Larangan ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW Yang artinya: "tidak diperbolehkan" (Mughniyah, 2009).

- e. Larangan bergaul suami istri. Larangan ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝۲۲

Terjemahnya :Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri

Penjelasan tentang ayat diatas menjelaskan bahwa: Allah SWT melarang suami menggauli istrinya dimasa haidh dimana berakibat buruk dengan berdampak negatif pada kesehatan antara lain dapat menjadikan vagina luka dan infeksi serta dapat hamil diluar kandungan dan lain-lain sebagainya

2. Sectio Caessaria

Islam merupakan agama yang begitu memperhatikan kehidupan umatnya. Berbagai aspek diatur didalamnya dimana semuanya dituangkan dalam Al-Qur'an dan dilengkapi dengan terjemahannya. Mulai dari konsepsi sampai meninggalnya seseorang islam semua telah diatur oleh Allah SWT (Hamdani,2012:12)

Pada Pasca Pelahiran sesar merupakan suatu indikasi yang diperuntukkan bagi ibu untuk dapat menyelamatkan Nyawanya maupun bayinya. Namun tidak

menutup kemungkinan ada hal-hal yang bisa terjadi sehingga berdampak buruk pada ibu maupun pada bayinya kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam

Allah berfirman dalam Q.S Al-ahqaf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berseerah diri".

Adapun kaitannya ayat diatas dengan judul penelitian yang saya susun yaitu dalam ayat diatas menjelaskan bahwa betapa susah nya ibu mengandung selama kurang lebih sembilan bulan lamanya, dan selama persalinan tersebut banyak komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dan dapat berdampak pada ibu dan bayinya, semua itu dapat beresiko yang akhirnya berdampak pada kematian. Berbagai komplikasi yang dapat timbul dari ibu mulai dari dalam rahim sang ibu dalam mengandung dengan susah payah sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, sampai

mengalami gangguan fisik dan psikis. Sehingga berbagai asuhan yang dapat diberikan pada ibu untuk menjaga kesehatan dan janin (Hamdani,2012:12)

Banyak alasan seseorang melakukan bedah sesar pada kelahiran bayinya. Bisa karena alasan medis : bayi kembar, bayi terlalu besar, habis ketuban. Atau dengan alasan estetika agar organ kewanitaan tetap utuh, atau sekedar ingin menentukan tanggal tertentu bagi buah hati, motif atau alasan inilah yang akan berpengaruh pada hukum melakukan operasi caessar (Hamdani,2012:12)

Adapun hukumnya mengacu pada alasan riil mengapa operasi caessar dilakukan:

- a.** Keadaan daruriyat, maksudnya adanya kekhawatiran nyawa ibu atau bayi bahkan keduanya terancam, kondisi darurat memiliki beberapa bentuk :
1. Kondisi ibu yang mengalami eklampsia atau kejang dalam kehamilan, mempunyai penyakit jantung, persalinan tiba-tiba macet, perdarahan banyak selama kehamilan, infeksi dalam rahim.
 2. Operasi caessar untuk menyelamatkan nyawa bayi. Misalnya, ibu sudah meninggal, tetapi bayi yang berada di dalam perutnya masih hidup.
 3. Operasi caessar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi secara bersamaan ketika terjadi air ketuban pecah namun belum ada kontraksi, bayi terlilit tali pusat sehingga tidak dapat keluar secara normal, usia bayi prematur, dan posisi bayi sungsang (Hamdani,2012:13)

Dalam ketiga keadaan tersebut, diperbolehkan dilakukan operasi caesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya Terdapat pada Qs. Al Maidah/5:32

Allah berfirman dalam Q.s. Al Maidah/5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

Terjemahnya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ayat diatas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkan semua manusia penjelasannya sebagai berikut:

Peraturan baik yang ditetapkan ditetapkan oleh seorang manusia atau oleh Allah, Pada hakikatnya adalah kemaslahatan masyarakat manusia. Dan kalau kita menyebut kata ‘masyarakat’ maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, anda dan dia. Kumpulan dari manusia (Tafsir Al-misbah:101)

Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dan masyarakat dan masyarakatnya. Pemisahan ini hanya terjadi pada dataran alam teori, tetapi dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kehidupan sosiologis manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, walau ketika dia hidup dalam gua sendirian, bukankah manusia yang hidup di dalam gua sendirian, menemukan makhluk lain bersamanya, kalau bukan makhluk sejenisnya maka hantu yang menakutkannya atau malaikat yang mendukungnya. Demikian manusia membutuhkan selainnya. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia-manusia lainnya bersamanya, saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama bahwa semua harus dihargai. Sehingga barangsiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, demikian juga sebaliknya (Tafsir Al-misbah:101)

b. Keadaan hajiyat

Keadaan hajiyat dalam operasi caesarea adalah adanya kekhawatiran terjadi bahaya atau sesuatu yang buruk yang akan menimpa ibu dan bayi, tetapi bahaya ini tidak sampai mengancam jiwa ibu dan anak. Seperti halnya llingkar rongga panggul lebih kecil dari ukuran janin, sehingga akan kesulitan dalam melahirkan secara alami, usia ibu yang terlalu tua, kelainan letak plasenta,, ukuran bayi terlalu besar atau terjadi bayi kembar. Dalam keadaan ini operasi caesarea di perbolehkan, karena hajiyat kadang sangat di butuhkan oleh masyarakat (Hamdani,2012:13)

c. Keadaan tahsiniat

Yaitu melakukan operasi caessarea dengan alasan yang sebenarnya tidak fundamen. Tidak ada ancaman atau dampak buruk yang akan terjadi pada ibu , misalnya karena ingin organ kewanitaan tetap utuh, menghindari rasa sakit saat melahirkan, enggan menunggu proses kelahiran yang lama, atau sekedar ingin mengepaskan waktu lahir dan tanggal tertentu, operasi caesarea dengan alasan yang seperti itu tidak di perbolehkan, karena telah menyakiti (merusak) diri sendiri demi mencapai tujuan yang maslahatnya tidak mu'tabar (diakui syariat). Karena operasi caessarea cenderung membawa dampak kurang baik utamanya bagi anak,yang terjadi pada anak misalnya gangguan pernapasan akibat cairan yang memenuhi paru-paru janin selama berada dalam rahim, rendahnya sistem kekebalan tubuh, rentan alergi, emosi cenderung rapuh, efek bagi ibu misalnya rasa sakit yang sangat pada bagian perut dan rahim akibat robekan saat operasi (Hamdani,2012:13).

2. Tinaan Tentang Proses Manajemen Kebidanan

a. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah

(Nurhayati, dkk, 2012: 139).

b. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.

Varney mengatakan bahwa seorang bidan perlu lebih kritis melakukan analisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis dan masalah potensial (Nurhayati, dkk, 2013:139).

Varney kemudian menyempurnakan proses kebidanan menjadi tujuh langkah yaitu:

1. Pengkajian/ Pengumpulan Data Dasar. Pengkajian ibu post partum berfokus pada status fisiologis dan psikologi ibu, tingkat kenyamanannya, kurangnya pengetahuan terkait dengan kesiapan untuk belajar, perilaku bonding, serta penyesuaian terhadap transisi yang diperlukan untuk menjadi ibu. Selain ibu, bayi juga perlu dikaji mengenai penyesuaian fisiologis bayi terhadap lingkungan di luar rahim, kenormalan fisik, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan bayi.
2. Identifikasi Diagnosis. Setiap ibu dan keluarga mengantisipasi perawatan postpartum di rumah, karenanya mereka akan memiliki respon yang unik. Setelah menganalisis data dengan cermat, bidan dapat menegakkan diagnosis berdasarkan data yang akan menjadi pedoman bidan dalam menerapkan tindakan. Diagnosis yang relevan untuk ibu post partum yang dirawat di rumah adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang tanda-tanda komplikasi.

- b. Pengetahuan yang tidak adekuat mengenai menyusui yang tidak efektif.
 - c. Keletihan yang berhubungan dengan kurangnya istirahat.
 - d. Kurang pengetahuan/keterampilan dan harapan yang tidak realistis dalam peran menjadi orang tua.
3. Antisipasi Timbulnya Diagnosis atau Masalah Potensial. Merupakan kegiatan antisipasi, pencegahan jika memungkinkan, menunggu dan waspada, serta persiapan untuk segala sesuatu yang terjadi pada ibu postpartum yang dirawat di rumah.
 4. Perlunya Tindakan Segera Dan Kolaborasi. Bidan melakukan perannya sebagai penolong dan pengajar dalam mempersiapkan ibu dan keluarganya pada masa postpartum. Bidan yang member perawatan postpartum di rumah melanjutkan perawatan berbagai entuk dan cara, misalnya konseling, support, pengajaran dan perujukan yang didasarkan pada tambahan berkelanjutan kedalam data dasar. Beberapa data dapat mengindikasikan adanya situasi darurat dimana bidan harus segera bertindak dalam rangka menyelamatkan jiwa pasien.
 5. Rencana Asuhan Sesuai Kebutuhan. Suatu rencana asuhan diformulasi seecara khusu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan keluarganya. Sedapat mungkin bidan melibatkan merka semua dalam rencana dan mengatur prioritas serta pilihan mereka untuk setiap tindakan yang dilakukan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai disusun dengan ibu dan keluarga.

Tujuan yang ingin dicapai meliputi hal-hal berikut: (Saleha, 2009:78-79)

- a. Ibu post partum akan mengalami pemulihan fisiologis tanpa komplikasi.
 - b. Ibu post partum dapat menyebutkan pengetahuan dasar yang akurat mengenai cara menyusui yang efektif.
 - c. Ibu postpartum mampu mendemonstrasikan perawatan yang tepat untuk diri dan bayinya.
 - d. Orang tua akan mendemonstrasikan interaksi yang positif satu sama lain terhadap bayi dan anggota keluarga yang lain.
6. Implementasi Langsung untuk Memenuhi Kebutuhan. Dapat dilakukan Oleh bidan atau sebagian dilaksanakan oleh ibu sendiri, keluarga atau anggota kesehatan yang lain.
7. Evaluasi Keefektifan Asuhan. Untuk bisa efektif, evaluasi didasarkan pada harapan pasien yang diidentifikasi saat merencanakan asuhan kebidanan. Bidan bisa merasa cukup yakin bahwa asuhan yang diberikan cukup efektif, jika hasil akhir berkualitas bisa dicapai.

3. *Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)*

Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning)

- a. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi yang sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi suatu rencana asuhan.
- b. Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan guna menyusun dokumentasi asuhan.

- c. SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.

SUBJEKTIF

1. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis
2. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya)
3. Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda “0” atau “X”.

OBJEKTIF

1. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik,
2. Hasil pemeriksaan laboatorium/ pemeriksaan diagnostic lain,
3. Informasi dari keluarga atau orang lain.

ASSESMEN

1. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif
2. Diagnostik/ masalah
3. Diagnosis/ masalah potensial
4. Antisipasi diagnosi/ masalah potensial/ tindakan segera.

PLANNING

Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E), meliputi: asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostic/laboratorium, konseling, dan tindak lanjut (follow up).

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN HASIL KEBIDANAN *POST NATAL CARE*

PADA NY”R” DENGAN *POST SECTIO CAESSARIA*

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TAHUN 2018

No Register : 512xxx
Tanggal masuk : 07 September 2018, Pukul 08.00 Wita
Tanggal Operasi : 07 September 2018, Pukul 11.00 Wita
Tanggal pengkajian : 07 September 2018, Pukul 15.15 Wita

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identitas istri/suami

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”
Umur : 23 Tahun / 25 Tahun
Nikah : 1 kali / 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta
Alamat : Paccinongan

Data Subjektif

1. Keluhan Utama

Ibu merasa nyeri pada daerah luka bekas operasi

2. Riwayat Keluhan Utama

Nyeri pada daerah abdomen bagian bawah (daerah bekas operasi) dirasakan sejak 2 jam setelah operasi, sifat nyeri hilang timbul (tidak menetap), ibu merasa cemas dengan keadannya, ibu mengatakan ASInya masih kurang

3. Riwayat Kesehatan Lalu dan Sekarang

Tidak ada riwayat penyakit serius seperti penyakit jantung, Diabetes melitus, hepatitis, tumor, hipertensi, penyakit menular seksual (PMS), dan tuberkulosis (TBC). Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan kejang. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok. Serta keluarga tidak memiliki penyakit menurun dan menular

4. Riwayat reproduksi

a. Menarche : 13 Tahun

- b. Siklus Haid : 28-30 Hari
- c. Lamanya : 5-7 hari
- d. Disminorhea : Tidak ada

5. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Ibu mengatakan ini adalah anak pertama dan tidak pernah keguguran
- b. HPHT tanggal 25-11-2017
- c. Tp tanggal 02-09-2018
- d. Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali di rumah puskesmas somba opu dan telah mendapatkan imunisasi sebanyak 2 kali, TT I pada tanggal 26-01-2018 dan TT II
- e. pada tanggal 26-02-2018.

6. Riwayat persalinan/kelahiran sekarang

- a. Ibu masuk rumah sakit pukul 08.00 wita
- b. Ibu dioperasi *sectio caessaria* pada tanggal 06 september pukul 11.00-12.00 wita dengan anastesi spinal, jenis kelamin perempuan, BBL 3300 gram, PB 49 cm, Apgar score 8/10
- c. Indikasi *sectio caessaria* (SC) *cephalopelvik disproportion* (CPD)

7. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

8. Data psikososial, ekonomi dan spiritual

- a. Ibu dan keluarga sangat senang dengan kelahiran bayinya
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami

- c. Hubungan antara keluarga baik
- d. Penghasilan suami mencukupi kebutuhan sehari-hari
- e. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga
- f. Selama kehamilan, proses persalinan dan masa nifas ini ibu senantiasa berdoa dan berserah diri pada Allah SWT.

9. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Sebelum nifas

Pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur, lauk pauk, dan buah, ibu minum 7-8 gelas/ hari

Selama nifas

Ibu mengatakan belum dianjurkan untuk makan karena masih puasa

b. Eliminasi

Sebelum nifas

Ibu BAK 3-5 kali /hari, berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak, BAB 1-2 kali/hari

Selama nifas

BAK terpasang kateter (250 ml) dalam urine bag, ibu belum BAB

c. Istirahat

Sebelum nifas

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/hari dan tidur malam 7-8 jam/hari

Selama nifas

Ibu belum tidur selama masuk diruangan nifas

d. Keadaan psikologis

Ibu merasa senang dengan kelahiran anak pertamanya

Data Objektif

- a. Masa nifas hari pertama
- b. Kesadaran composmentis
- c. Ekspresi ibu tampak meringis bila ingin bergerak
- d. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2 °C

e. Pemeriksaan fisik *Head to toe*

a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva pucat, sklera putih

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

c. Hidung

Inspeksi : Tidak ada polip

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

d. Mulut

Inspeksi : Bibir tidak pucat, tidak pecah-pecah atau kering, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi

e. Telinga

Inspeksi : tidak ada kelainan dan tidak ada serumen

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

f. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan vena jugularis

g. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan ,massa , dan benjolan, serta pada saat puting susu di pencet terdapat pegeluaran ASI

h. Abdomen

Inspeksi : Tampak luka bekas operasi tertutup verban

Palpasi : Terdapat nyeri tekan pada luka bekas operasi (perut bagian bawah, kontraksi uterus baik, TFU 1 jari bawah pusat.

i. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochea rubra, terpasang kateter

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

j. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

f. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan laboratorium 2 jam post operasi tanggal 07 september 2018

Hb: 10gr pukul 02.00 wita

b. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : P1 A0, Post sectio Hari pertama (3 jam), nyeri luka bekas operasi

Data subjektif

1. Ibu mengatakan ini anak pertama dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi
3. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya pada tanggal 07 september 2018 pukul 11.10 wita

Data objektif

1. Kesadaran composmentis
2. Keadaan umum ibu tampak lemah
3. Luka operasi masih basah dan diverban
4. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2° C

5. Tampak pengeluaran lochea rubra
6. TFU 1 jari di bawah pusat
7. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

Analisa dan interpretasi data

1. Sectio caessaria adalah proses persalinan dengan pembedahan melalui perut ibu dan rahim ibu untuk mengeluarkan bayi (Purwoastuti,Dkk,2015)
2. Pada hari pertama post partum, didapatkan tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat.Lokhia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalm masa nifas. Pada hari pertama post partum sampai hari kedua lochia yang keluar adalah lochia rubra berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo dan mekonium, lochea yang keluar selama dua sampai tiga hari (Saleha,2013:56)
3. Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kekondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (marmi,2012:140)
4. Nyeri pada luka operasi
Terputusnya continuitas jaringan akan melepaskan hormon vasilitator yang merangsang saraf perifer kehipotalamus sehingga terjadi feedback kedalam tubuh melalui saraf efferent sehingga di persepsikan sebagai nyeri (Nunung,Dkk,2013)

c. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

Diagnosa : Antisipasi terjadinya infeksi luka bekas operasi

Data subjektif

1. Ibu dioperasi tanggal 07 september 2018 pukul 11.00 wita
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi
3. Ibu merasa adanya pengeluaran darah dari jalan lahir

Data objektif

Tampak luka bekas operasi tertutup verban anti air

Analisa dan interpretasi data

Adanya luka operasi merupakan pintu masuknya kuman pathogen dan menjadi tempat untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan infeksi (Hardiana,2017:70)

d. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA /KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan analgetik dan antibiotik,vitamin

1. Asam mefenamat 500 mg dosis 3 kali sehari
Sebagai obat analgetik, analgesik, dan antiinflamasi
2. Cefadroxil 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai anti biotik dengan spektrum luas, efek melawan bakteri gram negatif maupun gram positif

3. Metronidazole 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai antibiotik yang dapat mnghentikan pertumbuhan bakteri

4. Tablet tambah darah

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

a. LANGKAH V : RENCANA/INTERVENSI

Diagnosa : Masa nifas hari pertama dengan *post sectio caessaria*

Masa Aktual : Nyeri luka bekas operasi

Masalah potensial : Antisipasi infeksi luka bekas operasi

Tujuan

- a. Masa nifas hari pertama berlangsung normal
- b. Nyeri pada luka operasi berkurang
- c. Tidak terjadinya infeksi luka bekas operasi

Kriteria

1. Masa nifas hari pertama berlangsung dengan normal

Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan Darah : Sistol 110-130 mmHg, Diastol 70-90 mmHg

Nadi : 60-90 kali/menit

Suhu : 36,5 - 37,5 C

Pernapasan : 16-24 kali/menit

2. Nyeri belum teratasi, ibu merasakan nyeri jika ingin bergerak
3. Tidak terjadi infeksi pada luka bekas operasi

Tidak terdapat tanda-tanda infeksi seperti peningkatan suhu tubuh melebihi 37,5 C, luka jahitan tidak bengkak dan kemerahan.

Rencana Asuhan

- b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional : Hal ini dapat mencegah infeksi silang

- c. Mengobservasi keadaan umum ibu

Rasional : Untuk mengetahui keadaan umum ibu dan sebagai petunjuk untuk melakukan pemantauan perawatan selanjutnya

- d. Observasi tanda-tanda vital

Rasional : tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

- e. Observasi TFU, kontraksi dan pengeluaran lochea

Rasional : sebagai indikator untuk menilai/atau mengetahui proses involusi berjalan normal atau tidak

- f. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Rasional : mobilisasi dini dapat melatih otot-otot abdomen sehingga terjadi peningkatan tonus otot, mempercepat proses penyembuhan, dan mencegah trombotik dan tromboemboli

g. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri

Rasional : dengan penjelasan pada ibu mengenai penyebab nyeri, maka ibu dapat mengerti dan beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan sehingga ibu padamau bekerja sama dalam proses perawatannya

h. Mengobservasi pemberian cairan infus

Rasional : pemberian cairan infus mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya hipotermi, dehidrasi dan komplikasi pada organ-organ lainnya.

i. Observasi pengeluaran urin

Rasional : Untuk mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh, sebab kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman pada ibu.

j. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya

Rasional : Dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman dan untuk mencegah terjadinya infeksi.

k. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup

Rasional : Istirahat yang cukup memberikan kesempatan otot dan otak untuk relaksasi setelah mengalami proses operasi sehingga sehingga pemulihan tenaga serta stamina ibu berlangsung dengan baik.

l. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan mengandung protein, karbohidrat, vitamin A,C,D

Rasional : Membantu dalam proses pemulihan ibu

m. Memberikan konseling KB pada ibu

Rasional : Dengan memberikan konseling KB pada ibu , dapat membantu ibu dalam memilih dan menentukan alat kontrasepsi yang dipakai.

- n. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemand sesuai kebutuhan bayi

Rasional : Dengan bayi menyusui sesering mungkin dapat membantu proses involusi uteri

- o. Penatalaksanaan dosis pemberian terapi oral

Rasional : Cefadroxil 3x1, Asam mefenamat 3x1, Metronidazole 3x1, sf 1x1

Cefadroxil merupakan golongan antibiotik yang dapat membunuh jenis kuman penyebab infeksi, Asam mefenamat merupakan obat analgetik yang dapat mngurangi rasa nyeri, metronidazole antibiotik yang dapat mngehentikan pertumbuhan bakteri, sf (tablet penambah darah)

b. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 07 September, pukul 15.20 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil : Tangan telah dicuci dengan bersih

2. Mengobservasi keadaan umum ibu

Hasil : Kesadaran composmentis, ibu merasakan nyeri pada daerah luka bekas operasi di tandai bila ibu bergerak wajah ibu meringis

3. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal di tandai dengan

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2° C

4. Observasi TFU, kontraksi dan pengeluaran lochea

Hasil : TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, lochea rubra

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri

Hasil : Ibu mengetahui penyebab nyeri

7. Mengobservasi pemberian cairan infus

Hasil : infus terpasang ,cairan Ringer Laktat 28 tetes

8. Mengobservasi pengeluaran urin

Hasil : urin sebanyak 250 ml tertampung di dalam urine bag

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) seperti mengganti pembalut minimal 3 kali sehari dan mengganti pakaian bila basah/kotor

Hasil : Ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

10. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : ibu bersedia untuk istirahat yang cukup

11. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan mengandung protein, karbohidrat vitamin A,C,D

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi

12. Memberikan konseling KB pada ibu

Mal : Merupakan metode yang dipakai dengan mengandalkan air susu ibu (ASI) selama 6 bulan penuh

Mini pil : Alat kontrasepsi oral yang dikonsumsi setiap hari 1 x 1 dapat digunakan 3 hari pasca persalinan dan sangat efektif bagi ibu menyusui

Suntik 3 Bulan : Jenis kontrasepsi yang disuntikan kedalam tubuh ibu yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu, suntikan pertama diberikan 6 minggu pasca persalinan

Implant/AKBK : Alat kontrasepsi hormonal yang dipasang dibawah kulit pada daerah lengan atas

IUD/AKDR : Alat kontrasepsi dalam rahim

Hasil ibu mengerti dan berencana memilih kontrasepsi suntik 3 bulan

13. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemand sesuai kebutuhan bayinya

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya

14. Pemberian obat oral

Hasil : Cefadroxil 500 mg 3 kali sehari

Metronidazole 500 mg 3 kali sehari

Asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari

Tablet tambah darah 1 kali sehari

c. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 07 september 2018, pukul 15.30 wita

a. Masa nifas hari pertama berlangsung normal di tandai dengan :

1. Kedaan umum ibu baik
2. TTV dalam batas normal

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2° C

3. TFU 1 jari dibawah pusat (keras dan bundar)
4. Involusi uteri berjalan dengan normal

b. Nyeri belum teratasi ,ibu masih merasakan nyeri bila bergerak, wajah masih tampak meringis

c. Potensial terjadinya infeksi bekas operasi

Tidak ada tanda-tanda infeksi, suhu tubuh normal

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY “R DENGAN POST SECTIO CAESSARIA

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

07 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 wita

Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 wita

Tanggal pengkajian : 07 September 2018, pukul 15.15 wita

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu menjalani operasi tanggal 07 september 2018 pukul 11.00 wita
2. Ibu mengatakan ini anak pertama dan tidak pernah keguguran
3. Ibu mengatakan nyeri pada daerah luka bekas operasi
4. Ibu mengatakan HPHT tanggal 25-11-2017
5. Ibu mengatakan ASInya sudah ada tapi masih sedikit
6. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit asma, jantung, hipertensi
7. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun
8. Ibu mengatakan tidak alergi makanan dan obat-obatan
9. Ibu dan keluarga sangat senang dengan kelahiran bayinya
10. Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi (KB)

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu tampak lemas
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu tampak meringis bila bergerak, pengeluaran lochea rubra
4. Tampak luka bekas operasi pada abdomen bagian bawah yang ditutupi dengan verban anti air, TFU 1 jari dibawah pusat teraba keras dan bundar
5. TTV

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2 °C

6. Pemeriksaan *head to toe*

a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sklera putih

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

c. Hidung

Inspeksi : Tidak ada polip

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

d. Mulut

Inspeksi : Bibir tidak pucat, tidak pecah-pecah atau kering, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi

e. Telinga

Inspeksi : tidak ada kelainan dan tidak ada serumen

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

f. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan vena jugularis

g. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan ,massa , dan benjolan, serta pada saat puting susu di pencet terdapat pegeluaran ASI

h. Abdomen

Inspeksi : Tampak luka bekas operasi tertutup verban

Palpasi : Terdapat nyeri tekan pada luka bekas operasi (perut bagian bawah, kontraksi uterus baik, TFU 1 jari bawah pusat.

i. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochea rubra, terpasang kateter

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan

j. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ektremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

ASSESSMENT (A)

P₁A₀, *Post sectio caessaria* hari pertama, dengan nyeri luka operasi, antisipasi terjadinya infeksi luka *post sectio caessaria*

PLANNING (P)

Tanggal 07 september 2018, pukul 15.20 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil : tangan telah dicuci

2. Mengobservasi keadaan umum ibu

Hasil : kesadaran composmentis, ibu merasa nyeri pada daerah bekas operasi

3. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 82 kali/menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,2 °C

4. Observasi TFU, kontraksi dan pengeluaran lochea

Hasil : TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, lochea rubra

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : ibu masih berbaring terlentang

6. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri

Hasil : ibu mengetahui penyebab nyeri

7. Mengobservasi pemberian cairan infus

Hasil : infus terpasang ,cairan ringer Laktat 28 tetes/menit

8. Mengobservasi pengeluaran urin

Hasil : urin sebanyak 250 ml tertampung dalam urine bag

9. Menganjurkan ibu menjaga kebersihan dirinya (Personal hygiene) seperti mengganti pembalut minimal 3 kali sehari dan mengganti pakaian bila kotor/basah

Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

10. Menganjurkan ibu untuk beristirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan 2 jam di siang hari

Hasil : ibu bersedia istirahat yang cukup

11. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka, selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat

Hasil : ibu mengerti dan bersedia mengkonsumsi makanan bergizi

12. Memberikan konseling KB pada ibu

Mal : Merupakan metode yang dipakai dengan mengandalkan air susu ibu (ASI) selama 6 bulan penuh

Mini pil : Alat kontrasepsi oral yang dikonsumsi setiap hari 1 x 1 dapat digunakan 3 hari pasca persalinan dan sangat efektif bagi ibu menyusui

Suntik 3 Bulan : Jenis kontrasepsi yang disuntikan kedalam tubuh ibu yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu, suntikan pertama diberikan 6 minggu pasca paersalinan

Suntik 1 bulan : Jenis kontrasepsi yang disuntikkan setiap 1 bulan

Implant/AKBK : Alat kontrsepsi hormonal yang dipasang dibawah kulit pada daerah lengan atas

IUD/AKDR : Alat kontrasepsi dalam rahim

Hasil : ibu mengerti dan berencana memilih kontrasepsi suntik 3 bulan

13. Menganjurka ibu untuk menyusui secara ondemand sesuai kebutuhan bayinya

Hasil : ibu bersedia menyusui bayinya secara ondemand

14. Pemberian Obat Oral

Hasil :

Cefadroxil 500 mg 3 kali sehari

Metronidazole 500 mg 3 kali sehari

Asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari

Tablet tambah darah 1 kali sehari

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY"R" DENGAN POST SECTIO CAESSARIA HARI KE II

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

08 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 wita
Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 wita
Tanggal pengkajian : 08 September 2018, pukul 15.30 wita

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny "R"/ Tn "A"
Umur : 23 Tahun / 25 Tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri luka operasi bila bergerak
2. Ibu mengatakan Asinya sudah ada tapi masih sedikit
3. Ibu mengatakan sudah platus tapi belum BAB

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tampak luka bekas operasi pada abdomen bagian bawah, tertutup verban
3. Ekspresi wajah ibu tampak meringis bila bergerak
4. Nyeri tekan pada daerah luka operasi
5. Kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras)
6. Tampak pengeluaran lochea rubra
7. Asi sudah ada
8. TFU 2 jari bawah pusat
9. TTV

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 83 kali/menit

Pernapasan : 20 kali/menit

Suhu : 36,6 °C

ASSESSMENT (A)

P₁A₀, *Post sectio caessaria* hari kedua, dengan nyeri luka operasi, antisipasi terjadinya infeksi luka *post sectio caessaria*

PLANNING (P)

Tanggal 08 september 2018, pukul 15.35 wita

1. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 83 kali/menit

Pernapasan : 20 kali/menit

Suhu : 36,6 °C

2. Mengobservasi TFU, kontraksi dan pengeluaran

Hasil: TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uteru baik, pengeluaran lochea rubra

3. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : ibu bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara

Hasil: ibu mengetahui cara perawatan payudara

5. Menganjurkan ibu untuk tetap beristirahat dengan cukup

Hasil : ibu bersedia istirahat yang cukup

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya

Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

7. Observasi pengeluaran urin

Hasil: terdapat 500 cc di urine bag

8. Mengobservasi pemberian cairan infus

Hasil : cairan ringer laktat 28 tetes / menit

9 Pemberian Obat Oral

Hasil :

Cefadroxil 500 mg 3 kali sehari

Metronidazole 500 mg 3 kali sehari

Asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari

Tablet tambah darah 1 kali sehari

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY”R” DENGAN POST SECTIO CAESSARIA HARI KE III

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

09 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 wita

Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 wita

Tanggal pengkajian : 09 September 2018, pukul 15.30 wita

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
2. Ibu mengatakan sudah BAB
3. Ibu mengatakan pengeluaran ASI lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah ibu cerah
3. Nyeri sudah berkurang
4. Kateter sudah di aff dan BAK sudah lancar
5. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 85 kali/menit

Pernapasan : 23 kali/menit

Suhu : 36,7 °C

6. TFU 3 jari bawah pusat teraba keras dan bundar, kontraksi uterus baik
7. Pengeluaran lochea rubra

ASSESSMENT (A)

P₁A₀, *Post sectio caessaria* hari ketiga, dengan nyeri luka operasi, antisipasi terjadinya infeksi luka *post sectio caessaria*

PLANNING (P)

Tanggal 09 september 2018, pukul 15.35 wita

1. Memberikan motivasi kepada ibu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

Hasil : ibu semangat dan mau melakukannya sendiri

2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 85 kali/menit

Pernapasan : 23 kali/menit

Suhu : 36,7 °C

3. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi) dalam proses penyembuhan

Hasil :ibu mengetahui pentingnya mobilisasi dalam proses penyembuhan

4. Memberitahu ibu bahwa infusnya akan dilepas sesuai dengan intruksi dokter karena keadaan ibu sudah menbaik

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk di aff infus

5. Memberikn dukungan moril pada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih

Hasil : ibu bersemangat dan merasa senang serta berterimakasih

6. Pemberian Obat Oral

Hasil :

Cefadroxil 500 mg 3 kali sehari

Metronidazole 500 mg 3 kali sehari

Asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari

Tablet tambah darah 1 kali sehari



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY”R” DENGAN POST SECTIO CAESSARIA HARI KE IV

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

10 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 wita

Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 wita

Tanggal pengkajian : 10 September 2018, pukul 15.30 wita

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu sudah bisa duduk dan berjalan ke kamar mandi
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah ceria
3. Nyeri tekan sudah berkurang, pengeluaran lochea sanguinolenta
4. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 85 kali/menit

Pernapasan : 24 kali/menit

Suhu : 36,5 °C

5. TFU 3 jari bawah pusat teraba keras dan bundar

ASSESSMENT (A)

P₁A₀, *Post sectio caessaria* hari keempat, dengan nyeri luka operasi, antisipasi terjadinya infeksi luka *post sectio caessaria*

PLANNING (P)

Tanggal 10 september 2018, pukul 15.35 wita

1. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk proses penyembuhannya

Hasil : ibu bersedia untuk tetap melakukan mobilisasi

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil :

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 85 kali/menit

Pernapasan : 24 kali/menit

Suhu : 36,5 °C

3. Memberikan konseling pada ibu sebelum pulang mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

Hindari aktivitas berat

Pada masa-masa pemulihan patut dihindari, karena aktivitas berat dapat memungkinkan terjadinya perdarahan pada daerah luka serta meningkatkan kemungkinan luka terbuka.

Hindari pakaian ketat

Menggunakan pakaian ketat dapat menekan bekas sayatan sehingga sirkulasi darah ke daerah luka menjadi tidak lancar

7. Menganjurkan ibu untuk kembali kerumah sakit 7 hari setelah operasi untuk memantau keadaan luka jahitan

Hasil : ibu bersedia datang kembali kerumah sakit pada jadwal yang telah ditentukan

8. Pemberian Obat Oral

Hasil :

Cefadroxil 500 mg 3 kali sehari

Metronidazole 500 mg 3 kali sehari

Asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari

Tablet tambah darah 1 kali sehari

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY”R” DENGAN POST SECTIO CAESSARIA HARI KE VIII

DI RUMAH PASIEN, PACCINNONGAN

15 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 Wita
Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 Wita
Tanggal pengkajian : 15 September 2018, pukul 15.15 Wita
Tempat pengkajian : Rumah pasien, paccinongan

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan keadaannya sudah membaik
2. Nyeri yang dirasakan sudah berkurang dari sebelumnya
3. Ibu mengatakan masih ada cairan keluar dari jalan lahir tapi tidak terlalu merah
4. ASI sudah lancar dan bayinya sering menyusu
5. Ibu mengatakan luka bekas operasinya sudah mengering
6. Ibu sudah beraktivitas seperti biasanya

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan utama ibu baik
2. Ekspresi ibu tampak ceria
3. Tampak luka bekas operasi tertutup verban
4. Pengeluaran lochea serosa
5. TFU 2 jari diatas symphysis, kontraksi uterus baik
6. Pengukuran tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82 kali / menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,6 °C

7. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Inspeksi : Tidak Pucat

Palpasi : Tidak oedema

b. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sklera putih

c. Payudara

Inspeksi : Tampak pembesaran, tidak ada peradangan, dan puting susu menonjol

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, bila dilakukan penekanan pada daerah areola ada pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : Tampak luka bekas operasi tertutup verban

Palpasi : Ada nyeri tekan, TFU 2 jari diatas sympsis

e. Vulva dan perineum

Inspeksi : Tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochea serosa

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan oedema

f. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak varices

Palpasi : Tidak oedema

ASSESSMENT

Masa nifas hari kedelapan dengan *post sectio caessaria*

PLANNING

Tanggal 15 september 2018, pukul 15.20 Wita

1. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya pada saat ini dalam keadaan baik

Hasil : Ibu telah mengetahui kondisinya pada saat ini

2. Menjelaskan pada ibu penyebab masih keluarnya darah dari jalan lahir yaitu disebabkan oleh terjadinya involusi uteri atau proses pengecilan uterus kembali seperti keadaan sebelum hamil.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Memberikan pendidikan kesehatan istirahat yang cukup \pm 8 jam di malam hari dan \pm 2 jam di siang hari

Hasil : ibu bersedia istirahat yang cukup

4. Menjelaskan pada ibu akibat kurang tidur dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan merawat bayi dan dirinya sendiri

Hasil : Ibu mengetahui akibat dari kurang istirahat

5. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin.

Hasil : ibu bersedia memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin

6. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya dengan cara mengganti pakaian bila lembab, basah, kotor dan apabila ibu sudah tidak nyaman lagi dan mengganti pembalut dan pakaian dalam 3-4 jam sekali atau bila keadaan pembalut sudah penuh atau terasa tidak nyaman lagi.

Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

7. Menjelaskan pada ibu tanda-tanda infeksi *post sectio caessaria*

- a. Color (panas)

Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab terdapat lebih banyak darah yang disalurkan ke area terkena infeksi/ fenomena panas lokal karena jaringan-jaringan tersebut sudah mempunyai inti dari hiperemia lokal tidak menimbulkan perubahan.

- b. Dolor (rasa sakit)

Dolor dapat ditimbulkan oleh perubahan PH lokal ion-ion tertentu dapat merangsang ujung saraf. Pengeluaran zat kimia tertentu seperti histamin atau zat kimia bioaktif lainnya dapat merangsang saraf nyeri, selain itu pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dan menimbulkan rasa sakit.

- c. Rubor (kemerahan)

Merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteriol yang mensuplai daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah yang mengalir kedalam mikro sirkulasi lokal.

d. Tumor (pembengkakan)

Pembengkakan ditimbulkan oleh karena pengirisan cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan interstisial.

Hasil : Ibu mengerti dan mengetahui tanda-tanda infeksi

8. Memberikan konseling kontrasepsi pada ibu dengan KB yang tidak mengganggu ASI

- a. Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. Keuntungan efektifitas tinggi, segera efektif, tidak mengganggu senggama, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu biaya
- b. Pil progestin (Mini Pil) bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mengganggu mortalitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Keuntungan: tidak mengganggu senggama, efektif bila digunakan secara benar, kesuburan segera kembali, dapat dihentikan setiap saat, tidak mempengaruhi ASI. Kekurangannya harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama bila lupa 1 maka kegagalan menjadi lebih besar, mual, pusing, timbul jerawat.
- c. Suntik 3 bulan bekerja untuk mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghambat transportasi gamet oleh tuba, membuat selaput dinding rahim tipis. Keuntungannya dapat mencegah kehamilan dalam jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, membantu mencegah Ca endometrium dan kehamilan ektopik. Kekurangannya pasien sangat bergantung pada pelayanan kesehatan, kesuburan terlambat kembali karena

belum habisnya pelepasan obat suntikan depo, kering pada vagina, libido menurun, sakit kepala, timbul jerawat.

d. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) bekerja dengan cara mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, lendir serviks menjadi kental mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keuntungannya daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan dengan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu senggama, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Kekurangannya nyeri kepala, perasaan mual, kepala pusing membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan, perubahan pola haid

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) menghambat kemampuan sperma masuk ke tubafalopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum bertemu. Keuntungan efektifitas tinggi, dapat efektif setelah pemasangan, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal. Kekurangan perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, saat haid terasa lebih nyeri, AKDR dapat keluar dengan sendirinya, tidak mencegah kehamilan ektopik, akseptor harus memeriksa posisi benang AKDR

hasil : ibu mengerti dan ingin memilih kontrasepsi suntik 3 bulan.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY”R” DENGAN *POST SECTIO CAESSARIA* HARI KE 14

DI RUMAH PASIEN, PACCINNONGAN

22 SEPTEMBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 Wita
Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 Wita
Tanggal pengkajian : 22 September 2018, pukul 15.15 Wita
Tempat pengkajian : Rumah pasien, paccinongan

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan ASInya lancar
2. Ibu mengatakan bayinya sering menetek
3. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna kekuning-kuningan
4. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel dan tidur nyenyak

DATA OBJEKTIF

1. Masa nifas hari ke empat belas
2. Keadaan umum ibu baik
3. Ekspresi ibu tampak ceria
4. Kesadaran composmentis
5. TFU tidak teraba, pengeluaran lochea serosa
6. Luka operasi tampak kering
7. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 84 kali / menit

Pernapasan : 23 kali/menit

Suhu : 36,7 °C

8. Pemeriksaan fisik terfokus

Mata	:konjungtiva merah muda , sklera tidak ikterus
Payudara	:puting susu menonjol,tidak ada nyeri tekan, tampak penegeluaran Asi
Abdomen	:tampak luka bekas operasi yang sudah mengering, terdapat nyeri tekan dengan tingkat nyeri ringan yaitu ibu menegerutkan alisnya jika dilakukan penekanan pada daerah abdomen, tidak terdapat push/nanah, suhu dibagian luka bekas operasi kurang lebih sama dengan daerah sekitarnya, serta tida ada bau busuk di daerah bekas luka operasi
Vulva dan perineum	:tidak ada kelainan, tidak ada varices, terdapat pengeluaran lochea serosa
Ekstremitas	:tidak ada varices dan tidak ada oedema

ASSESSMENT

Masa nifas hari keempat belas dengan post sectio caessaria

PLANNING

Tanggal 22 september pukul 15.20 Wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan atau tanda bahaya dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal

Hasil : ibu mengetahui hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa cairan yang keluar dari jalan lahir merupakan cairan normal yang berwarna kekuningan dimasa nifas hari keempat belas

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menganjurkan ibu untuk menghindari stres dengan cara beristirahat yang cukup dan tidak memikirkan banyak hal, karena jika ibu dalam keadaan stres maka proses semua perubahan atau pemulihan dalam diri ibu setelah melahirkan akan terganggu terutam dalam produksi ASI

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan dan bersedia untuk beristiraha yang cukup

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan gizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya

Hasil : ibu bersedia untuk tetap menjaga kebersihan dirinya

6. Menganjurkan ibu untuk tidak memakai pakaian dalam yang tidak ketat atau celana jeans

Hasil : ibu bersedia untuk tidak memakai pakaian yang terlalu ketat

7. Menganjurkan ibu untuk tidak bekerja yang berat-berat

Hasil : ibu bersedia untuk tidak bekerja yang berat-berat

8. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan

Hasil : ibu bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya

9. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan imunisasi bayinya

Hasil: ibu bersedia melakukannya



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE

PADA NY”R” DENGAN POST SECTIO CAESSARIA

DI RUMAH PASIEN, PACCINNONGAN

19 OKTOBER 2018

Tanggal Masuk : 07 September 2018, pukul 08.00 Wita
Tanggal operasi : 07 September 2018, pukul 11.00 Wita
Tanggal pengkajian : 19 Oktober 2018, pukul 15.15 Wita
Tempat pengkajian : Rumah pasien, paccinongan

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny “ R”/ Tn “A”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta

Alamat : Paccinongan

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang
2. Ibu mengatakan sudah membawa bayinya imunisasi tanggal 07 Oktober 2018 di rumah sakit
3. Ibu mengatakan suntik KB pada tanggal 07 Oktober 2018
4. Ibu sudah aktif mengerjakan pekerjaan rumah

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong,
5. Luka bekas operasi sudah kering
6. Mengukur tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Nadi : 80 kali / menit

Pernapasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,7 °C

7. Pemeriksaan fisik

Mata	:konjungtiva merah muda , sklera tidak ikterus
Payudara	:puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, penegluaran Asi lancar
Abdomen	:tampak luka bekas operasi yang sudah mengering, terdapat nyeri tekan dengan tingkat nyeri ringan yaitu ibu menegerutkan alisnya jika dilakukan penekanan pada daerah abdomen, tidak terdapat push/nanah, suhu dibagian luka bekas operasi kurang lebih sama dengan daerah sekitarnya, serta tida ada bau busuk di daerah bekas luka operasi
Vulva dan perineum	:tidak ada kelainan, tidak ada varices,
Ekstremitas	:tidak ada varices dan tidak ada oedema

ASSESMENT

Masa nifas keenam minggu dengan post sectio caessaria

PLANNING

Tanggal 19 oktober 2018,pukul 15.20 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, bahwa ibu dalam kondisi baik
Hasil : ibu mengetahui keadaannya
2. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya dan bayinya


Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihan diri dan bayinya

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun, dan setelah berusia 6 bulan menganjurkan ibu untuk memeberikan makanan pendamping ASI, tetatpi tetap memberikan ASI hingga bayi berusia 2 tahun

Hasil : ibu bersedia memberikan ASI eksklusif

4. Menganjurkan ibu untuk datang kerumah sakit jika masih ingin melanjutkan suntik KB yang digunakan

Hasil : ibu bersedia datang ke rumah sakit



Lembar Follow Up pada Ny”R” dengan *Post Sectio Caessaria*

No	Tanggal	Keluhan	Pemeriksaan fisik	Intervensi	Hasil	Follow Up
1.	07 september 2018	<ol style="list-style-type: none"> Nyeri pada daerah luka bekas operasi Asi belum lancar 	<ol style="list-style-type: none"> Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi Abdomen : tampak luka bekas operasi tertutup verban, nyeri tekan (perut bagian bawah), TFU 1 jari dibawah pusat Genitalia : tidak ada varices, terpasang kateter, tampak pengeluaran lochea rubra, 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur tanda-tanda vital Memberitahu pada ibu penyebab nyeri Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hiegene dengan mengganti pembalut minimal 3kali sehari 	<ol style="list-style-type: none"> Tekanan darah :120/80 mmHg Nadi: 82kali/menit Pernapasan : 22 kali/menit Ibu mengetahui penyebab nyeri Ibu bersedia untuk tetap menyusui bayinya Ibu bersedia menjaga personal hiegene dengan mengganti pembalut 	<ol style="list-style-type: none"> Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk mempercepat penyembuhan luka bekas operasi Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene Memberikan ibu konseling KB

2	08 september 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu masih merasakan nyeri luka operasi saat bergerak 2. Asi belum lancar 3. Ibu sudah platus tapi belum BAB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih 2. Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi 3. Abdomen : tampak luka bekas operasi tertutup verban, nyeri tekan (perut bagian bawah), TFU 2 jari dibawah pusat 4. Genitalia : tidak ada varices, terpasang kateter, tampak pengeluaran lochea rubra, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi 3. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara 4. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah : 120 kali/menit Nadi : 83 kali/menit Pernapasan : 20 kali/menit Suhu : 36,6 °C 2. Ibu sudah melakukan mobilisasi 3. Ibu sudah mengetahui cara perawatan payudara 4. Ibu bersedia untuk selalu menyusui bayinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk mempercepat penyembuhan luka bekas operasi 2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene
3	09 september 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyeri bekas operasi sudah bekurang 2. Ibu mengatakan sudah BAB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih 2. Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah : 120/70 Nadi : 85 kali/menit Pernapasan : 23 kali/permenit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk mempercepat

		3. Asi sudah lancar	<p>putting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi</p> <p>3. Abdomen : tampak luka bekas operasi tertutup verban, nyeri tekan (perut bagian bawah), TFU 3 jari dibawah pusat</p> <p>4. Genitalia : tidak ada varices, aff kateter, pengeluaran lochea rubra,</p>	<p>3. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p>	<p>Suhu : 36,7°C</p> <p>2. Ibu sudah melakukan mobilisasi duduk dan berjalan</p> <p>3. Ibu sudah mengetahui cara perawatan payudara</p> <p>4. Ibu selalu menyusui bayinya secara on demand</p>	<p>pat penyembuhan luka bekas operasi</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene</p> <p>4. Memberikan penjelasan tentang pentingnnya pergerakan (mobilisasi) dalam proses penyembuhan</p>
4	10 september 2018	Nyeri bekas operasi sudah berkurang	<p>1. Mata: konjungtiva merah muda ,sklera putih</p> <p>2. Payudara : hyperpigmentasi</p>	<p>1. Mengukur tanda-tanda vital</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap</p>	<p>1. Tekanan darah : 120/70 Nadi : 85 kali/menit Pernapasan : 23 kali/permenit</p>	<p>1. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk</p>

			<p>areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi</p> <p>Abdomen : tampak luka bekas operasi tertutup verban, nyeri tekan (perut bagian bawah), TFU 3 jari dibawah pusat</p> <p>3. Genitalia : tidak ada varices, pengeluaran lochea sanguinolenta</p>	<p>melakukan mobilisasi</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p>	<p>Suhu : 36,7°C</p> <p>2. Ibu sudah melakukan mobilisasi duduk dan berjalan</p> <p>3. Ibu selalu menyusui bayinya secara on demand</p>	<p>mempercepat penyembuhan luka bekas operasi</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene</p> <p>4. Memberikan penjelasan tentang pentingnnya pergerakan (mobilisasi) dalam proses penyembuhan</p> <p>5. Memberikan konseling tentang KB</p> <p>6. Memberitahu tanda-</p>
--	--	--	--	---	---	---

						<p>tanda infeksi <i>post sectio caessaria</i></p> <p>7. Mengajukan ibu untuk istirahat yang cukup</p>
5	15 september 2018	1. Nyeri yang di rasakan sudah berkurang dari sebelumnya	<p>1. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih</p> <p>2. Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi</p> <p>Abdomen : tampak luka bekas operasi tertutup verban, tidak ada tanda-tanda infeksi nyeri tekan (perut bagian bawah),</p>	<p>1. Mengukur tanda-tanda vital</p> <p>2. Mengajukan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi</p> <p>3. Mengajukan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p> <p>4. Mengajukan ibu untuk istirahat yang cukup</p>	<p>1. Tekanan darah : 120/70 Nadi : 85 kali/menit Pernapasan : 23 kali/permenit Suhu : 36,7°C</p> <p>2. Ibu sudah melakukan mobilisasi</p> <p>3. Ibu selalu menyusui bayinya secara on demand</p> <p>4. Ibu istiahat dengan cukup</p>	<p>1. Mengajukan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi untuk mempercepat penyembuhan luka bekas operasi</p> <p>2. Mengajukan ibu untuk tetap menyusui bayinya</p> <p>3. Mengajukan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene</p>

			<p>TFU 2 jari diatas symphis</p> <p>3. Genitalia : tidak ada varices, pengeluaran lochea serosa</p>			<p>4. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi) dalam proses penyembuhan</p> <p>5. Memberikan konseling tentang KB</p> <p>6. Memberitahu tanda-tanda infeksi <i>post sectio caessaria</i></p> <p>8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup</p> <p>9. Menganjurkan ibu unuk tidak bekerja yang berat-berat</p>
--	--	--	---	--	--	---

6	22 september 2018	Nyeri hanya di rasakan sekali-sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih 2. Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi 3. Abdomen : tampak luka bekas operasi sudah mengering, tidak ada tanda-tanda infeksi, TFU tidak teraba 4. Genitalia : tidak ada varices, pengeluaran lochea serosa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan mobilisasi 3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah : 120/70 Nadi : 85 kali/menit Pernapasan : 23 kali/permenit Suhu : 36,7°C 2. Ibu sudah melakukan mobilisasi 3. Ibu selalu menyusui bayinya secara on demand 4. Ibu istiahat dengan cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 2. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hiegene 3. Memberikan Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 4. Menganjurkan ibu untuk tidak bekerja yang berat-berat
7	19 oktober	Tidak ada keluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih 2. Payudara : hyperpigmentasi areola mammae, puting susu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah : 120/80 Nadi : 80 kali/menit Pernapasan : 22 kali/menit Suhu : 36,7°C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya

			<p>menonjol, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran asi</p> <p>3. Abdomen : tampak luka bekas operasi sudah mengering ,tidak ada tanda-tanda infeksi, TFU tidak teraba</p>	<p>3. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup</p> <p>4. Memberikan konseling KB</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan</p>	<p>2. Ibu sudah menggunakan suntik KB pada tanggal 07 oktober 2018</p> <p>3. Ibu selalu menyusui bayinya secara on demand</p> <p>4. Ibu istiahat dengan cukup</p>	<p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya</p>

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny.”R” dengan Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa, Pada tanggal 07 sampai 10 september 2018. Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis akan membahas berdasarkan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah Varney dengan uraian sebagai berikut :

1. Identifikasi data dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psokosial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi serta pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan da dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Menurut teori yang ada bahwa Seksio Sesarea (SC) dilakukan apabila ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada ibu maupun janin, dengan melalui pembedahan irisan dilakukan melalui perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerektomi).

Berdasarkan studi kasus pada Ny."R" Post Seksio ditemukan data ibu dioperasi Seksio Sesarea (SC) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal akibat ketidak sesuaian antara kepala janin dan ukuran panggul ibu Sehingga harus melakukan tindakan operasi sesar, apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

2. Identifikasi diagnosa / Masalah Aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasar

kan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Pada tinjauan pustaka dikatakan bahwa adanya luka operasi menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan sehingga rangsangan pada saraf meningkat, impuls

nyeri disebabkan ke korteks cerebri sehingga nyeri dipersepsikan. Sedangkan pada studi kasus pada Ny."R" ditemukan kontraksi uterus teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra, TFU 1 jari bawah pusat, dan nyeri yang dirasakan ibu pada daerah abdomen saat bergerak sehingga ditegakkan diagnosa Masa Nifas dengan Post Seksio Sesarea

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny."R" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu nyeri pada daerah bekas Seksio Sesarea (SC), sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

3. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa keadaan nyeri luka operasi kemungkinan dapat terjadi infeksi apabila tidak ditangani dengan baik.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny."R" dilahan praktek dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu terjadi infeksi. Dengan demikian penerapan tinjauan dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny."R" nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

4. Tindakan segera / kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada Post Seksio caessar tindakan segera dilakukan apabila ada perdarahan Post Seksio Sesarea (SC), tetapi pada studi kasus Ny”R” dengan Post Seksio Sesarea (SC) yang dilakukan yaitu pemberian asam mefenamat dosis 3 kali sehari sebagai obat analgetik dan antiinflamasi. Cefadroxil 6 tablet dosis 3 kali sehari sebagai antibiotik dengan spectrum luas, efekmelawan gram negatif maupun positif, tablet penambah darah dosis 1 kali sehari, diberikan untuk membentuk sel darah merah serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan pada teori dan kasus yang didapatkan

5. Rencana Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana

tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Pada studi kasus Ny”R” dengan Post Seksio Sesarea (SC) , penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu istirahat yang cukup, anjurkan ibu makan-maksan yang bergizi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, berikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah/kotor, jelaskan penyebab nyeri, anjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, lakukan perawatan payudara, observasi keadaan luka, observasi pemberian infus, observasi kandung kemih dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan, pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada pada Ny”R”.

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada studi kasus Ny”R” dengan Post Seksio Sesarea (SC) , semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang nifas di RSUD Syekh Yusuf

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi : luka insisi/operasi kering, nyeri pada daerah bekas operasi berkurang, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, nyeri, dan panas.

Berdasarkan studi kasus Ny”R” Post Seksio Sesarea (SC) tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny”R” secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan.

Dokumentasi Kunjungan Rumah



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny”R” dengan Post seksio caessar (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis data Ibu Post Partum Pada Ny”R” Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil ditemukan data bahwa ibu telah dioperasi Seksio Sesarea (SC) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal akibat ketidak sesuaian ukuran kepala janin dan ukuran panggul ibu.
2. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Ibu Post Partum Pada Ny”R” Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD syekh yusuf Gowa dengan hasil yaitu dapat menimbulkan nyeri pada daerah bekas Seksio Sesarea (SC).
3. Merumuskan diagnosa/masalah potensial Ibu Post Partum Pada Ny”R” Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu keadaan nyeri pada luka operasi memungkinkan terjadinya infeksi apabila tidak ditangani dengan baik.

4. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi Ibu Post Partum Pada Ny”R“ Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu tidak dilakukan tindakan segera mengingat keadaan pasien pada saat pelaksanaan manajemen tidak dalam keadaan darurat atau bahaya.
5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan Ibu Post Partum Pada Ny”R“ Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil penulis merencanakan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial.
6. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada Ibu Post Partum Pada Ny”R“ Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa Makassar dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ibu Post Partum Pada Ny”R“ Post Seksio Sesarea (SC) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.

B. Saran

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan pada setiap ibu Post Seksio Sesarea (SC) agar senantiasa menjaga kebersihan diri terutama pada daerah bekas operasi agar luka tidak terkena kotoran untuk mencegah timbulnya infeksi.
 - b. Diharapkan kepada ibu agar mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayuran hijau, lauk-pauk dan buah, dengan memperhatikan makanan yang bergizi agar ibu sehat sehingga akan membantu luka cepat kering dan sembuh.

- c. Diperlukan keterlibatan suami / keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara ibu dan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan di rumah.

2. Untuk Bidan

- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan sangat berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan memberikan konseling ANC untuk mempersiapkan persalinan dan kemungkinan komplikasi.
- b. Sebagai bidan diharapkan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- c. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara petugas profesional lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) agar proses berjalan dengan mudah.
- d. Sebagai tenaga bidan yang profesional dan muslimah harus dapat memberikan dukungan motivasi serta banyak berdo'a selama proses persalinan berlangsung.
- e. Perlunya bukti pertanggung jawaban petugas kesehatan terhadap semua asuhan yang diberikan maka setiap tindakan yang dilakukan harus didokumentasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson, Ralp C dan Martin L pernold. *Obsteri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC, 2013
- Chapman, V & Charles, C. *Persalinan dan Kelahiran*. Jakarta : EGC.2013
- Dube, JV,dkk, *Effect of Planned Early Ambulation on Selected Postnatal Activities of Postcaeserean Patients*. Journal international : Pdf. 2013
- Hamdani, M. *Pendidikan Agama Islam (Islam dalam kebidanan)*. Jakarta: TIM. 2012
- Heryani, Reni. *Asuhan kebidanan ibu Nifas Dan Menyusui*. Jakarta Timur: CV Trans Info Media. 2012
- Histriani, Lila. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny”S” PIA0 dengan Post Sectio Caessarea di bangsal Dahlia RSUD Pandanarang Boyolali*. Surakarta :KTI pdf. 2012
- Holmes, D & Baker, PN. *Buku Ajar Ilmu Kebidanan*. Jakarta: EGC.2012
- Kemenkes RI. “*Pusat Data dan Informasi Kementrian kesehatan RP*”. Jakarta. 2014.
- Maritalia, D. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas “peuperium care”*.yogyakarta: pustaka pelajar.2012
- Maryati,Ika. *Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas Post Sectio Caessarea di RSU Rachma husada Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta : pdf.2015
- Meeta, M & Garg, V. *The rate and indications of caesarean section*. Journal international: Pdf. 2017
- Nugroho, Dr T, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 3 Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.2014
- Nurjannah,dkk. *Asuhan Kebidanan Postpartum di lengkapi dengan Asuhan Kebidanan Post Sectio Caessarea*. Bandung : PT Refika Aditama. 2013

Purwoastuti, E & Walyani, ES. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.2015

Roito H, J, dkk. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: EGC. 2013

Saleha, S. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakarta: Salemba.2009

Shihab,M, Quraish. *Tafsir Al-misbah*.jakarta :lentera hati.2002

Utami, Tri. *Asuhan kebidanan pada ibu nifas Post sectio caessarea di RSUD Rachma Husada Bantul yogyakarta*. Surakarta : KTI pdf. 2015

WHO (*World Health Organization*), *pernyataan WHO tentang caessarea*. Swiss : Pdf. 2014

Yanti, D & Sundawati,D. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Belajar Menjadi Bidan Professional*. Bandung : PT Refika Aditama. 2014



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. I.I.M. Yasin Limpo No. 36 Samal -Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/07/2017

Gowa, 31 Juli 2017

Lamp : - 2019 - 1

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel.
 di-
 Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Rafida Novianti
 NIM : 70400114071
 Program Studi : Kebidanan
 Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
 Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
 2. dr. Hj. Dewi Seliawati, Sp. OG., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
 an. **Dekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
 NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 4422/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2494/FKIK/PP.00.9/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RAFIDA NOVIANTI**
Nomor Pokok : 70400114071
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Agustus s/d 02 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu**



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Fertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 10 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 070/1460/BKB.P/2018

Yth. Direktur. RSUD Syekh Yusuf

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 4422/S.01/PTSP/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Penelitian..

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RAFIDA NOVIANTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 02 November 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Barawaja 2 Lr. 2

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA"**

Selama : 06 Agustus s/d 02 September 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:254/Diklat.RSUD-SY/ IX /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Rafida Novianti
 N i m : 70400114071
 Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perawatan Nifas (PNC) Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Dengan Post Sectio Caesaria Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018* " pada 18 Agustus 2018 S/D 21 Agustus 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
 M A K A S S A R A

Sungguminasa, 04 September 2018

Ketua Diklat
 Koordinator Bagian Penelitian

Dra. Hj. Ramliati Raur, Bsc. MMRS
 Nip. 196807101987032019

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Rafida Novianti
 Nim : 7040114071
 TTL : Sinjai, 02 Nobember 1994
 Suku : Bugis
 Agama : Islam
 Alamat : Palae Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai Prov.Sulawesi
 Selatan
 Nama Orang Tua :
 Ayah : ALLO
 Ibu : Hj.Harliah, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 SDN 224 Salenrang
2. Tahun 2007-2010 SMPN 2 Sinjai Selatan
3. Tahun 2010-2013 SMAN 1 Sinjai Timur
4. Tahun 2014-2018 UIN Alauddin Makassar