

UJI AKTIVITAS INHIBITOR ENZIM TIROSINASE EKSTRAK

N-HEKSAN UMBI WORTEL (*Daucus carota L.*)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

HASRAWATI
NIM: 70100115014

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasrawati
NIM : 70100115014
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 20 Mei 1996
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Manuruki Raya Lorong 3A
Judul : Uji Aktivitas Inhibitor Enzim Tirosinase
EkstrakN-Heksan Umbi Wortel (*Daucus
Carrota L.*)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, November 2019

Penyusun

Hasrawati
NIM. 7010011514

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Akitivitas Inhibitor Enzim Tirosinase Ekstrak N-Heksan Umbi Wortel (*Daucus carrota L.*)” yang disusun oleh **Hasrawati**, NIM: 70100115014, Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 November 2019 M yang bertepatan dengan 14 Rabi’ul Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 11 November 2019 M
14 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Inhibitor Enzim Tirosinase Ekstrak N-Heksan Umbi Wortel (*Daucus carrota L.*)”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ante dan Ibunda tercinta Nasra yang tak henti-hentinya member doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Selesainya penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Asrul ismail, S.Farm., M.Sc., Apt selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt selaku sekretaris jurusan Farmasi sekaligus pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt selalu pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt dan Dr. H. Saleh Ridwan, M. Ag selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Prodi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan segala sesuatu yang bernilai manfaat bagi penulis selama proses studi.
9. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, November 2019

Penulis,

Hasrawati

NIM. 70100115014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	3
C. DefinisiOperasionaldanRuangLingkup.....	4
D. KajianPustaka.....	4
E. TujuanandanManfaatPenelitian	6
BAB II TEORI UMUM	
A. UraianTanamanWortel.....	8
B. Ekstraksi.....	11
C. AnatomiFisiologiKulit	13
D. Melanin	19
E. Enzim	22
F. EnzimTirosinase.....	26
G. Inhibitor Tirosinase	27
H. AsamKojat.....	29

I. Microplate Reader.....	30
J. Tinjauan Islam.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Alat dan Bahan	35
F. Prosedur Pengerjaan.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR ISI.....	50
RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil ekstraksi Umbi wortel	41
Tabel 2. Hasil identifikasi golongan senyawa umbi wortel.....	42
Tabel 3. Hasil persen inhibitor ekstrak n-heksan umbi wortel.....	42
Tabel 5. Hasil persen inhibitor kontrol positif asam kojat.....	43
Tabel 5. Hasil nilai IC ₅₀ Ekstrak N-heksan Umbi Wortel	43
Tabel 6. Sampel Ekstrak umbi wortel.....	62
Tabel 7. Kontrol positif AsamKojat.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian	53
Lampiran 2. Penyiapan sampel	54
Lampiran 3. Pembuatan larutan uji	55
Lampiran 4. Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase.....	57
Lampiran 5. Pengujian Identifikasi Golongan Kimia	58
Lampiran 6. Hasil perhitungan.....	59
Lampiran 7. Penyiapan dan ekstraksi sampel	59
Lampiran 8. Gambar hasil identifikasi golongan senyawa kimia ekstrak n-heksan umbi wortel (<i>Daucus carrota L</i>)	66
Lampiran 9. Gambar pengujian inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (<i>Daucus carrota L</i>).....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Umbi wortel (<i>Daucuscarrota L</i>)	8
Gambar 2. Anatomi kulit.....	13
Gambar 3. Tipe-tipe kulit.....	19
Gambar 4. Proses pembentukan melanin	21
Gambar 5. Enzim berikatan dengan subtrat	23
Gambar 6. Jenis-jenis enzim	23
Gambar 7. Reaksi oksidasi dengan katalis enzim tirosinase.....	26
Gambar 8. Kurva ekstrak umbi wortel.....	63
Gambar 9. Kurva Asam kojat.....	64



ABSTRAK

NAMA : Hasrawati

NIM : 70100115014

Jurusan : Farmasi

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak N-Heksan Umbi Wortel (*Daucus carrota L.*)

Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L.*) mengandung senyawa flavonoid dan betakaroten golongan senyawa terpen yang merupakan senyawa yang dapat berpotensi untuk menghambat adanya tirosinase. Adanya inhibitor akan mengurangi dan menghentikan aktivitas tirosinase dalam memproduksi melanin yang nantinya akan mempengaruhi warna kulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar aktivitas n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L.*) dalam menghibisi reaksi tirosin-tirosinase melalui nilai IC_{50} dengan konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, dan 50 ppm. Pada penelitian ini, pengujian aktivitas enzim tirosinase memberikan hasil akhir berupa DOPAchrome yang dapat menyerap energi sinar tampak yang dilakukan dengan menggunakan *ELISA reader* pada panjang gelombang 490 nm, dengan menggunakan asam kojat sebagai control positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L.*) memiliki aktivitas sebagai inhibitor tirosinase dengan rata-rata persen inhibitor berturut-turut yaitu 39,7 %, 40,2 %, 42,3 %, 42,3 %, 46,8 %, 47 %, 47,8 %, 48,5 %, dan 48,9 %. Ekstrak n-heksan umbi wortel memiliki nilai IC_{50} yaitu 50 $\mu\text{g/mL}$. Sedangkan asam kojat memiliki nilai IC_{50} sebesar 20 $\mu\text{g/mL}$. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan umbi wortel memiliki aktivitas yang paling kuat sebagai inhibitor tirosinase.

Kata kunci: Ekstrak n-heksan umbi wortel, tirosinase, IC_{50}

ALA UDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Hasrawati
Registration Number : 70100115014
Departement : Pharmacy
The title of Thesis : Test Tyrosinase Inhibition Activity of N-heksan Extract from Carrot Tuber (*Daucus carrota L.*)

A study concerning test tyrosinase inhibition activity of n-heksan extract from Carrot tuber that Carrot tuber (*Daucus carrota L.*) contain flavonoid and beta karoten which can be inhibited the tyrosinase enzyme activity. The presence of an inhibitor that will reduce and stop tyrosinase activity in producing melanin needed will increase skin color. In this research, testing of tyrosinase enzyme activity produces the final result DOPAchrome which can absorb visible light energy using ELISA reader at a wavelength of 490 nm using kojic acid as positive control. The purpose of this study was to study the large activity of Carrot tubern-heksan(*Daucus carrota L.*) in feeding the tyrosine-tyrosinase reaction through IC_{50} value data using positive control of kojic acid with a measurement sequence of 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, and 50 ppm. The results showed that Carrot tubern-heksan extract (*Daucus carrota L.*) had acted as a tyrosinase inhibitor with an average percentage of inhibitors involved, namely 39,7 %, 40,2 %, 42,3 %, 42,3 %, 46,8 %, 47 %, 47,8 %, 48,5 %, and 48,9 %.. Carrot tubern-heksan extract has an IC_{50} value of 50 $\mu\text{g} / \text{mL}$. While the IC_{50} value of kojic acid was 20 $\mu\text{g} / \text{mL}$. This swohs that n-heksan extract of Carrot tuber has the strongest activity inhibited the tyrosinase.

Keywords: N-heksan Extract from Carrot tuber, tyrosinase, IC_{50}



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam daerah sekitar katulistiwa dan daerah tropis dengan luas daratan hampir 2 juta, dikaruniai penyinaran matahari lebih dari 6 jam dalam sehari atau sekitar 2.400 jam dalam setahun. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi (Manan, 2009).

Banyak orang Asia yang tinggal didaerah timur terpapar sinar matahari sepanjang tahun. Oleh karena itu, rentan terkena *photodamage* dan *photoaging*. Beberapa studi populasi Asia mendemonstrasikan perubahan pigmen sebagai komponen utama dari *photoaging*. Dalam study Goh, karakteristik dari *photoaging* di Asia yang konsisten di Cina, Indonesia dan Malaysia (Cheryl, 2005).

Matahari mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, disamping fungsinya tersebut matahari memiliki radiasi sinar UV yang dapat berbahaya bagi kulit seperti warna kulit menjadi lebih gelap, eritema dan kulit terbakar, ada juga efek yang baru muncul setelah jangka waktu yang lama seperti pengerutan kulit, penuaan dini hingga masalah yang paling serius timbulnya kanker. Kulit secara alami mampu melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berbahaya bagi kulit yang disebut melanin. Melanogenesis merupakan proses pembentukan melanin pada sel. Proses pembentukan melanin ini akan lebih cepat terjadi apabila terpapar sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet disingkat sinar UV terbagi menjadi 3 jenis yaitu ultraviolet A (UVA), ultraviolet B (UVB) dan ultraviolet C (UVC).

Melanin adalah zat yang memberikan warna coklat atau coklat kehitaman pada kulit. Pembentukan melanin akan lebih cepat apabila enzim tirosinase bekerja secara aktif dengan dipicu oleh sinar ultraviolet. Pembentukan melanin dapat dihambat dengan beberapa cara, diantaranya menurunkan sintesis tirosinase, menurunkan transfer tirosinase dan menghambat aktivitas tirosinase (Hartanti dan Setiyawan 2009). Oleh karena itu, untuk mengurangi efek hiperpigmentasi dibutuhkan zat aktif yang berguna sebagai inhibitor tirosinase. Senyawa yang menjadi inhibitor tirosinase adalah senyawa golongan flavonoid yang biasanya banyak terdapat pada tumbuhan. Selain beberapa senyawa turunan flavonoid, hidroquinon, arbutin dan asam askorbat atau lebih dikenal dengan vitamin C juga dapat menghambat aktivitas enzim tirosinase.

Kulit yang sehat dan cerah merupakan idaman bagi semua orang terutama kaum perempuan. Oleh karena itu, banyak dari mereka menggunakan kosmetik pemutih yang telah banyak beredar atau kita jumpai dipasaran. Tetapi ada pula kosmetik yang tidak terdaftar BPOM atau kosmetik ilegal. Selama tahun 2018 BPOM RI menemukan 113 merek kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya, diantaranya kosmetik krim pemutih, kosmetik tabir surya, lipstik, mascara, *concealer*, *liner*, dan *body lotion* dari berbagai merk.

Wortel selain bermanfaat untuk kesehatan juga bermanfaat untuk kecantikan kulit. Secara turun temurun sampai saat ini wortel di gunakan sebagai masker yang dipercaya dapat mengurangi jerawat, *anti aging*, perawatan kulit kering, melindungi kulit dari sinar matahari, serta mencerahkan kulit. Di daerah dataran tinggi seperti Malino merupakan penghasil berbagai jenis sayuran seperti wortel, Selain dijual untuk menambah perekonomian, masyarakat di sana juga memanfaatkan wortel sebagai masker yang ditambahkan dengan bahan lain. Wortel dengan nama latin *Daucus carrota L* termasuk sayur-sayuran yang

memiliki berbagai macam manfaat. Selain bahan makanan dan obat-obatan, umbi atau akar wortel dapat digunakan untuk keperluan kosmetik. Wortel mengandung keratenoid yang berfungsi sebagai antioksidan (Cahyono,2006).

Menurut penelitian M.R Ghozaly, E.B. Safitri (2016) yang berjudul *Uji Aktifitas Antioksidan Ektrak N-Heksan, Etil Asetat, Dan Methanol dari Varietas Umbi Wortel (Daucus Carrota L) dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari beberapa varietas wortel dan menggunakan variasi pelarut yaitu n-heksan, etil asetat, dan methanol dengan mengekstraksi dengan metode maserasi. Pengukuran antioksidan dilakukan dengan metode DPPH menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Hasil uji aktivitas antioksidan pada varietas umbi wortel menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan, etil asetat, dan methanol memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC_{50} berturut turut pada wortel chantenay 108,437 $\mu\text{g/ml}$, 534,465 $\mu\text{g/ml}$, 517,93 $\mu\text{g/ml}$. pada wortel imperator 335,652 $\mu\text{g/ml}$, 309,15 $\mu\text{g/ml}$, 229,81 $\mu\text{g/ml}$. dan pada wortel nantes 560,6 $\mu\text{g/ml}$, 160,08 $\mu\text{g/ml}$, 488,98 $\mu\text{g/ml}$.

Berdasarkan uraian diatas, wortel memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Namun belum ada penelitian ilmiah yang menguji aktivitas dan potensi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas potensi ekstrak wortel (*Daucus carrota L*) sebagai inhibitor enzim tirosinase.

B. Rumusah masalah

1. Apakah ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase?
2. Berapa persen aktivitas tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*)?

3. Berapakah nilai IC_{50} inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota L*)?

C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian

1. Definisi operasional

- a. Wortel adalah tanaman sayuran umbi semusim banyak mengandung betakaroten yang ada didalam tubuh manusia yang dimetabolisme menjadi vitamin A. selain berkhasiat sebagai obat-obatan juga digunakan untuk kosmetik.
- b. Ekstrak adalah sediaan pekat hasil dari simplisia yang diekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai kemudian pelarut diuapkan.
- c. Melanin merupakan pigmen pada kulit yang di bentuk oleh melanosit dengan bantuan tirosinase yang dipercepat oleh paparan sinar UV.
- d. Enzim merupakan biokatalisator yaitu senyawa yang mempercepat proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi.
- e. Tirosinase adalah enzim yang berperan dalam proses pembentukan melanin
- f. Inhibitor tirosinase adalah penghambatan kerja enzim tirosinase dalam proses pembentukan pigmen pada kulit.

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Pendidikan Univertisas Hasanuddin.

D. Kajian Pustaka

Almunady T. Panagan (2011) yang berjudul *Pengaruh Penambahan Tepung Wortel (*Daucus carrota L*) Terhadap Bilangan Peroksida dan Asam Lemak Bebas pada Minyak Goreng Curah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung wortel terhadap bilangan peroksida dan asam lemak bebas pada minyak goreng curah kelapa sawit yang dibandingkan dengan BHT, dan mengetahui keefektifan tepung wortel sebagai antioksidan. Hasil penelitian pada hari ke 16 menunjukkan bahwa bilangan peroksida C₀ 2,9333 mek/kg, C₁ 2,2667 mek/kg, C₂ 1,6667 mek/kg, C₃ 1,4000 mek/kg, dan BHT 1,8000 mek/kg. berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa tepung wortel mengandung zat yang bersifat antioksidan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Donglin Zhang and Yasunori Hamazu (2004) yang berjudul *Phenolic compounds and their antioxidant properties in different tissues of carrots (*Daucus carota L.*)* penelitian tersebut menentukan senyawa fenolik pada wortel yang berpotensi sebagai antioksidan. Penelitian ini mengambil sampel kulit, xylem, dan floem pada wortel kemudian di analisis menggunakan metode HPLC hasilnya semua komposisi fenolik dalam jaringan yang berbeda adalah sama, tetapi kandungan senyawa fenolik yang bervariasi. Senyawa fenolik yang dihasilkan yaitu asam hydroxycinnamic dan turunannya seperti asam klorogenat, asam caffeic, asam 3'-caffeoylquinic, asam 4'-p-coumaroylquinic, asam 4'-dicaffeoylquinic, 3', asam 5'-dicaffeoylquinic dan beberapa turunan hydroxycinnamic tak dikenal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irmanida dan Morina (2013) yang berjudul *"Potensi Daun Kayu Bawang (*Protium javanicum*) sebagai Penghambat Kerja Enzim Tirosinase"* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi daun kayu bawang sebagai penghambat enzim tirosinase yang diekstraksi dengan

methanol dengan asam kojat sebagai kontrol positif. Ekstrak metanol kemudian dipartisi dengan n-heksana, etil asetat, n-butanol, dan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-heksana menghambat kerja reaksi difenolase pada enzim tirosinase dengan nilai IC₅₀ sebesar 114,2 ppm, dan fraksi etil asetat mampu menghambat reaksi monofenolase enzim tirosinase (IC₅₀ 834,0 ppm).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mustika Weni (2014) yang berjudul "*Aktivitas Penghambatan Ekstrak Sirih Merah (Piper crocatum) terhadap Pembentukan Malondialdehida (MDA) dan Enzim Tirosinase*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol sirih merah konsentrasi 200 ppm memiliki daya hambat pembentukan malondialdehid (MDA) sama besar ($\alpha > 0.05$) dengan vitamin E, ekstrak n-heksana konsentrasi 200 ppm memiliki daya hambat pembentukan malondialdehid (MDA) sama besar ($\alpha > 0.05$) dengan vitamin E. Aktivitas penghambatan tirosinase menunjukkan bahwa ekstrak etanol sirih merah memiliki nilai IC₅₀ sebesar 1655 ppm sedangkan ekstrak n-heksana sirih merah memiliki nilai IC₅₀ sebesar 3090.56 ppm.

E. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase.
- b. Untuk mengetahui persen aktivitas inhibitor ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*)
- c. Untuk mengetahui nilai IC₅₀ inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*)

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Memberikan informasi berupa data ilmiah mengenai aktivitas inhibitor tirosinase dan data ilmiah nilai IC_{50} inhibitor tirosinase serta nilai persen aktivitas inhibitor ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) ekstrak kulit wortel (*Daucus carrota L*).

b. Secara aplikatif

Diharapkan dapat menjadi data awal untuk dikembangkan menjadi penelitian lebih lanjut misalnya sebagai dasar pembuatan kosmetik pencerah berbahan dasar umbi wortel (*Daucus carrota L*).



BAB II

TINJAUAN TEOROTIS

A. Uraian Tanaman Wortel

1. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Rosidae
Ordo	: Apiales
Family	: Apiaceae
Genus	: <i>Daucus</i>
Spesies	: <i>Daucus Carrota L.</i> (Tjitrosoepomo, 2013)

2. Morfologi



Gambar 1. Umbi wortel (*Daucus carrota L.*)

Wortel adalah tanaman sayuran umbi semusim merupakan tumbuhan biennial (siklus hidup 12-24 bulan) yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk keperluan pertumbuhan/berbunga pada tahun kedua. Tanaman ini berbentuk perdu yang tumbuh tegak dengan tinggi 30-100 cm atau lebih. Sistem perakaran tunggang dan serabut. Batang pendek, basah, berbentuk bulat, dan umumnya berwarna hijau. Daun majemuk, menyirip ganda dua atau tiga, dan bertangkai. Bunga berbentuk payung berganda dan berwarna putih atau merah jambu agak pucat. Biji berkeping dua, berbentuk bulat pipih, dan berwarna kecoklatan. Bagian yang biasa dimakan adalah umbi akar. Umbi akar berwarna jingga dan berasa manis (Latief, 2012).

Di Indonesia wortel dikenal dengan beberapa sebutan tergantung pada daerahnya diantaranya Boktel (Melayu), Bortol (Sunda), Ortel (Madura), Wortol (Jawa). Adapun beberapa sebutan wortel diluar negeri seperti Wortel (Belanda), hu lao bo (China), Carrot (Inggris), Karotte (Jerman), Dang geun (korea), dan Khaerot (Thailand) (Latief, 2012).

3. Kandungan wortel

Pigmen : alpha-carotene, betakaroten, beta-cryptoxanthin, lutein, lycopene.

Phytochemical lainnya : apigenin, pinene, terpinene, terpineol, d-limonene, myricetin, asam caffeic, asam p-ceumaric, asam chlorogenic.

Kandungan vitamin dan mineral : vitamin A, Vitamin C, Potasium, Kalsium

Kandungan serat (James, 2008).

Hasil skrinning fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak umbi wortel (*Daucus carrota L*) mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, dan terpenoid (Widya, 2011).

4. Jenis wortel

Cahyono (2006) mengatakan bahwa pada awalnya hanya dikenal beberapa varietas wortel, namun dengan berkembangnya peradaban manusia dan teknologi, saat ini telah ditemukan varietas-varietas baru yang lebih unggul dari pada generasi-generasi sebelumnya. Varietas-varietas wortel terbagi menjadi 3 kelompok yang berdasarkan pada bentuk umbi, yaitu tipe Imperator, Chantenay, dan Nantes.

a. Tipe Imperator

Umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing (menyerupai kerucut), panjang umbi 20-30 cm, dan rasa yang kurang manis sehingga kurang disukai oleh konsumen.

b. Tipe Chantenay

Umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul, panjang antara 15-20 cm, dan rasa yang manis sehingga disukai oleh konsumen.

c. Tipe Nantes

Umbi berbentuk peralihan antara tipe Imperator dan tipe Chantenay, yaitu bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau berbentuk bulat agak panjang dengan ukuran panjang 10-15 cm. Dari ketiga kelompok tersebut, varietas yang termasuk ke dalam kelompok chantenay yang dapat memberikan hasil (produksi) paling baik, sehingga paling banyak dikembangkan.

5. Manfaat wortel

Wortel merupakan tanaman dengan berkaroten terkaya, unsur yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan sel. Sementara vitamin A dalam wortel membantu dalam menjaga kesehatan mata, kulit, dan rambut, serta memperbaiki

sistem imun tubuh. Kalsiumnya menjaga kesehatan tulang dan gigi serta membantu kerja berbagai otot dan saraf (Aprilia, 2007).

Manfaat wortel yaitu berguna untuk memenuhi kebutuhan kalsium, anti kanker, mengatasi amandel, gangguan pernapasan, antioksidan, meningkatkan imunitas, dan menghaluskan kulit. Zat yang terdapat dalam wortel juga berguna buat reproduksi, dalam hal ini mengatasi kemandulan & menyuburkan organ reproduksi. Wortel juga baik untuk kesehatan mata, karena mencegah rabun senja dan memulihkan penglihatan lemah. Di dalam wortel juga terdapat pektin yg baik untuk menurunkan kolestrol dalam darah. Serat yang tinggi juga bermanfaat mencegah terjadinya konstipasi alias susah buang air. Wortel juga dapat mengatasi gangguan kulit, seperti jerawat, bengkak bernanah, dan kulit kering (Depkes RI, 2009).

B. Ekstraksi

1. Definisi

Ekstraksi adalah proses mendapatkan ekstrak kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Ditjen POM, 2000)

2. Jenis jenis ekstraksi

a. Cara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan

pengadukan yang kontinyu. Remaserasi berarti dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya.

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlahnya pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4) Infus


Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infuse tercelup dalam penangas air mendidih, tempertur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit)

c. Destilasi Uap

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap (minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinyu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. (Ditjen POM, 2000)

C. Anatomi fisiologi kulit

1. Struktur kulit



Gambar 2. Anatomi kulit

Kulit adalah selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Luas kulit pada manusia rata-rata ± 2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak (Tranggono, 2007).

Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu epidermis (kulit ari) sebagai lapisan yang paling luar dan Dermis, sedangkan subkutis atau jaringan lemak terletak dibawah dermis.

a. Epidermis

Epidermis terdiri atas 5 lapisan sel penghasil keratin (keratinosit) yaitu:

1. Stratum basal (stratum germinativum) terdiri atas selapis sel kuboid atau silindris basofilik yang terletak di atas lamina basalis pada perbatasan epidermis – dermis.
2. Stratum spinosum, terdiri atas sel-sel kuboid, atau agak gepeng dengan inti ditengah dan sitoplasma dengan cabang-cabang yang terisi berkas filament.
3. Stratum granulosum, terdiri atas 3-5 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granula basofilik kasar.
4. Stratum lusidum, tampak lebih jelas pada kulit tebal, lapisan ini bersifat translusens dan terdiri atas lapisan tipis sel epidermis eosinofilik yang sangat gepeng
5. Stratum korneum, lapisan ini terdiri atas 1–20 lapis sel gepeng berkeratin tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi skleroprotein filamentosa birefringen, yakni keratin (Junqueira, 2007).

b. Dermis

Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, stratum papilare di sebelah luar dan stratum reticular yang lebih dalam.

1. Stratum papilar, terdiri atas jaringan ikat longgar, fibroblas dan sel jaringan ikat lainnya terdapat di stratum ini seperti sel mast dan 11 makrofag. Dari lapisan ini, serabut lapisan kolagen khusus menyelip ke dalam lamina basalis dan meluas ke dalam dermis. Serabut kolagen tersebut mengikat dermis pada epidermis dan disebut serabut penambat.
2. Stratum retikular, terdiri atas jaringan ikat padat tak teratur (terutama kolagen tipe I), dan oleh karena itu memiliki lebih banyak serat dan lebih sedikit sel dari pada stratum papilar (Junqueira, 2007).

Dermis kaya dengan jaring-jaring pembuluh darah dan limfa. Di daerah kulit tertentu, darah dapat langsung mengalir dari arteri ke dalam vena melalui anastomosis atau pirau arteriovenosa. Pirau ini berperan sangat penting pada pengaturan suhu. Selain komponen tersebut, dermis mengandung beberapa turunan epidermis, yaitu folikel rambut kelenjar keringat dan kelenjar sebacea (Junqueira, 2007).

c. Jaringan lemak

Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ - organ di bawahnya, yang memungkinkan kulit bergeser di atasnya. Hipodermis sering mengandung sel-sel lemak yang jumlahnya bervariasi sesuai daerah tubuh dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan status gizi yang bersangkutan. Lapisan ini juga disebut sebagai jaringan subkutan dan jika cukup tebal disebut panikulus adiposus (junqueira, 2007).

2. Warna kulit

Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam. Warna kulit terutama ditentukan oleh:

- a. Oxyhemoglobin yang berwarna merah.
- b. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan.
- c. Melanin yang berwarna coklat.
- d. Keratohyalin yang memberikan penampakan opaque pada kulit.
- e. Lapisan-lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan (Kusantati, 2008).

Dari semua bahan pembangun warna kulit itu, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit. Semakin banyak melanin yang terbentuk, maka semakin gelap kulit tersebut. Melanin adalah pigmen alamiah kulit yang memberikan warna coklat. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino dan dengan oksidasi tirosin diubah menjadi butiran-butiran melanin yang berwarna coklat, serta untuk proses ini perlu adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau dibawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran dan distribusi pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan-lapisan benih (Kusantati, 2008).

Pembentukan melanosom di dalam melanosit melalui 4 fase yaitu sebagai berikut:

- a. Fase I permulaan pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase, diliputi membran dan berbentuk vesikula bulat.

- b. Fase II disebut pramelanosom, pembentukan belum sempurna belum terlihat adanya pembentukan melanin.
- c. Fase III mulai nampak adanya deposit melanin di dalam membran vesikula. Disini mulai terjadi melanisasi melanosom.
- d. Fase IV deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partikel - partikel padat dan berbentuk sama (Tranggono, 2007).

Ada 2 macam pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi diantaranya:

- a. Eumelanin memberikan warna gelap, terutama hitam, coklat dan variasinya, serta mengandung nitrogen.
- b. Feomelanin memberikan warna cerah, kuning sampai merah, mengandung nitrogen dan sulfur (Tranggono, 2007).

3. Eritema dan pigmentasi

Eritema atau sunburn adalah bentuk luka bakar yang mempengaruhi jaringan kulit yang disebabkan oleh paparan radiasi sinar UV berlebih. Biasanya gejala normal terdiri dari kulit kemerah-merahan dan panas jika disentuh (Roshni dkk, 2014).

Kulit yang terpapar sinar matahari selama antara 6-20 jam akan menghasilkan eritema yang cepat atau lambat menimbulkan pencoklatan kulit (tanning). Tanning cepat tampak jelas 1 jam setelah kulit terpapar matahari dan kemudian akan hilang kembali dalam waktu 4 jam. Di sini tidak tampak adanya pembentukan melanosom baru. Tanning lambat terjadi 48-72 jam setelah kulit terpapar sinar UV-A. Hal ini disebabkan oleh pembentukan melanosom-melanosom baru secara perlahan, dan baru terlihat dalam waktu 72 jam (Tranggono, 2007).

Reaksi kulit yang terkena sinar UV adalah kerusakan kulit seperti *sunburn* tetapi dapat memicu mekanisme pertahanan untuk mengembalikan kerusakan dan meningkatkan produksi melanin untuk mencegah kerusakan. Melanin menyerap cahaya gelombang UV bertindak sebagai *photoprotectant*. Derajat *sunburn* yang ditimbulkan digolongkan menjadi empat, yaitu:

a. Superficial (*First-Degree*)

Luka bakar tingkat pertama hanya melibatkan epidermis, seperti sengatan matahari, nyeri dan kering. Luka bakar tingkat pertama biasanya sembuh dalam 5-10 hari.

b. Burns Superficial (*Superficial Second-Degree*)

Luka bakar derajat kedua melibatkan epidermis dan sampai bagian dermis. Ditandai dengan melepuh, basah dan pucat ketika disentuh. Luka bakar ini sembuh dalam waktu dua minggu dan umumnya tidak menyebabkan kulit kasar namun perubahan warna memungkinkan.

c. Deep Partial-Thickness (*Deep Second-Degree*)

Luka bakar tingkat dua yang dalam melibatkan lebih dalam lapisan dermis yaitu dermis reticular. Ditandai tampak putih dan tidak pucat, luka bakar ini tidak sembuh dalam waktu kurang dari tiga minggu dan mengakibatkan kulit kasar.


d. Full-Thickness (*Third-Degree*)

Luka bakar tingkat ketiga menghancurkan semua lapisan kulit termasuk lemak subkutan yang mendasarinya. Ditandai dengan coklat tua dan kasar serta sudah tidak memiliki rasa ketika disentuh (Roshni dkk, 2014)

Kulit terbagi atas beberapa tipe kulit yaitu:

- a. Tipe I : Selalu terbakar, tak pernah menjadi coklat

- b. Tipe II : mudah terbakar, jarang menjadi coklat
- c. Tipe III : kadang-kadang terbakar, mudah menjadi coklat
- d. Tipe IV : tidak pernah terbakar, mudah menjadi coklat
- e. Tipe V : secara genetik coklat
- f. Tipe VI : secara genetik hitam (Fitzpatrick, 2003)



Gambar 3. Tipe-tipe kulit

Respon pertama terhadap radiasi UV adalah peningkatan distribusi melanosom. Hal ini dengan cepat dapat meningkatkan pigmentasi pada lapisan basal (stratum basalis), sehingga warna kulit menjadi coklat karena sinar matahari. Apabila stimulasi dihentikan, warna coklat dapat dihentikan, warna coklat cepat menghilang atau mengelupas seiring dengan pergantian normal epidermis. Kulit yang terpapar dengan sinar matahari lebih lama, maka produksi melanin meningkat lagi secara permanen (Brown, 2005)

D. Melanin

Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh melanosit dari polimerisasi dan oksidasi pada proses melanogenesis dan pembentukannya memerlukan adanya enzim tirosinase (Damayanti, 2004)

1. Jenis-jenis melanin

Terdapat dua tipe pigmen melanin utama, antara lain :

a. Eumelanin

Pigmen ini memberikan warna coklat atau coklat gelap dan hitam. Tidak larut dalam semua macam larutan, mempunyai berat molekul tinggi, mengandung nitrogen dan terjadi oleh karena proses oksidasi dan polimerisasi bentuk 5,6 dihidroksiindol dan 5,6 dihidroksiindol 2 asam karboksil.

b. Feomelanin

Pigmen ini memberi warna cerah, yaitu kuning hingga coklat kemerahan. Larut terutama dalam alkali, mengandung nitrogen dan sulfur dan terjadi oleh karena proses polimerisasi sistenil dopa.

Selain itu juga dikenal tipe pigmen yang lain, yaitu oksimelanin, *trichrome*, melanin campuran (*mixed type melanins*) dan neuromelanin.

2. Fungsi melanin


- a. Memberi warna pada kulit
- b. Sebagai substansi fotoproteksi (tabir surya alami)
- c. Sebagai komponen pengikat obat (*drugs-binding agents*)
- d. Sebagai “*energy transducer*” melanin mampu mengubah beberapa bentuk energi menjadi panas dan kemudian dilepaskan.

3. Melanogenesis

Proses biokimia pigmentasi kulit (melanogenesis) bersifat sangat kompleks. Proses melanogenesis ini menghasilkan pigmen eumelanin dan feomelanin. Baik eumelanin maupun feomelanin keduanya adalah derivat tirosin melalui beberapa tahapan. Tirosin mengalami proses oksidasi menjadi 3,4-dihidroksi-fenilalanin (DOPA) oleh aktivitas enzim tirosinase dan kemudian dioksidasi lagi menjadi bentuk dopakuinon. Setelah tahap ini, jalur melanogenesis terbagi menjadi dua bagian, yaitu eumelanogenesis dan feomelanogenesis.

Pada jalur eumelanogenesis, senyawa dopakuinon mengalami oksidasi menjadi bentuk leukodopakrom (siklodopa) yang secara cepat pula berubah menjadi bentuk dopakrom. Selanjutnya dopakrom mengalami perubahan bentuk menjadi 5,6 dihidroksiindol dan 5,6 dihidroksi-indol 2 asam karboksilik. Pada tahap akhir pembentukan pigmen eumelanin apakah lebih dipengaruhi oleh polimerisasi senyawa 5,6 dihidroksiindol atau 5,6 dihidroksiindol 2 asam karboksilik sampai saat ini masih kontroversial.

Pada jalur feomelanogenesis, penambahan kelompok sulfhidril (sistein ataupun glutation) pada senyawa dopakuinon, akan menyebabkan reaksi nonenzimatis secara cepat pada metabolisme melanosit sehingga terbentuk senyawa sisteinil dopa. Kemudian senyawa ini mengalami oksidasi menjadi benzotizinilalanin sampai pada tahap terbentuknya pigmen feomelanin (Damayanti, 2004).



Gambar 4. Proses pembentukan melanin

E. Enzim


1. Pengertian enzim

Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia dan industri obat-obatan. Tiga sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk serta kontrol kinetik (Akhdia, 2003).


2. Mekanisme kerja enzim

Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap (Harahap, 2012)

Substrat berikatan dengan sisi aktif suatu enzim melalui beberapa bentuk ikatan kimia yang lemah (misalnya interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan interaksi hidrofobik). Setelah berikatan dengan bagian sisi aktif enzim, substrat bersama-sama enzim kemudian membentuk suatu kompleks enzim-substrat, selanjutnya terjadi proses katalisis oleh enzim untuk membentuk produk. Ketika produk sudah terbentuk enzim menjadi bebas kembali untuk selanjutnya bereaksi kembali dengan substrat.



Gambar 5. Enzim berikatan dengan substrat



Gambar 6. Jenis-jenis enzim

Dua model telah diusulkan untuk menjelaskan bagaimana enzim berikatan dengan substrat:

- a. Model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fisher pada tahun 1894, yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya.
- b. Induced-fit model diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koshland, Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. (Suhara, 2008)

3. Faktor faktor yang mempengaruhi kerja enzim

Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah temperature, derajat keasaman (pH), konsentrasi enzim dan substrat, kofaktor dan inhibitor. (Fauziyah, 2012)

a. Temperatur

Enzim tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Pada umumnya temperatur optimum enzim adalah 30-40°C. Kebanyakan enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai 0°C, namun enzim tidak rusak, bila suhu normal maka enzim akan aktif kembali. enzim tahan pada suhu rendah, namun rusak diatas suhu 500°C.

b. Derajat Keasaman (pH)

Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda - beda tergantung jenis enzimnya

c. Konsentrasi Enzim dan Substrat

Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak

reaksi akan berjalan lambat bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat.

d. Inhibitor Enzim

Seringkali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor, ada dua jenis inhibitor yaitu sebagai berikut:

1) Inhibitor kompetitif.

Pada penghambatan ini zat- zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim, jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim.

2) Inhibitor nonkompetitif

Pada penghambatan ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim- inhibitor, karena sisi aktif enzim berubah

4. Sifat sifat enzim

a. Enzim sebagai biokatalisator

Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas (spesifik *Pengantar Tentang Enzim* 121 kerjanya) dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi, sementara dengan kehadiran enzim kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 10⁷ kali.

b. Enzim itu Suatu Protein

Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA.

c. Enzim itu Khusus

Fungsi enzim itu tertentu, tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H_2O_2 , amylase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya.


d. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik

Beberapa enzim kerjanya dapat bolak balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. (Suhara, 2008)

F. Enzim tirosinase

Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju Katalisator reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas (spesifik kerjanya) dan aktivitasnya dapat diatur. Umumnya suatu enzim itu adalah protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis (Suhara, 2008).

Enzim yang berperan penting pada jalur sintesis melanin adalah tirosinase. Tirosinase memiliki aktivitas hidroksilasi tirosin, oksidasi L-DOPA (3,4-dihidroksifenilalanin) dan oksidasi hidroksiindol. Oleh karena itu, tirosinase dapat mengatalisis beberapa langkah dalam biosintesis melanin. Enzim tirosinase bekerja mengubah tirosin menjadi 3,4- dihidroksifenilalanin (DOPA) dan kemudian menjadi dopakuinon yang selanjutnya melalui beberapa tahap transformasi dikonversi menjadi melanin (Fitrie, 2004).



Gambar 7. Reaksi oksidasi dengan katalis enzim tirosinase

Aktivitas tirosinase ditemukan pada sejumlah mikroorganisme, tumbuhan maupun hewan dan yang terbaik berasal dari *Streptomyces glaucescens*, jamur *Neurospora crassa* dan *Agaricus bisporus* (Chang, 2009). Pada tumbuhan, tirosinase berperan dalam mengoksidasi jalur pencoklatan (*browning pathway*) yang teramati saat jaringan rusak dan terpapar udara. Sehingga apabila kecepatan aktivitas tirosinase meningkat, akan sebanding dengan peningkatan konversi tirosin untuk membentuk melanin. Hampir semua uji penghambatan tirosinase menggunakan tirosinase jamur dikarenakan enzim ini tersedia secara komersial. (Chang, 2009).

G. Inhibitor tirosinase

Penghambatan tirosinase merupakan salah satu strategi untuk mencegah hiperpigmentasi kulit. Tirosinase merupakan enzim yang berperan dalam biosintesis melanin. Enzim ini mengkatalisis reaksi hidroksilasi tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA), yang kemudian dikonversi menjadi senyawa reaktif dopakuinon. Hal ini dapat menyebabkan kulit tampak menjadi tampak lebih cerah (Nerya dkk, 2004).

Beberapa senyawa yang berfungsi sebagai inhibitor tirosinase, diantaranya adalah merkuri, hidrokuinon, arbutin, *alpha-hydroxy acid* (AHA), *kojic acid*, asam askorbat dan beberapa senyawa turunan fenol. Dari banyaknya senyawa inhibitor tirosinase yang telah diketahui terdapat senyawa yang memberikan efek negatif bila dipakai pada kulit dalam jangka panjang seperti merkuri, hidrokuinon dan AHA. Hidrokuinon memberikan efek toksik karena zat ini berkompetisi dengan tirosin sebagai substrat tirosinase sehingga menstimulasi tirosinase

mengoksidasi hidrokuinon menjadi benzokuinon. Benzokuinon jenis p-benzoquinon inilah yang bersifat toksik terhadap DNA (Westerhoof & Kooyers, 2005).

Menurut Chang (2009), mekanisme inhibisi tirosinase dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Agen pereduksi yang dapat mereduksi dopakuinon, seperti asam askorbat.
2. O-Dopakuinon *scavenger* seperti pada komponen yang mengandung gugus tiol dapat bereaksi dengan dopakuinon untuk membentuk produk tanpa warna.
3. Substrat enzim alternatif yang dapat menyerap hasil reaksi kuinoid yang bukan dari produk dopakrom, seperti pada kebanyakan komponen fenolik.
4. Inaktivator enzim nonspesifik yang tidak secara khusus mendenaturasi enzim sehingga dapat menghambat aktivitasnya, seperti asam atau basa.
5. Inaktivator tirosinase spesifik yang dapat mengkatalisis tirosinase dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim sehingga menginaktivasi secara irreversibel. Inhibitor jenis ini dikenal sebagai *suicide substrates*.
6. Inhibitor tirosinase spesifik yang berikatan reversibel dengan tirosinase dan mereduksi kapasitas katalisisnya. Mekanisme ini paling banyak ditemukan

Evaluasi eksperimental inhibitor tirosinase dapat dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurangi agen seperti asam askorbat menyebabkan reduksi kimia dopaquinone, dan mengurangi o-dopaquinone ke L-DOPA, jadi menghindari pembentukan dopachrome dan melanin.

2. *o*-Dopaquinone *scavenger* seperti kebanyakan senyawa yang mengandung thio dapat bereaksi dengan dopaquinone, untuk membentuk produk yang tidak berwarna. kemudian proses melanogenetiknya diperlambat
3. Beberapa senyawa fenolik bertindak sebagai substrat tirosinase alternatif, produk reaksi quinoid mereka menyerap dalam rentang spektral yang berbeda dari dopakrom. Ketika fenolat ini menunjukkan afinitas yang baik untuk tirosinase, pembentukan dopakrom dicegah, karenanya mereka bisa dianggap sebagai inhibitor tirosinase.
4. Nonspesifik inaktivator tirosinase seperti asam atau basa, yang tidak spesifik denaturasi enzim dan menghambat aktivitasnya. Asam atau basa kadang-kadang keliru dianggap sebagai inhibitor tirosinase.

Sebenarnya, inhibitor tirosinase spesifik harus dikatalisis oleh tirosinase dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim, sehingga tidak dapat diubah lagi enzim selama reaksi katalitik. Juga, beberapa bahan kimia senyawa yang secara reversibel berikatan dengan tirosinase dan mengurangi katalitiknya kapasitas, dan mereka juga bisa diakui sebagai spesifik tyrosinase inhibitor. Secara umum, beberapa inhibitor tirosinase hanya menunjukkan efek lemah penghambatan karena sifat reaktif dan habis pakai mereka terhadap tirosinase atau produk kuinon. Inhibitor tirosinase dapat digolongkan menjadi empat jenis, termasuk inhibitor kompetitif, inhibitor tidak kompetitif, tipe campuran (kompetitif/tidak kompetitif) inhibitor, dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menggabungkan dengan tirosinase gratis yang mencegah pengikatan substrat. Sebuah inhibitor kompetitif mungkin merupakan chelator ion tembaga, tirosinase analog substrat, atau turunan dari L-tirosin atau L-DOPA (Chang, 2012).

H. Asam kojat

Asam kojat (5-hidroksi-2-(hidroksimetil)-1,4-piron) adalah metabolit sekunder yang banyak diproduksi oleh jamur dari spesies *Aspergillus* dan *Penicillium* melalui proses fermentasi dalam kondisi aerob. Penggunaan asam kojat yang paling banyak ditemui dalam bidang kosmetik, yaitu sebagai pemutih dan pelindung dari sinar UV (Henny setiawati, 2003)

Bahan asam kojat telah dilaporkan memiliki potensi kepekaan yang tinggi dan dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Namun, hal ini berguna pada pasien yang tidak dapat mentoleransi *hydroquinone* dan studi menunjukkan dapat dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal untuk mengurangi iritasi. Produk pencerah kulit yang mengandung asam kojat biasanya digunakan dua kali per hari selama 1 atau 2 bulan atau sampai efek yang diinginkan tercapai (Sholikhah, 2017).

I. Microplate Reader

Microplate reader atau plate reader merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi sampel kimia, fisika, atau biologis dalam ukuran mikro. Alat ini umumnya digunakan dalam penelitian obat, validasi, dan banyak lagi yang umumnya digunakan dalam bidang farmasi, bioteknologi, dan akademik. Format microplate yang umum digunakan yaitu dengan 96 sumur yang terdiri dari 12 kolom dan 8 baris (Ganske, 2010).

Pengukuran absorbansi dapat dilakukan dengan *microplate reader*. Pembacaan absorbansi suatu sampel dimanfaatkan untuk uji *ELISA*, kuantifikasi protein dan asam nukleat, serta uji terhadap aktivitas enzim. Prinsip kerja *microplate reader* tidak berbeda jauh dengan spektrofotometri. Sumber cahaya menyinari sampel yang akan diukur dengan panjang gelombang tertentu (diatur dengan filter cahaya atau sebuah monokromator) dan kemudian detektor menghitung banyaknya cahaya awal yang ditransmisikan oleh sampel. Banyaknya

cahaya yang ditransmisikan berhubungan dengan konsentrasi molekul yang akan dicari (Ganske, 2010).

J. Tinjauan islam

Dalam Al-Quran dijelaskan Maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta dan segala yang ada didalamnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'am (6) ayat 1:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Terjemahannya:

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka (Q.S Al-An'am (6) : 1)"

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pujian dan penghormatan bagi Allah yang menciptakan langit, bumi, kegelapan dan cahaya demi kemaslahatan manusia dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya. Namun, dengan nikmat yang besar seperti itu, ternyata orang-orang kafir tetap menyekutukan Allah dalam beribadah (Shihab, 2000)

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa matahari sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Sesuai dengan firmannya Allah swt dalam surah Asy-syams (91) : 1:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

Terjemahannya:

"Demi matahari dan cahayanya di pagi hari (QS. Asy-syams (91) :1).

Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya dimana kegelapan menutup alam ini, kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang bertolak belakang dengan matahari, sebab ia bukan sumber cahaya dari matahari.

Menurut kajian ilmiah, cahaya di pagi hari adalah yang paling lengkap kekayaan panjang gelombangnya. Oleh karena itu, cahaya matahari pagi paling baik khasiatnya bagi manusia. Matahari adalah sumber energy utama bagi manusia, sedangkan cahayanya terdiri dari cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet (Kementrian agama, 2001)

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia seperti tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Asy-syu'ara (26) : ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (QS As-syu'ara (26) : 1)"

Dalam ayat ini adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptan Allah di bumi ini? Sebenarnya jika mereka mengamati dan merenungi hal itu niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Maha Kuasa (Shihab, 2000)

Dalam ayat lain juga dipertegas bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, Allah berfirman dalam surah Al-Imrah (2) : ayat 191:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S Al-imran (2) : 191)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa ("Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu (Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia (maka lindungilah kami dari siksa neraka).

Dari penjelasan ayat-ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia yang memiliki iman kepada Allah Swt., hendaknya memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diciptakan-Nya karna semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat. Allah Swt menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik yang bermanfaat. Hal inilah mendorong manusia yang beriman dan berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan.

Salah satu tanaman umbi wortel (*Daucus carrota L.*) dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan salah satu manfaatnya yaitu mengatasi produksi melanin secara berlebih dengan bantuan inhibitor tirosinase alami dari ekstrak daun afrika. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Terjemahnya:

" Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. Al-Bukhari: 5678)."

Hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah Swt menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan di obati sehingga akan mempermudah penyembuhannya. Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota L.*).

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Juli sampai bulan September 2019.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa analisis data berupa angka atau bilangan.

D. Populasi, sampel dan teknis pengambilan sampel

1. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel yang digunakan yaitu simplisia umbi wortel sebanyak 150 gram yang berasal dari Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pengambilan sampel

Waktu panen wortel sebaiknya pada saat cuaca cerah atau tidak hujan karena air dapat menyebabkan wortel cepat rusak (Cahyono, 2006). Cara memanen wortel dilakukan dengan mencabut umbi beserta akarnya. Tanahnya sebaiknya digemburkan terlebih dahulu agar memudahkan pencabutan wortel (Hanum, Chairani, 2008)

E. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Batang pengaduk, Bejana maserasi, Cawan porselin, Dekskikator, Erlenmeyer, Gelas kimia, Gelas arloji, Gelas ukur, Hot plate, Mikro Pipet, Mikro Plate Reader 96 Well, Oven, Ph Meter, Pipet, Sendok besi, Tabung ependorf, Tabung reaksi, Timbangan Analitik, Vial.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Air suling, Aluminium foil, Asam asetat anhidrat (AC_2O), Asam klorida (HCL) 2 N, Asam kojic, Asam sulfat pekat (H_2SO_4), Besi (III) klorida ($FeCl_3$), Dimetilsulfoksida (DMSO), Ekstak N-heksan umbi wortel, Eter, Enzim tirosinase 25 KU mushroom, Heksan, Kalium Hidroksida (KOH), Kalium Dihidrogen Pospat (KH_2PO_4), Kertas perkamen, Kertas saring, L-Tirosin, Magnesium (Mg), Natrium klorida (NaCl), Pereaksi Dragendorf, Pereaksi mayer, Pereaksi wagner.

F. Prosedur pengerjaan

1. Determinasi Sampel

Sampel wortel (*Daucus carrota L*) yang telah diambil langsung dari Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan di

determinasi terlebih dahulu untuk menentukan spesies yang spesifik pada sampel sehingga memastikan sampel yang digunakan sudah tepat.

2. Pengolahan sampel

Sampel wortel (*Daucus carota L*) dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel, kemudian dikupas lalu dipisahkan dari kulitnya kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50⁰C kurang lebih 32 jam. Kemudian simplisia yang sudah kering dirajang kecil-kecil, setelah itu di haluskan dan diayak dengan ayakan 50 mesh. Setelah itu di timbang untuk selanjutnya diekstraksi.

3. Ekstraksi sampel

Metode ekstraksi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu ekstraksi metode maserasi karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak komponen senyawa keratenoid pada wortel (Maleta dkk, 2018). Simplisia yang telah diserbukkan kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam wadah. Ditambahkan pelarut n-heksan hingga menutupi simplisia, ditutup dan didiamkan selama 3 hari sambil beberapa kali diaduk, disaring kemudian sari di pekatkan dan diuapkan.

4. Identifikasi Komponen Kimia

a. Alkaloid

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*) 0,5 g dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 ml HCl 2N kemudian dipanaskan selama 2-3 menit, didinginkan dan ditambahkan NaCl untuk mendapatkan protein-proteinnnya kemudian disaring. Ditambahkan 2 ml HCl 2N ke dalam filtrat. Dibagi menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi (I) ditambahkan dragendorf menghasilkan endapan merah jingga, tabung reaksi (II)

ditambahkan mayer menghasilkan endapan putih kekuningan, dan tabung reaksi (III) ditambahkan wagner menghasilkan endapan coklat.

b. Flavonoid

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*) 0,5g ditambahkan aquades dan ditambahkan heksan dan dikocok. Kemudian akan terpisah menjadi 2 lapisan dimana ekstrak metanol dalam air akan berada dibawah dan lapisan heksan akan berada di atas. Lapisan heksan dipisahkan sementara lapisan air ditambahkan etanol kemudian dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama ditambahkan 0,5 ml HCl pekat, kemudian dipanaskan di atas penangas selama 15 menit. Positif bila berwarna merah terang atau violet. Bagian kedua ditambahkan 0,5 ml HCl pekat kemudian ditambahkan 3-4 potong magnesium, amati perubahan warna yang terjadi pada tiap lapisan. Jika warna merah berarti positif mengandung flavonoid. Merah pucat-merah tua mengandung flavon.

c. Glikosida

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*) 0,2 g diuapkan di atas penangas air, lalu ditambahkan 3 ml asam asetat dengan sedemikian pemanasan, kemudian didinginkan. Selanjutnya, larutan ini ditambah larutan besi (III) klorida 0,3M, lalu dengan hati-hati ditambahkan campuran 3 ml asam sulfat dan 1 tetes besi (III) klorida 0,3M sehingga akan terbentuk cincin warna merah coklat pada batas cairan. Setelah beberapa menit di atas cincin akan berwarna biru hijau, ini menunjukkan adanya glikosida dan glikon gula 2-deoksi (Hanani, 2015).

d. Saponin

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L.*) sebanyak 0,5 g ditambahkan 10 ml air panas kemudian didinginkan, selama 10 detik larutan dikocok dengan kuat kemudian didiamkan selama 10 detik. Terbentuk buih

setinggi 1-10 cm dan buih tidak hilang bahkan setelah penambahan 1 tetes HCl 2N jika ekstrak positif mengandung saponin (Ditjen POM, 1995).

e. Terpenoid

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*) sebanyak 0,5 g ditambah 5 ml larutan eter kemudian diuapkan. Selanjutnya ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat ke dalam residu, asam sulfat pekat 1 tetes. Ketika filtrat menghasilkan warna merah-hijau atau violet-biru maka ekstrak positif mengandung terpen (Hanani, 2015).

f. Fenol

Ekstrak sampel sebanyak 0,2 gram ditambahkan dengan larutan FeCl_3 1%. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, merah, ungu, biru tua, biru, biru kehitaman, atau hijau kehitaman (Harborne, 1987).

5. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase

a. Pembuatan larutan Dapar Fosfat

Ditimbang sebanyak 2,7 g KH_2PO_4 dan dilarutkan dalam air suling, sedikit demi sedikit hingga mencukupi volume 400 mL. Kemudian pH larutan diukur dengan menggunakan pH meter. Ditimbang 5,6 g KOH dan larutkan dalam 100 mL air suling. Larutan KOH ditambahkan kedalam larutan KH_2PO_4 hingga mencapai pH 6,8. Larutan dapar fosfat disimpan pada lemari pendingin.

b. Pembuatan larutan L- Tirosin

Sebanyak 18,2 mg L-Tirosin dimasukkan kedalam labu tentukur 100 mL, ditambahkan dapar fosfat sedikit demi sedikit, dan dihomogenkan. Volumennya dicukupkan hingga 100 mL dengan larutan dapar fosfat.

c. Pembuatan larutan Enzim Tirosinase

Sebanyak 1 mg enzim tirosinase dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dilarutkan dalam 10 mL larutan dapar fosfat yang telah didinginkan. Larutan enzim tirosinase diletakkan pada wadah yang berisi es agar suhu enzim tetap stabil pada suhu dingin saat pengerjaan.

d. Pembuatan larutan uji Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*)

Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota l*) ditimbang sebanyak 5 mg kemudian dilarutkan dengan bantuan DMSO sebanyak 50 μ l, dihomogenkan lalu ditambahkan dengan dapar fosfat sampai 1000 μ l sehingga diperoleh larutan stok 1000 ppm. Larutan stok kemudian diencerkan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan, sehingga diperoleh larutan ekstrak dengan konsentrasi masing-masing 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, dan 50 ppm.

e. Pembuatan Larutan Kontrol Positif Asam Kojat

Sebanyak 5 mg dimasukkan kedalam tabung ependorf dan dilarutkan dalam 5 ml dari 50 Mm larutan dapar fosfat (pH 6,5). Kemudian larutan asam kojat diencerkan hingga diperoleh larutan asam kojat dengan konsentrasi yang sama dengan larutan uji.

f. Penentuan Inhibitor tirosinase

Uji penghambatan aktivitas enzim tirosinase berdasarkan metode Miyazawa dan Tamura (2006) dengan modifikasi tertentu. Sebanyak 50 μ l L-Tirosin 1 mM, 50 μ l larutan dapar fosfat 50 mM (pH 6,8), 20 μ l larutan enzim tirosinase dan 100 μ l larutan sampel dimasukkan ke dalam sumuran pada *microplate*. Campuran tersebut diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian diukur serapannya menggunakan *microplate reader* (ELISA) pada panjang gelombang 490 nm. Dilakukan pengujian blanko tanpa penambahan

enzim yaitu digunakan Sebanyak 170 μl larutan dapar fosfat (pH 6,8), 50 μl L-Tirosin 1 mM. Kontrol negatif menggunakan campuran tersebut diatas tanpa penambahan sampel dan untuk kontrol positif menggunakan asam kojat sebagai pengganti sampel. Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan secara triplo.

Penentuan persentase penghambatan aktivitas tirosinase berdasarkan rumus :

$$\% \text{ penghambatan Tirosinase} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor.

B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor.

Aktivitas penghambatan dari sampel uji ditentukan dengan IC_{50} yaitu konsentrasi dimana sampel uji menghambat aktivitas tirosinase sebesar 50%. IC_{50} dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier, log konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan probit % inhibisi sebagai sumbu y, dari persamaan $y = bx \pm a$ dapat dihitung nilai IC_{50} .

Rumus IC_{50} $y = ax + b$

$$x = (50 - a) : b$$

Keterangan:

a = slope

b = intersep

Nilai IC_{50} di bawah 100 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan aktivitas tirosinase yang paling kuat, nilai IC_{50} 100-450 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan yang kurang kuat, dan 450-700 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan aktivitas tirosinase sangat lemah (Zuraida et al, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Umbi Wortel (*Daucus carrota L*)

Sampel umbi wortel sebanyak 4 kg yang telah dikupas kemudian dipotong kecil kecil dan dikeringkan, diperoleh simplisia umbi wortel sebanyak 150 gram. simplisia tersebut di haluskan kemudian selanjutnya di ekstraksi dengan larutan penyari n-heksan sampai simplisia terendam. Metode ekstraksi menggunakan metode maserasi selama 3 hari dan sesekali diaduk, diperoleh ekstrak kental sebanyak 1.6 gram.

Tabel 1. Hasil ekstraksi Umbi wortel (*Daucus carrota L*)

Berat sampel	Berat simplisia	Jenis ekstrak	Berat ekstrak	Persen (%) Rendamen
4 kg	150 gram	Ekstrak kental	1,6 gram	1,06 %

2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Kimia

Ekstrak kental umbi wortel yang diperoleh kemudian di uji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan kandungan yang ada dalam umbi wortel. Pada pengujian identifikasi senyawa kimia ini meliputi enam golongan pengujian diantaranya Alkaloid, Flavanoid, Glikosida, Saponin, Terpenoid dan Fenol.

Tabel 2. Hasil identifikasi golongan senyawa umbi wortel (*Daucus carrota L*)

Uji	Pereaksi	Warna		Keterangan
		Pustaka	Hasil	
Alkaloid	Dragendorf	Merah jingga	Bening	(-)
	Mayer	Endapan merah kekuningan	Coklat	(-)
	Wegner	Endapan coklat	Orange	(-)
Flavonoid	HCl pekat + Mg	Merah, merah pucat, merah tua	Merah pucat	(+)
Glikosida	FeCl ₃ + H ₂ SO ₄	Cincin biru hijau	Hitam	(-)
Saponin	Air panas dan HCl	Terdapat buih	Tidak berbuih	(-)
Terpenoid	AcOH + H ₂ SO ₄	Merah-hijau, Violet-biru	Hijau	(+)
Fenol	FeCl ₃	hijau, merah, ungu, biru tua, biru, biru kehitaman atau hijau kehitaman	Kuning	(-)

Keterangan: (+) Positif mengandung senyawa tertentu

(-) Negatif atau tidak mengandung senyawa tertentu

3. Hasil persen aktivitas inhibitor tirosinase Ekstrak umbi wortel

Ekstrak kental umbi wortel yang diujikan terhadap enzim tirosinase untuk mengetahui berapa persen daya inhibitor dari beberapa konsentrasi yang dibuat.

Tabel 3. Hasil persen inhibitor ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) dan Kontrol positif.

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibisi
Ekstrak n-heksan umbi wortel (<i>Daucus carrota L</i>)	10 ppm	39.7 %
	15 ppm	40.2 %
	20 ppm	42.3 %
	25 ppm	42.3 %

	30 ppm	46.8 %
	35 ppm	47 %
	40 ppm	47.8 %
	45 ppm	48.5 %
	50 ppm	48.9 %
	Control (-)	0,1768

Tabel 4. Hasil persen inhibitor Kontrol Positif Asam kojat

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibisi
Kontrol Positif Asam Kojat	10 ppm	48.3 %
	15 ppm	49.3%
	20 ppm	49.6 %
	25 ppm	49.8 %
	30 ppm	52.9 %
	35 ppm	53 %
	40 ppm	53 %
	45 ppm	54.4 %
	50 ppm	54.9 %
	Kontrol (-)	0,1768

4. Hasil Nilai IC₅₀ Ekstrak n-heksan Umbi Wortel

Setelah di dapat konsentrasi terbaik kemudian dibuat grafik dan di hitung nilai IC₅₀ ekstrak tersebut. Nilai IC₅₀ menunjukkan kemampuan ekstrak dalam menghambat 50% aktivitas tirosinase.

Tabel 5. Hasil nilai IC₅₀ Ekstrak N-heksan Umbi Wortel

Sampel	Nilai IC ₅₀ (µg/mL)
Ekstrak Umbi Wortel	50 %
Asam Kojat	20 %

B. Pembahasan

Kulit adalah lapisan utama serta target dari paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar matahari memiliki efek yang merugikan serta menguntungkan bagi kulit tergantung lama dan frekuensi paparan. Jika banyak menghabiskan waktu dibawah sinar matahari dapat menyebabkan efek yang merugikan bagi kulit seperti mempercepat penuaan dini, eritema, kelainan pigmentasi hingga kanker kulit.

Melanogenesis merupakan serangkaian proses kompleks pembentukan melanin. Pigmen melanin diproduksi di dalam melanosit dengan bantuan katalis enzim tirosinase (Fitrie, 2004). Enzim tirosinase berfungsi dalam oksidasi pada proses melanogenesis. Faktor genetik mempengaruhi ukuran satuan melanin epidermis dan melanosom serta produksi melanin. Faktor lingkungan seperti pajanan sinar matahari meningkatkan kegiatan enzim tirosinase sehingga meningkatkan produksi melanin dan penimbunannya di dalam keratinosit sehingga mencoklat (*tanning*) (Damayanti, 2004)

Penghambatan tirosinase merupakan salah satu strategi untuk mencegah hiperpigmentasi kulit. Tirosinase merupakan enzim yang berperan dalam biosintesis melanin. Enzim ini mengkatalisis reaksi hidroksilasi tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA), yang kemudian dikonversi menjadi senyawa reaktif dopakuinon. Hal ini dapat menyebabkan kulit tampak menjadi tampak lebih cerah. (Nerya dkk, 2004)

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi wortel (*Daucus carota L*). Umbi wortel merupakan tanaman dengan karoten terkaya yang memiliki antioksidan yang kuat (Aprilia, 2007) selain itu juga mengandung senyawa fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan (Donglin Zhang, 2004)

Pada penelitian ini, sampel umbi wortel diekstraksi dengan metode maserasi. Digunakan metode maserasi karena metode ini terbilang mudah dan efektif serta aman untuk menghindari kerusakan senyawa pada umbi wortel yang bersifat termolabil. Simplisia umbi wortel sebanyak 150 gram yang telah dihaluskan dimasukkan kedalam bejana maserasi kemudian di tambahkan cairan penyari n-heksan 2 Liter hingga simplisia terendam. Digunakan pelarut n-heksan dikarenakan n-heksan merupakan pelarut yang efektif untuk menarik senyawa karoten pada wortel. Proses perendaman dilakukan selama 3x24 jam sambil sesekali diaduk. Sampel kemudian disaring dan dipisahkan dari ampasnya. Hasil maserasi di pekatkan dengan cara diangin anginkan karena termasuk pelarut yang mudah diuapkan. Diperoleh ekstrak kental sebanyak 1.6 gram dengan persen (%) rendamen 1,06 % dimana rendamen adalah kuantitas (jumlah) ekstrak yang diperoleh dari hasil ekstraksi suatu bahan alam dinyatakan dalam satuan persen (%), dimana semakin tinggi nilai rendamen yang diperoleh maka semakin besar pula ekstrak yang diperoleh.

Berdasarkan uji identifikasi golongan senyawa ekstrak n-heksan umbi wortel (-) tidak mengandung golongan senyawa alkaloid dilihat dari hasil pengujian pada ketiga pereaksi yakni pada pereaksi dragendorff tidak terdapat endapan merah jingga, tidak terdapat endapan merah kekuningan pada pereaksi mayer dan pada pereaksi wegner tidak terdapat endapan coklat. Pada pengujian selanjutnya (+) mengandung senyawa flavonoid ditandai dengan warna merah pada hasil reaksi. (-) tidak mengandung glikosida ditandai dengan tidak terbentuk cincin biru hijau pada hasil reaksi. (-) tidak mengandung golongan senyawa saponin karena tidak terdapat buih bahkan pada saat penambahan HCl 2N, (+) mengandung golongan senyawa terpen ditandai pada hasil reaksi terbentuk warna hijau, dan (-) tidak mengandung senyawa fenol ditandai pada hasil reaksi tidak

terbentuk warna hijau, merah ungu, biru tua, biru kehitaman atau hijau kehitaman. Selain itu pada jurnal (Widya dkk, 2011) melakukan skrining fitokimia menggunakan KLT menunjukkan bahwa ekstrak umbi wortel mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid dan terpenoid. Tetapi pada percobaan golongan senyawa alkaloid yang saya lakukan tidak positif dikarenakan beberapa faktor kesalahan yang mungkin terjadi. Adapun Masalah pada skrining fitokimia biasanya adalah kesalahan menafsirkan hasil analisis pengujian skrining seperti reaksi negative palsu adalah hasil pengujian menyatakan tidak ada (-) tapi sebenarnya ada (+). Ini disebabkan kurang sensitifnya alat atau bahan ujinya terlalu sedikit, atau bahan (ekstrak simplisia) tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu senyawa yang tadinya ada hilang atau rusak karena adanya reaksi enzimatik maupun hidrolisis.

Pada pengujian inhibitor tirosinase terhadap sampel umbi wortel (*Daucus carota L*) menggunakan alat *microplate reader* (ELISA) Metode ini dipilih karena relatif sederhana, ekonomis, memiliki sensitivitas yang cukup tinggi dan menggunakan jumlah sampel yang sedikit. Penelitian ini menggunakan enzim tirosinase yang disintesis dari jamur dan L-tirosin sebagai substratnya. sebagai kontrol positifnya digunakan asam kojat. Hal ini dikarenakan asam kojat memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Penggunaan asam kojat sebagai kontrol positif sangat disarankan sebagai pembanding kekuatan penghambatan tirosinase yang baik dengan bahan baru yang ditemukan ataupun dengan kekuatan penambahan bahan lain (Kurniasari, 2018).

Prinsip pengukuran yaitu enzim tirosinase akan mengkatalis pembentukan L-tirosin menjadi L-DOPA kemudian terbentuk dopakrom yang dapat terukur intensitasnya pada panjang gelombang 490 nm. Dopakrom yang terbentuk akan terlihat dengan adanya warna ungu muda. Penambahan sampel dimaksudkan


untuk menghambat aktivitas enzim tirosinase sehingga jumlah dopakrom yang terbentuk semakin berkurang. Serapan yang diperoleh (absorbansi) digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas ekstrak dalam menghambat reaksi tirosin-tirosinase. Penghambatan aktivitas enzim tirosinase ditunjukkan dengan nilai IC_{50} . IC_{50} merupakan nilai konsentrasi inhibitor tirosinase yang dapat menghambat 50% aktivitas tirosinase.

Mekanisme kerja *microplate reader* (ELISA) adalah : plat mikrotiter dilapisi dengan antigen kemudian memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu kemudian menambahkan antibodi primer dan antibodi sekunder yang terkunjungsi ke enzim. Setelah itu reaksi substrat dan enzim digunakan untuk menghasilkan produk berwarna sehingga menunjukkan reaksi positif.

Hasil uji aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carota L*) terhadap daya inhibitor dari beberapa konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, dan 50 ppm berturut turut adalah 39,7 %, 40,2 %, 42,3 %, 42,3 %, 46,8 %, 47 %, 47,8 %, 48,5 %, dan 48,9 %. adapun hasil inhibitor tirosinase dari control positif asam kojat dari beberapa konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, dan 50 ppm berturut turut adalah 48,3 %, 49,3 %, 49,6 %, 49,8 %, 52,9 %, 53 %, 53 %, 54,4 %, dan 54,9 %. Hasil diperoleh dari perhitungan nilai absorbansi yang dilakukan secara triplo untuk setiap konsentrasi. Adapun hasil yang diperoleh dalam bentuk persentase bertujuan untuk mengetahui skala perbandingan aktivitas inhibitor enzim pada setiap konsentrasi sampel.

Pengujian asam kojat sebagai kontrol positif dilakukan untuk memastikan bahwa metode yang dipakai adalah benar dengan cara membandingkan nilai IC_{50}

yang didapat dengan nilai IC_{50} dari hasil studi literatur. Hasil Nilai IC_{50} dari uji aktivitas inhibitor tirosinase menunjukkan nilai konsentrasi yang dapat menghambat 50% aktivitas enzim tirosinase (IC_{50}) yaitu $50 \mu\text{g/mL}$. Namun aktivitas penghambatan tirosinase masih lebih rendah dibanding asam kojat sebagai kontrol positif yaitu menunjukkan nilai IC_{50} sebesar $20 \mu\text{g/mL}$.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) memiliki aktivitas sebagai inhibitor tirosinase.
2. Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) memiliki rata-rata persen inhibitor pada konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, dan 50 ppm berturut turut adalah 39,7 %, 40,2 %, 42,3 %, 42,3 %, 46,8 %, 47 %, 47,8 %, 48,5 %, dan 48,9 %.
3. Ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*) memiliki nilai IC_{50} 50 $\mu\text{g/mL}$. Sedangkan nilai IC_{50} asam kojat sebagai kontrol positif sebesar 20 $\mu\text{g/mL}$.

B. Saran


Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut seperti Fraksinasi dan Isolasi untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung dalam umbi wortel (*Daucus carrota L*) sebagai pencerah kulit. Sehingga dapat memformulasi sediaan krim pencerah dari bahan alam yang aman bagi kulit.


DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia fadjar pertiwi. *Yuk Makan Wortel. 20 Resep Olahan Wortel*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Akhdiya, A. *Isolasi Bakteri Penghasil Enzim Protease Alkalin Thermostabil*. Bogor: Balai Penelitian Biotelnologi dan Sumberdaya Genetika Pertanian Bogor. 2003
- Brown. R.G, Burns T. *Lecture Notes Dermatologi*. Jakarta: Erlangga. 2005
- Cahyono, B. *Analisis Ekonomi dan Teknik Bercocok Tanam Sayuran*. Yogyakarta: Kanisius. 2006
- Cheryl M. Burgess. *Cosmetic Dermatology*. Washington D.C: Springer. 2005
- Damayanti N, Listiawan MY. *Fisiologi dan Biokimia Pigmentasi Kulit. Ilmu kulit dan Kelamin*. 2004
- Direktorat gizi Departemen Kesehatan RI. *Daftar komposisi zat gizi pangan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1996
- Departemen Kesehatan RI. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Depkes RI. 2009
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000
- Fitrie AA. *Histologi Dari Melanosit*. Sumatra Utara: Fakultas Kedokteran Bagian Histologi Universitas Sumatra Utara. 2004.
- Fitzpatrick. *Dermatology in General Medicine*. Sixth Edition. New York: Mc Graw-Hill. 2003
- Ghozaly, M. R, Safitri E.B. *Uji Aktifitas Antioksidan Ektrak N-Heksan, Etil Asetat, Dan Methanol dari Varietas Umbi Wortel (Daucus Carrota L) dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil)*. Jakarta: Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. 2016
- Irmanida dan Morina. *Potensi Daun Kayu Bawang (Protium javanicum) sebagai Penghambat Kerja Enzim Tirosinase*. Surabaya: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. 2013.
- Harahap, Fauziyah. *Fisiologi Tumbuhan Suatu Pengantar*. Medan: Unimed Press. 2012
- Hanum, Chairani. *Teknik Budidaya Tanaman*. Jilid 1. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

- Hanani, E. *Analisis Fitokimia*. Jakarta: EGC. 2015
- Habrone, J.B. *Metode Fitokimia*. Penerbit ITB. Bandung. 1987.
- Hartanti, Lanny dan Setiyawan H.K. Inhibitory Potential Of Some Synthtic Cinnamic Acid Derivativestowards tyrosinase Enzym. Jakarta: UGM. 2009.
- Jamesh A josep, dkk. *Kode Warna Makanan*. Jakarta: PT Mizan Publika. 2008
- Henny, setiawati. *Skrinning Beberapa Isolat Aspergillus sp. Penghasil AsamKojat Serta Pengaruh Kondisi Aerasi, Sumber Karbon, dan Sumber Nitrogen Terhadap Produksi Asam Kojat*. Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. 2003.
- Janquiera L, C. J Carneiro, RO. Kelley. *Histologi Dasar*. Edisi Ke V. Jakarta: EGC. 2007
- Kusantati, Herni. *Tata Kecantikan Kulit*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Latief Abdul. *Obat tradisional*. Jakarta: buku kedokteran EGC. 2012
- Lavi, Novita. *Sunscreen For Travellers*. Denpasar: Departement Pharmacy Faculty of Medicine, University of Udayana. 2012.
- Manan, Saiful. *Energi Matahari, Sumber Energi Alternatif yang Efisien, Handal dan Ramah Lingkungan di Indonesia*. Fakultas Teknis Universitas Diponegoro. 2009
- Maleta, Hana Susanti, dkk. *Ragam Metode ekstraksi keratenoid dari sumber dalam decade terakhir*. Universitas Pembangunan Jaya. 2018
- Michael S. Robert. Walters, A. Kenneth. *Dermatologic, Cosmeceutic, and Cosmetic Development*. New York: Informa Healtycare. 2008
- Miyazawa Mitsuo, Tamura Naotaka. *Inhibitory Compaund of Tyrosinase From the Sprout of Polygonum hydropiper L. (Benitade)*. Japan: Kinky University. 2006
- Nerya O, Musa R dkk. *Chalcones as potent tyrosinase inhibitors: the effect of hydroxyl positions and numbers*. Phytochemystri: Elsevier. 2004
- Panagan, Almunady T. *Pengaruh Penambahan Tepung Wortel (Daucus carrota L) Terhadap Bilangan Peroksida dan Asam Lemak Bebas pada Minyak Goreng Curah*. Sumatra Selatan: Universitas Sriwijaya. 2011


- Pratama, Wiweka Adi dkk. *Uji SPF in Vitro dan Sifat Fisik Beberapa Produk Tabir Surya yang Beredar di Pasaran*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM. 2015
- Roshni PR, dkk. *Evaluation and Management of Sunburn*. India: Departement of Pharmacy Practice. 2014
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002
- Suhara. *Dasar-dasar Biokimia*. Bandung: Prisma Press. 2008
- Tjirosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2013.
- Tranggono, Retno I dan Fatmas Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Weni, Mustika. *Aktivitas Penghambatan Ekstrak Sirih Merah (Piper crocatum) terhadap Pembentukan Malondialdehida (MDA) dan Enzim Tirosinase*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2014.

Lampiran 1. Bagan alur penelitian

Lampiran 2. Penyiapan sampel

Lampiran 3. Pembuatan larutan uji


a. Pembuatan larutan dapar fosfat




b. Pembuatan L-tirosin




c. Pembuatan larutan uji Ekstrak n-heksan umbi wortel







d. Pembuatan Larutan Kontrol Positif Asam Kojat




e. Pembuatan Larutan Enzim Tirosinase



Lampiran 4. Uji Penghambatan Aktivitas EnzimTirosinase

Lampiran 5. Pengujian Identifikasi Golongan Kimia



Lampiran 6. Hasil perhitungan

a. Persen Rendamen Ekstrak

% Rendamen ekstrak umbi wortel

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot simplisia (gram)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,6 \text{ gram}}{150 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 1,06 \% \end{aligned}$$

b. Perhitungan % Inhibitor tirosinase

$$\% \text{ inhibisi tirosinase} = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor (Kontrol negatif)

B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor

1. % inhibisi sampel umbi wortel

✓ 10 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0,1768 - 0,1066}{0,1768} \times 100 \% \\ &= 39,7 \% \end{aligned}$$

✓ 15 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0,1768 - 0,1057}{0,1768} \times 100 \% \\ &= 40,2 \% \end{aligned}$$

✓ 20 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0,1768 - 0,1020}{0,1768} \times 100 \% \\ &= 42,3 \% \end{aligned}$$

✓ 25 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0,1768 - 0,1020}{0,1768} \times 100 \% \\ &= 42,3 \% \end{aligned}$$

✓ 30 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0940}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 46,8 \% \end{aligned}$$

✓ 35 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0937}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 47 \% \end{aligned}$$

✓ 40 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0922}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 47,8 \% \end{aligned}$$

✓ 45 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0909}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 48,5 \% \end{aligned}$$

✓ 50 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0903}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 48,9 \% \end{aligned}$$

2. % inhibisi asam kojat

✓ 10 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0914}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 48,3 \% \end{aligned}$$

✓ 15 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0895}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 49,3 \% \end{aligned}$$

✓ 20 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0889}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 49,6 \% \end{aligned}$$

✓ 25 ppm

$$\begin{aligned} \text{\% inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0886}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 49,8 \% \end{aligned}$$

✓ 30 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0831}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 52,9 \%\end{aligned}$$

✓ 35 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0848}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 52 \%\end{aligned}$$

✓ 40 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0830}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 53 \%\end{aligned}$$

✓ 45 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0797}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 54,4 \%\end{aligned}$$

✓ 50 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ inhibisi tirosinase} &= \frac{0.1768 - 0.0805}{0.1768} \times 100 \% \\ &= 54,9 \%\end{aligned}$$

Tabel 5. Sampel Ekstrak umbi wortel (*Daucus carrota L*)


Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
10 ppm	0.1042	0,1066	39,7 %
	0.1013		
	0.1144		
15 ppm	0.1009	0,1057	40,2 %
	0.1059		
	0.1104		
20 ppm	0.1118	0.1020	42,3 %
	0.0941		
	0.1001		
25 ppm	0.0971	0,1020	42,3 %
	0.1046		
	0.1043		
30 ppm	0.0900	0.0940	46,8 %
	0.0999		
	0.0921		
35 ppm	0.0939	0,0937	47 %
	0.0935		
	0.0936		
40 ppm	0.0859	0.0922	47,8 %
	0.0953		
	0.0954		
45 ppm	0.0922	0.0909	48,5 %
	0.0916		
	0.0889		
50 ppm	0.0896	0.0903	48,9 %
	0.0843		
	0.0971		

Tabel 6. Kontrol positif Asam Kojat


Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
10 ppm	0.0916	0,0914	48,3 %
	0.0899		
	0.0928		
15 ppm	0.0820	0,0895	49,3 %
	0.0925		
	0.0939		
20 ppm	0.0880	0.0889	49.6 %
	0.0910		

	0.0877		
25 ppm	0.0822	0,0886	49,8 %
	0.1014		
	0.0821		
	0.0782		
30 ppm	0.0904	0.0831	52.9 %
	0.0806		
	0.0830		
35 ppm	0.0798	0.0830	53 %
	0.0861		
	0.0810		
40 ppm	0.0793	0.0830	53 %
	0.0886		
	0.0794		
45 ppm	0.0839	0.0797	54.4 %
	0.0781		
	0.0718		
50 ppm	0.0849	0.0805	54.9 %
	0.0825		

c. Kurva



Gambar 8. Kurva ekstrak umbi wortel



Gambar 9. Kurva Asam kojat

d. Perhitungan IC₅₀

1. Sampel

$$y = 0.258x + 37.09$$

Diketahui : $y = 50$
 $a = 37.09$
 $b = 0.258x$

$$Y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 37.09}{0.258}$$

$$X = 50 \mu\text{g/mL}$$

2. Asam kojat

$$y = 0.172x + 46.51$$

Diketahui : $y = 50$
 $a = 46,51$
 $b = 0,172x$

$$Y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 46,51}{0,172}$$

$$X = 20 \mu\text{g/mL}$$

Lampiran 7. Penyiapan dan ekstraksi sampel



(a)



(b)



(c)



(d)




(e)



(f)

- Keterangan:** (a) Pengambilan sampel
(b) sampel umbi wortel (*Daucus carrota L*)
(c) sampel dipotong kecil-kecil
(d) sampel dikeringkan
(e) didapatkan simplesia umbi wortel
(f) sampel diekstraksi dengan metode maserasi.

Lampiran 8. Gambar hasil identifikasi golongan senyawa kimia ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*)



Keterangan: (a) positif mengandung senyawa terpenoid
 (b) negatif tidak mengandung saponin
 (c) negatif tidak mengandung fenol
 (d) positif mengandung flavonoid
 (e) negatif tidak mengandung alkaloid
 (f) negatif tidak mengandung glikosida.

Lampiran 9. Gambar pengujian inhibitor tirosinase ekstrak n-heksan umbi wortel (*Daucus carrota L*)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

Keterangan: (a) penimbangan sampel
(b) dapar fosfat
(c) Larutan L-tirosin

- (d) sampel dengan beberapa konsentrasi**
- (e) pnyiapan sampel**
- (f) Asam kojat dengan beberapa konsentras**
- (g) sampel dan asam kojat dalam plate**
- (h) pengujian dengan alat ELISA.**



RIWAYAT HIDUP



Nama Hasrawati biasa di sapa Asrah atau Hase. Anak bungsu dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Ante dan Nasra. Pendidikan dimulai saat berumur 6 tahun di SD 108 Banoa selama 6 tahun kemudian di SMP 5 Sinjai Selatan selama 3 Tahun setelah itu lanjut SMA di SMA 9 Sinjai Selatan selama 3 tahun juga. Setelah melewati 6 tahun menjadi murid dan 6 tahun pula menjadi siswa akhirnya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alhamdulillah lulus dengan jalur SNMPTN dengan program studi Farmasi. Jurusan yang saya idamkan berkat saran dari tante saya yang katanya Farmasi itu keren dan peluang kerjanya insya Allah banyak. Setelah beberapa semester di farmasi saya belajar banyak hal mulai dari kekeluargaan, kesabaran, indahnyaberbagi, saling mengasihi dan bagaimana cara bertahan hidup hehe. Meskipun kadang terlintas dibenak ingin pindah jurusan namun semangat dan perjuangan orang tua menjadi alasan kuat untuk tetap bertahan sampai detik ini dan finally gelar S.Farm sudah didepan mata. Terimakasih teman-teman seperjuangan, sahabat, dosen dan staf, serta keluarga atas bimbingan dan supportnya. I am nothing without them!