

**UJI DAYA TOLAK EKSTRAK DAUN BELIMBING WULUH
(*Averrho bilimbi*) TERHADAP LALAT RUMAH
(*Musca domestica*)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FIRA FITRANILLAH
70200115021
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fira fitranillah
NIM : 70200115021
Tempat/Tgl Lahir : Polmas, 17 April 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/kesehatan lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Uji Daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh *averrhoa bilimbi* terhadap lalat rumah *musca domestica*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 12 November 2019

Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDE
MAKASSAR
Fira fitranillah
NIM. 70200115021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Uji Daya Tolak Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*) Terhadap Lalat Rumah (*Musca domestica*)**", yang disusun oleh **FIRA FITRANILLAH**, NIM: 70200115021, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari selasa, 22 Oktober 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 22 Oktober 2019 M
23 Safar 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi susilawaty, S.Si.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurdiyanah S, SKM., MPH	(.....)
Penguji I	: Munawir Amansyah, SKM.,M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini juga tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda nabi Muhammad swt. yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua ayahanda Moh. Nur dan ibunda Hasanah yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan senantiasa bertakwa kepada Allah swt. selalu memberikan nasihat serta doa yang tiada henti demi kelancaran dan kesuksesan penulis.

Tidak lupa pula penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. A. Armyr Nurdin., M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan

5. Ibu Nurdiyanah S, SKM., MPH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
6. Bapak Munawir Amansyah, SKM., M.Kes sebagai penguji I yang senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam penyusunan skripsi ini
8. Para Dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan khususnya program studi kesehatan masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat bagi penulis.
9. Pengelola seminar program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
10. Para staf akademik dan tata usaha fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
11. Teman-Teman tercinta angkatan 2015 (Covivera) program studi kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan peminatan kesehatan lingkungan (KL Capung) yang selalu membantu penulis dalam penelitian.
13. Teman – teman cld 36 (kesmas C) yang selalu mendoakan lancarnya penelitian ini.
14. Tim sibuk yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menangkap lalat rumah (*Musca Domestica*) yang menjadi sampel dalam penelitian ini.


Alhamdulillah Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, penulis tidak mampu untuk membalasnya. Maka dari itu peneliti hanya dapat menyerahkan semua itu kepada Allah swt., semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat menjadi suatu pahala.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhirnya, harapan dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Samata-Gowa 12 November 2019

Penulis

Fira fitranillah
70200115021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Tinjauan Tentang Tumbuhan	14
B. Tinjauan Tentang Lalat Rumah.....	18
C. Kerangka Teori.....	31
D. Kerangka Konsep	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36

E. Alur Penelitian	38
F. Instrument Penelitian	39
G. Validasi Dan Relibialitas Instrumen	41
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Analisis Data	45
C. Pembahasan.....	47
D. Keterbatasan Peneliti.....	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Penggunaan insektisida Hayati/Botani :	8
Tabel 3.1 Ulangan (replikasi) Perlakuan.....	35
Tabel 4.1 pengukuran Suhu dan Kelembaban.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Lalat Yang Hinggap Pada Permukaan Kandang Selama Ulangan 1,11 Dan 111 Waktu Pemaparan 60 Menit	44
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Daya tolak (%) Ekstrak Daun belimbing wuluh sebagai insektisida nabati terhadap Lalat (<i>Musca domestica</i>) Pada Ulangan I, II dan III.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pohon Belimbing.....	16
Gambar 2.2 Lalat Rumah	21
Gambar 2.3 Fase Perkembangan Lalat Rumah	22
Gambar 2.4 Morfologi Lalat Rumah.....	24
Gambar 2.5 Kerangka Teori.....	31
Gambar 2.6 Kerangka Konsep	32
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	34
Gambar 3.2 Alur Penelitian	38
Gambar 4.1 Grafik Garis Peningkatan Daya Tolak Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (<i>Averrhoa bilimbi</i>) Terhadap Lalat Rumah (<i>Musca domestica</i>)	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *Output Analisis Data Statistic Product And Service Solution (SPSS)
For Windows Release 23.*

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Riwayat Peneliti

Lampiran 4. Surat-Surat



TESTING THE EFFICACY OF BILIMBI (*Averrhoa bilimbi*) LEAF
EXTRACT AS HOUSEFLY (*Musca domestica*) REPELLANT

¹ Fira fitranillah,² Dr. Andi Susilawaty,³Nurdiyana S

^{1, 2} Environmental Health, Public Health Department, Faculty of
Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic
University of Makassar

³ Health Promotion, Public Health Department, Faculty of
Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic
University of Makassar

Fira.fitranillah@gmail.com

ABSTRACT

Diarrhea is an environmental disease. It transmits through faecal-oral route in diarrhea agent infected food, drinks or faeces. If houseflies land on food or drink after landing on infected faeces that carries plentiful viruses and bacteria, the risk of diarrhea transmission to the human who eat the food is very high. As one of the most effective way to keep houseflies away is by using environmentally friendly plant-based insecticides, this research aims to examine the efficacy of Bilimbi (*Averrhoa Bilimbi*) leaf extract as housefly (*Musca Domestica*) repellent. It used quantitative method and true experiment research design. The research was conducted in the Laboratory of Public Health of Alauddin State Islamic University of Makassar. The research samples consisted of 180 houseflies which were divided into four groups. Each group consisted of 15 houseflies that received either 0%, 10%, 15% and 20% repellent concentration and went through 3 replications within a 60-minute observation. The findings show that the application of 0% concentration invites 14 houseflies, the application of 10% concentration invites 4 houseflies, the application of 15% concentration invites 2 houseflies, the application of 20% concentration invites 1 housefly. Therefore, this research concludes that the most effective treatment is by applying 20% concentration of repellent with efficacy of 95.55%. ultimately, the findings of this research are hoped to be useful as a reference in using environmentally friendly plant-based insecticides.

Keywords: housefly, starfruit leaf extract, thrust



ABSTRAK

Nama : fira fitranillah
NIM : 70200115021
Judul : Uji Daya Tolak Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*) Terhadap Lalat Rumah (*Musca Domestica*)

lalat *Musca domestica* merupakan salah satu serangga yang paling umum sering ditemukan di sekitar makanan manusia, peralatan dan permukiman dan pembawa mekanik selama lebih dari seratus penyakit pada manusia dan hewan selain bakteri lainnya, protozoa, virus dan infeksi cacing melalui transmisi berbagai *pathogen*. Yang kita ketahui Lalat rumah berperan sebagai salah satu vektor yang dapat berperan dalam penularan penyakit seperti diare, *thypus*, *parathypus*, *disentri* dan *cholera*. Salah satu cara mengendalikan lalat rumah yaitu dengan penggunaan insektisida nabati yang ramah lingkungan. Peneliti menggunakan insektisida yang berasal dari bagian tumbuhan yaitu daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan metode Eksperimen sungguhan (*True Experiment*). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan UIN Alauddin Makassar, sampel dalam penelitian ini adalah lalat rumah sebanyak 180 ekor yang dibagi ke dalam empat kelompok, masing-masing berisi 15 ekor lalat dengan perlakuan (0%, 10%, 15% dan 20%) dan dilakukan 3 kali replikasi dengan waktu pengamatan selama 60 menit. Dari hasil penelitian rata-rata hinggapan lalat konsentrasi 0% yaitu 14 ekor, Pada konsentrasi 10% yaitu 4 ekor, Pada konsentrasi 15% yaitu 2 ekor dan Pada konsentrasi 20% yaitu 1 ekor. Perlakuan terbaik dalam mencegah hinggapan lalat adalah pada konsentrasi 20% dengan daya tolak 95,55%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif pengendalian vektor khususnya lalat rumah sebagai *insektisida* nabati yang ramah lingkungan.

Kata Kunci : lalat rumah, ekstrak daun belimbing, daya tolak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan. Penularan penyakit diare dapat terjadi secara fekal-oral, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi agen yang berasal dari air yang tercemar maupun dari tinja yang terinfeksi (WHO, 2013). Tinja yang telah terinfeksi mengandung virus dan bakteri dalam jumlah yang besar. Bila tinja tersebut dihirup oleh vektor seperti lalat, kemudian lalat tersebut hinggap di makanan dan minuman maka akan menularkan diare kepada orang yang memakannya (Widoyono, 2008).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO hampir 1 triliun dan 2,5 miliar kematian karena diare dalam 2 tahun pertama kehidupan. Secara global dengan derajat kesakitan dan kematian diperkirakan lebih dari 10 juta anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahunnya, sekitar 20% meninggal karena infeksi diare. Kematian yang disebabkan diare pada anak-anak terlihat menurun dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun (Kemenkes, 2011).

Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang keempat (13,2%) (Kementrian Kesehatan RI, 2015).

Di Indonesia kejadian diare sejak tahun 2015-2017, masih berfluktuasi dimana pada tahun 2015 jumlah kasus 1.213 dengan jumlah kematian 30 (CFR 2,47 %), tahun 2016 dengan jumlah kasus 198 jumlah kematian 6 (CFR 3,03 %), dan pada tahun 2017 kasus diare dengan jumlah penderita 1.725 jumlah kematian 34 (CFR 1,97%) (Profil Kesehatan RI, 2017).

Sulawesi Selatan menjadi salah satu propinsi dengan KLB diare terbesar pada tahun 2014 di mana angka kesakitan diare tertinggi terjadi di kota Makassar, Gowa, Bulukumba, Takalar, Pangkep, dan Luwu Utara. Bila dikelompokkan ke dalam kelompok umur maka jumlah kasus yang tertinggi berada pada kelompok umur <5 tahun sebanyak 93.560 kasus. Dari kasus tersebut, angka kesakitan diare tertinggi terjadi di kota Makassar dengan 26.485 kasus dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 1.429.242 jiwa (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2014).

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan pertumbuhan dan mengurangi populasi lalat yaitu dengan menggunakan *insektisida*. Penggunaan *insektisida* dapat dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan vektor termasuk dalam upaya pencegahan melalui kontak dengan vektor sebagai pencegahan penularan penyakit. *Insektisida* yang digunakan adalah *insektisida* yang ramah lingkungan seperti menggunakan *insektisida biorasional* yang mana termasuk dalam *insektisida botani*. *Insektisida botani* adalah semua jenis tanaman yang diekstrak dan mempunyai kandungan kimia yang dapat bersifat racun (Hasibuan R 2015).

Tanaman di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat. sesuai data bappenas (2003;2014) terdapat sekitar 38.000 jenis tumbuhan yang ada di Indonesia dan sekitar 55% merupakan tumbuhan endemic dan luas tanaman tahunan sekitar 16.099,27 ha serta tanaman semusim sekitar 506,21 ha. Potensi ini berupa produk alami terdiri atas obat-obatan, *insektisida*, nabati dan produk yang lain, dengan maksud untuk mengganti bahan komersial yang secara umum mengandung bahan kimia yang berbahaya.

Insektisida nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ternyata berpotensi untuk mengendalikan vektor, baik untuk pemberantasan larva maupun lalat dewasa, oleh karena terbuat dari bahan alami/nabati, maka jenis *insektisida* ini

bersifat mudah terurai (*bio-degradable*) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, dan relatif aman bagi alam, bagi manusia dan binatang ternak karena residu cepat menghilang. Daya bunuh *insektisida* nabati berasal dari zat toksik yang dikandungnya. Zat tersebut dapat bersifat racun kontak dan racun perut pada hewan berbadan lunak (Utomo, 2010).

Salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia adalah Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) dan tumbuh hampir di seluruh daerah, namun belum dibudidayakan secara khusus. Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sering dimanfaatkan hampir disemua bagian tumbuhan termasuk daun. Kandungan *Metabolit* *sekundernya* memiliki beberapa manfaat, seperti *antidiabetes*, *antimikrobia*, *antioksidan*, aktivitas *sitotoksik*, dan juga sebagai *insektisida* (Kumar, 2013).

Metabolit sekunder penyebarannya bervariasi untuk setiap tumbuhan serta diakumulasikan pada berbagai organ atau jaringan. Senyawa tersebut dapat dijumpai pada daun, bunga, buah, batang dan akar rimpang serta biji (Balandrin & Klock, 1988 dalam Nur Trisnawati, 2005). *Metabolit sekunder* yang sudah dapat diketahui fungsinya dalam biologi antara lain: *tanin*, *alkaloid*, *terpenoid*, *flavonoid*.

Penggunaan *insektisida nabati* dengan metode semprot umumnya tidak langsung mematikan serangga, namun lebih berfungsi untuk menolak kehadiran serangga, terutama disebabkan oleh baunya yang menyengat. *Insektisida nabati* yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menolak serangga adalah *insektisida sintesis* yang dapat menurunkan populasi serangga dengan cepat, lebih mudah dan praktis dipakai, mudah disimpan dan harganya relatif lebih murah (Novizan, 2002).

Tetapi selain memberikan manfaat yang besar, *insektisida sintesis* juga mendatangkan bahaya bagi manusia yaitu pencemaran lingkungan dan

keracunan. Selain itu bila digunakan secara berulang dapat menimbulkan *resistensi* vektor bahkan matinya hewan bukan sasarannya *insektisida sintetik* yang merupakan hasil *synthesis* di laboratorium.

Contoh dari *insektisida sintetik* tersebut adalah *DDT* yang digunakan untuk menolak nyamuk, dan *dimetilat 2,5 piridin dikarboksilat* yang digunakan untuk menolak lalat rumah. Mengingat penggunaan *insektisida sintetik* menimbulkan banyak efek negatif, maka perlu alternatif penggantinya. Hal ini disebabkan oleh bahan kimia yang diperdagangkan secara luas untuk bahan dasar dalam mensintesis *repellent* tersebut mengandung hidrokarbon terhalogenasi yang diketahui mempunyai waktu paruh terurai relatif panjang dan dikhawatirkan sifat racunnya (Habu, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pencarian senyawa alami yang dapat digunakan sebagai *insektisida nabati* dengan metode semprot lebih diutamakan.

Beberapa penelitian mengenai *insektisida nabati* diantaranya. (Vina Yuliana, 2016). yang menggunakan Penyemprotan Perasan Daun Kamboja (*Plumeria Acuminata*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca Domestica*) kemudian mengamati jumlah lalat yang hinggap pada umpan tersebut, hasil penelitian menunjukkan Konsentrasi yang paling efektif berdasarkan uji LSD adalah 60 % dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Melakukan pengujian Efektivitas Ekstrak Daun cengkeh Sebagai *Repellent* Semprot Terhadap Lalat Rumah (*Musca Domestica*) hasil penelitian menunjukkan Perlakuan terbaik dalam mencegah hinggap lalat adalah pada konsentrasi 20% dengan daya tolak 95,55% (Nur Aliah, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui Daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap lalat rumah (*Musca domestica*).

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot?
2. Pada konsentrasi berapa dari ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) efektif untuk menolak keberadaan lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas ekstrak adalah keberhasilan ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antara konsentrasi dan jumlah hinggapan lalat.
- b. Daya tolak adalah semakin sedikit lalat yang hinggap pada umpan
- c. Ekstrak daun belimbing wuluh dikatakan kuat daya tolaknya terhadap lalat rumah jika angka mencapai 80%-100%.
- d. Ekstrak daun belimbing wuluh dikatakan sedang daya tolaknya terhadap lalat rumah jika angka mencapai 60%-79%.
- e. Ekstrak daun belimbing wuluh dikatakan lemah daya tolaknya terhadap lalat rumah jika angka mencapai 40%-59%.
- f. Ekstrak daun belimbing wuluh dikatakan tidak berpengaruh daya tolaknya terhadap lalat rumah jika angka mencapai 0%-39%.

- g. *Insektisida nabati* adalah bahan aktif yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang dapat digunakan sebagai penolak serangga.
- h. Ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) adalah daun belimbing wuluh yang telah diekstraksi dengan caramaserasi dengan pelarut *metanol* 96%.
- i. Lalat rumah (*Musca domestica*) adalah lalat dewasa karena pada umur tersebut ketahanan tubuh lalat masih kuat dan sudah produktif.
- j. Konsentrasi ekstrak adalah konsentrasi ekstrak untuk perlakuan dalam penelitian ini yaitu : 10%, 15% dan 20%.

Daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot yaitu dihitung berdasarkan jumlah lalat yang hinggap terhadap umpan, semakin sedikit lalat yang hinggap pada umpan maka daya tolak ekstrak terhadap lalat semakin efektif.

Rumus menghitung daya tolak ekstrak terhadap lalat rumah.

$$\text{Daya tolak (\%)} = \frac{\Sigma \text{ lalat awal} - \Sigma \text{ lalat yang hinggap pada umpan}}{\Sigma \text{ lalat awal}} \times 100\%$$

Tingkat keefektifan dapat ditentukan dengan menggunakan skala :

Kuat	: 80% - 100%
Sedang	: 60% - 79%
Lemah	: 40% - 59%
Tidak berpengaruh	: 0% - 39% (Lesmana, 2003)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu kesehatan lingkungan.
- b. Masalah penelitian dibatasi pada ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot.
- c. Lalat yang diteliti adalah lalat rumah (*Musca domestica*).
- d. Senyawa aktif ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang digunakan adalah *flavonoid* dan *metabolit sekunder*.
- e. Botol semprot yang dipergunakan adalah botol *handsprei* baru.
- f. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan dengan pendekatan *eksperimental post test only control group design* dengan tujuan untuk mengetahui daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot.

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Penggunaan insektisida Hayati/Botani :

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Karakteristik variable			
			Variabel	Jenia penelitian	Sampel	Hasil
1	Nur Aliah, Andi Susilawaty, Irviani A.Ibrahim	Uji Efektivitas Ekstrak DaunCengkeh (<i>Syzigium Aromaticum</i>) Sebagai <i>Repellent</i> Semprot Terhadap Lalat Rumah (<i>Musca Domestica</i>)	Konsentrasi ekstrak dan lama pajanan	Kuantitatif dengan pendekatan eksperimen murni (<i>true experiment</i>)	Lalat Rumah (<i>Musca Domestica</i>)	Berdasarkan hasil uji Freidman nilai <i>asymp.sig</i> < 0,05 yaitu 0,029 dimana H_0 diterima dan dinyatakan bahwa ekstrak daun cengkeh (<i>Syzygium aroticum L.</i>) efektif sebagai <i>repellent</i> terhadap lalat rumah (<i>musca domestica</i>). Dari hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh jumlah hinggapan lalat pada ulangan I, II dan III konsentrasi 10% rata-rata 10 ekor, 15% rata-rata 3 ekor dan 20 % rata-rata 1 ekor. Rata-rata daya tolak ekstrak pada konsentrasi 10% yaitu 35,55%, konsentrasi 15% yaitu 82,22% dan konsentrasi 20% yaitu 95,55%. Perlakuan terbaik dalam mencegah hinggapan lalat adalah pada konsentrasi 20% dengan daya

						tolak 95,55%.
2	Vina Yuliana, Yamtana, Abdul Hadi Kadarusno	Aplikasi Penyemprotan Perasan Daun Kamboja (<i>Plumeria Acuminata</i>) Terhadap Kematian Lalat Rumah (<i>Musca Domestica</i>)	konsentrasi perasan daun kamboja 40 %, 50%, 60%.	Jenis penelitian ini merupakan eksperimen dengan menggunakan <i>Post Test Only With Control Group Design</i>	Lalat Rumah (<i>Musca Domestica</i>)	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh konsentrasi perasan daun kamboja pada kematian lalat rumah dengan <i>signifikansi</i> 0,000. Konsentrasi perasan daun kamboja 40 persen, 50 persen dan 60 persen mampu membunuh lalat rumah dengan rata-rata kematian sebesar 5, 10 dan 15 ekor. Konsentrasi yang paling efektif berdasarkan uji <i>LSD</i> adalah 60 persen dengan tingkat <i>signifikansi</i> sebesar 0,000.
3	Zulkahfi, suterayani, suparmin, Sutami, dan Astuti Arif	Pengendalian Serangan Rayap Tanah (<i>Coptotermes sp</i>) Menggunakan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (<i>Averrhoa bilimbi</i>)	konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh 2%. 4%, 6%.	eksperimen murni(<i>true experiment</i>)	Rayap Tanah (<i>Coptotermes sp</i>)	perlakuan ekstrak daun belimbing wuluh berbagai konsentrasi mampu mengendalikan serangan rayap dengan nilai mortalitas mencapai 100%. Perlakuan ekstrak daun belimbing wuluh menunjukkan konsentrasi 6% paling efektif dalam mengendalikan serangan rayap. Penurunan berat kertas uji yang diberi perlakuan lebih rendah dibandingkan dengan kertas

						kontrol.
4	Yokarius Krisman, Puji Ardiningsih, Intan Syahbanu	Aktivitas Bioinsektisida Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi) Terhadap Kecoak (Periplaneta Americana)	Konsentrasi ekstrak	Kuantitatif dengan pendekatan eksperimen	Kecoak (<i>Periplaneta Americana</i>)	Hasil penelitian menunjukkan <i>fraksi nheksan</i> daun belimbing wuluh memberikan pengaruh terhadap kematian kecoak dengan konsentrasi optimum sebesar 25,00% dan mengandung senyawa golongan <i>terpenoid/ steroid</i> . <i>Fraksi nheksan</i> memiliki nilai LC50 sebesar 24,135% dan nilai LT50 sebesar 47,044 jam sehingga berpotensi dijadikan sebagai <i>bioinsektisida</i>
5	Syahrizal	Pemanfaatan bubuk kayu manis (<i>Cinnamomun veru</i>) sebagai <i>Bioinsektisida</i> alami untuk mengusir lalat rumah (<i>Musca domestica</i>)	Konsentrasi ekstrak 10, 20, 30, 40 50 gr,	Eksperimen	Lalat rumah (<i>Musca domestica</i>)	Hasil penelitian lalat rumah (<i>Musca domestica</i>) dengan dosis 10 gr/0,5 kg media rata-rata yang hinggap yaitu 4 ekor lalat dosis 20 gr/0,5 kg media rata-rata yang hinggap yaitu 3 ekor lalat.dosis 30 gr/0,5 kg media rata-rata yang hinggap yaitu 2 ekor lalat.dosis 40 gr/0,5 kg media rata-rata yang hinggap yaitu 2 ekor lalat.dosis 50 gr/0,5 kg media rata-rata yang hinggap yaitu 2 ekor lalat.Kesimpulan ada perbedaan bermakna (signifikan) antara perbedaan berat bubuk kayu manis (<i>Cinnamomun Verum</i>)

						sebagai bioinsektisida alami untuk pengusir lalat rumah (<i>Musca domestica</i>) ($p = 0,007$). Kayu manis (<i>Cinnamomun Verum</i>) dapat digunakan sebagai pengusir lalat jika hendak menjemur ikan ataudaging. Sebaiknya menggunakan kayu manis yang baru yang kering sempurna agararoma lebih bagus.
6	Siti nurhayati, Tri wahyuni sukesi	Efek <i>insektisidal</i> ekstrak etanol daun jambu biji putih (<i>Psidium guajava L</i>) terhadap larva lalat rumah (<i>Musca domestica</i>)	kontrol negatif dengan semua konsentrasi perlakuan	Jenis penelitian ini adalah <i>True eksperimental</i> dengan jenis <i>Desain pretest control group</i>	Lalat rumah (<i>Musca domestica</i>)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa didapatkan pada uji normalitas nilai sig $0,001 < 0,05$ pada <i>uji levene statistic</i> nilai sig $0,018 < 0,05$ <i>uji kruskal walls</i> nilai sig $0,012 < 0,05$, dan <i>uji mann whitney</i> $< 0,05$. pada control negatif dengan semua konsentrasi perlakuan, LC 50 terletak pada konsentrasi 0,028% dan LC 50 pada 10,417 jam.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa telah ada penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan efektivitas *insektisida nabati* terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dan menggunakan bahan ekstrak daun cengkeh dan daun kamboja. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan daun Belimbing wuluh sebagai bahan daya tolak semprot terhadap lalat rumah (*Musca domestica*). Jadi jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif lapangan dengan *metode eksperimen*. hitung berdasarkan jumlah lalat yang hinggap terhadap umpan, semakin sedikit lalat yang hinggap pada umpan maka daya tolak ekstrak terhadap lalat semakin efektif.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dengan metode semprot.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai daya tolak semprot terhadap lalat rumah (*Musca domestica*).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan daun belimbing wuluh sebagai *insektisida nabati* terhadap lalat *alternatif*,

aman, dan ramah lingkungan dalam upaya pengendalian lalat rumah (*Musca domestica*).

2. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini diharapkan bukan hanya berkembang sebagai bahan informasi di bidang akademik saja, namun juga bisa berkembang secara *aplikatif* dimasyarakat yaitu bisa menjadi *Insektisida nabati* dengan metode semprot terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) bagi masyarakat yang ekonomis dan ramah lingkungan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Tumbuhan

Segala sesuatu yang Allah swt. Ciptakan tiada yang sia-sia, semua memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, jika manusia mau berfikir maka ia akan mendapatkan manfaat namun jika mereka ingkar dan sombong maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Segala yang diciptakan Allah swt Dibi bumi ini merupakan tanda-tanda akan Kebesaran-Nya bagi orang-orang yang beriman.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Āli-‘Imrān /3:191.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

"Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka". (Kementerian Agama RI, 2014: 109-110).

Ayat di atas juga menggambarkan bahwasanya tidak ada satupun ciptaan Allah di muka bumi ini yang diciptakan sia-sia. Ayat-ayat itu mengarahkan kepada akal manusia kepada fungsi pertama diantara sekian banyak fungsinya. Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. termasuk keanekaragaman tumbuhan tidaklah sia-sia dan pasti memiliki manfaat yang beranekaragaman pula. Dengan mengetahui ciptaan-Nya, khususnya pada tumbuhan, sehingga dapat memanfaatkan tumbuhan ini untuk berbagai kepentingan manusia.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Asy-Syu'ara /26; 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?.(KementrianAgama RI, 2013 : 371)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat-obatan yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Ketiga hal tersebut telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit.

Misalnya tumbuh-tumbuhan anggur, kurma, delima, dan sebagiannya lagi telah disebutkan lagi namanya oleh Allah dalam Al-Qur'an agar manusia dapat melakukan penelitian yang justru dapat menambah keyakinan seseorang kepada Allah swt. Di antara tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat bagi penyakit tertentu ialah belimbing wuluh.


1.Deskripsi Dan Klasifikasi Tanaman

Belimbing wuluh (*Averrhoa Bilimbi* L) termasuk dalam

FamilyOxalidaceae.

Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Sub divisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledonae</i>
Bangsa	: <i>Geraniales</i>
Suku	: <i>Oxalidaceae</i>
Marga	: <i>Averrhoa</i>
Jenis	: <i>Averrhoa bilimbi</i> Linn (Heyne, K. 1987).

2. Morfologi



Gambar 2.1 A. Pohon belimbing wuluh, B. Daun C. Bunga D. Buah
Sumber :dokumentasi pribadi

Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) merupakan tumbuhan berjenis pohon (Gambar 2.1), hidup pada ketinggian 500-750 meter di atas permukaan laut, dan tempat tumbuh yang disukainya ialah yang lebih banyak terkena matahari langsung. Pohon tersebut setelah besar dapat mencapai ketinggian 5-10 meter, mempunyai batang yang tidak begitu besar dengan permukaan kasar dan berbenjol-benjol, dahan jarang, kasar dan mudah patah. Daun majemuk menyirip dengan anak daun berbentuk bulat telur atau oval (Gambar 2.1), daun berwarna coklat muda, sedangkan yang tua berwarna hijau kekuningan. Panjang daun 30-60 cm dan berkelompok, diujung cabang. Pada setiap daun terdapat 21-45 anak daun yang berselang-seling atau setengah berpasangan (sudarsono, 2000).

3. Nama Daerah

Aceh (limeng, selimang, thlimeng), Gayo (selemeng), batak (Asom, belimbing, balimbingan), Nias (malimbi), Minangkabau (balimbieng), Melayu

(belimbing asam), Lampung (balimbing), Sunda (calincing, balimbing), Jawa (balimbing wuluh), Madura (bhalingbhing bulu), Bali (blingbing buloh), Bima (limbi), Flores (balimbeng, sawu, libi, sangi, belerang) (Arisandi dan Andrian, 2006).

4. Kandungan kimia

Senyawa sekunder yang dihasilkan oleh daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi L.*) adalah *alkaloid*, *saponin*, dan *flavonoid*, *terpenoid/ Triterpenoid*. *Saponin* merupakan golongan senyawa *triterpenoid* yang dapat digunakan sebagai *insektisida* dan *bioinsektisida*. (Nopianti, S., dkk 2008)

a. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa 15 karbon yang tersebar pada bagian-bagian tumbuhan (akar, batang, daun serta bagian generatif) dan dapat larut dalam air. Salah satu contoh *flavonoid* adalah pigmen bunga (*Antosianin*) yang berperan dalam menarik polinator seperti burung dan serangga, serta berperan dalam pengaturan *fotosintesis*. *Flavonoid* berfungsi sebagai kerja anti mikroba dan anti virus, serta kerja terhadap serangan serangga. *Flavonoid* mempunyai sifat yang khas yaitu bau yang sangat tajam, dapat larut dalam air dan pelarut organik serta mudah terurai pada temperatur tinggi. *Flavonoid* digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan insektisida nabati. *Flavonoid* masuk ke dalam mulut serangga/lubang alami di tubuh serangga dan menimbulkan kelayuan pada saraf.

b. Tanin

Tanin dijumpai dalam tanaman misalnya pada daun, buah, kulit batang atau dahan. Secara kimiawi *tanin* merupakan senyawa kompleks, biasanya merupakan campuran *polifenol*, yang sulit dipisahkan karena tidak mengkristal. Apabila *tanin* direaksikan dengan air akan membentuk larutan *koloid* yang memberikan reaksi asam dan rasa yang tajam. Sebagian besar tanaman yang

mempunyai kandungan *tanin* yang tinggi dihindari oleh hewan karena rasanya yang sepat.

c. *Terpenoid/Triterpenoid*

Triterpenoid merupakan komponen senyawa aktif yang dapat bekerja sebagai *antifungus*, *insektisida*, dan beberapa senyawa dapat menunjukkan sifat antibakteri dan antivirus. Selain itu pada tumbuhan obat dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit termasuk diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati dan malaria.

d. *Alkaloid*

Bidang kesehatan *alkaloid* mempunyai efek berupa pemicu system saraf, menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, *antimikroba*, obat penenang dan obat penyakit jantung (Robinson 2008). Pada tumbuhan, *alkaloid* berfungsi sebagai pelindung dari serangga hama, penguat tumbuh-tumbuhan serta sebagai pengatur kerja *hormon*. Telah diketahui sekitar 5.500 senyawa *alkaloid* yang tersebar di berbagai suku (Harbone, 1987).

5. Manfaat Tanaman

Daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit batuk, diabetes, rematik, gondongan, sariawan, sakit gigi, diare sampai tekanan darah tinggi dan buahnya untuk mengatasi penyakit seperti jerawat, gusi berdarah, panu dan memperbaiki fungsi pencernaan (arief, 2009).

B. Tinjauan tentang Lalat Rumah

Lalat merupakan serangga yang perannya selalu kita lihat dari sisi negatif saja, seperti jorok, pembawa penyakit dan lain sebagainya, namun Allah swt. menciptakan segala sesuatu termasuk hewan kecil seperti lalat dengan maksud dan tujuan. Allah swt. bahkan tidak segan untuk menggunakan makhluk kecil

sebagai perumpamaan yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar dan tepat oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah swt.

Allah swt. berfirman dalam QS.Al Hajj/22: 73

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan sekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah” (Kementerian Agama RI, 2013 :341).

Allah swt. telah mendatangkan perumpamaan tentang lalat (*dhubab*). Dalam al-Mu`jam al-Wasit, dinyatakan bahawa *dhubab* ialah sejenis hewan kecil yang bersayap (Anis et al) .Ia adalah serangga berwarna hitam terdapat di dalam rumah dan sering menghinggap ke dalam bekas air dan makanan. Serangga ini dinamakan sebagai *dhubab* kerana pergerakannya yang banyak.

Sebenarnya menciptakan lalat sama mustahilnya dengan menciptakan unta atau gajah, karena lalat pun memiliki rahsia yang tidak dapat terungkap yakni hidup. Tetapi gaya bahasa Al-Qur`an yang sungguh istimewa memilih lalat yang kecil dan diremehkan itu karena ketidak mampuan menciptakannya lebih menanamkan dalam benak kesan kelemahan dari pada jika yang disebut adalah unta atau gajah (M. Quraish. 2015).

Sementara pakar berkata bahwa walaupun manusia mampu menangkap lalat, dia pun tidak akan mampu mengambil kembali apa yang telah direbutnya, karena lalat saat menggunakan belalainya, mengeluarkan zat-zat yang menjadikan apa yang direbutnya itu berubah sifatnya sehingga ia tidak lagi sepenuhnya sama dengan keadaannya sebelum direbut (M. Quraish. 2015).

Karena itu jangan sekali-kali meremehkan lalat. Lalat adalah binatang yang sangat berani. Dia memang terbang jika anda mengusirnya, tetapi hanya sementara, karena sebentar lagi ia akan kembali, demikian seterusnya. Ia dinilai pemberani, sehingga seseorang yang luar biasa keberaniannya dilukiskan oleh pribahasa Arab dengan “Lebih berani dari lalat”. Demikianlah, Jika Anda memperhatikan lalat dan merenungkannya, Anda pasti akan sampai kepada kesadaran tentang kehadiran Allah pada lalat dan kegiatan-kegiatannya itu. Bukankah Allah hadir dimana-mana? (M. Quraish. 2015).

Dalil di atas pada dasarnya adalah perumpamaan yang Allah swt. berikan kepada manusia yang menyembah selain Allah, yaitu bahwa sekiranya semua Tuhan. Tuhan yang mereka sembah tersebut bersatu untuk membuat seekor lalat saja, maka niscaya mereka sekali-kali tidak akan bisa membuatnya. Hal ini sebenarnya menggambarkan betapa lemahnya kedua pihak yang diceritakan dalam ayat tersebut. Pertama manusia, betapa lemahnya manusia tersebut karena telah menyembah benda mati yaitu berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua betapa lemahnya berhala yang mereka sembah dikatakan dalam ayat tersebut “*jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu*”, yang bermakna bahwa berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun bahkan untuk menolong dirinya sendiri.

1. *Toksonomi* Lalat Rumah (*Musca domestica*)

Kingdom : *Animalia*

Phylum : *Arthoropoda*

Kelas : *Hexapoda*

Ordo : *Diptera*

Family : *Muscidae*

Genus : *Musca*


Spesies : *Musca domestica* (Simanjuntak, 2001):



Gambar 2.2 : lalat rumah
(Sumber : indonesian-publichealth.com)

2. **Siklus hidup**

Depkes (1991) menerangkan bahwa: “Lalat adalah *Insekta* yang mengalami *metamorfosa* yang sempurna, dengan stadium telur, larva, kepompong dan stadium dewasa”. Hal ini menunjukkan semua lalat mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya (Husain, 2014).



Gambar 2.3 Fase perkembangbiakan lalat *M. domestica*. A: telur, B: larva, C: pupa dan D: lalat dewasa *M. domestica* (Sumber : Sanchez *et al.* 2014)

Metamorfosis sempurna yang dialami lalat adalah sebagai berikut: Stadium telur, stadium larva, stadium kepompong dan terakhir stadium dewasa. Siklus ini bervariasi bergantung pada keadaan lingkungan perkembangbiakannya. Waktu yang dibutuhkan lalat menyelesaikan siklus hidupnya dari sejak masih telur sampai dengan dewasa antara 12 sampai 30 hari. Menurut Depkes RI (1991), bahwa: “rata-rata perkembangan lalat memerlukan waktu antara 7-22 hari, tergantung dari suhu dan makan dan yang tersedia” (Husain, 2014)

Dalam kehidupan lalat dikenal ada 4 (empat) tahapan yaitu mulai dari telur, larva, pupa dan dewasa :

a. *Fase telur*

Telur lalat berwarna putih dengan ukuran lebih kurang 1 mm, setiap kali bertelur akan menghasilkan 120-130 butir telur dan menetas dalam waktu 10-12 jam. Pada suhu rendah telur ini tidak akan menetas (dibawah 12-13 °C) dan akan menetas pada suhu 30 °C (Sucipto, 2011).

b. *Fase larva*

Ukuran *larva* kurang lebih 1mm setelah 4-5 hari pada suhu 30 °C melewati tiga *fase instar*, *larva instar* I dan II berwarna putih, sedang *larva instar* III

berwarna kekuningan. *Larva* memiliki sepasang *spirakle posterior* yang jelas dan memakan barteri, dan bahan-bahan dekomposisi. Larva awalnya menyukai suhu dan kelembaban tinggi tetapi menghindari cahaya. Sebelum menjadi pupa *larva* berhenti makan dan pindah ketempat yang lebih kering dan dingin. *Larva* ini mudah terbunuh pada temperatur 73 °C (Sucipto, 2011)

c. *Pupa*


Ketika terjadi *pupasi*, kulit *larva* mengkerut dan membentuk *puparium* seperti peluru dengan mengembangkan kantong berisi darah ke depan kepala. Lama stadium *pupa* 2-8 hari atau tergantung dari temperatur setempat, bentuknya bulat lonjong dengan warnah coklat hitam. Stadium ini kurang bergerak bahkan tidak bergerak sama sekali. Panjangnya kurang lebih ± 5 mm mempunyai selaput luar disebut *posterior spirakle* yang berguna untuk menentukan jenisnya (Sucipto, 2011).

d. Lalat

Lalat muda, awalnya lalat tampak lunak, pucat abu-abu dan tanpa sayap. Setelah istirahat, sayap dikembangkan dan *kutikula* mengeras serta warnanya gelap, lalat muda mencari makan setelah sayapnya mengembang selama waktu 2-24 jam setelah muncul dari pupa (Sucipto,2011).

Proses pematangan menjadi lalat dewasa kurang lebih 15 jam dan setelah itu siap untuk mengadakan perkawinan. Seluruh waktu yang diperlukan 7-22 hari, tergantung pada suhu setempat, kelembaban dan makanan yang tersedia. Umur lalat dewasa dapat mencapai 2-4 minggu (Habu, 2015).

3. Morfologi Lalat Rumah (*Musca domestica*)



Gambar 2.4 Morfologi lalat rumah (*Musca domestica*)
(Sumber : Wikipedia, 2013)

Keterangan gambar :

- A. Tarsus
- B. Antena
- C. Toraks
- D. Mata
- E. Sayap

- a. Lalat berukuran sedang, panjang 6-8 mm, berwarna hitam keabu-abuan dengan garis memanjang gelap pada bagian *dorsal toraks* dan satu garis hitam medial pada *abdomen dorsal* (Sucipto, 2011).
- b. Pada lalat betina matanya mempunyai cela yang lebih lebar, sedangkan lalat jantang lebih sempit (Sucipto, 2011).
- c. Antenanya terdiri dari tiga ruas, ruas terakhir paling besar, berbentuk silinder dan dilengkapi dengan *arista* yang memiliki bulu pada bagian atas dan bawah (Sucipto, 2011).
- d. Bagian mulut atau *proboscis* lalat disesuaikan khusus dengan fungsinya untuk menyerap dan menjilat makanan berupa cairan atau sedikit lembek, ketika lalat tidak sedang makan sebagian mulutnya ditarik ke dalam selubung, tetapi ketika sedang makan akan dijulurkan ke arah bawah (Sucipto, 2011).

- e. Bagian ujung *proboscis* terdiri atas sepasang *labella* berbentuk *oval* yang dilengkapi dengan saluran halus disebut *pseudotrakhea* tempat cairan makanan diserap. Lalat rumah makanannya sangat bervariasi, dan cara makannya tergantung pada keadaan fisik makanan (Sucipto, 2011).
- f. Sayapnya mempunyai 4 *vena* yang melengkung tajam ke arah *kosta* mendekati *vena* 3. *Vena* merupakan karakter yang menjadi ciri pada lalat rumah dan merupakan pembeda dengan *musca* jenis lainnya (Sucipto, 2011).
- g. Ketiga pasang kaki lalat pada ujungnya mempunyai sepasang kuku dan sepasang bantalan disebut *pulvillus* yang berisi kelenjar rambut, bantalan tersebut yang membuat lalat dapat menempel pada permukaan halus dan mengambil kotoran dan *patogen* ketika mengunjungi sampah dan tempat kotor lainnya (Sucipto, 2011).

4. Bionomik Lalat Rumah (*Musca domestica*)

- a. Tempat bertelur (*Habitat places*)

Kebiasaan Lalat rumah bisa membiak di setiap medium yang terdiri dari zat organik yang lembab dan hangat dapat memberi makan pada larva-larvanya. Medium pembiakan yang disukai ialah kotoran kuda, kotoran babi dan kotoran burung. Lalat rumah juga membiak di *feses* manusia dan karena *feses* manusia ini juga mengandung organisme *patogen* maka ia merupakan medium pembiakan yang paling berbahaya. Selain itu sampah yang ditumpuk di tempat terbuka karena mengandung zat-zat organik merupakan medium pembiakan lalat rumah yang penting.

Sebelum meletakkan telur, lalat biasanya melakukan orientasi terlebih dahulu dengan mencari media yang cocok untuk bertelur demi kelangsungan hidupnya. Lalat memiliki bagian yang sangat peka yaitu *tarsi* yang terletak pada bagian kepala dan *thorax* karena adanya *kemoreseptor* atau *sensilia olfaktori* yang

berpori sehingga dapat mendeteksi aroma yang tidak disenangi. Pada umumnya serangga memiliki *dendrit* atau bagian cabang *neuron* yang berfungsi menerima rangsangan pada bagian ujung yang tidak terlindung (Indriasih, 2015).

b. Jangkauan terbang

Lalat rumah bisa terbang jauh dan bisa mencapai jarak 15 km dalam waktu 24 jam. Sebagian besar tetap berada dalam jarak 1,5 km di sekitar tempat pembiakannya, tetapi beberapa bisa sampai sejauh 50 km. Lalat dewasa hidup 2-4 minggu pada musim panas dan lebih lama pada musim dingin. Mereka melampaui musim dingin (*over wintering*) sebagai lalat dewasa, dan berkembang biak di tempat-tempat yang relatif terlindung seperti kandang ternak dan gudang-gudang.

c. Tempat istirahat

Dalam memilih tempat istirahat (*resting place*), lalat lebih menyukai tempat yang tidak berangin, tetapi sejuk, dan kalau malam hari sering hinggap di semak-semak di luar tempat tinggal. Lalat beristirahat pada lantai, dinding, langit-langit, jemuran pakaian, rumput-rumput, kawat listrik dan lain-lain serta sangat disukai tempat-tempat dengan tepi tajam yang permukaannya vertikal. Tempat istirahat tersebut biasanya dekat dengan tempat makannya dan tidak lebih dari 4,5 meter di atas permukaan tanah (Depkes, 1991 dalam Husain, 2014).

d. Kebiasaan makan

Lalat memakan makanan yang dimakan oleh manusia sehari-hari, seperti gula, susu dan makanan lainnya, kotoran manusia serta darah. Bentuk makanannya cair atau makanan yang basah, sedang makanan yang kering dibasahi oleh ludahnya terlebih dulu, baru diisap (Habu, 2015).

e. Lama hidup

Pada musim panas, usia lalat berkisar antara 2-4 minggu, sedang pada musim dingin bisa mencapai 70 hari (Depkes, 1991). Tanpa air lalat tidak dapat

hidup lebih dari 46 jam. Sehingga lama hidup lalat pada umumnya berkisar antara 2-70 hari (Husain, 2014).

f. Temperatur dan kelembaban

Lalat mulai terbang pada *temperatur* 15 °C dan aktifitas optimumnya pada temperatur 21 °C. Pada temperatur di bawah 7,5 °C tidak aktif dan di atas 45 °C terjadi kematian pada lalat. Kelembaban erat hubungannya dengan *temperature* setempat. Kelembaban berbanding terbalik dengan *temperatur*. Jumlah lalat pada musim hujan lebih banyak dari pada musim panas. Lalat sangat sensitif terhadap angin yang kencang, sehingga kurang aktif untuk keluar mencari makanan pada waktu kecepatan angin (Husain, 2014).

5. Penyakit yang Ditimbulkan Lalat Rumah (*Musca Domestica*)

Lalat rumah (*musca domestica*) dapat bertindak sebagai vektor penyakit *typus*, penyakit perut lainnya seperti *disentridan diare*, *kolera*, dan penyakit kulit (Kartikasari, 2008).

a. Penyakit *Disentri*

Kuman penyebab penyakit menempel pada kaki dan belalai lalat kemudian terbawa ikut pindah ke tempat yang dihinggapi sambil menghisap makanan merayap di atasnya, atau melalui kotoran dan muntahan lalat. Salah satu penelitian Wart dan Lindsay tahun 1948 terhadap penyakit disentri dan penyakit *shigellosis*, dengan pengendalian lalat rumah jumlah kejadian penyakit tersebut bisa diturunkan sampai 50%.

b. Demam *Tipoid*

Manusia tertular kuman *tipoid* atau penyakit saluran cerna lain melalui makanan yang tercemar kuman dari lalat yang sebelumnya lalat hinggap di kotoran manusia yang mengandung kuman *tipus*/penyakit saluran cerna.

c. *Diare*

Banyak faktor yang dapat menyebabkan manusia terkena diare, salah satunya adalah vektor Lalat yang hinggap pada kotoran kemudian membawa bakteri *E.coli*, *Salmonella*, *Shigella* atau yang lain, dan hinggap pada makanan atau minuman manusia.

d. *Anthrax*

Penularan kuman anthrax karena lalat hinggap pada daging binatang yang mati karena penyakit *anthrax*, kemudian hinggap pada timbunan kotoran sekitar manusia. Kuman *anthrax* lama-kelamaan ikut debu dan terhisap manusia sebagai lazimnya penularan penyakit *anthrax*.

e. *Lepra*

Kuman *lepra* yang menempel pada tubuh lalat tercampur debu dan ikut terbawa angin kemudian dihirup manusia melalui pernafasan.

f. Penyakit cacingan (cacing gelang, pita dan tambang)

Seperti penyakit saluran cerna lain, telur cacing dipindahkan lalat dari kotoran penderita ke makanan manusia.

6. Pengendalian Vektor

Pengendalian adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan/menekan populasi atau *densitas* vektor dengan maksud untuk mencegah penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh vektor (Sumantri, 2013). Menurut Hoedojo dan Zulhasril, 2008 secara garis besar pengendalian vektor terbagi 2 yaitu:

a. **Pengendalian Alami**

Berbagai faktor *ekologi* berperan dalam pengendalian *vektor* secara alami seperti:

- 1) Adanya gunung, laut, danau dan sungai yang merupakan rintangan bagi penyebaran serangga.

- 2) Ketidakmampuan beberapa *spesies* serangga untuk mempertahankan hidupnya di ketinggian tertentu dari permukaan laut.
- 3) Perubahan iklim, (musim, curah hujan, angin), suhu udara serta kelembaban udara yang dapat menimbulkan gangguan pada beberapa *spesies* serangga.


b. Pengendalian Buatan

- 1) Pengelolaan lingkungan, pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan, yaitu dengan *memodifikasi* atau *manipulasi* lingkungan. Misalnya pembersihan dan pemeliharaan sarana fisik tempat istirahat serangga atau 3M dll.
- 2) Fisik, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan pemanas, pembeku, serta penggunaan alat listrik lain untuk penyinaran cahaya dan pengadaan angin yang dapat membunuh atau mengganggu kehidupan serangga.
- 3) Kimia, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan *insektisida*. *Insektisida* adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga. Menurut Ridad (1999), ada beberapa istilah yang berhubungan dengan *insektisida* seperti: *ovisida*, yaitu insektisida untuk membunuh stadium telur, *larvasida*, yaitu *insektisida* untuk membunuh stadium larva, dan *adultisida*, yaitu *insektisida* untuk membunuh stadium dewasa.
- 4) *Mekanik*, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan alat yang langsung dapat membunuh, menangkap, menyisir, atau menghalau serangga. Misalnya menggunakan baju pelindung dan memasang kawat kasa di jendela merupakan salah satu cara untuk menghindarkan hubungan antara manusia dengan *vektor*.

- 5) Biologi, pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan makhluk lain yang merupakan musuh alami lalat. Beberapa *parasit* dari golongan *nematoda*, *bakteri*, *protozoa*, *virus* yang dapat digunakan sebagai pengendali *larva* lalat.




C. Kerangka Teori



Gambar 2. 5 : Skema Kerangka Teori Sumber : Modifikasi dari Teori Hoedojo dan Zulhasril, 2008

D. Kerangka Konsep



Gambar 2.6 : Skema Kerangka Konsep
Sumber: Disadur Dari Beberapa Referensi

Keterangan :

-  Variabel Independen
-  : Variabel Kontrol
-  : Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *kuantitatif* lapangan dengan *metode eksperimen*. Penelitian *kuantitatif* merupakan jenis penelitian yang bersifat *objektif*, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan pengujian *statistik* (Nur Ikhsan, 2014). Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh *variabel* tertentu terhadap *variabel* lain dengan kontrol yang ketat dan umumnya bersifat *laboratories*.


2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. pembuatan ekstrak belimbing wuluh dilakukan di Laboratorium Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen murni (*True Experiment*) dengan rancangan *Posttest Only Control Group Design*, yaitu merupakan desain penelitian yang tidak menggunakan pretes terhadap sampel sebelum perlakuan. Dalam desain ini terdapat dua kelompok masing-masing dipilih secara acak (*randomization*), kelompok-kelompok yang ada dianggap sama sebelum dilakukan perlakuan. Desain penelitian ini yaitu untuk mengukur

pengaruh perlakuan pada kelompok *eksperimen* dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol (Nur Ikhsan, 2014). Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Desain Penelitian

Keterangan :

- S = Sampel lalat rumah (*Musca domestica*)
- R = *Randomisasi* (dipilih secara acak)
- K = Kelompok lalat rumah uji tanpa perlakuan (kontrol)
- K1 = Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun belimbing wuluh pada konsentrasi 10%
- K2 = Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun belimbing wuluh pada konsentrasi 15%
- K3 = Kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun belimbing wuluh pada konsentrasi 20%
- O = Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji tanpa perlakuan (kontrol)
- O1 = Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 10 %
- O2 = Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 15 %

O3 = Hasil pengamatan kelompok lalat rumah uji dengan pemberian ekstrak daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 20 %

Di dalam penelitian ini, menggunakan 4 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan 3 kali ulangan (replikasi).

Tabel 3.1 Ulangan (replikasi) Perlakuan.

Perlakuan	Ulangan					
	I		II		III	
	1-30 menit	31-60 menit	1-30 menit	31-60 menit	1-30 menit	31-60 menit
K _n	K _n W ₁	K _n W ₂	K _n W ₁	K _n W ₂	K _n W ₁	K _n W ₂
K1	K ₁ W ₁	K ₁ W ₂	K ₁ W ₁	K ₁ W ₂	K ₁ W ₁	K ₁ W ₂
K2	K ₂ W ₁	K ₂ W ₂	K ₂ W ₁	K ₂ W ₂	K ₂ W ₁	K ₂ W ₂
K3	K ₃ W ₁	K ₃ W ₂	K ₃ W ₁	K ₃ W ₂	K ₃ W ₁	K ₃ W ₂

Keterangan :

K_n : Kelompok lalat uji tanpa perlakuan (Kontrol)

K1 : Kelompok lalat uji dengan ekstrak daun Belimbing Wuluh (*averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 10%

K2 : Kelompok lalat uji dengan ekstrak daun Belimbing Wuluh (*averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 15%

K3 : Kelompok lalat uji dengan ekstrak daun Belimbing Wuluh (*averrhoa bilimbi*) pada konsentrasi 20%

W1 : Waktu paparan lalat (1-30 menit)

W2 : Waktu paparan lalat (31-60 menit)

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah lalat rumah (*Musca domestica*) yang diambil/ditangkap di alam bebas Cafeteria Uin Alauddin Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah lalat dewasa, jenis lalat rumah (*Musca domestica*). Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok uji dengan konsentrasi (10%, 15% dan 20%). Jumlah sampel tiap-tiap perlakuan sama, yaitu sebanyak 15 sampel yang dipilih secara acak, jadi jumlah seluruh sampel yang dibutuhkan adalah 180 ekor lalat rumah (*Musca domestica*).

Sampel bahan ekstrak dalam penelitian ini adalah daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang berasal dari desa Barombong Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung sesuai dengan prosedur yang terencana meliputi melihat dan mencatat jumlah ataupun aktivitas tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti melihat dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.


Tetapi dalam penelitian ini yang dimaksud observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati dan mencatat jumlah hinggapan lalat rumah (*Musca domestica*) setelah disemprot dengan ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) dengan berbagai konsentrasi yang berbeda dan dengan batas lama pemajanan yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen, baik berupa gambar maupun tulisan, serta menganalisa dokumen-dokumen yang ada, untuk mendukung penyusunan penelitian.



E. Alur Penelitian



Gambar 3.2 : Alur Penelitian

F. Instrumen Penelitian

1. Pembuatan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*)

a. Alat

Alat yang digunakan antara lain, toples (wadah maserasi), kain kasa, *aluminium foil*, oven merek *Mermet*, rotavapor merek *Heidolph*, wadah tempat penyimpanan, corong ukuran kecil, gunting, neraca analitik merek Kern.

b. Bahan

Bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak adalah daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*), dan Cairan penyari *metanol 96%*.

c. Prosedur Kerja

Ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang akan diekstraksi diperoleh dari pohon belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) Setelah itu daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) tersebut dicuci dengan air bersih yang mengalir ditiriskan hingga airnya tidak menetes kemudian digunting-gunting kecil, lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 30- 45 C. Kemudian disimpan dalam wadah bersih dan tertutup rapat.

Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang telah ditimbang sebanyak 800 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah *maserasi*, kemudian ditambahkan *metanol 96%* (hingga terlarut). Wadah *maserasi* ditutup dan disimpan selama 2 x 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan *filtrat*. Ampas diekstraksi kembali dengan *metanol* yang baru dengan jumlah yang sama (jika diperlukan). *Filtrat metanol* diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan rotavapor sampai diperoleh *ekstrak metanol* kental. Kemudian dibebaskan metanolkan

sampai di peroleh ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*).Dan selanjutnya mengencerkan ekstrak daun belimbing wuluh menjadi beberapa konsentrasi yaitu 10%, 15% dan 20%.

2. Pembuatan *Handsprei* Lalat

a. Alat

Alat yang digunakan sebagai alat semprotlalat adalah botol atau *handsprei* baru.

b. Bahan

Bahan yang digunakan adalah, ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*).

c. Prosedur Kerja

Siapkan alat semprot/handsprei yang sebelumnya dicuci dan dikeringkan.Kemudian botol handsprei diberi bahan aktif berupa ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*). Dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 10%, 15%, dan 20%, setelah itu *handsprei* siap untuk digunakan.

3. Uji Insektisida Nabati Dari Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*)

a. Alat

Alat yang digunakan adalah kandang lalat, kertas label, *stopwatch*, *termometer*, *hygrometer*, *handsprei*, alat tulis, dan lembar observasi.

b. Bahan

Bahan yang digunakan adalah lalat rumah (*Musca domestica*).

c. Prosedur Kerja

1. Siapkan kandang uji yang telah diberi lebel
2. Siapkan botol handsprei yang berisi ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*).

3. Lalat dimasukkan ke dalam kandang uji. Masing-masing kandang uji berisi 15 ekor lalat yang diambil secara acak. Jadi jumlah lalat dalam penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 180 ekor lalat rumah (*Musca domestica*).
4. Menunggu selama satu menit dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan pencatatan temperatur dan kelembaban udara.
5. Semprotkan ekstrak daun belimbing wuluh ke permukaan kandang uji. Amati dan catat jumlah hinggapan lalat tersebut selama 60 menit.
6. Perlakuan terhadap sampel uji dilakukan sebanyak 3 kali *replikasi*.

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validasi instrumen merupakan tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (Instrumen penelitian) dalam melakukan fungsi ukurnya. Seperti :

- a. Menggunakan alat ukur yang sama dan valid
- b. Pengukuran dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.

2. Reliabilitas

Reliabilitas data dijaga dengan melakukan replikasi pengujian sebanyak tiga kali pada setiap kelompok uji.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah diperoleh data dari jumlah hinggapan lalat terhadap umpan, maka dilakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Dilakukan editing dan tabulating data. Data selanjutnya

dianalisis dengan melakukan uji statistik menggunakan program statistik komputer (SPSS 23).

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, jika data terdistribusi normal maka di lanjutkan dengan *Uji regresi linear*, namun jika data tidak terdistribusi normal maka akan dilakukan uji freidman untuk mengetahui apakah ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*) efektif untuk menolak keberadaan lalat rumah. Hasil pengolahan dan uji statistik yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilaboratorium farmasi UIN Alauddin Makassar dan laboratorium Kesehatan Lingkungan UIN Alauddin Makassar pada tanggal 13 mei sampai 12 juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan ekstrak daun belimbing wuluh mulai tanggal 13 mei 2019 sampai 20 juni 2019
2. Perlakuan pada sampel uji terhadap lalat rumah (*musca domestica*) mulai tanggal 3 juli 2019 sampai 12 juli 2019.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada penyajian tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Pengukuran Suhu Dan Kelembaban Ruangan Laboratorium
Kesehatan Lingkungan

Pengulangan	Suhu ruangan (°C)	Kelembaban %
I	27	71
II	29	72
III	29	72
Rata-rata	28	72

Sumber :Data primer, 2019

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata suhu ruangan pada waktu penelitian 3 kali pengulangan adalah 28⁰C dan rata-rata kelembaban udara pada 3 kali pengulangan adalah 72 %.

Tabel 4.2

Jumlah Lalat Yang Hinggap Pada Permukaan Kandang Selama Ulangan
1,11 Dan 111 Waktu Pemaparan 60 Menit

Konsentrasi	Pengulangan	Jumlah lalat yang hinggap
-------------	-------------	---------------------------

		(menit)	
		0-30	31-60
Kontrol 0%	I	15	13
	II	17	11
	III	13	14
	Jumlah lalat	45	38
	Rata-rata	15	13
10%	I	4	6
	II	5	4
	III	4	3
	Jumlah lalat	13	13
	Rata-rata	4	4
15 %	I	3	2
	II	1	4
	III	2	1
	Jumlah lalat	6	7
	Rata-rata	2	2
20 %	I	0	1
	II	0	0
	III	0	1
	Jumlah lalat	0	2
	Rata-rata	0	1

Sumber : data primer 2019

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 4.2 Menunjukkan bahwa rata-rata jumlah hinggapan lalat ulangan I, II dan III pada kontrol (0%) pada waktu 0-30 yaitu 15 ekor lalat dan pada 31-60 menit 13 ekor lalat. Konsentrasi 10 % pada waktu 0-31 dan 31-60 menit yaitu masing-masing 4 ekor, pada konsentrasi 15% waktu pengamatan 0-30 menit yaitu 2 ekor dan 31-60 menit yaitu 2 ekor, kemudian pada konsentrasi 20% menit 0-31 yaitu 0 ekor(tidak ada) dan pada menit 31-60 yaitu 1 ekor lalat.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Daya tolak (%) Ekstrak Daun belimbing wuluh
sebagai insektisida nabati terhadap Lalat (*Musca domestica*) Pada Ulangan I,
II dan III

Replikasi	Jumlah lalat	Konsentrasi							
		0%		10 %		15%		20%	
		Lalat hinggap	DT (%)	Lalat hinggap	DT (%)	Lalat hinggap	DT (%)	Lalat hinggap	DT (%)
I	15	28	-86,66	10	33.33	5	66.66	1	93.33
II	15	28	-86,66	9	40	5	66.66	0	100
III	15	27	-80	7	53.33	3	80	1	93.33
Rata-rata					42.22		71.10		95.55

Sumber: Data Primer, 2019


Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata daya tolak ekstrak daun belimbing wuluh terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) bahwa pada konsentrasi 10% yaitu 42.22%, pada konsentrasi 15% yaitu 71.10% dan pada konsentrasi 20% yaitu 95,55%

B. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan program analisis data *Statistic Product and Service Solution (SPSS) for Windows Release 23*. Analisis pertama yang dilakukan adalah menghitung apakah data hasil penelitian yang diperoleh memiliki distribusi yang normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada hasil pemeriksaan jumlah lalat yang hinggap pada kontrol dan perlakuan konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil uji statistik menggunakan *uji Regresi Linear* (lihat pada lampiran) diperoleh nilai *asympt. Sig* < 0,05 yaitu 0,000 yang dinyatakan bahwa ekstrak berpengaruh untuk menolak keberadaan lalat rumah (*Musca domestica*).

Peningkatan Daya Proteksi Ekstrak Daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar 4.1 Grafik Garis Peningkatan Daya Tolak Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) Terhadap Lalat Rumah (*Musca domestica*)

Dari gambar 4.1 Dapat dilihat bahwa daya tolak berbanding lurus dengan konsentrasi, yang artinya semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) maka akan dihasilkan daya tolak yang semakin tinggi pula. Daya tolak ekstrak pada konsentrasi 10% tidak terlalu besar yaitu 42,22%, hal ini dapat disebabkan karena lalat masih dapat beradaptasi dengan aroma daun belimbing pada konsentrasi tersebut. Sedangkan untuk konsentrasi 15% daya tolaknya 71,10% dan konsentrasi 20% daya tolaknya paling tinggi 95,55%, aroma ekstrak daun belimbing wuluh cukup menyengat sehingga lalat tidak suka hinggap lagi.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*). belimbing wuluh merupakan satu jenis tanaman tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi diabetes, rematik, gondongan, sariawan, sakit gigi, gusi berdarah, jerawat, diare dan tekanan darah tinggi. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daunnya dimana kandungan kimia yang terdapat di dalam daunnya adalah *tanin, sulfur, steroid, asam format, dan flavonoid*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dimana waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00, dan juga tanaman yang sudah mulai berbunga karena saat itulah tanaman terjadi fotosintesis maksimum. Setelah daun dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pengeringan dilakukan agar reaksi enzimatik tidak berjalan dan mencegah pertumbuhan mikroba pada simplisia daun belimbing wuluh. Setelah didapatkan simplisia daun belimbing wuluh, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Sampel yang telah kering lalu dimaserasi dengan menggunakan pelarut *metanol* 96%.

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi. Dimana maserasi dilakukan dengan merendam simplisia daun belimbing wuluh dalam pelarut hingga seluruh simplisia terendam seluruhnya. Larutnya kandungan kimia simplisia saat proses maserasi, umumnya akan terjadi apabila pelarut menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel. Di dalam rongga sel inilah terdapat senyawa aktif yang dapat larut di dalam pelarut. Perbedaan konsentrasi antara larutan senyawa aktif di dalam sel dengan di luar sel menyebabkan larutan dengan konsentrasi tinggi didesak ke luar ke konsentrasi

rendah. Apabila telah terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel, maka proses ekstraksi akan berhenti. Oleh karena itu, pada proses maserasi disertai pula dengan pengadukan agar terjadi perputaran pelarut sehingga akan merubah profil konsentrasinya dan proses ekstraksi akan terjadi secara optimal.

Metode maserasi tidak menggunakan pemanasan, sehingga pengaruh negatif akibat pemanasan terhadap senyawa termolabil yang terdapat dalam daun belimbing wuluh dapat dihindari. Proses maserasi dilakukan menggunakan wadah terbuat dari kaca untuk menghindari terjadinya reaksi kimia antara pelarut maupun senyawa kimia yang tersari dengan wadahnya, karena sifat kaca yang lebih stabil (tidak mudah bereaksi) dibandingkan plastik maupun logam. Selama proses maserasi, wadah selalu dalam keadaan tertutup untuk menghindari kemungkinan terjadinya proses oksidasi oleh udara luar, juga dilakukan di dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya (sinar matahari) terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Hasil maserasi (*maserat*) kemudian disaring dan dilakukan pemekatan.

Konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh yang digunakan yaitu 10%, 15% dan 20%. Sampel penelitian adalah lalat rumah (*Musca domestica*) sebanyak 180 ekor yang dibagi kedalam 4 kandang pengamatan masing-masing berisi 15 ekor dan dilakukan 3 kali pengulangan. Pada saat penelitian berlangsung dilakukan pengukuran suhu dan kelembaban dengan menggunakan *thermometer* dan *hygrometer*. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata suhu saat pelaksanaan penelitian adalah 28°C, sedangkan kelembaban udara rata-rata sebesar 72%. masih sesuai untuk perkembangan hidup lalat. Parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara merupakan faktor penting yang mempengaruhi aktivitas *M. domestica*. Hal ini terkait dengan aktivitas *M. domestica* yang lebih aktif pada siang hari seperti mencari makan dan melakukan perkawinan

(Rozendaal, 1997). Pelarut *metanol* 96% yang digunakan dalam pembuatan ekstrak daun belimbing wuluh adalah pelarut yang lebih selektif, sifat toksik yang rendah dari pada pelarut lainnya. *Metanol* 96% bersifat semipolar sehingga dapat melarutkan zat kimia yang bersifat polar maupun non polar.

Kemudian Ekstrak daun belimbing wuluh dilakukan pengenceran, untuk konsentrasi 10% diperoleh dari larutan 10 gr ekstrak kemudian diencerkan dengan aquades 100 ml, untuk konsentrasi 15% dari ekstrak 15 gr diencerkan dengan aquades 100 ml dan untuk konsentrasi 20% dengan melarutkan ekstrak 20 gr kemudian diencerkan dengan cairan aquades 100 ml. Setelah konsentrasi ekstrak telah dibuat maka dilanjutkan dengan tahapan pengujian pada sampel penelitian. Terdapat 4 perlakuan dan satu di antaranya adalah control. masing-masing kandang uji di masukkan 15 sampel lalat rumah. Untuk kontrol tidak diberi perlakuan apapun, untuk konsentrasi 10%, 15% dan 20% di sekitar umpan udang di semprotkan ekstrak. Kemudian diamati jumlah lalat yang hinggap pada umpan sejak 0-30 menit pemaparan dan 31-60 menit.

Berdasarkan penelitian pada kontrol menunjukkan bahwa lalat sangat aktif hinggap dan makan pada udang ini disebabkan karena aroma udang yang disukai lalat rumah. Sedangkan pada perlakuan konsentrasi 10%, 15% dan 20% jumlah lalat yang hinggap pada udang semakin sedikit dengan semakin tingginya konsentrasi, hal ini dikarenakan aroma ekstrak yang tidak disukai lalat.

Ketertarikan lalat untuk hinggap pada suatu media berasal dari penghantaran rangsangan saraf sensoris. Oleh sebab itu, cara yang paling efektif untuk mencegah ketertarikan lalat ini untuk hinggap pada suatu media adalah dengan cara memblokir saraf sensorisnya. Dalam hal ini, aroma ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang telah memblokir saraf sensoris lalat.

Dari hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh jumlah hinggapan lalat pada ulangan I, II dan III konsentrasi 10% rata-rata 4 ekor, konsentrasi 15% rata-rata 2 ekor dan konsentrasi 20 % rata-rata 1 ekor. Kemudian dari perhitungan daya tolak rata-rata daya tolak ekstrak pada konsentrasi 10% yaitu 42.22%, konsentrasi 15% yaitu 71.10% dan konsentrasi 20% yaitu 95,55%.

Penelitian ini belum berhasil secara optimal (100%) dikarenakan masih adanya 1 lalat yang hinggap pada konsentrasi tertinggi yaitu pada konsentrasi 20% sehingga perlu untuk menambah konsentrasi ekstrak agar aroma khas dari ekstrak daun belimbing wuluh tersebut dapat merangsang saraf lalat rumah sehingga akan berpindah menghindari aromanya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh gracia dan marlik (2019) Potensi Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum*) Sebagai Repellent Lalat Rumah (*Musca domestica*) bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kemangi maka akan semakin tinggi pula daya tolak yang dihasilkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan andi (2016) yang berjudul Uji efektivitas ekstrak daun tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dengan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata l*) terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*) dengan menggunakan konsentrasi 60%, 70%, dan 80% terhadap kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*) dan ekstrak daun tembakau pada semua perlakuan baik yaitu sig. <0.05 maka dinyatakan bahwa ekstrak tembakau (*Nicotiana tobaccum*) dan ekstrak daun sirsak (*Annona muricata L*) efektif terhadap kematian lalat rumah (*Musca domestica*).

Namun berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa ekstrak daun belimbing wuluh kuat sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*) dan konsentrasi yang paling kuat yaitu pada konsentrassi 20% dengan persentase daya tolak 95,55%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliah, dkk, (2016) yang berjudul “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*) Sebagai *Repellent* Semprot Terhadap Lalat Rumah (*Musca Domestica*)”. dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil uji Freidman nilai *asympt.sig* < 0,05 yaitu 0,029 dimana H_0 diterima dan dinyatakan bahwa ekstrak daun cengkeh (*Syzygium aroticum L.*) efektif sebagai *repellent* terhadap lalat rumah (*musca domestica*). Dari hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh jumlah hinggapan lalat pada ulangan I, II dan III konsentrasi 10% rata-rata 10 ekor, 15% rata-rata 3 ekor dan 20 % rata-rata 1 ekor. Rata-rata daya tolak ekstrak pada konsentrasi 10% yaitu 35,55%, konsentrasi 15% yaitu 82,22% dan konsentrasi 20% yaitu 95,55%. Perlakuan terbaik dalam mencegah hinggapan lalat adalah pada konsentrasi 20% dengan daya tolak 95,55%. Konsentrasi insektisida yang tinggi akan bekerja lebih cepat dalam menekan aktifitas system saraf serangga, hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Zulkahfi, dkk (2017) *hasil penelitian* perlakuan ekstrak daun belimbing wuluh berbagai konsentrasi mampu mengendalikan serangan rayap dengan nilai mortalitas mencapai 100%. Perlakuan ekstrak daun belimbing wuluh menunjukkan konsentrasi 6% paling efektif dalam mengendalikan serangan rayap. Karena senyawa fenol termasuk flavonoid diketahui bersifat racun pada system pernapasan (mann dan kaufman, 2012). Senyawa flavonoid akan masuk kedalam tubuh serangga melalui system pernapasan yang berupa spirakel, sehingga menimbulkan kelemahan pada system saraf dan kerusakan pada system pernapasan yang menyebabkan kematian pada serangga akibat tidak bisa bernapas (cania dan endah, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Yokarius Krisman, dkk (2016) yang berjudul “Aktivitas Bioinsektisida Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi*) Terhadap Kecoak (*Periplaneta A mericana*)” Hasil penelitian

menunjukkan *fraksi nheksan* daun belimbing wuluh memberikan pengaruh terhadap kematian kecoak dengan konsentrasi optimum sebesar 25,00% dan mengandung senyawa golongan *terpenoid/ steroid*. *Fraksi nheksan* memiliki nilai LC50 sebesar 24,135% dan nilai LT50 sebesar 47,044 jam sehingga berpotensi dijadikan sebagai *bioinsektisida*.

Lalat rumah (*Musca domestica*) dapat bertindak sebagai vektor penyakit *typus*, penyakit perut lainnya seperti *disentri* dan *diare*, *kolera*, dan penyakit kulit (Kartikasari, 2008). Sebagai vektor atau agen penular penyakit, peranan lalat menularkan penyakit ini didukung dari bentuk anatomi tubuhnya yang banyak terdapat bulu sehingga bibit penyakit (virus, bakteri, protozoa) melekat pada tubuhnya. Selain itu, lalat juga mempunyai cara makan yang unik, yaitu lalat meludahi makanannya terlebih dahulu sampai makanan tersebut cair baru disedot ke dalam perutnya. Jiika pada makanan yang dihinggapinya terdapat bahan atau aroma yang tidak disukainya maka lalat akan segera meninggalkan makanan tersebut (Minar Indriasih, 2015).

Apabila lalat jatuh ke dalam makanan atau minuman, lalat akan mendahulukan sayap yang membawa racun (penyakit), kemudian baru penawarnya (obat). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun lalat ialah vektor (pembawa) kuman serta penyakit, namun tubuh lalat yang sama juga memiliki penawar serta bahan anti kuman di dalam tubuhnya.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ»

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda, "jika lalat terjatuh ke dalam minuman seseorang di antara kalian, maka hendaknya ia mencelupkannya ke dalamnya, kemudian membuangnya (lalat tersebut). Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penyembuhnya" Shahih: **Al Irwa' (175), Ash-Shahihah (138). Bukhari.**

Subhanallah, sungguh luar biasa misteri tentang sayap lalat ini. Teori yang sekarang ini menjadi perhatian para ilmuwan mengenai *antibacterial* pada salah satu sayap lalat yang dapat menetralkan sifat *bacterial* di sayap lain, nyatanya sudah diberitakan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam sekitar satu setengah abad yang lalu. Saat di mana pengetahuan belum sepesat sekarang, saat di mana masih banyak orang yang belum terpikir akan kebenaran hadist ini secara ilmiah. Meskipun begitu, mereka mengimaninya dengan sepenuh hati karena begitu kuatnya kalimat tauhid tertancap dalam dada mereka. Namun meskipun demikian pada kenyataannya lalat berperan menularkan berbagai penyakit, dan apabila lalat menghampiri atau mengerumuni makanan sangat tidak enak di pandang, dan kita merasa jijik untuk mencelupkan lalat kedalam makanan atau minuman yang dihinggapi lalat, karna itu perlu untuk mencari *insektisida* nabati terhadap lalat rumah yang ramah lingkungan.

Semakin tinggi tingkat kepadatan lalat maka semakin tinggi angka kejadian diare. Jalur transmisi penularan penyakit diare antara lain melalui air dan makanan sertabinatang arthropoda secara mekanis. Lalat merupakan binatang arthropoda termasuk insekta ordo diptera yang dapat menyebarkan penyakit jika

sudah hinggap di lingkungan yang kotor kemudian hinggap dimakanan sehingga dapat menyebabkan penyakit

Demikian Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Al-Bukhari :

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْقَرَأُ

Artinya :

“Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak diperhatikan), yaitu kesehatan dan waktu luang”.(HR. Al-Bukhari no. 6412, dari Ibnu ‘Abbas)

Dalam hadist tersebut diketahui bahwa kita harus senantiasa menjaga Kebersihan, termasuk kebersihan lingkungan tempat tinggal dan kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Apabila manusia mau memperhatikan apa-apa yang di bumi ini, baik yang terdapat di permukaannya, maupun yang tersimpan dalam perut bumi, niscaya ia akan menemukan banyak keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah swt. dan jika ia yakin, bahwa kesemuanya itu diciptakan Allah swt. untuk kemaslahatan dan kemajuan hidup manusia sendiri, maka ia akan bersyukur kepada Allah swt. dan meyakini bahwa semuanya itu diciptakan Allah berdasar tujuan yang luhur karena semuanya memberikan faedah yang tak terhitung banyaknya.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah membuktikan pernyataan-pernyataan al-Qur’an sesuai dengan fakta. Dalam al-Qur’an Allah swt. telah menyebutkan bahwa tumbuhan memiliki manfaat masing-masing yang dapat

digunakan manusia, ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa berbagai macam tanaman dapat digunakan sebagai obat, Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang memanfaatkan tumbuhan daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat.rumah (*Musca domestica*).

D. Keterbatasan peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai keterbatasan yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Lalat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lalat dewasa namun tidak dapat dipastikan secara pasti berapa hari usia lalat dewasa tersebut karena lalat ditangkap dan berasal dari alam.
2. Penelitian ini hanya berskala laboratories dan pengujian efektivitas ekstrak belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) hanya dalam skala kecil.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut, sehingga faktor- faktor keterbatasan dalam penelitian ini dapat teratasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh jumlah hinggapan lalat pada pengulangan I,II,dan III konsentrasi 10% rata-rata 4 ekor , 15% rata-rata 2 ekor dan 20% rata-rata 1 ekor. Rata-rata daya tolak ekstrak pada konsentrasi 10% yaitu 42,22%, konsentrasi 15% yaitu 71,10% dan konsentrasi 20% yaitu 95,55%. Perlakuan terbaik dalam mencegah hinggapan lalat adalah pada konsentrasi 20% dengan daya tolak 95,55%

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang lebih efektif (100%) dalam menolak keberadaan lalat rumah (*Musca domestica*)

Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian dalam ruangan dalam skala yang lebih besar yang menjadi habitat *Musca domestica* seperti pasar dan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA


- Aliah N, Susilawaty A, Irviani. 2016. *Uji Efektivitas Ekstrak Daun Cengkeh (Syzigium Aromaticum) Sebagai Repellent Semprot Terhadap Lalat Rumah (Musca Domestica)*. Al-Sihah : public health Science journal
- Nur andi. 2016. uji efektivitas ekstrak daun tembakau (*nicotiana tobaccum*) dengan ekstrak daun sirsak (*annona muricata l*) terhadap kematian lalat rumah (*musca domestica*). Al-Sihah : public health Science journal
- Arief, Prahasta. 2009. *Belimbing*. Bandung: CV Pustaka Grafika.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015-2019*.
- Cania, B & Endah, 2013, 'Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Daun Legundi (*Vitex trifolia*) Terhadap Larvasida *Aedes aegypti*', *Medical Journal of Lampung University*, vol.2, no.4, hal: 52-60, diakses tanggal 28 November 2014 <<http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/62/61>>
- Habu M. 2015. *Perbedaan Efektivitas Rendaman Buah Cengkeh Dan Daun Pandan Sebagai Pengusir (Repellent) Nabati Lalat Rumah (Musca domestica)*. Jurnal. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo.
- Harbone, J.B. 1987. *Metode Fitokimia*. Terjemahan Padmawinata, K. Soediro, I. ITB. Bandung.
- Hasibuan R . *Insektisida Organik Sintetik dan Biorasional*. Yogyakarta: Plantaxia; 2015; 113-146.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Badan Litbang Kehutanan.
- Hoedojo R. & Zulhasril. 2008. *Pengendalian Vektor (Parasitologi Kedokteran Edisi Ke IV)*. Jakarta.
- Husain S, dkk. 2014. *Pengaruh Variasi Warna Fly Grill Terhadap Kepadatan Lalat Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Gorontalo*. Jurnal. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo.
- Ikhsan N. 2014. *Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) sebagai Larvasida terhadap Kematian Larva Aedes spp*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.
- Indriasi M, Indra C, & Taufik A. 2015. *Pemanfaatan ekstrak daun cengkeh (syzygium aromaticum) sebagai repellent nabati dalam mengurangi jumlah lalat yang hinggap selama proses penjemuran ikan asin*. Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Kartikasari. 2008. *Dampak Vektor Lalat Terhadap Kesehatan*. Jurnal. Universitas Sumatera Utara.

- Kementerian Agama RI. 2013. *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Situasidiare di Indonesia*. Retrieved Agustus 18,2016. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Kesehatan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Kumar, K.A., Guosia, SK., and Anupama, Latha, J.N. 2013. *A review on phytochemical constituents and biological assays of averrhoa bilimbi*, I. J. P. P. S. R, 3(4):136-139.
- Kumar P, Mishra S, Malik A, Satya S. Efficacy of *Mentha piperita* and *Mentha citrata* essential oils against housefly, *Musca domestica* L. *Ind Crops Prod* 2012; **39**: 106-12.
- Kumar, P, Mishra, S, Malik, A & Satya, S, 2011, 'Repellent, Larvacidal and Pupicidal Properties of Essential Oil and Their Formulations Against the Housefly, *Musca domestica*', *Medical and Veterinary Entomology*, 25: 302-310, diakses 24 Januari 2014 <www.researchgate.net>
- Lesmana, D, 2003, *Aktivitas Repelensi Ekstrak Sepuluh Spesies Tanaman Terhadap Blatella germanica* L. (Diptera: Blattellidae), Skripsi, Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mann, R & Kaufman, P, 2012, 'Natural Product Pesticides: Their Development, Delivery and Use Against Insect Vectors', *Mini Reviews in Organic Chemistry*, 9: 185-202, diakses tanggal 18 November 2014 <<http://www.afpmb.org/sites/default/files/pubs/dwfp/publications/FY12/Mann%20and%20Kaufman%202012.pdf>>
- Nopianti, S., Dwi Astuti, dan Sri Darnoto. 2008. Efektivitas Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*L.) untuk Membunuh Larva Nyamuk *Anopheles aconitus* Instar III. *Jurnal Kesehatan*, 1(2): 103-114.
- Rozendaal, JA, 1997, *Vector Control: Methods for Use by Individual and Communities*, GENEVA:WHO
- Saima Gul, Muhammad Ismail, Muhammad Iqbal Khan. 2016. *Novel Synthesis Of Silver Nanoparticles Using Melon Aqueous Extract And Evaluation Of Their Feeding Deterrent Activity Against Housefly Musca Domestica*. Department Of Chemistry, Kohat University Of Science & Technology, Kohat 26000, Pakistan

- Sanchez HA & Cappinera JL. 2014. *House Fly, Musca domestica* linneaus (*Diptera: Muscidae*). The Entomolgy and Nematology departement. University of Florida: IFAS Extension.
- Simanjuntak, N.C.E. *Potensi lalat sebagai vector mekanik cacing parasit*. skripsi.
- Sucipto C. D. 2011. *Vektor Penyakit Tropis*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sudarsono. 2002. *Tumbuhan Obat Ii, Hasil Penelitian, Sifat-Sifat Dan Penggunaan, 42-45 Pusat Study Tanaman Obat Ugm Tradisional*. Yogyakarta.
- Utomo M. 2010. *Pengaruh Jumlah Air yang Di Tambahkan pada Kemasan Serbuk Bunga Sukun (Artocarpus communis) sebagai Pengganti Isi Ulang (Refill) Obat Nyamuk Elektrik Terhadap Lama Waktu Efektif Daya Bunuh Nyamuk Anopheles aconitus lapangan*. Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah: Semarang.
- Widoyono. 2008. *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga.
- Yuliana Vina, Yamtana, Kadarusno Abdul Hadi. 2016. *Aplikasi Penyemprotan Perasan Daun Kamboja (Plumeria Acuminata) Terhadap Kematian Lalat Rumah (Musca Domestica)*, Jurusan Kesehatan Lingkungan (JKL) Politeknik Kesehatan Kemenkes : Yogyakarta.
- Zukahfi, dkk. 2017. *Pengendalian Serangan Rayap Tanah (Coptotermes sp) Menggunakan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

L

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : J. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : J. H.M. Yasin Lingsi No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR KEPUTUSAN

Nomor : A.074/KEPK/FKIK/II/2019
 Judul Penelitian : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrho Bilimbi*) Sebagai Insektisida Nabati Terhadap Lalat Rumah (*Musca Domestica*)
 Nama Peneliti : Fira Fitranillah
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	1	0	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepemimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): <u>Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.</u>

Makassar, 23 Februari 2019



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
 NIP. 195802031965121001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Tempat: Jl. Sultan Alauddin Makassar No. 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211
Telp. (0411) 4211000, 4211001, 4211002, 4211003, 4211004, 4211005, 4211006, 4211007, 4211008, 4211009, 4211010, 4211011, 4211012, 4211013, 4211014, 4211015, 4211016, 4211017, 4211018, 4211019, 4211020, 4211021, 4211022, 4211023, 4211024, 4211025, 4211026, 4211027, 4211028, 4211029, 4211030, 4211031, 4211032, 4211033, 4211034, 4211035, 4211036, 4211037, 4211038, 4211039, 4211040, 4211041, 4211042, 4211043, 4211044, 4211045, 4211046, 4211047, 4211048, 4211049, 4211050, 4211051, 4211052, 4211053, 4211054, 4211055, 4211056, 4211057, 4211058, 4211059, 4211060, 4211061, 4211062, 4211063, 4211064, 4211065, 4211066, 4211067, 4211068, 4211069, 4211070, 4211071, 4211072, 4211073, 4211074, 4211075, 4211076, 4211077, 4211078, 4211079, 4211080, 4211081, 4211082, 4211083, 4211084, 4211085, 4211086, 4211087, 4211088, 4211089, 4211090, 4211091, 4211092, 4211093, 4211094, 4211095, 4211096, 4211097, 4211098, 4211099, 4211100

Memorandum : B. Saku/KEP/PT/No. V/07/2019 Gowa, 19 Juli 2019

Tempat :

Ket : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cc. Kepala IPT P2T, BKPMD Prov. Sulawesi Selatan
di
Tempat

Assalamu alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Fira Fitrianih
NIM : 70200115021
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Selimbing Wuluh (Aeschynomene Indica) Sebagai Insektisida Nabati Terhadap Lalat Rumah (Musca Domestica).
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Sulawaty, S.Si., M.Kes.
2. Nurdyanah S, SKM., MPH.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 2000604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 19486/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2143/FKIK/PP.00.9/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FIRA FITRANILLAH
 Nomor Pokok : 70200115021
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BELIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI) SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI TERHADAP LALAT RUMAH (MUSCA DOMESTICAL) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 12 Juli s/d 12 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 11 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
 2. Peringkat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 53 Makassar
Kampus II : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp. 1500363 (0411) 841879
Website : www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1194 /Un.06.1/PP.07/07/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Eksampulir
Hal : Izin Penelitian

Gowa, 15 Juli 2019

Yth; (daftar terlampir)
Di Gowa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19486/S.01/PTSP/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : FIRA FITRANILLAH
Nomor Pokok : 70200115021
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa

Disetujui dan diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi :

"UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BELIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI) SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI TERHADAP LALAT RUMAH (MUSCA DOMESTICAL)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Juli sampai dengan 12 Agustus 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, di mohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi fasilitas dan informasi serta data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Rektor UIN Alauddin Makassar
Wakil Rektor Bidang Akademik,



- Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN INGKUNGAN

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No 63 Makassar
Kampus II : Jl H.M. Yasin Limpo No 36 Gowa Telp 1500163 (0411) 841879
Fax (0411) 8221400 Website : www.uin-alauddin.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : *2299 / P/Phis / 11009 / 2019*

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala laboratorium kompetensi kesehatan lingkungan program studi kesehatan masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar menerapkan bahwa :

Nama : Fira Fitranillah
Nim : 70200115021
Tempat, Tanggal Lahir : Polman, 17 April 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Samata
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Kesling
Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) Sebagai Insektisida Nabati Terhadap Lalat Rumah (*Musca domestica*)

Benar telah melakukan penelitian dilaboratorium kompetensi kesehatan lingkungan pada tanggal 8 Juli – 12 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Samata-Gowa 17 Juli 2019

Mengetahui
Kepala Laboratorium

Abd. Majid HR. Lagu, SKM, M.Kes
Nip : 19880826 2015 03 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JURUSAN FARMASI
LABORATORIUM FARMASI BIOLOGI**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp.(0411) 864924 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Telp.(0411) 8221400 Romangpolong, Gowa

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt
NIP : 19860123 200912 2 007
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Farmasi
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Memberikan keterangan kepada :

Nama : Fira Fitranillah
Nim : 70200115021
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Universitas : UIN Alauddin Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah menyelesaikan penelitian pada Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dari tanggal 10 Juni s/d 20 Juni 2019, dengan judul penelitian :

"Uji efektifitas ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai insektisida nabati terhadap lalat rumah (*Musca domestica*). "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 01 Juli 2019
Kepala Laboratorium Jurusan Farmasi,


Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt
NIP. 19860123 200912 2 007

DOKUMENTASI PENELITIAN



Daun Belimbing Wuluh



Pelarut Metanol dan Kertas Saring



Proses Perendaman Daun Belimbing Wuluh Dengan Pelarut Metanol 96%



Setelah 2 X 24 Jam Perendaman



Proses Penyaringan Daun Belimbing Wuluh Yang Telah Direndam Metanol



Hasil penyaringan rendaman daun belimbing wuluh kering dengan metanol



Proses pemisahan ekstrak dari pelarut metanol dengan rotavapor



**Hasil Ekstrak Yang Telah Dibebas
Metanolkan**



**Penimbangan Ekstrak Untuk
Pengenceran**



Pengenceran Ekstrak Daun Beimbung Wuluh (*Averrhoa bilimbi*)



Perangkap Lalat Rumah
(Musca domestica)



Sampel Lalat Rumah
(Musca domestica)



Percobaan perlakuan
Control, 10%, 15% Dan 20%



Pencatatan Jumlah Lalat Yang
Higgap Pada Umpan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



FIRA FITRANILLAH, akrab disapa dengan nama fira, lahir di Polman Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 April 1997 yang merupakan anak ke-2 dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Moh. Nur dan Ibu Hasanah, yang bertempat tinggal di Kabupaten toil-toli Kecamatan Galang.

Penulis mulai menjalani pendidikan di SD Negeri I TINIGI Tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri I GALANG Tahun 2009-2012, selanjutnya di MAS Kalangkangan Tahun 2012-2015, lalu masuk ke Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2019.