

**EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SIDAGURI
(*Sida rhombifolia L*) TERHADAP KEMATIAN
LARVA *Aedes aegypti***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Rezki Rahmatullah
70200115005

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) Terhadap Kematian Larva *Aedes aegypti*”, yang disusun oleh **Rezki Rahmatullah**, NIM: 70200115005, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 6 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 06 November 2019

9 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes

(.....)

Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes

(.....)

PembimbingI : Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes

(.....)

PembimbingII : Habibi, SKM.,M.Kes

(.....)

Penguji I : Syahrul Basri, SKM.,M.Kes

(.....)

Penguji II : Dr. H. A. Darussalam M.Ag

(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Rahmatullah
NIM : 70200115005
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkajene Sidrap, 04 April 1997
Prodi : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : Kesehatan Lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pondok Puri Samata, Gowa
Judul : Efektivitas Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) Terhadap Kematian Larva *Aedes Aegypti*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November
2019

Penyusun,


REZKI RAHMATULLAH
NIM. 70200115005

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami sebagai penyusun mampu menyelesaikan Skripsi “Efektifitas Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) Terhadap Kematian Larva *Aedes aegypti*” guna memenuhi persyaratan dan menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini, merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah, dimana kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Namun dengan segala usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapiberbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Darwis Pure S.pd dan Ibunda Hj. Nuthayati serta adik-adikku Rizka Rahmatullah, Rahmat Hidayatullah dan Rizkia Rahmatullah yang tulus mendoakan dan memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof Hamdan Juhannis MA PhD, selaku Rektor Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Ibunda Dr.dr Syatirah Jalauddin, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Bapak Abd.Madjid HR Lagu SKM., M.Kes selalu Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Ibunda Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku sekretaris Program Studi Kesehatan Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Habibi, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syahrul Basri, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. A. Darussalm, M.Ag sebagai Dosen Penguji Agama yang telah memberikan saran dan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.


7. Saudara-saudara COVIVERA, teman kelas Kesmas A, peminatan Kesehatan Lingkungan, PBL Desa Sawagi Kec. Pattallasang Kab. Gowa, KKN Angkatan 60 terkhusus di Lingkungan Lemo Susu, Kel.Betteng, Kec.Lembang, Kab. Pinrang yang dengan tulus telah membantu dan selalu memberikan dukungan serta memberikan semangat sehingga penulis merasa kuat dan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta 9irls (Ridha Awaliah, Vika Yuliandira, Nurinzana, Suharda Chabirah, Nurul Iffa, Marlina Malik, Andi Nurhana Magfirah dan Aisyah Syahrudin) yang selalu setia menemani baik suka maupun duka dan memberikan dukungan, mengingatkan, membantu serta menyemangati. Semoga persahabatan yang telah dibangun selama perkuliahan kita bisa membawa hubungan silaturahmi diantara jarak dan waktu tetap terjaga.
9. Kepada Pakkampong (Andi Ira Tenri Adi Kusuma, Heny Dwi Agustin, Darma Tri Nugraha MasaTasmir) dan Fitrah Pujangga Ram yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama pengerjaan skripsi.
10. Kepada teman-teman Pondok Puri Samata terkhususnya Nana, Nadila, Amalia, Fira yang selalu setia menemani dan menyemangati selama pengerjaan skripsi. Semoga persahabat yang telah dibangun selama di pondok mulai dai awal perkuliahan sampai sekarang bisa membawa hubungan silahtuhrami diantara jarak dan waktu tetap terjaga.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas semuanya yang telah memberikan warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah swt. Semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Samata, November 2019

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	15
G. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17
A. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	17
B. Pengendalian Vektor	25
C. Tinjauan Umum Tentang Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i> L.).....	28
D. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam	35
E. Tinjauan Umum Tentang Insektisida	36
F. Kerangka Teori.....	43
G. Kerangka Konsep	44

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel Penelitian	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Pembuatan Larutan Perlakuan	49
F. Alur Penelitian	50
G. Instrumen Penelitian.....	51
H. Prosedur Penelitian.....	52
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Analisis Data	57
C. Pembahasan	64
D. Keterbatasan Penelitian	73
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	xvi- xxi
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Ulangan (Replikasi) Perlakuan Modifikasi.....	47
Tabel 3.2	Rincian Jumlah Sampel yang Digunakan	48
Tabel 3.3	Jumlah Ekstrak Daun Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i> L) yang dibutuhkan	50
Tabel 4.1	Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban Ruangan.....	54
Tabel 4.2	Kematian Larva <i>Aedes aegypti</i> pada Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) Pada Masing-masing Pengulangan	55
Tabel 4.3	Data Jumlah Larva <i>Aedes aegypti</i> yang Mati setelah pemberian ekstrak Daun Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) setelah 1440 menit	56
Tabel 4.4	Uji Normalitas Data	58
Tabel 4.5	Hasil <i>Uji One Way Anova</i> Kematian Larva <i>Aedes aegypti</i> setelah Pemberian Ekstrak Daun Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) dengan Berbagai Konsentrasi.....	58
Tabel 4.6	Hasil Analisis Probit LC_{50} dan LC_{90} daun sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) terhadap kematian larva <i>Aedes aegypti</i>	59
Tabel 4.7	Hasil Analisis Probit LT_{50} dan LT_{90} daun sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) terhadap kematian larva <i>Aedes aegypti</i>	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ciri-ciri nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	18
Gambar 2.2 Siklus Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	19
Gambar 2.3 Masa Hidup Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	23
Gambar 2.4 Tanaman Sidaguri	29
Gambar 2.5 Skema Kerangka Teori.....	43
Gambar 2.6 Kerangka Konsep	44
Gambar 3.1 Pendekatan Penelitian	46
Gambar 4.1 Rata-rata Kematian Larva <i>Aedes aegypti</i> Setelah Pemberian Ekstrak Daun Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) dengan Berbagai Konsentrasi setelah 1440 menit.....	57
Gambar 4.2 Grafik LC ₅₀ dan LC ₉₀	59
Gambar 4.3 Grafik LT ₅₀ dan LT ₉₀ Pada Konsentrasi 0,25%	60
Gambar 4.4 Grafik LT ₅₀ dan LT ₉₀ Pada Konsentrasi 0,50%	62
Gambar 4.5 Grafik LT ₅₀ dan LT ₉₀ Pada Konsentrasi 0,75%	63
Gambar 4.6 Grafik LT ₅₀ dan LT ₉₀ Pada Konsentrasi 1%	63

DAFTAR SINGKATAN

DBD	: Demam Berdarah Dengue
WHO	: World Health Organization
LC	: Lethal Concentration
LT	: Lethal Time



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Uji Normalitas Data
Lampiran 2 : Uji *One Way Anova*
Lampiran 3 : Analisis Probit *Lethal Concentration*
Lampiran 4 : Analisis Probit *Lethal Time*
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6 : Persuratan



EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SIDAGURI (*Sida Rhombifoli L*) TERHADAP KEMATIAN LARVA *Aedes aegypti*

¹Rezki Rahmatullah, ² Andi Susilawaty, ³Habibi

^{1, 2}Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat,
FKIK UIN Alauddin Makassar

³Bagian Epidemiologi, Jurusan Kesehatan Masyarakat,
FKIK UIN AlauddinMakassar

rhmtllhrezki@gmail.com

ABSTRAK

Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan vektor yang dapat menularkan virus dengue. Virus inilah yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Kasus Demam Berdarah meningkat dan menyebabkan kematian setiap tahunnya. Upaya untuk mengontrol vektor Demam Berdarah Dengue menggunakan larvasida kimia tidak aman untuk populasi dan lingkungan. Dampak negatif diminimalkan dengan menerapkan larvasida alami yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan terbukti berpotensi untuk mengendalikan vektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia L*) sebagai larvasida terhadap larva *Aedes aegypti* dari ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia L*). Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan metode Eksperimen Sungguhan (*True Experimen*). Penelitian ini dilakukan di Pondok Puri Samata Gowa. Sampel pada penelitian ini sebanyak 500 larva yang dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing berisi 25 larva dengan perlakuan (0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1%) serta ulangan sebanyak 4 kali dengan waktu pengamatan 1440 menit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase rata-rata kematian larva *Aedes aegypti* pada konsentrasi 0,25% sebesar 6,25%, konsentrasi 0,50% sebesar 12,25%, konsentrasi 0,75% sebesar 15,25%, dan konsentrasi 1% sebesar 18,25%. Hasil *Uji Anova* diperoleh *p-value* = 0,001 ($p < 0,05$) sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan antara kematian larva dengan pemberian ekstrak daun sidaguri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memutus rantai penularan melalui pemberantasan jentik.

Kata Kunci : Larva *Aedes aegypti*, Ekstrak Daun Sidaguri, Kematian Larva

THE EFFICACY OF ARROWLEAF SIDA (*Sida Rhombifoli L*) EXTRACT ON THE DEATH OF *Aedes aegypti* LARVAE

¹Rezki Rahmatullah, ² Andi Susilawaty, ³Habibi

^{1,2}Environmental Health, Public Health Department, Faculty of Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar

³ Epidemiology, Public Health Department, Faculty of Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar

rhmtllhrezki@gmail.com

ABSTRACT

Aedes aegypti is a vector that transmits dengue virus and causes Dengue Haemorrhagic Fever (DHF). The increasing number of DHF case has caused major fatality annually. The use of chemical larvicide is not entirely environmentally friendly. On the contrary, plant based larvicide has been proven to be effective in controlling larvae while subduing the negative impacts of larvicide use to environment. This research investigates the efficacy of arrowleaf sida extract (*Sida rhombifolia L*) as a larvicide in killing *Aedes aegypti* larvae. It uses quantitative approach with true experiment method in testing the hypothesis. The research samples consist of 500 larvae which are divided into four groups with different treatments (0.25%, 0.50%, 0.75% dan 1%) and four reapplications within a time span of 1440 minutes. The findings show that the average percentage of *Aedes aegypti* larvae death with 0.25% concentration is 6.25%, 0.50% concentration is 12.25%, 0.75% concentration is 15.25%, and 1% concentration is 18.25%. The result of ANOVA test is $p\text{-value} = 0.001$ ($p < 0.05$) which further indicates the correlation between the death of larvae and arrowleaf sida extract intervention. This research hopes that the research findings can contribute to the success of *Aedes aegypti* larvae eradication program.

Keywords: *Aedes aegypti* larvae, arrowleaf sida extract, the death of larvae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang tergolong *Arthropoda-Borne Virus*, genus *Flavivirus*, dan famili *Flaviviridae*. DBD dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat (Profil Kesehatan RI, 2017).

Penyakit Demam Berdarah (DBD) pertama kali dilaporkan di Asia Tenggara pada tahun 1954 yaitu di Filipina, selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Sebelum tahun 1970, hanya 9 negara yang mengalami wabah DBD, namun sekarang DBD menjadi penyakit endemik pada lebih dari 100 negara, diantaranya Afrika, Amerika, Mediterani Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Barat memiliki angka tertinggi terjadinya kasus DBD. Jumlah kasus di Amerika, Asia Tenggara dan Pasifik Barat telah melewati 1,2 juta kasus pada tahun 2008 dan lebih 2,3 juta di 2010. Pada tahun 2013 dilaporkan terdapat sebanyak 2,35 jutakasus di Amerika, dimana 37.687 kasus merupakan DBD berat. Perkembangan kasus DBD di tingkat global semakin meningkat, seperti dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni dari 980 kasus di hampir 100 negara tahun 1954-1959 menjadi 1.016.612 kasus di hampir 60 negara tahun 2000-2009 (WHO, 2014).

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utamanya di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya mobilitas

dan kepadatan penduduk, jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah. Penyakit DBD di Indonesia pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang di antaranya meninggal dunia. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2010).

Berdasarkan data dari Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, bahwa pada tahun 2010 Indonesia menempati urutan tertinggi kasus DBD di ASEAN dengan jumlah kasus sebanyak 156.086 kasus (Angka Kesakitan/IR = 65,70 per 100.000 penduduk). Meskipun, pada tahun 2011 kasus DBD turun menjadi 65.725 kasus (IR = 27,67), namun tahun 2012 meningkat kembali menjadi 90.245 kasus (IR = 37,27), dan pada tahun 2013 jumlah kasus semakin meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 112.511 kasus (IR = 45,85). Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2013 menjadi 100.347 kasus (IR = 39,80). Selain itu, adapun rata-rata jumlah kasus bulanan dari tahun 2010-2014, bulan Januari merupakan bulan dengan laporan kasus DBD tertinggi dari pada bulan-bulan lainnya, hal ini diakibatkan karena telah terjadi musim penghujan di tahun sebelumnya sehingga tempat perkembangbiakan nyamuk bertambah banyak dan mengakibatkan populasi nyamuk meningkat. (Kementerian Kesehatan RI, 2015:120-125).

Pada tahun 2017 kasus DBD berjumlah 68.407 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 493 orang. Jumlah tersebut menurun cukup drastis dari tahun sebelumnya, yaitu 204.171 kasus dan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, yaitu 78,85 menjadi 26,10 per 100.000 penduduk. Namun, penurunan *case fatality rate* (CFR) dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi, yaitu 0,78% pada tahun 2016, menjadi 0,72% tahun 2017 (Profil Kesehatan RI, 2017).

Pada tahun 2016 terdapat 10 provinsi dengan angka kesakitan kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi yaitu Sulawesi Selatan sebesar 105,95 per 100.000 penduduk, Kalimantan Barat sebesar 62,57 per 100.000 penduduk, dan Bali sebesar 52,61 per 100.000 penduduk. Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya berada pada urutan ke-10 provinsi dengan angka kesakitan tertinggi tahun 2016, meningkat menjadi provinsi dengan angka kesakitan tertinggi tahun 2017 (Profil Kesehatan RI, 2017).

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan kabupaten/kota *Insiden Rate* DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 19,90 per 100.000 penduduk dengan CFR 0.90%. Angka IR tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng 100,33 per 100.000 penduduk, Kota Pare-Pare 75,99 per 100.000 penduduk, Kabupaten Maros 63,38 per 100.000 penduduk, Kabupaten Takalar 40,85 per 100.000 penduduk, dan Kota Palopo 40,51 per 100.000 penduduk dan terendah di Kabupaten Pinrang 2,91 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017).

Mengingat ancaman penyakit DBD, berbagai usaha pencegahan penyakit ini telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Upaya-upaya pemberantasan dapat dilakukan dengan metode, diantaranya dengan menggunakan *larvasida*, yang merupakan golongan pestisida yang dapat membunuh serangga ataupun sebagai pembunuh larva (Nisa, Firdaus, 2015)

Pengendalian secara mekanik dan biologi adalah pengendalian vektor yang lebih ramah lingkungan dari pada menggunakan bahan-bahan kimia sistensis. Di tengah masyarakat yang terancam serangan penyakit vektor nyamuk, tentunya semakin banyak pula produk anti nyamuk yang mengeluarkan dan menawarkan produknya. Tetapi produk anti nyamuk yang dikeluarkan sebagian besar mengandung bahan kimia sistensis dengan konsentrasi tinggi, yang mana selain

membunuh nyamuk maka bahan kimia tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia (Utomo, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh *Indonesian Pharmaceutical Watch* (IPhW) pada tahun 2001, bahwa semua anti nyamuk yang beredar dipasaran dalam negeri, baik obat semprot, elektrik, bakar maupun cair mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu: *diklorvos*, *propoxuran*, dan beberapa jenis *phyrethroid* berupa *d-allethrin*, *transflutrin*, *bioallethrin*, *pallethrin*, *d-phenothrin*, dan *esbiothrin*. Lembaga kesehatan Internasional telah membuktikan bahaya dari senyawa tersebut. Akibat dari senyawa kimia tersebut akan terbukti ketika terakumulasi dalam tubuh atau konsentrasi melebihi ambang batas toleransi tubuh (Sobat Bumi dalam Lumowa, 2013).

Larvasida alami merupakan larvasida yang dibuat dari tanaman yang mempunyai kandungan beracun terhadap serangga pada stadium larva. Adanya larvasida alami ini diharapkan tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan, manusia dan tidak menimbulkan resistensi bagi serangga (Santoso, Chamid, Vididi, & Pratiwi, 2018).

Larvasida berasal dari ekstrak tanaman yang telah banyak diteliti, salah satunya adalah Sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang merupakan *Malvaceae* yang berasal dari Negara India dan menyebar ke Eropa. Beberapa senyawa aktif yang terkandung dalam Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) berupa *alkaloid*, *kalsium oksalat*, *tanin*, *saponin*, *fenol*, *asam amino*, dan minyak atsiri (Kemenkes RI, 2011).

Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga kita patut bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik, tumbuhan yang diciptakan-Nya memiliki

bentuk, ciri dan manfaat yang berbeda-beda dan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S asy-Syu'ara ayat 7 :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik “(Q.S asy syu’ara:7).

Berdasarkan ayat tersebut lafadz كَرِيمٍ antara lain digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang baik setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002). Allah SWT telah menumbuhkan dari bermacam-macam tumbuhan yang baik untuk makhluk-Nya yaitu tumbuhan yang bermanfaat. Salah satu manfaat tumbuhan yaitu dapat digunakan sebagai tumbuhan obat.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) efektif sebagai insektisida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti*?

Atas dasar uraian pokok masalah itu, dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kontrol terhadap (*Aquades*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*?
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi 0,25% terhadap kematian larva *Aedes aeypti*?
3. Bagaimana pengaruh konsentrasi 0,50% terhadap kematian larva *Aedes aeypti*?

4. Bagaimana pengaruh konsentrasi 0,75% terhadap kematian larva *Aedes aegypti*?
5. Bagaimana pengaruh konsentrasi 1% terhadap kematian larva *Aedes aegypti*?
6. Bagaimanakah perbandingan kematian larva *Aedes aegypti* pada kelompok kontrol (*Aquades*), konsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1% ?
7. Berapa *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dan *Lethal Concentration* 90% (LC_{90}) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang mematikan larva *Aedes aegypti*?
8. Bagaimana pengaruh lama pajanan ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan kematian larva *Aedes aegypti*?
9. Berapa *Lethal Time* 50% (LT_{50}) dan Berapa *Lethal Time* 90% (LT_{90}) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang mematikan larva *Aedes aegypti*?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)
 - a. Kontrol (*Aquades*) tidak memiliki pengaruh kematian larva *Aedes aegypti*.
 - b. Konsentrasi 0,25% tidak memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
 - c. Konsentrasi 0,50% tidak memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
 - d. Konsentrasi 0,75% tidak memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
 - e. Konsentrasi 1% tidak memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.

- f. Tidak terdapat perbandingan kematian larva *Aedes aegypti* pada kelompok kontrol (*Aquades*), konsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1%.
- g. Tidak terdapat *Lethal Concentration* 50% (LC₅₀) dan *Lethal Concentration* 90% (LC₉₀) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- h. Tidak terdapat hubungan antara lama pajanan ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan kematian larva *Aedes aegypti*.
- i. Tidak terdapat *Lethal Time* 50% (LT₅₀) dan *Lethal Time* 90% (LT₉₀) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang mematikan larva *Aedes aegypti*

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Kontrol (*Aquades*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- b. Konsentrasi 0,25% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- c. Konsentrasi 0,50% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- d. Konsentrasi 0,75% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- e. Konsentrasi 1% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- f. Diketahui perbandingan kematian larva *Aedes aegypti* pada kelompok kontrol (*Aquades*), konsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1%.
- g. Diketahui *Lethal Concentration* 50% (LC₅₀) dan *Lethal Concentration* 90% (LC₉₀) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- h. Diketuinya hubungan antara lama pajanan ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan kematian larva *Aedes aegypti*.

- i. Diketahui *Lethal Time* 50% (LT₅₀) dan *Lethal Time* 90% (LT₉₀) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Efektifitas ekstrak adalah keberhasilan ekstrak Daun Sidaguri mematikan larva *Aedes aegypti*. yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antara peningkatan konsentrasi ekstrak dengan jumlah kematian larva *Aedes aegypti*. dan nilai *Lethal Concentration* 50% (LC₅₀) dan *Lethal Concentration* 90% (LC₉₀) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- b. Larva *Aedes aegypti* instar III adalah larva *Aedes aegypti* yang telah berubah 4-5 hari setelah menetas.
- c. Jumlah kematian larva adalah banyaknya larva *Aedes aegypti* instar III yang mati setelah pemberian perlakuan. Larva dianggap mati bila tidak ada tanda-tanda kehidupan, misalnya tidak bergerak lagi walaupun dirangsang dengan cara air digerakkan atau disentuh.
- d. *Lethal Concentration* 50% (LC₅₀) dan *Lethal Concentration* 90% (LC₉₀) adalah konsentrasi yang menyebabkan terjadinya kematian pada 50% dan 90% larva *Aedes aegypti*.
- e. Konsentrasi ekstrak adalah konsentrasi ekstrak dalam penelitian ini yaitu 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1%.
- f. *Lethal Time* 50% (LT₅₀) dan *Lethal Time* 90% (LT₉₀) adalah waktu yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mematikan 50% dan 90% *Aedes aegypti*.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dengan baik, maka perlu kiranya dibuat batasan masalah. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Kesehatan Lingkungan.
- b. Masalah penelitian dibatasi pada efektivitas ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
- c. Larva yang diteliti adalah larva *Aedes aegypti*. instar III yang sebelumnya diambil di Laboratorium Entomologi Universitas Hasanuddin Makassar
- d. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan ekperimental *post test only control group design* dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti* instar III.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai Larvasida

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
Deby Swastika, dkk. <i>Medical Laboratory Technology Journal</i> . Vol 2, No. 2	2016	Peran Ekstrak Daun Pepaya (<i>Carica Papaya Linn</i>) Terhadap Kematian Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Konsentrasi Ekstrak 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%	Eksperimen semu <i>Non Equivalent Cont rol Group</i>	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Rata-rata jumlah kematian larva <i>Aedes aegypti</i> meningkat seiring dengan peningkatan pemberian konsentrasi ekstrak. Rata-rata peningkatan kematian larva pada setiap konsentrasi adalah 14,8% dan konsentrasi yang mampu mematikan 50% hewan coba yaitu larva <i>Aedes aegypti</i> adalah pada konsentrasi 25% sebanyak 60% kematian larva dari 20 larva <i>Aedes aegypti</i> .
Sulastri, dkk. <i>Jurnal Care</i> . Vol.	2016	Dosis Konsentrasi Tawas (Al ₂ (SO ₄) ₃)	Konsentrasi Tawas	Eksperimen pendekatan <i>post</i>	Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar III	Hubungan antara perlakuan pemberian dosis tawas terhadap

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
4, No.2		Terhadap Kematian Larva <i>Aedes aegypti</i>		<i>test only control group design</i>		kematian larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dengan nilai sigifikansi $p=0,001$. Nilai LC50 larutan tawas adalah 8,068 mg dan LC90 adalah 12,086 mg
Wahyu Wira Utami, dkk. <i>Jurnal Fitofarmaka Indonesia</i> . Vol,3 No 1 .	2016	Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak Daun Jarak Kepyar (<i>Ricinus Communis</i> L.) Terhadap Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Konsentrasi Ekstrak	Eksperimen pendekatan <i>post test only control group design</i>	Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar III/IV	Ekstrak etanol daun jarak kepyar (<i>Ricinus communis</i> L.) efektif sebagai larvasida terhadap larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> yang ditunjukkan dengan nilai LC ₅₀ sebesar $138,995 \pm 1,5 \mu\text{g/mL}$.
Desyana Nufus Sholeha, dkk. <i>Jurnal</i>	2018	Uji Aktivitas Fraksi Petroleum Eter Daun Beluntas (<i>Pluchea</i>	Konsentrasi Ekstrak <i>Lethal Concentration</i>	Eksperimen <i>randomized post test only control</i>	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Nilai LC ₅₀ fraksi petroleum eter daun beluntas (<i>Pluchea indica</i> (L.) Less) adalah 1907,83 ppm

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
<i>Pharmascience</i> . Vol 05, No. 02		<i>indica (L.) Less.</i>) Sebagai Larvasida terhadap Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	(LC) 50 dan 90	<i>group design</i>		dan nilai LC ₉₀ sebesar 2377,57 ppm. Fraksi petroleum eter daun beluntas (<i>Pluchea indica (L.) Less.</i>) tidak mempunyai aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk <i>Aedes eaegypti</i> .
Ratna Widyasari, dkk. <i>Jurnal Insan Farmasi Indonesia</i> . Vo. 1, No.1 Tahun 2018.		Efektivitas Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Manis (<i>Citrus X Aurantium L.</i>) Sebagai Larvasida Terhadap	Konsentrasi Ekstrak	Eksperimen pendekatan <i>post test only control group design</i>	Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Persentase mortalitas larvasida <i>Aedes aegypti</i> yang dibunuh oleh ekstrak etanol kulit jeruk dengan konsentrasi 0.2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1% secara berurutan adalah 77,3% 85,3%, 89,3%, 100% dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 0,8% ekstrak etanol kulit jeruk

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
						manis (<i>Citrus x aurantium</i> L.) memiliki efektivitas dalam membunuh larva <i>Aedes aegypti</i>
Setyo Dwi Santoso, dkk. <i>Jurnal Sains Health</i> . Vol. 2, No. 1. Tahun 2018		Daya Bunuh Ekstrak Daun Tomat (<i>Solanum Lycopersicum</i> L.) Terhadap Larva Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	Konsentrasi Ekstrak	True Eksperiment	Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar III	Ekstrak daun tomat dengan konsentrasi 1 mL menunjukkan tingkat kematian 96%. Larva dilakukan selama 4 jam sampai 24 jam. Konsentrasi terkecil yang dapat membunuh larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> adalah 0,6 % pada waktu 16 jam. Semakin besar konsentrasi larvasida yang digunakan dan semakin lama interaksi antara larvasida dengan larva nyamuk,

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
						maka semakin besar kemampuan larvasida tersebut untuk dapat mematikan larva nyamuk
Sri Wahyuni Handayani, dkk. <i>Balaba</i> . Vol. 14, No 1.	2018	Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L) dari Semarang, Temanggung, dan Kendal Sebagai Larvasida <i>Aedes</i> <i>aegypti</i> L	Konsentrasi Ekstrak	Ekperimental murni	Larva <i>Aedes</i> <i>aegypti</i> Instar III	Ekstrak tembakau Kendal membutuhkan konsentrasi 200 ppm untuk membunuh 69% larva <i>Ae. aegypti</i> , Ekstrak tembakau Semarang membutuhkan konsentrasi 100 ppm untuk membunuh 64% larva <i>Ae. aegypti</i> , dan Ekstrak tembakau Temanggung membutuhkan konsentrasi 100 ppm untuk membunuh 59% larva <i>Ae. aegypti</i> .

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengaruh kontrol (*Aquades*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
2. Mengetahui konsentrasi 0,25% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
3. Mengetahui konsentrasi 0,50% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
4. Mengetahui konsentrasi 0,75% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
5. Mengetahui konsentrasi 1% ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) memiliki pengaruh terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
6. Mengetahui perbandingan kematian larva *Aedes aegypti* pada kelompok kontrol (*Aquades*), konsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1%.
7. Mengetahui *Lethal Concentration* 50% (LC_{50}) dan *Lethal Concentration* 90% (LC_{90}) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
8. Mengetahui hubungan antara lama pajanan ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan kematian larva *Aedes aegypti*.
9. Diketahui *Lethal Time* 50% (LT_{50}) dan *Lethal Time* 90% (LT_{90}) dari ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.

G. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) sebagai ekstrak terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.

b. Kegunaan Aplikatif

Penelitian ini diharapkan bukan hanya berkembang sebagai bahan informasi di bidang akademik saja, namun juga bisa berkembang secara aplikatif di masyarakat yaitu bisa menjadi insektisida yang ramah lingkungan bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk Aedes aegypti

1. Taksonomi


Menurut Bagus Uda Palgunadi dan Asih Rahayu (2011) adapun kedudukan nyamuk *Aedes aegypti* dalam klarifikasi hewan (*taxonomi*) sebagai berikut :

Kerajaan	: <i>Animalia</i>
Phylum	: <i>Arthropoda</i>
Class	: <i>Hexapoda (Insecta)</i>
Sub Class	: <i>Pterygota</i>
Divisi	: <i>Endopterygota</i>
Ordo	: <i>Diptera</i>
Sub Ordo	: <i>Nematocera</i>
Family	: <i>Culicidae</i>
Sub Family	: <i>Culicinae</i>
Genus	: <i>Aedes</i>
Spesies	: <i>Ae. aegypti</i>
Nama Binomial	: <i>Aedes aegypti</i>

2. Morfologi

Nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa memiliki tubuh yang berwarna hitam kecokelatan. Ukuran tubuhnya antara 3-4cm, dengan mengabaikan panjang kakinya. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan, pada bagian punggung (dorsal) terdapat dua garis melengkung vertikal dibagian kiri dan kanan yang menjadi ciri khas nyamuk *Aedes aegypti*.

Nyamuk betina dan jantan memiliki perbedaan yang nyata dalam hal ukuran. Biasanya, nyamuk jantan memiliki tubuh yang lebih kecil dari pada betina, dan terdapat rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan (Ginanjar, 2007).



Gambar 2.1. Ciri-ciri nyamuk *Aedes aegypti*
(Sumber : <http://majalahhewan.com>)

Mulut nyamuk termasuk tipe yang menusuk dan menghisap (*rasing-sucking*), mempunyai enam stilet yaitu gabungan antara *mandibula* dan *maxilla* yang bergerak naik turun dan menusuk jaringan sampai menemukan pembuluh darah kapiler dan mengeluarkan ludah yang berfungsi sebagai cairan racun dan antikoagulan (Sembel Dt, 2009 dalam Palguna, 2011).

3. Siklus Hidup

Aedes aegypti mengalami metamorphosis lengkap atau metamorfosis sempurna (*holometabola*) yaitu dengan bentuk siklus hidup berupa Telur, Larva (beberapa instar, Pupa dan Dewasa (James MT and Harwood RF, 1969 dalam Palgunadi, 2011).



Gambar 2.2 Siklus Nyamuk *Aedes aegypti*

(Sumber : <https://dosenbiologi.com/hewan/daur-hidup-nyamuk>)

Nyamuk *Aedes aegypti* biasanya meletakkan telurnya pada tempat-tempat penampungan air yang bersih atau air hujan seperti pada bak mandi, tangki penampungan, vas bunga, kaleng ataupun kantung-kantung plastik besar dan semua wadah yang berisi air bersih (Sembel, 2009 dalam Anggraini, 2017). Telur nyamuk *Aedes aegypti* tidak memiliki pelampung dan diletakan satu persatu di atas permukaan air. Telur nyamuk *Aedes aegypti* berukuran 0,7 mm, dan dibungkus dalam kulit yang berlapis dan mempunyai saluran corong. (Neva FA and Brown HW, 1994 dalam Palgunadi, 2011). Nyamuk *Aedes aegypti* memiliki telur berwarna hitam dan berbentuk oval dan mengapung pada permukaan air jernih, dan menempel pada dinding permukaan air. Apabila wadah air mengering, maka telur bisa bertahan hidup selama beberapa minggu bahkan bulan. Ketika wadah berisi air lagi maka telur akan menetas menjadi jentik (larva). (Sigit dan Hadi, 2006 dalam Boekoesoe, 2013).

Jentik (larva) nyamuk *Aedes aegypti* dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit yang disebut instar. Perkembangan instar satu ke instar empat memerlukan waktu sekitar lima hari. Setelah mencapai instar keempat, larva berubah menjadi pupa dimana larva memasuki masa dorman (inaktif, tidur). (dr. Genis Ginanjar, 2007). Jentik (*larva*) yang berturut-turut disebut larva instar I, II, III, dan IV. Larva instar I memiliki tubuh yang sangat kecil dan panjangnya 1-2 mm, transparan dan terdapat duri-duri pada dada yang belum begitu jelas dan corong pernafasan (*siphon*) belum menghitam. Larva instar II, tubuhnya lebih besar dengan panjang 2,5 – 3,9 mm, duri pada dada belum jelas, dan siphon telah menghitam. Larva instar III, duri-duri pada dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 4-5mm, sedangkan pada instar IV dengan panjang 5-7 mm, tubuhnya telah lengkap yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala terdapat antena dan mata sedangkan pada bagian perut terdapat rambut-rambut lateral, pada segmen kedelapan pada bagian perut terdapat corong pernafasan (*siphon*) dan insang (Setyowati, 2013).

Pada larva instar IV akan berubah menjadi pupa yang berbentuk bulat gemuk menyerupai tanda koma. Tubuh pupa terdiri dari *safelo thorax* dan *abdomen*. Pada *thorax* terdapat corong pernafasan yang digunakan untuk bernapas. Pada pupa terdapat kantong udara yang terletak diantara bakal sayap nyamuk dewasa dan terdapat sepasang sayap pengayuh yang saling menutupi sehingga memungkinkan pupa untuk menyelam dengan cepat dan mengadakan serangkaian jungkiran sebagai reaksi terhadap rangsangan (Hendratno, 2003).

Pada tahap pupa tidak memerlukan makanan. Pupa nyamuk bergerak sangat aktif dan dapat berenang dengan mudah saat terganggu. Pupa bernapas menggunakan tabung-tabung pernapas yang terdapat pada bagian ujung kepala.

Pupa *Aedes* akan menjadi dewasa dalam waktu 2-3 hari setelah itu sobeknya selongsong pupa oleh gelembung udara karena gerakan aktif pupa. Suhu untuk perkembangan pupa yang optimal itu adalah 27°C – 32°C. Saat berubah menjadi stadium dewasa, pupa akan naik ke permukaan air. Kemudian akan muncul retakan pada bagian belakang permukaan pupa dan nyamuk dewasa akan keluar dari cangkang pupa (Achmadi, 2011).

4. Bionomik Nyamuk *Aedes aegypti*

Bionomik adalah perilaku nyamuk yang meliputi, tempat bertelur, (*habitat places*), kebiasaan menggigit (*host preference*), tempat istirahat (*resting places*), dan jangkauan terbang.

a. Tempat Bertelur

Ada beberapa karakteristik wadah tempat bertelurnya nyamuk *Aedes* sp, yaitu jenis, bahan, letak, warna, ukuran, dan kondisi wadah yang tertutup ataupun terbuka. Tempat potensial sebagai habitat larva nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* adalah wadah buatan manusia yang berisi air (Zahara, 2013). Jenis tempat perkembang biakan nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/wc, dan ember.
2. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, vas bunga, perangkat semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain)
3. Tempat penampungan air alamiah seperti: lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, dan potongan bambu (Kemenkes RI, 2013).

b. Kebiasaan Menggigit

Nyamuk betina membutuhkan protein untuk memproduksi telurnya. Oleh karena itu, setelah kawin nyamuk betina membutuhkan darah untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Nyamuk betina menghisap darah manusia setiap 2-3 hari sekali. Biasanya untuk mendapatkan darah yang cukup nyamuk betina sering menggigit lebih dari satu orang. Posisi menghisap darah nyamuk *Aedes aegypti* sejajar dengan permukaan kulit manusia (Depkes RI, 2004).

Nyamuk *Aedes aegypti* bersifat *anthropophilic* yang aktifitas menggigit nyamuk ini biasanya beberapa jam di pagi hari dan beberapa jam di pagi hari sebelum gelap. Pada penelitian sebelumnya yakni Prasetyowati (2014), bahwa nyamuk *Aedes aegypti* ternyata dapat menghisap darah pada malam hari (nocturnal) di Kawasan Pasae Wisata Pangandaran. Padahal sejauh ini penelitian di berbagai tempat menyebutkan *Aedes aegypti* aktif menghisap darah pada siang hari (diurnal) dengan daun puncak gigitan yaitu pagi hari pada pukul 08:00-09.00 dan sore pukul 16.00-17.00.

c. Tempat Istirahat

Setelah selesai menghisap darah, nyamuk betina akan beristirahat selama 2-3 hari untuk mematangkan telurnya. Nyamuk *Aedes aegypti* hidup domestik, artinya nyamuk ini lebih menyukai tinggal di dalam rumah dari pada di luar rumah. Tempat beristirahat yang disenangi nyamuk ini adalah tempat-tempat yang lembab dan kurang terang seperti kamar mandi, dapur, dan WC. Di dalam rumah nyamuk ini beristirahat di pakaian yang tergantung, kelambu ataupun tirai sedangkan di luar rumah nyamuk beristirahat pada tanaman-tanaman yang ada di luar rumah (Depkes RI, 2004).

d. Jangkauan Terbang dan Masa Hidup

Nyamuk *Aedes aegypti* bersifat *urban*, hidup di perkotaan, lebih sering hidup di dalam dan di sekitar rumah-rumah serta erat hubungannya dengan manusia. Jangkauan terbang nyamuk ini rata-rata adalah sekitar 100 m, tetapi pada keadaan tertentu nyamuk ini sampai beberapa kilometer dalam usahanya mencari tempat perindukan untuk meletakkan telurnya (Nurdin, 2003). Umur nyamuk betina bisa mencapai 8-15 hari, sedangkan nyamuk jantan berumur 3-6 hari (Cecep Dani Sucipto, 2011:48). Umur nyamuk *Aedes aegypti* di alam biasanya sekitar 10 hari. Umur 10 hari cukup untuk mengembangbiakkan *virus dengue* di dalam tubuh nyamuk tersebut. Di dalam laboratorium dengan suhu ruangan 28°C dengan kelembaban udara 80% dan nyamuk diberikan makan larutan gula sebanyak 10% serta darah mencit, umur nyamuk dapat mencapai 2 bulan (sungkar 2005 dalam Cecep Dani Sucipto, 2011:51). Nyamuk dapat berkembang dengan suhu rata-rata 25-27°. Sedangkan pada kelembaban kurang dari 60°C umur nyamuk menjadi lebih pendek (Depkes RI, 2004 dalam Cecep Dani Sucipto, 2011:54-55).



Gambar 2.3 Masa Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*

(Sumber: Kemenkes RI, 2013)

5. Penyebaran

Aedes aegypti ditemukan di negara-negara yang terletak antara 35° Lintang Utara dan 35° Lintang Selatan pada temperatur udara paling rendah sekitar 10°. *Aedes aegypti* memiliki sifat *highly anthropophilic* yang lebih menyukai

menggigit manusia dari pada binatang dan juga bersifat *endofilik*, artinya lebih menyukai beristirahat di dalam rumah (Malar, 2006).

Aedes aegypti merupakan nyamuk yang biasanya berada di daerah tropis dan dapat berkembang biak sepanjang tahun. Nyamuk ini diduga berasal dari Afrika, kemudian nyamuk *Aedes aegypti* tersebar di daerah tropis, subtropis dan sebagian daerah iklim sedang melalui perdagangan global dan pengiriman barang (Powell dan Tabachnick, 2013).

Distribusi nyamuk ini secara umum dibantu oleh imigrasi massal manusia. Proses pertama kali diduga terjadi saat migrasi menuju Dunia Baru (*New World*) melalui perdagangan buruh/budak pada abad ke-15 sampai 19, dan yang kedua yaitu, migrasi ke Asia pada abad ke-18 hingga 19. Migrasi ketiga terjadi setelah perang dunia kedua dengan tujuan berbagai negara di seluruh dunia (Mousson *et al.* 2005).

Di Indonesia, *Aedes aegypti* merupakan vektor penyakit *dengue* yang tersebar di seluruh Indonesia, kecuali pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (Hadi dan Koesharto, 2006). Di ketinggian 1.000 meter nyamuk *Aedes aegypti* tidak dapat berkembangbiak karena suhu udara terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan bagi kehidupan nyamuk tersebut (Sungkar, 2005 *dalam dalam* Cecep Dani Sucipto, 2011:51).

Penyebaran nyamuk *Aedes aegypti* di Indonesia terutama di kota pelabuhan dan pusat-pusat penduduk yang padat. Kepadatan *Aedes aegypti* tertinggi di daratan rendah. Hal ini mungkin karena penduduk di dalam daratan rendah lebih padat dibandingkan daratan tinggi (Sucipto, 2011 *dalam* Makkatenni, 2014).

6. Peran Nyamuk *Aedes aegypti* sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus dengue* yang dibawa oleh nyamuk *Aedes aegypti* (Musyarifatun dkk, 2013). Virus akan masuk ke dalam instestinum nyamuk. Replikasi virus terjadi dalam *hemocoelum* dan akhirnya akan menuju ke dalam air liur dan siap ditularkan. Pada fase ini disebut sebagai *extrinsic incubation periode* yang memerlukan waktu selama 7-14 hari (Soewondo ES, 1998 dalam Bagus Uda Palgunadi dan Asih Rahayu, 2011:3).

Pengaruh lingkungan yaitu suhu udara dan kelembaban udara juga sangat berpengaruh bagi viabilitas nyamuk *Aedes* maupun pada *virus dengue*. Suhu yang relatif rendah maupun relatif tinggi, serta kelembaban udara yang rendah dapat mengurangi viabilitas *virus dengue* yang hidup dalam tubuh nyamuk maupun mengurangi viabilitas nyamuk itu sendiri. Sehingga pada musim hujan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue lebih tinggi dibandingkan dengan pada waktu musim kemarau (Yotopranoto S dkk.,1998 dalam Bagus Uda Palgunadi dan Asih Rahayu, 2011:4).

Tingginya insiden pada daerah yang memiliki penduduk yang padat tidak luput dari peran nyamuk *Aedes aegypti* sebagai vektor DBD dengan padatnya penduduk pada suatu daerah maka akan memperbesar pula peluang nyamuk infeksi mengigit manusia dan menyebarkan virus tersebut pada populasi di daerah tersebut (Musyarifa, 2014).

B. Pengendalian Vektor

Pengendalian vektor adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menurunkan populasi vektor dengan maksud untuk mencegah penyakit yang ditularkan oleh vektor. Sampai saat ini upaya yang paling banyak digunakan dan

dianggap lebih mudah oleh masyarakat adalah upaya pemberantasan vektor atau binatang pembawa penyakit dengan cara membunuh dengan cara kimia maupun mekanik.

WHO (2012), mengajukan *Integrated Vektor Management* (IVM) atau pengendalian vektor terpadu adalah proses pengambilan keputusan yang rasional untuk penggunaan segala sumber daya dalam pengendalian vektor. Tujuan dari pendekatan IVM adalah untuk berkontribusi dalam pencapaian global dalam pengendalian penyakit akibat vektor dengan membuat pengendalian vektor yang lebih efisien, ekonomis, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan IVM ialah membantu program pengendalian vektor untuk menemukan dan menggunakan lebih banyak temuan lapangan untuk meningkatkan intervensi yang tepat dan bekerja sama dengan sektor kesehatan dan sektor lain seperti rumah tangga dan masyarakat.

Konsep pengendalian vektor terpadu serupa dengan konsep pengendalian hama terpadu yaitu dengan mengintegrasikan cara-cara pengendalian yang potensial secara efektif, ekonomis dan ekologis untuk menekan populasi serangga vektor pada aras yang dapat ditoleransi. Konsep pengendalian tersebut dapat diterapkan pada jenis serangga vektor yang lain selain *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang berhubungan dengan penyakit menular pada manusia (Oka, 1995 dalam Supartha, 2008).

Pencegahan atau penanggulangan *virus dengue* sangat tergantung pada pengendalian nyamuk vektor dan membatasi kontak antara nyamuk dengan manusia. Pemantauan persebaran dan perkembangan populasi nyamuk di suatu daerah merupakan komponen utama dalam program pengendalian terpadu pada vektor penyakit ini. Tujuan pemantauan nyamuk ini dilakukan untuk mengukur besar risiko yang dihadapi manusia dengan menentukan keberadaan dan

kelimpahan nyamuk yang berada di daerah tersebut. Di Indonesia, program nasional pengendalian vektor sudah ada sejak tahun 1982, namun kasus masih banyak dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Program pemerintah yang paling populer dalam memberantas nyamuk *Aedes aegypti* adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk mengeleminasi tempat nyamuk berkembang biak yang dikenal dengan “3M plus” (menutup, menguras dan mengubur wadah-wadah yang tidak digunakan). Program lainnya adalah dengan memperbaiki suplai air, pengendalian hayati seperti dengan memanfaatkan ikan predator dan lainnya, pengendalian terhadap larva atau jentik nyamuk) serta pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 374/Menkes/Per/III/2010, tentang Pengendalian Vektor bahwa pengendalian vektor dilakukan dengan menggunakan metode Pengendalian Terpadu. Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) atau *Integrated Vektor Control (IVC)* merupakan salah satu program dari upaya penanggulangan penularan Penyakit Berbasis Nyamuk (PBN) dan merupakan suatu pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan, rasionalitas, efektifitas serta dengan pertimbangan kesinambungan. Jadi, konsep pengendalian vektor terpadu adalah pendekatan pengendalian vektor dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen dan pertimbangan terhadap peneluran dan pengendalian penyakit. Pengendalian vektor terpadu merupakan kegiatan terpadu dalam pengendalian vektor sesuai dengan langkah kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pengendalian sebagai berikut :

1. Metode pengendalian fisik adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Contohnya, modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan (3M, pembersih lumut, penanaman bakaku, pengeringan, pengaliran/drainase, dan lain-lain), pemasangan kelambu, memakai baju lengan panjang, penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk (*cattle barrier*), dan pemasangan kawat kasa.
2. Metode pengendalian dengan menggunakan agen biotik. Contohnya, predator pemakan jentik (ikan, mina padi dan lain-lain), bakteri, virus, fungi dan manipulasi gen (penggunaan jantan mandul, dll).
3. Metode pengendalian secara kimia. Contohnya, *surface spray* (IRS), kelambu *berinsektisida*, *larvasida*, *space spray* (pengkabutan panas atau fogging dan dingin atau ULV), dan insektisida rumah tangga (penggunaan repelan, anti nyamuk bakar, liquid vaporizer, paper vapotizer, mat, aerosol dan lain-lain).

C. Tinjauan Umum Tentang Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.)

Berdasarkan ITIS (2015), tanaman Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.) diklasifikasikan sebagai berikut :

Divisi : *Tracheophyta*

Kelas : *Magnoliopsida*

Ordo : *Malvales*

Famili : *Malvaceae*

Genus : *Sida*

Spesies: *Sida rhombifolia* L.

Tanaman sidaguri dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama daerah Saliguri (Minangkabau), Sidaguri (Melayu), Sidaguri (Jawa Tengah), Sidagori

(Sunda), Taghuti (Madura), Kahindu (sumba), Hutu gamo (Halmahera), Digo (Ternate) (Dalimartha, 2003).

Sidaguri tumbuh liar yang biasanya ada ditepi jalan, halaman berumput, hutan, ladang, dan tempat-tempat yang terkena sinar matahari cerah atau sedikit terlindungi. Tanaman ini tumbuh diseluruh daerah tropis di seluruh dunia dari dataran rendah sampai 1.450 meter di atas permukaan laut. Tanaman perdu tegak ini tumbuh sampai 2 meter dengan cabang kecil. Daun tunggal, bentuk bulat telur atau lanset, tepi bergerigi ujung meruncing pertulangan menyirip, panjang 1-1,4 cm dan lebar 1-1,5 cm. Umumnya Daun Sidaguri berbentuk jajaran genjang dengan bagian bawah berwarna hijau pucat atau abu-abu (Gambar 2.4). Bunga tunggal berwarna kuning cerah dan akan mekar pada pukul 12.00 dan layu sekitar 3 jam kemudian. Buah dengan 8-10 kendaga diameter 6-7 mm (Dalimartha, 2003).



Gambar 2.4 Tanaman sidaguri
(Sumber : *Useful Tropical Plants*, 2019)

Indonesia merupakan daerah yang kaya akan tanaman, dengan keanekaragaman tanaman tersebut dapat dihasilkan banyak obat-obatan. Penggunaan tanaman hasil kekayaan alam Indonesia sebagai obat sudah dikenal sejak lama, terutama penggunaannya sebagai obat herbal atau tradisional.

Kegunaan tanaman tersebut sebagian besar merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu, sehingga pengalaman emperisi generasi-generasi berikut masih menggunakannya (Wulandari, 2015).

Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Tanaman sidaguri dapat tumbuh hingga 60 cm, terkadang juga tumbuh hingga 1,5 m. Tanaman ini terdistribusi kurang lebih 70 negara mulai dari yang beriklim tropis, subtropis, hingga yang bertemperatur hangat (Alppiansyah, 2015).

Seluruh bagian tumbuhan sidaguri memiliki efek. Secara *in vitro* *Sida rhombifolia* terbukti memiliki efek analgetik dan anti-inflamasi. Herbal sidaguri telah dikemas dan dipasarkan untuk digunakan sebagai obat asam urat. Bunga sidaguri dapat digunakan sebagai obat herbal luar pada gigitan serangga. Daun Sidaguri memiliki anti bakteri gram positif seperti *S.aureus*, *S.epidermidis* dan bakteri gram negatif *P.aeruginosa* dan *Escherichia coli*, yang dapat digunakan sebagai obat cacing, bisul, kurap dan juga gatal-gatal (Sari, 2012). Akar sidaguri digunakan untuk mengobati rematik, asma, influenza, sakit gigi dan juga mengurangi rasa nyeri pada pembengkakan akibat sakit gigi. Tumbuhan ini digunakan dengan cara menggigitnya pada bagian gigi yang sakit atau berkumur dengan air rebusan akar sidaguri (Kinho J dkk, 2011 & Sari, 2012).

1. Morfologi tanaman

a. Makroskopik

Bentuk daun bagian ujungnya membundar dan panjang bawah daun meruncing, tepi daun tidak rata (bergerigi), daun sidguri umumnya berbentuk jajar genjang, bagian bawah hijau pucat atau hijau abu-abu, ibu tulang daun membagi daun menjadi sama besar, anak tulang daun pertama mencapai tulang daun, pada bagian atas daun, tulang daun tampak seperti alur sedangkan pada bagian bawah

daun anak tulang daun menonjol keluar (Anonim, 1995). Bunga berdiri sendiri di ketiak, panjang 6-9 mm, pada ujungnya terbelah menjadi benang sari yang bebas. Bakal buah beruang 9-10. Tangkai pada pangkalnya bersatu. Buah dengan 8-10 kenda (Steenis, 2003).

b. Mikroskopik

Pada penampang melintang melalui tulang daun tampak epidemis atas terdiri dari satu lapis sel, bentuk empat persegi panjang. Pada epidemis atas terdapat rambut penutup berbentuk bintang yang terdiri dari 3-8 sel. Epidemis bawah terdiri dari satu lapis sel, bentuk empat persegi panjang; pada pandangan tangensial berbentuk poligonal, dinding samping agar berkelok-kelok; rambut penutup serupa dengan rambut penutup pada epidermis atas; stomata tipe *anomositik* dengan 3-4 sel tetangga. Jaringan *palisade* terdiri dari selapis sel *silindris* panjang berisi banyak butiran *klorofil*. Jaringan bunga karang terdiri dari sel dengan ukuran tidak sama, kadang-kadang terdapat pula ruang antara sel, mengandung butiran hijau daun; pada jaringan bunga karang terdapat rongga *lisigen*. Beberapa *sel parenkim* berisi kristal *kalsium oksalat* berbentuk roset. Pada tulang daun tampak *sel kolenkim* di bawah epidermis atas dan di bawah. Di antara floem dan parenkim terdapat serbuk sklerenkim; berkas pengangkut tipe kolateral. Serbuk berwarna hijau kecoklatan. Fragmen pengenal adalah rambut penutup berbentuk bintang, *fragmen mesofil*, *fragmen epidermis* dengan *stomata* dan *Kristal kalsium oksalat* berbentuk roset (Anonim, 1995)

2. Kandungan kimia Sidaguri (*Sida rhombifolia* L)

Sidaguri memiliki sifat yang khas manis dan mendinginkan. Kandungan utama tanaman ini adalah *tanin*, *flavonoid*, *saponin*, *alkaloid*, dan *glikosida*. Disamping itu juga ditemui *kalsium osalat*, *fenol*, *steroid*, *efedrin* dan *asam amino*. Kadar kimia zat tersebut ditemui pada kisaran yang berbeda-beda pada

jaringan tanaman. Pada akar *alkaloid* terdapat kandungan *alkaloid*, *steroid* dan *efedrin*. Pada daun terdapat kandungan *alkaloid*, *kalsium oksalat*, *tannin*, *saponin*, *fenol*, *asam amino* dan *minyak atsiri*, pada batang ditemui *kalsium oksalat* dan *tannin* (Menkes RI, 2016).

3. Efek farmakologi

Herbal sidaguri berkhasiat untuk *antiinflamasi*, *diuretik* dan *analgetik* (Soedibyo, 1998), *diaforetik*, *antipiretik* dan menyembuhkan penyakit kulit (Anonim, 1995).

4. Aktivitas *Sida rhombifolia L.* sebagai Anti-inflamasi

Dalam studi pendahulu untuk uji toksisitas akut pada ekstrak *Sida rhombifolia L.* menghasilkan nilai LD₅₀ lebih dari 5000 mg/kg. Penghambatan tergantung dosis edema diamati pada 1; 2 dan 3 jam. Namun demikian ekstrak menunjukkan penghambatan paling banyak dalam pada proses induksi pada telinga edema dengan dosis 200, 300 dan 500 µg/telinga. Adapun untuk aktivitas *analgesik*, ekstrak menghasilkan efek *analgesik* yang signifikan dalam *asam asetat* dengan metode *hot plate* ($p \leq 0,005$) dan penghambatan bergantung pada dosis yang diamati (Konate dkk, 2012). Kornate dkk (2012) menyimpulkan bahwa sidaguri memiliki anti-inflamasi dan sifat analgesik. Temuannya tersebut mendukung penggunaan ekstrak *Sida rhombifolia L.* sebagai obat tradisional.

Ekstrak *etanol* dari bagian udara kering *Sida rhombifolia L.* dilakukan penelitian karena diduga dapat berfungsi sebagai *analgesik* dan memiliki aktivitas *sitotoksik* terhadap hewan uji. Ekstrak yang dihasilkan signifikan ($p < 0,001$) dalam proses penghambatan *asam asetat* yang diinduksi pada tikus dengan dosis oral 250 dan 500 mg/kgBB dibandingkan dengan standar *natrium diklofenak* yang diinduksikan obat pada dosis 25 mg/kgBB. Ekstrak *etanol* minyak mentah juga menunjukkan aktivitas *sitotoksik* yang paling menonjol terhadap *Artemia salina*

(LC50 40 µg/mL dan LC50 80 µg/mL). Berdasarkan hasil yang diperoleh, *Sida rhombifolia* L. dapat digunakan dalam pengobatan tradisional (Rahman dkk., 2011).

5. Senyawa Bioaktif

Senyawa bioaktif diartikan sebagai senyawa kimia dari bahan alami yang mempunyai aktivitas biologi yang dapat dimanfaatkan. Senyawa bioaktif diperkirakan terdapat di alam dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak terbatas yang sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Banyak senyawa bahan alam yang bersifat bioaktif berhasil diisolasi baik dari hewan maupun dari tumbuhan yang sangat berguna misalnya sebagai *insektisida*, *pestisida*, *antifungi* dan *sitotoksik* (Suriyani, 2006).

6. Bioaktivitas Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.)

a. Bagian Daun

Simarmata dkk (2012) menunjukkan bahwa efek dari penurunan kadar asam urat suspense efek ekstrak *etanol* Daun Sidaguri (EEDS) dosis 50 mg/kg BB dan suspensi EEDS 200 mg/kgBB lebih kuat dibandingkan suspense allopurinol 10 mg/kg BB karena persen penurunan suspense EEDS dosis 50 mg/kgBB adalah 49,45% dan suspensi EEDS dosis 200 mg/kg BB adalah 47,90%, sedangkan suspensi *allopurinol* dosis 10 mg/kgBB adalah 44,31%. Sementara efek penurunan kadar asam urat dari suspensi EEDS 100 mg/kgBB (43,11%) tidak lebih baik dari suspensi *allopurinol* dosis 10 mg/kgBB (44,31%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa EEDS dosis 50 mg/kg BB memiliki efek penurunan kadar asam urat yang lebih baik.

Efektivitas fraksi etanol 70% dari ekstrak *etanol* Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.) dengan dosis 5,873 mg/kg BB dapat menurunkan kadar asam urat

serum yang sebanding dengan *allopurinol* dosis 0,39 mg/kg BB pada mencit jantan galur *Swiss-webster* yang diinduksi *kalium oksonat* (Hidayati dkk, 2013).

b. Bagian Batang

Asam asetil biasa juga dikenal sebagai *asetosal* atau *aspirin* adalah *analgetik* (penahan rasa sakit atau nyeri), *antipiretik* (demam), dan juga *anti-inflamasi* (peradangan) yang merupakan golongan obat yang digunakan secara bebas dan luas. Ekstrak etanol pada kulit batang sidaguri dengan dosis 100, 200, dan 400 mg/kg BB memiliki efek *analgetik* dimana pada dosis 100 mg/kg BB menunjukkan penurunan jumlah geliat berbeda bermakna terhadap kelompok control ($p > 0,05$) pada menit ke 45, 50, 55, 60; dosis 200 mg/kgBB pada menit ke 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60; sedangkan dosis 400 mg/kgBB pada menit ke 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ekstrak etanol kulit pada batang sidaguri pada dosis 100, 200 dan 400 mg/kg BB menunjukkan rata-rata total persentas proteksi sebesar 29,74%, 41,03% dan 52,71%; sedangkan efektivitas *analgetik* sebesar 38,77%; 55,01%; dan 78,08%. Ekstrak *etanol* kulit batang sidaguri dosis 3 yaitu 400 mg/kgBB menunjukkan aktivitas *analgetik* terbesar dengan total penurunan jumlah geliat paling besar, persentase proteksi sebesar 52,71% dan efektivitas *analgetik* sebesar (78,08%). Ekstrak *etanol* kulit batang sidaguri dengan dosis 400 mg/kg BB merupakan dosis yang paling efektif karena dapat menurunkan jumlah geliat lebih besar dari dosis 100 dan 200 mg/kgBB (Suwandi, 2014).

c. Bagian Akar

Penelitian *in vitro* terhadap ekstrak akar sidaguri dengan menggunakan pelarut *etanol* 95% menunjukkan efek analgetik dan anti inflamasi yang lebih baik dibandingkan dengan efek anti bakterinya. Hasil ini ditegaskan dalam penelitian selanjutnya terhadap hewan coba yang menunjukkan potensi anti-inflamasi

ekstrak akar sidaguri pada tikus Wistar dengan model lesi periapikal (Tanumihardja dkk, 2016).

Ekstrak *etanol* pada Daun Sidaguri menunjukkan adanya daya hambat yang tergantung pemberian dosis yang diberikan dan pengaruh ekstrak pada dosis 3,36 mg/kg BB lebih baik dibandingkan dengan ekstrak yang diberikan pada dosis rendah serta kontrol negatif yang diberikan secara oral pada tikus. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak akar *S. rhombifolia* memiliki aktivitas sebagai *anti-inflamasi* dan *analgesik* (Tanumihardja dkk, 2016).

D. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam

Allah SWT menciptakan alam beserta isinya tidaklah sia-sia. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan dieksplorasi jika manusia berfikir. Salah satu ciptaan-Nya yang ada disekitar kita adalah tumbuhan, baik di darat maupun di larutan.

Salah satu tumbuhan yang telah Allah SWT ciptakan yaitu tumbuhan sidaguri. Bagian dari tumbuhan sidaguri mulai dari daun, kulit batang, dan akar bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh manusia sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam HR. Bukhari (Fitria, 2015):

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya : “Allah SWT tidak menciptakam suatu penyakit tanpa menciptakan pula obat untuknya.” (HR. Bukhari).

Hadist di atas menunjukkan bahwa betapa adilnya Allah SWT yang memberikan suatu penyakit beserta penawarnya (obat). Pengetahuan yang akan menuntun manusia untuk menemukan obat-obatan yang telah tersedia di alam, contohnya obat yang berasal dari tumbuhan. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuannya, maka tidak akan pernah ada yang tahu adanya obat yang

berasal dari tanaman yang biasanya tidak dihiraukan. Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengambil manfaat dari alam semesta, salah satunya dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai obat.

E. Tinjauan Umum Tentang Insektisida

1. Pengertian Insektisida

Secara harfia insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh dan mengendalikan serangga hama. Pengertian secara luas yaitu semua bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, menolak atau mengurangi serangga. Insektida bisa berbentuk larutan, padat, dan juga gas. Insektisida digunakan untuk mengendalikan serangga dengan cara mengganggu atau merusak sistem didalam tubuh serangga (Cecep Dani Sucipto, 2011:239).

Insektisida adalah senyawa yang sifatnya sebagai racun bagi jasad pengganggu tanaman, insektisida dapat memengaruhi tumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Jadi secara sederhana insektisida dapat dikatakan senyawa yang berfungsi sebagai pembunuh hama khususnya serangga (Sudarmo, 2007).

Insektisida alami adalah insektisida yang berasal dari bahan hidup seperti tumbuhan dan mikro. Insektisida alami berasal dari tanamn yang sering di sebut insektisida botanis (Jumar, 2000).

2. Cara Masuk (*Mode Of Entry*) dan Cara Kerja (*Mode Of Action*) Insektisida dalam Tubuh Serangga

Menurut Argrochemil (2011), zat atau senyawa yang bersifat racun tersebut memiliki beberapa cara untuk menyebabkan racun pada serangga hama di antaranya sebagai berikut :

a. Racun Kontak

Racun di dalam pestisida yang bekerja dengan baik ketika terkena langsung oleh hama atau OPT sasaran. Racun kontak sangat efektif untuk mengendalikan OPT yang sifatnya meneteap dan tidak tersembunyi. Pestisida yang termasuk dalam racun kontak umumnya adalah herbisida, insektisida dan fungisida.

b. Racun Perut

Racun perut merupakan racun di dalam pestisida yang bekerja ketika racun tertelan oleh serangga. Racun akan merusak lambung serangga sehingga menyebabkan kematian pada serangga. Racun perut juga dapat disebut racun lambung karena serangan berpusat pada bagian lambung. Istilah racun perut ini hanya terdapat pada insektisida.

c. Racun Pernapasan

Racun pernapasan juga hanya terdapat pada jenis insektisida. Racun mulai bekerja ketika racun mulai terhirup oleh organ pernapasan dari hama jenis serangga. Akan jauh lebih efektif ketika hama sasaran berada pada puncak aktifitasnya karena pernapasan yang semakin cepat dan racun akan terhirup lebih banyak.

3. Jenis-Jenis Insektisida organik sintetik

Insektisida organik sintetik dapat dibedakan atas tiga kelompok berdasarkan struktur dan komposisinya, yaitu:

- a. Insektisida organoklorin, misalnya DDT, Metosikhlor, Aldrin, dan Dieldrin.
- b. Insektisida organofosfor, misalnya Parathion dan Malathion.
- c. Insektisida karbamat, misalnya Karbaril (sevin) dan Baygon.

Sifat-sifat insektisida tersebut berbeda-beda meskipun termasuk dalam satu kelompok. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan grup yang terkait pada

struktur ini dasar terdapat disetiap kelompok. Dua insektisida yang penting dilihat dari segi pencermarannya terdapat lingkungan yaitu daya racunnya (toksisitasnya) dan kemudahannya terdegradasi. (Srikandi F, 1992: 71-72).

4. Formulasi Insektisida

Formulasi insektisida merupakan proses “pengolahan” bahan teknis untuk memperbaiki berbagai aspek seperti: efektivitas, kemudahan aplikasi, keamanan serta biaya. Secara mendasar formulasi terdiri dari:

a. Bahan Aktif

Bahan utama dari formulasi yaitu bahan aktif yang secara biologis bersifat sebagai insektisida. Kadar bahan aktif untuk formulasi cair dinyatakan dalam g/l, sedangkan formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cair dan padat dinyatakan dalam persen bobot. Sebagai ilustrasi Indro 25EC berarti kadar bahan aktif insektisidanya adalah 26 gram/liter, sedangkan Dira 10WP kadar bahan aktifnya 10% atau 100g/kg.

b. Pelarut (*solvent*)

Pelarut adalah bahan yang digunakan untuk melarutkan bahan aktif. Umumnya pelarut insektisida berupa, air, minyak dan talk.

c. Pengencer (*diluents*)

Pelarut harus dibedakan dengan pengencer. Pengencer merupakan bahan yang digunakan untuk mengencerkan formulasi sehingga siap untuk diaplikasikan. Contoh dari pengencer tersebut adalah air dan solar.

d. Sulfaktan

Sulfaktan merupakan bahan aktif yang terdapat dalam suatu formulasi untuk memperbaiki sifat-sifat seperti kebasahan, penyebaran, dispensibilitas, dan pembentukan emulasi.

e. Sinergi

Sinergi bahan kimia yang meskipun tidak harus mempunyai sifat insektisida namun dalam meningkatkan potensi insektisida dari bahan yang ditambahkan.

Keberhasilan pengendalian serangga dapat tercapai dengan pemilihan jenis formulasi yang tepat. Adapun jenis-jenis formulasi insektisida yang banyak digunakan terdapat pengendalian nyamuk antara lain:

1. *Oil Miscible Liquid* (OL)

Formulasi *Oil Miscible Liquid* merupakan formulasi yang paling sederhana dan yang banyak dipakai pada insektisida rumah tangga. Formulasi ini terdiri dari bahan aktif yang dicampur dengan satu pelarut yang kuat misalnya hidrokarbon aromatik dan pelarut lain seperti minyak tanah, contohnya formulasi OL yang sering dipakai di rumah tangga yaitu: Baygon 4.2AL, Domestos Nomos 7.2L, Jumbo 1.52L, Hit 9.33 AL.

2. *Mosquito Coil* (MC)

Formulasi MC dikenal dengan anti nyamuk bakar. Bentuk ini adalah formulasi tradisional yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Formulasi ini dibuat dengan memcampurkan bahan aktif yang umumnya adalah *piretroid*, dengan bahan pembawa seperti tepung tempurung kelapa, pewangi dll. Contoh produk formulasinya yang terdaftar dan beredar di Indonesia antara lain: Antimos 0.25MC, Bedak 0.18MC, Naygon 0.03MC.

3. *Aerosol*

Formulasi ini siap pakai dan yang paling diminati di lingkungan rumah tangga setelah formulasi MC dan OL. Untuk menghasilkan formulasi ini dilakukan dengan melarutkan bahan aktif dengan pelarut organik dan dimasukkan ke dalam kaleng *aeraosol* dan selanjutnya diisi gas sebagai tenaga pendorong

untuk menghasilkan droplet halus melalui nozzle. Contoh produk formulasi *aerosol* yang terdaftar dan tersedia dipasaran antara lain: Baygon 0.065, dll.

4. *Vaporizer*

Vaporizer merupakan formulasi mutakhir yang banyak dikenal saat ini pada industri insektisida rumah tangga. Formulasi ini mengandalkan bahan aktif yang menguap baik dengan bantuan energi dari luar untuk mengendalikan serangga terbang khususnya nyamuk dalam ruangan. Ada beberapa jenis yang di kenal di pasar yaitu:

- a. *Liquid Vaporize* (LV) adalah formulasi cair yang berada dalam botol, seperti Tigaroda Alpha 35VL, Mortein 21.3 VL, Baygon 6,7VM, dll.
- b. *Vaporizing Mat* (MV) adalah bahan lempengan kertas yang lebih dikenanl dengan mat, seperti: Baygon 4,3MAT, Hit 6,3MAT, dll.
- c. *Passive Vaporize* (VP) adalah formulasi terbaru dalam keluar, formulasi ini mengendalkan penguapan bahan aktif, salah satu formulasi yang sekarang baru hadir adalah bentuk kertas lampion, seperti: Mortein Udara Aktiv 11.802 VP, dll.

Pemilihan formulasi menjadi sangat penting pada pengendalian *low impact*. Adapun pertimbangan dalam memilih formluasi; perilaku hama, ketersediaan alat, bahaya drift-kontaminasi lingkungan, keamanan operator dan organisme bukan sasaran, kemungkinan kontaminasi terhadap makanan, bercak, jenis/tipe permukaan serta biaya (Cecep Dani Sucipto, 2011:250-266)

5. Resistensi

Resistensi adalah kemampuan individu serangga untuk bertahan hidup terhadap suatu dosis insektisida yang dalam keadaan normal dapat membunuh spesies serangga tersebut. Status resistensi atau kerentanan insektisida (*insecticide susceptibility*) terhadap serangga, diukur menggunakan prosedur standar

kerentanan, yaitu metode standar yang tepat untuk mengukur resistensi insektisida khususnya di lapangan.

Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil *Letal Dosis* (LD50) atau (LD100) adalah:

Kematian 99-100% = *susceptible*/rentan/peka

Kematian 80-90% = toleran

Kematian <80% = resisten

Penggunaan insektisida pada pengendalian populasi nyamuk menyebabkan tekanan seleksi atas individu nyamuk yang memiliki kemampuan untuk tetap hidup bila kontak dengan insektisida dengan mekanisme berbeda (Cecep Dani Sucipto, 2011:278). Mekanisme resistensi dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu (1) biokimiawi dan (2) perilaku (*behavioral resistance*).

1. Mekanisme biokimiawi

Berkaitan dengan fungsi enzimatis di dalam tubuh vektor yang mampu mengurai molekul insektisida menjadi molekul-molekul lain yang tidak toksik (detoksifikasi). Molekul insektisida harus berinteraksi dengan molekul target dalam tubuh vektor sehingga mampu menimbulkan keracunan terhadap sistem kehidupan vektor menimbulkan kematian. Detoksifikasi insektisida terjadi dalam tubuh spesies vektor karena meningkatnya populasi yang mengandung enzim yang mampu mengurai molekul insektisida. Tipe resistensi dengan mekanisme biokimiawi ini sering disebut sebagai *resistensi enzimatis*.

2. Resistensi perilaku (*behavioral resistance*)

Individu dari populasi mempunyai struktur eksoskelet sedemikian rupa sehingga insektisida tidak mampu masuk dalam tubuh vektor. Secara alami vektor menghindari kontak dengan insektisida, sehingga insektisida tidak sampai kepada “target” (Kementerian Kesehatan RI, 2012:95-96).


Beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme resistensi pada nyamuk seperti: Faktor genetik, faktor ini tergantung pada keberadaan gen resistensi yang mampu mengkode pembentuk enzim tertentu dalam tubuh nyamuk. Enzim ini akan menetralkan keberadaan insektisida (misalnya enzim esterase). Faktor biologis, yaitu kecepatan regenerasi nyamuk. Kemampuan beradaptasi terhadap tekanan alam seperti pemberian insektisida dan didukung kecepatan regenerasi yang resisten. Faktor operasional, meliputi bahan kimia yang digunakan, cara aplikasi, frekuensi dosis dan lama pemakaian (panut Dj, 2008 dalam *Lintje Boekoesoe*, 2013:16-17).



F. Kerangka Teori

Daun Sidaguri mengandung senyawa kimia yang diketahui memiliki aktivitas sebagai larvasida nyamuk sehingga dapat menyebabkan kematian pada larva seperti *alkaloid*, *tanin*, *saponin*, dan *minyak atsiri*. *Alkaloid* mampu menghambat metamorphosis pada larva dan akan mempengaruhi sistem kerja saraf. *Tanin* mengganggu pertumbuhan larva dengan cara mengganggu larva untuk mencerna makanannya (Nisa *et al*, 2015).

Menurut Dinata (2009) *minyak atsiri* adalah senyawa yang memberikan bau khas terhadap tumbuhan. Minyak atsiri ini hanya ditemukan pada tumbuhan yang memiliki *sel glandula*. *Saponin* berfungsi untuk mengikat *sterol* bebas pada pencernaan serangga (Aminah dkk, 2001).




Gambar 2.5. Skema Kerangka Teori Modifikasi

(Gautar *et al.*, 2013; Nisa *et al.*, 2015; Sandika *et al.*, 2012; Minarni *et al.*, 2013;

Tandi, 2010; Diki 2012

F. Kerangka Konsep



Gambar 2.6. Kerangka Konsep

Keterangan :

: Variabel terikat

: Variabel bebas

: Variabel perancu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan pengujian statistik. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat (Musalifah, 2016).


2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pembuatan ekstrak Daun Sidaguri dilakukan di Laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksperimen murni (*true experiment*) dengan rancangan *pre-post test Control Grup Design*, merupakan desain penelitian yang menggunakan *pre-test* terhadap sampel sebelum diberikan perlakuan. Dalam desain ini terdapat dua kelompok masing-masing dipilih dengan *purposive sampling*, kelompok-kelompok tersebut dipilih berdasarkan Kriteria Inklusi dan Eksklusi peneliti. Desain penelitian ini mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan

kelompok kontrol (Riyanto, 2011 *dalam* Ikhsan, 2014). Desain penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Pendekatan Penelitian
(Prof. Dr. Sugiyono, 2003)

Keterangan:

S = Sampel

K₁ = Kelompok kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan 100ml *aquadest* atau konsentrasi 0%

K₂ = Kelompok kontrol setelah mendapatkan perlakuan dengan 100ml *aquadest* atau konsentrasi 0%

X_{1.2.3.4} = Pemberian ekstrak dengan berbagai konsentrasi 0,25%,0,50%, 0,75% dan 1%

O_{1.a} = Kelompok 1 sebelum perlakuan dengan ekstrak 0,25%

O_{1.b} = Kelompok 2 sebelum perlakuan dengan ekstrak 0,50%

O_{1.c} = Kelompok 3 sebelum perlakuan dengan ekstrak 0,75%

O_{1.d} = Kelompok 4 sebelum perlakuan dengan ekstrak 1%

O_{2.a} = Kelompok 1 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,25%

O_{2.b} = Kelompok 2 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,50%

O_{2.c} = Kelompok 3 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,75%

O_{2.d} = Kelompok 4 setelah perlakuan dengan ekstrak 1%

Di dalam penelitian ini, menggunakan 5 kelompok perlakuan yang terdiri dari 4 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol (kontrol negatif) dengan 4 kali pengulangan (replikasi).

Tabel 3.1
Ulangan (replikasi) Perlakuan Modifikasi

Ulangan	Konsentrasi (%)	Waktu Kematian Larva (menit)								Total kematian larva	Presentasi kematian larva (%)
		5	10	20	40	60	120	240	480		
I	0%										
	0,25%										
	0,50%										
	0,75%										
	1%										
II	0%										
	0,25%										
	0,50%										
	0,75%										
	1%										
III	0%										
	0,25%										
	0,50%										
	0,75%										
	1%										
IV	0%										
	0,25%										
	0,50%										
	0,75%										
	1%										

(Limbran Tyna dkk, 2018 ; Nirma, 2016)

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva *Aedes aegypti* instar III yang didapat Laboratorium Entomologi Universitas Hasanuddin Makassar yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh ahli serangga.

2. Sampel

a. Kriteria Inklusi

1. Larva *Aedes aegypti* sehat dan telah mencapai instar III.
2. Larva bergerak aktif.

b. Kriteria Eksklusi

1. Larva *Aedes aegypti* yang belum mencapai instar III.
2. Larva yang telah berubah menjadi pupa ataupun nyamuk dewasa.
3. Larva yang mati sebelum perlakuan.

c. Besar Sampel

Tabel 3.2
Rincian Jumlah Sampel yang Digunakan

Perlakuan	Jumlah Nyamuk x Jumlah pengulangan	Total
Kontrol (-) : 0%	25 larva nyamuk x 4	100 larva nyamuk
Perlakuan I : 0,25%	25 larva nyamuk x 4	100 larva nyamuk
Perlakuan II : 0,50%	25 larva nyamuk x 4	100 larva nyamuk
Perlakuan III : 0,75%	25 larva nyamuk x 4	100 larva nyamuk
Perlakuan IV : 1%	25 larva nyamuk x 4	100 larva nyamuk
Jumlah total nyamuk yang digunakan		500 larva nyamuk

d. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* terhadap larva *Aedes aegypti*. Sampel dalam penelitian ini adalah larva nyamuk *Aedes aegypti*. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok, 1 kelompok menjadi kontrol dan 4 kelompok diuji menggunakan ekstrak dengan konsentrasi yang berbeda

(0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1%) dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Jumlah sampel setiap perlakuan sama dengan menggunakan 25 larva nyamuk *Aedes aegypti* jadi total larva yang di butuhkan adalah 500 larva.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yakni diambil dari jumlah larva yang mati setiap 24 jam pada setiap konsentrasi ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L.*) selanjutnya data dikumpullkan dalam bentuk tabel.

2. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan cara menghitung jumlah larva yang mati selama 24 jam pada masing-masing gelas perlakuan. Larva yang mati merupakan larva yang tenggelam ke dasar kontainer, tidak bergerak, meninggalkan larva lain yang bergerak dengan jelas dan tidak merespon terhadap rangsangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen, baik berupa gambar maupun tulisan, serta menganalisis dokumen-dokumen yang ada, untuk mendukung penyusunan penelitian.

E. Pembuatan Larutan Perlakuan

Membuat berbagai konsentrasi yang diperlukan dapat digunakan rumus:

$$V_1M_1=V_2M_2$$

Keterangan :

V_1 = Volume larutan yang akan diencerkan (ml)

M_1 = Konsentrasi ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L.*) %


V_2 = Volume larutan (air + ekstrak) yang diinginkan (ml)

M_2 = Konsentrasi ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) yang akan dibuat

Tabel 3.3
Jumlah Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) yang dibutuhkan

M1	V2	M2	V1	Pengulangan (V1 x 4)
100%	100 ml	0,25%	0,25%	1 ml
100%	100 ml	0,50%	0,50%	2 ml
100%	100 ml	0,75%	0,75%	3 ml
100%	100 ml	1%	1%	4 ml
Total				10 ml

F. Alur Penelitian



Gambar 3.2. Alur Penelitian

Keterangan :

K₁ K₂ K₃ K₄ = Kontrol (Tanpa Perlakuan)

O_{2.a1.2.3.4} = Kelompok 1 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,25%
dengan 4 kali pengulangan

O_{2.b1.2.3.4} = Kelompok 2 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,50%
dengan 4 kali pengulangan

O_{2.c1.2.3.4} = Kelompok 4 setelah perlakuan dengan ekstrak 0,75%
dengan 4 kali pengulangan

O_{2.d1.2.3.4} = Kelompok 4 setelah perlakuan dengan ekstrak 1%
dengan 4 kali pengulangan

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alat preparasi bahan uji:

- 1) Gelas plastik ukuran \pm 400 ml untuk tempat meletakkan larva uji

b. Alat untuk pembuatan larutan uji:

- 1) Timbangan untuk menimbang Daun Sidaguri yang diperlukan
- 2) Blender untuk menghaluskan Daun Sidaguri yang sudah kering
- 3) Toples dan kain kasa untuk proses maserasi Daun Sidaguri
- 4) *Rotary Evaporator* untuk membuat ekstrak Daun Sidaguri
- 5) Pipet tetes untuk mengambil ekstrak Daun Sidaguri
- 6) Botol tertutup sebagai tempat untuk ekstrak Daun Sidaguri
- 7) Gelas ukur 100 ml untuk mengukur ekstrak Daun Sidaguri

c. Alat untuk uji efektivitas:

- 1) Gelas ukur 250 ml untuk mengukur jumlah air yang diperlukan
- 2) Pipet larva untuk mengambil larva
- 3) Lidi atau jarum untuk mengetahui larva yang mati

2. Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L.*)
- b. Etanol 96%
- d. Air untuk tempat berkembang larva
- e. Aquades untuk melakukan pengenceran ekstrak
- f. Makanan ikan (*hati ayam*) untuk makanan larva

H. Prosedur Penelitian**1. Preparasi Bahan Uji**

Larva nyamuk *Aedes aegypti* yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di Laboratorium Entomologi Universitas Negeri Hasanuddin Makassar yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh ahli serangga. Larva diletakkan di dalam nampan plastik yang berisi air, selanjutnya dipisahkan menggunakan pipet dan larva diletakkan pada gelas plastik yang berisi ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L.*) dengan konsentrasi berbeda di tiap gelas.

2. Pembuatan Larutan Uji

Langkah pembuatan ekstrak Daun Sidaguri sebagai berikut:

- a. Daun Sidaguri yang diambil dibersihkan
- b. Kemudian Daun Sidaguri diangin-anginkan
- c. Daun Sidaguri di hancurkan dengan cara diremukkan
- d. Daun kemudian direndam selama 3x24 jam menggunakan *etanol* 96%
- e. Setelah direndam bahan di saring menggunakan kain kassa

- f. Ekstrak cair di *Rotary Evaporator* menggunakan *etanol* 96%
- g. Menyimpan ekstrak pada mangkok dan di diamkan ± 1 minggu (untuk menghilangkan atau menguapkan pelarut yang masih tersisa pada ekstrak sehingga dihasilkan ekstrak pekat Daun Sidaguri dengan konsentrasi 100%)

Penggunaan etanol pada penelitian ini dikarenakan kandungan zat palling tinggi ditemukan pada ekstrak etanol dibandingkan dengan pelarut yang lain. Selain itu etanol juga memiliki sifat toksisitas yang paling rendah serta bersifat semipolar (Agnetha, 2005 dan Wurangin, 2005).

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dari jumlah kematian larva *Aedes aegypti* selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan *Minitab*. Terdapat beberapa uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Anova

Uji anova yang dimaksudkan yaitu untuk melihat hubungan atau pengaruh ekstrak Daun Sidaguri terhadap kematian larva.

2. Analisis Probit

Digunakan untuk menemukan efek mortalitas ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia* L) terhadap larva *Aedes aegypti* yang dinyatakan dengan *Lehal Concentration* (LC).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dilaboratorium farmasi UIN Alauddin Makassar dan Pondok Puri Samata pada tanggal 1 Agustus sampai 2 September 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Ekstrak daun sidaguri mulai tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus 2019 di Laboratorium Farmasi UIN Alauddin Makassar.
2. Perlakuan pada sampel uji terhadap larva *Aedes aegypti* mulai tanggal 1 September sampai 3 September 2019 di Pondok Puri Samata.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari penyajian tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran suhu dan Kelembaban Ruangan

Pengulangan	Suhu(°C)	Kelembaban (%)
I	30,4	61
II	30,0	62
III	30,0	59
IV	30,2	60
Rata-Rata	30,0	60

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata suhu ruangan pada waktu penelitian adalah 30,0°C dan rata-rata kelembaban ruangan adalah 60%.

Tabel 4.2 Kematian Larva *Aedes aegypti* pada Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) Pada Masing-masing Pengulangan

Ulangan	Konsentrasi (%)	Waktu Kematian Larva (menit)								Total kematian larva	Presentasi kematian larva (%)	
		5	10	20	40	60	120	240	480			1440
I	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1%
	0,50%	0	0	0	0	0	1	1	4	6	12	1,33%
	0,75%	0	0	0	0	0	1	3	3	10	17	1,8%
	1%	0	0	0	0	0	1	1	1	16	19	2,11%
II	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0,44%
	0,50%	0	0	0	0	0	1	0	2	6	9	0,48%
	0,75%	0	0	0	0	0	0	3	4	9	16	1,77%
III	1%	0	0	0	0	0	0	3	7	15	25	2,77%
	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,22%
	0,50%	0	0	0	0	0	0	1	3	12	16	1,77%
IV	0,75%	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	1%
	1%	0	0	0	0	0	1	1	5	6	13	1,44%
	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0,25%	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	1,11%
	0,50%	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12	1,33%
	0,75%	0	0	0	0	0	0	3	4	10	17	1,88%
	1%	0	0	0	0	1	1	1	3	12	18	2%

Sumber : Data Primer, 2019

Hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada kematian larva uji pada konsentrasi 0% di setiap pengulangan. Pada konsentrasi 0,25% kematian larva uji dimulai pada menit ke-480 pada pengulangan keempat dengan jumlah kematian larva uji sebanyak 3 larva. Pada konsentrasi 0,50% diperoleh kematian larva uji dimulai pada menit ke-120 pada pengulangan pertama dan kedua dengan jumlah kematian larva uji pada masing-masing pengulangan sebanyak 1 larva. Pada konsentrasi 0,75% kematian larva uji dimulai pada menit ke-120 pada pengulangan pertama sebanyak 1 larva. Penelitian yang dilakukan pada


konsentrasi 1% kematian larva uji dimulai pada pengulangan ke-4 dengan jumlah kematian larva uji sebanyak 1 larva.

Tabel 4.3 Data Jumlah Larva *Aedes aegypti* yang Mati setelah pemberian ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) setelah 1440 menit

Konsentrasi (%)	Jumlah Larva uji	Jumlah larva yang mati pada Ulangan Ke-				Jumlah larva yang mati	Rata-Rata
		I	II	III	IV		
Kontrol (-)	25	0	0	0	0	0	0%
0,25%	25	9	4	2	10	25	6,25%
0,50%	25	12	9	16	12	49	12,25%
0,75%	25	19	16	9	17	61	15,25%
1%	25	17	25	13	18	73	18,25%

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol pada semua pengulangan tidak ditemukan adanya larva yang mati. Jumlah rata-rata tertinggi larva nyamuk yang mati dalam waktu 1440 menit setelah pemberian ekstrak pada konsentrasi 1% yaitu sebanyak 73 larva (18,25%) sedangkan nilai terendah terdapat pada konsentrasi 0,25% sebanyak 25 larva (6,25%)



Sumber: Data Primer 2019

Gambar 4.1 Rata-rata Kematian Larva *Aedes aegypti* Setelah Pemberian Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan Berbagai Konsentrasi Setelah 1440 Menit

Berdasarkan gambar 4.2. menunjukkan bahwa dari keempat kelompok konsentrasi penelitian ini, 1% merupakan konsentrasi dengan rata-rata presentasi kematian larva yaitu 18,25%. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi dan semakin tinggi lama pajanan waktu maka semakin tinggi juga kematian larva.

B. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data *Statistic Product and Service Solution (SPSS)* dan *Minitab*. Analisis yang pertama dilakukan adalah apakah hasil data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak.

1. Uji Distribusi Data

Sebelum dilakukan uji *One way Anova*, maka data yang didapatkan harus memenuhi syarat yaitu data distribusi atau sebaran data normal. Berdasarkan data yang didapat dari hasil uji utama pada tabel 4.2. selanjutnya dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil

uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa distribusi data yang didapatkan adalah berdistribusi normal ($sig > 0,05$).

Tabel 4.4 Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Konsentrasi	.155	20	.200*	.896	20	.035
Kematian larva	.130	20	.200*	.906	20	.054

Sumber: Data Primer 2019

2. One Way Anova

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan/pengaruh ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) sebagai larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*. Hasil analisis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji One Way Anova Kematian Larva *Aedes aegypti* setelah Pemberian Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dengan Berbagai Konsentrasi

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	651.000	4	162.750	8.455	.001
Within Groups	288.750	15	19.250		
Total	939.750	19			

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.5 nilai sig. (signifikan) dari hasil jumlah kematian larva *Aedes aegypti* setelah pemberian ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) yaitu $p\text{-value} = 0,001$ ($p < 0,005$), maka H_a diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan/perbedaan yang signifikan.

3. Analisis Probit

a. Lethal Concentration

Lethal Concentration 50 (LC₅₀) merupakan konsentrasi dari ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang mematikan 50% sedangkan *Lethal Concentration 90 (LC₉₀)* merupakan konsentrasi ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) yang mematikan 90% dari jumlah sampel penelitian. Hasil analisis probit untuk LC_{50} dan LC_{90} dapat dilihat Tabel 4 berikut:


Tabel 4.6 Hasil Analisis Probit LC₅₀ dan LC₉₀ daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*

Lethal Concentration	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
LC ₅₀	0.0063133	0.0057632	0.0069051
LC ₉₀	0.0120227	0.0109484	0.0134953

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa estimasi nilai LC₅₀ ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) diperoleh pada 0.0063133%, sedangkan estimasi nilai LC₉₀ ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) diperoleh pada konsentrasi 0.0120227%.

Gambar 4.2 Grafik LC₅₀ dan LC₉₀



Sumber: Data Primer 2019

b. Lethal Time

Lethal Time 50 (LT₅₀) merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% dari jumlah larva yang di uji pada konsentrasi tertentu, sedangkan nilai LT₉₀ merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 90% dari jumlah larva yang di uji pada konsentrasi tertentu. Nilai analisis probit untuk LT₅₀ dan LT₉₀ dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:


Tabel 4.7 Hasil Analisis Probit LT_{50} dan LT_{90} daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*

Konsentrasi	LT_{50} dan LT_{90}	Estimate	Lower Bound	Upper Bound
0,25%	LT_{50}	1770.98	1576.83	2045.40
	LT_{90}	2646.32	2320.65	3129.55
0,50%	LT_{50}	1305.26	1181.45	1460.71
	LT_{90}	2116.61	1904.18	2396.58
0,75%	LT_{50}	1309.31	1191.48	1455.71
	LT_{90}	2077.21	1878.04	2338.34
1%	LT_{50}	1322.49	1202.34	1472.40
	LT_{90}	2099.46	1895.86	2367.32

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai LT_{50} yang diperoleh pada ekstrak (*Sida rhombifolia*) pada konsentrasi 0,25% diperoleh 1770.98 menit, sedangkan nilai LT_{90} diperoleh 2646.32 menit. Pada konsentrasi 0,50% nilai LT_{50} diperoleh 1305.26 menit, sedangkan nilai LT_{90} diperoleh 2116.61 menit. Nilai LT_{50} pada konsentrasi 0,50% diperoleh 1309.31 menit dan LT_{90} diperoleh 2077.21 menit. Pada konsentrasi 1% nilai LT_{50} diperoleh dengan nilai 1322.49 menit sedangkan pada LT_{90} diperoleh 2099.46 menit.


Gambar 4.3 Grafik LT₅₀ dan LT₉₀ Pada Konsentrasi 0,25%



Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan gambar 4.3 diperoleh nilai LT₅₀ ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia L*) atau waktu yang digunakan untuk membunuh larva 50% dari total kematian larva uji adalah 1771 menit sedangkan untuk LT₉₀ atau waktu yang digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2626 menit. Persamaan yang diperoleh dari regresi linier pada konsentrasi 0,25% adalah mortalitas = $-0.295 + 0.005136$ menit, kematian larva (mortalitas) yang terjadi per menit adalah 0.005136 larva dan setiap kematian larva (mortalitas) yang terjadi pada 100 menit adalah 0.5136 larva.


Gambar 4.4 Grafik LT_{50} dan LT_{90} Pada Konsentrasi 0,50%



Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh nilai LT_{50} ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia L*) atau waktu yang digunakan untuk membunuh larva 50% dari total kematian larva uji adalah 1306 menit sedangkan untuk LT_{90} atau waktu yang digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2117 menit. Persamaan yang diperoleh dari regresi linier pada konsentrasi 0,25% adalah mortalitas = $-0.155 + 0.009586$ menit, kematian larva (mortalitas) yang terjadi per menit adalah 0.009586 larva dan setiap kematian larva (mortalitas) yang terjadi pada 100 menit adalah 0.9586 larva atau dibulatkan menjadi 1 larva.


Gambar 4.5 Grafik LT₅₀ dan LT₉₀ Pada Konsentrasi 0,75%



Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan gambar 4.5 diperoleh nilai LT₅₀ ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia L*) atau waktu yang digunakan untuk membunuh larva 50% dari total kematian larva uji adalah 1309 menit sedangkan untuk LT₉₀ atau waktu yang digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2077 menit. Persamaan yang diperoleh dari regresi linier pada konsentrasi 0,25% adalah mortalitas = $-0.284 + 0.009546$ menit, kematian larva (mortalitas) yang terjadi per menit adalah 0.009546 larva dan setiap kematian larva (mortalitas) yang terjadi pada 100 menit adalah 0.9546 larva atau dibulatkan menjadi 1 larva.

Gambar 4.6 Grafik LT₅₀ dan LT₉₀ Pada Konsentrasi 1%



Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan gambar 4.6 diperoleh nilai LT₅₀ ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia* L) atau waktu yang digunakan untuk membunuh larva 50% dari total kematian larva uji adalah 1322 menit sedangkan untuk LT₉₀ atau waktu yang digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2099 menit. Persamaan yang diperoleh dari regresi linier pada konsentrasi 0,25% adalah mortalitas = $-0.266 + 0.009377$ menit, kematian larva (mortalitas) yang terjadi per menit adalah 0.009377 larva dan setiap kematian larva (mortalitas) yang terjadi pada 100 menit adalah 0.9377 larva atau dibulatkan menjadi 1 larva.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) sebagai larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*. Khasiat daun sidaguri salah satunya sebagai obat asam urat. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daunnya dimana kandungan kimia pada daun *alkaloid*, *kalsium oksalat*, *tannin*, *saponin*, *fenol*, *asam amino* dan *minyak atsiri*.

Kandungan *Alkaloid* pada Daun Sidaguri berfungsi untuk mengganggu sistem saraf larva, yang sebelumnya larva bergerak aktif tapi setelah pemberian

Ekstrak Daun Siaguri (*Sida rhombifolia*) larva menjadi lamba dan kemudian menyebabkan kematian. Hal ini sesuai dengan penelitian Purnamasari (2017), alkaloid menyebabkan gangguan kerja sistem saraf larva.

Kandungan *tanin* Daun Sidaguri yang memiliki rasa pahit, sehingga menyebabkan larva *Aedes aegypti* tidak mau makan dan pada akhirnya mati. Menurut Susanti (2017) *tanin* dapat mengganggu serangga dalam mencerna makanan, memiliki rasa pahit yang dapat menyebabkan mekanisme penghambat makanan. Selain *tanin*, *saponin* juga memiliki rasa pahit. Dalam penelitian ini, ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dikontakkan secara langsung ke larva, akibat kandungan saponin tersebut larva mengalami rusak pada bagian kulit. Menurut Mutiarasari (2017), apabila saponin kontak dengan permukaan kulit nyamuk akan merusak mukosa kulit dan terabsorpsi akan menjadi hemolisis darah sehingga enzim pernafasan akan terhambat dan mengakibatkan kematian.

Flavonoid merupakan salah satu jenis golongan fenol dan banyak ditemukan didalam tumbuh-tumbuhan. Secara biologis flavonoid mempunyai rasa pahit sehingga dapat bersifat menolak serangga. Bila senyawa flavonoid masuk kemulut serangga dapat mengakibatkan kelemahan pada saraf dan kerusakan pada spirakel sehingga serangga tidak bias bernafas dan akhirnya mati. Selain itu, kelompok flavonoid yang berupa isoflan juga memiliki efek pada reproduksi serangga, yakni menghambat proses pertumbuhan serangga (Harborne, 1987 dalam Eka S dan Eka N, 2014).

Minyak Atsiri adalah komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan petik bunga. Minyak atsiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai pewangi dan juga produk farmasi seperti minyak angin dan obat (Ajizah, 2004 dalam Rahmawati, 2012). Minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan larva dengan

mengganggu proses terbentuknya dinding sel, membrane atau dinding sel, membrane atau dinding sel tidak terbentuk atau tidak terbentuk dengan sempurna.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia*) dimana waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA. Setelah pengambilan daun, selanjutnya daun dipisahkan dengan batangnya dan dicuci agar debu yang ada di daun hilang. Setelah itu daun dikeringkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung. Pengeringan dilakukan agar reaksi enzimatik tidak berjalan dan mencegah pertumbuhan mikroba pada simplisia daun sidaguri. Setelah daun dikeringkan kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Sampel yang telah dikeringkan kemudian dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96%.

Pada penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Dimana maserasi dilakukan dengan memasukkan simplisia atau daun sidaguri yang telah dikeringkan ke dalam wadah kaca dan memasukkan larutan etanol 96% sampai simplisia tersebut terendam. Larutnya kandungan kimia simplisia saat proses maserasi, umumnya akan terjadi apabila pelarut menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel daun. Di dalam rongga sel inilah terdapat banyak kandungan senyawa aktif yang dapat larut di dalam pelarut, dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan senyawa aktif di dalam sel dengan di luar sel menyebabkan larutan dengan konsentrasi tinggi didesak keluar ke konsentrasi rendah. Apabila telah terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan diluar sel, maka proses ekstraksi akan berhenti. Oleh karena itu, proses maserasi harus disertai pengadukan agar terjadi perputaran pelarut sehingga konsentrasinya dan proses ekstraksinya akan terjadi secara optimal.

Proses maserasi dilakukan menggunakan wadah yang terbuat dari kaca untuk menghindari terjadinya reaksi kimia antara pelarut maupun senyawa kimia

yang tersaring dengan wadahnya, karena sifat kaca yang lebih stabil (tidak mudah bereaksi) dibandingkan dengan plastik maupun logam. Selama masa maserasi, wadah selalu dalam keadaan tertutup untuk menghindari kemungkinan terjadinya proses oksidasi oleh udara luar, dan juga dilakukan di dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh sinar matahari terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Hasil dari proses maserasi tersebut kemudian disaring dan dilakukan pemekatan.

Setelah hasil dari proses maserasi di saring hasil dari saringan tersebut merupakan ekstrak cair dari Daun Sidaguri. Selanjutnya dilakukan proses *Rotary Evaporator*, yaitu proses pemisahan antara kandungan ekstrak Daun Sidaguri dengan larutan *etanol 96%*. Hasil dari *Rotary Evaporator* akan menjadi ekstrak padat yang akan dilakukan pengenceran kembali menggunakan *aquadest*.

Sampel pada penelitian ini menggunakan 4 kelompok konsentrasi daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) dimana konsentrasi yang digunakan yaitu, 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% dan 1 kelompok untuk kontrol. Sampel pada penelitian adalah larva *Aedes aegypti* sebanyak 500 larva yang dibagi ke dalam 4 konsentrasi dan 1 kontrol yang masing-masing berisi 25 larva serta dilakukan 4 kali pengulangan. Pada saat penelitian berlangsung dilakukan pengukuran suhu dan kelembaban dengan menggunakan *thermometer* dan *hygrometer*. Suhu optimum bagi perkembangan larva yaitu 25°-35°C, suhu ini sesuai perkembangan larva di alam terbuka (Ridha 2013, dalam Tri dan Widya, 2017). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata suhu saat pelaksanaan penelitian adalah 30,0°C, suhu ini masih dalam batas normal untuk perkembangbiakan larva sedangkan kelembaban optimum dalam proses perkembangbiakan larva nyamuk berkisar antara 60%-80% dan batas rendah kelembaban yang memungkinkan kehidupan nyamuk adalah kelembaban 60% (Azhari, 2014). Hasil rata-rata kelembaban pada

penelitian ini adalah 60%. Pelarut yang digunakan dalam pembuatan ekstrak adalah etanol 96% , etanol digunakan karena lebih selektif, netral dan kapang sulit bertumbuh dalam etanol 20% keatas (Artanti dkk, 2006).

Pengulangan kedua pada tabel 4.2 menunjukkan kematian larva *Aedes aegypti* pada konsentrasi 0,50% lebih tinggi dibanding konsentrasi 0,75% dan 1%, karena pada pengulangan tersebut kelembaban ruangan sebesar 59% dimana kelembaban optimum untuk perkembangbiakan larva *Aedes aegypti* yaitu 60%.

Penelitian ini menggunakan kontrol yang berupa *aquades*, yang berfungsi untuk membandingkan kematian larva pada kelompok pemerian Ekstrak Daun Sidaguri dengan berbagai konsentrasi (*Sida rhombifolia*). Setiap kontrol berisikan 25 larva, mulai pengulangan pertama sampai pengulangan keempat. Pada tabel 4.2 dapat diketahui tidak adanya larva yang mati disetiap pengulangan, yang berarti tidak ada pengaruh kontrol (*aquades*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*. Setiap kontrol dilakukan pengukuran Ph air, pada pengulangan I pH 7,57%, pengulangan kedua pH 7,80%, pengulangan ketiga dengan pH 7,64%, dan pengulangan keempat dengan pH 7,57%.

Konsentrasi 0,25% berisikan 25 larva *Aedes aegypti* pada setiap pengulangan. pengulangan pertama jumlah larva yang mati 9 larva (1%) dengan pH 4,58% . Pengulangan kedua jumlah larva yang mati 4 larva (1,13%) dengan pH 5,50%. Pengulangan ketiga jumlah larva yang mati 2 larva (0,22%) dengan pH 6,12% dan pengulangan keempat 10 larva (1,11%) dengan larva 8,17%.

Konsentrasi 0,50% berisikan 25 larva *Aedes aegypti* pada setiap pengulangan. Pengulangan pertama jumlah larva yang mati 12 larva (1,33%) dengan pH 4,82%. Pengulangan kedua dengan jumlah larva yang mati 9 larva (0,48%) dengan pH 4,90%. Pengulangan ketiga dengan jumlah larva yang mati 16

larva (1,77%) dengan pH 5,52%. Pengulangan keempat dengan jumlah larva yang mati 1,33 larva (1,33) dengan pH 6,15%

Konsentrasi 0,75% berisikan 25 larva *Aedes aegypti* pada setiap pengulangan. Pengulangan pertama jumlah larva yang mati 17 larva (1,8) dengan pH 4,83%. Pengulangan kedua jumlah larva yang mati 16 larva (1,77%) dengan pH 4,84%. Pengulangan ketiga jumlah larva yang mati 9 larva (1%) dengan pH 4,90% dan pada pengulangan keempat larva yang mati 17 larva (1,88), dengan pH 7,03 %.

Konsentrasi 1% berisikan 25 larva *Aedes aegypti* pada setiap pengulangan. Pengulangan pertama jumlah larva yang mati 19 larva (2,11%) dengan pH 5,04%. Pengulangan kedua jumlah larva yang mati 25 larva (2,77%) dengan pH 5,53%. Pengulangan ketiga jumlah larva yang mati 13 larva (1,44%) dengan pH 5,71% dan pengulangan keempat jumlah larva yang mati 18 larva (2%) dengan pH 5,72%. Pada konsentrasi 1% kematian larva *Aedes aegypti* dimulai pada menit ke-60 terus meningkat hingga pada menit ke-1440 yakni 18,25% larva uji. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama pajanan waktu, maka semakin tinggi juga kematian larva uji dimana sesuai dengan teori peneliti sebelumnya bahwa khasiat insektisida untuk membunuh serangga tergantung pada bentuk, cara masuk ke dalam tubuh serangga, macam bahan kimia, konsentrasi dan jumlah (dosis) insektisida (Hoedjoe dan Zulhasril ,2004 dalam Amalia, 2016).

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun sidaguri (*Sida rhombifolia*) mempunyai efek larvasida terhadap larva *Aedes aegypti*, pada konsentrasi 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% terdapat kematian larva . Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka jumlah kematian larva semakin tinggi pula. Kejadian ini disebabkan karena senyawa toksin masuk ke dalam tubuh larva dan

merusak sistem saraf tubuh larva. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Arnis Nurhidayah Jamal, dkk (2016) yang berjudul “Efektivitas Larvasida Ekstrak Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*) Terhadap Larva *Aedes* sp. Instar III” dimana hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara peningkatan konsentrasi ekstrak kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*) dengan jumlah kematian larva *Aedes* sp. Peningkatan konsentrasi ekstrak kulit pisang (*Musa paradisiaca* var. *Raja*) menyebabkan peningkatan persentasi kematian larva *Aedes* sp.

Berdasarkan analisis data dari uji *one way anova* dalam penelitian ini diperoleh $p\text{-value} = 0,001$ ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan atau dapat dinyatakan bahwa ekstrak daun sidaguri efektif sebagai larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti*.

Untuk mengetahui LT_{50} dan LT_{90} pada setiap konsentrasi, maka digunakan uji probit dengan menggunakan aplikasi *Minitab*. Nilai LT_{50} ekstrak daun sidaguri pada konsentrasi 0,25% pada menit 1770.98 menit sedangkan LT_{90} pada menit 2646.32. Untuk konsentrasi 0,50% nilai LT_{50} pada menit 1305.26, dan nilai LT_{90} pada menit 2116.61. Konsentrasi 0,75% nilai LT_{50} pada menit 1309.31, sedangkan LT_{90} pada menit 2077.21. Nilai LT_{50} pada konsentrasi 1% pada menit 1322.49 menit, sedangkan nilai LT_{90} pada menit 2099.46 menit.

Toksisitas Ekstrak Daun Sidaguri terhadap larva *Aedes aegypti* yaitu dengan menggunakan nilai LC (*Lethal Concentration*). Nilai LC yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah LC_{50} adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian larva 50% dan LC_{90} yang menyebabkan kematian larva 90%. Estimasi nilai *Lethal Concentration* (LC) dianalisis setelah pengamatan selama 24jam. Berdasarkan hasil uji analisis probit dalam penelitian ini, diperoleh nilai LC_{50}

diperoleh 0.0063133% yang menyebabkan larva mati 50% dan LC_{90} diperoleh 0.0120227% yang menyebabkan larva mati 90%.

Hasil penelitian ekstrak daun sidaguri ini mengubah syarat fisik air yang seharusnya jernih menjadi kehijauan. Nyamuk *Aedes aegypti* tidak hanya mampu hidup pada perindukan air jernih saja, tapi dapat bertahan hidup dan tumbuh normal pada habitat sub optimal seperti air selokan yang tergenang (Rina, 2017).

Pada penelitian Ayu Selvyana (2017) yang berjudul “Perkembangan dan Ketahanan Hidup Larva *Aedes aegypti* Pada Beberapa Air Limbah” dimana hasil penelitian menunjukkan dari keempat media limbah yang digunakan untuk menguji ketahanan hidup larva *Aedes aegypti* media air comberan dan air cucian singkong tidak ditemukan adanya kematian larva uji sedangkan ketahanan hidup larva terendah yaitu larva yang dipelihara pada limbah air sabun dengan jumlah rata-rata kematian sebesar 97%.

Sejumlah strategi telah digunakan untuk mengendalikan semua penyakit yang ditularkan melalui vektor ini, diantaranya pengendalian vektor dengan alat pencengahan paling ampuh yang potensinya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk dapat mengontrol vektor, WHO mempromosikan manajemen vektor terintegrasi sebagai pendekatan terbaik. Sebenarnya vektor kontrol dapat berperan dengan meminimalkan tingkat keparahan penyakit yang ditularkan oleh vektor asalkan seluruh potensinya sepenuhnya dimanfaatkan. Studi tentang larvasida nyamuk adalah upaya serius kearah ini karena memberikan solusi yang aman, ramah lingkungan, tidak menyebabkan iritasi dan murah (Varun Tyagi dkk, 2017).

Sesungguhnya Allah swt telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, artinya setiap makhluk hidup memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dan binatang merupakan ciptaan Allah swt yang tak

sesederhana yang kita pikirkan. Dalam pertumbuhannya sebuah tumbuhan atau binatang mengalami proses-proses yang amat sangat rumit, yang tidak mudah kita nalar secara sederhana. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan alam semesta diliputi oleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua “diciptakan”, bahwa mereka menunjukkan kekuasaan, ilmu, dan seni dari “Pencipta” mereka. Manusia bertanggung jawab mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal budinya, untuk memuliakan Allah swt. Walaupun semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, beberapa tanda dirujuk Allah swt secara khusus dalam Al-Qur’an.

Nyamuk adalah salah satunya. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 26 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang biasa dan tidak penting. Namun, ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah swt. Inilah sebabnya “Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya perubahan warna air sehingga tidak memenuhi syarat fisik air bersih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan Ekstrak Daun Sidaguri untuk mematikan larva *Aedes aegypti* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengaruh kontrol (*Aquadest*) terhadap kematian larva *Aedes aegypti*.
2. Konsentrasi 0,25% Ekstrak Daun Sidaguri dapat mematikan larva *Aedes aegypti* sebanyak 25 (6,25%) selama 1440 menit.
3. Konsentrasi 0,50% Ekstrak Daun Sidaguri dapat mematikan larva *Aedes aegypti* sebanyak 49 (12,25%) selama 1440 menit.
4. Konsentrasi 0,75% Ekstrak Daun Sidaguri dapat mematikan *Aedes aegypti* sebanyak 61 (15,25%) selama 1440 menit.
5. Konsentrasi 1% Ekstrak Daun Sidaguri dapat mematikan *Aedes aegypti* sebanyak 73 (18,25%) selama 1440 menit.
6. Rata-rata kematian larva *Aedes aegypti* terendah pada konsentrasi 0,25% yaitu sebanyak 25 larva (6,25%), dan kematian tertinggi pada konsentrasi 1% sebanyak 73 larva (18,25).
7. Konsentrasi Ekstrak Daun Sidaguri yang dapat mematikan 50% nyamuk uji (LC_{50}) yaitu pada konsentrasi 0.0063133%, sedangkan yang dapat mematikan 90% nyamuk uji (LC_{90}) pada konsentrasi 0.0120227%.
8. Adanya hubungan lama pajanan dengan kematian larva *Aedes aegypti*. Semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama pajanan waktu, maka semakin tinggi juga kematian larva uji.

9. Nilai LT_{50} pada konsentrasi 0,25% pada menit 1770.98 menit sedangkan LT_{90} pada menit 2646.32. Untuk konsentrasi 0,50% nilai LT_{50} pada menit 1305.26, dan nilai LT_{90} pada menit 2116.61. Konsentrasi 0,75% nilai LT_{50} pada menit 1309.31, sedangkan LT_{90} pada menit 2077.21. Nilai LT_{50} pada konsentrasi 1% pada menit 1160.15, sedangkan nilai LT_{90} pada menit 1981.24.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar Ekstrak Daun Sidaguri dapat di aplikatifkan dengan memenuhi syarat fisik air bersih.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memenuhi kandungan Daun Ekstrak Daun Sidaguri yang paling berperan besar sebagai larvasida.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan formulasi Ekstrak Daun Sidaguri yang lebih aplikatif sehingga penggunaannya lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2011. *Dasar-dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Alpiansyah, A. 2015. *Antihyperuricemia Potential of Sida rhombifolia L. as a Treatment for Gout*. Journal Majority. Vol. 4 (3): 9-13
- Amalia R., 2016. *Daya Bunuh Air Perasan Daun Mengkudu (Morinda Citrifolia) Terhadap Kematian Larva Aedes aegypti*. Universitas Negeri Semarang
- Anggraini T S. & Widya H C. (2017). *Perkembangan Aedes aegypti Pada Berbagai Ph Air Dan Salinitas Air*. Semarang. *Higeia* 1 (3) : 1-10
- Anonim. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.
- Artanti, N. M., Hanafi, M. Y. 2006. Isolation and identification of active antioxidant compound from start fruit mistletoe Dendrophthoe pentandra (Ethanol extract). *Journal of applied sciences*. 6(8)
- Rahmawati A., 2012. *Minyak Atsiri Surian (Toona Sinensis Roemor) Sebagai Biolarvasida Nyamuk Demam Berdarah (Aedes aegypti Linn)*. Institut Pertanian Bogor.
- Azhari, M. (2014). *Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Infeksi Virus Dengue*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Palgunadi B U., Rahayu A., 2011. *Aedes aegypti sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue*. Artikel. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Boekoesoe, Litjen. 2013. *Kajian Faktor Lingkungan terhadap Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Studi Kasus di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo*. Laporan Akhir Hibah Disertai Doktor. Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo.
- Dalimartha, S. 2003. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*. Jilid 3. Jakarta. Puspa Swara. WHO. 2012. *Handbook for integrated vektor management*. WHO : Departemen of Control of Neglected Tropical Diseases.
- Rina D., 2017. *Ketahanan Hidup dan Fekunditas Larva Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae) pada Habitat Suboptimal*. *Journal of Sainstek* 9(2) : 158-167

- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2007),h. 315
- Departemen Kesehatan RI, 2004. *Buletin Harian Perilaku Dan Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegypti Sangat Penting Diketahui Dalam Melakukan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Termasuk Pemantauan Jenrik Berkalah*. Ditjen p2m & PL. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2004. *Perilaku Hidup Nyamuk Aedes aegypti Sangat Penting Diketahui Dalam Melakukan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Termasuk Pemantauan Jentik Berkala*. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2005. *Materia Medika Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2017. *Profil Kesehatan 2016*.
- Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan Kemenkes R.I. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ginanjari G., 2007. *Demam Berdarah*. Yogyakarta: B-first.
- Wulandari E., 2015. *Aktivitas Antioksidan Dan Kualitas Gummy Candy Ekstrak Akar Alang Alang (Imperata cylindrica) Dengan Variasi Penambahan Gelatin Dan Agar-Agar Serta Pewarna Alami*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Srikandi F., 1992. *Polusi Air Dan Udara*. Penerbit KANSIUS. Yogyakarta.
- Hendratno, S. 2003. *Panduan Kuliah Mahasiswa Entomologi*. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro: 39.
- Hidayati, D.P., Sediarto., dan Dwitiyanti., 2013. Uji Efektivitas Fraksi Etanol 70% Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia* L.) Terhadap Kadar Asam Urat Serum Pada Mencit yang Diinduksi Kalium Oksonat. *Jurnal Farmasi dan Sains*.
- ITIS (Integrated Taxonomic information System). 2005. *Commercially Processed dry Ginger (Zingiber officinale): Composition and Effects on LPS-stimulated PGE₂ Production*. *Phytochemistry*. Vo. 66 (13): 1614-163
- Kementerian Kesehatan RI, 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 374/Menkes/Per/Ia/II/2010 Tentang Pengendalian Vektor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI, 2014. *Profil Kesehatan Indonesia 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Modul Pengendalian Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Pedoman penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian vektor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Profil pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan tahun 2013*. Jakarta(ID): Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta.
- Kinho J, Arini Dwi DI, Tabba S, Kama H, Kafiari Y, dkk, 2011. *Tumbuhan obat tradisional di Sulawesi Utara. Jilid I*. Jakarta: Badan penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan; p.83-6.
- Konate, K., Mavoungou, J.F., Ouedraogo, M., Lepengue, A.N., Souza, A., Barro. N., and M'Batchi, B., 2012. Preliminary Toxicity Study, Anti-Nociceptive and Anti-Inflammatory Properties of Extracts from *Sida hombifolia* L. (Malvaceae). *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, **3** (09); 3136-3145.
- Lumowa. 2013. *Pengaruh Mat Serbuk Bunga Sukun (Artocarpus altilis) sebagai Isi Ulang Anti Nyamuk Elektrik terhadap Kematian Nyamuk Aedes aegypti*. Samarinda: Universitas Mulawarman. Artikel FKIP UNS.
- Malar, Manorentitha. 2006. *The Ecology and Biology of Aedes aegypti (L) and aedes albopictus (skues) Diptera : Culcidae and the Resistrence status of aedes albopictus (field strain) against organopshates in penang, Malaysia*. (tesis). Malaysia.
- Utomo M, Wardani R S., S. A. (2010). *The Influence Of Water Amount Added To Sukun Flower Dust (Artocarpus Communis) As The Substitution Of Electric Mosquito Medicine Refill Againts The Effective Long Time Of Mosquito Anopheles Aconitus Extinguish Skill*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Univers, 6(1), 15–23.
- Mousson L, Dauga C, Garrigues T, Schaffner F, Vazeille M, Failloux AB. 2005. *Phylogeography of Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) and Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) based on mitochondrial DNA variations*. *Genetical Research* 86(1): 1-11. doi: 10.1017/S0016672305007627.
- Musyarifatun F., Nurjauzuli., Onny S., 2014. *Analisis Spasial Lingkungan dan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Demak*. Jawa Tengah : Magister Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro.

- Mutiarasari, D., & Tiku, L. L. B. T. K. (2017). Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pandan (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) Sebagai Larvasida Alami Terhadap Larva *Aedes aegypti*. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 3(2) : 31-39.
- Nirma, dkk, 2017. *Efektivitas Larvasida Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Dalam Membunuh Jentik Nyamuk Aedes sp (Studi di Daerah Epidemi DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Antang Kecamatan Manggala)*. Makassar : FKIK UIN Alauddin Makassar.
- Nisa, K, O. Firdaus, Ahmadi, Hariani (2015). Uji aktivitas Ekstrak Biji dan Daun mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) sebagai Larvasida *Aedes sp*. *Sel Jurnal Penelitian Kesehatan* 2(2) : 43-48.
- Nurdin, Y. 2003. *Diklat Entomologi Kedokteran Aspek Hospes, Ages, Vector, Dan Lingkungan Pada Infeksi Virus Dengue*. Jember: Laboratorium Parasitologi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jember.
- Jamal S A N., Susilawati A, Azriful. (2016). Efektivitas Larvasida Ekstrak Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) Terhadap Larva *Aedes sp*. Instar III. *Higiene*. 2 (2) : 1-7
- Powell J R, Tabachnick W J. 2013. *History of domestication and spread of Aedes aegypti--a review*. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 108(1):11-17. doi: 10.1590/0074-0276130395.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Purnamasari, R. M., Sudarmaja, I. M., & Swastika, I. K. (2017). Potensi Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) sebagai Larvasida Alami Bagi *Aedes aegypti*. *E-JURNAL MEDIKA*, 6(3), 1-8.
- Rahman, A., Paul, L.C., Solaiman, and Rahman, A.A., 2011, Analgesic and Cytotoxic of *Sida rhombifolia* Linn., *Pharmacology online*, 2; 707-714.
- Santoso, Chamid, Viddi, Pratiwi,. 2018. Daya Bunuh Ekstrak Daun Tomat (*Solanum Lycopersicum* L.) Terhadap Larva Nyamuk *Aedes Aegypti*. *Jurnal Sain Health*. Vol. 2 No. 1.
- Sari E R. Skrining Aktivitas Antimikroba dari Daun Tumbuhan Sidaguri. *J Scienta* 2012; 2(1): 41-4.

- Selvyany A. (2017). *Perkembangan Dan Ketahanan Hidup Larva Aedes Aegypti Pada Beberapa Air Limbah*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Setyowati, E.A. 2013. *Biologi Nyamuk Aedes aegypti Sebagai Vektor Demam Berdarah Dengue*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah, Volume : 1, cet-10, Jakarta : Lentera Hati.
- Simarmata, Y.B.C., Saragih, A., dan Bahri, S. 2012. Efek Hipourikemia Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida rhombifolia L*) Pada Mencit Jantan. *Journal of Pharmacologi*, **1** (1); 21-28.
- Eka S., Eka N., 2014. Uji Aktivitas Perasan Buah Mentimun (*Cucumis Sativus L*) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal Kimia Mulawarman*. 11(2).
- Soedibyo. M., 1998. *Alam Sumber Kesehatan Manfaat dan Kegunaan*. Cetakan I, 22-24, 344-345, Balai Pustaka, Jakarta.
- Steenis, C. G. G. J. Van. 2003. *Flora*. Pradnya Pramitha, Jakarta.
- Cecep D S., 2011. *Vektor Penyakit Tropis*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jumar. 2000. *Entomologi Pertanian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarmo. 2007. *Pestisida*. Yogyakarta: Kanisius
- Supartha, I. Wayan. 2008. *Pengendalian Terpadu Vektor Virus DBD Berdarah Darah Dengue, Aedes egypti (Linn) dan Aedes albopictus (Skuse) (dipteral : Culicidae)*. Dies Natalis Universitas Udayana, 2008.
- Suriani, 2006, *Isolasi, Karakterisasi, dan Uji Bioaktivitas Metabolit Sekunder Spons Callyspongia sp.*, Tesis tidak diterbitkan, jurusan Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Suwandi, D.E., 2014, *Aktivitas Analgetik Ekstrak Etanol Kulit Batang Sidaguri (Sida rhombifolia L.) Pada Mencit Jantan GalurSwiss Webster Dengan Metode Geliat (Siegmund)*. *Jurnal Farmako Bahari*, **2** (2); 64-72.
- Tanumihardja, M., Natsir, N., Mattulata, I.K., and Lukman, M. 2016. *Pharmacological Evaluation of Ethanol Extract of Sida rhombifolia L. roots (Malvaceae)*. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, **8** (1); 770-774.
- Tina Lymbran, dkk, 2018. *Uji Perbandingan Efektivitas Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper Betle Linn) Dengan Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus Amaryllifolius Roxb) Terhadap Kematian Larva Nyamuk Aedes Aegypti*

Tahun 2018. Preventif Journal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo.

Tyagi Varun, Ranjeet Patel, dkk. 2017. *Chemical composition and bioefficacy for larvicidal and pupicidal activity of essential oils against two mosquito species*. International Journal of Mosquito Research 2017; 4(4): 112-118

World Health Organization. 2005. *Guidelines For Laboratory And Field Testing Of Mosquito Larvicides*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. 2014. *Dengue and Severe Dengue from World Health Organization*.

Wulandari, E. 2015. *Aktivitas Antioksidan Dan Kualitas Gummy Candy Ekstrak Akar Alang-Alang (Imperatacylindrica) Dengan Variasi Penambahan Gelatin Dan Agar-Agar Serta Pewarna Alami*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 : Uji Normalitas Data

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Konsentrasi	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%
Kematian larva	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Konsentrasi	Mean	3.00	.324
	95% Confidence Interval for Lower Bound	2.32	
	Mean Upper Bound	3.68	
	5% Trimmed Mean	3.00	
	Median	3.00	
	Variance	2.105	
	Std. Deviation	1.451	
	Minimum	1	
	Maximum	5	
	Range	4	
	Interquartile Range	2	
	Skewness	.000	.512
	Kurtosis	-1.323	.992
Kematian larva	Mean	10.25	1.573
	95% Confidence Interval for Lower Bound	6.96	
	Mean Upper Bound	13.54	
	5% Trimmed Mean	10.28	
	Median	10.50	
	Variance	49.461	
	Std. Deviation	7.033	
	Minimum	0	

Maximum	20	
Range	20	
Interquartile Range	14	
Skewness	-.278	.512
Kurtosis	-1.246	.992

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Konsentrasi	.155	20	.200*	.896	20	.035
Kematian larva	.130	20	.200*	.906	20	.054

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 2 : Uji *One Way Anova*

Descriptives

Kematian larva

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontrol	4	.00	.000	.000	.00	.00	0	0
Konsentrasi 0.25	4	8.00	5.715	2.858	-1.09	17.09	2	15
Konsentrasi 0.5	4	14.25	4.031	2.016	7.84	20.66	10	19
Konsentrasi 0.75	4	14.00	4.761	2.380	6.42	21.58	9	19
Konsentrasi 1	4	15.00	4.967	2.483	7.10	22.90	9	20
Total	20	10.25	7.033	1.573	6.96	13.54	0	20

ANOVA

Kematian larva

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	651.000	4	162.750	8.455	.001
Within Groups	288.750	15	19.250		
Total	939.750	19			

Multiple Comparisons

Kematian larva

LSD

(I) Konsentrasi	(J) Konsentrasi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Kontrol	Konsentrasi 0.25	-8.000*	3.102	.021	-14.61	-1.39
	Konsentrasi 0.5	-14.250*	3.102	.000	-20.86	-7.64
	Konsentrasi 0.75	-14.000*	3.102	.000	-20.61	-7.39
	Konsentrasi 1	-15.000*	3.102	.000	-21.61	-8.39
Konsentrasi 0.25	Kontrol	8.000*	3.102	.021	1.39	14.61
	Konsentrasi 0.5	-6.250	3.102	.062	-12.86	.36
	Konsentrasi 0.75	-6.000	3.102	.072	-12.61	.61
	Konsentrasi 1	-7.000*	3.102	.039	-13.61	-.39
Konsentrasi 0.5	Kontrol	14.250*	3.102	.000	7.64	20.86

	Konsentrasi 0.25	6.250	3.102	.062	-.36	12.86
	Konsentrasi 0.75	.250	3.102	.937	-6.36	6.86
	Konsentrasi 1	-.750	3.102	.812	-7.36	5.86
Konsentrasi 0.75	Kontrol	14.000*	3.102	.000	7.39	20.61
	Konsentrasi 0.25	6.000	3.102	.072	-.61	12.61
	Konsentrasi 0.5	-.250	3.102	.937	-6.86	6.36
	Konsentrasi 1	-1.000	3.102	.752	-7.61	5.61
Konsentrasi 1	Kontrol	15.000*	3.102	.000	8.39	21.61
	Konsentrasi 0.25	7.000*	3.102	.039	.39	13.61
	Konsentrasi 0.5	.750	3.102	.812	-5.86	7.36
	Konsentrasi 0.75	1.000	3.102	.752	-5.61	7.61

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 3 : Analisis Probit *Lethal Concentration*

Probit Analysis: mortalitas, n versus Konsentrasi

Distribution: Normal

Response Information

Variable	Value	Count
mortalitas	Event	208
	Non-event	292
n	Total	500

Estimation Method: Maximum Likelihood

Regression Table

Variable	Coef	Standard Error	Z	P
Constant	-1.41709	0.128906	-10.99	0.000
Konsentrasi	224.463	19.9292	11.26	0.000
Natural Response	0			

Log-Likelihood = -263.310

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	17.7741	3	0.000
Deviance	25.1613	3	0.000

Tolerance Distribution


Parameter Estimates

Parameter	Estimate	Standard Error	95.0% Normal CI	
			Lower	Upper
Mean	0.0063133	0.0002867	0.0057514	0.0068751
StDev	0.0044551	0.0003955	0.0037435	0.0053019

Table of Percentiles

Percent	Percentile	Standard Error	95.0% Fiducial CI	
			Lower	Upper
1	-0.0040508	0.0009053	-0.0061808	-0.0025264
2	-0.0028364	0.0008035	-0.0047222	-0.0014802
3	-0.0020658	0.0007398	-0.0037986	-0.0008146
4	-0.0014862	0.0006924	-0.0031049	-0.0003128
5	-0.0010147	0.0006544	-0.0025416	0.0000963
6	-0.0006134	0.0006224	-0.0020629	0.0004453
7	-0.0002615	0.0005947	-0.0016438	0.0007519
8	0.0000535	0.0005701	-0.0012692	0.0010271
9	0.0003401	0.0005481	-0.0009290	0.0012779
10	0.0006038	0.0005282	-0.0006165	0.0015093
20	0.0025638	0.0003918	0.0016819	0.0032532

30	0.0039770	0.0003171	0.0032916	0.0045583
40	0.0051846	0.0002834	0.0046059	0.0057345
50	0.0063133	0.0002867	0.0057632	0.0069051
60	0.0074419	0.0003227	0.0068534	0.0081428
70	0.0086495	0.0003871	0.0079672	0.0095195
80	0.0100627	0.0004822	0.0092311	0.0111704
90	0.0120227	0.0006319	0.0109484	0.0134953
91	0.0122864	0.0006530	0.0111777	0.0138100
92	0.0125730	0.0006761	0.0114264	0.0141522
93	0.0128880	0.0007016	0.0116996	0.0145289
94	0.0132399	0.0007304	0.0120042	0.0149500
95	0.0136412	0.0007634	0.0123512	0.0154307
96	0.0141127	0.0008025	0.0127582	0.0159961
97	0.0146923	0.0008509	0.0132580	0.0166918
98	0.0154629	0.0009157	0.0139212	0.0176177
99	0.0166773	0.0010189	0.0149648	0.0190789



Lampiran 4 : Uji Probit *Lethal Time*

1. LT₅₀ dan LT₉₀ konsentrasi 0,25%

Probability Plot for Mortalitas

Probit Analysis: Mortalitas, n versus Menit

Distribution: Normal

Response Information

Variable	Value	Count
Mortalitas	Event	39
	Non-event	861
n	Total	900

Estimation Method: Maximum Likelihood

Regression Table

Variable	Coef	Standard Error	Z	P
Constant	-2.59280	0.162699	-15.94	0.000
Menit	0.0014641	0.0001536	9.53	0.000
Natural Response	0			

Log-Likelihood = -104.781

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	13.1913	7	0.068
Deviance	13.7693	7	0.055

Tolerance Distribution


Parameter Estimates

Parameter	Estimate	Standard Error	95.0% Normal CI	
			Lower	Upper
Mean	1770.98	115.252	1545.09	1996.87
StDev	683.036	71.6510	556.099	838.949

Table of Percentiles

Percent	Percentile	Standard Error	95.0% Fiducial CI	
			Lower	Upper
1	181.997	96.2460	-43.0728	347.080
2	368.192	82.8259	179.114	513.720
3	486.327	75.7035	317.249	622.283
4	575.195	71.3027	419.197	705.916
5	647.482	68.4545	500.612	775.457
6	709.010	66.6169	568.691	835.865

7	762.958	65.4885	627.378	889.836
8	811.262	64.8815	679.083	939.004
9	855.193	64.6702	725.394	984.431
10	895.631	64.7656	767.417	1026.85
20	1196.12	73.5774	1062.79	1358.98
30	1412.79	86.7509	1261.69	1612.56
40	1597.93	100.742	1426.07	1834.80
50	1770.98	115.252	1576.83	2045.40
60	1944.02	130.676	1725.76	2257.84
70	2129.16	147.865	1883.74	2486.49
80	2345.83	168.598	2067.39	2755.31
90	2646.32	198.078	2320.65	3129.55
91	2686.76	202.093	2354.64	3180.00
92	2730.69	206.464	2391.55	3234.84
93	2779.00	211.282	2432.10	3295.15
94	2832.94	216.677	2477.37	3362.54
95	2894.47	222.845	2528.97	3439.43
96	2966.76	230.112	2589.55	3529.81
97	3055.63	239.073	2663.97	3640.97
98	3173.76	251.026	2762.82	3788.82
99	3359.96	269.946	2918.47	4022.00



2. LT_{50} dan LT_{90} konsentrasi 0,50%**Probability Plot for Mortalitas****Probit Analysis: Mortalitas, n versus Menit**

Distribution: Normal

Response Information

Variable	Value	Count
Mortalitas	Event	87
	Non-event	813
n	Total	900

Estimation Method: Maximum Likelihood

Regression Table

Variable	Coef	Standard Error	Z	P
Constant	-2.06170	0.0997523	-20.67	0.000
Menit	0.0015795	0.0001186	13.32	0.000
Natural Response	0			

Log-Likelihood = -186.372

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	10.6663	7	0.154
Deviance	16.3528	7	0.022

Tolerance Distribution


Parameter Estimates

Parameter	Estimate	Standard Error	95.0% Normal CI	
			Lower	Upper
Mean	1305.26	70.0108	1168.04	1442.48
StDev	633.099	47.5271	546.476	733.452

Table of Percentiles

Percent	Percentile	Standard Error	95.0% Fiducial CI	
			Lower	Upper
1	-167.545	72.5379	-329.032	-39.6092
2	5.03668	62.8882	-133.206	117.367
3	114.535	57.4444	-10.3131	218.315
4	196.905	53.8159	81.2017	295.188
5	263.908	51.2266	154.916	358.444
6	320.937	49.3207	217.059	412.884
7	370.941	47.9026	271.037	461.126
8	415.714	46.8522	318.925	504.764

9	456.432	46.0893	362.089	544.840
10	493.914	45.5574	401.477	582.074
20	772.434	47.0028	683.234	869.682
30	973.266	53.3690	875.643	1087.83
40	1144.87	61.2734	1035.10	1279.17
50	1305.26	70.0108	1181.45	1460.71
60	1465.66	79.6150	1326.08	1643.96
70	1637.26	90.5378	1479.53	1841.31
80	1838.09	103.893	1657.99	2073.41
90	2116.61	123.074	1904.18	2396.58
91	2154.09	125.697	1937.23	2440.16
92	2194.81	128.556	1973.11	2487.51
93	2239.58	131.710	2012.55	2539.60
94	2289.59	135.245	2056.57	2597.80
95	2346.62	139.289	2106.75	2664.20
96	2413.62	144.059	2165.67	2742.26
97	2495.99	149.946	2238.06	2838.25
98	2605.49	157.807	2334.21	2965.94
99	2778.07	170.265	2485.64	3167.32



3. LT_{50} dan LT_{90} konsentrasi 0,75%

Probability Plot for Mortalitas

Probit Analysis: Mortalitas, n versus Menit

Distribution: Normal

Response Information

Variable	Value	Count
Mortalitas	Event	82
	Non-event	818
n	Total	900

Estimation Method: Maximum Likelihood

Regression Table

Variable	Coef	Standard Error	Z	P
Constant	-2.18511	0.110203	-19.83	0.000
Menit	0.0016689	0.0001242	13.44	0.000
Natural Response	0			

Log-Likelihood = -169.724

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	34.4633	7	0.000
Deviance	36.4587	7	0.000

Tolerance Distribution


Parameter Estimates

Parameter	Estimate	Standard Error	95.0% Normal CI	
			Lower	Upper
Mean	1309.31	66.2926	1179.38	1439.24
StDev	599.196	44.5974	517.863	693.302

Table of Percentiles

Percent	Percentile	Standard Error	95.0% Fiducial CI	
			Lower	Upper
1	-84.6286	70.7930	-241.816	40.5131
2	78.7115	61.8536	-56.9343	189.415
3	182.346	56.8048	59.1255	285.130
4	260.305	53.4279	145.591	357.974
5	323.720	51.0041	215.276	417.875
6	377.695	49.2044	274.061	469.389
7	425.021	47.8487	325.155	515.004
8	467.396	46.8268	370.518	556.234
9	505.934	46.0655	411.434	594.071
10	541.409	45.5136	448.796	629.200

20	805.013	46.1800	716.784	899.884
30	995.090	51.5205	900.202	1104.89
40	1157.50	58.4580	1052.16	1284.82
50	1309.31	66.2926	1191.48	1455.71
60	1461.11	75.0160	1329.04	1628.36
70	1623.53	85.0233	1474.88	1814.41
80	1813.60	97.3368	1644.37	2033.34
90	2077.21	115.113	1878.04	2338.34
91	2112.68	117.550	1909.40	2379.48
92	2151.22	120.208	1943.44	2424.18
93	2193.60	123.140	1980.86	2473.36
94	2240.92	126.428	2022.62	2528.31
95	2294.90	130.193	2070.22	2591.01
96	2358.31	134.635	2126.11	2664.71
97	2436.27	140.121	2194.76	2755.36
98	2539.91	147.451	2285.96	2875.94
99	2703.25	159.077	2429.54	3066.14



4. LT_{50} dan LT_{90} konsentrasi 1%**Probit Analysis: Mortalitas, n versus Menit**

Distribution: Normal

Response Information

Variable	Value	Count
Mortalitas	Event	81
	Non-event	819
n	Total	900

Estimation Method: Maximum Likelihood

Regression Table

Variable	Coef	Standard Error	Z	P
Constant	-2.18136	0.110057	-19.82	0.000
Menit	0.0016494	0.0001240	13.30	0.000
Natural Response	0			

Log-Likelihood = -170.053

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	35.0583	7	0.000
Deviance	36.9171	7	0.000

Tolerance Distribution


Parameter Estimates

Parameter	Estimate	Standard Error	95.0% Normal CI	
			Lower	Upper
Mean	1322.49	67.7267	1189.75	1455.23
StDev	606.271	45.5835	523.200	702.531

Table of Percentiles

Percent	Percentile	Standard Error	95.0% Fiducial CI	
			Lower	Upper
1	-87.9049	71.7219	-247.405	38.7360
2	77.3639	62.5736	-60.0477	189.254
3	182.222	57.4116	57.5443	286.032
4	261.102	53.9638	145.133	359.706
5	325.265	51.4940	215.709	420.305
6	379.878	49.6649	275.231	472.434
7	427.763	48.2920	326.955	518.605
8	470.638	47.2620	372.866	560.348
9	509.631	46.4998	414.267	598.664
10	545.525	45.9527	452.065	634.246
20	812.241	46.8190	722.949	908.638

30	1004.56	52.4312	908.192	1116.58
40	1168.89	59.6348	1061.64	1299.09
50	1322.49	67.7267	1202.34	1472.40
60	1476.09	76.7088	1341.27	1647.48
70	1640.42	86.9918	1488.58	1836.13
80	1832.74	99.6263	1659.80	2058.10
90	2099.46	117.845	1895.86	2367.31
91	2135.35	120.341	1927.54	2409.00
92	2174.35	123.063	1961.94	2454.32
93	2217.22	126.066	1999.74	2504.18
94	2265.11	129.433	2041.94	2559.88
95	2319.72	133.288	2090.03	2623.44
96	2383.88	137.835	2146.49	2698.15
97	2462.76	143.451	2215.86	2790.04
98	2567.62	150.953	2308.00	2912.27
99	2732.89	162.850	2453.08	3105.07



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Proses memisahkan batang dan daun sidaguri



Proses pengeringan daun sidaguri



Proses pencampuran etanol 96% dan daun sidaguri



Proses maserasi selama 3 hari



Proses penyaringan



Proses Rotavapor



**Hasil proses Rotavapor
Ekstrak Cair**



**Hasil proses Rotavapor
Ekstrak Padat**



Proses Penimbangan dan Pencampuran Ekstrak



Larva *Aedes aegypti*



Alat pengukur pH air



Alat Mengukur suhu dan kelembaban ruangan

Larva *Aedes aegypti*



Proses penempatan larva *Aedes aegypti* pada masing-masing konsentrasi

Lampiran 5 : Persuratan



Nomor : B-155/FKK/PP.00.9/07/2019

Gowa, 10 Juli 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Pengejuan Kode Etik

Kepada Yth.

Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/ izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Rezi Rahmahillah
NIM	: 70200115005
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian	: Efektivitas Ekstrak Daun Sidagumi (Sida rhombifolia L) Terhadap Kemalian Larva Aedes Aegypti.
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. 2. Habibi, SKM., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
 NIP. 19810405 2000604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 35 Tello, (0411) 841879 Fax. 0411-8221400 Gowa
Email: www/fk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-199/WFKIK/PP.00.9/07/2019

Gowa, 30 Juli 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.

Gubernur Prov. Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPMDD Prov. Sulawesi Selatan

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (I) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rezki Rahmatullah
NIM : 70200115005
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Efektivitas Ekstrak Daun Sidaguri (Sida rhombifolia L) Terhadap Larva Aedes Aegypti.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.
2. Habibi, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Nur Bidayah

Tembusan:

- Dekan FKIK (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin No.63, Tello (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus 2: Jl. H.M. Yasin Liman No. 35 Tello, (0411) 841879 Fax (0411) 8721490 Somba Opu, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A. 176/KEPK/FKIK/VII/2019
 Judul Penelitian : Efektivitas Ekstrak Daun Sidagumi (*sida rhombifolia* L) Terhadap Larva *Aedes aegypti*
 Nama Peneliti : Rezki Rahmatullah
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	7	0	1	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 29 JULI 2019

Ketua



[Handwritten Signature]

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.
 NIP. 196402031983121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin No. 62 Telp. 04124 (fax 04123) Makassar
 Kampus 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-1019/FKIK/PP.00.9/06/2019

Gowa, 23 Juni 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pembuatan Ekstrak

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Prodi Farmasi FKIK UINAM

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin untuk pembuatan ekstrak kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Rezi Rahmatullah
NIM	: 70200115005
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian	: Efektivitas Ekstrak Daun Sidaguri (Sida rhombifolia L) Terhadap Kematian Larva Nyamuk Aedes Aegypti.
Dosen Pembimbing :	1. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. 2. Habibi, SKM., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.
 NIP. 19810405 2000604 2 003

Tembusan :

1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 20857/5.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2396/FKIK/PP-00 907/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

N a m a : REZKI RAHMATULLAH
Nomor Pokok : 70200115005
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SIDAGURI (SIDA RHAMBIFALIA L) TERHADAP LARVA AEDES AEGYPTI "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 Agustus s/d 30 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
 Pada tanggal : 31 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Np. : 10510513 109002 1 002

Ditujukan To: 1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
 2. Peneliti

01/08/2019 10:27:2019



J. Boulevard No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
 Website : <http://slemas.sulawesi.go.id> Email : ptsp@sulawesi.go.id
Makassar 90222





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN"
PERPUSTAKAAN FAKULTAS KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN
 Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 53 Tlp. (0411) 864924 (Fax. 864923) Makassar
 Kampus II - Jalan H.M. Yasin Limpo No. 16 Samata, Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor: 237/ FKIK/ HM.2.2/BP / 11/ 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Andi Mansyur S. Hum., MM**
N i p : **19820325 200912 1 005**
Jabatan : **Kepala Perpustakaan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan**

Memberi surat keterangan kepada :

N a m a : **Rezki Rahmatullah**
Nim : **70200115005**
Jurusan : **Kesehatan Masyarakat**
No. Angg. Perpustakaan : **-**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo (Pondok Puri Samata)**

1. Telah menyerahkan sebuah CD Skripsi dengan judul : Efektivitas Ekstrak Daun Sidaguri (Sida Rhombifolia L) Terhadap Kematian Larva Aedes Aegypti.
2. Telah menyerahkan koleksi buku di perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar , 07 November 2019

Kepala Perpustakaan FKIK


Andi Mansyur

RIWAYAT HIDUP



REZKI RAHMATULLAH, Lahir pada tanggal 4 April 1997, di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan keluarga Darwis Pure dengan Hj. Nurhayati Latta. Penulis pertama kali masuk jenjang pendidikan pada tahun 2003 di SD Negeri 11 Pangsid dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Pangsid dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Pangsid dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan Lulus sebagai Mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.