

**DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA  
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2019**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**NURUL IFFAH**  
**70200115097**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2015”, yang disusun oleh Nurul Iffah, NIM: 70200115097, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 06 November 2019 M  
9 Rabiul Awal 1441 H

### EWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Syahratul Aeni, SKM., M.Kes</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. Muzakkir, M.Pd.I</b>	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatira, Sp. A. M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Iffah  
NIM : 70200115097  
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Januari 1998  
Jurusan / Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Tala'salampang 2 Blok H1  
Judul : Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita  
di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa  
Tahun 2019.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata-Gowa, November 2019

Penyusun

  
Nurul Iffah  
70200115097

STATE ISLAMIC UNIVE  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami sebagai penyusun mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019”**. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Muh. Saad Asaf** dan Ibunda **Sitti Akirah**, serta saudara-saudariku **Saidah Saad, Adriani Saad, Nur Khalis Saad** dan **Nurul Mukhlisah** yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Syahratul Aeni, SKM., M.Kes, selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. Muzakkir, M.Pd.I selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Saudara-saudariku COVIVERA, teman kelas Kesmas B, peminatan Kesehatan Lingkungan 015 (KL Capung), PBL Dusun Bollangi Desa Timbuseng Kab. Gowa, KKN angkatan 60 terkhusus di Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai yang selalu memberikan dukungan serta memberikan semangat sehingga penulis merasa kuat dan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih kenagan yang kita lalui selama ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta (Marlina Malik, Suharda Chabirah, Vika Yuliandira, Ridha Awaliah S, Rezki Rahmatullah, Andi Nurhana Magfirah, Nurinzana, Aisyah Syahrudin) yang selalu setia menemani baik suka maupun duka dan memberi dukungan, mengingatkan, membantu serta menyemangati. Semoga persahabatan yang telah dibangun selama perkuliahan kita bisa membawa hubungan silaturahmi diantara jarak dan waktu tetap terjaga.
9. Kepada Muh. Syarwan terimakasih banyak yang telah setia dan telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan membantu selama pengerjaan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses sama-sama dan semoga Allah membalas kebaikan mu selama ini aamiin.
10. Kepada Hendra Wijaya Sumakul terimakasih sudah menjadi ketua tingkat dari maba hingga peminatan sudah mau direpotkan juga. Dan menjadi seorang kakak sehingga memotivasiku selama menepuh bangku perkuliahan.
11. Kepada teman-teman yang telah membantu selama penelitian dan yang membantu dalam pengolahan data. Bantuan kalian semoga bernilai ibadah disisi Allah SWT.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah swt. semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin


Samata-Gowa, Oktober 2019

Penulis



Nurul iffah

NIM 70200115097



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Hipotesis .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	15
G. Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Balita .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pnemonia .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang BBLR .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian Rumah .....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi .....	27
F. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Merokok .....	29
G. Tinjauan Umum Tentang Obat anti nyamuk.....	30
H. Kerangka Teori .....	33
I. Kerangka Konsep .....	34
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	52
C. Keterbatasan Penelitian .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka .....	11
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Menurut Desa atau Kelurahan Tahun 2016 .....	40
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019.....	41
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	42
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan dengan balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	42
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Umur balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	43
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	43
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Status Pneumonia di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	44
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan BBLR balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	44
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Kepadatan Hunian di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	45
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan obat anti nyamuk di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	45
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan Keberadaan Perokok dalam Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	46
Tabel 4.12	Distribusi Responden Berdasarkan Ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019.....	46

Tabel 4.13	Distribusi BBLR Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	47
Tabel 4.14	Distribusi Kepadatan Hunian Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	48
Tabel 4.15	Distribusi Penggunaan Obat Anti Nyamuk Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	49
Tabel 4.16	Distribusi Keberadaan Perokok dalam Rumah Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019.....	50
Tabel 4.17	Distribusi Ventilasi Rumah Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	51



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Master Tabel
- Lampiran 4 Output SPSS
- Lampiran 5 Turnitin (Plagiat)
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal kepada Dinas Kesehatan Gowa
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal kepada Puskesmas Bajeng
- Lampiran 9 Lembar Rekomendasi Etik
- Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 11 Surat Izin Penelitian dari BKPMMD Prov. Sul-Sel
- Lampiran 12 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Gowa
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi dari Kecamatan Bajeng
- Lampiran 14 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Puskesmas Bajeng
- Lampiran 15 Riwayat Hidup Peneliti



**DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA  
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2019**

<sup>1</sup> *Nurul iffah,*<sup>2</sup> *Emmi Bujawati,*<sup>3</sup> *Abd Majid HR Lagu*  
<sup>1,3</sup> *Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat,*  
*FKIK UIN Alauddin Makassar*  
<sup>2</sup> *Bagian Epidemiologi, Jurusan Kesehatan Masyarakat, FKIK UIN*  
*Alauddin Makassar*  
[saad.iffah@gmail.com](mailto:saad.iffah@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Pneumonia adalah bentuk infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru yang terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut alveoli, yang terisi udara ketika orang yang sehat bernafas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor determinan apa saja yang menyebabkan kejadian penyakit pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dan desain studi cross sectional, sampel penelitian ini adalah balita yang didiagnosis pneumonia dan tidak pneumonia dari bulan Januari-Juli 2019 di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan antara riwayat BBLR ( $p\text{-value} = 0,003$ ), kepadatan hunian ( $p\text{-value} = 0,000$ ), penggunaan obat anti nyamuk ( $p\text{-value} = 0,000$ ), perilaku merokok dalam rumah ( $p\text{-value} = 0,000$ ), dengan kejadian pneumonia pada balita dan tidak ada hubungan antara ventilasi ( $p\text{-value} = 0,122$ ) dengan kejadian pneumonia pada balita. Kesimpulan penelitian ini diharapkan masyarakat meningkatkan perilaku sehat seperti tidak merokok di dalam rumah, tidak menggunakan obat anti nyamuk tetapi lebih baiknya menggunakan kelambu atau memasang kasa pada jendela dan pintu.

**Kata Kunci : Determinan, Pneumonia, Balita.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**THE DETERMINANTS OF PNEUMONIA OCCURRENCES  
ON INFANTS IN THE WORKING AREAS OF  
BAJENG HEALTH CARE CENTER GOWA REGENCY 2019**

<sup>1</sup> *Nurul iffah,* <sup>2</sup> *Emmi Bujawati,* <sup>3</sup> *Abd Majid HR Lagu*

<sup>1,3</sup> *Environmental Health Division, Public Health Department, Faculty of Medicine  
and Health Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar*

<sup>2</sup> *Epidemiology Division, Public Health Department, Faculty of Medicine and Health  
Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar*

[saad.iffah@gmail.com](mailto:saad.iffah@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

Pneumonia is a form of acute respiratory infection that attacks the lungs. The lungs are made up of small sacs called alveoli, which filled with air when a healthy person breathes. The purpose of this study was to determine the determinants of pneumonia occurrences on infants in the working area of Bajeng Health Center, Gowa Regency. This research is quantitative research with an observational analytic approach and cross-sectional study design. The sample of this study were infants who were both diagnosed and not diagnosed with pneumonia from January to July 2019 in the working area of Bajeng Health Center, Gowa Regency. The results showed that there were influences of BBLR history (p-value = 0.003), the density of occupancy (p-value = 0,000), the use of anti-mosquito drugs (p-value = 0,000), and smoking behavior at home (p-value = 0,000) on the occurrences of pneumonia on infants. However, there was no influence of ventilation (p-value = 0.122) on the occurrences of pneumonia on infants. The conclusion of this research is that the community is expected to improve healthy behaviors such as preventing smoking behaviour in the housing area and stopping the use of anti-mosquito drugs. Instead, it is suggested to use mosquito nets or to install gauze on windows and doors to prevent from mosquitos.

**Key Words : Determinants, Pneumonia, Infants.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Pneumonia merupakan terjadi peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, menghirup partikel asing atau iradiasi atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut. (Caesar & W, 2015). *World Health Organization* (WHO) memprediksikan terdapat 151,8 juta kasus pneumonia/tahun, 8,7% (13,1 juta) diantaranya merupakan pneumonia berat dan perlu rawat inap. Terdapat 15 negara dengan prediksi kasus baru dan insiden pneumonia anak balita paling tinggi, mencakup 74% (115,3 juta) dari 156 juta kasus di seluruh dunia. Lebih dari setengahnya terfokus di 6 negara, mencapai 44% populasi anak balita di dunia. Ke-6 negara tersebut adalah India 43 juta, China 21 juta, Pakistan 10 juta, Bangladesh, Indonesia dan Nigeria masing-masing 6 juta kasus per tahun. (Masfufatun Juni, Nurjazuli, 2016).

Menurut *World Health Organization* (2016), pneumonia adalah salah satu penyebab kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Pneumonia membunuh 920.136 anak-anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2015, terhitung 16% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun. Berdasarkan penelitian Wulandari, Sudarwati, dan Suwardi (2013), menyatakan bahwa 20,274% orang yang pneumonia berat akan berisiko mengalami kematian. Selain itu di negara berkembang kejadian pneumonia pada anak balita sebesar 0,28 kejadian/anak/tahun, sedangkan di negara maju 0,05 kejadian/anak/tahun. Diperkirakan terdapat 155 juta kejadian baru pneumonia pada anak balita tiap tahunnya, dan sebanyak 7-13% menderita pneumonia berat yang dapat mengancam jiwa.

Pneumonia adalah bentuk infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut alveoli, yang terisi udara ketika orang yang sehat bernafas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli dipenuhi dengan nanah dan cairan, yang membuat pernafasan terasa menyakitkan dan membatasi asupan oksigen. Balita dapat dilindungi dari pneumonia, dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan, dan dirawat dengan biaya rendah, pengobatan dan perawatan berteknologi rendah. (WHO, 2019)

Kasus pneumonia merupakan penyebab kematian ketiga setelah kardiovaskular dan tuberculosi di Indonesia. Indonesia termasuk peringkat ke-8 dalam 15 negara dengan angka kematian pneumonia balita tertinggi yaitu 22.000 kematian balita per tahun (Syani & Raharjo, 2015).

Penyakit pneumonia merupakan salah satu penyakit yang dianggap serius di Indonesia hal ini dikarenakan, dari tahun ke tahun penyakit pneumonia selalu berada di peringkat atas dalam daftar penyakit penyebab kematian bayi dan balita. Insiden dan prevalensi kejadian pneumonia di Indonesia adalah 1,8% dan 4,5% dari 82.666 balita. Lima provinsi yang mempunyai insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Nusa Tenggara Timur (4,6% dan 10,3%), Papua (2,6% dan 8,2%), Sulawesi Tengah (2,3% dan 5,7%), Sulawesi Barat (3,1% dan 6,1%), dan Sulawesi Selatan (2,4% dan 4,8%). Terjadi peningkatan angka cakupan penemuan pneumonia balita yaitu 63,45% (Riskesdas, 2013).

Angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,16%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 0,08%. Pada kelompok bayi angka kematian sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,17% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 0,15%. Berdasarkan data riset kesehatan dasar seluruh Provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 6 penyumbang kasus

morbiditas pneumonia tertinggi pada balita dengan presentase 30,3% sedangkan CFR pada balita sebesar 1,0% (Risksedas, 2013).

Berdasarkan data profil kesehatan Sulawesi Selatan 3 tahun terakhir, Gowa berada pada urutan pertama penemuan penyakit pneumonia pada balita dengan angka penemuannya pada tahun 2016 dengan 6.385 kasus sama dengan jumlah perkiraan penderita yaitu sebanyak 6.385. Dengan ini membuat Kabupaten Gowa peringkat pertama dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani, disusul oleh Kabupaten Jeneponto dengan 1.722 kasus, Kabupaten Bulukumba sebanyak 540 kasus. (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2016)

Angka morbiditas pneumonia pada balita pada tahun 2017 di Kabupaten Gowa jumlah penderita yang ditemukan dan ditangani turun menjadi 873 kasus dari 406.672 perkiraan penderita, namun Kabupaten Gowa tetap menjadi daerah tertinggi angka kejadian pneumonia di Sulawesi Selatan, sementara di urutan kedua setelah Kabupaten Gowa terdapat Kota Makassar dengan jumlah kasus sebanyak 526 dari 1.282.945 jumlah perkiraan penderita, dan berikutnya di urutan ketiga Kabupaten Jeneponto dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani sebanyak 490 kasus (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2017).

Angka penderita pneumonia pada balita di Kabupaten Gowa mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan jumlah kasus 868 dari 6.842 jumlah penderita yang diperkirakan. Meskipun demikian Kabupaten Gowa masih menjadi daerah tertinggi angka kejadian pneumonia. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone diurutan kedua dan ketiga dengan jumlah kasus berturut-turut sebanyak 596 dan 533 kasus (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Berdasarkan data dinas kesehatan Gowa tahun 2018 wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan total kasus 127 anak di bawah 5 tahun dengan jumlah anak laki-laki 78 dan perempuan 59 merupakan peringkat pertama penyakit

pneumonia pada balita, dan diikuti oleh Puskesmas Sumba Opu yang memiliki kasus sebanyak 110 anak di bawah 5 tahun dengan jumlah anak laki-laki 61 dan perempuan 49 anak, kemudian diurutkan ketiga terdapat Puskesmas Pallangga dengan total kasus sebanyak 80 anak dibawah 5 tahun dengan jumlah anak laki-laki 44 dan anak perempuan 36 anak. Berdasarkan data di Puskesmas Bajeng cakupan pneumonia balita tahun 2018 Desa Panciro urutan paling tinggi dengan cakupan 38 kasus Desa Tubjeng urutan paling rendah dengan cakupan 5 kasus.

Tingginya kejadian pneumonia pada balita disebabkan antara lain karena beberapa faktor risikonya belum tertanggulangi dengan baik. Kemenkes RI dan beberapa penelitian terkait menyatakan faktor risiko pneumonia pada balita merupakan kombinasi faktor anak, ibu dan lingkungan. Faktor anak meliputi umur, jenis kelamin, status gizi, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang kurang memadai, status imunisasi dan defisiensi vitamin A. Faktor ibu diantaranya adalah pengetahuan ibu dan tingkat sosial ekonomi rendah. Faktor lingkungan fisik rumah meliputi kondisi lantai, dinding, ventilasi, kelembaban, suhu, pencahayaan, kepadatan hunian kamar tidur yang tidak memenuhi syarat (Yudiasuti, Sawitri, dan Wirawan, 2015).

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai risiko morbiditas yang lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami berat badan lahir rendah. Berat badan saat lahir menentukan perkembangan dan pertumbuhan fisik serta mental pada masa balita. Adapun masalah kesehatan yang dialami oleh bayi yang BBLR lebih mudah terkena penyakit infeksi terutama pneumonia dan sakit saluran pernapasan lainnya, hal ini dikarenakan sistem pembentukan organ yang belum sempurna. Menurut penelitian Cardoso, Coimbra, and Werneck (2013), balita yang mempunyai riwayat berat badan lahir rendah memiliki risiko 6,12 kali

untuk terkena pneumonia dibandingkan dengan balita yang mempunyai riwayat berat badan lahir normal.

Kebiasaan merokok di dalam rumah salah satu masalah kesehatan yang kian mengkhawatirkan di Indonesia adalah semakin banyaknya jumlah perokok yang berarti semakin banyak penderita gangguan kesehatan akibat merokok ataupun menghirup asap rokok (bagi perokok pasif). Terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah akan memperbesar resiko anggota keluarga yang menderita sakit, anak-anak yang orang tuanya merokok lebih mudah terkena penyakit saluran pernapasan seperti flu, asma, pneumonia dan penyakit saluran pernapasan lainnya (Wardani dan Winarsih, 2015). Berdasarkan hasil penelitian Milo, Ismanto, dan Kallo (2015), didapatkan p value  $0,002 < 0,05$ . Dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak.

Penggunaan obat anti nyamuk menjadi salah satu faktor risiko balita terkena pneumonia. Berdasarkan hasil penelitian Annah (2012) di RSUD Salewangan Maros, menunjukkan bahwa penggunaan obat nyamuk bakar di dalam rumah yang terdapat balita, meningkatkan risiko balita terkena pneumonia 6,3 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tinggal di rumah tanpa penggunaan obat anti nyamuk bakar akibat paparan asap dari obat nyamuk bakar tersebut.

Kepadatan hunian rumah juga menjadi faktor risiko balita terkena pneumonia, berdasarkan penelitian Astutik (2008) menunjukkan bahwa balita yang bertempat tinggal di rumah yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat disebabkan karena luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang menempati rumah berisiko 3,32 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tinggal di rumah dengan kepadatan hunian yang memenuhi syarat.

Pneumonia timbul akibat berbagai faktor, salah satunya faktor yang menyebabkannya adalah luas ventilasi rumah. Berdasarkan hasil penelitian Arta L (2009) balita yang tinggal dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat berisiko terkena pneumonia 2,9 kali dibanding dengan balita yang tinggal di rumah dengan ventilasi yang memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan faktor determinan (riwayat BBLR, kepadatan hunian, penggunaan obat anti nyamuk, keberadaan perokok dan luas ventilasi) dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019.

### **C. Hipotesis**

#### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

- a. Tidak ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- b. Tidak ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- c. Tidak ada hubungan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- d. Tidak ada hubungan keberadaan perokok dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- e. Tidak ada hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.

#### **2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )**

- a. Ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- b. Ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- c. Ada hubungan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- d. Ada hubungan keberadaan perokok dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.
- e. Ada hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.

#### ***D. Definisi Operasional***

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Pneumonia**

Pneumonia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyakit pada saluran pernapasan dimana balita mengalami sesak nafas, demam, batuk berdahak, suara parau. Berdasarkan hasil diagnosa tenaga kesehatan di Puskesmas Bajeng.

##### **2. Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)**

Riwayat BBLR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah balita yang memiliki riwayat berat badan lahir rendah  $< 2500$  gram sewaktu dilahirkan. Berdasarkan WHO (World Health Organization) tahun 2014.

*Kriteria objektif :*

Memenuhi Syarat : memiliki riwayat berat badan lahir  $\geq 2500$  gram.

Tidak Memenuhi Syarat : memiliki riwayat berat badan lahir  $< 2500$  gram.

##### **3. Kepadatan hunian rumah**

Kepadatan hunian rumah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu luas kepadatan hunian ruang tidur dengan jumlah penghuni di dalam ruang tidur. Hal ini berdasarkan kementerian RI No.829/Menkes/SK/VII/1999

*Kriteria objektif :*

Memenuhi Syarat : luas ruang tidur  $\leq 2$  orang/8m<sup>2</sup>.

Tidak Memenuhi Syarat : luas ruang tidur  $> 2$  orang/8m<sup>2</sup>.

#### 4. Penggunaan obat anti nyamuk

Penggunaan obat anti nyamuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan obat anti nyamuk di dalam rumah.

*Kriteria objektif :*

Menggunakan : Jika keluarga balita menggunakan obat anti nyamuk.

Tidak Menggunakan : Jika keluarga balita tidak menggunakan obat anti nyamuk.

#### 5. Keberadaan Perokok

Keberadaan perokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdapat anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok, sehingga balita terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif.

*Kriteria objektif :*

Ada : Ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

Tidak ada : Tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

#### 6. Ventilasi

Ventilasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah dengan menggunakan *Role meter*. Hal ini berdasarkan kemenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999.

*Kriteria objektif :*

Memenuhi syarat :  $\geq 10\%$  luas lantai rumah.

Tidak memenuhi syarat :  $< 10\%$  luas lantai rumah.

### ***E. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Masalah penelitian ini dibatasi pada determinan kejadian penyakit pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Balita di wilayah kerja Pusekmas Bajeng adalah balita yang terdaftar dalam rekam medik merupakan balita yang mengalami pneumonia dan tidak pneumonia.
- c. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional* untuk mengetahui determinan kejadian penyakit pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.



### *F. Kajian Pustaka*

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel		Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Independet	Dependent		
1.	<b>Deviani Utami,</b> 2014	Determinan Kejadian Pneumonia Berat Pada Balita (Studi Kasus Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Rsud. Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Provinsi Lampung).	Pemberian ASI, imunisasi campak, kepadatan hunian, polusi udara,	Kejadian penyakit Pneumonia	Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Rancangan penelitian analitik observasional dengan pendekatan Case Control.	Hasil penelitian didapatkan ada 4 variabel yang berhubungan yaitu riwayat pemberian ASI eksklusif (p-value=0,005; OR=2,229), Imunisasi campak (p-value=0,040; OR=3,181), Kepadatan hunian (p-value=0,015; OR=3,262), Polusi udara (p-value=0,009; OR=4,060). Simpulan dari penelitian ini bahwa determinan kejadian pneumonia adalah polusi udara

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel		Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Independet	Dependent		
2.	<b>Muhammad Habibi Syahidi, Dwi Gayatri, Krisnawati Bantas, 2016</b>	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Anak Berumur 12-59 Bulan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Tahun 2013	Anak umur 12-59 bulan. Pendidikan, pengetahuan, pendapatan orang tua, perilaku merokok di dalam dan diluar rumah, kepadatan hunian	Kejadian penyakit ISPA	Penelitian menggunakan desain studi cross-sectional dengan 104 sampel. Sampel yang dimaksud disini adalah anak berusia 12-59 bulan yang pernah melakukan kunjungan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat pada tahun 2013	Hasil menunjukkan bahwa dari 11 variabel yang dilakukan uji bivariat, variabel yang diketahui memiliki hubungan yang bermakna (P value < 0,05) dengan kejadian ISPA pada anak berusia 12 – 59 bulan adalah pendidikan (OR=3,16 : 95% CI 1,20–8,31), pengetahuan (OR=2,76 : 95% CI 1,12–6,79), pendapatan keluarga (OR=2,75 : 95% CI 1,10–6,86), kepadatan hunian (OR=5,59 : 95% CI 2,16–14,50), perilaku merokok keluarga dalam rumah (OR= 8,02 : 95% CI (2,42–26.57) dan perilaku merok ok keluarga di luar rumah (OR=5,12 : 95% CI 1,24–21,19)

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel		Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Independet	Dependent		
3.	<b>Ika Oktaviani, Siti Maesaroh, 2017</b>	Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Puskesmas Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	Umur, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi..	Kejadian Pneumonia	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode <i>cross sectional</i> . Populasi pada penelitian ini adalah seluruh balita di Puskesmas Kebun Handil Kota Jambi berjumlah 3.731 balita pada tahun 2016.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kejadian pneumonia (19,4%), umur 0–36 bulan (19,6%), jenis kelamin laki – laki (18,1%), status gizi baik(19,1%), status imunisasi tidak lengkap (22,9%). Berdasarkan hasil analisa statistik dari empat variabel yang diteliti terdapat satu variabel yang berhubungan yaitu status imunisasi tidak lengkap (p value 0,034) dengan kejadian penyakit Pneumonia pada balita.
4.	<b>Fajar, Sulistiyani, Onny Setiani, 2017</b>	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian neumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen Kota Semarang	Balita, Lingkungan Fisik Rumah, Perilaku Keluarga	Kejadian Pneumonia	Penelitian ini merupakan kasus-kontrol dengan metode retrospective study. Kelompok kasus sebanyak 35 responden dan	Hasil penelitian : 1) Ada hubungan antara kebiasaan membuka jendela rumah dengan kejadian pneumonia (p=0,031; OR =3,273; CI 95%), 2) Paparan Asap Rokok (p =0,002; OR =5,537; CI 95%), 3) Kondisi Rumah (p =0,010;

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel		Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Independet	Dependent		
					kelompok kontrol 35 responden	OR =6,303; CI 95%). Hasil analisis multivariat: 1). Ada hubungan antara kebiasaan membuka jendela rumah dengan kejadian pneumonia OR = 3,596, 2). Paparan Asap Rokok OR = 8,426, 3). Kondisi Rumah OR = 9,240
5	<b>Dismo Katiandagho, Nildawati, 2018</b>	Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Desa Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kondisi Fisik Rumah	Kejadian pneumonia pada balita	Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan Cross sectional study, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner, hygrometer untuk mengukur kelembaban dan meteran untuk mengukur luas ventilasi.	Ada hubungan yang bermakna antara kondisi dinding rumah yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian Pneumonia pada balita (p= 0,001), ada hubungan yang bermakna antara kondisi lantai rumah yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian pneumonia pada balita (p= 0,008), ada hubungan yang bermakna antara luas ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian pneumonia pada balita dengan nilai (p= 0,001) dan ada hubungan yang bermakna kondisi kelembaban udara yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian pneumonia pada balita (p=0,000).

Dari tabel sintesa 1.1 dapat dilihat berbagai penelitian tentang pneumonia pada balita yang telah dilakukan di setiap tahunnya, maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang Determinan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Beberapa alasan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Wilayah kerja Puskesmas Bajeng belum pernah ada yang meneliti tentang Determinan Kejadian Pneumonia Pada Balita. Jumlah penderita pneumonia pada balita pada tahun 2018 di Kabupaten Gowa menduduki tingkat pertama dan di Wilayah kerja Puskesmas Bajeng juga tertinggi dibandingkan Puskesmas lainnya pada tahun 2018. Adapun variabel yang belum diteliti dari 5 jurnal di atas yaitu : penggunaan obat anti nyamuk.

### ***G. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui faktor determinan apa saja yang menyebabkan kejadian penyakit pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan riwayat BBLR terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui hubungan keberadaan perokok dalam rumah terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui hubungan kepadatan hunian rumah terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.

- d. Untuk mengetahui hubungan luas ventilasi rumah terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.
- e. Untuk mengetahui hubungan penggunaan obat anti nyamuk terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.

#### ***H. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan bagian dari proses dan pengalaman belajar yang berharga bagi penulis dalam hal mengembangkan pengetahuan penelitian khususnya pada bidang kesehatan lingkungan, serta dapat menyampaikan kepada masyarakat pentingnya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang baik.

##### **2. Bagi Praktis**

Sebagai referensi dan pengetahuan awal dalam hal menambah wawasan untuk masyarakat khususnya ibu rumah tangga bahwa betapa pentingnya hidup sehat dan menjaga sanitasi lingkungan yang baik.

##### **3. Bagi Instansi Kesehatan Puskesmas Bajeng dan Dinas Kesehatan Gowa.**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang faktor determinan pneumonia sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanganan kasus pneumonia pada balita.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Balita*

##### 1. **Pengertian Balita**

Balita adalah anak umur satu tahun tepat sampai umur lima tahun kurang satu hari, anak umur 5 tahun tepat tidak termasuk kelompok anak 1-5 tahun. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pada masa balita kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik. Pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut (Depkes RI, 2006):

- a. Faktor internal adalah ras atau etnik, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom.
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri anak, antara lain penyakit kelainan, gizi, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, sosiologis, ekonomi, endokrin, pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan.

Setiap anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dengan anak lainnya. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering disebut *golden age* atau masa keemasan. Adapun dalil Al-qur'an yang menjelaskan tentang tumbuh kembang balita sampai dewasa atau tua terdapat dalam Q.S Al-Ghaafir/40:67 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ مِن قَبْلِ أَنْ يَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

*Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi diantara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami berbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. (Departemen Agama RI, 2007).*

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan seorang manusia melalui tahap mulai dari bayi atau balita sampai kita dewasa, tetapi diantara sebagian manusia diwafatkan sebelum dewasa atau tua, penyebab utama sehingga mengakibatkan kematian seorang anak sebelum dewasa adalah faktor kesehatan atau adanya penyakit seperti kasus pneumonia pada anak balita yang banyak terjadi pada saat sekarang ini (Shihab, 2002)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pneumonia**

### **1. Pengertian Pneumonia**

Pneumonia adalah infeksi akut parenkim paru yang meliputi alveolus dan jaringan interstitial (IDAI, 2010). Pneumonia adalah suatu proses peradangan yang disebabkan pengisian rongga *alveoli* *clas* *eksidat* (Juspiandi, 2014).

Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paruparu (alveoli) yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Gejala penyakit pneumonia ini berupa nafas cepat dan nafas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Batas nafas cepat adalah frekuensi pernafasan sebanyak 60 kali per menit atau lebih pada umur balita < 2 bulan, 50 kali per menit atau lebih pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali per menit

atau lebih pada anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Pneumonia yang menyerang bayi dan balita bisa menyebabkan kematian yang cepat bila tidak segera diobati (Rasyid, 2013).

## 2. Etiologi Pneumonia

Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur maupun mikoplasma. Namun lebih sering disebabkan oleh bakteri maupun virus. Adapun bakteri, virus, jamur dan mikoplasma yang menyebabkan pneumonia adalah sebagai berikut:

Bakteri : *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus Influenzae, Staphylococcus Aureus.*

Virus : *Adenovirus, virus Coxszckie, dan Respiratory Ssyncytial Virus (RSV).*

Jamur : *Hitoplasma Capsulatum, Coccidioides Immitis, BlastomycesDermatitis.*

Mikoplasma : *Mycoplasma Pneumoniae* (Narsiti dkk, 2013)

Bibit penyakit penyebab pneumonia seperti virus, bakteri dapat ditularkan melalui lingkungan yang telah tercemar. Salah satunya dengan melalui udara yang tercemar seperti asap rokok, penggunaan obat anti nyamuk, dan kebersihan rumah sehingga bakteri dan virus penyakit pneumonia berkembang biak dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu untuk dapat mencegah terjadinya penyakit pneumonia maka perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ  
نَظِيفٌ يُحِبُّ النُّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ  
الْكَرَّمَ حَوَادُّ يُحِبُّ الْجُودَ  
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ ﴿رَوَاهُ  
الْتَّرْمِذِيُّ﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”* (Sunan At-Tirmidzi : 2799)

Dari hadits di atas ada hikma yang dapat dipetik, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar karena sesungguhnya Allah menyukai hal tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ini belum bisa menerapkan teori-teori kebersihan untuk menjaga kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan heran apabila dalam kehidupan yang penuh kemajuan sekarang ini begitu banyak macam penyakit yang muncul dan menyerang manusia terutama balita yang memiliki daya tahan tubuh masih lemah.

### **3. Mekanisme Terjadinya Pneumonia**

Dalam mekanisme atau proses terjadinya penyakit pneumonia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sumber keberadaan agent penyebab, wahana lingkungan sebagai media penularan, kontak atau pajanan terhadap host, dan kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme agent yang telah masuk untuk menentukan kondisi sakit atau tidak sakit, yang dikenal dengan Teori Simpul (Najmah, 2016). Penyakit pneumonia merupakan penyakit yang tergolong ke dalam Air Borne Disease dimana penularannya dapat terjadi melalui udara yang telah tercemar bibit penyakit dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Penularan melalui udara terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda terkontaminasi. Namun, pada kenyataannya sebagian besar penularan melalui udara dapat juga menular melalui kontak langsung dengan penderita yang mengidap penyakit pneumonia (Najmah, 2016).

Sumber agent pada penyakit pneumonia dapat berupa bakteri, virus, atau polutan udara. Sumber agent berupa bakteri dan virus dapat berasal dari lingkungan rumah yang tidak baik, atau dapat berasal dari orang lain yang menderita penyakit pneumonia, sementara agent berupa polutan udara dapat bersumber dari aktivitas manusia didalam rumah seperti memasak, merokok, menggunakan obat nyamuk bakar, atau aktivitas manusia di luar rumah yang menyebabkan timbulnya emisi kendaraan, emisi pabrik, gas buang dari tempat sampah atau kandang ternak yang selanjutnya akan memasuki lingkungan udara (Najmah, 2016).

Percikan air liur merupakan media bagi agent penyakit untuk dapat menularkan penyakit ini. Dalam proses penularannya, penyakit ini dapat terjadi akibat terpapar oleh agent penyebabnya baik terjadi kontak langsung antar permukaan badan dan perpindahan mikroorganisme dari orang yang terinfeksi ke orang sehat yang rentan, maupun melalui benda perantara yang terkontaminasi (terkena percikan air liur penderita) dan memindahkan agent penyebabnya, cara ini dikenal dengan transmisi kontak (Saputri, 2016).

Selain transmisi kontak, penularan penyakit ini juga dapat terjadi melalui transmisi droplet. Terjadinya batuk, bersin, dan berbicara dari orang yang terinfeksi merupakan sumber droplet agent penyebab pneumonia. Droplet yang mengandung mikroorganisme penyebab pneumonia jika tersembur dalam jarak dekat (< 1m) melalui udara dan terdeposit di mukosa mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain maka selanjutnya agent tersebut akan menyerang sistem pernapasan manusia. Pada fase ini maka agent penyakit telah masuk ke dalam tubuh host (Saputri, 2016).

Agent yang telah masuk akan memicu timbulnya reaksi oleh tubuh host. Jika masih berada dalam saluran pernapasan atas maka akan menimbulkan

reaksi berupa peradangan yang memicu terjadinya gejala ringan yang diawali dengan panas atau demam, tenggorokan sakit, nyeri telan, pilek, dan batuk. Jika telah memasuki saluran pernapasan yang lebih dalam, maka agent dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan timbulnya nanah (pus) dan cairan yang memenuhi alveoli, sehingga terjadi sesak napas, mengi, atau kesulitan bernapas karena kesulitan dalam penyerapan oksigen. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan paru-paru untuk mengembang sehingga tubuh bereaksi dengan adanya pernapasan yang cepat untuk menghindari terjadinya hipoksia. Jika keadaan ini semakin memburuk, paru akan bertambah kaku dan timbul tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Pada fase ini maka host telah berada pada kondisi sakit pneumonia. Jika hipoksia atau sepsis (infeksi menyeluruh) terjadi, dapat berisiko untuk terjadinya kematian (Saputri, 2016).

#### **4. Klasifikasi berdasarkan kelompok umur**

##### **a. Anak umur < 2 bulan**

##### **1) Batuk Bukan Pneumonia**

Seorang bayi berumur <2 bulan diklasifikasikan menderita batuk bukan pneumonia apabila dari pemeriksaan: Tidak ada tarikan dinding dada ke dalam (TDDK) kuat dan tidak ada napas cepat, frekuensi napas kurang dari 60x/menit (Depkes RI, 2010).

##### **2) Pneumonia Berat**

Seorang bayi berumur <2 bulan menderita penyakit sangat berat apabila dari pemeriksaan ditemukan salah satu “tanda bahaya” yaitu kurang mau minum, kejang, kesadaran menurun atau sukar dibangunkan, stidor pada waktu anak tenang, wheezing, demam atau terlalu dingin. Ditandai dengan tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK) yang kuat dan adanya napas cepat 60x/menit

atau lebih. Semua pneumonia pada bayi berumur kurang dari 2 bulan diklasifikasikan sebagai pneumonia berat, tidak boleh diobati di rumah, harus dirujuk ke rumah sakit (Depkes RI, 2010).

b. Anak umur 2 bulan sampai < 5 tahun

1) Batuk Bukan Pneumonia

Seorang anak berumur 2 bulan sampai <5 tahun diklasifikasikan menderita batuk bukan pneumonia apabila dari pemeriksaan:

- a) Tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK).
- b) Tidak ada nafas cepat, frekuensi nafas kurang dari 50x/menit untuk anak umur 2 bulan sampai <12 bulan dan kurang dari 40x/menit pada umur 12 bulan - <5 tahun. Sebagian besar penderita batuk pilek tidak disertai tanda-tanda pneumonia (TDDK dan nafas cepat). Hal ini berarti anak hanya menderita batuk-pilek dan diklasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia (Depkes RI 2010:17).

2) Batuk Dengan Pneumonia

Sebagian besar anak yang menderita pneumonia tidak akan menderita pneumonia berat kalau cepat diberi pengobatan. Seorang anak berumur < 2 bulan - < 5 tahun diklasifikasikan menderita batuk dengan pneumonia apabila:

- a) Tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah kedalam.
- b) Adanya nafas cepat, dengan frekuensi nafas 60x/menit pada bayi berumur <2 bulan, 50x/menit atau lebih pada anak umur 2-12 bulan dan 40x/menit atau lebih pada umur 12 bulan - <5 tahun (Depkes RI, 2010:16).

3) Batuk Dengan Pneumonia Berat

Seorang anak berumur 2 bulan sampai <5 tahun diklasifikasikan menderita batuk dengan pneumonia berat apabila terdapat tarikan dinding dada bagian bawah

kedalam (TDDK). Jika anak diklasifikasikan menderita pneumonia berat harus dirujuk segera kerumah sakit (Depkes RI, 2010: 15).

### **5. Gejala Klinis Pneumonia**

Gejala pneumonia yaitu panas tinggi disertai batuk berdahak, napas cepat (frekuensi napas >50 kali/menit), sesak, dan gejala lainnya (sakit kepala, gelisah, dan nafsu makan berkurang) (Riskesdas, 2013). Gambaran klinis pneumonia pada bayi dan anak bergantung pada berat ringannya infeksi, tetapi secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Gejala infeksi umum, yaitu demam, sakit kepala, gelisah, malaise, penurunan nafsu makan, keluhan gastrointestinal seperti mual, muntah atau diare, kadang-kadang ditemukan gejala infeksi ekstrapulmoner.
- 2) Gejala gangguan respiratori, yaitu batuk, sesak nafas, retraksi dada, takipnea, nafas cuping hidung, air hunger, merintih, dan sianosis (Narsiti dkk, 2008:354).

### **6. Pencegahan Penyakit Pneumonia**

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menghindari balita dari paparan asap rokok, polusi udara, dan tempat keramaian yang berpotensi menjadi faktor penularan.
- 2) Menghindari balita dari kontak penderita pneumonia.
- 3) Memberikan ASI eksklusif pada anak.
- 4) Segera berobat jika mendapatkan anak mengalami panas, batuk, pilek. Terlebih jika disertai suara serak, sesak nafas, dan adanya terikat pada otot diantara rusuk (retraksi).
- 5) Imunisasi lengkap dan gizi baik dapat mencegah pneumonia.

- 6) Mengatasi faktor lingkungan seperti polusi udara dalam ruangan dan menjaga kebersihan yang baik di rumah juga dapat mengurangi jumlah anak-anak yang jatuh sakit terkena pneumonia.
- 7) Imunisasi HIB (untuk memberikan kekebalan terhadap *haemophilus influenza*, vaksin *pneumococcal disease*) dan vaksin *influenzae* pada anak resiko tinggi, terutama usia 2-23 bulan. Namun untuk vaksin ini karena harganya yang cukup mahal, tidak semua anak dapat menikmatinya (Misnadiarly, 2010)

### **C. Tinjauan umum tentang BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)**

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram saat ditimbang pertama kali setelah kelahiran 24 jam. (Izzah K.A., 2018). Istilah lain sebelum BBLR yaitu bayi yang lahir prematur atau kurang dari 2500 gram, BBLR dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan ukuran antara lain :

1. Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang berat badannya kurang dari 2500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi.
2. Bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi yang berat badannya kurang dari 1500 gram.
3. Bayi berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER) adalah bayi yang berat badannya kurang dari 1000 gram (Septiani, 2015).

Berat badan memiliki peran penting terhadap kematian balita akibat pneumonia. Di negara berkembang, sebanyak 22% kematian pada pneumonia diperkirakan terjadi karena BBLR (Narsiti dkk, 2008).

Menurut penelitian Susi Hartati (2011), menghasilkan bahwa bayi dengan BBLR mempunyai resiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan berat

badan lahir normal dan memiliki peluang mengalami pneumonia sebanyak 1,38 kali dibanding berat badan lahir normal, terutama pada bulan-bulan pertama kelahiran karena pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna sehingga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit saluran pernapasan lainnya.

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian Rumah***

Banyaknya orang yang tinggal dalam satu rumah mempunyai peranan penting dalam kecepatan transmisi mikroorganisme di dalam lingkungan. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni didalamnya, artinya luas lantai bangunan rumah tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya agar tidak menyebabkan *overload*. Hal ini tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain (Notoatmodjo, 2003).

Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh rumah biasanya dinyatakan dalam m<sup>2</sup>/orang. Kepadatan hunian dalam rumah menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah, kepadatan hunian ruang tidur minimal luasnya 8 m<sup>2</sup> dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan hunian rumah adalah meteran.

#### ***E. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi***

Ventilasi dalam rumah mempunyai banyak fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut agar tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan oksigen yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen

di dalam rumah, disamping itu kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya kelembaban udara didalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan.

Kelembaban ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri patogen penyebab penyakit. Fungsi kedua yaitu untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri. terutama bakteri patogen, karena di situ selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir. Fungsi lainnya adalah menjaga ruangan selalu tetap didalam kelembaban yang optimum (Notoatmodjo, 2007).

Ada dua macam ventilasi yaitu :

1. Ventilasi alamiah yaitu dimana aliran udara dalam ruangan tersebut terjadi secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin, lubang-lubang pada dinding dan sebagainya.
2. Ventilasi buatan yaitu dengan mempergunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara dalam ruangan, misalnya kipas angin dan AC.

Perlu diperhatikan di sini bahwa sistem pembuata ventilasi harus dijaga agar udara tidak membalig lagi, harus mengalir artinya dalam ruangan, rumah harus ada jalan masuk dan keluarnya udara yang ada pada ruangan tersebut (Natoatmodjo, 2007). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah dengan menggunakan *Roll meter*. Menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah  $\geq 10\%$  luas lantai rumah dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah  $\leq 10\%$  luas lantai rumah.

Persyaratan ventilasi yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Luas lubang ventilasi tetap minimal 5% dari luas lantai ruangan, sedangkan luas lubang ventilasi insidentil ( dapat dibuka dan ditutup) minimal 5% dari luas lantai. Jumlah keduanya menjadi 10% dari luas lantai rumah.
- b. Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari asap dari sampah atau pabrik, knalpot kendaraan, debu dan lain-lain.
- c. Aliran udara diusahakan cross ventilation dengan menempatkan lubang ventilasi berhadapan antar dua dinding. Aliran udara ini jangan sampai terhalang oleh barang-barang besar, misalnya lemari, dinding, sekat dan lain-lain.

#### ***F. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Merokok***

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merokok dapat merupakan bagian hidup masyarakat. Bahaya merokok bagi kesehatan telah dibicarakan dan diakui secara luas. Penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli memberikan bukti nyata adanya bahaya merokok bagi kesehatan si perokok dan juga bagi orang lain.

Keburukan mengonsumsi rokok juga dengan jelas disebutkan pada kemasan rokok. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahkan. Alangkah baiknya jika kita membelanjakan harta kita dengan baik bukan menjatuhkan diri kita pada suatu penyakit atau bahkan menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Adapun dalil yang membahas tentang membelanjakan harta dengan baik dalam Q.S Al-Baqarah/2:195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2007).*

Kesehatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia adalah semakin banyaknya jumlah perokok yang berarti semakin banyak penderita gangguan kesehatan akibat merokok ataupun menghirup asap rokok (bagi perokok pasif) yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Hal seperti ini tidak bisa dianggap biasa saja karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif lebih besar mengalami risiko dari pada perokok aktif. (Dachroni,2002).

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Paparan asap rokok pada ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti terjadinya penyakit pneumonia. Belakangan ini para ahli juga menemukan hubungan antara penurunan berat bayi yang dilahirkan oleh istri seorang perokok akibat gangguan perkembangan janin selama kandungan. Penelitian menunjukkan bahwa keluhan pernapasan, batuk pilek dan sebagainya, ternyata 20% sampai 80% lebih sering terjadi pada anak perokok dari pada anak bukan perokok.

### **G. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat anti nyamuk**

Obat anti nyamuk digolongkan menjadi beberapa jenis, obat anti nyamuk bakar,elektrik, oles dan semprot. Obat anti nyamuk adalah jenis insektisida yang umum digunakan oleh masyarakat. Pusat Data dan Informasi Persatuan Rumah


Sakit Indonesia (PERSI) di tahun 2006 menyatakan bahwa pemakaian obat anti nyamuk berbahaya bagi manusia karena mengandung bahan aktif yang termasuk golongan organophosfat dan karbamat. Bahan aktif dari organophosfat yaitu *Dichlorvos* atau *Dichlorovynil dimethyl phosfat* (DDVP) dan bahan aktif dari karbamat yaitu propuxur yang merupakan jenis insektisida pembunuh serangga. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada obat anti nyamuk selain berupa propuxur dan diklorvos, senyawa lain yaitu pyrethroid, tranflutrin, dellatherine (Amelia, Yustini Alioes, 2015)

World Health Organization (WHO) menetapkan diklorvos sebagai racun tingkat pertama yang mempunyai efek teratogenik yang membahayakan perkembangan janin dan mempunyai bahan aktif yang merusak sistem saraf, pernapasan dan ginjal. Obat anti nyamuk kandungannya juga ditambahkan S2 (*octachloro dipropyl ether*) yang mempunyai efek lebih ampuh untuk membunuh segala jenis serangga dan akan menjadi sangat berbahaya jika dibakar karena menghasilkan BMCE (*bischloromethyl ether*) yang mempunyai risiko kanker paru. World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa yang dikatakan keracunan adalah bila terjadi penurunan kadarolinesterase dalam darah 30% dari normal. Obat anti nyamuk banyak beredar di pasaran dan harga anti nyamuk bakar relatif murah. Dari hasil penelitian pemilihan jenis pestisida dalam rumah tangga yang banyak digunakan berdasarkan kebiasaan (56%) dan paling banyak kedua berdasarkan harga (53%). Keampuhannya untuk membasmi nyamuk dengan cepat merupakan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan obat anti nyamuk. Jenis anti nyamuk yang banyak digunakan dalam rumah tangga adalah jenis bakar (54%) dan jenis semprot (19%). (Amelia, Yustini Alioes, 2015)

Obat anti nyamuk bakar akan mengeluarkan asap yang mengandung beberapa gas seperti CO<sub>2</sub>, CO, nitrogen oksida, amoniak, metana, dan partikel yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nitrogen dioksida yang masuk ke dalam saluran napas akan bereaksi dengan air yang terdapat di saluran napas atas dan bawah membentuk HNO<sub>3</sub>. Asam sulfat dan asam nitrat yang terjadi merupakan iritan yang sangat kuat. Efek kerusakan terhadap saluran napas paru dapat bersifat akut dan kronik. Besar dan luasnya kerusakan tergantung pada jenis zat, konsentrasi zat, lama paparan dan ada atau tidaknya kelainan saluran napas atau paru sebelumnya. (Chandra Ilyas Nampira, Isbandiyah, 2013).

Dampak obat anti nyamuk bakar bagi pengguna adalah keracunan langsung dan gangguan kesehatan jangka panjang yang disebabkan kontaminasi (paparan) secara langsung ketika menggunakan obat anti nyamuk bakar, sehingga zat aktif (DDVP, propoksur (karbamat), dietiltoluemit, dan Piretrin) yang terkandung dalam obat anti nyamuk masuk ke dalam tubuhnya. Mekanisme masuknya obat anti nyamuk diantaranya melalui pernapasan, dapat menimbulkan gejala berupa batuk, bersin, serta dispnea. (Chandra Ilyas Nampira, Isbandiyah, 2013).

### H. Kerangka Teori



**Gambar 2.1 Kerangka Teori**


Sumber: Modifikasi Weber David J, Wiliam A Rutala, 2001

dan Ditjen PP dan PL Depkes RI, 2004.

□ = Variabel Tidak Diteliti

□ (dashed) = Variabel Diteliti

### *I. Kerangka konsep*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang didatakan.

##### **2. Lokasi dan Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Agustus – September 2019.

#### ***B. Pendekatan Penelitian dan Rancangan Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional* bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor resiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan (Nasir M, 2011).

#### ***C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang tercatat dalam rekam medis dari bulan Januari-Juli 2019, Balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Bajeng yaitu sebanyak 189 balita.

##### **2. Sampel**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data populasi yang berjumlah 189 sampel.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini alat untuk pengumpulan data adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden. Cara pengumpulan data diperoleh dengan :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama dari individu atau perseorangan, biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain. Adapun data primer diperoleh dari hasil turun langsung melaksanakan wawancara dengan cara membagikan kuesioner kepada responden dan hasil pengukuran menggunakan *role meter* untuk mengukur luas ventilasi. Kuesioner berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait variabel-variabel yang diteliti seperti riwayat BBLR, keberadaan perokok dalam rumah, kepadatan hunian, penggunaan obat anti nyamuk, dan ventilasi.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua biasanya diperoleh melalui badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh institusi pemerintah maupun swasta. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari rekam medik Puskesmas Bajeng bulan Januari-Juli tahun 2019 untuk mendapatkan jumlah balita yang menderita pneumonia dan tidak pneumonia.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan *role meter*. Kuesioner yang di dalamnya berisi sejumlah pernyataan untuk menggali informasi dari responden. *Role meter* alat untuk mengukur luas ventilasi rumah berupa.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Pengolahan Data**

Teknik analisa data dilakukan pengolahan dengan bantuan komputer dengan program pengolahan data sedangkan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi.

#### **a. Koding**

Mengkode data dengan memberi kode pada masing-masing jawaban. Hal ini untuk mempermudah pengolahan data.

#### **b. Editing**

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data melalui wawancara. Apabila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan disempurnakan.

#### **c. Tabulating**

Tabulasi dilakukan pada data yang telah terkumpul, disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Hal ini untuk mempermudah penataan data untuk disajikan dan dianalisis.

#### **d. Entry**

Proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital. Data fisik yang dimaksud adalah kegiatan memasukkan data yang telah didapat kedalam program komputer untuk selanjutnya akan diolah.

## 2. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut;

### a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase dari masing-masing yang diteliti baik variabel bebas maupun terikat. Analisis univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna, peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, dan grafik.

### b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk menentukan besarnya hubungan variabel bebas dan variabel terikat yang digambarkan dengan analisis tabel silang 2 x 2. Analisis bivariat ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan uji perbedaan proporsi menggunakan uji statistik *Chi Square* pada derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi. Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, serta disajikan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Deskripsi Lokasi Penelitian

Puskesmas Bajeng berada di Ibu Kota Kecamatan Bajeng yang merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa, terletak di sebelah Selatan Kota Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat.

Puskesmas Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 34,39 km<sup>2</sup> atau 57,23 % dari luas wilayah Kecamatan Bajeng. Puskesmas Bajeng mempunyai 10 wilayah desa/kelurahan dengan desa yang terluas adalah Desa Tangkebajeng dengan luas 6,35 km<sup>2</sup> atau 18,46% dari luas wilayah kerja Puskesmas Bajeng dan untuk desa/kelurahan terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 1,53 km<sup>2</sup> atau 4,45% dari luas wilayah kerja Puskesmas Bajeng. Akses dari ibu kota kecamatan ke seluruh desa/kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Bajeng relatif mudah karena semua desa/kelurahan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Tabel 4.1  
Luas Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Luas	
		km <sup>2</sup>	%
1	Tangkebajeng	6.35	18.46
2	Kalebajeng	1.80	5.23
3	Limbung	3.50	10.18
4	Bone	3.58	10.41
5	Maradekaya	5.80	18.87
6	Lempangang	3.57	10.38
7	Bontosunggu	9.35	9.25
8	Panciro	9.25	9.25
9	Tubajeng	1.90	5.52
10	Mataallo	1.53	4.45
<b>Jumlah</b>		34.39	100%

*Sumber : Profil Puskesmas Bajeng tahun 2018*

**b. Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas Bajeng**

**1) VISI :**

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Untuk Menunjukkan Kecamatan Bajeng Sehat”

**2) MISI :**

- a) Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar dan terjangkau oleh masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas SDM yang professional.
- c) Meningkatkan tata kelola Puskesmas Bajeng yaitu sistem informasi dan manajemen.
- d) Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

### 3) TUJUAN

Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehatn bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bajeng sehat.

## 2. Hasil Univariat

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan analisis univariat yang hasilnya nanti memberi gambaran umum mengenai responden. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

### a. Karakteristik Responden

#### 1) Umur

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja**  
**Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

Umur	Frekuensi	%
18-27 Tahun	55	29,2
28-37 Tahun	115	60,8
38-47 Tahun	14	7,3
48-57 Tahun	3	1,6
58-67 Tahun	2	1.1
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 189 ibu yang memiliki bayi diperoleh umur ibu yang paling banyak berumur sekitar 28-37 tahun sebanyak 115 responden (60,8%), dan yang paling sedikit berumur sekitar 58-67 tahun sebanyak 2 responden (1,1%).

## 2) Jumlah anggota keluarga

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga**  
**di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2019**

<b>Jumlah anggota keluarga</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
5-9 orang	187	99,9
10-15 orang	2	1,1
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita, terdapat jumlah anggota keluarga yang 5-9 orang sebanyak 187 responden (99,9%) dan jumlah anggota keluarga yang 10-15 orang sebanyak 2 responden (1,1%).

## 3) Hubungan dengan balita

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan dengan balita**  
**di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2019**

<b>Hubungan dengan balita</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Ibu	179	94,7
Nenek	10	5,3
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita, terdapat responden yang memiliki hubungan dengan balita sebagai ibu sebanyak 179 responden (94,7%) dan yang memiliki hubungan dengan balita sebagai nenek sebanyak 10 responden (5,3%).

## 4) Umur Balita

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Umur balita di Wilayah Kerja**  
**Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Umur balita</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
0-12 bulan	57	30,1
13-24 bulan	36	19,1
25-37 bulan	69	36,5
38-59 bulan	27	14,3
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita diperoleh umur balita yang paling banyak berumur 25-37 bulan sebanyak 69 responden (36,5%) dan yang paling sedikit berumur 38-59 bulan sebanyak 27 responden (14,3%).

## 5) Jenis Kelamin Balita

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin balita di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Jenis Kelamin balita</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Perempuan	100	52,9
Laki-laki	89	47,1
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita, terdapat balita yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 100 responden (52,9%) dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 89 responden (47,1%).

**b. Status Pneumonia**

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Status Pneumonia di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Status Pneumonia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Tidak menderita	140	74,1
Menderita	49	25,9
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita diperoleh balita dengan status tidak menderita pneumonia sebanyak 140 responden (74,1%) dan yang menderita pneumonia sebanyak 49 responden (25,9%).

**c. Determinan Kejadian Pneumonia Pada Balita**

1) BBLR (berat bayi lahir rendah)

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan status BBLR balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>BBLR</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Tidak BBLR	177	93,7
BBLR	12	6,3
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita diperoleh balita yang tidak BBLR sebanyak 177 responden (93,7%) dan balita yang BBLR sebanyak 12 responden (6,3%).

## 2) Kepadatan Hunian

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kepadatan Hunian di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Kepadatan hunian</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Tidak memenuhi syarat	123	65,1
Memenuhi syarat	66	34,9
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita diperoleh kondisi kepadatan hunian responden balita tidak memenuhi syarat sebanyak 123 rumah (65,1%) dan kepadatan hunian responden balita yang memenuhi syarat sebanyak 66 rumah (34,9%) .

## 3) Penggunaan obat anti nyamuk

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Obat Anti**  
**Nyamuk di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2019**

<b>Penggunaan obat anti nyamuk</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Tidak Menggunakan	114	60,3
Menggunakan	75	39,7
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 189 responden balita diperoleh ibu balita tidak menggunakan obat anti nyamuk dalam rumah sebanyak 114 orang (60,3%) dan yang menggunakan obat anti nyamuk dalam rumah sebanyak 75 orang (39,7%).

## 4) Perokok dalam rumah

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Keberadaan Perokok Dalam Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Perokok</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Tidak Ada	147	77,8
Ada	42	22,2
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 189 responden (77,8%) dan yang terdapat perokok dalam rumah sebanyak 42 orang (22,2%).

## 5) Ventilasi

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Luas Ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

<b>Ventilasi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Memenuhi syarat	157	83,1
Tidak Memenuhi syarat	32	16,9
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengukuran luas ventilasi rumah responden balita diperoleh luas ventilasi responden memenuhi syarat sebanyak 157 rumah (83,1%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 32 rumah (16,9%).

### 3. Analisis Bivariat

#### a. Riwayat BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

**Tabel 4.13**  
**Distribusi BBLR Terhadap Penyakit Pneumonia pada Balita di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2019**

BBLR	Pneumonia pada balita				Total		<i>P value</i>	<i>RP</i>
	Menderita		Tidak Menderita		N	%		
	n	%	n	%				
BBLR	8	16,3	4	2,9	12	6,3	<b>0,003</b>	<b>2,9</b>
Tidak BBLR	41	83,7	136	97,1	177	93,7		
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>		

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 12 balita yang memiliki riwayat BBLR terdapat 8 balita (16,3%) menderita pneumonia dan dari total 177 balita yang tidak BBLR terdapat 136 balita (97,1%) tidak menderita pneumonia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh *P value* = 0,003 (*P value* < 0,05). Oleh sebab itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat BBLR dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Nilai *RP*=2,9 yang berarti responden yang memiliki riwayat BBLR memiliki peluang 2,9 kali lebih besar menderita pneumonia dibandingkan yang tidak memiliki riwayat BBLR.

## b. Kepadatan Hunian

**Tabel 4.14**  
**Distribusi Kepadatan Hunian Terhadap Penyakit Pneumonia**  
**Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2019**

Kepadatan Hunian	Pneumonia pada balita				Total		<i>P value</i>	<i>RP</i>
	Menderita		Tidak Menderita		N	%		
	n	%	n	%				
Tidak Memenuhi Syarat	42	85,7	81	57,9	123	65,1	<b>0,001</b>	<b>3,1</b>
Memenuhi Syarat	7	14,3	59	42,1	66	34,9		
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>		

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 123 balita yang memiliki kepadatan hunian tidak memenuhi syarat dan menderita pneumonia terdapat 42 balita (85,7%) dan dari total 66 balita yang memiliki kepadatan hunian yang memenuhi syarat dan tidak menderita pneumonia terdapat 59 balita (57,9%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh *P value* = 0,001 (*P value* < 0,05). Oleh sebab itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Nilai *RP* = 3,1 yang berarti balita yang tinggal dengan kepadatan hunian tidak memenuhi syarat memiliki peluang 3,1 kali lebih besar menderita pneumonia dibandingkan kepadatan hunian yang memenuhi syarat.

## c. Penggunaan obat anti nyamuk

**Tabel 4.15**  
**Distribusi Penggunaan Obat Anti Nyamuk Terhadap Penyakit**  
**Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2019**

Penggunaan obat anti nyamuk	Pneumonia pada balita				Total		<i>P</i> <i>value</i>	<i>RP</i>
	Menderita		Tidak Menderita		N	%		
	n	%	n	%				
Menggunakan	38	77,6	37	26,4	75	39,7	<b>0,000</b>	<b>5,1</b>
Tidak menggunakan	11	22,4	103	73,6	114	60,3		
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>		

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari total 75 balita yang menggunakan obat anti nyamuk terdapat 38 balita (77,6%) menderita pneumonia dan dari total 114 balita yang tidak menggunakan obat anti nyamuk terdapat 103 balita (73,6%) tidak menderita pneumonia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh *P value* = 0,000 (*P value* < 0,05). Oleh sebab itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Nilai *RP* = 5,1 yang berarti balita yang sering terpapar dengan obat anti nyamuk memiliki peluang 3,1 kali lebih besar menderita pneumonia dibandingkan tidak menggunakan obat anti nyamuk.

## d. Keberadaan perokok dalam rumah

**Tabel 4.16**  
**Distribusi Keberadaan Perokok Dalam Rumah Terhadap**  
**Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas**  
**Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019**

Perokok dalam rumah	Pneumonia pada balita				Total	<i>P</i> <i>value</i>	<i>RP</i>
	Menderita		Tidak Menderita		N		
	n	%	n	%			
Ada	23	46,9	19	13,6	42	22,2	<b>0,000</b>
Tidak Ada	26	53,1	121	86,4	147	77,8	
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data primer 2019

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari total 42 balita yang memiliki keberadaan perokok dalam rumah terdapat 23 balita (46,9%) menderita pneumonia dan dari total 147 balita yang tidak memiliki perokok dalam rumah terdapat 121 balita (86,4%) tidak menderita pneumonia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh *P value* = 0,000 (*P value* < 0,05). Oleh sebab itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Nilai *RP* = 3,2 yang berarti balita yang sering terpapar asap rokok dalam rumah memiliki peluang 3,2 kali lebih besar menderita pneumonia dibandingkan tidak terpapar asap rokok dalam rumah.

## e. Ventilasi rumah

**Tabel 4.17**  
**Distribusi Ventilasi Rumah Terhadap Penyakit Pneumonia pada**  
**Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten**  
**Gowa Tahun 2019**

Ventilasi rumah	Pneumonia pada balita				Total		<i>P value</i>	<i>RP</i>
	Menderita		Tidak Menderita		N	%		
	n	%	n	%				
Tidak memenuhi syarat	12	24,5	20	14,3	32	22,2	<b>0,156</b>	<b>1,6</b>
Memenuhi syarat	37	75,5	120	85,7	157	77,8		
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>100</b>		

*Sumber : Data primer 2019*

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari total 32 balita yang memiliki ventilasi rumah tidak memenuhi syarat, terdapat 12 balita (24,5%) menderita pneumonia dan dari total 157 balita yang memiliki ventilasi rumah yang memenuhi syarat terdapat 129 balita (85,7%) tidak menderita pneumonia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-square* diperoleh *P value* = 0,156 (*P value* < 0,05). Oleh sebab itu,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas ventilasi rumah dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Nilai *RP* = 1,6 yang berarti balita yang tinggal dengan kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat memiliki peluang 1,6 kali lebih besar menderita pneumonia dibandingkan kondisi ventilasi yang memenuhi syarat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan antara riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita**

Riwayat BBLR didapatkan sebagian kecil balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng memiliki riwayat berat badan lahir rendah yaitu 12 balita (6,3%). Bayi dengan berat lahir rendah pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna, pertumbuhan dan maturasi organ dan alat-alat tubuh belum sempurna akibatnya bayi dengan berat badan lahir rendah lebih mudah mendapatkan komplikasi dan infeksi terutama pneumonia dan penyakit pernafasan lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cardoso, Coimbra, and Werneck (2013), balita yang mempunyai riwayat berat badan lahir rendah memiliki risiko 6,12 kali untuk terkena pneumonia dibandingkan dengan balita yang mempunyai riwayat berat badan lahir normal.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayati Ceria (2016) mengenai riwayat BBLR sebagai salah satu faktor kejadian pneumonia pada balita. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa anak balita dengan lahir dengan BBLR berisiko mengalami pneumonia sebesar 8,90 kali dibandingkan anak balita dengan berat badan lahir normal. Anak balita dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) lebih berisiko mengalami pneumonia hal ini disebabkan balita cenderung memiliki daya tahan tubuh kurang dan beberapa fungsi organ belum matang seperti imaturitas organ pernafasan, pola nafas yang tidak efektif, ketidakmampuan absorpsi nutrisi yang dapat menyebabkan pertumbuhan kurang sesuai dengan usia. Kekebalan tubuh yang kurang baik dan pertumbuhan yang tidak sesuai serta fungsi organ yang kurang apabila tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tua akan

menjadikan anak balita mudah terserang penyakit (Efni, Machmud, & Pertiwi, 2016).

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh pula 41 balita (83,7%) yang menderita pneumonia tetapi tidak memiliki riwayat BBLR hal ini menunjukkan bahwa riwayat BBLR bukanlah faktor mutlak penyebab pneumonia, akan tetapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi, seperti penggunaan obat anti nyamuk. Berdasarkan hasil *cross tabulation* antara riwayat BBLR dengan penggunaan obat anti nyamuk diperoleh 95,8% balita menggunakan obat anti nyamuk dengan tidak memiliki riwayat BBLR. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang tidak memiliki riwayat BBLR dapat pula mengalami pneumonia yang disebabkan faktor lain yakni polusi udara dalam rumah terutama penggunaan obat anti nyamuk bakar yang memiliki bahan kimia yang dapat menimbulkan racun apabila terpapar setiap hari.

## **2. Hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita.**

Berdasarkan keputusan kementerian kesehatan nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang persyaratan rumah sehat, dua orang maksimal menempati luas ruang 8 m<sup>2</sup>. Bangunan yang sempit dan tidak sesuai dengan jumlah penghuninya akan mempunyai dampak kurangnya oksigen dalam ruangan sehingga daya tahan tubuh menurun. Berdasarkan analisis bivariat antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita didapatkan hasil terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Astutik (2008) menunjukkan bahwa balita yang bertempat tinggal di rumah yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat disebabkan karena luas rumah yang tidak sebanding dengan

jumlah keluarga yang menempati rumah berisiko 3,32 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tinggal di rumah dengan kepadatan hunian yang memenuhi syarat. Kepadatan hunian di dalam rumah dapat menimbulkan efek negatif terhadap fisik, mental maupun moral bagi penghuninya.

Hunian yang padat memudahkan terjadinya penularan penyakit. Studi terhadap kondisi rumah menunjukkan hubungan yang tinggi antara koloni bakteri dan kepadatan hunian penghuni per meter persegi, sehingga adanya efek sinergi yang diciptakan dimana sumber pencemaran mempunyai potensi menekan reaksi kekebalan, bersama dengan terjadinya peningkatan bakteri patogen dengan kepadatan penghuni kepada setiap keluarga. (Sinaga & D, 2015). Bila penghuni terlalu padat dan terdapat penghuni yang sakit, maka akan mempercepat transmisi atau penularan penyakit tersebut. artinya, ruang tidur menjadi pengap dan lembab. Ruang tidur yang pengap dan lembab memungkinkan mikroorganisme patogen berkembangbiak salah satunya mikroorganisme penyebab pneumonia (Pramudiyani & Prameswari, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapat pula data balita yang tidak menderita pneumonia dengan kondisi kepadatan hunian tidak memenuhi syarat yaitu 81 balita (57,9%). Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil *cross tabulation* antara kepadatan hunian dengan luas ventilasi diperoleh 102 balita (65,0%) memiliki ventilasi yang baik, hal ini menunjukkan walaupun kamar balita dihuni lebih dari 2 orang jika terdapat ventilasi dalam kamar dan sikap ibu membuka jendela di pagi hari hingga sore menjadi salah satu faktor adanya sirkulasi udara yang baik yang didapatkan oleh balita, dari 123 balita yang kondisi kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat terdapat 90 balita dengan kondisi jendela yang dibuka setiap harinya. Adanya ventilasi atau jendela di sebuah kamar mempengaruhi siklus udara kamar sehingga pertukaran udara berjalan dengan baik.

### **3. Hubungan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita.**

Berdasarkan analisis bivariat antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Hal ini sejalan dengan penelitian Annah (2012) di RSUD Salewangan Maros, menunjukkan bahwa penggunaan obat nyamuk bakar di dalam rumah yang terdapat balita, meningkatkan risiko balita terkena pneumonia 6,3 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tinggal di rumah tanpa penggunaan obat anti nyamuk bakar akibat paparan asap dari obat nyamuk bakar tersebut.

Berdasarkan hasil analisis ada pula balita tidak pneumonia dan menggunakan obat anti nyamuk yaitu 37 balita (26,4%) hal ini dikarenakan sistem imun dalam tubuh balita masih kuat berdasarkan hasil *cross tabulation* antara penggunaan obat anti nyamuk dengan riwayat BBLR diperoleh 26,0% yang menggunakan obat anti nyamuk dan tidak memiliki riwayat BBLR sehingga sistem imun atau kekebalan tubuhnya masih kuat, dapat pula dilihat dimana ibu biasa menggunakan obat anti nyamuk, sebagian besar ibu menggunakan obat anti nyamuk jauh dari jangkauan anak-anak yakni 141 balita (74,6%) dalam hal ini, ada ibu yang memakai obat anti nyamuk di ruang keluarga dan ruang tamu bahkan ada ibu yang sudah tidak memakai obat anti nyamuk ketika ada balita tetapi lebih memilih menggunakan kelambu di malam hari.

Saat ini terdapat begitu banyak pilihan obat anti nyamuk yang ada di pasaran. Misalnya berbentuk semprot, bakar, oles maupun elektrik. Khasiat semua obat anti nyamuk adalah sama yaitu membunuh dan mengusir nyamuk. Bedanya adalah kemasan dan konsentrasi bahan aktif atau zat racunnya. Obat anti nyamuk dikatakan bahaya bagi manusia karena kandungan bahan aktif yang termasuk

golongan organofosfat. Bahan aktifnya adalah *dichlorovinyl dimethyl phofat (DDVP)*, *propoxur (karbamat)* dan *diethyltoluamide 0,25%* yang merupakan jenis insektisida pembunuh serangga. Obat anti nyamuk yang mengandung *d-aletrin* dapat mengusir nyamuk, tetapi jika ruangan tertutup tanpa ventilasi maka orang di dalamnya akan keracunan *d-aletrin*. Balita yang keracunan *d-aletrin*, akan membuat sistem kekebalan tubuhnya menurun sehingga balita dapat terkena pneumonia. Efek terbesar akan dialami oleh organ yang sensitif karena obat anti nyamuk lebih banyak mengenai hirupan, maka organ tubuh yang kena adalah pernafasan (Yulianti, Setiani, & D, 2013).

Penggunaan obat anti nyamuk tidak dianjurkan, karena penggunaan 1 gulung obat anti nyamuk bakar sama dengan mengkonsumsi 75-137 batang rokok. Asap yang dihasilkan dari obat anti nyamuk bakar mengandung *carbonil compound (formaldehyde dan acetaldehyde)* yang bersifat karsinogenik. Bersifat karsinogenik karena dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan pada jangka pendek dan asma serta gangguan saluran nafas permanen pada anak bawah lima tahun dalam jangka panjang serta *pyrethroids (d-allethrin, esbiothrin, transfluthrin, dan metofluthrin)* yang menyebabkan polusi udara. Asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran tersebut dapat meningkatkan risiko 3 kali lipat mengalami gangguan saluran pernafasan pada anak bawah lima tahun terpajan dibandingkan anak bawah lima tahun tidak terpajan. (Fahimah, 2014)

Pemakaian obat anti nyamuk bakar ini perlu diwaspadai (*confounding*) apabila faktor lingkungan rumah yang lain tidak mendukung seperti luas ventilasi kurang. Menggunakan anti nyamuk hanya sesuai keperluan, untuk ruang tertutup sebaiknya menggunakan bentuk semprot (selama penyemprotan sebaiknya tidak ada orang lain di dalam ruangan, dan ruang baru dimasuki setelah 2-3 jam), untuk ruang ber-AC sebaiknya tidak menggunakan anti nyamuk apapun karena dapat

membuat zat kimia terakumulasi, jika terpaksa menggunakan anti nyamuk bakar atau elektrik maka ruangan harus selalu terbuka sepanjang pemakaian, serta menghindarkan anak-anak (balita) dari kontak dengan anti nyamuk (lotion anti nyamuk baru boleh diberikan pada anak-anak yang berusia di atas 9 tahun dan dioleskan secukupnya saja. (Saleh, 2017).

Prinsipnya semua anti nyamuk memang mengandung zat kimia yang dapat menjadi racun, karena itu harus digunakan dalam jumlah yang seminimal mungkin atau sesuai kebutuhan. Untuk mengurangi penggunaan obat anti nyamuk bakar di dalam rumah, keluarga dapat menggunakan cara tradisional yaitu memasang kelambu pada tempat tidur, menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya, memasang kasa nyamuk pada pintu dan jendela, menggunakan raket anti nyamuk (Saleh, 2017).

Penggunaan obat anti nyamuk dapat pula merusak lingkungan sekitar tanpa kita sadari bila menggunakan setiap hari orang yang menghirup asap dari obat anti nyamuk dapat menjadi racun terutama dapat mengganggu sistem pernafasan tubuh. Adapun dalil Al-qur'an yang menjelaskan tentang larangan untuk merusak lingkungan (hayati maupun nonhayati) Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'Raaf/7:56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2012).*

Walaupun penggunaan obat anti nyamuk mampu membasmi nyamuk tetapi penggunaan obat anti nyamuk tetaplah berbahaya jika digunakan terus-menerus terutama bagi kesehatan paru-paru dimana ketika seseorang menghirup zat kimia yang terkandung dalam obat anti nyamuk lama kelamaan akan menjadi racun dalam tubuh, apalagi balita yang masih memiliki sistem imun yang mudah terserang penyakit seperti pneumonia.

#### **4. Hubungan antara keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita**

Keberadaan anggota keluarga yang merokok dapat mempengaruhi terjadinya pneumonia pada balita. Polusi udara yang dikeluarkan tersebut mengandung bahan kimia berbahaya sehingga dapat mengganggu kesehatan orang disekitarnya. Asap rokok sangat berbahaya bagi balita karena balita mempunyai daya tahan tubuh yang masih rendah. Dalam asap rokok terkandung lebih dari 4000 bahan kimia, termasuk 43 bahan yang dapat menyebabkan kanker (Menkes RI, 2009).

Berdasarkan analisis bivariat antara keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Hal ini sejalan dengan penelitian Milo, Ismanto, dan Kallo (2015), didapatkan p value  $0,002 < 0,05$ . Dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak.

Asap rokok mengandung kurang lebih sekitar 4000 bahan kimia seperti *nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen cyanide, amoniak, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol*, dan lain-lain (Yulianti, Setiani, & D, 2013). Setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan, racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbonmonoksida.

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen, dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. (Sugihartono & Nurjazuli, 2012).

Rokok juga meningkatkan kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal ginjal serta tekanan darah tinggi. Bahkan bahan berbahaya dan racun dalam rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga kepada orang-orang disekitarnya yang tidak merokok yang sebagian besar adalah bayi, anak-anak dan ibu yang terpaksa menjadi perokok pasif oleh karena anggota keluarga mereka merokok di dalam rumah. Padahal perokok pasif mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kanker paru-paru dan penyakit jantung. Sedangkan pada janin, bayi dan anak-anak mempunyai risiko yang lebih besar untuk menderita kejadian berat badan lahir rendah, bronchitis dan pneumonia, infeksi rongga telinga dan asma (Sugihartono & Nurjazuli, 2012).

Risiko balita menderita pneumonia yang memiliki anggota keluarga yang merokok dalam rumah atau sekitar anak jauh lebih besar dari pada yang tidak memiliki anggota keluarga yang merokok. Terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah akan memperbesar risiko anggota keluarga menderita sakit khususnya bagian paru-paru. Perokok tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, melainkan juga orang disekitar mereka. Bahkan sebuah riset menyatakan bahaya perokok pasif atau mereka yang berada disekitar perokok lebih besar terinfeksi kanker dibandingkan perokok yang sesungguhnya. Betapa dirugikannya orang yang disekeliling perokok saat menghisap asap yang berpotensi membunuh diri mereka secara perlahan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang larangan menyakiti orang

lain tanpa sebab, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/33:58 yang berbunyi

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَقَدِ احْتَمَلُوا  
بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Departemen Agama RI, 2012).

Rokok sudah sangatlah jelas berbahaya dan mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya. Dalam kaidah Fiqih juga disebutkan “mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengambil manfaat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, perokok aktif yang merokok di dalam rumah adalah ayah atau kakek balita. Perokok biasanya merokok di ruang tamu, teras dan ruang makan. Asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok itulah yang menyebabkan pneumonia. Berdasarkan hasil analisis, didapat pula balita yang tidak menderita pneumonia dan ada perokok dalam rumah sebanyak 19 balita (13,6%) hal ini dikarenakan sebagian besar rumah balita memiliki luas ventilasi yang memenuhi syarat, berdasarakan hasil *cross tabulation* antara keberadaan perokok dalam rumah dengan luas ventilasi rumah diperoleh 20,4% sehingga sirkulus udara di dalam rumah baik. Walaupun begitu balita yang terpapar asap rokok memiliki peluang terkena penyakit pneumonia 3,2 kali dibanding yang tidak terpapar asap rokok. Diharapkan, anggota keluarga balita dapat memahami bahaya asap rokok bagi orang lain terutama bila ada balita dalam rumah sehingga dapat dihindarkan dan kondisi balita tetap sehat.

## 5. Hubungan antara ventilasi dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita

Ventilasi merupakan tempat proses penyediaan udara segar ke dalam rumah dan tempat pengeluaran udara kotor dari ruangan tertutup. Tersedianya udara segar atau bersih dalam rumah amat dibutuhkan manusia, sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik akan menimbulkan keadaan yang dapat merugikan kesehatan.

Berdasarkan analisis bivariat antara ventilasi dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ventilasi dengan kejadian penyakit pneumonia pada balita. Hal ini berbeda dengan penelitian Arta L (2009) yang menunjukkan bahwa ventilasi di dalam rumah terbukti berhubungan dengan kejadian pneumonia ketika diuji dengan *Chi Square* dengan  $OR = 2,9$ . Balita yang tinggal dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat berisiko terkena pneumonia 2,9 kali dibanding dengan balita yang tinggal di rumah dengan ventilasi yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, didapat pula balita yang menderita pneumonia dan tinggal di rumah dengan ventilasi rumah yang memenuhi syarat yaitu 37 balita (75,5%) hal ini dikarenakan berdasarkan hasil *cross tabulatiaon* antara luas ventilasi dengan penggunaan obat anti nyamuk diperoleh 77,1% penggunaan obat anti nyamuk dengan luas ventilasi memenuhi syarat. Walaupun luas ventilasi memenuhi syarat ketika ibu menggunakan obat anti nyamuk pada malam hari dan di kamar tidur balita hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab pneumonia terutama penggunaan obat anti nyamuk bakar.

Ventilasi yang kurang dapat menyebabkan kelembaban bertambah. Kelembaban di luar rumah secara alami dapat mempengaruhi kelembaban di dalam

rumah. Ruang yang lembab memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme patogen, salah satunya mikroorganisme penyebab pneumonia. Untuk mendapatkan tingkat kelembaban yang baik hendaknya mengatur agar pertukaran udara selalu lancar serta sinar matahari dapat masuk yaitu dengan perbaikan ventilasi karena ventilasi berkaitan erat dengan kelembaban (Pramudiyani & Prameswari, 2011).

### ***C. Keterbatasan Penelitian***

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya adalah :

1. Terdapat beberapa alamat responden yang kurang lengkap.
2. Bahasa daerah masyarakat yang peneliti kurang pahami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kejadian penyakit pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaen Gowa tahun 2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan  $p\text{-value} = 0,003$ .
2. Ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan  $p\text{-value} = 0,000$ .
3. Ada hubungan antara penggunaan obat anti nyamuk dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan  $p\text{-value} = 0,000$ .
4. Ada hubungan keberadaan perokok dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan  $p\text{-value} = 0,000$ .
5. Tidak ada hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dengan  $p\text{-value} = 0,122$ .

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian yang serupa :

1. Bagi Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bajeng Kabupaen Gowa
  - a) Tidak merokok di dalam rumah terutama jika ada balita.

- b) Tidak lebih sering menggunakan obat anti nyamuk terutama obat anti nyamuk bakar tetapi gunakanlah kelambu pada malam hari atau memasang kasa nyamuk pada pintu dan jendela.
- c) Masyarakat diharapkan agar dapat lebih aktif dalam mencari informasi dari keluarga, tetangga, maupun media sosial lainnya mengenai penyakit pneumonia dan cara pencegahannya.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang serupa diharapkan bisa menggunakan beberapa cara. Dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan jenis desain penelitian yang berbeda mengenai faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pneumonia pada balita, misalnya dengan variabel pengetahuan ibu tentang pneumonia, cakupan imunisasi, dan pemberian ASI Eksklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Yustini Alioes, S. R. (2015). *Hubungan Lama Penggunaan Obat Anti Nyamuk Bakar dengan Kadar Kolinesterase Darah pada Masyarakat Kelurahan Jati Rumah Gadang Padang*. Jurnal Kesehatan Andalas, 4(2), 577–581.
- Annah, I. (2012). *Faktor Risiko Kejadian Pneumonia Anak Umur 6-59 bulan di RSUD Salewangan Maros 2012*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Arta L, Suhartono, Hanani Y. (2009). *Analisis Kondisi Rumah Sebagai Faktor Risiko Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Sentosa Baru Kota Medan Tahun 2008*. J Kesehatan Lingkung Indones. 8(1):26-34.
- Astutik, Dwi. (2008). *Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Anak Usia > 2 Bulan –5 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Cebongan Salatiga*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang
- Caesar, D. L., & W, N. E. (2015). *Hubungan Jumlah Bakteri Patogen dalam Rumah dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ngesrep Banyumanik Semarang Tahun 2014 Relationship between Amount Bacterial Pathogen in the House with Incidence of Pneumonia on Children Under Five*. 14(1), 21–26
- Cardoso, A.M., Coimbra, C.E.A., & Werneck, G.L. (2013). *Risk factor for hospital admission due to acute lower respiratory tract infection in Gurani indigenous children in southern Brazil: a population based case-control study*. Topical Medicine and International Health, 8 (5), 596-607. Doi: 10.1111.
- Ceria, I. (2016). *Hubungan Faktor Risiko Intrinsik Dengan Kejadian Pneumonia Pada Anak Balita*. Jurnal Medika Respati, 11(4), 1907–3887.
- Chandra Ilyas Nampira, Isbandiyah, M. F. (2013). *Hubungan Antara Pemakaian Obat anti nyamuk Bakar Dan Frekuensi Penyakit Paru Obstruksi Kronik (Ppok)*. 9(2), 93. <https://doi.org/10.22219/sm.v9i2.4136>
- Dachroni (2002). *Pedoman Pembinaan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di Tatanan Tempat-Tempat Umum*, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani

- Departemen Kesehatan RI. (2005). *Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional Penanggulangan Pneumonia Balita Tahun 2005-2009*. Depkes RI, Jakarta
- (2006). *Profil Kesehatan 2005*. Jakarta
- (2010). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Depkes RI.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2016). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016*. Makassar.
- (2017). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017*. Makassar.
- (2018). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018*. Makassar.
- Dinkes Kabupaten Gowa, (2018), *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa 2018*, Gowa.
- Efni, Y., Machmud, R., & Pertiwi, D. (2016). *Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Kelurahan Air Tawar Barat Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), 365–370. Retrieved from <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Fajar, Sulistiyani, dan O. S. (2017). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen Kota Semarang*.
- Fahimah, R., Kusumowardani, E., & Susanna, D. (2014). *Kualitas Udara Rumah dengan Kejadian Pneumonia Anak Bawah Lima Tahun (di Puskesmas Cimahi Selatan dan Leuwi Gajah Kota Cimahi)*. *Makara Journal of Health Research*, 18(1), 25–33. <https://doi.org/10.7454/msk.v18i1.3090>
- IDAI. (2010). *Pedoman Pelayanan Medis*, Jakarta
- Ika Oktaviani, S. M. (2017). *Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Puskesmas Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang*. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, Vol.VIII N(2), 70–84.
- Izzah, Kurnia Aqidatul. (2018). *Hubungan Riwayat BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) dengan Perkembangan Motorik Halus dan Kasar Bayi Usia -12 Bulan (Studi di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kecamatan Babat)*. STIK Insan Cendekia Medika Jombang.
- Juspiandi, La Ode Asfilalyly. (2014). *Kejadian Pneumonia Pada Balita*, *Journal of Peditre Nursing Vol. 1(2)*, PD.081-086
- Katiandagho, D., & Nildawati. (2018). *Hubungan Kodisi Fisik Rumah dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Desa Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Higiene*, 4(2), 75–81.
- Kemenkes RI. 2009 *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009*. Jakarta : Kemenkes RI

- Masfufatun Juni, Nurjazuli, S. (2016). *Hubungan Faktor Kualitas Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Pneumonia Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Banjarmangu 1 Kabupaten Banjarnegara*. <http://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jkli> Hubungan, 15(1), 6–13.
- Misnadiarly. (2010). *Penyakit Infeksi Saluran Napas Pneumonia pada Anak, Orang Dewasa, Usia Lanjut*, Pustaka Obor Populer, Jakarta.
- Milo,S., Ismanto,A.Y., Kallo,V.D. (2015).*Hubungan Kebiasaan Merokok didalam Rumah dengan Kejadian ISPA pada anak umur 1-5 tahun di Puskesmas Sario Kota Manado*.Ejournal keperawatan (e-Kp), Volume 3, Nomor 2
- Muhammad Habibi Syahidia , Dwi Gayatria, K. B. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA ) pada Anak Berumur 12-59 Bulan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat , Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan , Tahun 2013*. Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia, 1(1), 23–27. Retrieved from [journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/download/1313/628](http://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/download/1313/628)
- Najmah. (2016). *Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Narsiti dkk. (2008). *Respirologi Anak*, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Jakarta,
- Narsiti N, dkk. (2013). *Buku Ajar Respirologi Anak*, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Jakarta.
- Nasir, Abdul Muhith, Ideputri. (2011). *Metodologi Penelitian Kesehatan, Mulia Medika*. Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- (2003). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pramudiyani, N.A., & Prameswari, G.N. (2011) *Hubungan antara Sanitasi Rumah dan Perilaku dengan Kejadian Pneumonia Balita*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(2): 71-78
- Rasyid, Z. (2013). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia Anak Balita di RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar*. Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(3).
- Riskesdas. (2013). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

- Saputri, I. W. (2016). *Analisis Spasial Faktor Lingkungan Penyakit ISPA Pneumonia pada Balita di Provinsi Banten Tahun 2011-2015*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saleh, M. (2017). *Hubungan Sumber Polutan dalam Rumah Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada Balita di Kecamatan Mariso Kota Makassar*. *Kesehatan Lingkungan*, 3(3), 946–952. <https://doi.org/P-ISSN:2527-3310>
- Septiani, Rini. (2015). *Faktor Maternal pada Kejadian BBLR di Indonesia (Analisis Data Rikesdas 2013)*. Skripsi. FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 5* Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga. (2015). *Analisis Kondisi Rumah Sebagai Faktor Risiko Kejadian Pneumonia Pada Balita di Wilayah Puskesmas Sentosa Baru Kota Medan Tahun 2008*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 8(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/jkli.8.1.26-34>
- Susi Hartati. (2011). *Analisi Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Anak Balita Di RSUD Pasar Rebo Jakarta*
- Sundari, S., Pratiwi, dan Khairudin. (2014). *Perilaku Tidak Sehat Ibu yang Menjadi Faktor Resiko Terjadinya ISPA Pneumonia pada Balita*. s, 2(3), 141–147.
- Sugihartono, & Nurjazuli. (2012). *Analisis Faktor Risiko Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo Kota Pagar*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 11(1), 82–86.
- Syani, F. E., Budiyono, dan Raharjo, M. (2015). *Hubungan Faktor Risiko Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit Pneumonia Balita dengan Pendekatan Analisis Spasial di Kecamatan Semarang Utara*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3).
- Utami, D. (2014). *Determinan Kejadian Pneumonia Berat Pada Balita ( Studi Kasus Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Rsud. Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Provinsi Lampung)*.
- Wardani, N. K., dan Winarsih, S. (2015). *Hubungan Antara Paparan Asap Rokok dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita di Desa Pucung Rejo Kabupaten Magelang Tahun 2014*. *Jurnal Kebidanan*, 4(8).
- World Health Organization. (2016). *Fact Sheets Pneumonia*

World Health Organization. (2019). Fact Sheets Pneumonia

Wulandari, D. A., dkk (2013). *Kematian Akibat Pneumonia Berat pada Anak Balita*. Majalah Kedokteran Bandung, 45(1).  
<https://doi.org/10.15395/mkb.v45n1.140>

Yudiastuti, E., Sawitri, dan Wirawan. (2015). *Durasi Pemberian ASI Eksklusif, Lingkungan Fisik dan Kondisi Rumah Sebagai Faktor Risiko Pneumonia pada Balita di Puskesmas II Denpasar Selatan*. Public Health and Preventive Medicine Archive, 3(2).

Yulianti, L., Setiani, O., & D, Y. H. (2013). *Faktor-Faktor Lingkungan Fisik Rumah Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pangandaran Kabupaten Ciamis*.187–193.  
<https://doi.org/10.14710/jkli.11.2.187-193>.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

**ALA UDDIN**

M A K A S S A R

**N**

**LAMPIRAN 1**

**KUESIONER PENELITIAN**

**DETERMINAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA TAHUN  
2019**

---

No. Kuesioner :

Tanggal :

**I. Identitas Responden**

- a. Nama : .....
- b. Umur : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Alamat Rumah : .....
- e. Jumlah anggota keluarga : .....
- f. Hubungan dengan balita : .....

**II. Identitas Balita**

- a. Nama : .....
- b. Umur Balita : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Berat badan balita pada waktu dilahirkan : .....gram
- e. Apakah balita pernah mengalami berat < 2500 gr ?

- 1. Ya                      2. Tidak

**III. Kepadatan Hunian**

- a. Berapa luas kamar ?  
Luas = .....m<sup>2</sup>
- b. Berapa luas ventilasi kamar ?  
Luas = ..... m<sup>2</sup>

- c. Apakah kamar ibu mempunyai jendela kamar tidur?
  - 1. Ya
  - 2. Tidak
- d. Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?
  - 1. Ya
  - 2. Tidak
- e. Kapan ibu membuka jendela kamar tidur balita?
  - 1. Pagi
  - 2. Siang
  - 3. Sore
  - 4. Malam
- f. Berapa lama ibu membuka jendela kamar tidur balita?
  - 1. 1-2 jam
  - 2. 3-6 jam
  - 3. >6 jam
- g. Jumlah orang yang tidur sekamar dengan balita ..... orang

IV. Penggunaan Obat anti nyamuk

- a. Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari?
  - 1. Ya
  - 2. Tidak
- b. Jenis obat anti nyamuk apa yang ibu gunakan?
  - 1. Obat anti nyamuk bakar
  - 2. Obat anti nyamuk semprot
  - 3. Obat anti nyamuk elektrik
- c. Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk di sekitar balita?
  - 1. Ya
  - 2. Tidak
- d. Dimana ibu biasa menggunakan obat anti nyamuk?
  - 1. Di kamar tidur balita
  - 2. Di ruang tamu
  - 3. Di ruang keluarga
- e. Berapa kali ibu menggunakan obat anti nyamuk dalam sehari ?
  - 1. 1 kali
  - 2. 2 kali
  - 3. 3 kali
  - 4. 4 kali
- f. Kapan ibu menggunakan obat anti nyamuk?
  - 1. Pagi hari
  - 2. Siang hari
  - 3. Sore hari
  - 4. Malam hari

- V. Kebiasaan merokok
- a. Apakah ada anggota keluarga yang merokok?
    1. Ya
    2. Tidak
  - b. Berapa banyak orang yang merokok dalam rumah?
    1. 1-2 orang
    2. 3-5 orang
    3. > 5 orang
  - c. Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?
    1. Ya
    2. Tidak
  - d. Berapa batang rokok yang biasa dihisap dalam sehari ?
    1. < 5 batang / hari
    2. 5-10 batang / hari
    3. > 10 batang / hari
  - e. Jenis rokok yang dihisap?
    1. Kretek
    2. Filter
    3. Dan lainnya =.....

- VI. Ventilasi
- a. Luas lantai rumah = .....m<sup>2</sup>
  - b. Luas ventilasi rumah = .....m<sup>2</sup>
  - c. Berapa banyak ventilasi dalam rumah ?
    1. 1-3 buah
    2. 4- 6 buah
    3. > 6 buah
  - d. Apakah ibu memiliki jendela?
    1. Ya
    2. Tidak
  - e. Berapa banyak jendela dalam rumah ?
    1. 1-3 buah
    2. 4-5 buah
    3. > 5 buah
  - f. Apakah ibu sering membuka jendela rumah?
    1. Tidak pernah
    2. Kadang-kadang
    3. Sering

## LEMBAR OBSERVASI / CHEKLIST PENELITIAN

No	Variablel penelitian	MS	TMS
1.	Kepemilikan ventilasi dalam rumah		
2.	Luas ventilasi 10% dari luas lantai		
3.	Kamarisasi dalam rumah		
4.	Luas kamar 8m <sup>2</sup> / 2 orang		

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat



## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu responden balita




Wawancara dengan nenek responden balita



Wawancara dengan ibu responden balita



STATE ISLAMIC  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Pengukuran ventilasi rumah responden



Pengukuran jendela ventilasi responden

Pengukuran ventilasi kamar responden

MASTER TABEL

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
1	NUR	22	Labakkang	2	3	1	AD	6 bulan	2	2700 gram	0	1	9	0,9	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.44	2	1	1	1	2
2	HAD	40	Borong Bulo	2	3	1	AH	14 bulan	1	2900 gram	0	0	6	1,21	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	30	1.01	1	1	1	2	1
3	SIN	65	Borong Bulo	2	5	2	MU	12 bulan	1	3000 gram	0	0	9	1,07	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	54	1.92	3	1	2	3	1
4	KAS	27	Borong Bulo	2	3	1	AK	6 bulan	2	3300 gram	0	0	6	0,82	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.72	3	1	2	1	2
5	SIS	30	Panciro	2	8	1	SA	8 bulan	2	3000 gram	0	1	6	1,07	1	1	1	3	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	60	2.04	2	1	1	1	2
6	JUN	34	Borong Bulo	2	5	1	AS	3 bulan	1	2900 gram	0	0	6	0,18	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	42	1.7	2	1	2	1	2
7	SAM	24	Labakkang	2	3	1	AN	2 minggu	1	3000 gram	0	1	12	0,36	1	1	1	2	3	1	1	3	1	1	1	4	1	1	0	2	2	150	2.4	3	1	2	3	1
8	RAH	30	Labakkang	2	5	1	AR	37 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0,48	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	50	0.22	3	1	1	2	1
9	HAS	39	Labakkang	2	5	1	AI	15 bulan	2	3000 gram	0	1	6	0,12	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	2	30	0.18	2	1	1	2	1
10	SAY	46	Tamacinna	2	3	1	AR	10 bulan	1	3800 gram	0	0	6	0,09	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.36	2	1	2	1	2
11	DIA	21	Tamacinna	2	6	1	AR	10 bulan	1	3100 gram	0	0	9	0,24	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	49	0.54	2	1	1	3	1
12	ANA	22	Tamacinna	2	6	1	AL	12 bulan	1	2700 gram	0	1	9	1,07	1	1	1	2	3	2	1	1	0	2	1	4	1	1	1	3	2	90	0.27	2	1	2	3	1
13	ENI	32	Labakkang	2	5	1	AA	30 bulan	1	2900 gram	0	1	9	1,12	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	4	0	0	0	0	0	54	0.48	3	1	2	1	2
14	MUH	32	Labakkang	2	5	1	AB	3 bulan	1	3700 gram	0	1	9	1,3	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	4	0	0	0	0	0	54	1.08	3	1	2	1	2
15	SAL	26	Labakkang	2	5	1	FZ	8 bulan	1	3600 gram	0	0	13,5	2,21	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.48	3	1	2	1	2
16	HAR	26	Barasa	2	3	1	DR	27 bulan	1	3200 gram	0	0	6	0,48	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	48	1.92	3	1	2	2	1
17	KAM	29	Barasa	2	5	1	AH	12 bulan	1	2800 gram	0	1	9	2	1	1	1	2	4	2	1	3	1	1	1	4	1	1	0	3	2	70	1.92	3	1	2	2	1
18	RIS	25	Barasa	2	6	1	YR	27 bulan	2	3000 gram	0	1	12	1,59	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	63	1.96	2	1	2	2	1
19	KAR	31	Barasa	2	4	1	SA	40 bulan	1	3200 gram	0	1	10,5	1,23	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	0	2	2	91	1.27	3	1	2	2	1
20	SAM	37	Barasa	2	4	1	NU	40 bulan	1	2700 gram	0	0	12	2,21	1	1	1	1	4	2	1	1	0	2	1	4	1	1	0	3	2	72	2.34	3	1	2	3	1
21	JUM	18	Barasa	2	15	1	MN	6 bulan	1	3100 gram	1	1	6,25	0,09	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	105	9.08	3	1	2	1	2
22	MIR	26	Barasa	2	15	1	NA	1 bulan	2	3000 gram	0	0	6	0,24	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	105	8.25	3	1	2	1	2

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7		
23	SUR	35	Tamacinna	2	5	1	AI	10 bulan	1	2700 gram	0	1	7,5	0.08	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	2	59,53	45	2	1	2	2	1	
24	SAS	24	Tamacinna	2	4	1	AR	12 bulan	1	3250 gram	0	0	9	0.11	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.34	1	1	2	2	1
25	DIH	34	Tamacinna	2	7	1	MA	16 bulan	2	3300 gram	0	1	9	1.02	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	40	3,8	2	1	2	3	1	
26	SAA	34	Tamacinna	2	3	2	BA	50 bulan	2	2100 gram	0	0	16	0.37	1	1	1	2	3	1	1	1	0	2	1	4	1	1	0	1	2	27	3,7	3	1	2	1	1		
27	NAR	43	Barasa	2	5	1	ZI	53 bulan	2	3200 gram	0	0	12	0.12	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	2.01	2	1	2	2	1	
28	SAP	29	Labakkang	2	8	1	MH	55 bulan	1	2700 gram	0	0	9	0.24	0	0	0	0	3	2	1	1	1	3	1	4	1	1	1	3	1	120	5.34	3	1	3	3	1		
29	HAE	38	Labakkang	2	4	1	SP	55 bulan	2	3700 gram	0	0	6	0.48	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	42	2.34	2	1	2	3	1	
30	ANI	30	Labakkang	2	4	1	PU	5 bulan	1	3400 gram	0	1	9	0.72	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	2	48	2	2	1	2	3	1		
31	IRM	21	Borong bulo	2	3	1	KS	1 bulan	2	3700 gram	0	0	9	0.2	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	48	3.9	2	1	2	2	1	
32	IND	20	Labakkang	2	3	1	FA	2 bulan	1	2000 gram	0	1	6	0.12	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	59	2.01	1	1	1	1	2		
33	RAY	38	Labakkang	2	6	1	AR	20 bulan	2	3300 gram	0	1	9	0.72	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	2	97	4.15	2	1	2	1	2		
34	MRT	25	Borong bulo	2	7	1	AZ	10 bulan	1	2700 gram	0	0	4	0.24	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	30	1.78	2	1	2	3	1	
35	RSA	24	Pa're-pa're	2	5	1	AF	28 bulan	1	3100 gram	0	0	5	0.18	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	30	1.2	1	1	2	2	1		
36	KMM	26	Kutulu	2	5	1	FD	12 bulan	2	3000 gram	0	1	6	0.24	0	0	0	0	4	2	1	1	0	3	1	4	1	1	1	3	2	42	2.03	2	1	1	3	1		
37	AHD	41	Kutulu	2	6	1	SR	22 bulan	2	2500 gram	0	1	8	0.09	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	88	3.96	1	1	1	1	2		
38	RIA	40	Kutulu	2	6	1	AR	26 bulan	2	2800 gram	0	0	7	0.09	1	0	0	0	3	2	1	2	0	2	1	4	0	0	0	0	0	96	4.89	2	1	2	3	1		
39	IND	27	Kutulu	2	4	1	DZ	12 bulan	1	3300 gram	0	0	7	0.14	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6	2	1	1	2	1		
40	TRI	25	Pa're-pa're	2	3	1	AF	11 bulan	2	3000 gram	0	0	6	0.08	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	5.03	2	1	2	1	2		
41	JUL	35	Kutulu	2	4	1	MK	57 bulan	1	3000 gram	0	1	8	0.07	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	108	8.09	2	1	2	3	1		
42	JAN	60	Borong Bulo	2	3	2	MF	12 bulan	1	3000 gram	0	0	9	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	3	2	40	4.2	2	1	1	3	1		
43	NUR	23	Kutulu	2	3	1	FH	3 bulan	2	2800 gram	0	0	12	0.48	1	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	0	2	2	42	3.09	3	1	2	1	2		
44	WAH	22	Kutulu	2	3	1	FA	2 bulan	2	2700 gram	0	0	12	0.48	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	50	5.02	2	1	2	2	1	

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
45	AIN	38	Borong Bulo	2	3	1	NA	23 bulan	2	3200 gram	0	0	9	0.12	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	42	3	2	1	1	3	1
46	TIN	37	Pa're-pa're	2	5	2	AU	12 bulan	2	2900 gram	0	1	6	0.09	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	0	3	2	32	3.09	3	1	1	3	1
47	FIT	21	pa're-pa're	2	4	1	AI	12 bulan	2	2900 gram	1	1	9	0.27	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	42	4.08	2	1	2	3	1
48	MAH	51	Kutulu	2	5	1	AA	2 bulan	2	2900 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	108	5.04	3	1	1	1	2
49	SAI	24	Pa're-pa're	2	4	1	NH	3 bulan	2	3500 gram	0	0	9	0.09	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	56	5.79	2	1	2	1	1
50	SIT	30	Pa're-pa're	2	8	1	NA	11 bulan	2	2900 gram	0	1	6	0.08	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	42	4.05	2	1	2	3	1
51	HDR	50	Labakkang	2	7	2	RI	4 bulan	1	3200 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	40	4	1	1	2	2	1
52	SMR	29	Labakkang	2	6	1	SS	59 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.24	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	90	5.03	2	1	2	3	1
53	MRH	40	Labakkang	2	7	2	RA	58 bulan	1	3500 gram	0	0	6	0.24	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	60	6	2	1	2	3	1
54	JMS	19	Kutulu	2	7	1	SH	23 bulan	2	2600 gram	1	0	9	0.18	1	1	1	1	2	1	1	1	0	3	1	4	1	1	0	2	2	49	5.03	3	1	2	3	1
55	NLD	27	Kutulu	2	5	1	RA	13 bulan	1	2700 gram	0	0	12	0.12	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	3	2	56	6.03	3	1	2	3	1
56	SLH	33	Kutulu	2	6	1	MY	57 bulan	1	3000 gram	0	0	15	0.68	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	90	6.03	2	1	2	1	2
57	SMA	24	Pa're-pa're	2	4	1	AM	28 bulan	1	3200 gram	0	0	9	0.18	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	30	3.05	2	1	2	1	1
58	SAM	30	Pa're-pa're	2	8	1	NR	36 bulan	2	2900 gram	0	1	6	0.09	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	56	4.03	2	1	2	3	1
59	UNI	30	Kutulu	2	5	1	RA	12 bulan	1	3200 gram	0	1	9	0.36	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	60	4.34	3	1	2	1	2
60	MMI	28	Pa're-pa're	2	4	1	AK	22 bulan	2	3000 gram	0	0	9	0.1	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	56	4.68	3	1	2	3	1
61	ARI	19	Pa're-pa're	2	8	1	SB	12 bulan	2	2600 gram	0	0	9	0.36	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	49	5.2	2	1	2	3	1
62	RST	40	Pa're-pa're	2	6	1	FD	11 bulan	2	2700 gram	0	0	6	0.09	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	60	5.03	2	1	2	3	1
63	SWI	32	Pa're-pa're	2	3	1	BL	12 bulan	1	2000 gram	0	0	6	0.06	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	36	2.04	2	1	2	3	1
64	RSH	30	Pa're-pa're	2	5	1	AF	32 bulan	2	2500 gram	1	1	7	0.03	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	36	0.11	3	1	2	3	1
65	SLA	51	Pa're-pa're	2	4	2	SR	12 bulan	1	2800 gram	0	1	8	0.04	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	3	1	42	2.04	2	1	3	3	1
66	PRH	35	Pa're-Pa're	2	3	1	FA	57 bulan	1	3200 gram	0	0	12	0.06	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2.09	2	1	2	3	1
67	ADW	33	Pa're-Pa're	2	6	1	AL	35 bulan	2	2900 gram	0	0	9	0.05	1	1	1	2	4	2	1	1	0	2	1	4	0	0	0	0	0	63	3.15	2	1	2	3	1

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
68	AMN	29	Pa're-Pa're	2	4	1	SS	23 bulan	1	3100 gram	0	0	9	0,04	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	48	1,15	2	1	2	3	1
69	SMI	27	Pa're-Pa're	2	3	1	RV	37 bulan	1	2900 gram	0	0	12	0,06	1	1	1	2	3	1	1	1	0	2	1	4	0	0	0	0	0	56	2,65	2	1	2	3	1
70	MRY	31	Pa're-Pa're	2	3	1	RG	12 bulan	1	3000 gram	0	0	12	0,05	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	72	3,45	2	1	2	3	1
71	NLS	27	Panciro	2	3	1	GH	23 bulan	1	2800 gram	0	0	8	0,34	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	42	4,35	3	1	3	2	1
72	SRI	28	Panciro	2	4	1	AU	22 bulan	2	2700 gram	0	1	15	0,36	1	1	1	3	4	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	42	1,26	3	1	3	2	1
73	KRM	29	Panciro	2	4	1	PA	28 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0,12	1	1	1	2	2	1	1	1	0	3	1	3	1	1	0	3	2	49	4,36	3	1	3	3	1
74	SYF	30	Kutulu	2	5	1	AN	30 bulan	1	3000 gram	0	1	6	0,36	1	1	1	2	3	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	2	56	4,08	3	1	3	2	1
75	UYU	30	Barasa	2	6	1	AR	22 bulan	1	2900 gram	0	0	9	0,45	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	3,67	3	1	2	1	2
76	IWT	32	Panciro	2	5	1	IY	22 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0,12	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0,51	3	1	3	3	1
77	SRH	28	Panciro	2	4	1	WM	12 bulan	2	2800 gram	0	1	7	0,11	1	0	0	0	3	2	1	2	1	1	1	4	1	1	0	3	2	49	2,04	2	1	2	2	1
78	NMH	20	Barasa	2	5	1	LP	36 bulan	2	2900 gram	0	0	6	0,24	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	64	2,72	3	1	3	3	1
79	LWA	28	Panciro	2	5	1	WN	12 bulan	1	2700 gram	0	1	8	0,12	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	48	4,09	3	1	3	1	2
80	NRM	29	Panciro	2	6	1	CA	10 bulan	2	3100 gram	0	1	8	0,26	1	0	0	0	3	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	2	54	4,21	3	1	2	1	2
81	SMG	32	Bonto Ramba	2	7	1	RR	22 bulan	2	2700 gram	1	0	9	0,34	1	1	1	3	3	2	1	2	0	3	1	3	0	0	0	0	0	56	2,01	3	1	2	2	1
82	HLA	33	Bonto Ramba	2	4	1	AF	35 bulan	1	2800 gram	0	0	8	0,21	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	64	3,25	3	1	3	2	1
83	IMD	35	Bonto Ramba	2	6	1	FA	9 bulan	2	2800 gram	0	1	7	0,12	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	49	3,15	2	1	2	1	2
84	DHI	36	Bonto Ramba	2	4	1	ZA	10 bulan	1	2700 gram	0	1	8	0,18	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	3	1	42	0,9	3	1	2	2	1
85	HSN	33	Bonto Ramba	2	4	1	SR	12 bulan	1	2800 gram	0	0	8	0,09	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	54	2,4	3	1	2	2	1
86	WTI	39	Bonto Ramba	2	6	1	KA	22 bulan	2	2900 gram	0	0	9	0,11	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0,51	3	1	2	2	1
87	LLI	27	Panciro	2	8	1	RA	37 bulan	2	2700 gram	0	0	8	0,18	1	0	0	0	2	1	1	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	72	2,88	3	1	3	3	1
88	RTI	29	Bonto Ramba	2	5	1	LI	12 bulan	1	2600 gram	0	0	8	0,08	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,4	3	1	3	3	1
89	HUS	27	Panciro	2	4	1	UL	35 bulan	1	2700 gram	1	0	12	0,16	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2,16	3	1	3	3	1



No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
113	RIS	30	Bonto Ramba	2	4	1	LU	19 bulan	1	2600 gram	1	0	8	0.18	1	1	1	2	3	2	1	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	64	2.24	2	1	3	1	2
114	SAI	28	Kutulu	2	5	2	MI	29 bulan	1	2500 gram	0	0	9	0.14	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	60	3.46	2	1	2	3	1
115	LES	30	Kutulu	2	7	1	KP	44 bulan	1	2900 gram	0	0	8	0.26	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	72	4.56	2	1	2	2	1
116	WAD	28	Tamacinna	2	4	1	RK	10 bulan	1	2500 gram	0	0	12	0.09	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	5.43	2	1	2	3	1	
117	KAL	26	Tamacinna	2	4	1	PM	22 bulan	1	2600 gram	0	0	12	0.34	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	42	4.6	2	1	2	3	1
118	HUD	27	Tamacinna	2	3	2	AS	29 bulan	1	2500 gram	0	0	9	0.14	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	42	3.98	2	1	3	2	1
119	RIA	29	Kutulu	2	4	1	TH	21 bulan	1	2700 gram	0	0	9	0.45	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1.26	3	1	2	3	1	
120	MUL	29	Kutulu	2	3	1	KH	42 bulan	1	2600 gram	0	0	12	1.25	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	1	4	0	0	0	0	82	0.98	2	1	3	3	1	
121	LIS	30	Tamacinna	2	6	2	MM	19 bulan	1	2800 gram	1	1	8	0.54	1	1	1	3	3	2	1	1	1	3	1	4	0	0	0	0	45	1.45	3	1	2	3	1	
122	YUS	28	Tamacinna	2	5	1	PM	12 bulan	1	2900 gram	0	0	9	1.76	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.34	3	1	3	3	1	
123	ZAH	29	Kutulu	2	6	1	MZ	11 bulan	1	2800 gram	0	0	9	1.43	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1.24	2	1	3	3	1	
124	FIN	30	Kutulu	2	6	1	MK	29 bulan	1	2700 gram	0	0	12	0.45	1	1	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.81	2	1	2	3	1	
125	AFI	29	Kutulu	2	5	1	AK	26 bulan	1	2600 gram	0	0	9	0.25	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	64	0.83	2	1	3	2	1
126	AIN	28	Kutulu	2	4	1	RR	37 bulan	1	2600 gram	0	0	8	0.32	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	72	1.02	2	1	3	2	1
127	BAD	32	Kutulu	2	4	1	DJ	21 bulan	2	2600 gram	0	0	9	0.34	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	80	5.34	3	1	2	1	2
128	FIR	27	Kutulu	2	3	1	AW	22 bulan	2	2600 gram	0	0	9	0.34	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	72	2.04	2	1	2	3	1
129	DIL	27	Pa're-pa're	2	3	1	DW	37 bulan	2	2600 gram	0	1	8	0.32	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	2	84	3.02	3	1	3	3	1
130	KHA	29	Kutulu	2	4	1	AM	24 bulan	2	2500 gram	0	0	8	0.24	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	5.02	3	1	3	3	1	
131	HAI	28	Kutulu	2	3	1	ML	25 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.12	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	60	6.12	2	1	3	3	1
132	ROS	29	Tamacinna	2	3	1	GR	26 bulan	1	2800 gram	0	0	12	0.14	1	1	1	3	3	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	72	5.32	3	1	3	3	1	
133	HAB	30	Tamacinna	2	5	1	KH	57 bulan	1	2700 gram	0	0	15	0.15	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6.21	3	1	3	3	1	
134	INA	31	Tamacinna	2	4	1	RM	27 bulan	2	2600 gram	0	0	12	0.12	1	1	1	2	2	1	1	2	0	3	1	3	1	1	0	2	2	72	4.32	3	1	3	3	1

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
135	HAY	29	Tamacinna	2	4	1	NF	41 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.21	1	1	1	3	4	2	1	2	0	3	1	3	1	1	0	2	2	56	3.25	3	1	3	2	1
136	PTA	29	Tamacinna	2	4	1	DZ	30 bulan	2	2600 gram	0	0	9	0.24	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3.54	2	1	2	2	1
137	LIL	27	Tamacinna	2	5	1	AF	22 bulan	1	2800 gram	0	0	8	0.15	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	72	3.21	2	1	2	3	1
138	SAN	28	Tamacinna	2	6	1	DK	27 bulan	1	3000 gram	0	0	12	0.12	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	64	5.12	2	1	3	3	1
139	HNH	29	Bonto Boddia	2	6	1	AF	12 bulan	1	3100 gram	0	0	12	0.14	1	1	1	3	3	1	1	1	0	3	1	4	0	0	0	0	0	81	4.32	3	1	2	2	1
140	HSB	30	Bonto Boddia	2	6	1	AK	10 bulan	1	3200 gram	0	0	9	0.12	1	1	1	3	3	2	1	1	0	3	1	4	1	1	0	2	2	70	4.23	3	1	2	2	1
141	BAY	34	Bonto Boddia	2	5	1	NI	11 bulan	2	3300 gram	0	0	9	0.13	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	3.21	2	1	3	3	1
142	STR	32	Bonto Boddia	2	5	1	ME	24 bulan	2	2900 gram	0	0	12	0.12	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	5.32	3	1	3	3	1
143	FIT	34	Bonto Manai	2	5	1	EA	22 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.11	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4.32	3	1	2	3	1
144	BAD	35	Bonto Manai	2	3	1	RZ	27 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.14	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	3.45	3	1	2	2	1
145	RUG	32	Bonto Manai	2	3	1	KH	29 bulan	2	2600 gram	0	0	9	0.12	1	1	1	2	3	2	1	1	0	3	1	4	1	1	0	3	2	64	2.67	2	1	3	2	1
146	UMM	32	Bonto Manai	2	4	1	DH	33 bulan	2	2700 gram	1	1	8	0.13	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	2	72	5.32	2	1	3	2	1
147	HIK	31	Bonto Manai	2	3	1	NR	34 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.11	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	4.34	2	1	3	3	1
148	BUR	30	Bonto Manai	2	5	1	WR	38 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.21	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5.64	3	1	2	3	1
149	ZAH	29	Bonto Manai	2	5	1	AT	12 bulan	2	2900 gram	1	1	6	0.09	1	1	1	3	3	2	1	2	0	3	1	4	0	0	0	0	0	60	3.45	2	1	2	2	1
150	NIS	28	Bonto Manai	2	6	1	AS	11 bulan	2	2900 gram	0	1	6	0.18	1	1	1	3	3	2	1	2	1	1	1	4	0	0	0	0	0	64	4.67	3	1	2	2	1
151	BUS	28	Panciro	2	5	1	RS	23 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.13	1	1	1	2	3	2	1	2	1	1	1	4	0	0	0	0	0	90	3.25	2	1	2	2	1
152	NUR	23	Panciro	2	3	1	NR	28 bulan	2	3000 gram	0	1	8	0.15	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	72	3.54	3	1	2	3	1
153	HAS	26	Panciro	2	4	1	MI	26 bulan	2	2800 gram	0	0	12	0.25	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	3.21	2	1	2	3	1
154	SAB	35	Panciro	2	3	1	HS	24 bulan	1	2900 gram	0	0	12	0.22	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	4.32	2	1	3	2	1
155	TEN	38	Panciro	2	4	1	HT	50 bulan	2	3000 gram	0	0	15	0.19	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	2.67	3	1	3	3	1
156	MIA	28	Panciro	2	4	1	FS	26 bulan	1	2700 gram	0	0	9	0.15	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	3.65	2	1	2	2	1
157	KIA	30	Panciro	2	5	1	FJ	27 bulan	1	3200 gram	0	0	12	0.13	1	1	1	2	2	1	1	2	0	2	1	4	0	0	0	0	0	72	2.86	2	1	2	3	1

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
158	ARI	27	Panciro	2	3	1	RD	58 bulan	1	3100 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	2	3	2	1	1	0	2	1	4	1	1	0	3	2	56	3.15	3	1	2	2	1
159	AWA	25	Panciro	2	6	1	MA	12 bulan	1	2900 gram	0	0	9	0.12	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	81	2.96	2	1	3	3	1
160	SAI	27	Panciro	2	4	1	GR	22 bulan	1	3300 gram	0	0	12	0.19	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	90	3.67	3	1	3	3	1
161	IST	38	Panciro	2	5	1	DL	59 bulan	1	3000 gram	0	0	12	0.23	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	3.54	2	1	3	2	1
162	ZUR	34	Panciro	2	4	1	IL	50 bulan	1	3200 gram	0	0	12	0.15	1	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	3.15	2	1	3	3	1
163	UDA	32	Panciro	2	3	1	AN	49 bulan	2	2800 gram	0	1	8	0.12	1	1	1	1	3	2	1	1	0	2	1	4	1	1	0	2	2	64	2.56	2	1	2	3	1
164	IDA	28	Panciro	2	5	1	MA	25 bulan	1	2900 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	2	2	81	2.95	2	1	2	2	1
165	HAN	29	Panciro	2	6	1	DA	27 bulan	2	2700 gram	0	0	9	0.19	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	74	3.25	2	1	2	3	1
166	UNA	37	Panciro	2	3	1	MA	30 bulan	2	2700 gram	0	0	12	0.23	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	80	3.15	2	1	2	2	1
167	IRA	33	Panciro	2	4	1	BA	28 bulan	2	2900 gram	0	0	9	0.25	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2.85	2	1	2	2	1
168	MIL	26	Panciro	2	3	1	CI	26 bulan	2	2600 gram	0	1	9	0.13	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	0	3	2	63	2.46	2	1	2	3	1
169	UMI	28	Panciro	2	3	1	RA	32 bulan	2	2800 gram	0	0	12	0.18	1	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	66	2.58	2	1	2	1	2
170	NDI	31	Panciro	2	4	1	NU	31 bulan	2	3000 gram	0	0	12	0.18	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	96	3.25	3	1	3	3	1
171	HIR	27	Panciro	2	5	1	IA	33 bulan	2	2800 gram	0	0	12	0.25	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	72	2.56	2	1	2	3	1
172	LMA	26	Panciro	2	4	1	AN	29 bulan	2	2700 gram	0	1	9	0.13	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	0	2	2	63	2.45	2	1	2	2	1
173	TIA	29	Panciro	2	3	1	CH	34 bulan	2	2800 gram	0	0	15	0.23	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	81	3.15	3	1	3	1	2
174	MUN	27	Panciro	2	3	1	RA	37 bulan	1	3000 gram	0	0	16	0.25	1	1	1	2	3	1	1	1	0	2	1	4	1	1	0	2	2	96	4.15	3	1	2	2	1
175	NDI	25	Panciro	2	5	1	IM	36 bulan	1	3100 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2.85	2	1	3	3	1
176	SRI	30	Tamacinna	2	5	1	BA	30 bulan	1	3400 gram	0	0	12	0.18	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	2.25	2	1	2	3	1
177	MIL	29	Tamacinna	2	4	1	DH	35 bulan	2	2900 gram	0	0	9	0.15	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	80	3.23	2	1	2	1	2
178	SYI	31	Tamacinna	2	3	1	TR	25 bulan	2	2600 gram	0	1	8	0.09	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	90	3.67	3	1	2	3	1

No	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	KH1	KH2	KH3	KH4	KH5	KH6	KH7	KH8	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KM1	KM2	KM3	KM4	KM5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
179	SIR	28	Tamacinna	2	5	1	SR	29 bulan	2	2800 gram	0	0	12	0.19	1	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	72	2.86	2	1	2	1	2
180	RIA	31	Tamacinna	2	4	1	UL	27 bulan	1	2900 gram	0	0	12	0.22	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	63	2.25	2	1	2	2	1
181	MAN	29	Tamacinna	2	3	1	DR	26 bulan	1	3100 gram	0	0	12	0.18	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	88	2.78	2	1	2	3	1
182	ERI	27	Tamacinna	2	3	1	DI	28 bulan	1	3000 gram	0	0	9	0.15	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	2.15	2	1	3	2	1
183	GHR	32	Tamacinna	2	4	1	NR	32 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.19	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	3.15	3	1	3	1	2
184	IY	34	Bonto Ramba	2	5	1	RD	37 bulan	1	2900 gram	0	0	12	0.22	1	1	1	2	3	1	1	1	0	2	1	4	1	1	0	2	2	81	3.54	3	1	2	3	1
185	RUL	29	Bonto Ramba	2	5	1	AN	35 bulan	2	3000 gram	0	0	16	0.25	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	77	2.89	2	1	2	1	2
186	DAY	37	Bonto Ramba	2	4	1	UD	31 bulan	1	3000 gram	0	0	12	0.23	1	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2.65	2	1	2	3	1
187	JIR	30	Bonto Ramba	2	3	1	US	34 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.18	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	90	3.65	3	1	2	2	1
188	SAA	28	Bonto Ramba	2	5	1	PT	32 bulan	2	2800 gram	0	0	9	0.19	1	1	1	2	3	2	1	1	0	2	1	4	0	0	0	0	0	96	4.15	3	1	3	2	1
189	NIA	29	Bonto Ramba	2	4	1	IN	29 bulan	2	2900 gram	0	0	12	0.22	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	74	2.76	2	1	2	3	1

### Keterangan Master Tabel

IR1 : Nama responden

IR2 ; Umur

IR3 : Jenis kelamin

1 : Laki-Laki

2 : Perempuan

IR4 : Alamat

IR5 : Jumlah anggota keluarga

IR6 : Hubungan dengan balita

1 : Ibu

2 : Nenek

3 : Ayah

IB1 : Nama balita

IB2 : Umur balita

IB3 : Jenis kelamin

IB4 : Berat badan waktu lahir

IB5 : Pernah Mengalami BBLR

1 : Iya

0 : Tidak

IB6 : Status Pneumonia

1 : Iya

0 : Tidak

KH1 : Luas Kamar (m<sup>2</sup>)

KH2 : Luas Ventilasi kamar (m<sup>2</sup>)

KH3 : Apakah kamar ibu mempunyai jendela kamar tidur?

1 : Iya

2 : Tidak

KH4 : Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?

1 : Iya

0 : Tidak

KH5 : Kapan ibu membuka jendela kamar tidur balita?

1 : Pagi 3 : Sore

2 : Siang 4 : Malam

KH6 : Berapa lama ibu membuka jendela kamar tidur balita?

1 = 1-2 jam 2 = 3-6 jam 3 = >6 jam

KH7 : Jumlah orang yang tidur sekamar dengan balita?

KH8 : Luas kamar 8m<sup>2</sup>/2 orang ?

1 : Memenuhi Syarat 2 : Tidak memenuhi syarat

KO1 : Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari?

1 : Iya

0 : Tidak

KO2 : Jenis obat anti nyamuk apa yang ibu gunakan?

1 : Obat anti nyamuk bakar

2 : Obat anti nyamuk semprot

3 : Obat anti nyamuk elektrik

KO3 : Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?

1 : Iya

0 : Tidak

KO4 : Dimana biasanya ibu menggunakan obat anti nyamuk ?

1 : Di kamar tidur balita

2 : Di ruang tamu

3 : Di ruang keluarga

KO5 : Berapa kali ibu menggunakan obat anti nyamuk dalam sehari?

1 = 1 kali 2 = 2 kali 3 = 3 kali 4 = 4 kali

KO6 : Kapan ibu menggunakan obat anti nyamuk?

1 : pagi hari

2 : siang hari

3 : sore hari

4 : malam hari

KM1 : Apakah ada anggota keluarga yang merokok?

1 : Iya

0 : Tidak

KM2 : Berapa banyak orang yang merokok dalam rumah?

1 = 1-2 orang

2 = 3-5 orang

3 = >5 orang

KM3 : Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?

1 : Iya

0 : Tidak

KM4 : Berapa batang rokok yang biasa dihisap dalam sehari?

1 = <5 batang/hari

2 = 5-10 batang/hari

3 = >10 batang/hari

KM5 : Jenis rokok yang dihisap?

1 : Kretek

2 : Filter

3 : Lainnya...

V1 : Luas lantai rumah (m<sup>2</sup>)

V2 : Luas ventilasi rumah (m<sup>2</sup>)

V3 : Berapa banyak ventilasi dalam rumah?

1 = 1-3 buah

2 = 4-6 buah

3 = >6 buah

V4 : Apakah ibu memiliki jendela?

1 : Iya

0 : Tidak

V5 : Berapa banyak jendela dalam rumah?

1 = 1-3 buah

2 = 4-5 buah

3 = >5 buah

V6 : Apakah ibu sering membuka jendela rumah?

1 : Iya

0 : Tidak

V7 : Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah

1 : Memenuhi syarat

2 : Tidak memenuhi syarat



**LAMPIRAN 4**

**Frequency Table**

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-27 tahun	55	29.1	29.1	29.1
	28-37 tahun	115	60.8	60.8	89.9
	38-47 tahun	14	7.4	7.4	97.4
	48-57 tahun	3	1.6	1.6	98.9
	58-67 tahun	2	1.1	1.1	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Jumlah anggota keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	47	24.9	24.9	24.9
	4	51	27.0	27.0	51.9
	5	51	27.0	27.0	78.8
	6	25	13.2	13.2	92.1
	7	7	3.7	3.7	95.8
	8	6	3.2	3.2	98.9
	15	2	1.1	1.1	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Hubungan dengan balita**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ibu	179	94.7	94.7	94.7
	nenek	10	5.3	5.3	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	89	47.1	47.1	47.1
	Perempuan	100	52.9	52.9	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Usia balita**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-12 bulan	57	30.2	30.2	30.2
	13-24 bulan	36	19.0	19.0	49.2
	25-37 bulan	69	36.5	36.5	85.7
	38-59 bulan	27	14.3	14.3	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	177	93.7	93.7	93.7
	Ya	12	6.3	6.3	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Status Pneumonia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	140	74.1	74.1	74.1
	Ya	49	25.9	25.9	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Luas kamar 8m<sup>2</sup>/2 orang**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	66	34.9	34.9	34.9
	Tidak memenuhi syarat	123	65.1	65.1	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	114	60.3	60.3	60.3
	Ya	75	39.7	39.7	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	147	77.8	77.8	77.8
	Ya	42	22.2	22.2	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

**Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi Syarat	157	83.1	83.1	83.1
	Tidak memenuhi syarat	32	16.9	16.9	100.0
	Total	189	100.0	100.0	

M A K A S S A R

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram? * Status Pneumonia	189	100.0%	0	0.0%	189	100.0%

### Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram? \* Status Pneumonia Crosstabulation

Count

		Status Pneumonia		Total
		Tidak	Ya	
Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	Tidak	136	41	177
	Ya	4	8	12
Total		140	49	189

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.075 <sup>a</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.925	1	.003		
Likelihood Ratio	9.444	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	11.016	1	.001		
N of Valid Cases	189				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.11.

b. Computed only for a 2x2 table

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Luas kamar 8m2/2 orang * Status Pneumonia	189	100.0%	0	0.0%	189	100.0%

### Luas kamar 8m2/2 orang \* Status Pneumonia Crosstabulation

Count		Status Pneumonia		Total
		Tidak	Ya	
Luas kamar 8m2/2 orang	Memenuhi syarat	59	7	66
	Tidak memenuhi syarat	81	42	123
Total		140	49	189

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.394 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	11.198	1	.001		
Likelihood Ratio	13.747	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	12.328	1	.000		
N of Valid Cases	189				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.11.

b. Computed only for a 2x2 table

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari? * Status Pneumonia	189	100.0%	0	0.0%	189	100.0%

### Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari? \* Status Pneumonia Crosstabulation

Count		Status Pneumonia		Total
		Tidak	Ya	
Apakah ibu sering menggunakan obat anti nyamuk setiap hari?	Tidak	103	11	114
	Ya	37	38	75
Total		140	49	189

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39.632 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	37.525	1	.000		
Likelihood Ratio	40.018	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	39.422	1	.000		
N of Valid Cases	189				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.44.

b. Computed only for a 2x2 table

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah * Status Pneumonia	189	100.0%	0	0.0%	189	100.0%

### Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah \* Status Pneumonia

Count

		Status Pneumonia		Total
		Tidak	Ya	
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	120	37	157
	Tidak memenuhi syarat	20	12	32
Total		140	49	189

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.687 <sup>a</sup>	1	.101		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.011	1	.156		
Likelihood Ratio	2.527	1	.112		
Fisher's Exact Test				.122	.081
Linear-by-Linear Association	2.673	1	.102		
N of Valid Cases	189				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.30.

b. Computed only for a 2x2 table

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita? * Status Pneumonia	189	100.0%	0	0.0%	189	100.0%

### Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita? \* Status Pneumonia Crosstabulation

Count		Status Pneumonia		Total
		Tidak	Ya	
Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?	Tidak	121	26	147
	Ya	19	23	42
Total		140	49	189

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23.381 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	21.490	1	.000		
Likelihood Ratio	21.294	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	23.257	1	.000		
N of Valid Cases	189				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.89.

b. Computed only for a 2x2 table

## Crosstabs

### Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? \* Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?

#### Crosstab

		Count	Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	
			Tidak	Ya
Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	Tidak	Count	131	10
		% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	92.9%	7.1%
	Ya	Count	46	2

	% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	95.8%	4.2%
Total	Count	177	12
	% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	93.7%	6.3%

### Crosstab

			Total
Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	Tidak	Count	141
		% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	100.0%
	Ya	Count	48
		% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	100.0%
Total	Count		189
	% within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?		100.0%

### Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah \* Luas kamar 8m2/2 orang

### Crosstab

			Luas kamar 8m2/2 orang Memenuhi syarat
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	55
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	35.0%
	Tidak memenuhi syarat	Count	11
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	34.4%
Total	Count		66
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah		34.9%

### Crosstab

			Luas kamar 8m2/2 orang Tidak memenuhi syarat
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	102
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	65.0%
	Tidak memenuhi syarat	Count	21
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	65.6%
Total	Count		123
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah		65.1%

### Crosstab

		Total	
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	157
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%
	Tidak memenuhi syarat	Count	32
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%
Total	Count	189	
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%	

### Crosstabs

**Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram? \***  
**Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?**

### Crosstab

		Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	
		Tidak	Ya
Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	Tidak	Count	131
		% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	74.0%
	Ya	Count	10
		% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	83.3%
Total	Count	141	
	% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	74.6%	
		46	2
		26.0%	16.7%
		48	25.4%

### Crosstab

		Total	
Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	Tidak	Count	177
		% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	100.0%
	Ya	Count	12
		% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	100.0%
Total	Count	189	
	% within Apakah balita pernah mengalami berat badan <2.500 gram?	100.0%	

## Crosstabs

**Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah \* Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?**

### Crosstab

		Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?	
		Tidak	
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	125
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	79.6%
	Tidak memenuhi syarat	Count	22
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	68.8%
Total	Count	147	
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	77.8%	

### Crosstab

		Apakah anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?	
		Ya	
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	32
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	20.4%
	Tidak memenuhi syarat	Count	10
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	31.3%
Total	Count	42	
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	22.2%	

### Crosstab

		Total	
Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	Memenuhi Syarat	Count	157
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%
	Tidak memenuhi syarat	Count	32
		% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%
Total	Count	189	
	% within Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	100.0%	

## Crosstabs

**Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? \* Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah**

### Crosstab

		Luas ventilasi 10% dari luas lantai rumah	
		Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	Tidak	Count 120 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 85.1%	21 14.9%
	Ya	Count 37 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 77.1%	11 22.9%
Total		Count 157 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 83.1%	32 16.9%

### Crosstab

			Total
Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita?	Tidak	Count 141 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 100.0%	141
	Ya	Count 48 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 100.0%	48
Total		Count 189 % within Apakah ibu menggunakan obat anti nyamuk tersebut di sekitar balita? 100.0%	189

## Crosstabs

Luas kamar 8m2/2 orang \* Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?

### Crosstabulation

		Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?	
		Tidak	
Luas kamar 8m2/2 orang	Memenuhi syarat	Count	6
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	9.1%
	Tidak memenuhi syarat	Count	33
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	26.8%
Total		Count	39
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	20.6%

Luas kamar 8m2/2 orang \* Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?

### Crosstabulation

		Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?	
		Ya	
Luas kamar 8m2/2 orang	Memenuhi syarat	Count	60
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	90.9%
	Tidak memenuhi syarat	Count	90
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	73.2%
Total		Count	150
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	79.4%

Luas kamar 8m2/2 orang \* Apakah ibu biasa membuka jendela kamar tidur balita?

### Crosstabulation

		Total	
Luas kamar 8m2/2 orang	Memenuhi syarat	Count	66
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	100.0%
	Tidak memenuhi syarat	Count	123
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	100.0%
Total		Count	189
		% within Luas kamar 8m2/2 orang	100.0%

## LAMPIRAN 5

### DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA TAHUN 2019

#### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>11%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>jurnal.fk.unand.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>journal.fkm.ui.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>docobook.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

M A K A S S A R

9	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## LAMPIRAN 6



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 61 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841829 Fax (0411) 8221400 Sarepta, Gowa

Nomor : B-1827 /FKIK/PP.00.9/05/2019  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 15 Mei 2019

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa  
di-  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Iffah  
NIM : 70200115097  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Judul : Penanggulangan Penyakit Pneumonia Pada Balita Berbasis Partisipasi di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data di Puskesmas Bajeng Kab. Gowa.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Nip. 19810405 200604 2 003

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Nip. 19810405 200604 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

LAMPIRAN 7

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 25 Januari 2019

Nomor : 070/064 /BKB.P/2019  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Kepada  
Yth. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa

Di-  
Tempat

Surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor: B-441/FKIK/PP.00.9/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Rekomendasi Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NURUL HFAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 28 Januari 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Tala'salampang 2 Blok. H1

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN DAN JUMLAH BAKTERI PATOGEN DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA**"

Selama : 26 Januari s/d 3 Februari 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menanti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA  
KEPALA BADAN,  
  
DRS. BAHARUDDIN.T  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600124 197911 1 001

Terlampir  
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);  
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Perizinan-

## LAMPIRAN 8



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30, Telepon. 884637, Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 16 Mei 2019

Nomor : 070/ 557 /BKB.P/2019

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Kepada

Yth. Ka. Puskesmas Bajeng

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik FKIK UIN Alauddin Makassar Nomor:B-1828/FKIK/PP.00.9/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Rekomendasi Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL IFFAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 28 Januari 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Tala'salampang 2 Blok HI No, 2

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian penyelesaian Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"PENANGGULANGAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA BERBASIS PARTISIPASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA"**

Selama : 16 s/d 23 Mei 2019  
Pengkiran : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN  
Sekretaris,



**Tembusan:**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.-

LAMPIRAN 9



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax (0411) 864923 Makassar  
 Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.217 /KEPK/FKIK/IX/2019  
 Judul Penelitian : Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019  
 Nama Peneliti : Nurul Iffah  
 No. Register

U	I	N	A	M	I	9	0	9	0	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b. Tidak ( terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar , 9/September 2019

Ketua

**Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.**  
 NIP. 195802011983121001



LAMPIRAN 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa  
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1363/FKIK/PP.00.9/09/2019

Gowa, 12 September 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.

Gubernur Prov. Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sulawesi Selatan  
di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*


Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Ifah  
NIM : 70200115097  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Penelitian : Determinan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019.  
Dosen Pembimbing : 1.Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.  
2.Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Nur Hidayah

Tembusan:  
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

LAMPIRAN 11

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 3 3 7 1

Nomor : 23001/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2383/FKIK/PP.00.9/09/2019 tanggal 12 September 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURUL IFFAH  
Nomor Pokok : 70200115097  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :  
" DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA TAHUN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 September s/d 21 Oktober 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 13 September 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 196105131990021002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Peninggiat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

SIMP PTSP 13-09-2019

 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90222



## LAMPIRAN 12



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 16 September 2019

Nomor : 070/1338 /BKB.P/2019  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Bajeng

Di-  
Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 23001/S.01/PTSP/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL IFFAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 28 Januari 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (D3)  
Alamat : Tala'Salapang 2 Blok H1 No 2

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA 2019"**

Selama : 17 September s/d 21 Oktober 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA BADAN,**  
**Sekretaris,**

  
**DRS. ALWI ARIFIN, M. SI**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP : 19670808 198811 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Pertinggal;

## LAMPIRAN 13



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**KECAMATAN BAJENG**  
Jl. Masjid Raya No. 29 Limbung No. Telp (0411) 842037

### REKOMENDASI

Nomor : 070/1398 / Um

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kab. Gowa Nomor : 070/1398/BKB.P/2019 Tanggal 16 September 2019 tentang Rekomendasi Penelitian, maka kepada yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **NURUL IFFAH**  
Tempat / Tanggal lahir : Makassar, 28 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (D3)  
Alamat : Tala'Salampang 2 Blok H1 No. 2

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data/Survey Data dan wawancara dengan judul : **"DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJEN KABUPATEN GOWA 2019"**

Selama : 17 September s/d 21 Oktober 2019

Pengikut Peserta : Tidak Ada

Demikian izin rekomendasi/penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbung, 16 September 2019

  
An. Camat  
Sekcam  
**MUHTAHR. T. S Sos**  
NIP. 196211221982031001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan ;
4. Peninggal.

## Lampiran 14



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAJENG**  
Jl. Pramuka No. 1 Telp. (0411) 842033-8204224 Limbung  
KEC. BAJENG KAB. GOWA 92152  
Email : pmbajenglimbunggo@gmail.com



### **REKOMENDASI**

Nomor : 440.1/ PKM-BJ/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menegaskan bahwa

Nama : **NURUL IFFAH**  
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 28 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)  
Alamat : Tala'salampang 2 Blok III No 2

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Dalam Wilayah Kerja Bajeng Berdasarkan Rekomendasi Kecamatan Bajeng Pemerintah kab. Gowa Nomor : 070.37/Lim, Tanggal 16 September 2019, Tentang Rekomendasi Penelitian Dengan Judul :  
**" DETERMINAN KEJADIAN PENYAKIT PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA 2019"**

Waktu pelaksanaan : 17 September s.d 21 Oktober 2019

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Limbug, 21 Oktober 2019  
Kepala Puskesmas Bajeng

**Dr. NURWAHYUDI**  
Pangkat : Penata Tk. 1, III/d  
Nip. 198208282010011026

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa ( Seb. Laporan )
2. Arsip

## Lampiran 15



**Nurul Iffah** akrab dipanggil iffah, lahir di Makassar, 28 Januari 1998 anak kelima dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Muh. Saad Asaf dan Sitti Akirah. Mengawali Pendidikan, penulis mulai mengayam Pendidikan pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak Aisyiah Sinjai Utara dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Gunung Sari 1 Makassar pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan SMP di MTs Negeri Makassar hingga tahun 2012 semasa SMP penulis mengikuti organisasi IRMAS (Ikatan Remaja Mesjid As'sadah). . Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA di MAN 2 Makassar hingga tahun 2015 semasa SMA penulis mengikuti organisasi KIR (Karya Tulis Ilmiah Remaja). Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Kesehatan Masyarakat dan mengambil konsentrasi Kesehatan Lingkungan dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Semasa kuliah penulis pernah bergelut dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat periode 2016-2017.