

**DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI
PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA
TAHUN 2019**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WAHIDATUL HUSNA
70200115001
ALAUDDIN
MAKASSAR

**GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidatul Husna
NIM : 70200115001
Tempat/Tgl Lahir : Majannang, 20 Juni 1997
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Gizi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Determinan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas
Bajeng Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata- Gowa, 02 November 2019

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Wahidatul Husna
NIM: 70200115001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Determinan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng Tahun 2019**", yang disusun oleh **Wahidatul Husna, NIM: 70200115001**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 06 November 2019 M
8 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(..... 
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(..... 
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(..... 
Pembimbing II	: Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes	(..... 
Penguji I	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(..... 
Penguji II	: Dr. H. Muh. Ilham, M. Pd	(..... 

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UNIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kuasa-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Juga tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Orang Tua, Ayahanda B.Dg.Rukka dan Ibunda Nursia serta saudara-saudaraku yang telah mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan nasehat, dukungan baik dari segi moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat.

Penulisan hasil penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd.Madjid HR.Lagu , SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Ibu Syarfaini, SKM., M.Kes sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.

5. Ibu Irviani A Ibrahim, SKM., M.Kes sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
6. Ibu Sukftrianty Syahrir,SKM., M.Kes sebagai penguji I yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
7. Bapak Dr. H.M. Ilham., M.Pd sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis.
9. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
10. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
11. Para Staf bagian KIA Puskesmas Bajeng dan Masyarakat Bajeng yang telah banyak memberikan bantuan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman tercinta angkatan 2015 (Covivera) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman tercinta Peminatan Gizi 2015 sebagai teman seperjuangan dan yang selalu ada ketika dibutuhkan
14. Teman-teman KKN Penulis Dilla,Dia,Itadan khususnya Arya yang selalu siap mendengar keluh kesah dan membantu penyusunan skripsi penulis.


15. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan, karena tanpa bantuan mereka penulis tidaklah mampu menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata-Gowa, Oktober 2019

Penulis

Wahidatul Husna
NIM. 70200115001



DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian	15
G. Manfaat Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Anemia Pada Ibu Hamil.....	17
B. Tinjauan Umum Asupan Makanan	34
C. Tinjauan Umum Pola Makan	38
D. Tinjauan Umum Penyakit Infeksi	40
E. Tinjauan Umum Perdarahan	41
F. Kerangka Teori.....	43
G. Kerangka Konsep	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Populasi	46
D. Sampel dan Teknik Sampling	46
E. Kriteria Retruksi.....	48

F. Teknik Pengambilan Data	49
G. Instrument Penelitian	50
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	53
1. Gambaran Umum Lokasi	53
2. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	66
1. Riwayat Penyakit Infeksi	66
2. Riwayat Pendarahan	68
3. Asupan Protein	70
4. Asupan Vitamin C	73
5. Asupan Zat Besi (Fe)	76
6. Pola Makan	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penggolongan Status Anemia Ibu Hamil	19
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa	55
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	55
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	56
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	57
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Pendarahan di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	57
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	58
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	59
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Fe di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	59
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.....	60

Tabel 4.10	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng.....	61
Tabel 4.11	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Riwayat Pendarahan Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng	62
Tabel 4.12	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Protein Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng.....	63
Tabel 4.13	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Vitamin C Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng	64
Tabel 4.14	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Fe Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng.....	65
Tabel 4.15	Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Pola Makan Pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	43
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Identitas Responden
- Lampiran 3 Lembar *Food Recall* 24 Jam
- Lampiran 4 *Semi Quantitative- Food Frequency Questionnaire*
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Master Tabel
- Lampiran 7 Hasil Analisis Dengan Menggunakan SPSS Versi 2.5
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



ABSTRAK

Nama : Wahidatul Husna
NIM : 70200115001
Judul : **Determinan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Bajeng Tahun 2019**

Anemia merupakan kondisi di mana kadar Hemoglobin kurang dari normal. Anemia dalam kehamilan merupakan kondisi ibu di mana kadar Hemoglobin di bawah 11 gr/dl. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian *analitik observasional* dengan desain *case control*. Jumlah sampel sebanyak 64 orang dengan pengambilan sample secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan riwayat penyakit infeksi mempunyai resiko 7 kali lebih besar mengalami anemia dibanding yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi (OR=7,154), riwayat perdarahan mempunyai resiko 2 kali lebih besar mengalami anemia dibanding yang tidak memiliki riwayat perdarahan (OR=2,333), asupan protein yang kurang mempunyai resiko 5 kali lebih besar mengalami anemia dibanding asupan protein yang cukup (OR=5,000), asupan Vitamin C 2 kali dapat mengurangi dampak terjadinya anemia pada ibu hamil (OR=2,143), asupan Fe yang kurang mempunyai resiko 1 kali lebih besar mengalami anemia banding dengan asupan Fe yang cukup (OR=1,457), pola makan yang buruk mempunyai resiko 1 kali lebih besar mengalami anemia dibanding pola makan yang baik (OR=1,462). Jadi disarankan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya agar mengetahui status kesehatannya secara dini.

Kata Kunci: Anemia,Asupan Makan,Pola Makan, Penyakit Infeksi, Perdarahan

THE DETERMINANTS OF ANEMIA IN PREGNANCY IN BAJENG HEALTH CENTRE IN 2019

¹ Wahidatul Husna, ² Syarfaini, ³ Irviani Ibrahim

^{1,2,3} Nutrition, Public Health Department.

Alauddin State Islamic University of Makassar

wahidatulhusna934@gmail.com

ABSTRACT

Anemia in pregnancy is a condition where the haemoglobin level is below 11 gr/dl. This research investigates the determinants of anemia in pregnancy in Bajeng Health Centre in 2019. It uses observational analytic approach with case control as the research design. The research samples consist of 64 pregnant women who are selected by using purposive sampling technique. The findings show a history of infectious disease puts pregnant mothers on the risk for anemia 7 times at higher (OR=7,154). Pregnant women with a history of haemorrhage are at risk of anemia twice higher than those without one (OR=2,333). Protein intake deficit also increases the risk for pregnant women to have anemia by 5 times (OR=5,000), while vitamin C intake can lower its risk by twice (OR=2,143). Additionally, Fe intake deficit also increase the risk for anemia by 1 time (OR=1,457). The same fact also applies to poor eating patterns that can increase the risk for anemia by 1 time (OR=1,462). Therefore, this research recommends that pregnant women attend pregnancy check-ups regularly to monitor their health condition and prevent undesirable complications.

Keywords : anemia, food intake, eating patterns, infectious disease, hemorrhage



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu wilayah. Berdasarkan pada survey Demografi Kesehatan Ibu tahun 2012, AKI di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target *Millennium Development Goals* (MDG's) yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu dengan persentase tertinggi adalah perdarahan (28%). Anemia dan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil merupakan penyebab utama terjadinya Perdarahan (Kemenkes RI, 2014).

Menurut *World Health Organization* (WHO) prevalensi anemia pada ibu hamil secara global telah mencapai 41,8%. Di daerah Asia sendiri prevalensi ibu hamil diperkirakan sebesar 48,2% dan Afrika sebesar 57,1% (Shandra, 2018). Indonesia masih termasuk ke dalam negara dengan tingkat kesehatan yang rendah, karena masih tingginya angka kematian pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki resiko kematian hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Anemia dalam kehamilan memiliki keterkaitan yang erat dengan keadaan janin, abortus, cacat bawaan, berat bayi lahir rendah, cadangan zat besi yang berkurang pada anak atau anak lahir dalam keadaan anemia gizi. Kondisi ini menyebabkan angka kematian perinatal masih tinggi, demikian pula dengan mortalitas dan morbiditas pada ibu. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perdarahan pada saat persalinan yang

merupakan penyebab utama kematian ibu hamil/bersalin di Indonesia (Depkes RI, 2001).

Dari data Riskesdas tahun 2007 mendapatkan prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 24,5%, tahun 2010 prevalensi anemia pada ibu hamil masih tetap bertahan pada 24,5% dan Riskesdas tahun 2013 terjadi peningkatan yakni tercatat 37,1% ibu hamil mengalami anemia (Riskesdas, 2013). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dari 23.839 ibu hamil yang diperiksa kadar Hemoglobinnya, terdapat 23.478 (98,49%) dengan kadar Hb 8-11 mg/dl dan 361 (1,15%) ibu hamil dengan kadar Hb < 8 mg/dl.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada tahun 2017, terdapat 4013 ibu hamil yang mengalami anemia. Dari 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Gowa prevalensi anemia tertinggi terdapat di Puskesmas Somba Opu dengan 698 kasus anemia, Puskesmas Bajeng dengan 477 kasus anemia dan Puskesmas Pallangga dengan 349 kasus anemia (Data Binkesmas Kabupaten Gowa, 2018)

Pada tahun 2017, dari 929 ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, tercatat 81 ibu hamil yang mengalami anemia di Puskesmas Bajeng dan pada Desember tahun 2018 mengalami peningkatan yakni tercatat 477 ibu hamil anemia dengan 11 ibu hamil mengalami anemia berat dan 466 dengan anemia sedang dari 1042 ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya (Data Binkesmas Kabupaten Gowa, 2018).

Data yang diperoleh dari rekam medik Puskesmas Bajeng tahun 2019 periode April-Mei 2019 tercatat 201 yang memeriksakan kehamilannya dan

terdapat 52 yang menderita anemia dengan 11 kasus di Desa Maradekayya, 8 kasus di Desa Panyangkalang, 5 kasus di Desa Panciro, 6 kasus di Kelurahan Limbung, 4 kasus di Desa Tangkabajeng dan Bontosunggu, 3 kasus di Kelurahan Bone dan Tubajeng, 3 kasus di Desa Mataallo dan Maccinibaji serta 1 kasus di Desa Lempangan dan Kalebajeng.

Sebagian besar anemia pada ibu hamil adalah anemia karena kekurangan zat besi. Anemia gizi besi pada ibu hamil pada umumnya disebabkan oleh perubahan fisiologis karena kehamilan yang diperberat karena kekurangan zat gizi, seperti vitamin B1, asam folat dan Vitamin C (Zakaria, 2014).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua yakni faktor pangan dan non-pangan. Faktor pangan adalah faktor di mana kurangnya asupan zat besi dari makanan, dan juga rendahnya tingkat penyerapan zat besi dari makanan. Komposisi makanan masyarakat yang lebih banyak mengandung faktor-faktor yang dapat menghambat penyerapan zat besi (*inhibitor factors*) seperti serat, fitat maupun tanin menjadi penyebab rendahnya tingkat penyerapan zat besi ke dalam tubuh. Sedangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi seperti vitamin C dan protein hewani sangat sedikit proporsinya dalam makanan sehari-hari. Faktor non-pangan yang menjadi penyebab terjadinya anemia defisiensi besi diantaranya penyakit yang disebabkan oleh parasit (malaria dan kecacingan) serta perdarahan (Fadlilah, 2009).

Hasil penelitian Eko,dkk (2012) menunjukkan rata-rata (63%) ibu hamil trimester III mengalami anemia, pola makan ibu hamil pada trimester III rata-rata

(65%) tidak sehat. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Fatimah,dkk (2011) di Kabupaten Maros ditemukan anemia gizi sebesar 79,4% dengan jumlah asupan protein, vitamin C,vitamin B6,zat besi dan zink yang berada di bawah AKG.

Ilmu gizi merupakan pengetahuan tentang asupan makanan dalam hubungannya dengan kesehatan dan proses di mana organisme menggunakan makanan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, bekerjanya anggota dan jaringan tubuh secara normal serta produksi tenaga agar tubuh terhindar dari anemia gizi. Apabila makanan tidak memenuhi kebutuhan akan zat gizi maka akan terjadi masalah kekurangan zat gizi seperti anemia gizi.

Makanan merupakan salah satu kunci kesehatan bagi manusia, di mana makanan tidak hanya menentukan kesehatan masa kini tapi juga menentukan kelangsungan hidup kita masing-masing. Fungsi makanan dalam tubuh sangat banyak, yakni sebagai sumber tenaga, memenuhi kebutuhan pertumbuhan, pemeliharaan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan makanan yang halal baik bahannya maupun cara perolehannya, selain itu juga diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang baik, sesuai dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 1 : 168.

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوطِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

Terjemahan :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”
(Depag, 2010)

Ayat tersebut menjelaskan tentang makanan yang halal lagi baik. Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama. Namun demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Selanjutnya tidak semua yang halal itu bagus untuk kondisi masing-masing. Misal, ada yang halal bagi si A yang memiliki kesehatan tertentu, tetapi tidak baik bagi kondisinya itu. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan saat itu ia menjadi makanan yang kurang baik. (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah vol.1 : 456)

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang determinan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng pada tahun 2019 karena anemia ibu hamil di wilayah kerja puskesmas ini meningkat dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Determinan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Wilayah kerja Puskesmas Bajeng pada tahun 2019”

C. Hipotesis

Untuk mengarahkan penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan maka ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Hipotesis alternatif (H_a) : “ Ada hubungan antara Penyakit Infeksi dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019”

Hipotesis Nol (H_0) : “Tidak ada hubungan antara Penyakit Infeksi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019

2. Hipotesis alternatif (H_a) : “ Ada hubungan antara Riwayat Perdarahan dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019”

Hipotesis Nol (H_0) : “Tidak ada hubungan antara Riwayat Perdarahan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019”.

3. Hipotesis alternatif (H_a) : “ Ada hubungan antara asupan makanan dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019”

Hipotesis Nol (H_0) : “Tidak ada hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019

4. Hipotesis alternatif (H_a) : “ Ada hubungan antara pola makan dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019”

Hipotesis Nol (H_0) : “Tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Penyakit Infeksi, yakni riwayat penyakit malaria dan infeksi kecacingan yang diderita dengan disertakan bukti diagnose responden sebelum hamil dan pada saat pengambilan data dinilai pada jawaban responden pada kuesioner.
 - a) Resiko Tinggi : Jika pernah mengalami penyakit infeksi sebelum hamil
 - b) Resiko Rendah : Jika tidak pernah mengalami penyakit infeksi sebelum hamil
2. Riwayat Perdarahan, yakni pernah mengalami selama masa kehamilan tersebut
 - a) Resiko Tinggi : Jika pernah mengalami Perdarahan
 - b) Resiko Rendah : Jika tidak pernah mengalami perdarahan
3. Anemia adalah hasil pemeriksaan kadar hemoglobin ibu hamil dengan menggunakan teknik Cyanmethemoglobin, dengan kriteria berikut :
 - a) Anemia : Kadar Hb ibu hamil < 11 gr%
 - b) Tidak anemia : Kadar Hb ibu hamil ≥ 11 gr%
4. Asupan Makanan, yaitu makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
 - a) Asupan Protein, yakni jumlah asupan protein yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan diketahui melalui *recall* 24 jam
 - 1) Resiko Rendah (Cukup) : Jika Konsumsi Protein $\geq 80\%$
 - 2) Resiko Tinggi (Kurang) : Jika Konsumsi Protein $< 80\%$
 - b) Asupan Zat Besi, yakni jumlah asupan zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan diketahui melalui *recall* 24 jam


- 1) Resiko Rendah (Cukup) : Jika Konsumsi Fe $\geq 80\%$
 - 2) Resiko Tinggi (Kurang) : Jika Konsumsi Fe $< 80\%$
- c) Asupan Vitamin C, yakni jumlah asupan Vitamin C yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan diketahui melalui *recall* 24 jam
- 1) Resiko Rendah (Cukup) : Jika Konsumsi vitamin C $\geq 80\%$
 - 2) Resiko Tinggi (Kurang) : Jika Konsumsi vitamin C $< 80\%$
5. Pola Makan, yakni informasi tentang gambaran mengenai jenis makanan yang biasa dikonsumsi seseorang. Frekuensi makanan/*food frequency* dinilai dengan skor sebagai berikut :
- a. Skor 50 untuk konsumsi > 1 kali sehari
 - b. Skor 25 untuk konsumsi 1 kali sehari
 - c. Skor 15 untuk konsumsi ≥ 3 kali seminggu
 - d. Skor 10 untuk konsumsi < 3 kali seminggu
 - e. Skor 1 untuk konsumsi jarang
 - f. Skor 0 untuk makanan yang tidak pernah dikonsumsi
 - Buruk jika hasil perhitungan skor food frequency sampel $<$ skor rata-rata seluruh sampel
 - Baik jika hasil perhitungan skor food frequency sampel \geq skor rata-rata seluruh sampel
- (DeWijn,1978).

E. Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Shandra Wahyoenie Syarifuddin (2018)	Gambaran Kejadian anemia dalam kehamilan di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa Tahun 2018.	Penelitian yang menggunakan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian anemia dalam kehamilan di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa.	<p>1. Kejadian anemia berdasarkan umur ibu mayoritas terjadi pada kelompok ibu risiko rendah (20-35 tahun) yaitu sebanyak 33 ibu hamil (62,3%), kebanyakan diantaranya mengalami anemia ringan yaitu sebanyak 30 orang (56,6%).</p> <p>2. Kejadian anemia berdasarkan pendidikan ibu mayoritas terjadi pada ibu berpendidikan rendah yaitu sebanyak 28 orang (52,8%),</p>

				<p>kebanyakan diantaranya mengalami anemia ringan yaitu sebanyak 20 orang (37,7%).</p> <p>3. Kejadian anemia berdasarkan paritas ibu mayoritas terjadi pada risiko tinggi (1 dan > 3 kali) yaitu sebanyak 28 ibu hamil (52,8%), kebanyakan diantaranya mengalami anemia ringan yaitu sebanyak 22 orang (41,5%).</p>
2.	A.St.Bulkis dkk (2013)	Hubungan pola konsumsi dengan status hemoglobin pada ibu hamil di kabupaten Gowa	Jenis penelitian ini dalam penelitian <i>survey analitik</i> dengan rancangan <i>cross sectional</i> . pengambilan sampel dilakukan secara <i>random sampling</i> .	Diantara berbagai faktor penyebab terjadinya anemia, pola konsumsi merupakan faktor yang paling dominan (50%) pengaruhnya terhadap anemia defisiensi besi. Prevalensi anemia yang

		tahun 2013		ditemukan di lokasi penelitian sebesar 37%, angka ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang moderat.
3.	Indah Lisfi dkk (2017)	Hubungan asupan Fe dan vitamin A dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Air Dingin Kota Padang	Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan yang bermakna antara asupan Fe dengan anemia ibu hamil trimester III. 2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan Fe dengan anemia berdasarkan asupan vitamin A pada ibu hamil trimester III.
4.	Hesty Wiarisa dkk (2017)	Perilaku dengan kejadian anemia pada ibu hamil	Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Yaitu untuk melihat hubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Desa Tanjung Niaga

			<p>antara beberapa variabel yaitu variabel dependen dan independen.</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun 2014 dengan <i>P-value</i> =0,0004 dan <i>odds Ratio</i>(OR) = 3,374</p> <p>2. Ada hubungan antara sikap dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun 2014 dengan <i>P-value</i> =0,018 dan <i>odds Ratio</i>(OR) = 0,356</p> <p>3. Ada hubungan antara praktik ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten</p>
--	--	--	--	---

				Melawi tahun 2014 dengan <i>P-value</i> =0,021 dan <i>odds Ratio</i> (OR) = 1,979
5.	Tri Restu Handayani (2017)	Determinan kejadian Anemia defisiensi Zat Besi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Nagaswidak Palembang Tahun 2017	Penelitian ini menggunakan metode analitik observasi dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada hubungan antara umur, paritas, jarak kehamilan dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian Anemia Defisiensi Zat Besi pada ibu hamil di Puskesmas Nagaswidak Palembang. 2. Tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian anemia Defisiensi Zat Besi pada ibu hamil di Puskesmas Nagaswidak Palembang.

				<p>3. Faktor yang paling berhubungan dengan anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil adalah kepatuhan mengonsumsi tablet Fe.</p>
--	--	--	--	---



F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui determinan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui hubungan Penyakit infeksi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019
- b) Untuk mengetahui hubungan Riwayat Perdarahan dengan kejadian anemia di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.
- c) Untuk mengetahui hubungan asupan makanan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019
- d) Untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti

3. Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi institusi Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa mengenai determinan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas tersebut.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan anemia ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Anemia Pada Ibu Hamil

1. Definisi Anemia Pada Ibu Hamil

Anemia didefinisikan sebagai kondisi dimana kadar hemoglobin berada di bawah batas normal. Sebagian anemia di Indonesia disebabkan oleh defisiensi zat besi, oleh karena itu lebih dikenal dengan nama Anemia Gizi Besi. Anemia gizi besi ini merupakan salah satu gangguan yang sering dialami ibu hamil pada masa kehamilannya. Karena kadar hemoglobin yang berada di bawah batas normal maka darah tidak dapat mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Wasnidar, 2007).

Anemia dalam kehamilan merupakan kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gr/dl pada trimester 1 dan 3, dan < 10,5 gr/dl pada trimester 2. Nilai batas tersebut terjadi karena hemodelusi terutama pada trimester ke 2 (Prawirohardjo, 2002). Anemia sering disebut Kurang darah yakni keadaan di mana kadar Hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal (<12 gr/dl) yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh, kemampuan dan konsentrasi belajar, mengambat tumbuh kembang dan akan membahayakan kehamilan nanti (Kemenkes RI, 2010).

Penurunan sedang kadar hemoglobin yang dijumpai selama kehamilan pada wanita sehat yang tidak mengalami defisiensi besi atau asam folat disebabkan oleh penambahan volume plasma yang relative lebih besar daripada penambahan massa hemoglobin dan volume sel darah merah. Ketidakseimbangan yang terjadi

antara kecepatan penambahan plasma dan penambahan eritrosit ke dalam sirkulasi ibu biasanya memuncak pada trimester kedua. Pada kehamilan tahap selanjutnya, ekspansi plasma pada dasarnya berhenti sementara massa hemoglobin terus meningkat (Fatmawati, 2010).

Anemia secara klinik bergantung pada kadar hemoglobin dalam darah. Anemia merupakan suatu keadaan di mana berkurangnya kapasitas pengangkutan oksigen darah yang dapat disebabkan oleh berkurangnya sel darah merah, konsentrasi hemoglobin yang rendah atau kombinasi diantara keduanya. Kemudian disebut anemia dalam kehamilan jika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah 11 g/dl.

Menurut Waryana (2010) anemia dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Anemia gizi besi. Anemia jenis ini biasanya berbentuk normositik dan hipokromik serta keadaan tersebut paling banyak dijumpai pada masa kehamilan.
- b. Anemia megaloblastik. Anemia ini berbentuk makrosistik, anemia jenis ini jarang terjadi, penyebabnya yaitu karena kurangnya asam folat.
- c. Anemia hipoplastik. Anemia ini terjadi karena hipofungsi sumsum tulang dalam membentuk sel-sel darah merah baru.
- d. Anemia hemolitik. Anemia ini terjadi karena penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya (Arisman, 2010).

Menegakkan diagnosa anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan anamnesa. Hasil anamnesa didapatkan dengan keluhan cepat lelah, sering pusing, dan mata berkunang-kunang. Pemeriksaan dan pengawasan Hb

dapat dilakukan dengan menggunakan alat sahli. Pemeriksaan ini dapat dilakukan minimal 2 kali selama masa kehamilan. Hasil pemeriksaan Hemoglobin dengan sahli dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penggolongan Status Anemia Ibu Hamil

Kadar Hemoglobin	Status Anemia
11 g/dl	Normal
9-10 g/dl	Anemia Ringan
7-8 g/dl	Anemia Sedang
< 7 g/dl	Anemia Berat

Sumber : WHO,2002

Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat bayi lahir rendah dan angka kematian perinatal meningkat. Di samping itu, pendarahan *antepartum* dan *postpartum* lebih sering dijumpai pada wanita anemis dan lebih sering berakibat fatal, sebab wanita yang mengalami anemis tidak dapat mentolerir kehilangan darah.

Anemia karena defisiensi zat besi merupakan penyebab utama anemia pada ibu hamil dibandingkan dengan defisiensi zat gizi lain. Oleh karena itu anemia gizi besi pada masa kehamilan sering diidentikkan dengan anemia gizi besi.

Allah berfirman dalam surah al-Mai'dah Ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)

Terjemahan :

“Mereka menanyakan kepadamu : “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah : “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu;kamu mengajarnya menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” (Depag, 2010)

Menurut Sa'id, makna yang dimaksud ialah sembelihan yang halal lagi baik bagi mereka. Menurut Muqatil, yang dimaksud dengan tayyibat adalah segala sesuatu yang dihalalkan untuk mereka memperolehnya, berupa berbagai macam rezeki. Ibnu Wahb mengatakan bahwa Imam Malik pernah ditanya mengenai menjual burung pemangsa, ia menjawab bahwa burung itu bukan termasuk burung yang halal.

1. Etiologi Anemia Dalam Kehamilan

Anemia yang terjadi dalam kehamilan dapat memberikan dampak buruk terutama dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas. Pengaruh yang dapat terjadi karena anemia pada saat kehamilan dapat berupa abortus, persalinan kurang bulan, ketuban pecah dini (KPD). Pengaruh anemia saat persalinan dapat berupa partus lama, gangguan his, kekuatan mengedan serta kala uri memanjang sehingga dapat terjadi retensio plasenta. Pengaruh anemia saat masa nifas adalah berupa subinvolusi uteri, perdarahan post partum, infeksi nifas dan penyembuhan luka perineum lama (Mardliyanti, 2005).

Anemia yang paling sering terjadi pada kehamilan adalah anemia akibat kekurangan asupan zat besi dalam makanan. Gangguan penerapan, dan peningkatan kebutuhan zat besi atau karena terlampaui banyak zat besi yang keluar dari tubuh, misalnya terjadi perdarahan. Wanita hamil memerlukan 40 mg zat besi atau 2 kali lipat kebutuhan saat tidak dalam keadaan hamil. Pengaturan jarak

kehamilan sangat penting untuk diperhatikan yakni minimal dua tahun sehingga badan ibu siap menerima janin tanpa harus menghabiskan zat besinya. Kehamilan yang berulang dalam waktu singkat akan menguras cadangan zat besi ibu (Fatmawati, 2010).

Banyak faktor yang dapat menimbulkan anemia pada saat kehamilan, yakni diantaranya :

- a. Kurang gizi (*malnutrisi*)
- b. Kurangnya zat gizi dalam makanan
- c. *Mal absorpsi*
- d. Kehilangan banyak darah ; persalinan yang lalu, haid dll
- e. Penyakit kronis, TBC, infeksi kecacingan, malaria
- f. Terjadinya pengeceran darah selama kehamilan

2. Kebutuhan Zat Besi Pada Ibu Hamil

Jumlah zat besi yang dibutuhkan ibu hamil jauh lebih besar daripada wanita yang tidak hamil. Pada hamil trimester I kebutuhan zat besi masih sedikit karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin lambat. Memasuki kehamilan trimester II dan III terjadi penambahan sel darah merah sampai 35% yang ekuivalen dengan 450 mg besi. Pertambahan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan oksigen oleh janin yang harus diangkut oleh sel darah merah.

Kemudian pada saat melahirkan akan terjadi kehilangan darah dan diperlukan pertumbuhan besi 300-350 mg. diperkirakan wanita hamil sampai

melahirkan memerlukan zat besi kurang lebih 40 mg/hari atau dua kali lipat kebutuhan daripada saat kondisi normal (tidak hamil). Tidak mengherankan bila banyak wanita hamil akhirnya menderita anemia gizi besi karena kebutuhan meningkat, tetapi konsumsi makanannya tidak memenuhi syarat gizi (Khomsan, 2003).

3. Tanda dan Gejala Anemia

Penderita anemia biasanya ditandai dengan mudah lemah, letih, lesu, nafas pendek, muka pucat, susah berkonsentrasi serta fatigue atau rasa lelah yang berlebihan. Gejala ini disebabkan karena otak dan jantung mengalami kekurangan distribusi oksigen dari dalam darah. Denyut jantung penderita anemia biasanya lebih cepat karena berusaha mengkompensasi kekurangan oksigen dengan memompa darah lebih cepat. Akibatnya kemampuan kerja dan kebugaran tubuh menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, kerja jantung menjadi berat dan bisa menyebabkan gagal jantung kongestif. Anemia zat besi juga bisa menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terinfeksi (Fatmah, 2010).

Tanda anemia adalah pucat, (lidah, bibir dalam, muka, telapak tangan) mudah letih, detak jantung lebih cepat, apatis, pusing, mata berkunang-kunang dan mengantuk. Tanda anemia lain yakni 5L (lemah, letih, lesu, lunglai dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang (Kemenkes, RI)

4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada ibu hamil pada dasarnya adalah mengatasi penyebab pada anemia berat (kadar Hb ,8 g/dl), biasanya ada penyakit yang melatarbelakangi misalnya TBC dan malaria. Dalam

rangka penanggulangan anemia pada ibu hamil telah dilakukan program penanggulangan anemia yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1995, yaitu :

- a. Peningkatan suplementasi tablet zat besi pada ibu hamil dengan memperbaiki system distribusi dan monitoringnya secara terintegrasi dengan program lainnya.
- b. Suplementasi zat besi kepada anak sekolah remaja putrid dan wanita pekerja yang tinggal di daerah miskin sedangkan di daerah lain suplementasi berlandaskan kemandirian yang didukung dengan kegiatan kampanye peningkatan suplementasi zat besi
- c. Peningkatan KIE untuk mengetahui konsumsi tablet zat besi dan bahan makanan alamiah sumber zat besi
- d. Membagikan tablet zat besi atau tablet tambah darah (TTD) kepada ibu hamil sebanyak 90 tablet yang diminum 1 tablet setiap hari selama masa kehamilan.

Oleh karena itu upaya program penanggulangan anemia yang telah dilakukan pemerintah selanjutnya dievaluasi, dikaji dan dianalisis sehingga Pemda, khususnya bagian TIM PANGAN dan GIZI dapat dijadikan bahan masukan untuk program perencanaan perbaikan gizi di masa yang akan datang (Waryana, 2010).

5. Pembagian Anemia

Menurut Prawirohardjo (2002), Anemia dapat digolongkan menjadi :

- a. Anemia defisiensi besi (Fe) yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi

- b. Anemia megaloblastik yaitu anemia yang disebabkan oleh kekurangan asam folat
- c. Anemia hipoplastik, yaitu anemia yang disebabkan karena hipofungsi sumsum tulang
- d. Anemia hemolitik, yaitu anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya.

6. Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi merupakan masalah defisiensi nutrisi terbanyak dan juga merupakan penyebab terjadinya anemia terbesar dalam kehamilan. Diketahui terdapat 20% populasi unia yang menderita anemia defisiensi besi dan 50% dari individu yang mengalami defisiensi besi berlanjut menjadi anemia defisiensi besi. Wanita produktif merupakan populasi terbesar yang menderita anemia defisiensi besi terutama saat kehamilan dan persalinan (Milman et al,1994 dalam Wibowo dan Purba, 2006). Menurut Wintrobe (1974) dalam Tamboen (1991), defisiensi besi merupakan berkurangnya jumlah besi yang ada di dalam tubuh. Defisiensi besi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

a. Tingkat *Prelaten Iron Deficiency*

Cadangan besi di endotelial pada tingkat ini menurun akibatnya kadar ferritin plasma menurun dan berdampak pada peningkatan absorbs zat besi. Kadar Hb dan Besi serum menurun tetapi belum terjadi perubahan biokimia dan belum memperlihatkan gejala klinis.

b. Tingkat *latent iron deficiency*

Cadangan besi di retikuloendotelial menurun dan serum feritin juga mengalami penurunan. Pada tingkat ini terjadi perubahan biokimia tubuh yaitu besi serum menurun dan terjadi peningkatan *Free Erythrocyte Protoporphyrin* (FEP). Tetapi kadar Hb masih normal.

c. Tingkat *iron deficiency anemia*

Tingkat ini merupakan tingkat terakhir dari defisiensi besi. Cadangan besi sangat menurun bahkan bisa sama sekali tidak ada. Terjadi perubahan biokimia tubuh seperti, besi serum sangat menurun, kadar Hb menurun dan terjadi peningkatan jumlah FEP, sudah nampak gejala klinis dan terjadi perubahan pada epitel. Tingkat ini dinamakan anemia.

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi di dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya konsumsi zat besi dan juga dapat terjadi karena rendahnya tingkat absorbs zat besi akibat dari rendahnya konsumsi zat yang dapat membantu proses absorbs zat besi serta tingginya konsumsi zat yang dapat menghambat absorbs zat besi (Depkes, 1995).

7. Dampak anemia

Anemia gizi besi pada ibu hamil dapat mengaibatkan tingginya angka kematian ibu berkaitan erat dengan anemia. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah dan angka kematian perinatal meningkat (Almatsier, 2009).

Dampak yang timbulkan akibat anemia gizi besi sangat kompleks. Menurut Ros dan Horton (1998), bahwa anemia gizi besi berdampak pada menurunnya kemampuan motorik anak, menurunnya skor IQ, menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kemampuan mental anak, menurunnya produktivitas kerja pada orang dewasa, yang akhirnya berdampak pada keadaan ekonomi dan pada wanita hamil akan menyebabkan buruknya persalinan, berat badan lahir rendah, bayi lahir premature, serta dampak negatif lainnya seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran. Akibat lainnya dari anemia gizi besi adalah gangguan pertumbuhan, gangguan imunitas serta rentan terhadap pengaruh racun dari logam-logam berat.

Defisiensi besi berpengaruh negatif terhadap fungsi otak, terutama terhadap fungsi system neurotransmitter (penghantar syaraf). Akibatnya, kepekaan reseptor syaraf dopamine berkurang yang dapat berakhir dengan hilangnya reseptor tersebut. Daya konsentrasi, daya ingat dan kemampuan belajar terganggu, ambang batas rasa sakit meningkat, fungsi kelenjar tiroid dan kemampuan mengatur suhu tubuh juga menurun (Almatsier, 2009).

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi anemia

Menurut Istiarti (2004) bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil :

a. Faktor dasar

1) Sosial Ekonomi

Menurut Istiarti (2004) menyatakan bahwa perilaku seseorang dibidang kesehatan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. Sekitar 2/3 wanita hamil di negara maju yaitu hanya 14%.

2) Pengetahuan

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai sumber misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. Kebutuhan ibu hamil akan zat besi (Fe) meningkat 0,8 mg pada trimester pertama dan meningkat tajam pada trimester ke III yaitu 6,3 mg sehari. Jumlah sebanyak itu tidak mungkin tercukupi hanya melalui makanan apalagi didukung dengan pengetahuan ibu hamil yang kurang terhadap peningkatan kebutuhan zat besi (Fe) selama hamil sehingga menyebabkan anemia pada ibu hamil (Arisman, 2010).

Ibu hamil dengan pengetahuan tentang zat besi (Fe) yang rendah akan berperilaku kurang patuh dalam mengonsumsi tablet zat besi (Fe) serta dalam pemilihan makanan sumber zat besi (Fe) juga rendah. Sebaliknya ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang zat besi (Fe) yang baik, maka cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan rasional dan semakin patuh dalam mengonsumsi tablet Fe.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan penyempurnaan hidup. Biasanya seorang ibu khususnya ibu hamil yang

berpendidikan tinggi dapat menyeimbangkan pola konsumsinya. Apabila pola konsumsinya sesuai maka asupan zat gizi yang diperoleh akan tercukupi, sehingga kemungkinan besar bisa terhindar dari masalah anemia.

4) Budaya

Faktor sosial budaya setempat juga berpengaruh pada terjadinya anemia. Pendistribusian makanan dalam keluarga yang tidak berdasarkan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, serta pantangan-pantangan yang harus diikuti kelompok khusus misalnya ibu hamil, bayi, ibu nifas merupakan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dan perilaku masyarakat yang menghambat terciptanya pola hidup sehat dimasyarakat. Hasil penelitian Sadli (2011) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mempunyai budaya baik 88,2% tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), sedangkan yang mempunyai budaya kurang baik 63,6% mengalami kekurangan energy kronik (KEK). Hasil uji statistik menunjukkan ternyata ada hubungan budaya dengan kejadian KEK pada ibu hamil dengan nilai $p = 0,00$.

b. Faktor tidak langsung

1) Kunjungan *Antenatal Care*

Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan terutama pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim (Manuaba,2009).Kasus anemia defisiensi gizi umumnya selalu disertai dengan mal nutrisi infestasi parasit, semua ini berpangkal pada keengganan ibu untuk menjalani pengawasan antenatal. Apabila dilakukan *antenatal care* (ANC) kejadian anemia dapat terdeteksi secara dini, karena anemia pada tahap awal tidak terlalu memberikan

keluhan yang bermakna. Keluhan biasanya terasa jika sudah masuk tahap lanjut (Arisman, 2010).

2) Paritas

Paritas ≥ 3 merupakan faktor terjadinya anemia yang berhubungan erat dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat < 2 tahun (Khomsan, 2004). Paritas merupakan kelahiran setelah gestasi 20 minggu, tanpa memperhatikan apakah bayi hidup atau mati. Paritas ibu merupakan frekuensi ibu pernah melahirkan anak hidup atau mati, tetapi bukan aborsi (Nurhidayati, 2013).

Ibu hamil terlalu sering hamil sehingga dapat menguras cadangan zat besi dalam tubuh. Selain kunjungan *antenatal care* ibu hamil, kehamilan yang berulang dalam waktu yang singkat akan dapat mengahabiskan cadangan dalam tubuh. Hasil penelitian Djamilus (2008) bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan status anemia ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Bogor yaitu usia kehamilan, intervensi, tingkat pendidikan, usia, paritas dan *antenatal care* (ANC) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Hasil penelitian Noverstiti (2012) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara paritas dengan kejadian anemia. Hal ini disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi pada ibu hamil dengan paritas > 3 seperti sikap, tindakan, jarak kehamilan sebelumnya. Selain itu, pada saat penelitian ibu hamil yang ditemukan banyak yang memiliki paritas ≤ 3 , termasuk ibu hamil yang sedang hamil anak pertama, sehingga tidak diperoleh perbedaan yang bermakna antara ibu hamil yang anemia dengan yang tidak anemia. Karakteristik ibu hamil yang sebagian

besar tidak bekerja atau ibu rumah tangga diduga ikut mempengaruhi, karena ibu rumah tangga aktivitas yang dilakukan juga sedikit.

3) Umur

Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil, akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda (<20 tahun) perlu tambahan gizi yang banyak selain digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur yang tua di atas 30 tahun perlu energy yang besar juga karena fungsi organ yang makin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energy yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung (Kristiyanasari, 2010).

Ibu hamil pada usia yang terlalu muda (<20 tahun) tidak atau belum siap untuk memperhatikan lingkungan yang diperlukan untuk pertumbuhan janin. Sedangkan ibu hamil di atas 30 tahun lebih cenderung mengalami anemia disebabkan cadangan zat besi yang mulai menurun (Nurhidayati, 2013).

4) Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan dan penggunaan obat membantu dokter dalam penyiapan gizi khusus. Wanita berpenyakit kronis memerlukan bukan hanya zat besi untuk mengatasi penyakitnya, tetapi juga untuk kehamilannya yang sedang ia jalani (Arisman, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan Sari (2012) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami abortus dan juga anemia pada kehamilan sebelumnya. Ibu

hamil yang memiliki riwayat abortus akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami anemia dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat abortus.

c. Faktor Langsung

1) Pola konsumsi tablet Fe

Pada trimester ke 2 dan 3, faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya anemia kehamilan adalah konsumsi tablet Fe dan kadar hemoglobin pada trimester sebelumnya. Konsumsi tablet besi (Fe) sangat berpengaruh terhadap terjadinya anemia khususnya pada trimester II, trimester III dan pada masa nifas. Hal ini disebabkan kebutuhan zat besi pada masa ini lebih besar dibandingkan trimester I dan menunjukkan pentingnya pemberian tablet Fe untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan dan nifas (Notobroto, 2003).

Penyebab anemia gizi besi dikarenakan kurang masuknya unsur besi dalam makanan, karena gangguan *reabsorpsi*, gangguan pencernaan atau terlampaunya banyaknya besi keluar misalnya perdarahan. Sementara itu kebutuhan ibu hamil akan Fe meningkat untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah 200-300%. Perkiraan jumlah zat besi yang diperlukan selama hamil 1040 mg. sebanyak 300 mg Fe ditransfer ke janin dengan rincian 50-75 mg untuk pembentukan plasenta, 450 mg untuk menambah jumlah sel darah merah dan 200 mg hilang ketika melahirkan. Kebutuhan Fe selama kehamilan trimester I relatif sedikit yaitu 0,8 mg sehari yang kemudian meningkat tajam selama trimester III yaitu 6,3 mg sehari. Jumlah sebanyak itu tidak mungkin tercukupi hanya melalui makanan (Arisman, 2010).

Upaya petugas kesehatan terhadap ibu hamil untuk mencegah anemi zat besi dapat dimulai saat ibu hamil mulai memeriksakan dirinya untuk selalu diupayakan berperilaku yang baik dalam hal mengonsumsi makanan yang bergizi bagi dirinya, di mana zat besi dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi daging seperti sapi. Zat besi juga dapat ditemukan pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam dan kangkung, buncis, kacang polong, serta kacang-kacangan.

Hasil penelitian Amaliah (2002) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi sumber penghambat penyerapan Fe dengan status anemia remaja putri. Kejadian anemia lebih 55% tinggi pada remaja putri yang sering mengonsumsi makanan/minuman sumber penghambat penyerapan Fe (54,2%) dibandingkan dengan yang jarang mengonsumsi (26,9%).

2) Penyakit Infeksi

Beberapa penyakit infeksi dapat memperbesar risiko anemia. Infeksi ini umumnya adalah TBC, cacian dan malaria, karena menyebabkan terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah dan terganggunya eritrosit. Cacian jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacian akan menyebabkan malnutrisi dan dapat mengakibatkan anemia defisiensi besi. Infeksi malaria dapat menyebabkan anemia. Hubungan antara penyakit ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh nilai $p=0,295$ ($p>0,05$) maka H_0 diterima artinya tidak ada terdapat hubungan yang bermakna (Nurhidayati, 2013).

Penyakit infeksi seperti TBC, cacian usus dan malaria juga penyebab terjadinya anemia karena menyebabkan terjadinya peningkatan penghancuran sel

darah merah dan terganggunya eritrosit (Wiknjosastro, 2005). Penyakit yang diderita ibu berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan, penyakit tersebut antara lain hipertensi, jantung, asma, TB paru, malaria. Seseorang dapat terkena anemia karena meningkatnya kebutuhan tubuh akibat kondisi fisiologis (hamil, kehilangan darah karena kecelakaan, pasca bedah atau menstruasi), adanya penyakit kronis seperti infeksi cacing tambang, malaria dan TBC (Rochjati, 2003).

3) Perdarahan

Perdarahan antepartum dan postpartum lebih sering dijumpai pada wanita yang anemis dan lebih sering berakibat fatal, sebab wanita yang anemis tidak dapat mentolerir kehilangan darah, bahwa dampak anemia pada kehamilan bervariasi dari keluhan yang sangat ringan hingga terjadinya gangguan kelangsungan kehamilan (abortus, partus imatur/prematur), gangguan proses persalinan (atonia, partus lama, perdarahan atoni), gangguan pada masa nifas, dan gangguan pada janin (abortus, dismaturitas, BBLR, kematian perinatal dan lain-lain) (Almatsier, 2009).

Penyebab anemia besi juga dikarenakan terlampaui banyak besi keluar dari badan misalnya perdarahan. Penyebab utama kematian maternal antara lain adalah perdarahan pasca partum (di samping eklamsi dan penyakit infeksi) dan plasenta previa yang kesemuanya berpangkal pada anemia defisiensi (Mulyawati, 2009).

4) Status gizi

Status gizi adalah ekspresi dalam keadaan seimbang dalam bentuk variable tertentu. Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa

sebelum dan selama kehamilan kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi sebelum dan selama hamil (Supariasa, 2002).

Penelitian yang dilakukan Triwidayanti (2011) menyatakan ibu hamil merupakan salah satu indikator yang terkena anemia, apalagi ibu hamil tersebut memiliki status gizi yang tidak baik. Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia trimester III di Puskesmas Garuda kota Bandung.

B. Tinjauan Umum Tentang Asupan Makanan

Asupan makanan dikenal juga dengan istilah konsumsi makanan yaitu jumlah total makanan yang tersedia untuk dikonsumsi (Damayanti, 2003). Allah SWT berfirman dalam *Q.S Abasa ayat 80 : 24* :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)

Terjemahnya :

“Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya” (Depag, 2010)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya dengan memasang akalnya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuknya (Tafsir Jalalain).

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi makanan. Tingkat konsumsi makanan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan. Kualitas makanan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Jika konsumsi makanan memenuhi kebutuhan tubuh baik dari

sudut kualitas maupun kuantitasnya maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan yang sebaik-baiknya (Imaftuha, 2010)

Asupan zat besi merupakan komponen yang penting dalam proses pernapasan. Zat besi merupakan bagian yang berguna untuk mengikat oksigen dalam eritrosit. Zat besi ini dibutuhkan oleh tubuh sekitar 15-30 mg per hari. Penyerapan zat besi ini dipermudah oleh asam klorida di dalam lambung (Irianto dan Waluyo 2004:33 dalam Imaftuha, 2010).

Dalam tubuh zat besi bekerjasama dengan rantai protein pengangkut elektron, yang berperan dalam langkah-langkah akhir metabolisme energy. Defisiensi besi terutama dapat menyerang golongan rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui serta pekerja dengan penghasilan rendah. Pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan penyembuhan luka, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi.

Kehamilan yang disertai dengan perubahan anatomi dan fisiologik yang mempengaruhi hampir semua organ tubuh, sebagian besar dari pengaruh ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut bukan merupakan respon terhadap janin semata, tetapi merupakan bagian integral dari system ibu dan anak guna memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan janin. Dalam masa kehamilan, kebutuhan gizi meningkat dengan meningkatnya usia kehamilan ibu. Tetapi pada umumnya pola konsumsi ibu hamil tetap atau bertambah sedikit. Pola

makan ibu hamil dipengaruhi oleh selera, kebiasaan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan gizi dan pengetahuan keluarga (Imaftuha, 2010).

Menurut Ali Khomsan dkk (1994) dalam Imaftuha 2010, ada beberapa faktor yang saling berhubungan dalam mempengaruhi konsumsi pangan. Faktor yang dominan yakni pengetahuan tentang gizi dan pendapatan keluarga. Sekalipun daya beli termasuk faktor penentu dalam menyediakan pangan tetapi sebagian besar kekurangan gizi dapat diatasi jika orang tahu bagaimana memanfaatkan dengan benar sesuatu yang dimilikinya.

Kebutuhan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi menganjurkan penambahan 12 gr/hari sehingga dalam satu hari dapat mencapai 75-100 gr. Perkiraan zat besi yang perlu ditimbun selama masa kehamilan yaitu sebesar 1040 mg. Kenaikan berat badan pada kehamilan trimester pertama dan kedua sangat penting karena pada waktu inilah janin dan plasenta di bentuk, meskipun pada usia kehamilan ini kenaikan berat badan ibu kecil. Jika ada trimester I dan II berat badan ibu tidak mengalami kenaikan maka akan meningkatkan BBLR. Hal ini karena adanya KEP maka ukuran plasenta yang dihasilkan kecil dan kurangnya suplai makanan ke janin. Bayi BBLR mempunyai resiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Kekurangan gizi pada ibu lebih cenderung mengakibatkan BBLR dan kelainan yang bersifat umum. Kekurangan gizi ibu yang lama dan berkelanjutan selama kehamilan akan berakibat lebih buruk pada janin daripada malnutrisi akut (soetjiningsih, 2004).

Gizi merupakan bahan makanan yang mengandung zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia ini tidak akan berlangsung lebih lama apabila tidak tersedia bahan makanan. Di samping itu makanan merupakan kepentingan utama untuk kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menyediakan berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 95 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تُوْفِكُونَ ﴿95﴾

Terjemahnya :

“ Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah ”

Berdasarkan ayat tersebut, menurut tafsir Al-Mukhtashar menyatakan bahwa Allah SWT menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan yakni membelah biji-bijian agar keluar darinya tumbuhan, dan membelah biji kurma sehingga keluar darinya biji kurma. Dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan sperma dan telur yang keduanya merupakan makhluk mati dari makhluk hidup. Atau maknanya adalah Dia mengeluarkan orang yang beriman dari orang kafir lewat kelahiran keturunan mereka dan mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin demikian pula. Yang melakukan hal menakjubkan tersebut adalah Allah SWT, bagaimana kalian berpaling dari kebenaran Allah setelah melihat Keluarbiasaannya Ciptaan-Nya dan Kesempurnaan Kuasa-Nya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

Pola makan adalah suatu informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu sehingga penilaian konsumsi pangan dapat berdasarkan jumlah maupun jenis makanan yang dikonsumsi (Ari Istiany, 2013). Pola makan yang disesuaikan berkaitan dengan waktu dan cara mengonsumsi. Masalah jenis makanan dan nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah sebuah ketetapan yang harus dipenuhi. Tinjauan medis mengatakan bahwa sebaiknya dalam memenuhi peningkatan kebutuhan asupan gizi yang ada ibu hamil melakukannya secara bertahap. Prinsip makan yang dilakukan adalah makan sedikit tetapi dalam waktu yang sering, itu lebih diutamakan dibandingkan makan besar sekaligus. Syaikh Muhammad Al-Mubarakfury menjelaskan :

وَأَمْتَلَاؤُهُ يَفْضِي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

Terjemahan :

“Penuhnya perut (dengan makanan) bias menyebabkan kerusakan agama dan dunia (tubuhnya)”(H.R Ibnu Majah).

Selain itu perlu diperhatikan perubahan umum yang terjadi pada kehamilan seperti bertambahnya berat badan yang sebagian besarnya terdiri dari cairan.

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan gizi, karena selama kehamilan dibutuhkan berbagai unsure gizi yang jauh lebih banyak di bandingkan dengan pada masa tidak hamil. Hal ini selain untuk memenuhi kebutuhan ibu sendiri juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam kandungannya. Oleh karena itu, jika ibu

tidak mengonsumsi makanan yang cukup kualitas dan kuantitasnya maka resiko untuk menderita gizi kurang lebih besar. Tujuan penataan gizi pada wanita hamil yakni untuk menyiapkan :

1. Cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin , mineral, dan cairan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu, janin serta plasenta.
2. Makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh bukan lemak
3. Cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi penambahan berat baku dalam kehamilan
4. Perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik dan memperoleh cukup energy untuk menyusui serta merawat bayi kelak
5. Perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan reaksi yang tidak diinginkan seperti mual dan muntah
6. Perawatan gizi yang dapat membantu pengobatan penyakit yang terjadi selama kehamilan (diabetes kehamilan)
7. Mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik dan dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup (Arisman, 2004).

Jadi pola makan seimbang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan menu sehari-hari yang menjamin gizi yang baik. Untuk mencapai status gizi yang baik diperlukan makanan yang beraneka ragam, untuk menjamin terpenuhinya kecukupan sumber tenaga dan zat pembangun.

Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energy selama masa kehamilan, maka WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester ke dua dan tiga.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Infeksi

Status gizi kurang dan penyakit infeksi memiliki interaksi bolak-balik. Gizi kurang dapat disebabkan oleh infeksi melalui berbagai mekanisme. Di berbagai tempat di dunia makanan dapat tercemar oleh beberapa bibit penyakit yang menimbulkan gangguan penyerapan zat gizi oleh tubuh. Daya tahan tubuh orang yang mengalami gizi kurang menjadi rendah, sehingga mudah terserang penyakit infeksi. Begitupula sebaliknya, orang yang terkena penyakit infeksi akan mengalami gizi kurang. Perdarahan patologis akibat penyakit/infeksi parasit seperti cacingan dan saluran pencernaan berhubungan positif dengan anemia (Syafiq, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismen (2006) menunjukkan hubungan yang bermakna antara kehamilan dengan kejadian malaria, wanita hamil lebih beresiko 2,66 kali terkena malaria daripada wanita yang tidak hamil. Penelitian yang dilakukan pada 337 ibu hamil di Magelang, prevalensi kecacingan pada ibu hamil sebesar 62,75% (187 ibu hamil) dengan analisa regresi linier berpengaruh signifikan terhadap kadar Hb

(Widagdo,2003).selain karena secara fisiologis ibu hamil membutuhkan zat besi lebih banyak, anemia gizi besi juga dapat disebabkan oleh infeksi kecacingan (terutama cacing tambang) dan malaria. Infeksi cacing tambang menyebabkan perdarahan pada dinding usus, malaria pada penderita anemia gizi besi dapat memperberat keadaan anemia (Sulistyoningsih, 2011).

E. Tinjauan Umum Tentang Riwayat Pendarahan

Tingginya anemia yang menimpa ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap janin yang dikandung dari ibu dalam kehamilan, persalinan maupun pada masa nifas yang diantaranya dapat menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR), partus premature, abortus, pendarahan postpartum, partus lama dan syok. Hal ini berkaitan dengan banyak faktor antara lain status gizi, kadar Hb, umur dan pekerjaan (Sarwono Prawirohardjo, 2011).

Pada anemia jumlah efektif sel darah merah berkurang. Hal ini mempengaruhi jumlah hemoglobin dalam darah. Berkurangnya jumlah hemoglobin dalam darah menyebabkan jumlah oksigen yang diikat dalam darah juga sedikit, sehingga mengurangi jumlah pengiriman oksigen ke organ-organ vital (Fajrin, 2016).


Kekurangan Hb dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang ditransfer ke sel tubuh maupun otak. Sehingga dapat memberikan efek buruk pada ibu itu sendiri maupun pada bayi yang dilahirkan (Manuaba,2001).Kekurangan suplai oksigen dapat menyebabkan persalinan yang lama akibat kelelahan otot rahim dalam berkontraksi dan pendarahan

pasca persalinan karena atonia uteri yakni tidak adanya reaksi otot rahim (Fajrin, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosmiyati (2015) menunjukkan bahwa terjadinya pendarahan pada saat persalinan memiliki resiko 5 kali lebih besar pada ibu hamil yang mengalami anemia pada saat kehamilannya dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak anemia.



F. Kerangka Teori




Gambar 2.1 Landasan Teori

Sumber : Modifikasi (Junadi, 1995 dalam Eka Pratiwi, 2016)

G. Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teori menurut Arisman, maka kerangka konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Variabel yang diteliti



□ : Variabel Independen




□ : Variabel Dependen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analitik observasional* dengan desain *case control*. *Case control* merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua kelompok kasus dan kelompok control (Notoatmodjo, 2010). Rancangan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi kelompok kasus dan control, kemudian secara retrospektif diteliti faktor-faktor resiko yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan control dapat terkena paparan atau tidak.



Gambar : Desain studi kasus kontrol (gordis, 2000 dimodifikasi)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-September 2019.

C. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil anemia yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Dengan mencatat nama ibu hamil dan apa keluhan kehamilan pada petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 52 kasus anemia dari 201 ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya.

D. Sampel dan Teknik Sampling

1. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang dipilih melalui cara tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus pengambilan sampel analisis kategori berpasangan berdasarkan odd ratio menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{52}{52(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 32 \text{ orang}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebesar 32 responden.

a. Sampel kasus

Sampel kasus pada penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dan mengalami anemia dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin di bawah 11 gr/dl di puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

b. Sampel control

Sampel control adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dan tidak anemia di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 32 responden. Jumlah total sampel adalah jumlah sampel kasus ditambah jumlah sampel control dengan menggunakan perbandingan 1 : 1 dengan *matching* usia kehamilan yaitu trimester II sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 64. Hal ini sejalan dengan teori Cunningham (2009) yang menyatakan anemia pada ibu hamil terjadi karena adanya hemodelusi, khususnya pada trimester II.

2. Teknik sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni salah satu jenis pengambilan sampel dengan menentukan beberapa kriteria peneliti.

E. Kriteria restriksi (inklusi dan eksklusi)

1. Kriteria inklusi

a. Kelompok kasus

- 1) Ibu hamil dengan usia kehamilan Trimester II
- 2) Kadar Hemoglobin < 11 gr/dl (menderita anemia)
- 3) Tidak menderita penyakit infeksi
- 4) Bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung
- 5) Menetap /tidak berpindah daerah

b. Kelompok Kontrol

- 1) Ibu hamil dengan usia kehamilan mencapai Trimester II
- 2) Kadar Hemoglobin ≥ 11 gr/dl (tidak menderita anemia)
- 3) Tidak menderita penyakit infeksi
- 4) Bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung
- 5) Menetap /tidak berpindah daerah

2. Kriteria eksklusi

a. Kelompok kasus

- 1) Ibu hamil sehat
- 2) Kadar Hemoglobin ≥ 11 gr/dl (tidak menderita anemia)
- 3) Menderita penyakit infeksi
- 4) Tidak bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung

5) Perpindah daerah atau peninggal dunia

b. Kelompok Kontrol

1) Ibu hamil sehat

2) Kadar Hemoglobin ≥ 11 gr/dl (tidak menderita anemia)

3) Menderita penyakit infeksi

4) Tidak bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung

5) Perpindah daerah atau peninggal dunia

F. Teknik Pengambilan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner pada responden (Ibu hamil) yang dimana sebelum responden mengisi kuesioner, terlebih dahulu responden mendapatkan penjelasan tentang tujuan penelitian dan cara pengisian kuesioner oleh peneliti. Data primer meliputi pendidikan, pengetahuan, asupan Fe, asupan protein, asupan vitamin C, riwayat penyakit infeksi dan riwayat perdarahan . Kadar Hb di peroleh dari tes hemoglobin data ibu hamil, kadar Hb dari ibu hamil ini dilakukan oleh petugas yang terlatih. Sedangkan Untuk mengetahui asupan Zat besi, asupan protein dan asupan Vitamin C di kumpulkan dengan metode *Semi-Quantitatif Food Frekuensi questionnaire* (FFQ) dan *Food Recall* 24 Jam.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi gambaran semua lokasi penelitian dimulai dari laporan bulan puskesmas dibagian tata usaha dan hasil pemeriksaan yang ada di bagian KIA, Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

G. Instrument Penelitian

Instrument atau alat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat ukur Hb

Alat yang digunakan untuk mengukur Hb (hemoglobin) darah adalah Haemometer

2. Formulir *Recall 24 Jam*

Untuk mengetahui asupan makanan yang dikonsumsi ibu hamil.

3. Formulir *Semi-Quantitatif Food Frekuensi Questionnaire* (FFQ).

Untuk mengetahui frekuensi makan makanan yang mengandung zat besi protein dan vitamin C pada periode perhari,perminggu hingga perbulan.

4. Kuesioner

Kuesioner berisi beberapa pertanyaan untuk mengukur pengetahuan ibu hamil tentang anemia, riwayat penyakit infeksi dan riwayat perdarahan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer melalui tahapan sebagai berikut : Editing, coding, entry data, cleaning, dan tabulasi .

2. Analisis data

a. Analisis univariat

Analisis univariat adalah memperoleh informasi untuk mengenai semua variable penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi

b. Analisis bivariat

Dilakukan untuk melihat hubungan dan besarnya variable bebas secara dengan variable terkait karena rancangan penelitian adalah studi kasus control, maka analisis yang digunakan adalah odds ratio (OR) dengan menggunakan tabel kontigensi 2 x 2

Tabel Odds Ratio

Faktor risiko	Kasus	Control	Jumlah
Ada (+)	A	b	a + b
Tidak (-)	C	d	c + d
Jumlah	a+c	b+d	a+b+c+d

Sumber : sidney slegal 1997

Keterangan:

$$OR = \frac{ad}{bc}$$

a = jumlah kasus terpapar dengan faktor risiko positif (+)

b = jumlah control yang terpapar dengan risiko negative (-)

c = jumlah kasus yang tidak terpapar

d = jumlah control yang tidak terpapar

interpretasi

- 1) Jika $OR = 1$ variabel independen bukan merupakan faktor risiko terhadap variable dependen
- 2) Jika $OR < 1$ variabel independen merupakan faktor protektif terhadap variable dependen
- 3) Jika $OR > 1$ maka variable independen merupakan faktor risiko terhadap variable dependen



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Bajeng berdiri sejak Tahun 1958, terletak di Kecamatan Bajeng, sekitar 11 Km dari Ibukota Kabupaten, dan kurang lebih 23 Km dari Ibukota Propinsi serta memiliki keadaan geografis daerah dataran rendah yang berbatasan dengan :

- a. Kecamatan Pallangga pada bagian utara
- b. Kabupaten Takalar pada bagian timur
- c. Kecamatan Bontonompo pada bagian selatan
- d. Kabupaten Takalar pada bagian utara

Luas tanah Puskesmas 1027,42 M² dengan luas bangunan induk 155 M², perawatan 110 M². Lokasi Puskesmas Bajeng terletak pada jalur strategis lintas darat Propinsi dengan fasilitas sarana listrik PLN 24 jam dan sarana telekomunikasi telepon.

Luas wilayah kerja puskesmas Bajeng yakni 49,96 Ha atau 496,9 km terdiri dari 6 kelurahan dan 8 desa. Kepadatan penduduk dinyatakan dalam satuan orang/km yakni 85 orang/km². Angka kelahiran atau fertilitas di Wilayah kerja Puskesmas Bajeng sebesar 26,1 per 1000 penduduk, tergolong pada laju kelahiran sedang. Dan angka kematian wilayah Puskesmas Bajeng sebesar 3,716 per 1000 orang penduduk per tahun masih tergolong rendah.

Visi dan Misi Puskesmas Bajeng:

VISI:

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Untuk Menunjukkan Kecamatan Bajeng Sehat”

MISI:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang professional
- c. Meningkatkan tata kelola puskesmas Bajeng yaitu sistem informasi dan manajemen
- d. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

TUJUAN:

Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Bajeng dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bajeng sehat.

MOTTO:

“Kesehatan Anda adalah Keutamaan Kami”

2. Hasil Penelitian

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh informasi secara umum tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel.

1. Umur

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil Di Wilayah Kerja
Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Umur	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	< 20 Tahun	11	34,4	3	9,3
2	20 – 30 Tahun	17	53,1	23	71,9
3	>30 Tahun	4	12,5	6	18,8
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan umur ibu hamil pada kelompok kasus umur < 20 tahun terdapat 11 orang (34,4%) ,umur 20-30 tahun terdapat 17 orang (53,1%), dan umur >30 tahun 4 orang (12,5%). Pada kelompok kontrol umur <20 tahun terdapat 3 orang (9,3%) , umur 20-30 tahun terdapat 23 orang (71,9%), dan umur >30 tahun 6 orang (18,8%).

2. Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu Hamil Di Wilayah
Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Pendidikan	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	SD/Sederajat	1	3,1	1	3,1
2	SMP/Sederajat	8	25,0	8	25,0
3	SMA/Sederajat	17	53,1	20	62,5
4	Diploma/Sarjana	6	18,8	3	9,4
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan distribusi responden berdasarkan pendidikan ibu hamil pada kelompok kasus yang berpendidikan SD/ Sederajat

terdapat 1 orang (3,1%), SMP/Sederajat terdapat 8 orang (25,0%), SMA/Sederajat terdapat 17 orang (53,1%), Diploma / Sarjana terdapat 6 orang (18,8%). Pada kelompok kontrol yang berpendidikan SD/Sederajat terdapat 1 orang (3,1%), SMP/Sederajat terdapat 8 orang (25,0%), SMA/Sederajat terdapat 20 orang (62,5%) dan Diploma/Sarjana terdapat 3 orang (9,4%).

3. Riwayat Penyakit Infeksi

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Ibu Hamil
Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Riwayat Penyakit Infeksi	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	6	18,8	1	3,1
2	Resiko Rendah	26	81,2	31	96,9
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit infeksi ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 6 orang (18,8%), resiko rendah terdapat 26 orang (81,2%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 1 orang (3,1%) dan resiko rendah terdapat 31 orang (96,9%).

4. Riwayat Perdarahan

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Pendarahan Ibu Hamil
Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Riwayat Pendarahan	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	8	25,0	4	12,5
2	Resiko Rendah	24	75,0	28	87,5
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan riwayat pendarahan ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 8 orang (25,0%), resiko rendah terdapat 24 orang (75,0%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 4 orang (12,5%) dan resiko rendah terdapat 28 orang (87,5%).

5. Asupan Protein

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Protein Ibu Hamil Di
Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Asupan Protein	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	20	62,5	8	25,0
2	Resiko Rendah	12	37,5	24	75,0
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan distribusi responden berdasarkan asupan protein ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 20

orang (62,5%), resiko rendah terdapat 12 orang (37,5%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 8 orang (25,0%) dan resiko rendah terdapat 24 orang (75,0%)

6. Asupan Vitamin C

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C Ibu Hamil Di
Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Asupan Vitamin C	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	20	82,5	14	43,8
2	Resiko Rendah	12	37,5	18	56,3
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan distribusi responden berdasarkan asupan vitamin C ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 20 orang (82,5%), resiko rendah terdapat 12 orang (37,5%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 14 orang (43,8%) dan resiko rendah terdapat 18 orang (56,3%).

7. Asupan Zat Besi (Fe)

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Asupan Fe Ibu Hamil Di Wilayah
Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Asupan Fe	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	17	53,1	14	43,8
2	Resiko Rendah	15	46,9	18	56,2
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan distribusi responden berdasarkan asupan zat besi (Fe) ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 17 orang (53,1%), resiko rendah terdapat 15 orang (46,9%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 14 orang (43,8%) dan resiko rendah terdapat 18 orang (56,2%).

8. Pola Makan

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan Ibu Hamil Di Wilayah
Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Pola Makan	Kasus		Kontrol	
		n	%	n	%
1	Resiko Tinggi	16	50	13	40,6
2	Resiko Rendah	16	50	19	59,4
Total		32	100	32	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan distribusi responden berdasarkan pola makan ibu hamil pada kelompok kasus dengan resiko tinggi terdapat 16

orang (50%), resiko rendah terdapat 16 orang (50%). Pada kelompok kontrol resiko tinggi terdapat 13 orang (40,6%) dan resiko rendah terdapat 19 orang (59,4%).

b. Analisis Bivariat

1. Riwayat Penyakit Infeksi

Tabel 4.9
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Ibu Hamil Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019

No.	Riwayat Penyakit Infeksi	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	6	18,8	1	3,1	7	10,9	7,154
2.	Risiko rendah	26	81,2	31	96,9	57	89,1	
Total		32	100	32	100	64	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 6 orang (18,8%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 26 orang (81,2%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 1 orang (3,1%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 31 orang (96,9%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 7,154 karena $OR > 1$ maka riwayat penyakit infeksi merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 7,154 artinya ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit infeksi 7,154 kali lebih berisiko daripada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi.

2. Riwayat Pendarahan

Tabel 4.10
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Riwayat Pendarahan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019

No.	Riwayat Pendarahan	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	8	25,0	4	12,5	12	18,8	2,333
2.	Risiko rendah	24	75,0	28	87,5	52	81,2	
Total		32	100	32	100	64	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 8 orang (25,0%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 24 orang (75,0%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 4 orang (12,5%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 28 orang (87,5%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 2,333 karena $OR > 1$ maka riwayat pendarahan merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 2,333 artinya ibu hamil yang memiliki riwayat pendarahan 2,333 kali lebih berisiko daripada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat pendarahan.

3. Asupan Protein

Tabel 4.11
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Protein Pada Ibu Hamil
Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Asupan Protein	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	20	62,5	8	25,0	28	43,8	5,000
2.	Risiko rendah	12	37,5	24	75,0	36	56,2	
Total		32	100	32	100	64	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 20 orang (62,5%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 12 orang (37,5%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 8 orang (25,0%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 24 orang (75,0%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 5,000 karena $OR > 1$ maka asupan protein merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 5,000 artinya ibu hamil yang memiliki asupan Protein kurang 5,000 kali lebih berisiko daripada ibu hamil yang memiliki asupan protein cukup.

4. Asupan Vitamin C

Tabel 4.12
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Vitamin C Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019

No.	Asupan Vitamin C	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	20	82,5	14	43,8	34	53,1	2,143
2.	Risiko rendah	12	37,5	18	56,3	30	46,9	
Total		32	100	32	100	78	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 20 orang (82,5%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 12 orang (37,5%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 14 orang (43,8%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 18 orang (56,3%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 2,143 karena $OR > 1$ maka asupan Vitamin C merupakan faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 2,143 artinya ibu hamil dengan asupan Vitamin C kurang 2,143 kali beresiko mengalami anemia dibanding ibu hamil dengan asupan Vitamin C cukup.

5. Asupan Fe

Tabel 4.13
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Asupan Fe Pada Ibu Hamil Di
Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Asupan Fe	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	17	53,1	14	43,8	31	48,4	1,457
2.	Risiko rendah	15	46,9	18	56,2	33	51,6	
Total		32	100	32	100	64	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 17 orang (53,1%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 15 orang (46,9%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 14 orang (43,8%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 18 orang (56,2%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 1,457 karena $OR > 1$ maka asupan Fe merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 1,457 artinya ibu hamil yang memiliki asupan Fe kurang 1,457 kali lebih berisiko daripada ibu hamil yang memiliki asupan Fe cukup.

6. Pola Makan

Tabel 4.14
Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Pola Makan Pada Ibu Hamil Di
Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
Tahun 2019

No.	Pola Makan	Kasus		Kontrol		Total		OR
		n	%	n	%	N	%	
1.	Risiko tinggi	16	50	13	40,6	29	45,3	1,462
2.	Risiko rendah	16	50	19	59,4	35	54,7	
Total		32	100	32	100	64	100	

Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 32 orang yang berada di kelompok kasus, 16 orang (50%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 16 orang (50%) tergolong risiko rendah. Sedangkan dari 32 orang yang berada di kelompok kontrol, 13 orang (40,6%) diantaranya tergolong risiko tinggi, dan 19 orang (59,4%) tergolong risiko rendah.

Hasil uji Odds Ratio (OR) diperoleh nilai OR 1,462 karena $OR > 1$ maka pola makan ibu hamil merupakan faktor resiko terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa. Nilai OR 1,462 artinya ibu hamil dengan pola makan yang buruk 1,462 kali lebih berisiko daripada ibu hamil dengan pola makan yang baik.

B. Pembahasan

1. Riwayat Penyakit Infeksi

Ibu yang sedang hamil sangat peka terhadap infeksi dan penyakit menular. Penyakit pada ibu hamil meskipun tidak mengancam nyawa ibu tetapi dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi janin. Penyakit tersebut dapat mengakibatkan abortus, pertumbuhan janin terhambat, janin mati dalam kandungan, serta cacat bawaan (Prahesti,2017).

Kekurangan cairan dan zat gizi lainnya dapat terjadi pada ibu hamil yang terinfeksi penyakit. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anemia pada kehamilan yakni infeksi parasit, infeksi malaria dan infeksi cacing (Ononge et al,2014). Penyakit infeksi dapat menyebabkan anemia karena dapat menyebabkan penurunan asupan makanan dan malabsorpsi nutrisi (Rahayu,2018).

Hasil penelitian menunjukkan penyakit infeksi merupakan faktor resiko terjadinya anemia pada ibu hamil, dengan Odd Ratio OR = 7,154 artinya ibu hamil yang pernah menderita penyakit infeksi 7,154 kali lebih berisiko menderita anemia dibanding ibu hamil yang tidak pernah menderita anemia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmayani (2016) yang menyatakan adanya hubungan yang erat antara penyakit infeksi dengan kejadian anemia. Walaupun penelitian lain yang dilakukan oleh Mahyuni (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai $p=0,198$.

Menurut syafiq dalam salmariantity (2012) menyatakan bahwa anemia memiliki hubungan yang erat dengan perdarahan patologis yang terjadi akibat

penyakit/infeksi parasit seperti cacingan. Menurut sulistyoningsih (2011) anemia gizi selain karena keadaan fisiologis ibu hamil yang membutuhkan zat besi lebih banyak, hal ini juga dapat disebabkan oleh kecacingan dan malaria. Infeksi cacing yang terjadi pada ibu hamil dapat menyebabkan perdarahan pada dinding usus.

Infeksi yang akut menyebabkan kurangnya nafsu makan dan toleransi terhadap makanan sehingga mengurangi asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh (Mahyuni,2019). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah, 2:222

ع
 ۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞

Terjemahnya:

“,,Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Depag RI,2010).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebaiknya kita terhindar dari penyakit maka kita harus memperhatikan kebersihan diri untuk mencegah terjadinya penyakit seperti penyakit infeksi (Shihab,2002), karena penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit infeksi ini dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit (Irmayanti,2013). Penyakit infeksi ini juga menyebabkan kurangnya nafsu makan sehingga mengurangi asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh.

Pada penelitian ini ibu yang terinfeksi apabila menderita penyakit infeksi sebelum hamil seperti malaria dan kecacingan, yang diajukan melalui pertanyaan kuesioner dan apabila ibu menderita salah satu dari kedua penyakit tersebut maka

dikategorikan terinfeksi. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa gejala yang pernah dialami oleh ibu.

Pada penelitian ini terdapat 1 orang (3,1%) responden yang pernah menderita penyakit infeksi tetapi tidak mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit infeksi ini mengonsumsi tablet Fe secara teratur, selain itu juga ibu banyak mengonsumsi sayuran yang di mana sayuran ini banyak mengandung zat besi yang baik bagi kesehatan ibu khususnya untuk membantu peningkatan kadar Hb pada ibu hamil.

Terdapat 26 orang (81,2%) yang tidak pernah menderita penyakit infeksi tetapi mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena pola makan ibu yang kurang baik serta ibu yang kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan.

2. Riwayat Perdarahan

Perdarahan merupakan penyebab yang paling sering dari anemia. Jika kehilangan darah, tubuh dengan segera menarik cairan dari jaringan diluar pembuluh darah sebagai usaha untuk menjaga agar pembuluh darah tetap terisi. Akibatnya darah jadi encer dan persentase sel darah merah berkurang.

Anemia yang terjadi akibat perdarahan umumnya muncul akibat gangguan gastrointestinal, penggunaan obat-obatan, menstruasi dan proses kelahiran. Anemia akibat perdarahan bisa bisa bersifat ringan sampai berat, dan memiliki gejala yang bervariasi.

Hasil penelitian menunjukkan riwayat perdarahan merupakan faktor resiko terjadinya anemia pada ibu hamil, dengan Odd Ratio OR = 2,333 artinya ibu hamil yang pernah mengalami perdarahan 2,333 kali lebih berisiko menderita anemia dibanding ibu hamil yang tidak pernah mengalami perdarahan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan dengan nilai OR = 5,096. Yang artinya perdarahan ini merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rosmiyati (2015) menunjukkan bahwa terjadinya pendarahan pada saat kehamilan memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk mengalami anemia. karena pada perdarahan terdapat pengeluaran darah sedikit-sedikit/cukup banyak yang baik diketahui ataupun tidak diketahui oleh ibu hamil.

Anemia yang disebabkan oleh perdarahan terbagi menjadi 2 yakni perdarahan akut dan perdarahan kronik. Perdarahan akut adalah timbulnya renjatan bila pengeluaran darah cukup banyak, terjadinya penurunan kadar Hb kemudian akan terjadi setelah beberapa hari. Perdarahan kronik yakni perdarahan yang terjadi sedikit demi sedikit dan biasanya tidak diketahui oleh pasien.

Salah satu gejala anemia adalah lemah, letih dan lesu. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana ibu mengalami kelelahan selama masa kehamilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Luqman 31:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤٦﴾

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Depag, 2010)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan manusia agar berbakti kepada orangtuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dan menyusui kita. Perjuangan ibu yang sangat berat mulai dari hamil dalam keadaan yang lemah hingga pada persalinan yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan bayi yang dikandungnya.

Pada penelitian ini ditemukan 4 orang (12,5%) yang memiliki riwayat perdarahan tetapi tidak menderita anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil mengonsumsi tablet Fe secara teratur untuk mengganti kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung Fe serta rajin minum susu.

Terdapat 24 (75,0%) yang tidak pernah mengalami perdarahan tetapi mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil kurang makan makanan yang mengandung protein hewani seperti telur dan ayam.

3. Asupan Protein

Berdasarkan penelitian menunjukkan responden yang berstatus anemia lebih sedikit pada responden dengan asupan protein rendah (37,5%) daripada responden dengan asupan protein cukup (52,5%). Setelah di uji didapatkan nilai

Odd Ratio pada penelitian ini $OR = 5,000$ yang artinya responden dengan asupan protein rendah 5 kali berisiko anemia dibanding responden dengan asupan protein cukup.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2017) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang antara asupan protein dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai $p = 0,043$. Jika asupan protein cukup maka kadar hemoglobin dalam darah normal atau tidak mengalami anemia. Jika asupan protein kurang dapat mengalami anemia karna kadar hemoglobin kurang dari normal.

Protein merupakan zat pembangun jaringan tubuh, pembentuk struktur tubuh, zat untuk pertumbuhan, transportasi oksigen zat gizi serta imunitas bagi tubuh. Protein berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh, kekurangan asupan protein menyebabkan transportasi zat besi akan terhambat sehingga mengakibatkan terjadinya defisiensi zat besi. Makanan yang tinggi akan protein terutama yang berasal dari hewani biasanya mengandung zat besi yang lebih banyak (Almatsier,2009). Asupan protein hewani dapat meningkatkan penyerapan zat besi didalam tubuh. Rendahnya konsumsi asupan protein maka dapat menyebabkan rendahnya penyerapan zat besi dalam tubuh. Keadaan ini dapat mengakibatkan tubuh kekurangan zat besi dan dapat menyebabkan anemia atau penurunan kadar hemoglobin dalam darah.

Mengenai makanan hewani telah tercantum dalam Al-Qur'an Q.S An-Nahl 16:14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memaikainya dan (selain itu) engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya; dan lagi supaya kamu dapat mencari rezki dari limpah karuniaNya; dan supaya kamu bersyukur” (Depag, 2010).

Ayat tersebut menyatakan bahwa binatang ternak, ikan dan hewan laut halal untuk dikonsumsi, yang terdiri dari ikan laut, kerang-kerangan, udang, cumi-cumi, ikan tawar dan hewan laut itu halal untuk dikonsumsi. Semuanya merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh (Shihab,2002). Kekurangan protein akan mengakibatkan tubuh akan memiliki daya tahan yang lemah dan mudah terserang penyakit.

Protein juga berperan dalam proses pengangkutan zat-zat gizi termasuk zat besi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan dan melalui membrane sel ke dalam sel-sel. Sehingga apabila kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi (Almatsier,2004). Protein juga membantu proses penyerapan vitamin C dalam pembentukan sel darah merah (Arifin,2013).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa protein memiliki peran esensial dalam transportasi zat besi yang ada dalam tubuh untuk pembentukan sel darah

merah di sumsum tulang. Selain itu, protein hewani yang memiliki nilai biologik tinggi dapat membantu penyerapan vitamin C dan mendukung pembentukan sel darah merah. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terhambat sehingga gagal dalam produksi sel darah merah yang kemudian jika terjadi terus-menerus akan mengakibatkan defisiensi zat besi. Oleh karena itu meningkatkan asupan protein sangat dianjurkan bagi ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bajeng.

Pada penelitian ini ditemukan 8 orang (12,5%) yang memiliki asupan protein kurang tetapi tidak mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil mengonsumsi tablet Fe secara teratur, serta mengonsumsi makanan yang mengandung Vitamin C walaupun hanya dari sayur-sayuran. Selain itu juga ibu hamil rajin memeriksakan kehamilannya sehingga dapat mendeteksi secara dini riwayat kesehatannya serta rajin mengonsumsi susu.

4. Asupan Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air yang terdapat banyak dalam buah-buahan segar. Dalam buah-buahan vitamin C terdapat dengan konsentrasi tinggi pada bagian kulit buah agak lebih rendah terdapat dalam daging buah dan lebih rendah dalam bijinya.

Makanan yang tinggi akan vitamin C dapat meningkatkan penyerapan, baik zat besi heme maupun zat besi non-heme yang jika dikonsumsi dapat membantu dalam pembentukan trombosit (sel darah merah) dan mencegah anemia gizi.

Hasil uji Odd Ratio diperoleh nilai OR 2,143 yang artinya ibu hamil dengan asupan vitamin C yang kurang 2,143 kali lebih berisiko mengalami anemia dibanding ibu hamil dengan asupan vitamin C yang cukup. Maka, dapat disimpulkan bahwa asupan vitamin C merupakan faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Soviana (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan vitamin C dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Soekirman juga mengatakan bahwa kejadian anemia selain dipengaruhi oleh kurangnya asupan zat besi, juga dipengaruhi oleh kurangnya asupan zat gizi yang bersifat *enhancer*. Salah satu senyawa *enhancer* yang dapat membantu penyerapan zat besi adalah vitamin C. Penyerapan zat besi akan meningkat dengan kehadiran vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dalam hal ini buah dan sayur merupakan bahan makanan yang harus dimasukkan dalam daftar menu untuk setiap kali makan (Almatsier,2001).

Absorpsi besi yang efektif dan efisien memerlukan suasana asam dan adanya reduktor, seperti vitamin C. Absorpsi besi dalam bentuk *non-heme* dapat meningkat empat kali lipat dengan adanya vitamin C. Oleh karena itu, kekurangan vitamin C dapat menghambat proses absorpsi besi sehingga lebih mudah terjadi anemia. Selain itu, vitamin C dapat menghambat pembentukan *hemosiderin* yang sukar di mobilisasi untuk membebaskan besi jika diperlukan. Vitamin C juga memiliki peran dalam pemindahan besi dari transferrin dalam plasma ke *ferritin* hati.

Vitamin C dapat ditemukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur yang mengandung vitamin C ada pada sayur bayam, kangkung, brokoli, kentang wortel, tomat, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kembang kol. Pada buah-buahan vitamin C paling banyak terkandung dalam buah melon, jambu biji, legekeng, papaya dan jeruk.

Konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C sangat berperan dalam absorpsi besi dengan jalan meningkatkan absorpsi zat besi nonheme hingga empat kali lipat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tannin dalam teh, fifat, fosfat dan serat dalam bahan makanan (Husaini,2001).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 11 telah dikemukakan tentang anjuran makan buah dan sayuran, sebagai berikut:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

" Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan". (Depag,2010)

Didalam Al-Qur'an memang jenis buah yang disebut hanya kurma, zaitun dan anggur. Namun menurut musafir, hal ini hanyalah contoh buah-buahan yang ada di Negara Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan. Keempat jenis buah-buahan tersebut mewakili jenis buah-buahan yang ada di bumi. Dari aspek ilmiah, buah-buahan adalah pangan sumber vitamin dan mineral (Tafsir Al-Mishbah).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan buah-buahan yang baik dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, buah-buahan ini juga mengandung zat-zat gizi yang baik bagi tubuh manusia. Dari hasil penelitian terdapat 30 ibu hamil dengan asupan vitamin C cukup dan mengalami anemia. Hal ini disebabkan oleh sumber vitamin C yang dikonsumsi oleh ibu hamil hanya berasal dari sayur-sayuran, jarang sekali ibu hamil mengonsumsi vitamin C dari sumber bahan makanan lainnya contohnya buah-buahan. Terbatasnya persediaan buah-buahan di rumah menjadi salah satu sulitnya responden mendapatkan buah-buahan untuk dikonsumsi sebagai salah satu bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C, selain itu rasa mual dan tidak suka akan buah-buahan juga menjadi salah satu alasan ibu hamil tidak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung Vitamin C.

Terdapat 14 (43,8%) ibu hamil dengan asupan vitamin C yang kurang tetapi tidak anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil tersebut mengonsumsi tablet tambah darah yang diberikan oleh petugas puskesmas, banyak mengonsumsi sumber protein hewani dan zat besi, serta rajin minum susu.

5. Asupan Zat Besi (Fe)

Kekurangan zat besi menimbulkan penyakit defisiensi yang disebut anemia gizi besi yaitu suatu keadaan di mana kadar Hb dalam darah kurang dari normal. Kurangnya pasokan zat besi (Fe) yang merupakan inti molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah menyebabkan terjadinya pengecilan ukuran hemoglobin, pengurangan jumlah sel darah merah serta rendahnya kandungan hemoglobin. Anemia zat besi ini biasanya ditandai dengan

mengecilnya ukuran sel darah merah dari ukuran normal (mikrositosis) serta turunnya kadar Hb total di bawah nilai normal (hipokromia). Kedua tanda-tanda anemia gizi besi ini biasanya yang akan mengganggu metabolisme energi sehingga dapat menurunkan produktivitas (Haslindah, 2017).

Hasil uji Odd Ratio diperoleh nilai OR = 1,457 yang artinya ibu hamil dengan asupan Fe yang kurang 1,457 kali lebih berisiko dibanding ibu hamil dengan asupan Fe yang cukup. Maka, dapat disimpulkan bahwa asupan Fe merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devani C.C (2015) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara zat besi dengan kadar hemoglobin.

Asupan makanan dalam islam, di mana terdapat ungkapan mengatakan siapa Anda adalah apa yang anda makan. Makanan demikian penting di dalam kehidupan manusia sepanjang masa sehingga dibicarakan semua orang dalam berbagai stratanya.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S Abasa 80: 27-28 tentang ciptaan Allah yang berupa biji-bijian dan sayur-sayuran yang merupakan sumber zat besi yaitu:

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا

Terjemahannya:

“Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran”
(Depag,2010)

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah SWT menciptakan tumbuhan biji-bijian di muka bumi ini yang mengandung nutrisi lengkap. Oleh karena itu, jenis makanan yang mengandung biji-bijian sangat penting dalam masa kehamilan.

Selain biji-bijian, Allah juga menciptakan sayur-sayuran dan buah di muka bumi ini. Di mana sayur mengandung nutrisi berharga, vitamin, asam folat dan mineral. Sayuran yang berwarna hijau banyak mengandung asam folat yaitu zat yang dibutuhkan untuk perkembangan bayi selama masa kehamilan serta mencegah bayi lahir cacat dan premature.

Menurut tafsir Al-Misbah, setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan perjalanan hidup manusia sejak nutfah sampai di bangkitkan. Dalam ayat disebutkan aneka tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran (Shihab,2002).

Dari hasil penelitian terdapat 14 (43,8) ibu hamil dengan asupan Fe kurang tetapi tidak anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil patuh dan rutin memeriksakan kehamilannya dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium sehingga mengetahui secara dini status kesehatannya serta rutin berkonsultasi kepada dokter. Selain itu ibu hamil juga mengonsumsi Vitamin C dan menjaga pola makan sehingga walaupun asupan Fe kurang tetapi tidak mengalami anemia.

Terdapat 15 ibu hamil dengan asupan Fe cukup dan mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan ibu hamil memiliki kebiasaan makan mie instant dan minum teh setelah makan yang menjadi faktor rendahnya konsumsi dan penyerapan zat besi dalam tubuh ibu hamil.

Hal lain yang menyebabkan adanya hubungan antara asupan Fe dengan kejadian anemia adalah karena banyaknya pantangan atau tabu makanan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil seperti larangan mengonsumsi udang yang merupakan

pelancar absorpsi zat besi. Larangan ini akan berakibat pada terhambatnya absorpsi zat besi pada ibu hamil yang akan menyebabkan terjadinya anemia.

6. Pola Makan

Pola makan yang baik selama kehamilan dapat membantu tubuh mengatasi permintaan khusus karena hamil, serta memiliki pengaruh positif pada kesehatan bayi. Pola makan yang sehat bagi ibu hamil adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat-zat gizi sesuai dengan yang dianjurkan (Manuaba, 2012). Pola makan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi dan alam. Sehingga faktor-faktor tersebut berpengaruh pada status gizi ibu hamil.

Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan beraneka ragam yang diolah dari empat jenis bahan makanan pokok, seperti beras dan alternative penggantinya, buah-buahan, sayur-sayuran serta daging atau alternative penggantinya. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus terdiri keempat bahan makanan pokok tersebut karena dari bahan-bahan tersebut mengandung zat-zat gizi yang berbeda-beda. Jika jeli dalam memilih bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh maka makanan yang kita konsumsi mengandung nutrisi yang seimbang (Keisnawati dkk, 2015). Jika pola makan yang seimbang ini tidak terpenuhi, maka cenderung akan mengakibatkan anemia pada masa kehamilannya.

Dari hasil penelitian didapatkan 29 responden (45,3%) yang memiliki pola makan kurang baik. Hasil uji Odd Ratio diperoleh nilai $OR = 1,462$ yang artinya ibu hamil yang memiliki pola makan yang buruk 1,4 kali lebih berisiko mengalami anemia daripada ibu hamil dengan pola makan yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2018) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan anemia pada masa kehamilan dengan *p value* 0,019. Responden dengan pola makan buruk lebih berisiko menderita anemia daripada responden dengan pola makan yang sehat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arrihfatur (2017) dengan judul hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Jetis Yogyakarta. Dengan hasil uji *chi-square* 0,000 yang artinya terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Terdapat 16 (50%) responden yang pola makannya baik tetapi mengalami anemia. Ibu hamil yang pola makannya baik tetapi mengalami anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti hamil pada usia yang berisiko, mengonsumsi makanan atau minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi, serta terjadi perdarahan pada masa kehamilan (Manuaba, 2004).

Terdapat 13 responden (40,6%) yang pola makannya buruk tetapi tidak mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena ibu hamil untuk dapat memenuhi kebutuhan zat besi diganti dengan mengonsumsi tablet Fe secara teratur, minum susu kehamilan, tidak terjadi perdarahan pada masa kehamilan dan mengonsumsi makanan yang mengandung Vitamin C yang berasal dari sayur-sayuran

Pola makan yang baik adalah pola makan yang seimbang dan memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, pola makan yang baik juga adalah pola makan yang sesuai dengan yang dianjurkan dan tidak berlebih-lebihan.

Dalam islam telah di atur bahwa kita tidak dianjurkan untuk memakan makanan secara berlebih-lebihan dan melampaui batas. Hal tersebut telah diatur dalam Q.S Thaha 20: 81 berikut:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Terjemahannya:

“Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-KU, maka sesungguhnya binasalah ia” (Depag RI, 2010).

Menurut tafsir Jalalain, *“Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian”* yakni nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian (dan janganlah melampaui batasnya) jika kalian mengingkari nikmat-nikmat itu (yang menyebabkan kemurkaan menimpa kalian).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa:

1. Riwayat penyakit infeksi mempunyai resiko 7 kali lebih besar mengalami anemia dibanding yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi
2. Riwayat perdarahan mempunyai resiko 2 kali lebih besar mengalami anemia dibanding yang tidak memiliki riwayat perdarahan
3. Asupan protein yang kurang mempunyai resiko 5 kali lebih besar mengalami anemia dibanding asupan protein yang cukup
4. Asupan Vitamin C yang kurang mempunyai resiko 2 kali lebih besar mengalami anemia dibanding asupan Vitamin C yang cukup
5. Asupan Fe yang kurang mempunyai resiko 1 kali lebih besar mengalami anemia dibanding dengan asupan Fe yang cukup
6. Pola makan yang buruk mempunyai resiko 1 kali lebih besar mengalami anemia dibanding pola makan yang baik.

B. *Saran*

1. Ibu hamil dianjurkan rajin membaca buku KIA minimal 2 kali dan mencari sumber informasi dari media cetak (koran, majalah, dll) maupun elektronik (televisi, radio, dll)

2. Ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit agar rajin memeriksakan kehamilannya agar dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara dini dan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam masa kehamilannya.



Lampiran 1**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN****DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS BAJENG TAHUN 2019**

Dalam rangka penelitian tentang determinan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019, maka kami mohon kesediaan ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan bersedia menjadi subyek penelitian.

Atas partisipasi ibu saya ucapkan terimakasih.

Samata,

2019

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (.....)
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2**KUESIONER PENELITIAN****DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IB HAMIL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS BAJENG 2019**

Desa/ Dusun :

Nomor Kode sampel :

Tanggal wawancara :

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Usia Kehamilan :
6. Frekuensi Kunjungan Periksa Hamil :
7. Kadar Hb :
8. Selama 2 minggu terakhir apakah pernah menderita malaria?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
9. Selama 2 minggu terakhir apakah pernah mengalami infeksi kecacingan?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

10. Selama masa kehamilan apakah pernah mengalami pendarahan?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah



Lampiran 3**LEMBAR *FOOD RECALL* 24 JAM****DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS BAJENG TAHUN 2019**

Nama :

Umur :(Tahun)

Pengukuran hari/minggu ke :/.....

Tanggal :/...../2019

Waktu Makan	Nama Masakan/ Metode Pemasakan	Nama Bahan Makanan	Berat (URT)	Berat (g)	Ket
Pagi					
Selingan					
Siang					
Selingan					
Malam					

M A K A S S A R

5. Kacang-kacangan								
Kacang koro								
Kacang merah								
Kacang tanah								
Kacang hijau								
Kacang kedelai								
Kacang mete								
Kacang polong								
Biji kenari								
Biji wijen								
6. Buah-buahan								
Alpukat								
Apel								
Markisa								
Pisang								
Kurma								
Sukun								
Susu								

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 Wawancara Responden dan *Recall 24 jam*



Gambar 2 Wawancara Responden dan *Recall 24 jam*



Gambar 3 Wawancara Responden dan *Recall 24 jam*



Gambar 4 Wawancara Responden dan *Recall 24 jam*



FREQUENCIES

Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kasus	32	50.0	50.0	50.0
	Kontrol	32	50.0	50.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

umurresponen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20	14	21.9	21.9	21.9
	20-30	40	62.5	62.5	84.4
	>30	10	15.6	15.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/Sederajat	2	3.1	3.1	3.1
	SMP/Sederajat	16	25.0	25.0	28.1
	SMA/Sederajat	37	57.8	57.8	85.9
	Diploma/Sarjana	9	14.1	14.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Riwayat Kecacingan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	7	10.9	10.9	10.9
	Resiko Rendah	57	89.1	89.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Riwayat Pendarahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	12	18.8	18.8	18.8
	Resiko Rendah	52	81.3	81.3	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Asupan Protein

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	28	43.8	43.8	43.8
	Resiko Rendah	36	56.3	56.3	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Asupan Vit.C

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	34	53.1	53.1	53.1
	Resiko Rendah	30	46.9	46.9	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Asupan Fe

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	31	48.4	48.4	48.4
	Resiko Rendah	33	51.6	51.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Pola Makan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resiko Tinggi	29	45.3	45.3	45.3
	Resiko Rendah	35	54.7	54.7	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

CROSSTAB**Case Processing Summary**

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Riwayat Kecacingan * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Riwayat Pendarahan * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Asupan Protein * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Asupan Vit.C * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Asupan Fe * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Pola Makan * Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RIWAYAT KECACINGAN * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL

Crosstab

		Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil		Total
		Kasus	Kontrol	
Riwayat Kecacingan	Resiko Tinggi	Count	6	1
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	18.8%	3.1%
	Resiko Rendah	Count	26	31
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	81.3%	96.9%
Total		Count	32	32
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Kecacingan (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	7.154	.809	63.299
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	1.879	1.241	2.844
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.263	.042	1.638
N of Valid Cases	64		

RIWAYAT PENDARAHAN * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL**Crosstab**

			Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil		Total
			Kasus	Kontrol	
Riwayat Pendarahan	Resiko Tinggi	Count	8	4	
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	25.0%	12.5%	
	Resiko Rendah	Count	24	28	
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	75.0%	87.5%	
Total		Count	32	32	
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Pendarahan (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	2.333	.624	8.719
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	1.444	.879	2.373

For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.619	.268	1.432
N of Valid Cases	64		

ASUPAN PROTEIN * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL

Crosstab

		Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil		Total	
		Kasus	Kontrol		
Asupan Protein	Resiko Tinggi	Count	20	8	28
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	62.5%	25.0%	43.8%
	Resiko Rendah	Count	12	24	36
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	37.5%	75.0%	56.3%
Total	Count	32	32	64	
	% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%	100.0%	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Asupan Protein (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	5.000	1.709	14.628
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	2.143	1.277	3.597
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.429	.228	.804
N of Valid Cases	64		

ASUPAN VIT C * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL**Crosstab**

		Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil		Total	
		Kasus	Kontrol		
Asupan Vit.C	Resiko Tinggi	Count	20	14	34
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	62.5%	43.8%	53.1%
	Resiko Rendah	Count	12	18	30
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	37.5%	56.3%	46.9%
Total		Count	32	32	64
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Asupan Vit.C (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	2.143	.788	5.825
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	1.471	.874	2.475
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.686	.418	1.128
N of Valid Cases	64		

ASUPAN Fe * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL**Crosstab**

		Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil			
		Kasus	Kontrol	Total	
Asupan Fe	Resiko Tinggi	Count	17	14	31
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	53.1%	43.8%	48.4%
	Resiko Rendah	Count	15	18	33
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	46.9%	56.3%	51.6%
Total	Count	32	32	64	
	% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%	100.0%	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Asupan Fe (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	1.457	.544	3.901
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	1.206	.738	1.973
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.828	.503	1.362
N of Valid Cases	64		

POLA MAKAN * KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL

Crosstab

		Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil			
		Kasus	Kontrol	Total	
Pola Makan	Resiko Tinggi	Count	16	13	29
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	50.0%	40.6%	45.3%
	Resiko Rendah	Count	16	19	35
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	50.0%	59.4%	54.7%
Total		Count	32	32	64
		% within Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil	100.0%	100.0%	100.0%

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pola Makan (Resiko Tinggi / Resiko Rendah)	1.462	.544	3.929
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kasus	1.207	.741	1.966
For cohort Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil = Kontrol	.826	.498	1.369
N of Valid Cases	64		

MASTER TABEL
DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS BAJENG KABUPATEN GOWA

No	Nama	status sampel	Umur	Usia Kehamilan	Kadar Hb (g/dl)	Pendidikan	Pekerjaan	Kunjungan Kehamilan	Riwayat Kecacingan	Riwayat Pendarahan	standar 80%	Asupan Protein	Kategori	Standar 80%	Asupan Vitamin	Kategori	Standar 80%	Asupan Fe	Kategori	Rata-Rata	Skor	Pola Makan
1	Ny. S	Kasus	39	2	10	3	IRT	3 kali	Ya	Ya	60,8	54,7	Kurang	68	58,7	Kurang	28	28,5	Cukup	295	381	Baik
2	Ny. W	Kasus	25	2	10	4	Dosen	4 kali	Tidak	Ya	60,8	57,5	Kurang	68	5,1	Kurang	28	19,5	Kurang	295	316	Baik
3	Ny. H	Kasus	35	2	8	3	IRT	4 kali	Tidak	Ya	60,8	45,7	Kurang	68	15,8	Kurang	28	17,6	Kurang	295	371	Baik
4	Ny. W	Kasus	38	2	8	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	50,1	Kurang	68	77,4	Cukup	28	10,4	Kurang	295	253	Buruk
5	Ny. A	Kasus	27	2	10,5	2	IRT	3 kali	Tidak	Ya	60,8	59,4	Kurang	68	37,2	Kurang	28	28	Cukup	295	236	Buruk
6	Ny. S	Kasus	18	2	9	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	64,0	Cukup	68	41,3	Kurang	28	11,3	Kurang	295	351	Baik
7	Ny. I	Kasus	22	2	10	3	IRT	5 kali	Ya	Tidak	60,8	68,4	Cukup	68	42,3	Kurang	28	9,5	Kurang	295	420	Baik
8	Ny. L	Kasus	20	2	10	4	Karyawan	5 kali	Tidak	Ya	60,8	56,8	Kurang	68	33,2	Kurang	28	10,7	Kurang	295	124	Buruk
9	Ny. M	Kasus	16	2	9	2	IRT	3 kali	Ya	Tidak	60,8	43,9	Kurang	68	56,8	Kurang	28	29,5	Cukup	295	279	Buruk
10	Ny. H	Kasus	19	2	10	3	IRT	6 kali	Tidak	Ya	60,8	19,8	Kurang	68	61,6	Kurang	28	9,4	Kurang	295	206	Buruk
11	Ny. M	Kasus	30	2	9	2	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	86,2	Cukup	68	44,6	Kurang	28	12,5	Kurang	295	159	Buruk

12	Ny. S	Kasus	17	2	9	2	IRT	5 kali	Ya	Tidak	60,8	17,2	Kurang	68	104,2	Cukup	28	28,5	Cukup	295	175	Buruk
13	Ny. S	Kasus	17	2	8,3	2	IRT	6 kali	Ya	Tidak	60,8	66,6	Cukup	68	55,4	Kurang	28	30,0	Cukup	295	369	Baik
14	Ny. H	Kasus	20	2	10	3	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	32,9	Kurang	68	83,2	Cukup	28	27,8	Kurang	295	255	Buruk
15	Ny. S	Kasus	25	2	9	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	89,7	Cukup	68	61,2	Kurang	28	27,5	Kurang	295	180	Buruk
16	Ny. I	Kasus	19	2	10	3	IRT	5 kali	Tidak	Tidak	60,8	58,6	Kurang	68	76,3	Cukup	28	31,8	Cukup	295	218	Buruk
17	Ny. N	Kasus	18	2	10	3	IRT	6 kali	Ya	Tidak	60,8	77,2	Cukup	68	73,2	Cukup	28	20,7	Kurang	295	364	Baik
18	Ny. N	Kasus	24	2	10	3	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	41,2	Kurang	68	65,6	Cukup	28	19,8	Kurang	295	356	Baik
19	Ny. A	Kasus	22	2	9,8	3	IRT	6 kali	Ya	Ya	60,8	93,8	Cukup	68	69,2	Cukup	28	17,9	Kurang	295	257	Buruk
20	Ny. T	Kasus	20	2	9	3	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	45,2	Kurang	68	80,3	Cukup	28	31,8	Cukup	295	260	Buruk
21	Ny. L	Kasus	26	2	10	3	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	32,2	Kurang	68	45,6	Kurang	28	32,6	Cukup	295	400	Baik
22	Ny. W	Kasus	22	2	9	2	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	44,5	Kurang	68	47,9	Kurang	28	31,9	Cukup	295	386	Baik
23	Ny. R	Kasus	18	2	10	2	IRT	5 kali	Ya	Tidak	60,8	52,3	Kurang	68	69,1	Cukup	28	32,5	Cukup	295	360	Baik
24	Ny. M	Kasus	28	2	10	3	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	56,9	Kurang	68	36,8	Kurang	28	43,6	Cukup	295	266	Buruk

25	Ny. S	Kasus	25	2	9	4	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	35,7	Kurang	68	84,5	Cukup	28	31,8	Cukup	295	450	Baik
26	Ny. J	Kasus	24	2	9	4	IRT	4 kali	Ya	Tidak	60,8	65,2	Cukup	68	83,6	Cukup	28	20,8	Kurang	295	249	Buruk
27	Ny. L	Kasus	24	2	10. 5	3	IRT	3 kali	Ya	Ya	60,8	94,2	Cukup	68	30,6	Kurang	28	19,8	Kurang	295	345	Baik
28	Ny. S	Kasus	22	2	8	4	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	33,9	Kurang	68	44,3	Kurang	28	28,6	Cukup	295	278	Buruk
29	Ny. T	Kasus	23	2	8	3	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	76,5	Cukup	68	42,5	Kurang	28	29,5	Cukup	295	298	Baik
30	Ny. H	Kasus	31	2	10	1	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	77,9	Cukup	68	46,7	Kurang	28	17,4	Kurang	295	376	Baik
31	Ny. I	Kasus	25	2	9	4	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	65,7	Cukup	68	56,9	Kurang	28	28,5	Cukup	295	287	Buruk
32	Ny. A	Kasus	28	2	8	2	IRT	3 kali	Ya	Ya	60,8	55,8	Kurang	68	87,6	Cukup	28	23,4	Kurang	295	426	Baik
33	Ny. N	Kontrol	23	2	13	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	98,5	Cukup	68	75,9	Cukup	28	18,5	Kurang	295	334	Baik
34	Ny. R	Kontrol	21	2	11	2	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	93,4	Cukup	68	74	Cukup	28	28,5	Cukup	295	245	Buruk
35	Ny. S	Kontrol	22	2	15	3	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	34,1	Kurang	68	77,9	Cukup	28	25,3	Kurang	295	279	Buruk
36	Ny. S	Kontrol	23	2	13	2	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	104,7	Cukup	68	89,2	Cukup	28	17,6	Kurang	295	354	Baik
37	Ny. H	Kontrol	23	2	12	3	IRT	4 kali	Ya	Tidak	60,8	37,3	Kurang	68	71,3	Cukup	28	29,3	Cukup	295	372	Baik

38	Ny. I	Kontrol	25	2	13	3	IRT	6 kali	Ya	Ya	60,8	31,5	Kurang	68	69	Cukup	28	32,1	Cukup	295	297	Baik
39	Ny. D	Kontrol	23	2	13	3	IRT	3 kali	Ya	Ya	60,8	65,2	Cukup	68	77,6	Cukup	28	31,5	Cukup	295	288	Buruk
40	Ny. N	Kontrol	41	2	13	2	IRT	3 kali	Ya	Ya	60,8	97,4	Cukup	68	88,9	Cukup	28	33,3	Cukup	295	215	Buruk
41	Ny. F	Kontrol	25	2	12	4	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	102,3	Cukup	68	85,0	Cukup	28	31,5	Cukup	295	205	Buruk
42	Ny. N	Kontrol	31	2	12	2	IRT	4 kali	Ya	Tidak	60,8	100,3	Cukup	68	79,1	Cukup	28	20,8	Kurang	295	314	Baik
43	Ny. H	Kontrol	31	2	11	2	IRT	5 kali	Ya	Ya	60,8	96,7	Cukup	68	51,9	Kurang	28	19,5	Kurang	295	256	Buruk
44	Ny. S	Kontrol	17	2	12	2	IRT	6 kali	Ya	Ya	60,8	82,1	Cukup	68	73,8	Cukup	28	28,9	Cukup	295	201	Buruk
45	Ny. R	Kontrol	22	2	13	3	IRT	6 kali	Ya	Tidak	60,8	59,6	Kurang	68	48,6	Kurang	28	32,5	Cukup	295	412	Baik
46	Ny. N	Kontrol	23	2	11	3	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	89,6	Cukup	68	56,8	Kurang	28	31,9	Cukup	295	312	Baik
47	Ny. Y	Kontrol	28	2	11	4	Karyawan ti	3 kali	Ya	Ya	60,8	89,5	Cukup	68	32,1	Kurang	28	37,9	Cukup	295	325	Baik
48	Ny. B	Kontrol	23	2	11	3	IRT	8 kali	Tidak	Ya	60,8	67,8	Cukup	68	74,7	Cukup	28	20,3	Kurang	295	231	Buruk
49	Ny. S	Kontrol	34	2	12	2	IRT	7 kali	Ya	Tidak	60,8	60,8	Cukup	68	79,5	Cukup	28	30,3	Cukup	295	413	Baik
50	Ny. K	Kontrol	23	2	13	3	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	79,3	Cukup	68	43,5	Kurang	28	28,6	Kurang	295	196	Buruk

51	Ny. A	Kontrol	25	2	11	3	IRT	8 kali	Ya	Ya	60,8	66,5	Cukup	68	56,5	Kurang	28	41,5	Cukup	295	266	Buruk
52	Ny. R	Kontrol	23	2	11	3	IRT	8 kali	Ya	Ya	60,8	45,3	Kurang	68	81,8	Cukup	28	32,1	Cukup	295	260	Buruk
53	Ny. E	Kontrol	23	2	13	4	IRT	9 kali	Ya	Ya	60,8	33,0	Kurang	68	64,7	Kurang	28	19,6	Kurang	295	220	Buruk
54	Ny. M	Kontrol	27	2	12	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	77,9	Cukup	68	72,4	Cukup	28	18,5	Kurang	295	379	Baik
55	Ny. F	Kontrol	31	2	13	3	IRT	2 kali	Ya	Ya	60,8	82,1	Cukup	68	33,6	Kurang	28	15,9	Kurang	295	206	Buruk
56	Ny. H	Kontrol	26	2	13	3	IRT	8 kali	Ya	Ya	60,8	102,5	Cukup	68	20,5	Kurang	28	20,7	Kurang	295	361	Baik
57	Ny. P	Kontrol	25	2	12	1	IRT	8 kali	Ya	Ya	60,8	38,2	Kurang	68	45,6	Kurang	28	23,5	Kurang	295	349	Baik
58	Ny. S	Kontrol	33	2	11	2	IRT	9 kali	Ya	Ya	60,8	45,2	Kurang	68	55,7	Kurang	28	19,6	Kurang	295	355	Baik
59	Ny. F	Kontrol	22	2	11	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	103,5	Cukup	68	82,8	Cukup	28	22,3	Kurang	295	297	Baik
60	Ny. A	Kontrol	28	2	11	3	IRT	6 kali	Ya	Ya	60,8	85,2	Cukup	68	88,6	Cukup	28	29,4	Cukup	295	294	Baik
61	Ny. R	Kontrol	26	2	13	3	IRT	4 kali	Ya	Ya	60,8	100,1	Cukup	68	82,9	Cukup	28	32,5	Cukup	295	382	Baik
62	Ny. H	Kontrol	19	2	11	3	IRT	2 kali	Ya	Ya	60,8	123,7	Cukup	68	18,4	Kurang	28	31,5	Cukup	295	295	Baik
63	Ny. N	Kontrol	23	2	11	3	IRT	7 kali	Ya	Ya	60,8	89,6	Cukup	68	56,8	Kurang	28	31,9	Cukup	295	312	Baik

64	Ny. W	Kontrol	20	2	11	3	IRT	8 kali	Ya	Ya	60,8	95,8	Cukup	68	43,2	Kurang	28	28	Cukup	295	297	Baik
----	----------	---------	----	---	----	---	-----	--------	----	----	------	------	-------	----	------	--------	----	----	-------	-----	-----	------





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 854924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.209 /KEPK/FKIK/VIII/2019
 Judul Penelitian : Determinan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng Tahun 2015
 Nama Peneliti : Wahidatul Husna
 No. Register : U I N A M I 9 0 8 0 2 0 9


A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> f. Disetujui <input type="checkbox"/> g. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> h. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> i. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> j. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang bersisko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr dr.H.Andi Army Nurdin,M.Sc

Makassar, 09 Agustus 2019

Ketua



Dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc.
 NIP. 197302031983121001



120101014212102

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21775/S.01/PTSP/2019
 KepadaYth.
 Lampiran :
 Bupati Gowa
 Perihal : Izin Penelitian

di
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2692/FKIK/PP.00.9/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : WAHIDATUL HUSNAH
 Nomor Pokok : 70200115001
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 35, Sarnata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" DETERMINAN KEJADIN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS BAJENG TAHUN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Agustus s/d 23 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 16 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Terdapat 2 (dua) Lembar
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
 2. Peneliti

DINAS PTSP 16-08-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://dinas.makselprov.go.id> Email : ptsp@makselprov.go.id
 Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 20 Agustus 2019

Nomor: 070/1279/BKB.P/2019

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Ka. Puskesmas Bajeng

Di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 21775/S.01/PTSP/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : WAHIDATUL HUSNAH
 Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 20 Juni 1997
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi (SI)
 Alamat : Samata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"DETERMINAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS BAJENG TAHUN 2019"**

Selama : 23 Agustus s/d 23 September 2019

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA-BADAN
 SEKRETARIS,**

DRS. ALWI AKIFIN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19670808 198811 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
4. Yang Bersangkutan ;
5. Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BAJENG
Jl. Pramuka No. 1 Telp. (0411) 842033-8204224 Limbung
KEC. BAJENG KAB. GOWA 92152
Email : pkmbajenglimbunggowa@yahoo.com



REKOMENDASI

Nomor : 440.1/50/ PKM-B J/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa

Nama : **WAHIDATUL HUSNAH**
Tempat/Tanggal lahir : Gowa, 20 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Samata

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Dalam Wilayah Kerja Bajeng Berdasarkan Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Gowa Nomor : 070/1279/BKP.P/2019, Tanggal 20 Agustus 2019, Tentang Rekomendasi Penelitian Dengan Judul :

"KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUKESMAS BAJENGTAHUN 2019"

Waktu pelaksanaan : 23 Agustus s/d 23 September 2019

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperfunya.

Limbug, 17 September 2019

Kepala Puskesmas Bajeng
Kab. Sub. Bag. Tata Usaha,



ALTAUDDIN, SKM

Pangkat : Penata

Nip. 197510121997021001

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa (Seb. Laporan)
2. Arsip

BIOGRAFI PENULIS



Wahidatul Husna lahir di Majannang, 20 Juni 1997, anak pertama dari dua bersaudara. Memulai pendidikan di SDI Pattallassang, kemudian melanjutkan pendidikan keningkat menengah pertama di SMPN 1 Parigi sampai ke tingkat menengah akhir di SMAN 1 Parigi pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan keningkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015.

