

**FORMULASI SEDIAAN GEL EKSTRAK AIR BUNGA ROSELLA**  
**(*Hibiscus sabdariffa L*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci**  
**(*Oryctolagus cuniculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**Nur Hidayah**

NIM. 70100115065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR

**2019**

M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 70100115065  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 November 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : BTN. Graha Kalegowa C16/12  
Judul : Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 November 2019

Penyusun

**Nur Hidayah**  
NIM. 70100115065

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Formulasi Sediaan Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)**" yang disusun oleh Nur Hidayah, NIM: 70100115065, mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 12 November 2019 yang bertepatan dengan 15 Rabi'ul Awal 1441 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 12 November 2019**  
**15 Rabi'ul Awal 1441 H**

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si.,M.Si.,Apt	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Munifah Wahyuddin, S.Farm.,M.Sc.,Apt	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UTN Alauddin Makassar,



**Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes**  
**NIP. 19800701 200604 2 002**

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syamsu Rijal Salam S.Sos dan Ibunda tercinta Alm Sugiyati Sultan S.Sos dan Mismawati S.Sos yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ibunda Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Munifah Wahyudin, S.Farm.,M.Sc.,Apt selaku Pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis dari awal hingga akhir.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan hormat atas bantuan semua pihak yakni kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Andi Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc.,Apt selaku ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm.,M.Si.,Apt selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si dan Bapak Nurkhalis A.Ghaffar, S.Ag.,M.Hum selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Seluruh dosen dan laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan segala sesuatu yang bernilai manfaat bagi penulis selama proses studi, serta segenap Staf Tata Usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar ‘PULV15” yang senantiasa menjadi tempat keluh kesah serta selalu memberikan semangat selama berada di Jurusan Farmasi.
8. Khusus untuk saudari tidak sedarah yang selalu ada baik suka maupun duka sedari Maba hingga detik ini. Nurul Annisa Utami, Nurlina, Ummah Ashliha, Nur Islamiah dan khususnya untuk Ika Yulianti Fadilah, Nur Pratiwi Kartikasari yang tak henti-hentinya memberikan semangat hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Laboratorium Gebyanti Swara, Fitrah Insani, Nur Ismi, Nurminah dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penelitian, terima kasih untuk bantuan, semangat dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh


dari kata sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 12 November 2019

Penulis,

**Nur Hidayah**  
NIM. 70100115065



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	.....
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
1. Definisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Sampel.....	8
1. Klasifikasi Tanaman Bunga Rosella.....	8
2. Nama Daerah.....	8
B. Deskripsi Tanaman Bunga Rosella.....	9
C. Morfologi Tanaman Bunga Rosella.....	9
D. Kandungan Kimia Bunga Rosella.....	10
E. Anatomi dan Fisiologi Kulit.....	10
1. Epidermis.....	11
2. Dermis.....	13
3. Subkutan atau Hipodermis.....	14
F. Absorpsi Obat Melalui Kulit.....	14
F. Luka.....	16

G. Sediaan Gel .....	21
1. Definisi Gel .....	21
2. Basis Gel.....	21
H. Komposisi Sediaan Gel .....	22
I. Hewan Coba.....	24
J. Tinjauan Islam .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Instrumen Alat .....	31
1. Alat .....	31
2. Bahan.....	31
D. Pengolahan dan Pengujian Sampel .....	32
1. Penyiapan Sampel .....	32
2. Pengolahan Sampel .....	32
3. Pembuatan Sediaan Gel.....	32
4. Uji Stabilitas Sediaan Gel .....	33
5. Penyiapan Hewan Uji.....	34
6. Pemberian Luka.....	34
7. Uji Perlakuan.....	35
8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	
A. Hasil Penelitian .....	36
B. Pembahasan .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	41
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
<b>KEPUSTAKAAN</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Formulasi Sediaan Gel .....	32
2. Hasil Rendamen Ekstrak Air Bunga Rosella .....	36
3. Hasil Penyembuhan Luka .....	36
4. Hasil Pengujian Organoleptik Gel Ekstrak Air Bunga Rosella.....	37
5. Hasil Pengujian Ph Gel Ekstrak Air Bunga Rosella .....	37
6. Hasil Pengujian Viskositas Gel Ekstrak Air Bunga Rosella.....	37
7. Hasil Pengujian Homogenitas Ekstrak Air Bunga Rosella .....	38
8. Hasil Pengujian Daya Sebar Ekstrak Air Bunga Rosella.....	38
9. Perubahan Panjang Luka Sayat .....	54
10. Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat .....	55
11. Presentase Hari Perubahan Panjang Luka Sayat .....	56
12. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel .....	58
13. Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1. Penyiapan Sampel Bunga Rosella .....	49
Lampiran 2. Penyiapan Ekstrak Menggunakan Metode <i>Freeze Drying</i> .....	50
Lampiran 3. Pembuatan Sediaan Gel .....	51
Lampiran 4. Uji Stabilitas Sediaan Gel .....	52
Lampiran 5. Perlakuan Terhadap Hewan Coba .....	53
Lampiran 6. Perubahan Panjang Luka Sayat.....	54
Lampiran 7. Presentase Perubahan Panjang Luka.....	55
Lampiran 8. Perhitungan RAL, Hubungan Formula dan Penyembuhan Luka .....	56
Lampiran 9. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel .....	58
Lampiran 10. Perubahan Persentase Rendamen Ekstrak.....	59
Lampiran 11. Perhitungan Pembuatan Gel .....	60
Lampiran 12. Gambar Penelitian.....	61



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar 1. Bunga Rosella ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) .....	8
Gambar 2. Pengolahan Sampel Bunga Rosella .....	62
Gambar 3. Sediaan Gel Ekstrak Air Bunga Rosella.....	63
Gambar 4. Uji Perlakuan pada Kelinci .....	64
Gambar 5. Pengujian pH.....	65
Gambar 6. Pengujian Homogenitas.....	65
Gambar 7. Pengujian Daya Sebar .....	66
Gambar 8. Pengujian Viskositas .....	66



## ABSTRAK

**Nama** : Nur Hidayah  
**Nim** : 70100115065  
**Judul** : **Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).**

---

Rosella memiliki kandungan senyawa saponin, flavonoid dan tanin yang dapat berperan dalam menyembuhkan luka sayat. Dalam penelitian ini dilakukan uji aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dengan menggunakan sediaan gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas penyembuhan terhadap luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dan konsentrasi optimum pada sediaan gel ekstrak air bunga rosella. Ekstrak air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) diformulasikan menjadi sediaan gel menggunakan basis Karbomer dengan tiga konsentrasi yaitu 5%, 10% dan 15%, selain itu kontrol positif yang digunakan yaitu Bioplacenton® sedangkan kontrol negatif menggunakan basis gel. Luka sayat dilakukan pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dengan panjang luka yaitu 3 cm dan kedalaman 2 mm hingga menembus lapisan kulit dermis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelinci yang diberikan gel dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% memiliki nilai persentase rata-rata penyembuhan luka berturut-turut yaitu 17,66%, 15,33% dan 12,33%. Dapat disimpulkan dari hasil uji Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) bahwa sediaan gel yang memberikan efek penyembuhan luka sayat yang paling baik adalah sediaan gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dengan konsentrasi 15%.

**Kata kunci : Bunga Rosella, Luka Sayat, Gel**



## ABSTRACT

**Name** : Nur Hidayah  
**Student Number** : 70100115065  
**Title** : **Formulation Preparation Gel Water Extract Of  
Rosella Flowers (*Hibiscus sabdariffa L.*) Cut Wound  
Healing on Rabbits (*Oryctolagus cuniculus*).**

---

Rosella flower contains saponin, flavonoid and tannin compounds which can act as wound healing. This research was conducted on the rest wound healing activities of wound healing in rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) using a rosella flower extract gel (*Hibiscus sabdariffa L.*). The purpose of this study was to determine the healing activity of cut wounds in rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) and optimum concentration in rosella flower extract gel water preparations. Rosella Flower. Rosella is formulated into gel preparations using a carbomer base with three concentrations of 5%, 10% and 15% while the positive control used was Bioplacenton® while negative controls used gel bases. The cut is done on rabbits wound length of 3 cm with a depth of 2 mm to penetrate the dermis skin layer. The results showed that rabbits given a gel with a concentration of 5%, 10% and 15% had an average percentage of successive wound healing which was 17,66, 15,33% and 12,33%. It can be concluded from the results of the Completely Randomized Design (CRD) test and the Smallest Significant Difference Test (LSD) that the gel preparations that provide the best wound healing effect are rosella flower extract gel (*Hibiscus sabdariffa L.*) gel with a concentration of 15%.

**Keywords : Rosella Flower, Healing Wound, Gel**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Luka adalah salah satu proses rusaknya struktur anatomi pada kulit yang disebabkan goresan benda tajam, benturan pada benda tumpul, gigitan hewan, bahan kimia, sengatan listrik, dan ledakan (Sjamsuhidajat, 2005). Luka terdiri dari dua yaitu luka akut dan luka kronik. Contoh luka akut yaitu luka jahit karena pembedahan, luka sayat, luka bakar dan luka tusuk. Sedangkan contoh luka kronik yaitu ulkus diabetes, ulkus venous. Luka sayat termasuk dalam luka akut yang memiliki serangan cepat dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan (Perdanakusuma, 2007).

Luka sayat adalah salah satu luka yang terjadi karena teriris benda tajam, seperti terjadi karena pembedahan. Ciri-ciri luka sayat yaitu luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka (Berman, 2009). Luka yang terjadi apabila di biarkan maka akan terjadi infeksi sehingga mikroorganisme yang ada di sekeliling luka dapat masuk ke dalam tubuh sehingga kulit, jaringan pengikat, otot, syaraf, pembuluh darah dan selaput tulang (Prasetyo, 2009).

Proses perubahan kompleks berupa pemulihan kontinuitas dan fungsi anatomi dapat diartikan sebagai penyembuhan luka (Shenoy C, 2009). Penyembuhan luka dapat membentuk sel-sel secara terus menerus dan interaksi sel matrik dalam tiga fase. Fase normal dalam penyembuhan luka yaitu fase inflamasi selama 0-7 hari, fase regenerasi selama 3-4 hari, dan fase *remodeling* selama 3-12 bulan atau lebih (Gadekader, 2012). Tahap fisiologis penyembuhan luka terdiri dari 4 fase yaitu fase inflamasi, destruktif, proliferasi dan maturasi (Ariningrum, 2017). Proses penyembuhan secara alami dapat dinormalkan kembali oleh tubuh (Sjamsuhidajat, 2005).

Penyembuhan luka dapat dilakukan dengan obat modern maupun obat tradisional. Obat tradisional lebih banyak digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit oleh hampir 80% populasi di dunia (Babu, 2002).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2007, penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan masyarakat. Pengobatan tradisional sering digunakan karena bahan yang mudah didapat dan biaya yang murah. Pengobatan tradisional dinilai lebih aman jika digunakan sesuai dengan kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu dan tanpa penyalahgunaan (Sari, 2006). Pengobatan tradisional dimanfaatkan untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit, peningkatan daya tahan tubuh serta mengembalikan kebugaran (Direktorat, 2007).

Banyak tanaman di sekitar yang bermanfaat untuk kesehatan yang kurang diperhatikan, salah satunya adalah bunga rosella. Walaupun di pasaran saat ini sudah banyak yang beredar produk teh bunga rosella, namun pemanfaatannya sangat terbatas. Di masyarakat umumnya rosella hanya dimanfaatkan untuk minuman (Aisiyah, 2017).

Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) adalah salah satu tumbuhan keluarga Malvaceae termasuk dalam tanaman yang relatif mudah untuk tumbuh serta digunakan sebagai sumber makanan dan serat banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan (Da-Costa-Rocha, 2014).

Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) telah banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk sembelit, penyakit jantung, hipertensi, infeksi saluran kemih, kanker, diabetes dan gangguan saraf. Dalam penelitian Pemanfaatan Bunga Rosella sebagai Bahan Pewarna Lipstik mengatakan bahwa bunga rosella

mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami pengganti pewarna sintetik (Syamsul, 2017). Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) juga berpotensi sebagai antioksidan, antiobesitas, antimikroba dan hepatoprotektif (Patel, 2013). Dalam penelitian sebelumnya John Kenneth Mensah. 2015. Antioxidant and Antimicrobial Activities of the Extracts of the Calyx of Hibiscus Sabdariffa Linn, menyatakan bahwa Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) mengandung glikosida, flavonoid, saponin, minyak esensial, triterpen, tanin, steroid, karatenoid, glikosida, antarkuinon, antarkuinon glikosidan dan polifenol (Mensah, 2015).

Menurut Anggraini. 2002, flavonoid memiliki efek antiinflamasi dimana berfungsi sebagai anti radang dan mampu mencegah kekakuan dan nyeri (Anggraini, 2002). Saponin mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi melawan fungi dan bakteri terhadap proses penyembuhan luka (Faure, 2002). Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih dan antiseptik yang berfungsi membunuh kuman atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang biasa timbul pada luka sehingga luka tidak mengalami infeksi yang berat (Robinson, 1995).

Gel adalah salah satu sediaan semipadat yang terdiri dari molekul kecil atau besar dalam pelarut cair yang dibuat seperti agar-agar dengan penambahan zat pembentuk gel (Allen, 2011). Gel memiliki penggunaan dan penyebaran yang lebih baik, mudah dan cepat digunakan pada kulit. Selain itu gel dapat menyejukkan, melembabkan dan mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan pada luka (Amalia, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah formulasi gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) memiliki aktivitas penyembuhan terhadap luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) ?
2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dalam formulasi gel yang efektif terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) ?

## **C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup**

### **1. Defenisi Operasional**

- a. Formulasi adalah proses mengubah bahan baku baik tunggal maupun kombinasi untuk menjadi produk sediaan farmasi.
- b. Gel adalah sediaan semipadat yang mengandung zat aktif dan dapat larut sehingga sediaan jernih dan tembus
- c. Ekstrak air adalah suatu zat yang dihasilkan dari hasil penyarian dengan menggunakan metode *Freeze Drying*.
- d. Bunga rosella adalah tanaman herbal yang digunakan untuk pengobatan luka sayat.
- e. Luka sayat adalah luka yang terjadi karena teriris benda tajam.
- f. *Freeze Drying* adalah suatu metode pengeringan dari bahan cair yang dibekukan kemudian dipanaskan dalam ruang hampa udara.

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dalam menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), serta mengetahui konsentrasi optimum ekstrak air

bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dalam menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan John Kenneth Mensah. Antioxidant and antimicrobial activities of the extracts of the Calyx of Hibiscus Sabdariffa Linn. 2015, menyatakan bahwa ekstrak air dari bunga rosella mengandung glikosida, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid, tannin, polifenol, karotenoid, antarkuinon dan antarkuinon glikosida. Peneliti mengambil acuan dari jurnal tersebut dengan menggunakan ekstrak air (Mensah, 2015).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aried Eriadi 2015. Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steen) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Tikus Putih Jantan. Formulasi Salep ekstrak etanol (*Anredera cordifolia*) menggunakan konsentrasi 5%, 10%, 15%, kontrol positif salep betadine, kontrol negatif (basis salep). Hasil penelitian pada konsentrasi 15% lebih efektif dalam penyembuhan luka sayat dibandingkan dengan dosis 5% dan 10%. Dari penelitian ini, peneliti mengambil konsentrasi yang sama yaitu 5%, 10% dan 15% (Eriadi, 2015).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lena Maulina dengan judul Formulasi Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) Dengan Variasi Gelling Agent Sebagai Sediaan Luka Bakar. 2015. Mengatakan bahwa basis Na-CMC mempunyai daya sebar yang pendek walaupun daya lekat paling lama dibandingkan dengan basis karbopol dan tragakan sehingga pelepasan zat aktif tidak maksimal karena tertahan oleh *gelling agent* Na-CMC. Sementara basis tagakan tidak menyembuhkan luka dibandingkan dengan basis karbopol walaupun daya sebar basis tragakan paling besar namun karena viskositas yang terlalu encer mengakibatkan daya lekat yang cepat

sehingga zat aktif yang terabsorpsi di kulit jumlahnya sedikit. Dari penelitian ini, peneliti mengambil acuan bahan karbopol sebagai basis gel (Maulina, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzi dengan judul Efektivitas Salep Getah Jarak Pagar (*Jatropha curcas*, Linn) pada Fase Epitelisasi Penyembuhan Luka Sayat Mencit (*Mus musculus*) tahun 2017 yang mengatakan bahwa pengolahan data hasil penelitian menggunakan metode ANOVA (Analisis Varian) secara rancangan acak lengkap satu arah (RAL). Dari penelitian ini, peneliti mengambil acuan menggunakan metode pengolahan data yaitu metode ANOVA dan RAL (Fauzi, 2017).

Berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan Komala dengan judul Uji Efektivitas Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Bakteri *Streptococcus pneumonia* mengatakan bahwa ekstrak etanol dan ekstrak air kelopak bunga rosella efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus pneumonia* karena ekstrak dari keduanya mengandung senyawa tannin, saponin dan flavonoid. Dari penelitian tersebut, merujuk untuk melakukan penelitian ini.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan Awal Januari S dengan judul Pengeringan Bengkuang Dengan Sistem Pengeringan Beku Vakum (*Vacuum Freeze Drying System*). 2014, menyatakan bahwa pengeringan beku (*Freeze Drying*) merupakan salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas dan juga produk hasil pengeringan beku dapat mempertahankan stabilitas produk dan stabilitas struktur bahan. Peneliti menggunakan metode pengeringan yang sama yaitu *Freeze Drying* (Januari, 2014).

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

a. Mengetahui ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) pada sediaan gel yang aktif terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

b. Mengetahui konsentrasi optimum ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dalam formulasi gel yang efektif terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk penyembuhan luka sayat sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai obat penemuan baru.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Uraian Sampel*

##### 1. **Klasifikasi Tanaman Bunga Rosella (Mardiah, 2009)**

Kingdom : Plantae  
Divisio : Spermatophyta  
Subdivisio : Angiospermae  
Kelas : Dicotyledonae  
Ordo : Malvaceae  
Famili : Malvaceae  
Genus : Hibiscus  
Spesies : *Hibiscus sabdariffa L*



Gambar 1. Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L*)

##### 2. **Nama Daerah**

Nama daerah : Rosella, asam paya, asam susur, dan frambozen (Rosella), Rosella atau buah rosella (Australia), Mestha atau chin baung (India), krajeb (Myanmar), Asam paya atau asam susur (Malaysia), oseille rouge, oseille de guinee, atau l'oiselle (Prancis), luo shen hua (china) (Mardiah, 2009), Rosella di Indonesia dikenal dengan nama daerah gamet walanda (Sunda), kasturiroriha (Ternate), bunga rosella (Sulawesi).

## **B. Deskripsi Tanaman Bunga Rosella**

Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah tumbuhan semak umur satu tahun, tinggi tumbuhan mencapai 2,4 m dengan batang yang halus atau hamper halus, berbentuk silinder berwarna merah. Daunnya berseling dengan panjang 7,5–12,5 cm berwarna hijau, ibu tulang daun kemerahan, tangkai daun pendek. Helai daun yang terletak dibagian pangkal batang tidak berbagi, bentuk daun bulat telur, tangkai daun pendek. Daun-daun dibagian cabang dan ujung batang berbagi, menjadi 3 toreh, lebar toreh daun 2,5 cm, tepi daun berringgit, daun penumpu bentuk benang, panjang tangkai daun 0,3–12 cm, hijau hingga merah, pangkal daun meruncing, tepi daun berringgit, pangkal daun tumpul hingga meruncing, sedikit berambut (Da-Costa-Rocha, 2014).

Bunga tunggal, kuncup bunga tumbuh dari bagian ketiak daun, tangkai bunga berukuran 5–20 mm, kelopak bunga berlekatan, tidak gugur, tetap mendukung buah, berbentuk lonceng, mahkota bunga berlepasan, berjumlah 5 petal, mahkota bunga berbentuk bulat telur terbalik, warna kuning, kuning kemerahan, benang sari terletak pada suatu kolom pendukung benang sari, panjang kolom pendukung benang sari sampai 20 mm, kepala sari berwarna merah, panjang tangkai sari 1 mm, tangkai putik berada di dalam kolom pendukung benang sari, jumlah kepala putik 5 buah, warna merah. Buah kapsul berbentuk bulat telur, ukuran buah 13–22 mm x 11–20 mm, tiap buah berisi 30–40 biji. Ukuran biji 3–5 mm x 2–4 mm, warna coklat kemerahan (Direktorat, 2007).

## **C. Morfologi Tanaman Bunga Rosella**

Rosella merah (*Hibiscus sabdariffa* L.) termasuk dalam genus hibiscus, family malvaceae yang mencakup lebih dari 300 spesies setiap tahunnya. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat ada juga yang mengatakan bahwa tanaman ini berasal dari India. Saat ini, banyak dibudidayakan di daerah tropis dan

subtropis termasuk India, Arab Saudi, Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Mexico. Rosella merah mulai dikenal dan ditanam di Asia sejak abad ke-17. Ditanam secara besar-besaran di Indonesia sejak tahun 1920. Rosella dapat hidup lama dan dapat tumbuh mencapai ketinggian 0.5 -3 meter (Da-Costa-Rocha, 2014).

#### **D. Kandungan Kimia Rosella**

Rosella mengandung banyak vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif yang penting, seperti asam organik, pitosterol, dan polifenol, yang diantaranya sebagai antioksidan. Selain glukosida hibiskritin (flavanol) yang dihasilkan oleh kelopak bunga rosella, tanaman ini juga menghasilkan gossipetin dan hibiskin (antosianin) (Al-Hashimi, 2012). Bunga Rosella menurut Mensah memiliki kandungan glikosida, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, tannin, karotenoid, polifenol, antarkuinon dan antarkuinon glikosida (Mensah, 2015).

#### **E. Anatomi dan Fisiologi Kulit**

Integumen (kulit) merupakan salah satu bagian sistem organ yang terbesar yang melingkupi kulit, bulu, rambut, kuku, kelenjar keringat dan produknya (keringat atau lendir) (Widia, 2015).

Kulit merupakan organ yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Beratnya yaitu sekitar 16% berat tubuh, orang dewasa 2,7-3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5-1,9 m<sup>2</sup>. Tebalnya mulai 0,5 mm-6 mm, tergantung jenis kelamin dan umur (Perdanakusuma, 2007).

Fungsi kulit terdapat beberapa yaitu (Sloane, 2004)

a) Sebagai perlindungan, dengan adanya kulit dapat melindungi tubuh dari mikroorganisme dan juga perlindungan terhadap sinar ultraviolet matahari karena terdapat melanin.

b) Sebagai pengatur suhu tubuh dimana pembuluh darah dan kelenjar dalam kulit dapat mempertahankan dan mengatur suhu tubuh.

c) Sebagai ekskresi, ekskresi pada tubuh melalui kelenjar-kelenjar keringat yang dapat berupa zat berlemak, air dan ion-ion seperti  $\text{Na}^+$ .

d) Sebagai metabolisme, salah satu proses metabolisme yaitu sintesis vitamin D yang penting untuk pertumbuhan tulang dengan cara bantuan sinar ultraviolet atau radiasi sinar matahari.

e) Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat dengan konsistensi yang proporsional tidaklah mudah menyerap air, larutan maupun benda padat. Kulit hanya dapat menyerap cairan mudah menguap dan bersifat lipofil (larut lemak).

f) Fungsi pembentukan pigmen. Sel melanosit (pembentuk pigmen) ditemui di lapisan basal yang berasal dari rigi syaraf (Rahman, 2010). Kelompok sel ini 'mengecat' kulit dan rambut dengan pigmen yang dihasilkannya. Jumlah pigmen melanin yang terdapat pada kulit akan menentukan warna kulit tersebut. Semakin banyak pigmen yang dihasilkan, semakin gelap pula warna kulit. Namun, hal ini bertujuan untuk melindungi sel-sel kulit dari bahaya radiasi yang ditimbulkan sinar UV.

Kulit mencakup 3 lapisan dan bagian-bagiannya. Ketiga lapisan tersebut yaitu epidermis, dermis dan subkutis (Widia, 2015).

### **1. Epidermis**

Bagian kulit paling luar merupakan Epidermis. Epidermis memiliki ketebalan yang berbeda-beda, paling tebal berukuran 1 mm seperti pada telapak tangan dan telapak kaki sedangkan yang paling tipis terdapat pada bagian pipi, kelopak mata, dahi dan perut. Sel-sel epidermis juga disebut sebagai keratinosit. Zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-

dinding kapiler dermis akan diperoleh sehingga epidermis melekat pada dermis (Widia, 2015).

Lapisan epidermis yang paling atas merupakan lapisan tanduk (Stratum Korneum). Lapisan ini mencakup beberapa lapisan pipih yang mudah terlepas dan tergantikan dengan sel yang baru setiap 4 minggu karena pada usia setiap sel biasanya hanya 28 hari. Pada saat terlepas, kondisi kulit akan terasa sedikit kasar sampai muncul lapisan baru.

a) Lapisan bening (Stratum Lusidum) merupakan lapisan yang terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil, tipis dan translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya) yang terletak di bawah stratum korneum. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening.

b) Lapisan berbutir (Stratum Granulosum) tersusun oleh sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Stoughton menemukan bahwa di dalam butir keratohyalin itu terdapat bahan logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit (Shenoy C, 2009).

1) Keratin adalah protein keras dan resilien, anti air dan melindungi permukaan kulit terbuka.

2) Keratin pada lapisan epidermis adalah keratin lunak yang berkadar sulfur rendah, berlawanan dengan keratin yang ada di kuku dan rambut.

3) Saat keratohialin dan keratin berkumulasi, maka nucleus sel berdisintegrasi menyebabkan kemarian sel.

c) Lapisan bertaju (Stratum Spinosum) adalah lapisan sel spina atau tanduk disebut demikian karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan menyerupai spina. Spina adalah bagian penghubung intraseluler yang disebut desmosom (Sloane, 2004)

d) Lapisan benih (Stratum basal atau germinativum) adalah lapisan tunggal sel-sel yang melekat pada jaringan ikat pada lapisan kulit dibawahnya (dermis). Pembelahan sel yang cepat berlangsung pada bagian ini dan sel baru didorong masuk ke lapisan berikutnya (Sloane, 2004).

e) Stratum korneum adalah epidermis teratas, terdiri dari 25 sampai 30 lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan semakin gepeng saat mendekati permukaan kulit. Epidermis tipis yang melapisi seluruh tubuh, kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki, tersusun hanya dari lapisan basalis dan korneum.

1) Permukaan ternuka dari stratum korneum mengalami proses pergantian ulang yang konsisten atau deskuamasi.

2) Keseluruhan lapisan epidermis akan diganti dari dasar ke atas setiap 15 sampai 30 hari.

## **2. Dermis**

Tempat ujung saraf rasa ada pada dermis atau kulit jangat. Dermis juga tempat keberadaan kandungan rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit (Sebasea) atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening (Widia, 2015).

Pada dasarnya dermis terdiri dari serat-serat yang bisa membuat kulit berkerut sehingga akan kembali ke bentuk semula. Serat protein yang disebut kolagen atau jaringan penunjang memiliki fungsi sebagai pembentuk jaringan-jaringan kulit yang dapat menjaga kekeringan dan kelenturan kulit. Dalam lapisan kulit dermis terdapat dua macam kelenjar yaitu kelenjar keringat (Sudorifea) dan kelenjar palit (Sebasea) (Widia, 2015).

Kelenjar keringat (Sudorifera) dapat membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh dan mengatur suhu badan seperti rangsangan oleh panas, latihan jasmani, emosi dan obat-obat tertentu.

a) Kelenjar palit (Sebacea) berada pada bagian kulit yang berdekatan dengan rambut terdiri dari gelembung kecil yang bermuara seperti kandungan rambut (folikel).

### **3. Subkutan atau Hipodermis**

Lapisan subkutan atau hipodermis dapat mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf juga dapat berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak tersebut bervariasi (Widia, 2015).

Lapisan lemak ini disebut penikulus adiposus yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat dan juga pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama (berlainan). Guna penikulus adiposus adalah sebagai shock beaker atau pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas atau untuk mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan tambahan untuk kecantikan tubuh. Di bawah subkutis terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot (Rahman, 2010).

Fungsi Subkutis / hipodermis melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh dan mechanical shock absorber (Perdanakusuma, 2007).

### **F. Absorpsi Obat Melalui Kulit**

Mekanisme kerja obat terjadi ketika bertemu dengan reseptor yang sesuai dengan senyawa komponen dalam obat itu. Absorpsi obat melalui kulit merupakan upaya untuk menghantarkan senyawa dalam obat untuk bertemu dengan reseptornya yang ada di kulit tanpa harus melewati saluran gastrointestinal (peroral). Absorpsi bahan dari luar kulit menuju hingga ke bawah kulit yang tercakup dalam aliran darah, disebut absorpsi perkutan. Umumnya, absorpsi perkutan dari bahan obat ada pada preparat dermatologi, seperti cairan, gel, salep,

krim, dan pasta, yang tidak hanya tergantung pada sifat kimia fisika dari bahan obat apa saja, tapi juga pada sifat apabila dimasukkan ke dalam bahan pembawa dalam sediaan farmasetik.

Pembawa dalam sediaan farmasetik tidak dapat lebih jauh menembus kulit atau pembawa bahan obat melalui kulit, terhadap kadar dan tingkat penembus kulit, pembawa tidak mempengaruhi laju dan derajat penetrasi zat obat, dan derajat serta laju penetrasi variasi dengan berbedanya obat dan pembawa. Oleh karena itu, untuk absorpsi obat percutan dan tingkat efikasi terapi yang dihasilkan, maka setiap kombinasi pembawa dalam suatu sediaan obat, harus diuji dan terbukti secara saintifik sendiri-sendiri (Ansel, 2008: 490).

Melalui penelitian yang terus mengalami kemajuan, maka muncul adanya hipotesis yang menganggap bahwa obat dapat mengalami penetrasi melewati kulit yang utuh setelah pemakaian topikal melalui dinding folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar lemak, atau antar sel dari selaput tanduk. Seharusnya bahan obat yang dipakai mudah memasuki kulit yang rusak atau pecah, akan tetapi penetrasi semacam itu bukan merupakan proses absorpsi percutan yang benar (Ansel, 2011). Penetrasi obat umumnya melalui lapisan epidermis. Komponen lemak menjadi faktor utama tinggi rendahnya penetrasi obat melalui kulit.

Kulit yang utuh, akan memudahkan penetrasi obat melalui lapisan epidermis di mana hal ini merupakan jalur yang lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Ini disebabkan luas permukaan yang lebih rendah jika dibanding kulit yang tidak mengandung elemen anatomi. Lebih lanjut, selaput yang menutupi lapisan tanduk umumnya tidak terus menerus dan tidak mempunyai daya tahan terhadap penetrasi, karena pada susunan dari bermacam-macam selaput dengan proporsi dan keringat yang diproduksi dan derajat daya pelepasnya melalui pencucian atau penguapan keringat (Ansel, 2011).

## **G. Luka**

Luka merupakan salah satu rusak atau hilangnya sebagian jaringan tubuh. Salah satu penyebab luka yaitu berasal dari tusukan atau goresan benda tajam, kecelakaan, benturan benda tumpul, terkena tembakan, gigitan hewan, terkena air panas, terkena api atau terbakar, listrik dan petir (Martutik, 2013).

Luka diklasifikasikan dalam 2 bagian (Perdanakusuma, 2007) :

### **1. Luka akut**

Luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Kriteria luka akut adalah luka baru, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan Contoh : Luka sayat, luka bakar, luka tusuk, crush injury. Luka operasi dapat dianggap sebagai luka akut yang dibuat oleh ahli bedah. Contoh : luka jahit, skin grafting.

### **2. Luka kronik**

Luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali (rekuren) dimana terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderita. Pada luka kronik luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik terhadap terapi dan punya tendensi untuk timbul kembali. Contoh : Ulkus dekubitus, ulkus diabetik, ulkus venous, luka bakar.

Luka sayat merupakan salah satu luka yang terjadi akibat teriris benda tajam, seperti terjadi karena pembedahan. Ciri-ciri luka sayat yaitu luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka (Berman, 2009).

Penyebab terjadinya luka diantaranya karena faktor yang disengaja dan tidak disengaja. Luka yang dilakukan dengan sengaja contohnya operasi sedangkan luka yang tidak disengaja contohnya kecelakaan, tergores, tertusuk benda tajam atau pun tersayat (Moreau, 2003).

Jenis-jenis luka diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni luka terbuka dan luka tertutup (Potter dan Perry, 2006) :

1. Luka terbuka merupakan luka yang melibatkan robekan pada kulit atau membran mukosa. Luka ini dapat disebabkan oleh benda tajam atau tumpul (insisi bedah, fungsi vena, luka tembak). Robekan kulit memudahkan masuknya mikroorganisme, kehilangan darah dan cairan tubuh melalui luka.

2. Luka tertutup merupakan luka tanpa robekan pada kulit. Luka ini dapat disebabkan oleh bagian tubuh yang terpukul oleh benda tumpul, terpelintir, keseleo, daya deselerasi ke arah tubuh seperti fraktur tulang, robekan pada organ dalam.

Berdasarkan tingkat keparahan luka dibagi menjadi tiga yaitu (Potter dan Perry 2006) :

1. Permukaan

Lapisan ini hanya mengenai lapisan epidermis. Penyebabnya dapat dikarenakan gesekan pada permukaan kulit (abrasi, luka bakar tingkat I, luka cukur). Robekan dapat menimbulkan resiko infeksi. Luka tidak mengenai jaringan dan organ dibawahnya sehingga suplai darah lancar.

2. Penetrasi

Luka dapat memicu rusaknya lapisan epidermis, dermis dan jaringan atau organ yang lebih dalam. Luka yang disebabkan oleh benda asing atau alat yang masuk ke dalam jaringan tubuh dan biasanya tidak disengaja akan beresiko tinggi yang dapat mengalami infeksi karena terkontaminasinya benda asing. Luka dapat menyebabkan perdarahan dalam dan luar, kerusakan organ dan hilangnya fungsi secara sementara atau permanen.

### 3. Perforasi

Luka penetrasi akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam dan keluar dari organ dalam serta meningkatkan resiko terkena infeksi.

Penyembuhan luka merupakan suatu proses untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kolagen disamping sel epitel merupakan komponen utama dalam proses penyembuhan luka. Fibroblas merupakan sel yang dapat bertanggung jawab akan sintesis kolagen. Fase fisiologi penyembuhan luka dapat dilakukan secara alami seperti:

1. Fase inflamasi, Fase ini diawali sejak terjadinya luka sampai hari kelima. Setelah itu, pembuluh darah yang putus akan mengalami konstriksi dan retraksi yang disertai reaksi hemostasis disebabkan agregasi trombosit yang bersama jala fibrin membekukan darah. Yang berperan untuk terjadinya kemotaksis netrofil, makrofag, mast sel, sel endotelial dan fibroblast yaitu *Epidermal Growth Factor* (EGF), *Insulin-like Growth Factor* (IGF), *Platelet-derived Growth Factor* (PDGF) dan *Transforming Growth Factor beta* (TGF- $\beta$ ) merupakan komponen hemostasis ini akan melepaskan dan mengaktifkan sitokin. Hal tersebut dinamakan fase inflamasi. Fase ini kemudian mengalami vasodilatasi dan akumulasi leukosit Polymorphonuclear (PMN). Makrofag mengeluarkan mediator inflamasi *Transforming Growth Factor beta 1* (TGF  $\beta$ 1) yang juga mengeluarkan agregat trombosit (Perdanakusuma, 2007).

Angiogenesis merupakan salah satu proses terjadinya fase inflamasi, dimana pada luka injuri akan mengalami regenerasi atau tumbuhnya pembuluh-pembuluh darah yang baru sangat penting peranannya dalam fase proliferasi. Dalam proses inflamasi mengalami perlawanan terhadap infeksi dan sebagai jembatan untuk pertumbuhan sel-sel baru (Suriadi, 2004).

2. Fase Proliferasi, Fase ini ditandai dengan adanya pembentukan jaringan granulasi dalam luka, makrofag dan limfosit ikut berperan, tipe sel dominan juga mengalami proliferasi dan migrasi termasuk sel epitelial, fibroblas, dan sel endothelial. Konsentrasi oksigen dan faktor pertumbuhan tergantung pada metabolik. Dalam beberapa jam setelah injury, terjadi epitelialisasi dimana epidermal yang mencakup sebagian besar keratin mulai bermigrasi dan mulai stratifikasi dan diferensiasi untuk menyusun kembali fungsi barrier epidermis. Pada proses ini diketahui sebagai epitelialisasi, juga meningkatkan produksi ekstraseluler matrik (*promotes-extracellular matrix* atau singkat ECM), *growth factor*, sitokin dan angiogenesis melalui pelepasan faktor pertumbuhan seperti *keratinocyte growth factor* (KGF). Pada fase proliferasi fibroblas merupakan elemen sintetik utama dalam proses perbaikan dan berperan dalam produksi struktur protein yang digunakan selama rekonstruksi jaringan. Secara khusus fibroblas menghasilkan sejumlah kolagen yang banyak. Fibroblas biasanya akan tampak pada sekeliling luka. Pada fase ini juga terjadi angiogenesis yaitu suatu proses dimana kapiler-kapiler pembuluh darah yang baru tumbuh atau pembentukan jaringan baru (granulasi tissue). Secara klinis akan tampak kemerahan pada luka. Kemudian pada fase kontraksi luka, kontraksi disini adalah berfungsi dalam memfasilitasi penutupan luka (Suriadi, 2004).

Fibroblas (menghubungkan sel-sel jaringan) yang berpindah ke daerah luka mulai 24 jam pertama setelah pembedahan. Pada jaringan lunak yang normal (tanpa perlukaan), pemaparan sel fibroblas sangat jarang dan biasanya bersembunyi di matrik jaringan penunjang. Sesudah terjadi luka, fibroblas akan aktif bergerak dari jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka, kemudian akan berkembang (proliferasi) serta mengeluarkan beberapa substansi (kolagen, elastin,

hyaluronic acid, fibronectin, dan proteoglycans) yang berperan dalam membangun (rekonstruksi) jaringan baru (Shukla, et al. 1999).

3. Fase maturasi, Fase ini merupakan fase yang terakhir dan terpanjang pada proses penyembuhan luka. Terjadi proses yang dinamis berupa remodelling kolagen, kontraksi luka dan pematangan parut. Aktivitas sintesis dan degradasi kolagen berada dalam keseimbangan. Fase ini berlangsung mulai 3 minggu sampai 2 tahun. Akhir dari penyembuhan ini didapatkan parut luka yang matang yang mempunyai kekuatan 80% dari kulit normal (Perdanakusuma, 2007).

Pada fase maturasi atau remodeling yaitu banyak terdapat komponen matrik. Komponen hyaluronic acid, proteoglycan, dan kolagen yang berdeposit selama perbaikan untuk memudahkan perekatan pada migrasi seluler dan menyokong jaringan. Serabut-serabut kolagen meningkat secara bertahap dan bertambah tebal kemudian disokong oleh proteinase untuk perbaikan sepanjang garis luka. Kolagen menjadi unsur yang paling utama pada matrik. Serabut kolagen menyebar dengan saling tertarik dan menyatu, berangsur-angsur menyokong pemulihan jaringan. Remodeling kolagen selama pembentukan skar terjadi pada sintesis dan katabolisme kolagen secara terus menerus (Suriadi, 2004). Peranan senyawa sapogenin pada proses penyembuhan luka sayat tikus putih. Beberapa sapogenin bekerja sebagai antimikroba (anti-bakteri dan anti virus) meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kadar gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah, dan sapogenin juga bermanfaat mempengaruhi pembentukan kolagen (tahap awal perbaikan jaringan) yaitu dengan menghambat produksi jaringan luka yang berlebihan (Setyoadi, 2010). Kandungan senyawa sapogenin yang terkandung dalam getah merangsang pembentukan sel epitel yang baru dan mendukung proses re-epitelisasi, karena semakin cepat proses re-epitelisasi

maka semakin cepat pula berkurang ukuran luka sehingga mempersingkat proses penyembuhan luka (Prasetyo, 2010).

## **H. Sediaan Gel**

### **1. Definisi Gel**

Gel adalah salah satu sediaan semipadat yang terdiri dari molekul kecil atau besar dalam pelarut cair yang dibuat seperti agar-agar dengan penambahan zat pembentuk gel (Allen, 2011).

Gel memiliki sifat yaitu inert pada zat pembentuk gel dan tidak bereaksi dengan bahan lain. Syarat pemilihan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk sediaan yang baik selama penyimpanan tetapi tidak dapat rusak ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal (Lachman, 2012).

Pemilihan pembentuk gel akan mempengaruhi sifat fisika gel serta hasil akhir sediaan. Pembentuk gel yang umumnya dipakai yaitu hidroksi propil metil selulosa (HPMC) dan karbomer (Arikumalasari, 2013). Bahan polimer yang biasa digunakan untuk pembentukan gel yaitu gom alam, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan semisintetis dan sintetis seperti metil selulosa, hidroksietil selulosa dan karbopol (Lachman, 2012).

### **2. Basis Gel**

Basis Gel terdiri dari dua, yaitu

#### **a. Basis Gel Hidrofobik**

Basis Hidrofobik atau tidak suka pada pelarut Basis gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana tebal, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase.

Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 2011).

b. Basis Gel Hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, system koloid hidrofilik biasanya lebih mudah dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 2011). Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voight, 1995).

**I. Komposisi Sediaan Gel**

Bahan formulasi sediaan gel yang digunakan yaitu :

1. Karbomer 940

Karbomer 940 adalah polimer sintetik dengan berat molekul tinggi. Dalam formulasi salep, lotion, krim dan gel digunakan untuk sediaan mata, rektal, topikal dan vaginal. Karbomer biasa digunakan dengan konsentrasi 0.5%-2.0% (Rowe, 2009).

Karbomer 940 jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin akan mengembang untuk membentuk sediaan semipadat yaitu sediaan gel (Lachman, 2012).

Karbomer yang paling baik digunakan sebagai pembentuk gel dan memiliki viskositas yang paling baik. Karbomer 940 dapat memberikan hydrogel dan hidroalkohol yang lebih transparan (Voight, 1995). Karbomer 940 dapat dinetralkan atau pengalkali dengan penambahan basa yang cocok seperti Tris (hidroksimetil) (Anwar, 2012).

## 2. Trietanolamin

Senyawa ini tidak berwarna atau kuning pucat, kental dan sedikit berasa ammonia. Trietanolamin (TEA) mempunyai rumus molekul  $C_6H_{15}NO_3$  dengan berat molekul yaitu 149,19. Umumnya digunakan pada formulasi sediaan topikal sebagai bahan pemberi basa (Rowe, 2009).

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut. Karbomer 940 akan mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semi padat (Lachman, 2012).

Karbopol mengandung asam kaboksilat sebesar 56%-68% dan merupakan polimer asam sehingga penggunaan alkalizing agent untuk menutupi sifat asam yang ditimbulkan oleh Karbopol (Ariyana, 2014).

## 3. Gliserin

Dalam formulasi topikal dan kosmetik, gliserin digunakan sebagai humektan dan emolien dengan konsentrasi kurang atau sama dengan 30%. Gliserin juga dapat digunakan pada gel berair maupun tidak berair (Rowe, 2009).

Penggunaan gliserin diperlukan sebagai humektan yang dapat menahan air serta mencegah hilangnya air (Anwar, 2012).

## 4. Metil Paraben

Metil paraben digunakan sebagai pengawet antimikroba (*preservative*) pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% - 0,3% (Rowe, 2009).

Seperti yang telah diketahui bahwa gel memiliki kandungan air yang banyak. Sehingga dibutuhkan penambahan pengawet untuk mencegah terjadinya

kontaminasi pembusukan bakterial. Pengawet yang paling tepat adalah penggunaan metilparaben 0,075% dan propilparaben 0,025% (Voight, 1995).

## **J. Hewan Coba**

Pemanfaatan hewan pada bidang penelitian yang disebut sebagai hewan model atau hewan percobaan telah berlangsung sejak berabad lalu sejalan dengan perkembangannya bidang kedokteran (Baumans, 2004). Penggunaan hewan coba pada peneliti kesehatan banyak dilakukan untuk uji kelayakan atau keamanan suatu bahan obat dan juga untuk penelitian yang berkaitan dengan suatu penyakit. Berdasarkan itu maka hewan coba yang digunakan harus sehat atau bebas dari mikroorganisme patogen sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Tolistiawaty, 2014). Hewan coba yang sering digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*), tikus (*Rattus norvegicus*), kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dan hamster (Priyambodo, 2013).

### 1. Klasifikasi Hewan Coba

Klasifikasi kelinci (Hustamin, 2006)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Ordo : Logomorpha

Famili : Leporidae

Genus : *Oryctolagus*

Spesies : *Oryctolagus cuniculus*

## 2. Morfologi Kelinci

Berdasarkan bobot badannya ternak kelinci dewasa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu kecil (*small and dwarf breeds*), sedang atau medium (*medium breeds*), dan berat (*giant breeds*). Kelinci tipe kecil bobot badannya antara 0,9 – 2,0 kg, tipe sedang bobot badannya antara 2,0 – 4,0 kg dan tipe besar bobot badannya antara 5,0 – 8,0 kg. Kelinci tipe sedang setelah umur 7 – 8 bulan baru bias dikawinkan, dipelihara terutama untuk menghasilkan daging (Widodo, 2010).

Tubuh kelinci berbulu halus dan daerah yang tidak berbulu ada pada daerah ujung hidung dan sebagian kecil dari *scrotum* pada kelinci jantan dan bagian *inguinal* pada kedua jenis kelamin, baik jantan maupun betina (Sumadi, 2000).

Secara garis besar, kelinci memiliki karakter yaitu (Malole, 1989) :

Berat badan dewasa	: 2,0 – 5,0 kg
Berat lahir	: 30,0 – 100,0 g
Luas tubuh kelinci	: setiap 2,5 kg seluas 1.270,0 cm <sup>2</sup>
Umur	: 5,0– 6,0 tahun
Temperatur tubuh	: 38,0 – 39,60 C
Konsumsi makanan	: 5 g / 100 g / hari
Konsumsi air	: 5 –10 ml / 100 g /hari
Mulai kawin	: Jantan, 6 – 10 bulan, betina 5 – 9 bulan
Jumlah anak/lahir	: 4 –10 ekor
Penyapihan	: 4 –6 pekan
Pemeliharaan	: 1 –11 Tahun

Kelinci sehat merupakan salah satu syarat untuk dapat digunakan sebagai hewan coba. Berat badan kelinci yang digunakan yaitu 1,5 kg - 2,0 kg dan berwarna putih agar memudahkan untuk mengamati luka.

## **K. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan**

Pengobatan merupakan suatu cara untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Pada dasarnya obat tradisional diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak orang-orang yang berada disekitar dan juga selama tidak membawa syirik seperti jampi-jampi, berdoa kepada roh halus atau azimat, karena Islam berarti keselamatan sebagai agama tauhid yang tidak bertentangan dengan akal dan tidak musyrik.

Pengobatan modern berasal dari pengobatan tradisional. Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa ada dua macam penyakit sesuai dengan keadaan manusia, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Pengobatan untuk rohani adalah Al-Qur`an sedangkan jasmani adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sesungguhnya Allah Swt menurunkan penyakit beserta obatnya.

Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah Swt, maka yang dapat menyembuhkan penyakit juga hanya Allah semata. Akan tetapi untuk kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah Swt juga mendatangkan obat. Sebagaimana disebutkan dalam hadist shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya” (HR Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas dapat diketahui Allah Swt tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, baik penyakit yang muncul pada zaman nabi maupun saat ini. Segala jenis penyakit pasti ada obatnya, tergantung cara mengatasinya sehingga penyakit tersebut bisa sembuh.

Beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasanya bermanfaat sebagai obat. Apalagi di Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat.

Sebagaimana firman Allah swt yang dijelaskan mengenai berbagai macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pengobatan dalam QS. Taahaa ayat (20)/53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۝

Terjemahnya :

*“Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air, maka kamu membutuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam”* (Depertemen Agama RI, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk serta mengingatkannya pula dengan jawaban Nabi Musa As, tentang keluasan ilmu Allah. Para ulama menulis bahwa Allah swt, menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar mereka dapat menikmati hidup dan berbekal guna kehidupan akhiratnya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan dan mata-mata air dan sampai sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt, memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat. Thabathaba'i lebih jauh firman-Nya: Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dan rangka

kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah: Dia menurunkan dari langit air, maka kamu membutuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah Kepada langit guna menurunkan hujan dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2002).

Dalam Q.S Al-Nahl/16: 10 Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۱۰

Terjemahnya :

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu” (Depertemen Agama RI, 2002).

Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia Yang Mahakuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk dimanfaatkan. *Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternak kamu* sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu (Shihab. 2002).

Dengan menyebutkan air hujan yang turun, manusia diajak untuk mengadiah keatasnya untuk mengetahui betapa rapat hidupnya dengan alam disekelilingnya. Padahal dari air itulah bergantung segenap kehidupan sehingga kamu tidak mati kehausan. Air hujan yang turun menimbulkan rumput hijau, makanan ternak atau mata air akan diminum ternak itu. Ditumbuhkannya buah-buahan yang beranekaragam dari Barat dan Timur, semuanya tumbuh di Bumi.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis bermanfaat bagi kesehatan. Sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S Asy-Syu'ara/26:7

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Departemen Agama RI, 2002).

Kata (إِلَى) pada firman-Nya di awal ayat ini ( أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ ) awalan *yara ila al-ardh* / apakah mereka tidak melihat ke bumi merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandang hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandangi sampai mencakup seluruh bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memerintahkan untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Dari hadist dan ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan tidak sia-sia. Semuanya memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Seperti halnya

dengan tanaman bunga rosella. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa bunga rosella dapat menyembuhkan luka sayat dan memiliki efektivitas yang paling bagus pada konsentrasi sediaan gel 15% dibandingkan dengan sediaan gel Bioplacenton® yang beredar di masyarakat. Inilah bukti kebesaran Allah swt dalam Al-Qur'an yang tidak ada keraguan bagi-Nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar (STIFA), Laboratorium Farmasetika, dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental laboratorium.

#### **C. Instrumen Alat**

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu batang pengaduk, cawan petri, cotten bud, gelas kimia (*pyrex*®), gelas ukur (*pyrex*®), gunting, glass arloji, *hot plat*, kandang kelinci, kapas, kain kasa, penggaris, pH meter (ATC), pipet tetes, pisau bedah, pelester obat, saringan, silet, sendok tanduk, pot, timbangan analitik (*Pesica*®) dan *Viscometer Brookfield (DV-E Viscometer*®).

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Aquadest, alkohol 70%, Bioplasenton®, Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*), Karbopol 940, Gliserin, Metil Paraben, Trietanolamin.

## D. Pengolahan dan Pengujian sampel

### 1. Penyiapan sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L*) sebanyak 500 gram yang diperoleh di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri Provinsi Jawa Timur.

### 2. Pengolahan Sampel

Sampel Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L*) dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dikeringkan didalam lemari pengering atau diangin-anginkan dan terlindung dari sinar matahari. Bunga rosella telah kering dipotong kecil kemudian direndam menggunakan pelarut aquadest. Setelah itu rendamannya dimasukkan kedalam capet untuk dibekukan didalam lemari es. Setelah membeku dimasukkan kedalam *Freeze Dryer* pada suhu  $-51^{\circ}\text{C}$  selama 2 hari 2 malam. Hasil yang didapatkan kemudian ditimbang dan didapatkan berat serbuk kering.

### 3. Pembuatan Sediaan Gel

Tabel 1. Formulasi sediaan gel ekstrak air bunga rosella

No	Nama Bahan	Formula (%)			
		I	II	III	Kontrol-
1.	Ekstrak Air Bunga Rosella	5%	10%	15%	-
2.	Karbomer 940	2%	2%	2%	2%
3.	Trietanolamin	0,2%	0,2%	0,22%	0,2
4.	Gliserin	20%	20%	20%	20%
5.	Metilparaben	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.	Aquadest	Ad	Ad	Ad	Ad
		100%	100%	100%	100%

Pembuatan Gel Basis Karbomer 940 dikembangkan terlebih dahulu dalam air panas pada suhu 80°C kemudian diaduk menggunakan magnetik stirer selama 30 menit. Basis karbomer yang telah dikembangkan ditambahkan TEA dan diaduk hingga terbentuk gel. Tambahkan gliserin (campuran 1), kemudian ditambahkan metil paraben yang telah dilarutkan dalam air panas pada suhu 75°C (campuran 2). Setelah homogen, dimasukkan campuran 2 tadi ke dalam campuran 1 dan dihomogenkan kemudian ditambahkan ekstrak air bunga rosella aduk hingga homogeny. Kemudian ditambahkan sisa air suling dan diaduk hingga terdispersi merata.

#### **4. Uji Stabilitas Sediaan Gel**

Pengujian stabilitas fisik sediaan gel yaitu:

a. Uji Organoleptik

Pemeriksaan organoleptik yang dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, warna dan bau dari sediaan gel (Maulina, 2015).

b. Uji pH

Pengukuran pH sediaan gel dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Alat pH meter terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan larutan dapar netral (pH 7,0) lalu dikeringkan dengan kertas tisu. Pengukuran dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter kedalam sediaan gel yang akan diuji, sampai alat akan menunjukkan angka yang konstan. Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan nilai pH sediaan.

c. Uji Viskositas

Uji viskositas gel dilakukan dengan menggunakan viscometer Brookfield pada kecepatan 50 rpm dan menggunakan spindle nomor 07. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel kemudian

dilihat viskositasnya. Pengukuran viskositas dilakukan dengan cara sebelum dan sesudah penyimpanan sediaan gel pada suhu kamar yaitu 20-25°C selama 6 siklus.

d. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan cara sediaan gel dioleskan tipis-tipis pada sekeping kaca. Kemudian ditutup dengan keping kaca lainnya, lalu diamati homogenitasnya. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar

e. Daya Sebar

Uji daya sebar gel dilakukan dengan cara meletakkan gel sebanyak 1 g di atas plastik beralas kertas grafik, plastik lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelah itu ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5 - 7 cm menunjukkan konsistensi semisolid.

## 5. Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji dikarantinakan selama 7 hari untuk adaptasi pada lingkungan baru. Hewan coba yang digunakan yaitu Kelinci jantan (*Oryctolagus cuniculus*) dengan bobot badan berkisar antara 1,5-2 kg sebanyak 15 ekor. Tiap kelompok kelinci ditempatkan dalam kandang yang terpisah, tiap kandang berisi 3 ekor kelinci.

## 6. Pemberian Luka

Kelinci dianastesi menggunakan lidokain, kemudian bulu kelinci dicukur pada daerah punggung untuk membantu dalam pembuatan dan pengamatan luka. Cuci tangan dengan memakai sarung tangan, berikan alkohol pada area kulit yang akan diiris atau dibedah, kemudian lakukan irisan menggunakan pisau bedah steril, panjang luka 3 cm dan kedalaman sampai area dermis (sekitar 2 mm dari

permukaan kulit). Kelinci yang digunakan yaitu 15 ekor dibagi dalam 5 kelompok, dalam tiap kelompok ada 3 ekor kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

### **7. Uji Perlakuan**

Setiap kelompok diberikan perlakuan :

- a. Kelompok I : Diberikan gel ekstrak bunga rosella dengan 5%
- b. Kelompok II : Diberikan gel ekstrak bunga rosella dengan 10%
- c. Kelompok III : Diberikan gel ekstrak bunga rosella dengan 15%
- d. Kelompok IV : Kontrol positif Bioplasenton®
- e. Kelompok V : Kontrol negatif diberikan bahan dasar gel

### **8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisa data penelitian ini melalui Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan ANOVA (Analysis of Varians). Dimana RAL adalah jenis rancangan yang paling sederhana, dimana satu percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Statistika inferensi adalah semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data (contoh) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya (populasi)

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Hasil Ekstraksi Bunga Rosella

Pembuatan ekstrak bunga rosella dilakukan dengan metode freeze drying menggunakan pelarut air dari 400 g simplisia. Hasil yang didapatkan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Hasil rendamen ekstrak air bunga rosella

Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	% Rendamen
Bunga Rosella ( <i>Hibiscus sabdariffa L.</i> )	400 g	37,143 g	9,28%

2. Hasil pengujian sediaan gel terhadap penyembuhan luka sayat

Sediaan gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) diberikan pada punggung kelinci dengan berbagai konsentrasi. Pengamatan dimulai saat pemberian luka hingga hari luka tertutup 100% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil penyembuhan luka

Formula	Replikas 1 (Hari ke)	Replikasi 2 (Hari ke)	Replikasi 3 (Hari ke)	Jumlah	Rata-rata
Gel 5%	17	18	18	53	17,66
Gel 10%	15	15	16	46	15,33
Gel 15%	12	12	13	37	12,33
Bioplasenton	14	15	14	41	13,66
Basis Gel	20	21	20	61	20,33
Jumlah	78	81	79	238	15,86

### 3. Hasil Uji Stabilitas Sediaan Gel

Pengujian stabilitas sediaan gel terdiri dari pengujian organoleptik, pengujian pH, pengujian viskositas, pengujian homogenitas serta pengujian daya sebar. Hal ini dilakukan dengan tiga formulasi pada konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk gel F1 menggunakan konsentrasi ekstrak 5%, gel F2 menggunakan ekstrak 10% dan gel F3 menggunakan ekstrak 15%. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil pengujian organoleptik Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Formula	Organoleptik		
	Bentuk	Bau	Warna
F1 5%	Semi padat	Khas ekstrak	Merah jambu
F2 10%	Semi padat	Khas ekstrak	Merah
F3 15%	Semi padat	Khas ekstrak	Merah tua

Tabel 5. Hasil pengujian pH Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Formula	pH
F1 5%	6,7
F2 10%	6,6
F3 15%	6,4

Tabel 6. Hasil pengujian Viskositas Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Formula	Viskositas	
	Sebelum	Sesudah
F1 5%	3200	3415
F2 10%	3120	3227
F3 15%	2810	3025

Tabel 7. Hasil pengujian Homogenitas Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Formula	Homogenitas
F1 5%	≠ Terdapat partikel
F2 10%	≠ Terdapat partikel
F3 15%	≠ Terdapat partikel

Tabel 8. Hasil pengujian daya sebar Gel Ekstrak Air Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Formula	Daya Sebar
F1 5%	4,3 cm
F2 10%	4,4 cm
F3 15%	4,3 cm

## B. Pembahasan

Bunga rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*) telah banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk sabelit, penyakit jantung, hipertensi, infeksi saluran kemih, diabetes dan gangguan saraf. Bunga rosella mengandung senyawa saponin, flavonoid dan tanin yang berperan dalam penyembuhan luka sayat. Bunga Rosella diekstraksi menggunakan pelarut air karena mudah menarik senyawa yang bersifat polar, dimana senyawa polar merupakan senyawa yang larut dalam air sedangkan senyawa yang dikandung pada bunga rosella yaitu flavonoid, saponin, tanin, glikosida, steroid, antarkuinon dan polifenol (Mensah, 2015).

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi, dimana hasil maserasi kemudian dilanjutkan menggunakan metode pengeringan beku (*Freeze drying*). *Freeze drying* merupakan salah satu metode pengeringan. Ekstrak yang dihasilkan sebanyak 37,143 gram dari hasil maserasi 400 gram simplisia bunga rosella dan hasil rendamen diperoleh sebanyak 9,28%.

Ekstrak air bunga rosella diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. Penggunaan sediaan gel ini dipilih karena mampu memberikan sensasi dingin pada kulit, mudah merata sehingga tidak meninggalkan bekas dikulit, penampilannya transparan dan pelepasan obatnya baik.

Bahan yang digunakan untuk membuat sediaan gel yaitu karbomer sebagai pembentuk gel. Pemilihan karbomer sebagai basis karena paling baik digunakan sebagai pembentuk gel dan memiliki viskositas yang paling baik dengan konsentrasi 0.5%-2.0% (Rowe, 2009). Untuk bahan ini dapat dinetralkan dengan penambahan basa yang cocok seperti trietanolamin sehingga dapat didispersikan dalam air untuk membentuk sediaan gel (Anwar, 2012). Selain itu, bahan pengawet yang digunakan yaitu metil paraben karena seperti yang telah diketahui bahwa gel memiliki kandungan air yang banyak, sehingga dibutuhkan penambahan pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba dengan konsentrasi 0,02% - 0,3% (Rowe, 2009). Gliserin digunakan sebagai humektan dimana fungsi humektan yaitu dapat mengurangi hilangnya air pada sediaan gel dan juga dapat mempertahankan kelembaban kulit dengan konsentrasi kurang atau sama dengan 30%. (Rowe, 2009).

Formulasi sediaan gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dibuat dalam 3 konsentrasi yang berbeda yaitu formula pertama dengan konsentrasi 5%, formulasi kedua dengan konsentrasi 10% dan formulasi ketiga dengan konsentrasi 15%. Setiap perlakuan dilakukan replikasi atau triplo karena untuk memastikan hasil yang didapatkan sama. Digunakan juga kontrol negatif tanpa ekstrak dan kontrol positif yaitu Bioplasenton®. Kandungan Bioplasenton® yaitu *neomycin sulfate* dan *placenta extract*, dimana *neomycin sulfate* sebagai antibiotik yang dapat membunuh berbagai macam kuman sedangkan *placenta extract* sebagai "biogenic stimulator" yang berperan penting dalam mempercepat

penyembuhan luka dan regenerasi sel kulit. Begitupula pada ekstrak air bunga rosella yang aktif sebagai antimikroba dengan konsentrasi 1,25 mg/ml. Senyawa yang berperan yaitu alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin (Mensah, 2015).

Penyembuhan luka sayat yang diujikan pada kelinci yang diberikan luka dengan ukuran panjang 3 cm dengan kedalaman 2 mm menembus lapisan kulit dermis dari permukaan kulit. Pengobatan dilakukan setiap 1 x 24 jam dengan cara mengoleskan sediaan gel pada luka hingga sembuh. Luka sayat dikatakan sembuh apabila luka tertutup sempurna. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, setiap formulasi gel memiliki efek penyembuhan luka yang berbeda-beda. Gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) memberikan efek penyembuhan luka sayat yang optimum pada formulasi ketiga dengan konsentrasi 15% dari replikasi berturut-turut yaitu pada hari ke-12, 13 dan 13 terjadi penyembuhan luka hingga 100%, dibandingkan dengan kontrol positif yaitu Bioplacenton® pada hari ke-14, 15 dan 14 sedangkan untuk konsentrasi 10% terjadi penyembuhan pada hari ke-15, 15 dan 16 dan konsentrasi 5% terjadi penyembuhan pada hari ke-17, 18 dan 18 sedangkan untuk kontrol negatif terjadi penyembuhan pada hari ke-20, 21 dan 20.

Hasil pengujian dari organoleptik pada semua konsentrasi sediaan gel menunjukkan bahwa bau dan bentuk sediaan sama yaitu bau khas ekstrak dan bentuk semi padat (gel). Sedangkan untuk warna pada ketiga sediaan gel berbeda dimana formula 1 menunjukkan warna merah jambu, formula 2 menunjukkan warna merah sedangkan formula 3 menunjukkan warna merah tua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka warna yang dihasilkan semakin gelap.

Hasil pengujian dari pH sediaan gel dengan konsentrasi 5% menunjukkan nilai 6,7, untuk sediaan gel dengan konsentrasi 10% menunjukkan nilai 6,6

sedangkan sediaan gel dengan konsentrasi 15% menunjukkan nilai 6,4. Dimana nilai pH sediaan gel yang baik yaitu sesuai dengan pH kulit 4,5-6,5. Jika pH sediaan asam (terlalu rendah) maka dapat menimbulkan iritasi pada kulit sedangkan pH sediaan basa dapat menimbulkan kulit yang bersisik sehingga berkurangnya estetika pada kulit.

Hasil pengujian dari viskositas sebelum dan sesudah penyimpanan pada suhu kamar yaitu 20-25°C selama 6 siklus menunjukkan adanya perubahan. Sebelum penyimpanan pada sediaan gel dengan konsentrasi 5% mengalami perubahan dari 3200 cP menjadi 3415 cP, sediaan gel dengan konsentrasi 10% dari 3120 cP menjadi 3227 cP dan untuk sediaan gel dengan konsentrasi 15% 2810 cP menjadi 3025 cP. Sedangkan nilai viskositas yang baik pada sediaan gel yaitu 2000-4000 cP (Tahir, 2017).

Hasil pengujian dari homogenitas pada semua konsentrasi sediaan gel menunjukkan tidak terdapat partikel padat didalamnya atau gel yang tidak merata serta yang masih tergumpal. Hal ini termasuk parameter dari pengujian homogenitas. Pengujian homogenitas bertujuan agar melihat zat aktif menyebar sempurna pada sediaan gel.

Hasil pengujian dari daya sebar pada sediaan gel dengan konsentrasi 5% menunjukkan nilai 4,3 cm, untuk sediaan gel dengan konsentrasi 10% menunjukkan nilai 4,4 cm sedangkan untuk sediaan gel dengan konsentrasi 15% menunjukkan nilai 4,3 cm. Sedangkan nilai daya sebar yang baik yaitu 5 - 7 cm (Garg, 2002). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan gel dalam hal menyebar saat dioleskan pada kulit.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sediaan gel ekstrak air bunga rosella dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% efektif dalam menyembuhkan luka sayat pada kelinci dan konsentrasi yang optimum ditujukan

pada sediaan gel konsentrasi 15%. Untuk pengujian stabilitas fisik yang baik dari ketiga formula yang didapatkan yaitu pengujian organoleptik, viskositas, homogenitas dan pengukuran pH pada formula ke-3 dengan konsentrasi 15% yang dapat memenuhi karakteristik sediaan gel.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sediaan gel ekstrak air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dapat memberikan aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
2. Konsentrasi optimum sediaan gel ekstrak air Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) pada konsentrasi 15% dapat menyembuhkan luka sayat.

#### **B. Saran**

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan peningkatan konsentrasi ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*).
2. Disarankan untuk melakukan pengujian pada sediaan gel ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) dengan jenis luka yang berbeda.



## KEPUSTAKAAN

- Ainingsih, N. *Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera) Sebagai Obat Luka Sayat Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus)*. Surabaya: Universitas Sebelas Maret. 2018.
- Aisyah, S. H. *Pemanfaatan Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa L.) Sebagai Bahan Alami Untuk Upaya Preventif Dan Promotif Kesehatan Bagi Masyarakat Nusukan Banjarsari Surakarta. Vol 2*. Surakarta: Abdimas Unwahas. 2017
- Al-Hashimi, A. Antioxidant and Antibacterial Activities of Hibiscus sabdariffa L. extracts, *African Journal of Food Science*. 2012.
- Allen, L. V. *Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems*. London: Department of Medicinal Chemistry and Pharmaceutics. 2011.
- Amalia, N. R. Uji Efek Penyembuhan Gel Ekstrak Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) Terhadap Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). *JF FKIK UINAM*. 2015.
- Anggraini, W. *Skripsi Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn.) pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar*. Surakarta: UMS Press. 2002.
- Anief, M. *Formulasi Obat Topikal Dengan Dasar Penyakit Kulit*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 1997.
- Anief, M. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. 2010.
- Ansel, H. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, diterjemahkan oleh Farida Ibrahim, Edisi keempat*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2011.
- Anwar, E. *Eksipien Dalam Sediaan Farmasi Karakterisasi dan Aplikasi*. Jakarta: Dian Rakyat. 2012.
- Arikumalasari. Optimasi HPMC Sebagai Gelling agent Dalam Formula Gel Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.). *Jurnal Farmasi Udayana*. 2013.
- Ariningrum, D. S. *Buku Pedoman Keterampilan Klinis Manajemen Luka*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.
- Ariyana, S. D. Formulation and In Vitro Evaluation of Alginate Based Metronidazole Periodontal Gel. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*. 2014.

- Aulton, M. *Pharmaceuticals, The Design and Manufacture of Medicines, 3rd Ed.* New York: Churcill Livingstone Press. 2007.
- Ayu, P. *Pengaruh Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper betle Var. rubrum) Terhadap Waktu Kesembuhan Luka Insisi Yang Diinfeksi Staphylococcus aureus Pada Tikus Putih.* Surabaya: Universitas Airlangga. 2012.
- Azizah, R. T. Uji Aktivitas Antibakteri Gel Serbuk Lidah Buaya (Aloe vera var. sinensis) Berbasis Carbopol 934 Terhadap Staphylococcus Aureus Dan Pseudomonas Aeruginosa. 2018. *Publikasi Ilmiah.* 2018.
- Babu, M. G. *Healing Potential of Daatura Alba on Burn Wounds in Albino Rats, J. Euthnopharmacol, vol 83.* 2002.
- Baumans, V. *Use Of Animals In Experimental Research: An Ethical Dilemma. Gene Therapy.* 2004.
- Berman, A. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis Edisi Kelima.* Jakarta: EGC. 2009
- Da-Costa-Rocha, I. B. A phytochemical and pharmacological review. *Food Chemistry.* 2014.
- Dewi, C. C. Hidroksi Propil Metil Selulosa Dan Karbomer Serta Sifat Fisikokimianya Sebagai Gelling Agent. *Farmaka.* 2015
- Direktorat. *Acuan Herbal Indonesia. Volume ketiga edisi pertama.* Jakarta: Badan POM RI. 2007
- Dwidjoseputro, D. *Dasar-Dasar Mikrobiologi. Djambatan.* 1994
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Gema Risalah Press. 2002
- Eriadi, A. Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia (Tenore) Steen*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Tikus Putih Jantan. *Jurnal Farmasi Higea.* 2015
- Faure, D. The family-3 glycoside hydrolises: from housekeeping function to host-microbe interction. *Appled and Environmental Microbiology. Minireview.* 2002
- Gadekader, R. S. *A Studi of Formulation, Characterisation and Wound Healing Potentional of Transdermal Patches of Curcumin, Asian Jurnal of Pharmaceutical and Clinical Research Vol 5.* 2012
- Garg, A. *Spearing Of Semisolid Formulation: An Update Pharmaceutical Technology.* 2002.
- Hidayat, T. *Budidaya Tanaman Rosella.* Jakarta: CV. Sinar Cemerlang. 2007

- Huang, T.-W. Effect of Hibiscus sabdariffa Extract on High Fat Diet–Induced Obesity and Liver Damage in Hamsters. *Food & Nutrition Research*. 2015
- Hustamin, R. *Panduan Memelihara Kelinci Hias*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2006
- Januari, A. Pengeringan Bengkuang Dengan Sistem Pengeringan Beku Vakum (Vacum Freeze Drying System). *Jom FTEKNIK vol I*. 2014
- John, D. *Pharmaceutics Dosage Form and Design*. London: Pharmaceutical Press. 2008
- Kozma C, M. W. Anatomy, Physiology and Biochemistry of the Rabbit. *The Biology*. 1974
- Lachman, L. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Ed3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012
- Liana, Y. Efektifitas Pemberian Ekstrak Daun Betadine (*Jatropha multifida linn*) terhadap Ketebalan Jaringan Granulasi dan Jarak Tepi Luka pada Penyembuhan Luka Sayat Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). *JKK Vol 5*. 2018
- Malole, M. *Penggunaan Hewan Percobaan di Laboratorium*. Bogor: Departemen Kesehatan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi. 1989
- Mardiah, S. *Budidaya & Pengolahan Rosela SI Merah Segudang Manfaat*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2009
- Marliana, S. Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Komponen Kimia. *Jurnal Biofarmasi*. 2005
- Martutik, M. Hubungan kadar albumin dengan penyembuhan luka pada pasien post operasi. 2013
- Maryani. *Khasiat dan Manfaat Rosella*. Jakarta: Agromedia Pustaka. 2005
- Maulina, L. Formulasi Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana*) dengan Variasi Gelling Agent Sebagai Sediaan Luka Bakar. *Yogyakarta. FF Univ Ahmad Dahlan*. 2015
- Mensah, J. K. Antioxidant and Antimicrobial Activities of the Extracts of the Calyx of Hibiscus sabdariffa Linn. *Current Science Perspectives*. 2015
- Moreau, D. Wound Care Made Incredible Easy. *Lippincott Williams dan Wilkin*. 2003
- Patel, S. Hibiscus Sabdariffa : An Ideal Yet Under- Exploited Candidate For Nutricautical Applications. *Biomedicine and Preventive Nutrition*. 2013

- Perdanakusuma. *Anatomi Fisiologi Kulit Dan Penyembuhan Luka*. Surabaya: Airlangga University School of Medicine. 2007
- Priyambodo, s. *Pengendalian Hama Tikus Terpadu Edisi ke-3*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2013
- Prasetyo, B. Efektivitas Getah Jarak Cina (*Jatropha multifida L*) Terhadap Penyembuhan Luka Perdarahan Kapiler pada Marmut. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung. 2009
- Robinson, T. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Penerjemah: Padmawinata, K. Bandung: ITB. 1995
- Rostinawati, T. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Dan Ekstrak Air Kelopak Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa L.*) terhadap *Mycobacterium tuberculosis* Galur Labkes-026 (*Multi Drug Resisten*) dan *L.* dan *Mycobacterium tuberculosis* Galur H37Rv Secara In Vitro. 2008
- Rowe, R. C. *Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. London: Pharmaceutical Press. 2009
- Sari. Pemanfaatan Obat Tradisional dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya. *Majalah Ilmu Kesehatan*. 2006
- Shenoy C, M. P. Preliminar Phytochemical Investigation and Wound Healing Activity of *Allium cepa* Linn (liliaceae). 2009
- Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2009
- Sjamsuhidajat, R. a. *Buku Ajar: Ilmu Bedah*. Jakarta: EGC. 2005
- Sloane, E. *Anatomi Dan Fisiologi Untuk Pemula*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2004
- Sumadi, R. S. Gambaran Biologi Hewan Percobaan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Bogor. *Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan*. 2000
- Suriadi. *Perawatan Luka Edisi I*. Jakarta: CV Sagung Seto. 2004)
- Syamsul, D. Pemanfaatan Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) Sebagai Bahan Pewarna Lipstik. *Jurnal Stikes Helveltia*. 2017
- Tahir, K. A. Pengaruh Variasi Konsentrasi Basis HPMC 4000 Terhadap Stabilitas Fisik Gel Mikroemulsi Natrium Diklofenat. *JF FIK UINAM*. 2017
- Tolistiawaty, I. Gambaran Kesehatan pada Mencit (*Mus musculus*) di Instalasi Hewan Coba. *Jurnal Vektor Penyakit*. 2014


- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjadara University. 1995
- Voon HC, B. R. Flower extracts and their essential oils as potential antimicrobial agents for food uses and pharmaceutical applications. *Comprehensive Reviews in Food Science Food Safety*. 2011
- Wardani, E. Uji Aktivitas Ekstrak Etanol dan Ekstrak Etil Asetat Daun Sirih Merah (*Piper cf. fragile*. Benth ) Terhadap Penyembuhan Luka Terbuka Pada Tikus . *Uji Aktivitas Ekstrak*. 2017
- Widia, L. *Anatomi, Fisiologi dan Siklus Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2015
- Widodo, A. *Suplemen Tepung Kencur (Kaempferia galanga Lamk Ke Dalam Pakan Terhadap Performan Kelinci Jantan Peranakan*. Universitas Sebelas Maret. 2010
- Widyantoro, O. B. Uji Sifat Fisik dan Aktivitas Ekstrak Daun Petai Cina (*Leucaena glauca*, Benth) Dalam Berbagai Tipe Salep sebagai Obat Luka Bakar. *Uji Sifat Fisik dan Aktivitas*. 2015
- Wijaya, B. A. Potensi Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (*Colocasia esculenta [L]*) Sebagai Alternatif Obat Luka Pada Kulit Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) . *Pharmakon-Jurnal Ilmiah Farmasi*. 2014
- Yenti, R. Formulasi Krim Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (*Eupatorium odoratum*. L) untuk Penyembuhan Luka. *Majalah Kesehatan PharmaMedika*. 2011

## LAMPIRAN


### Lampiran 1. Penyiapan Sampel Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L)



**Lampiran 2. Penyiapan Ekstrak menggunakan metode *Freeze Drying***



### Lampiran 3. Pembuatan Sediaan Gel




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

MAKASSAR

#### Lampiran 4. Uji Stabilitas Sediaan Gel



### Lampiran 5. Perlakuan Terhadap Hewan Coba



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

## Lampiran 6. Perubahan Panjang Luka Sayat

Tabel 9. Perubahan panjang luka sayat

Hari	Gel 5%			Gel 10%			Gel 15%			Bioplasenton®			Basis Gel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	2,80	2,80	2,70	2,80	2,70	2,80	2,50	2,80	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	3,00	3,00
3	2,60	2,70	2,60	2,60	2,30	2,50	2,20	2,50	2,60	2,70	2,70	2,80	2,80	3,00	3,00
4	2,50	2,60	2,50	2,40	2,00	2,10	1,90	2,30	2,50	2,40	2,40	2,50	2,80	2,90	2,90
5	2,30	2,20	2,10	2,20	1,80	2,00	1,60	2,00	1,70	2,10	1,90	2,40	2,50	2,80	2,70
6	2,00	1,90	2,00	1,90	1,70	1,80	1,40	1,70	1,50	1,70	1,70	1,90	2,40	2,60	2,50
7	1,70	1,70	1,90	1,70	1,60	1,80	1,00	1,50	1,20	1,50	1,60	1,80	1,90	2,30	2,30
8	1,60	1,60	1,80	1,50	1,50	1,70	0,70	1,30	0,90	1,30	1,40	1,70	1,80	2,20	2,10
9	1,40	1,50	1,70	1,30	1,30	1,60	0,50	1,10	0,70	1,00	1,00	1,50	1,70	2,10	2,00
10	1,20	1,50	1,60	1,00	1,20	1,40	0,30	0,80	0,60	0,80	0,90	1,30	1,60	2,00	1,70
11	1,00	1,40	1,60	0,70	0,90	1,30	0,20	1,50	0,40	0,60	0,80	0,90	1,50	1,90	1,50
12	0,70	1,00	1,20	0,60	0,60	1,00	0,00	0,30	0,20	0,50	0,70	0,60	1,30	1,80	1,40
13	0,50	1,00	1,00	0,50	0,40	0,70		0,00	0,00	0,30	0,40	0,30	1,10	1,50	1,30
14	0,30	0,80	0,90	0,20	0,10	0,50				0,00	0,20	0,00	0,90	1,40	1,00
15	0,20	0,70	0,60	0,00	0,00	0,30					0,00		0,80	1,20	0,80
16	0,10	0,40	0,30			0,00							0,70	1,10	0,60
17	0,00	0,10	0,10										0,50	0,80	0,40
18		0,00	0,00										0,30	0,60	0,20
19													0,20	0,50	0,10
20													0,00	0,10	0,00
21														0,00	

Keterangan :



Luka tertutup 100%

## Lampiran 7. Presentase Perubahan Panjang Luka

Tabel 10. Presentase Perubahan panjang luka sayat

Hari	Gel 5%			Gel 10%			Gel 15%			Bioplasenton®			Basis Gel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6,67	6,67	10,0	6,67	10,0	6,67	16,7	6,67	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	0	0
3	13,3	10,0	13,3	13,3	23,3	16,7	26,7	16,6	13,3	10,0	10,0	6,67	6,67	0	0
4	16,7	13,3	16,7	20,0	33,3	30,0	36,7	23,3	16,7	20,0	20,0	16,7	6,67	3,33	3,33
5	23,3	26,7	30,0	26,7	40,0	33,3	46,7	33,3	43,3	30,0	36,7	20,0	16,7	6,67	2,70
6	33,3	36,7	33,3	36,7	43,3	40,0	53,3	43,3	50,0	43,3	43,3	36,7	20,0	13,3	16,7
7	43,3	43,3	36,7	43,3	46,7	40,0	66,6	50,0	60,0	50,0	46,7	40,0	36,7	23,3	23,3
8	46,7	46,7	40,0	50,0	50,0	43,3	76,7	56,7	70,0	56,7	53,3	43,3	40,0	26,7	30,0
9	53,3	50,0	43,3	56,7	56,7	46,7	83,3	63,3	76,7	66,7	66,7	50,0	43,3	3,00	33,3
10	60,0	50,0	46,7	66,7	60,0	53,3	90,0	73,3	80,0	73,3	70,0	56,7	46,7	33,3	43,3
11	66,7	53,3	46,6	76,7	70,0	56,7	93,0	83,3	86,7	080,	73,3	70,0	50,0	36,7	50,0
12	76,7	66,7	60,0	80,0	80,0	66,7	100	90,0	93,3	83,3	76,7	80,0	56,7	40,0	53,3
13	83,3	66,7	66,7	83,3	86,7	76,7		100	100	90,0	86,7	90,0	63,3	50,0	56,7
14	90,0	73,3	70,0	93,3	96,0	83,0				100	93,3	100	70,0	53,3	66,7
15	93,3	76,7	80,0	100	100	90,0					100		73,3	60,0	73,3
16	96,7	86,7	90,0				100						76,7	63,3	80,0
17	100	96,7	96,7										83,3	73,3	86,7
18		100	100										90,0	80,0	93,3
19													93,3	83,3	96,7
20													100	96,7	100
21														100	

Keterangan :



Luka tertutup 100%

**Lampiran 8. Perhitungan RAL (Rancangan Acak Lengkap), Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka Sayat**

Tabel 11. Presentase Perubahan panjang luka sayat

Formula	Hari ke-n hingga luka tertutup 100%			Jumlah	Rata-rata
	1	2	3		
Gel 5%	17	18	18	53	17,66
Gel 10%	15	15	16	46	15,33
Gel 15%	12	12	13	37	12,33
Bioplasenton	14	15	14	41	13,66
Basis Gel	20	21	20	61	20,33
Jumlah	78	81	79	238	15,86

**Perhitungan Anova**

$$\begin{aligned} \text{Faktor koreksi (FK)} & : \frac{(\sum y)^2}{k \times t} \\ & : \frac{(238)^2}{5 \times 3} \\ & : 3776,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} & : ((17)^2 + (18)^2 + (18)^2 + (15)^2 + (15)^2 + (16)^2 + \\ & (12)^2 + (12)^2 + (13)^2 + (14)^2 + (15)^2 + (14)^2 + \\ & (20)^2 + (21)^2 + (20)^2 - \text{FK} \\ & : 181,74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} & : \frac{(53)^2 + (46)^2 + (37)^2 + (41)^2 + (61)^2}{3} - \text{FK} \\ & : 3898,66 - 3776,2 \\ & : 122,46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} & : \text{JKT} - \text{JKP} \\ & : 181,74 - 122,46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & : 59,28 \\
 \text{Derajat Bebas Total (DBT)} & : (k \times t) - 1 \\
 & : (5 \times 3) - 1 \\
 & : 14 \\
 \text{Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} & : k - 1 \\
 & : 5 - 1 \\
 & : 4 \\
 \text{Derajat Bebas Galat (DBG)} & : \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan} \\
 & : 14 - 4 \\
 & : 10 \\
 \text{Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP):} & \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\
 & : \frac{122,46}{4} \\
 & : 30,61 \\
 \text{Kuadrat Tengah Galat (KTG)} & : \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\
 & : \frac{59,28}{10} \\
 & : 5,92 \\
 \text{F-Hitung} & : \frac{\text{KT Perlakuan}}{\text{KT Galat}} \\
 & : \frac{30,61}{5,92} \\
 & : 5,17
 \end{aligned}$$

**Lampiran 9. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel**

Tabel 12. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (DB)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	122,46	4	30,61	5,17	3,48	5,99
Galat	59,28	10	5,92			
Total	159,74	14				

Koefisien Keseragaman

$$: \frac{\sqrt{KTG}}{Y} \times 100\%$$

$$: \frac{\sqrt{5,92}}{15,58} \times 100\%$$

$$: \frac{\sqrt{5,92}}{15,58} \times 100\%$$

$$: 15,61$$

**Perhitungan nilai BNT 0,05**

BNT

$$: t_{\alpha}; dbG \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$: t(0,05); 10 \frac{\sqrt{2 \times 5,92}}{3}$$

$$: 1,812 \frac{\sqrt{11,84}}{3}$$

$$: 1,812 \times 1,986$$

$$: 3,598$$

**Perhitungan nilai BNT 0,01**

BNT

$$: t_{\alpha}; dbG \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$: t(0,01); 10 \frac{\sqrt{2 \times 5,92}}{3}$$

$$: 2,764 \frac{\sqrt{11,84}}{3}$$

$$: 2,764 \times 1,986$$

$$: 5,489$$


**Lampiran 10. RAL Hubungan antara formula dan kecepatan penyembuhan luka**

Tabel 13. Hubungan antara formula dan kecepatan penyembuhan luka

Perlakuan		I	II	III	IV	V
	Rata-rata	12,33	13,66	15,33	17,66	20,33
Gel 15%	12,33	0				
(I)						
Bioplacenton®	13,66	1,33 <sup>ns</sup>	0			
(II)						
Gel 10%	15,33	3 <sup>ns</sup>	1,67 <sup>ns</sup>	0		
(III)						
Gel 5%	17,66	5,33*	4 <sup>ns</sup>	2,33 <sup>ns</sup>	0	
(IV)						
Basis Gel	20,33	8**	6,67**	5*	2,67 <sup>ns</sup>	0
(V)						
Keterangan				BNT 0,05 = 3,59	BNT 0,01 = 5,48	
	*	= Signifikan (Berbeda nyata)				
	**	= Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)				
	ns	= Non Signifikan				

**Lampiran 11. Perhitungan Persentase Rendamen Ekstrak**

$$\begin{aligned}\text{Persen Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak}}{\text{Bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{37,143 \text{ g}}{400 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 9,28 \%\end{aligned}$$



### Lampiran 11. Perhitungan Pembuatan Gel

#### 1. Formulasi Gel 5%

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak bunga rosella} &= \frac{5}{100} \times 20 \text{ g} = 0,5 \text{ g} \\ \text{Carbomer 940} &= \frac{1}{100} \times 20 \text{ g} = 0,2 \text{ g} \\ \text{Trietanolamin} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Gliserin} &= \frac{20}{100} \times 20 \text{ g} = 4 \text{ g} \\ \text{Metilparaben} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Aquadest} &\text{ ad } 100\% \end{aligned}$$

#### 2. Formulasi Gel 10%

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak bunga rosella} &= \frac{10}{100} \times 20 \text{ g} = 1 \text{ g} \\ \text{Carbomer 940} &= \frac{1}{100} \times 20 \text{ g} = 0,2 \text{ g} \\ \text{Trietanolamin} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Gliserin} &= \frac{20}{100} \times 20 \text{ g} = 4 \text{ g} \\ \text{Metilparaben} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Aquadest} &\text{ ad } 100\% \end{aligned}$$

#### 3. Formulasi Gel 15%

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak bunga rosella} &= \frac{15}{100} \times 20 \text{ g} = 3 \text{ g} \\ \text{Carbomer 940} &= \frac{1}{100} \times 20 \text{ g} = 0,2 \text{ g} \\ \text{Trietanolamin} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Gliserin} &= \frac{20}{100} \times 20 \text{ g} = 4 \text{ g} \\ \text{Metilparaben} &= \frac{0,2}{100} \times 20 \text{ g} = 0,04 \text{ g} \\ \text{Aquadest} &\text{ ad } 100\% \end{aligned}$$

**Lampiran 12. Gambar Penelitian****Gambar 2. Pengolahan Sampel Bunga Rosella**

(a)



(b)



(c)




(d)

Keterangan :

- (a) : Bunga Rosella yang telah dikeringkan
- (b) : Penyaringan sampel
- (c) : Sampel dimasukkan dicawan petri
- (d) : Ekstrak air bunga rosella

**Gambar 3. Sediaan Gel Ekstrak Air Bunga Rosella**



Keterangan :


- (a) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 5%
- (b) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 10%
- (c) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 15%
- (d) : Basis Gel

**Gambar 4. Uji Perlakuan pada Kelinci**




Keterangan :

- (a) : Proses pemberian luka
- (b) : Pengukuran panjang luka
- (c) : Penutupan Luka
- (d) : Luka sayat sembuh 100%

**Gambar 5. Pengujian pH**

Keterangan :

- (a) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 5%
- (b) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 10%
- (c) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 15%

**Gambar 6. Pengujian Homogenitas**

Keterangan :

- (a) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 5%
- (b) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 10%
- (c) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 15%


**Gambar 7. Pengujian Daya Sebar**



Keterangan :

- (e) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 5%
- (f) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 10%
- (g) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 15%

**Gambar 8. Pengujian Viskositas**



Keterangan :

- (a) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 5%
- (b) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 10%
- (c) : Gel Ekstrak Air Bunga Rosella 15%

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nur Hidayah akrab disapa Ida atau Bety. Lahir di Makassar tanggal 17 November 1996, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan H. Syamsurijal Salam dan Alm Sugiyati Sultan.

Telah menyelesaikan pendidikan di SDI Bert Mamajang III Makassar pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Pallangga pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Makassar hingga tahun 2014. Masuk perguruan tinggi tepatnya di UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi pada tahun 2015 melalui jalur UMPTKIN.

Selama kuliah penulis aktif mengikuti organisasi di tingkat jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2016-2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R