

**UJI AKTIVITAS INHIBITOR TIROSINASE DAN PENETAPAN KADAR
FENOLIK TOTAL EKSTRAK METANOL JAMUR TIRAM PUTIH
(*Pleurotus ostreatus*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR SUCI WAHDANIYA

70100115072

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Suci Wahdaniya
NIM : 70100115072
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 Mei 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Paccinongang
Judul : Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase dan Penetapan
Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Jamur
Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2019

Penyusun

Nur Suci Wahdaniya
NIM. 70100115072

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Skripsi yang berjudul **“Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase dan Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)”** yang disusun oleh **Nur Suci Wahdaniya, NIM 70100115072**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Selasa 12 November 2019** yang bertepatan dengan **15 Rabi’ul-Awal 1441 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 12 November M
15 Rabi’ul-Awal 1441 H**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A (.....)
Sekertaris : Nurul Mukhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si., Apt (.....)
Pembimbing I : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si (.....)
Pembimbing II: Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt (.....)
Penguji I : Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt (.....)
Penguji II : Dr. Rahma Amir, M.Ag (.....)

Diketahui oleh: **M A K A S S A R**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP.19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase dan Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bachtiar dan Ibunda tercinta Salmawati yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan hormat atas bantuan semua pihak yakni kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt Selaku ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Syamsuri Syakri, S.Si., M.Si., Apt, selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si, selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
5. Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt selaku Pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.

6. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt dan Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Seluruh dosen dan laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan segala sesuatu yang bernilai manfaat bagi penulis selama proses studi, serta segenap Staf Tata Usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan adminitrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar ‘PULV15” yang senantiasa menjadi tempat keluh kesah serta selalu memberikan semangat selama berada di Jurusan Farmasi.
10. Khusus untuk teman seperjuangan penelitian saudari Hasrawati yang selalu setia menemani sampai penelitian selesai
11. Teman-teman yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian Achsanul Husna , Rusman Mutahir, Khairunnisa Jamaruddin, Ummil Wildaeni serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk bantuan, semangat dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, November 2019

Penulis,

Nur Suci Wahdaniyah

NIM. 70100115072



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1. Defenisi operasional.....	3
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN TEORITIS	8

A. Uraian Tumbuhan	8
1. Daerah Tumbuh.....	8
2. Nama Daerah.....	8
3. Morfologi Tumbuhan	8
4. Klasifikasi Fungi	10
5. Kandungan Kimia	11
B. Kulit	12
C. Melanin dan Enzim Tirosinase	15
D. Inhibitor Tirosinase.....	18
E. Asam Kojat	20
F. Microplate Reader.....	20
G. Fenolik	21
H. Metode Ekstraksi	23
1. Defenisi	23
2. Tujuan Ekstraksi.....	23
3. Jenis – Jenis Ekstraksi.....	24
I. Tinjauan Islam	25
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Lokasi Penelitian.....	28

3. Waktu Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Instrumen Penelitian	28
1. Alat Penelitian	28
2. Bahan Penelitian.....	28
D. Sampel	29
E. Prosedur Kerja	29
1. Pengambilan sampel.....	29
2. Pengolahan sampel.....	29
3. Ekstraksi sampel.....	29
4. Uji Pendahuluan.....	30
5. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase	30
6. Penetapan Kadar Fenolik Total.....	32
F. Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Hasil Ekstraksi	34
2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa.....	34
3. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total	34
4. Hasil Aktivitas Inhibitor Tirosinase	34
5. Hasil nilai IC ₅₀	34

B. Pembahasan	35
BAB V.....	39
PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	43
RIWAYAT HIDUP PENULIS	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil ekstraksi jamur tiram putih	34
Tabel 2. Uji identifikasi golongan senyawa jamur tiram putih	34
Tabel 3. Kadar fenolik total jamur tiram putih	34
Table 4. Aktivitas inhibitor tirosinase jamur tiram putih dan asam kojat (kontrol positif)	34
Tabel 5. Nilai IC ₅₀ jamur tiram putih	34
Table 6. Hasil pengukuran absorbansi larutan standar asam galat.....	48
Tabel 7. % inhibitor tirosinase jamur tiram putih	49
Tabel 8. % inhibitor asam kojat	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	10
Gambar 2. Struktur kulit	12
Gambar 3. Reaksi terbentuknya melanin	17
Gambar 4. Gugus fenol	21
Gambar 5. Kurva kalibrasi asam galat	48
Gambar 6. Kurva jamur tiram putih.....	50
Gambar 7. Kurva asam kojat.....	51
Gambar 8. Sampel jamur tiram putih.....	53
Gambar 9. Ekstrak jamur tiram putih.....	53
Gambar 10. Hasil golongan fenolik	54
Gambar 11. Sampel pada microplate 96 well	54
Gambar 12. Pengujian pada ELISA	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	43
Lampiran 2.. Skema Pembuatan Larutan Uji	44
Lampiran 3. Skema Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase.....	46
Lampiran 4. Perhitungan Rendamen Ekstrak.....	47
Lampiran 5. Pengukuran Absorbansi Larutan standar	48
Lampiran 6. Perhitungan Kadar Fenolik Total	49
Lampiran 7. Perhitungan % Inhibitor Tirosinase	49
Lampiran 8. Perhitungan Nilai IC_{50}	52



ABSTRAK

Nama : Nur Suci Wahdaniya

Nim : 70100115072

Judul : Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase dan Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)

Jamur tiram mengandung vitamin B, vitamin C dan karbohidrat seperti β -glukan, monoterpenoid, triterpenoid, sumber potensi lignin dan fenol. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi jamur tiram putih karena rasanya yang enak, kandungan nutrisinya yang tinggi dan berkhasiat untuk pengobatan penyakit. Dalam penelitian ini dilakukan uji aktivitas inhibitor tirosinase dan penetapan kadar fenolik total ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas penghambatan inhibitor tirosinase dan kadar fenolik total Ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan konsentrasi 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm dan 95 ppm dilarutkan dengan menggunakan DMSO. Aktivitas penghambatan diukur menggunakan *Enzyme Linked Immunsorbent Assay* (ELISA) pada panjang gelombang 490 nm. Penetapan kadar fenolik total ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan konsentrasi 100 ppm dengan dilarutkan dengan metanol dan diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 744,8 nm. Hasil penelitian menunjukkan persentase inhibitor tirosinase ekstrak jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki aktivitas inhibitor tirosinase. rata – rata persen inhibitor pada konsentrasi 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm dan 95 ppm berturut – turut adalah 17,6 %, 19,5%, 22,2%, 25,9%, dan 35,7%. Dan berdasarkan hasil perhitungan nilai IC_{50} 9,06%. Kadar Fenolik total 1,13 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki daya hambat inhibitor tirosinase yang sangat kuat.

Kata kunci: Ekstrak jamur tiram putih, inhibitor tirosinase, fenolik total

ABSTRACT

Nama : Nur Suci Wahdaniya

Nim : 70100115072

Judul : Tyrosinase Inhibitor Activity Test and Determination of Total Phenolic Levels of White Oyster Mushroom Methanol Extract (Pleurotus ostreatus)

White oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) also known as oyster mushroom is easy to grow in tropical and subtropical areas and easily cultivated. Oyster mushrooms contain B vitamins, vitamin C and carbohydrates such as β -glucans, monoterpenoids and triterpenoids. Oyster mushroom body parts are a potential source of lignin and phenols. However, what is consumed by many Indonesians in general is white oyster mushroom because it tastes good, has high nutritional content and is efficacious for the treatment of diseases. In this research, the activity of tyrosinase inhibitor was tested and the determination of total phenolic levels of methanol extract of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). The purpose of this study was to determine the inhibitory activity of tyrosinase inhibitors and total phenolic content of methanol extract of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). Methanol extract of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) with a concentration of 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm and 95 ppm was dissolved using DMSO. Inhibitory activity was measured using Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) at a wavelength of 490 nm. Determination of total phenolic levels of methanol extracts of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) with a concentration of 100 ppm dissolved with methanol and measured using UV-Vis spectrophotometer at a maximum wavelength of 744.8 nm. The results showed the percentage of tyrosinase inhibitors extract of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) had tyrosinase inhibitor activity. The average percent inhibitors at concentrations of 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm and 95 ppm respectively were 17.6%, 19.5%, 22.2%, 25.9%, and 35.7%. And based on the calculation of the IC₅₀ value of 9.06%. Total phenolic levels 1.13%. From these results it can be concluded that the methanol extract of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) has a very strong inhibition of tyrosinase inhibitors.

Keywords: White oyster mushroom methanol extract, tyrosinase inhibitor, total phenol



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berada di sekitar garis ekuator memiliki iklim tropis yang dikarakterisasi dengan suhu tinggi dan radiasi sinar ultraviolet (UV) pada level tertinggi (Ezzedine K, 2007). Kulit terbakar sinar matahari dan kulit kecokelatan merupakan efek cepat yang biasa terjadi akibat dari paparan radiasi sinar UV yang berlebihan (WorldHealthOrganization, 2002). Wanita-wanita Asia secara umum lebih menyukai kulit putih daripada kulit coklat sehingga produk pencerah kulit menjadi segmen terbesar dan terus berkembang pada pasar perawatan kulit (Sanjeewa KKA, 2016) karena kulit yang cerah diasumsikan dengan indikasi terlihat lebih muda dan cantik (Smit N, 2009)

Penggunaan bahan-bahan yang bersifat sintetis pada produk kosmetika dinilai kurang aman karena dapat menimbulkan efek samping pada penggunaan jangka panjang. Agen depigmentasi seperti hidrokuinon, kortikosteroid dan asam kojat. Walaupun sampai saat ini efektivitasnya masih tinggi namun dalam pemakaian jangka panjang menimbulkan beberapa efek samping seperti okronosis, atrofi, karsinogenesis dan efek samping sistemik lainnya (Parvez S, 2006)

Penggunaan kosmetik yang berbahan dasar alam tentunya dapat menarik perhatian produsen karena selain dinilai lebih aman, kosmetika yang berbahan dari makanan dan tanaman sudah terbukti mempunyai efektivitas yang baik untuk kesehatan maupun kecantikan kulit (Vinayak B, 2007). Kemudian untuk kosmetika yang berbahan dasar alam juga dinilai lebih ramah lingkungan (Quishi, 2009)

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) juga dikenal juga sebagai *oyster mushroom* mudah tumbuh didaerah tropis dan subtropis serta mudah dibudidayakan

(Chrinang P., 2009) Jamur tiram mengandung vitamin B, vitamin C dan karbohidrat seperti β -glukan, monoterpenoid dan triterpenoid (Iwalokun B. A., 2007). Bagian tubuh jamur tiram merupakan sumber potensi lignin dan fenol (Fountoulakis, 2007). Ada beberapa warna pada jenis jamur tiram ini antara lain putih, kuning, merah jambu, coklat dan abu-abu (Jeong – H. K, 2009), namun yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah jamur tiram putih karena rasanya yang enak, kandungan nutrisinya yang tinggi dan berkhasiat untuk pengobatan penyakit (Tjokrokusumo, 2008)

Warna kulit sangat dipengaruhi oleh keberadaan melanin, dimana keberadaan melanin sangat dipengaruhi oleh enzim tirosinase. Enzim ini dapat mengkatalisis dua reaksi biosintesis melanin yaitu Ohidroksilasi dari asam amino L-tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin (LDOPA), dan oksidasi subsekuen dari LDOPA menjadi dopakuinon. Senyawa dopakuinon mempunyai kereaktifan yang sangat tinggi sehingga dapat mengalami polimerisasi secara spontan membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin (Sheng, 2012). Inhibitor tirosinase dibutuhkan dan berperan penting sebagai penghambat produksi melanin pada lapisan epidermis dan membuat kulit tampak lebih cerah (Zeo Draelos, 2013). pengujian inhibitor tirosinase dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan ekstrak untuk menghambat fase monofenolase (substrat L-tirosin) dan difenolase (substrat L-DOPA), dengan arbutin dan asam kojat sebagai kontrol positif. Salah satu senyawa kimia yang dapat menghambat aktivitas tirosinase adalah senyawa polifenol yang merupakan kelompok flavonoid (Fawole A, 2012)

Senyawa fenolik merupakan senyawa yang cukup luas penggunaannya. Kemampuannya memberikan peran besar sebagai senyawa biologik terhadap kepentingan manusia. Salah satu contoh sebagai antioksidan dalam mencegah dan mengobati penyakit degeneratif, kanker, penuaan dini dan gangguan sistem imun

tubuh (Apsari Pramudita Dwi., 2011). Begitu juga dengan flavonoid dimana sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid dilaporkan mempunyai atau memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang dan anti kanker (Miller, 1996)

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian uji aktivitas inhibitor tirosinase dan penetapan kadar fenolik total ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase ?
2. Berapa persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) ?
3. Berapakah kadar fenolik total ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) ?
4. Berapakah nilai IC_{50} inhibitor tirosinase ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi operasional

1. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan yang tidak terlarut.
2. Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat.
3. Melanin adalah pigmen yang diproduksi oleh sel yang dikenal sebagai melanosit pada kulit.

4. Enzim tirosinase adalah enzim *multichopper monooxygenase* yang terdapat pada tanaman, jamur, serangga, dan mamalia termasuk manusia yang berperan penting dalam pigmentasi kulit.
5. Fenolik total adalah jumlah kandungan total senyawa yang bersifat polar pada tanaman.
6. Inhibitor tirosinase adalah penghambatan enzim tirosinase yang berpengaruh pada pigmentasi kulit.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah uji aktivitas inhibitor tirosinase dan penetapan kadar fenolik total ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, di bandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Didapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian Aprillia Kurniasari, dkk (2018) yang berjudul Potensi Ekstrak Biji Coklat (*Theobroma cacao* Linn) sebagai Inhibitor Tirosinase untuk Produk Pencerah Kulit. Menyatakan bahwa terdapat aktivitas inhibitor tirosinase pada ekstrak etanol biji coklat. Aktivitas inhibitor tersebut dapat dilihat dari nilai IC50 untuk reaksi monofenolase dan difenolase masing-masing adalah 352,05 µg mL⁻¹ dan 836,20 µg mL⁻¹. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan asam kojat, untuk monofenolasi sebesar 2,38 µg mL⁻¹ dan difenolasi 10,74 µg mL⁻¹. Selain itu juga terdapat kandungan senyawa flavonoid total sebanyak 0,05 %b/b,

sehingga ekstrak etanol biji coklat ini merupakan bahan alam yang berpotensi untuk digunakan dalam formulasi krim pemutih dalam bidang kefarmasian.

2. Berdasarkan penelitian Qori Wahyuningsih (2013) yang berjudul Aaktivitas Penghambatan Tirosinase Dari Ekstrak Etil Asetat Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steen). Menyatakan bahwa Ekstrak etil asetat daun binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steen) mempunyai aktivitas penghambatan tirosinase yang rendah. Kemudian untuk nilai IC_{50} dari ekstrak etil asetat daun binahong sebesar 299,1 $\mu\text{g/ml}$ dan nilai IC_{50} kontrol positif (Hidrokuinon) yaitu 16,34 $\mu\text{g/ml}$
3. Berdasarkan penelitian Netty Widyastuti dan Sri Istini yang berjudul Optimasi Proses Pengeringan Tepung Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*). Menyatakan bahwa, Proses pembuatan bubuk jamur tiram putih dipandang cukup penting optimasinya, sebab jamur tiram putih berpotensi sebagai *nutriceutical* karena hasil analisis kandungan nutrisi pada jamur tiram putih (100 g) menunjukkan bahwa serat kasar (3.44 % b/b), protein (3.15% b/b), asam glutamat (0.94 % b/b) relatif tinggi. Karbohidrat (0.63 % b/b), lemak (0.10% b/b), relatif rendah. Kemudian pada pembuatan tepung dengan cara pertama yakni jamur tiram putih segar diblender dibuat bubur kemudian dioven selama 24, 48 dan 72 jam, pada temperatur 50° C dan 60° C hasilnya tidak direkomendasikan karena tepung lengket dan gosong. Namun Jamur tiram putih segar yang dipotong-potong, dikeringkan dalam oven pada 40° C selama 24 jam dan digiling sampai menjadi tepung memberikan hasil baik , bubuk berwarna putih dan halus.
4. Berdasarkan penelitian Sri Wahdaningsih, dkk (2017) yang berjudul Penetapan Kadar Fenolik Total dan Flavonoid Total dan Fraksi Etil Asetat

Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus* (F.A Weber) Britton dan Rose) menyatakan bahwa Buah naga merupakan salah satu buah tropis yang termasuk di dalam suku Cactacea dengan nama latin *Hylocereus polyrhizus* (F.A.C.WEBER) BRITTON DAN ROSE. Kulit buah naga merah kaya akan senyawa antioksidan alami berupa senyawa fenolik, flavonoid, karotenoid, dan antosianin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui total senyawa fenolik dan flavonoid ekstrak metanol, fraksi larut etil asetat dan fraksi tidak larut (endapan) kulit *H. polyrhizus* . Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan metanol kemudian dilakukan triturasi dengan pelarut etil asetat. Jumlah senyawa fenolik dalam sampel ditentukan dengan metode kolorimetri pada panjang gelombang maksimum 744,8 nm dan flavonoid pada panjang gelombang maksimum 431 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar fenolik total dari ekstrak metanol, fraksi larut etil asetat dan fraksi tidak larut etil asetat (endapan) adalah berturut turut 0.1994, 0.0196 dan 0.4020 μ gGAE/g ekstrak dan kadar flavonoid total dari ekstrak metanol, fraksi larut etil asetat dan fraksi tidak larut etil asetat (endapan) adalah berturut-turut 0.5139, 46.54 dan 11.3811 μ gQE/g ekstrak.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleorotus Ostreotus*)
2. Mengetahui persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleorotus Ostreotus*)
3. Menentukan kadar fenolik total ekstrak jamur tiram putih (*Pleorotus Ostreotus*)
4. Mengetahui nilai IC₅₀ inhibitor tirosinase ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleorotus Ostreotus*)

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah, pengetahuan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat luas mengenai penemuan potensi jamur tiram putih (*Pleurotus Ostreotus*) sebagai inhibitor tirosinase dan kadar fenolik total yang dapat di jadikan sebagai produk pencerah wajah.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tumbuhan

Uraian tumbuhan meliputi daerah tumbuh, nama daerah, nama asing, morfologi tumbuhan, sistematika tumbuhan, sinonim tumbuhan, kandungan kimia dan kegunaan dari tumbuhan.

1. Daerah Tumbuh

Uraian tumbuhan meliputi daerah tumbuh, nama daerah, nama asing, morfologi tumbuhan, sistematika tumbuhan, sinonim tumbuhan, kandungan kimia dan kegunaan dari tumbuhan.

2. Nama Daerah

Jamur tiram (Indonesia) mempunyai banyak nama antara lain di Jepang dikenal dengan nama shimeji atau hiratake, di Eropa dengan nama abalone mushroom, Amerika dikenal oyster mushroom dan di daerah Jawa barat lebih dikenal dengan supu liat kalau sudah agak tua akan liat atau alot kalau dimakan (Suriawiria, 2000)

3. Morfologi Tumbuhan

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh menyamping pada batang kayu lapuk. Kehidupan jamur mengambil makanan yang sudah dibuat oleh organism lain yang telah mati (saprofit), karena tidak memiliki klorofil. semua jenis saprofit khususnya yang tumbuh pada kayu dapat dengan mudah dibudidayakan, meskipun dari beberapa hal jamur sulit dipasarkan dalam jumlah besar karena sifatnya mudah lunak sehingga mudah rusak (Djarajah, 2001). Menurut (Gunawan, 2004), ciri-ciri jamur tiram adalah daging tebal. Berwarna putih, kokoh, tetapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai, bau dan rasa tidak merangsang. Tangkai tidak ada atau jika ada biasanya pendek, kokoh dan tidak dipusat atau lateral (tetapi kadang-kadang

dipusat), panjang 0,5-4,0 cm, gemuk, padat, kuat kering, umumnya berambut atau berbulu kapas paling sedikit di dasar.

Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit karang (tiram). Tubuh buah jamur memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipes atau stalk). Pileus berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 5-15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan pertumbuhan tangkainya dapat pendek atau panjang (2-6 cm). Tangkai ini menyangga tudung lateral (dibagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) Jamur tiram bersih (*Pleurotus florida* dan *Pleurotus ostreatus*) memiliki tudung berwarna putih susu atau putih kekuning-kuningan dengan garis tengah 3-14 cm (Djarajah, 2001)

Permukaan jamur tiram licin dan agak berminyak ketika lembab sedangkan bagian tepinya mulus agak bergelombang. Daging jamur cukup tebal, kokoh tapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai. Jika sudah terlalu tua, daging buah menjadi alot dan keras. Spora berbentuk batang berukuran $8-11 \times 3-4 \mu\text{m}$. Miselium berwarna putih dan bisa tumbuh dengan cepat (Gunawan, 2004)

Jamur tiram memiliki inti plasma dan spora yang berbentuk sel – sel lepas atau bersambungan membentuk hifa dan miselium. Pada titik – titik pertemuan percabangan miselium akan terbentuk bintik kecil yang disebut pin head atau calon tubuh jamur yang akan berkembang menjadi tubuh buah jamur (Parjimo dan Agus, 2007).

Permukaan bawah tudung dari tubuh buah muda terdapat bilah-bilah (lamela). Lamela tubuh menurun dan melekat pada tangkai. Pada lamela terdapat sel-sel pembentuk spora (basidium) yang berisi basidiospora. Basidiospora biasanya dibentuk pada saat tubuh buah telah dewasa (mengalami

kematangan). Selama tepi tudung masih berlipat-lipat, tubuh buah dikatakan belum dewasa. Tepi tudung yang merengah penuh maka tubuh buah mencapai fase dewasa dan dapat dipanen. Tubuh buah yang matang biasanya rapuh dan spora dapat dilepaskan (Anonim, 2005).

Batang atau tangkai jamur tiram tidak tepat berada ditengah tudung, tetapi agak kepinggir. Tubuh buahnya membentuk rumpun yang memiliki banyak percabangan dan menyatu dalam satu media. Jika sudah tua, daging buahnya akan menjadi liat dan keras. Warna jamur yang disebut dengan oyster mushroom ini bermacam-macam, ada yang putih, abu-abu, coklat, dan merah. Di Indonesia, jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah jamur tiram putih. (Parjimo dan Agus, 2007)

4. Klasifikasi Fungi

- Divisio : Thallophyta
- Sub Divisio : Fungi
- Klasis : Basidiomycetes
- Ordo : Agaricales
- Familia : Agaricaceae
- Genus : *Pleurotus*
- Spesies : *Pleurotus ostreatus* (Becker, 1968)




Gambar 1. Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) (Susilawati, 2010)

5. Kandungan Kimia

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) atau dikenal juga sebagai oyster mushroom mudah tumbuh di daerah tropis dan subtropis serta mudah dibudidayakan (Chrinang P., 2009) Jamur tiram mengandung vitamin B, vitamin C dan karbohidrat seperti β - glukukan, monoterpenoid dan diterpenoid (Iwalokun B. A., 2007) Bagian tubuh jamur merupakan sumber potensial lignin dan fenol (Fountoulakis, 2007) Ada beberapa warna pada jenis jamur tiram ini antara lain putih , kuning , merah jambu coklat dan abu - abu (Jeong – H. K, 2009). namun yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah jamur tiram putih karena rasanya yang enak, kandungan nutrisinya yang tinggi dan berkhasiat untuk pengobatan penyakit (Tjokrokusumo, 2008)

Dari segi nutrisi , jamur tiram mengandung vitamin B1 (tiamin) 0,1 IU, B2 (Riboflavin) 2,04 mg, B3 (niasin) 54,30 mg, BS (Pantothenic acid) 12,30 mg, vitamin D 116 IU (Paul Stamets, 2005), asam - asam organik seperti asam askorbat (vitamin C) , asam malat dan asam fumarat, karbohidrat seperti β - glukukan , protein seperti hidrofobin serta trace element seperti selenium (Iwalokun et al, 2007) Selain itu, jamur tiram diketahui mengandung γ - amino butyric acid (GABA) yang merupakan golongan asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter serta mengandung 9 (sembilan) macam asam amino yaitu lisin, metionin, triptofan, treonin, valin, leusin, isoleusin, histidin dan fenilalanin (Chrinang P., 2009). Bagian tubuh jamur tiram juga dikenal kaya akan lignin dan senyawa fenol (Fountoulakis, 2007). Kandungan serat jamur tiram yang kaya chiton cukup baik untuk memperbaiki kinerja metabolisme tubuh (Alam, 2010) Di samping itu dengan kandungan lemak yang rendah jamur tiram dapat membantu mengurangi kadar lemak dalam darah

B. Kulit



Gambar 2. Struktur kulit (Singla, 2012)

Terdapat 3 lapisan utama pada kulit, diklasifikasikan dari luar ke dalam antara lain epidermis (*non-viable* dan *viable* epidermis), dermis dan endodermis. Ketiga lapisan tersebut memiliki anatomi yang berbeda, morfologi, senyawa penyusun sifat dan fungsinya yang berbeda. (Isriany, 2013)

Lapisan paling luar adalah turunan ectoderm yang disebut epidermis. Dimana lapisan ini terhubung dengan dermis oleh dermo-epidermic (*dermo-epidermic junction*). Dibawah lapisan dermis merupakan hypodermis atau biasa disebut endodermis. Pada setiap lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Total area pembuluh darah yang tersedia pada perlintasan langsung obat ke sirkulasi sistemik sebesar 100-200% dari area kulit (Isriany, 2013). Sebagian besar persiapan topikal dimaksudkan untuk diterapkan pada kulit. Jadi pengetahuan dasar tentang kulit dan fungsi fisiologinya sangat penting untuk mendesain topikal. Permukaan kulit manusia mengandung rata-rata 40-70 folikel rambut dan 200-300 selubung keringat pada setiap sentimeter persegi kulit. pH kulit bervariasi dari 4 hingga 5,6. Keringat dan asam lemak yang disekresikan dari sebum

mempengaruhi pH permukaan kulit (Singla, 2012). Kulit dapat dianggap memiliki empat lapisan jaringan yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

1. Stratum Korneum

Stratum korneum merupakan lapisan terluar kulit, yang melindungi jaringan bawah kulit terhadap sebagian besar substansi yang bersentuhan langsung dengan kulit. Stratum korneum adalah 10 hingga 20 sel lapisan tebal di sebagian besar tubuh. Setiap sel adalah struktur datar, seperti platelike - 34-44 μm panjang, lebar 25-36 μm , 0,5 hingga 0,20 μm tebal - dengan luas permukaan 750 1.200 μm ditumpuk satu sama lain di batu bata seperti mode. Stratum korneum terdiri dari lipid, glycosphingo lipid, protein (75-85%) yang terutama keratin, (5-15%) termasuk fosfolipid, kolesterol sulfat dan lipid netral (Singla, 2012)

2. Epidermis

Lapisan kulit ini berada di antara stratum korneum dan dermis dan memiliki ketebalan mulai dari 50-100 μm . Struktur sel dalam epidermis yang layak secara fisiokimia mirip dengan makhluk hidup lainnya jaringan. Sel-sel disatukan oleh tonofibril. Kepadatan wilayah ini tidak jauh berbeda dengan air. Kandungan airnya sekitar 90% (Singla, 2012)

3. Dermis

Tepat di bawah epidermis adalah dermis. Ini adalah fibrin struktural dan sangat sedikit sel seperti itu dapat ditemukan secara histologis dalam jaringan normal. Ketebalan dermis berkisar antara 2000 hingga 3000 μm dan terdiri dari matriks jaringan ikat longgar yang tersusun dari protein berserat yang tertanam dalam substansi dasar amphorphose (Singla, 2012)

4. Hipodermis

Hipodermis sebenarnya bisa dikatakan bukan bagian dari jaringan ikat yang terstruktur yang bertekstur longgar, jaringan ikat fibrosa mengandung darah dan pembuluh getah bening, bewarna putih, pori-pori kelenjar keringat dan saraf kulit. Sebagian besar peneliti menganggap obat meresap melalui kulit memasuki sirkulasi sebelum mencapai lapisan hypodermis, meskipun jaringan lemak bisa berfungsi sebagai depot obat (Singla, 2012)

Kulit diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, didasarkan pada warna kulit, kecenderungan kulit terbakar dan kemampuan penyamakannya serta tingkat penyamakannya. Berikut adalah tipe-tipe kulit: (Halel, 2009)

a. Tipe kulit 1

Orang dengan tipe kulit 1 memiliki kulit pucat, umumnya berambut pirang atau merah dan mata berwarna terang. Jika orang-orang ini terkena sinar matahari selama 30 menit mereka akan merasakan kulit terbakar

b. Tipe kulit 2

Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki corak kulit yang cerah dan mata berwarna terang. Jika dibawah sinar matahari selama 30 menit, kulitnya akan memerah dan terbakar sinar matahari.

c. Tipe kulit 3

Pada kelompok ini spektrum lebih luas, mulai dari kulit yang relative berwarna seimbang hingga relative lebih gelap. Setelah paparan 30 menit, kulit akan *tanning*, meskipun penyamakan bervariasi tergantung individu. Setelah paparan sinar matahari yang lama, kulitnya akan terbakar.

d. Tipe kulit 4

Orang-orang pada kelompok ini umumnya memiliki rambut gelap, mata cokelat atau hitam dan kulit relative gelap. Dibawah paparan sinar

matahari selama 30 menit jenis tipe kulit ini akan mengalami *tanning* namun tidak akan terbakar.

e. Tipe kulit 5

Yang termasuk dalam tipe kulit ini adalah orang-orang berkulit gelap (misalnya orang India), jarang terbakar matahari.

f. Tipe kulit 6

Golongan kulit hitam merupakan tipe kulit enam, contohnya orang Afrika. Akan tetap memiliki kulit yang gelap meskipun berada pada daerah yang tidak pernah terpapar sinar matahari sekalipun. Saat terkena matahari tipe kulit ini akan menjadi coklat tua/ hitam gelap dan tidak terbakar matahari.

C. *Melanin dan Enzim Tirosinase*

Warna kulit normal ditentukan oleh jumlah dan sebaran melanin yang dihasilkan oleh melanosom pada melanosit, yang secara genetik jumlahnya telah tertentu. Warna kulit juga dipengaruhi oleh ketebalan kulit, vaskularisasi kulit, kemampuan refleksi permukaan kulit serta kemampuan absorpsi epidermis dan dermis, selain itu juga ada beberapa pigmen lain seperti karoten (oranye), oksihemoglobin (merah), hemoglobin (biru) dan melanin (coklat) yang mempengaruhi warna kulit (Tranggono, 2007)

Melanin yang disebut dengan melanosom merupakan pigmen atau zat warna alami pada organel khusus termasuk makhluk hidup.

Pembentukan melanosom didalam melanosit melalui empat fase yaitu:

- a. Fase I: awal pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase, meliputi membrane dan berbentuk vesikula bulat.
- b. Fase II: pramelanosom, pada fase ini belum sempurna, belum terlihat adanya pembentukan melanin.

c. Fase III: telah tampak adanya deposit melanin didalam membrane vesikula.

Disini mulai terjadi melanisasi melanosom.


d. Fase IV: deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partake-partikel padat dan berbentuk sama. (Tranggono, 2007)

Melanin mempunyai dua bentuk yaitu :

1 . Eumelanin memiliki sifat tidak larut dalam air dan berwarna coklat gelap hitam di dalam retina mata .

2 . Feomelanin memiliki sifat larut dalam basa dan memberikan warna kuning - merah pada rambut

Kedua bentuk tersebut disintesis dari oksidasi tirosin oleh enzim tirosinase Enzim tirosinase yang dikenal dengan polifenol oksidase merupakan enzim kunci yang mempunyai peran dalam biosintesis melanin di dalam sel tumbuhan mikroorganisme dan juga mamalia. Biosintesis melanin oleh enzim fuosinase dilakukan dengan mengatalisis orto-ludroksilasi tirosin menjadi 3,4 dihidroksilfenilalanin atau DOPA (monofenolase) dan oksidasi DOPA menjadi dopakuinon (difenolase). O - Kuinon yang dihasilkan ini dapat bertransformasi menjadi pigmen, baik dengan reaksi enzimatik maupun reaksi non - enzimatik (Lithiwayatwuid, 2008)



Gambar 3. Reaksi terbentuknya melanin (Balsam dan Sagarin, 1972)

Paparan sinar UV pada kulit dapat memacu sekresi melanin akibat proliferasi melanosit yang meningkat. Sekresi melanin yang abnormal juga menimbulkan hiperpigmentasi dan kulit. Melanin merupakan pigmen yang dapat melindungi jaringan kulit dari paparan sinar UV. Melanin terbentuk melalui jalur yang disebut melanogenesis di mana enzim tirosinase berperan penting (Herrling T., 2007)

Tirosinase adalah enzim multicopper monooxygenase yang terdapat pada tanaman, jamur serangga dan mamalia termasuk manusia. Pada tanaman dan jamur enzim ini dapat memberikan warna pada produk pertanian. Pada mamalia termasuk manusia enzim tirosinase berperan pada proses melanogenesis atau hiperpigmentasi (Chang T, 2007)

Enzim tirosinase pada mamalia berperan dalam reaksi pigmentasi kulit atau perubahan warna kulit menjadi coklat, mata dan rambut. Enzim tirosinase ini juga dapat menyebabkan reaksi pencoklatan pada produk pangan seperti pada buah-buahan dan sayuran yang mengakibatkan menurunnya harga jual dan nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut (Likhitiwiyawud, 2008). Reaksi

pencoklatan pada produk pangan dipengaruhi oleh konsentrasi enzim tirosinase dan substrat ketersediaan oksigen pH dan suhu (Chang, 2009)

Senyawa yang dapat menghambat proses pembentukan melanin disebut inhibitor tirosinase. Inhibitor tirosinase juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit hiperpigmentasi dan melanogenesis pada kulit (Batubara I Darusman LK, 2010). Inhibitor tirosinase pada saat ini banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi sebagai penghambat produksi melanin berlebih pada lapisan epidermis dan membuat kulit tampak lebih putih (Arung ET, 2006)

Mekanisme kerja enzim tirosinase untuk menghambat aktivitas enzim tirosinase adalah mereduksi bahan yang dapat menyebabkan oksidasi dopakuinon. Inhibitor tirosinase dapat bekerja secara kompetitif dan non kompetitif dengan substrat tirosinase yaitu L - tirosin dan L – DOPA. Inhibitor tirosinase yang spesifik akan berikatan kovalen dengan enzim sehingga enzim menjadi tidak aktif selama reaksi katalitik berlangsung (Chang, 2009)

D. *Inhibitor Tirosinase*

Inhibitor tirosinase banyak digunakan dalam dermatologi perawatan dan juga diterapkan dalam kosmetik. Ada banyak sekali inhibitor tirosinase berasal dari bahan alami dan dari bahan sintetik, yang telah diteliti. Banyak potensi inhibitor tirosinase diperiksa pada L-tirosin atau L-DOPA sebagai substrat enzim, dan aktivitas tirosinase diuji dalam hal pembentukan dopachrome. Demikian, evaluasi eksperimental inhibitor tirosinase dapat dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurangi agen seperti asam askorbat menyebabkan reduksi kimia dopaquinone, dan mengurangi o-dopaquinone ke L-DOPA, jadi menghindari pembentukan dopachrome dan melanin.

2. O - Dopaquinone *scavenger* seperti kebanyakan senyawa yang mengandung thio dapat bereaksi dengan dopaquinone, untuk membentuk produk yang tidak berwarna. kemudian proses melanogenetiknya diperlambat
3. Beberapa senyawa fenolik bertindak sebagai substrat tirosinase alternatif, produk reaksi quinoid mereka menyerap dalam rentang spektral yang berbeda dari dopakrom. Ketika fenolat ini menunjukkan afinitas yang baik untuk tirosinase, pembentukan dopakrom dicegah, karenanya mereka bisa dianggap sebagai inhibitor tirosinase.
4. Nonspesifik inaktivator tirosinase seperti asam atau basa, yang tidak spesifik denaturasi enzim dan menghambat aktivitasnya. Asam atau basa kadang-kadang keliru dianggap sebagai inhibitor tirosinase.

Sebenarnya, inhibitor tirosinase spesifik harus dikatalisis oleh tirosinase dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim, sehingga tidak dapat diubah lagi enzim selama reaksi katalitik. Juga, beberapa bahan kimia senyawa yang secara reversibel berikatan dengan tirosinase dan mengurangi katalitiknya kapasitas, dan mereka juga bisa diakui sebagai specific tyrosinase inhibitor. Secara umum, beberapa inhibitor tirosinase hanya menunjukkan efek lemah penghambatan karena sifat reaktif dan habis pakai mereka terhadap tirosinase atau produk kuinon. Inhibitor tirosinase dapat digolongkan menjadi empat jenis, termasuk inhibitor kompetitif, inhibitor tidak kompetitif, tipe campuran (kompetitif / tidak kompetitif) inhibitor, dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menggabungkan dengan tirosinase gratis yang mencegah pengikatan substrat. Sebuah inhibitor kompetitif mungkin merupakan chelator ion tembaga, tirosinase analog substrat, atau turunan dari L-tirosin atau L-DOPA (Sheng, 2012)

E. Asam Kojat

Asam kojat (*Kojic acid*) adalah inhibitor tirosinase berasal dari berbagai spesies jamur tersebut dalam pengolahan makanan untuk mencegah browning dan untuk mempromosikan kemerahan strawberry mentah. *Kojic Acid* ini telah digunakan dalam industri makanan untuk mencegah pencoklatan makanan dan memerah tomat mentah (Sholikah, 2017: 28)

Bahan asam kojat telah dilaporkan memiliki potensi kepekaan yang tinggi dan dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Namun, hal ini berguna pada pasien yang tidak dapat mentoleransi *hydroquinone* dan studi menunjukkan dapat dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal untuk mengurangi iritasi. Produk pencerah kulit yang mengandung asam kojat biasanya digunakan dua kali per hari selama 1 atau 2 bulan atau sampai efek yang diinginkan tercapai (Sholikah, 2017: 28).

F. Microplate Reader

Microplate reader atau plate reader merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi sampel kimia, fisika, atau biologis dalam ukuran mikro. Alat ini umumnya digunakan dalam penelitian obat, validasi, dan banyak lagi yang umumnya digunakan dalam bidang farmasi, bioteknologi, dan akademik. Format microplate yang umum digunakan yaitu dengan 96 sumur yang terdiri dari 12 kolom dan 8 baris (Ganske, 2010).


Pengukuran absorbansi dapat dilakukan dengan microplate reader. Pembacaan absorbansi suatu sampel dimanfaatkan untuk uji ELISA, kauntifikasi protein dan asam nukleat, serta uji terhadap aktivitas enzim. Prinsip kerja microplate reader tidak berbeda jauh dengan spektrofotometri. Sumber cahaya menyinari sampel yang akan diukur dengan panjang gelombang tertentu (diatur dengan filter cahaya atau sebuah monokromtor) dan kemudian detektor menghitung banyaknya cahaya awal yang ditransmisikan oleh sampel. Banyaknya cahaya yang

ditransmisikan berhubungan dengan konsentrasi molekul yang akan dicari (Ganske, 2010).

G. Fenolik

Senyawa fitokimia fenolik adalah yang terbesar dan secara luas terdistribusi dalam tanaman. Ada tiga kelompok penting dari senyawa fenolik yaitu flavonoid, asam fenolat dan polifenol. Asam fenolat memiliki berbagai aktivitas biologi pada manusia, seperti meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol darah, memiliki aktivitas antimikroba misalnya pada bakteri *Staphylococcus aureus* (Gryglewski, 1988). Asam fenolat juga memiliki beberapa aktivitas biologis, seperti antiulser, antinflamasi, antioksidan (Silva *et al*, 2007), sitotoksik dan anti tumor, antispasmodic, dan antidepresan (Ghasemzadeh, 2010)

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di cincin aromatic. Dengan kata lain, senyawa fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol. Terkait dengan senyawa fenolik, seringkali terjadi keracunan pada pengertian istilah “polifenol”, istilah polifenol kadang disalahartikan sebagai bentuk polimerasi senyawa fenolik, padahal polifenol hanya merupakan satu senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus fenol. (Kiessoun, 2010)



Gambar 4. Gugus fenol

Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka utama fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota. Terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik.

Oleh karena senyawa kimia yang tergolong sebagai senyawa fenolik sangat banyak macamnya, berbagai cara klasifikasi dilakukan oleh banyak ilmuwan.

a. Senyawa fenolik sederhana

Secara umum senyawa fenolik sederhana memiliki sifat bakterisidal, antiseptic, dan antihelmintik. Senyawa dari kelompok ini merupakan hasil substitusi gugus fenol. Substitusi tersebut bisa berupa dua gugus atau satu gugus dalam posisi orto, meta, para. Contoh senyawa fenolik sederhana yang tersubstitusi oleh dua dan satu gugus hidroksil berturut-turut adalah floroglukinol dan resorcinol, contoh senyawa fenol sederhana lainnya adalah p-kresol, 3-etilfenol, 3,4-dimetilfenol, dan hidrokarbon.

b. Asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya (aldehid)

Senyawa fenolik dari golongan asam fenolat adalah fenol yang tersubstitusi oleh gugus karboksil. Contoh asam fenolat adalah asam galat. Asam galat merupakan trifenol yang biasa terdapat di daun teh dalam bentuk teresterifikasi bersama dengan katekin. Selain gugus karboksil, gugus lainnya seperti aldehid juga dapat tersubstitusi di gugus fenol, contoh senyawa dari jenis ini adalah vanillin.

c. Asetofenon dan asam fenilasetat

Asetofenon dan asam fenilasetat adalah golongan senyawa fenolik yang jarang ditemukan di alam. Asetofenon dikenal dengan adanya gugus aseton yang tersubstitusi di fenol. Asam fenilasetat juga memiliki gugus karboksil, namun berbeda dengan asam fenolat, gugus karboksil pada asam fenilasetat tidak berikatan langsung dengan cincin benzen.

Senyawa golongan fenol diketahui sangat berperan terhadap aktivitas antioksidan, semakin besar kandungan senyawa golongan fenolnya maka semakin besar aktivitas antioksidannya (Shahwar, 2010)

H. Metode Ekstraksi

1. Defenisi

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh baagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah maupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Depkes, 1979)

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes, 1979)

Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang diisolasi. Umumnya kita perlu „membunuh“ jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Bila ampas jaringan pada ekstraksi ulang, sama sekali tak berwarna hijau lagi, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstraksi (Harborne, 1987) (Harborne, 1987)

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada antar lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut.

3. Jenis – Jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi.

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserasi pertama, dan seterusnya (Depkes RI, 2000).

Menurut (Harborne, 1987), metode maserasi digunakan untuk mengekstrak jaringan tanaman yang belum diketahui kandungan senyawanya yang kemungkinan bersifat tidak tahan panas sehingga kerusakan komponen tersebut dapat dihindari. Kekurangan dari metode ini adalah waktu yang relatif lama dan membutuhkan banyak pelarut. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan prinsip kelarutan. Prinsip kelarutan adalah like dissolve like, yaitu (1) pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar, (2) pelarut organik akan melarutkan senyawa organik. Ekstraksi senyawa aktif dari suatu jaringan tanaman dengan berbagai jenis pelarut pada tingkat kepolaran yang berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimum, baik jumlah ekstrak maupun senyawa aktif yang terkandung dalam contoh uji.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan,

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya penetasan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) (Depkes RI, 2000: 82).

c. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995)

I. Tinjauan Islam

Banyaknya tumbuhan di muka bumi ini yang dapat manusia manfaatkan sebagai pengobatan maupun digunakan untuk merias diri dari bahan pokok yang berasal dari alam hal ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi ini sangat banyak mengandung manfaat hanya saja kita perlu mengkajinya lebih dalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengetahui manfaat dari tumbuh – tumbuhan tersebut dalam hal ini berupa vitamin dan mineral serta banyak macam lainnya.

Sebagaimana dijelaskan QS. Asy-Syu'ara (26) 7

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Terjemahnya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran (Kementerian agama, 2014)

Dan pada dijelaskan pula pada QS. Al-Hijr (15) 19

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (Kementerian agama, 2014)

Dan dilanjutkan pada QS. Abasa (80) 24 – 32

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣٠ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ٣١ مَتَّعْنَاكُمْ وَلِأَنعِمِمْكُمْ ٣٢

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu disana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu (kementerian agama, 2014)

Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna, maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya, kemudian kami belah bumi, yakni merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, lalu Kami tumbuhkan padanya, yakni di bumi itu, biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran, dan juga pohon zaitun serta pohon kurma, dan kebun-kebun yang lebat serta buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu (Shihab, 2002)

Ayat ayat di atas menyebut aneka tumbuhan dan buah-buahan. Kurma tidak disebut buahnya, tetapi pohonnya. Ini karena pohon kurma, di samping buah kurma, memiliki banyak keistimewaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Arab ketika itu. Mereka makan buah kurma dalam keadaan mentah, setengah matang, dan

matang. Mereka menjadikan dari buahnya arak dan bijinya makanan unta. Dari dahan pohon kurma, mereka minum airnya. Dari pelepahnya, mereka jadikan bahan rumah kediaman mereka, juga dari pohon itu mereka membuat tikar, tali, bahkan perlengkapan rumah tangga (Shihab, 2002)

Kemudian dilanjut pada QS. Ibrahim (14) 37

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ ٣٧

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur (Kementerian agama, 2014)

Surah tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan hampan tumbuhan serta tanaman untuk dijadikan sebagai pengobatan maupun kesenangan bagi manusia dalam hal ini bisa kita jadikan juga kosmetik untuk merias wajar. Dan dapat pula dijadikan pakan untuk hewan-hewan ternak, tetapi tak lupa pula Allah memerintahkan kita untuk tetap mendirikan sholat, berusaha dan memohon untuk diberi rezeki agar kita tetap bersyukur atas karunia yang telah Allah Swt berikan berupa tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen laboratorium berdasarkan pada model penelitian true eksperimental yakni masuk dalam bentuk posttest-only control design.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Laboratorium Biofarmaka Universitas Hasanuddin.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2019 sampai selesai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa analisis data berupa angka atau bilangan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain:

1. Alat Penelitian

Alat-alat gelas, bejana maserasi, cawan porselin, Deksikator, labu tentukur, Oven, Ph Meter, Rotary evaporator, Tabung ependorf, Timbangan Analitik, Mikro Plate Reader 96 Well, Mikro Pipet.

2. Bahan Penelitian

Air suling, Aluminium foil, aluminum klorida ($AlCl_3$), asam asetat anhidrat (AC_2O), asam klorida (HCL) 2 N, asam kojat, asam sulfat pekat (H_2SO_4), besi (III) klorida ($FeCl_3$), Dimetilsulfoksida (DMSO), Ekstak

metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), Eter, Enzim tirosinase 25 KU mushroom (sigma®), methanol, heksan, Kalium Hidroksida (KOH), Kalium Dihidrogen Pospat (KH₂PO₄), kertas perkamen, kertas saring, L-Tirosin (sigma®), Magnesium, natrium klorida (NaCl), natrium klorida (NaOH) Pereaksi Dragendorff, mayer, wagner, tissue.

D. Sampel

Sampel yang digunakan adalah ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

E. Prosedur Kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel Jamur tiram putih (*Pleurotus Ostreatus*) yang akan digunakan sebanyak 3 kg diperoleh dari Desa Parai Katte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

2. Pengolahan sampel

Sampel jamur tiram putih (*Pleurotus Ostreatus*) yang diperoleh ditimbang sebanyak 3 kg setelah itu dilakukan sortasi basah, kemudian dilakukan pencucian dimana sampel jamur tiram dicuci sampai bersih sehingga tidak ada lagi zat pengotor yang tertinggal setelah itu dilakukan perajangan pada sampel selanjutnya dilakukan pengeringan, kemudian di sortasi kering. Dilakukan penggilingan sampel jamur tiram putih dan selanjutnya dilakukan pengayakan dengan nomor mesh 100, kemudian sampel jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) siap untuk di ekstraksi.

3. Ekstraksi sampel

Sampel jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 150 gram dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian dituang cairan penyari metanol hingga terendam, ditutup dan dibiarkan selama 1 hari terlindung dari cahaya, kemudian disaring ke

dalam wadah penampung dan ampasnya selanjutnya dimaserasi kembali dengan penyari metanol yang baru. Maserasi ini dilakukan sebanyak 3 kali penyarian. Hasil dari penyarian yang diperoleh dipekatkan dan dibebaskan dengan metanol.

4. Uji Pendahuluan

a. Identifikasi senyawa fenolik

Ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan sedikit eter. Lapisan eter dikeringkan pada plat tetes, ditambahkan larutan FeCl_3 . Terbentuk warna hijau kehitaman menandakan adanya senyawa fenol (Depkes RI, 1979).

5. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase

a. Pembuatan larutan Dapar Fosfat

Ditimbang sebanyak 2,7 g KH_2PO_4 dan dilarutkan dalam air suling, sedikit demi sedikit hingga mencukupi volume 400 mL. Kemudian pH larutan diukur dengan menggunakan pH meter. Ditimbang 5,6 g KOH dan larutkan dalam 100 mL air suling. Larutan KOH ditambahkan ke dalam larutan KH_2PO_4 hingga mencapai pH 6,8. Larutan dapar fosfat disimpan pada lemari pendingin.

b. Pembuatan larutan L- Tirosin

Sebanyak 18,2 mg L-Tirosin dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 mL, ditambahkan dapar fosfat sedikit demi sedikit, dan dihomogenkan. Volumennya dicukupkan hingga 100 mL dengan larutan dapar fosfat.

c. Pembuatan larutan Enzim Tirosinase

Sebanyak 1 mg enzim tirosinase dimasukkan kedalam labu tentukur 10 mL dilarutkan dalam 10 mL larutan dapar fosfat yang telah didinginkan. Larutan enzim tirosinase diletakkan pada wadah yang berisi es agar suhu enzim tetap stabil pada suhu dingin saat pengerjaan.

d. Pembuatan larutan uji ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) ditimbang sebanyak 5 mg kemudian dilarutkan dengan bantuan DMSO sebanyak 50 μ l, dihomogenkan lalu ditambahkan dengan dapar fosfat sampai 1000 μ l sehingga diperoleh larutan stok 1000 ppm. Larutan stok kemudian diencerkan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan, sehingga diperoleh larutan ekstrak dengan konsentrasi masing-masing 50 ppm, 25 ppm, 20 ppm, 15 ppm dan 10 ppm.

e. Pembuatan Larutan Kontrol Positif Asam Kojat

Sebanyak 5 mg dimasukkan kedalam tabung ependorf dan dilarutkan dalam 5 ml dari 50 Mm larutan dapar fosfat (pH,6,5). Kemudian larutan asam kojat diencerkan hingga diperoleh larutan asam kojat dengan konsentrasi yang sama dengan larutan uji.

f. Penentuan Inhibitor tirosinase

Uji penghambatan aktivitas enzim tirosinase berdasarkan metode Miyazawa dan Tamura (2006) dengan modifikasi tertentu. Sebanyak 50 μ l L-Tirosin 1 mM, 50 μ l larutan dapar fosfat 50 mM (pH 6,8), 20 μ l larutan enzim tirosinase dan 100 μ l larutan sampel dimasukkan ke dalam sumuran pada *microplate*. Campuran tersebut diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian diukur serapannya menggunakan *microplate*

reader (ELISA) pada panjang gelombang 490 nm. Dilakukan pengujian blanko tanpa penambahan enzim yaitu digunakan Sebanyak 170 µl larutan dapar fosfat (pH 6,8), 50 µl L-Tirosin 1 mM. Kontrol negatif menggunakan campuran tersebut diatas tanpa penambahan sampel dan untuk kontrol positif menggunakan arbutin sebagai pengganti sampel. Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan secara triplo.

Penentuan persentase penghambatan aktivitas tirosinase berdasarkan rumus:

$$\% \text{ penghambatan Tirosinase} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor.

B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor.

6. Penetapan Kadar Fenolik Total

a. Pembuatan larutan standar asam galat.

Larutan standar asam galat 1000 ppm dibuat dengan menimbang 10 mg asam gallat dilarutkan dalam metanol p.a hingga volume 10 mL. Dari larutan stock dipipet sebanyak 2,5 mL diencerkan dengan metanol p.a hingga volume 25 mL dihasilkan konsentrasi 100 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 1, 2, 3, 4, 5 mL dan dicukupkan dengan metanol p.a hingga 10 mL, sehingga dihasilkan konsentrasi 0.5, 1, 5, 10 dan 25 ppm (Malik, 2015)

b. Pengukuran larutan standar asam galat.

Untuk masing-masing konsentrasi 0.5, 1, 5, 10 dan 25 ppm ditambahkan 0,4 mL reagen Folin-Ciocalteu dikocok dan dibiarkan 4-8 menit, ditambahkan 4,0 mL larutan Na₂CO₃ 7% kocok hingga homogen. Ditambahkan aquabidestilata hingga 10 mL dan didiamkan selama 2 jam pada suhu ruangan. Diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum

744,8 nm, dibuat kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi asam galat ($\mu\text{g/mL}$) dengan absorbansi (Malik, 2015)

c. Pembuatan larutan ekstrak

Masing-masing larutan ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dibuat dengan cara menimbang 10 mg kemudian dilarutkan dengan 10 mL metanol p.a.

d. Penetapan fenolik total

Masing-masing dipipet sebanyak 1 mL larutan ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), kemudian sampel ditambahkan dengan 0,4 mL reagen Folin-Ciocalteu dikocok dan dibiarkan 4-8 menit, tambahkan 4,0 mL larutan Na_2CO_3 7% kocok hingga homogen. Tambahkan aquabidestilata hingga 10 mL dan diamkan selama 2 jam pada suhu ruang. Ukur serapan pada panjang gelombang serapan maksimum 744,8 nm. Lakukan 3 kali pengulangan sehingga kadar fenol yang diperoleh hasilnya sebagai mg ekuivalen asam galat/g ekstrak.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer, yang didapatkan dari absorbansi masing-masing larutan perbandingan asam galat dan kuersetin dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linier.

Kadar total dari senyawa dihitung dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linier $y = ax + b$, yang diperoleh dari kurva kalibrasi masing-masing pembanding. Hasil dinyatakan dalam satuan mg dalam 100 gram.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi

Tabel 1. Hasil ekstraksi jamur tiram putih

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak Kental	150 gram	12.425	8.28 %

2. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Tabel 2. Uji identifikasi golongan senyawa jamur tiram putih

Golongan	Pereaksi	Hasil
Fenolik	+ Eter + FeCl ₃	Merah (+)

3. Hasil Penetapan Kadar Fenolik Total

Tabel 3. Kadar fenolik total jamur tiram putih

Berat bahan (g)	absorbansi	Absorbansi rata - rata	Kadar ekivalen (ppm)	Kadar fenolik total (%)
1 gram	1.706	1.002	11.35	1.13
	0.961			
	0.97			

4. Hasil Aktivitas Inhibitor Tirosinase

Tabel 4. Aktivitas inhibitor tirosinase jamur tiram putih dan asam kojat (kontrol positif)

Konsentrasi	Jamur tiram putih	Asam kojat
55 ppm	17.6 %	39.2 %
65 ppm	19.5 %	41.1 %
75 ppm	22.2 %	41.7 %
85 ppm	25.9 %	43.4 %
95 ppm	35.7 %	45.9 %

5. Hasil nilai IC₅₀

Tabel 5. Nilai IC₅₀ jamur tiram putih

Sampel	Nilai IC ₅₀ (µg/mL)
Jamur tiram putih	9.06
Asam kojat	7.92

B. Pembahasan

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) merupakan spesies fungi yang tumbuh secara liar tetapi banyak juga dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki bahan dasar budidaya yang terbilang murah dan sederhana. Pemanfaatan jamur tiram dimasyarakat biasanya digunakan sebagai sayur sebagai makanan pokok sehari – hari karena mengingat dari manfaat lain jamur tiram putih ini sendiri dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mencegah kanker dan bisa juga digunakan sebagai obat kolesterol.

Dalam penelitian ini jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) diambil secara utuh kemudian dilakukan pencucian sampel, kemudian dipotong- potong kecil. Selanjutnya sampel dikeringkan pada lemari pengering. Setelah itu sampel di serbukkan menggunakan blender untuk memperluas permukaan sampel sehingga memudahkan zat – zat yang terkandung dalam sampel untuk di tarik oleh larutan penyari yang digunakan, selanjutnya sampel di ekstraksi. Adapun tujuan dari proses ekstraksi yaitu untuk menarik komponen senyawa kimia yang terkandung dalam sampel.

Metode maserasi merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan), bertujuan agar senyawa yang terkandung dalam sampel tidak rusak. dimana metode ini cocok untuk bahan yang tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang diperkirakan dapat merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Metode ini memiliki keuntungan yaitu cara pengerjaannya mudah, alat yang digunakan sederhana, cocok untuk bahan yang tidak tahan pemanasan (Depkes RI, 1986). Metode ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perubahan konsentrasi antara larutan zat aktif yang didalam dan yang ada diluar sel,

maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi larutan antara diluar sel dan di dalam sel. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi.

Larutan penyari yang digunakan pada penelitian ini yaitu metanol. Dimana metanol ini dapat mampu menarik komponen senyawa polar maupun non polar. Metanol juga bersifat mudah menguap sehingga mempermudah proses pemisahan filtrate pada saat dikeringkan. Kemudian hasil pada tabel 1. Di dapatkan ekstrak 12,425 gram dan hasil rendamen 8,28 %. Rendamen adalah kuantitas (jumlah) ekstrak yang diperoleh dari hasil ekstraksi suatu bahan alam dinyatakan dalam satuan persen (%), dimana semakin tinggi nilai rendamen yang diperoleh maka semakin besar pula ekstrak yang diperoleh.

Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas inhibitor tirosinase dan penetapan kadar fenolik total dari jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Identifikasi senyawa fenolik dilakukan dengan menggunakan pereaksi eter dan $FeCl_3$, $FeCl_3$ akan bereaksi dengan gugus fenolik yang berada pada sampel membentuk warna hijau, biru, atau hitam menunjukkan adanya senyawa fenolik (Harborne, 1987). Uji pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang senyawa yang terkandung dalam jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Kemudian hasil pada tabel 2. Menunjukkan adanya kandungan fenol yang terdapat dalam jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

Penetapan kandungan fenolik total dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu. Metode ini berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksi senyawa fenolik. Semua senyawa fenolik termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu, walaupun bukan penangkap radikal bebas efektif. Adanya inti aromatis pada senyawa fenol dapat mereduksi fosfomolibat

fosfotungstat menjadi molibdenum yang berwarna biru (Lee et al, 2003). Hasil pada tabel 3. Menunjukkan bahwa jamur tiram putih memiliki kadar fenolik 1,13 %

Pengujian inhibitor tirosinase dilakukan dengan menggunakan *microplate reader* (ELISA). Metode ini dipilih karena sederhana, mudah digunakan dan menggunakan jumlah sampel yang sedikit. Penelitian ini menggunakan enzim tirosinase yang disintesis dari jamur dan L-tirosin sebagai substratnya. Kerja maksimum enzim tirosinase pada pH 6,8 sehingga didapar dengan dapar fosfat pH 6,8 yang telah didinginkan. Enzim tirosinase juga stabil pada suhu -20°C sehingga dalam penyimpanan dan proses pengerjaan enzim harus tetap berada pada wadah dingin.

Mekanisme kerja *microplate reader* (ELISA) adalah plat mikrotiter dilapisi dengan antigen kemudian memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu kemudian menambahkan antibodi primer dan antibodi sekunder yang terkunjungsi ke enzim. Setelah itu reaksi substrat dan enzim digunakan untuk menghasilkan produk berwarna sehingga menunjukkan reaksi positif.

Prinsip pengukuran yaitu enzim tirosinase akan mengkatalis pembentukan L-tirosin menjadi L-DOPA kemudian terbentuk dopakrom yang dapat terukur intensitasnya pada panjang gelombang 490 nm. Dopakrom yang terbentuk akan terlihat dengan adanya warna ungu muda. Penambahan sampel dimaksudkan untuk menginhibisi aktivitas enzim tirosinase sehingga jumlah dopakrom yang terbentuk semakin berkurang. Serapan yang diperoleh (absorbansi) digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas ekstrak dalam menginhibisi reaksi tirosin-tirosinase. Penghambatan aktivitas enzim tirosinase ditunjukkan dengan nilai IC_{50} . IC_{50} merupakan nilai konsentrasi inhibitor tirosinase yang dapat menghambat 50% aktivitas tirosinase.

Hasil pada tabel 4. Dari beberapa konsentrasi terhadap daya hambat inhibitor tirosinase jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Konsentrasi 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm, 95 ppm berturut – turut adalah 17,6 %, 19,5 %, 22,2 %, 25,9 % dan 35,7 %. Dan asam kojat 39,2 %, 41,1 %, 41,7 %, 43,4 % dan 45,9 % Hasil diperoleh dari perhitungan nilai absorbansi yang dilakukan secara triplo untuk setiap konsentrasi. Adapun hasil yang diperoleh dalam bentuk persentase bertujuan untuk mengetahui skala perbandingan aktivitas inhibitor enzim pada setiap konsentrasi sampel.

Hasil pada tabel 5. Nilai IC_{50} jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) 9,06 $\mu\text{g/mL}$, dan asam kojat 7,92 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan nilai konsentrasi yang dapat menghambat 50% aktivitas enzim tirosinase. Senyawa dikatakan sebagai inhibitor tirosinase sangat kuat jika IC_{50} kurang dari 50, dikatakan kuat jika IC_{50} 50 – 100, sedang 100 – 50 dan lemah 151 – 200. Semakin kecil nilai IC_{50} semakin tinggi aktivitas inhibitor tirosinase (Badarinath. 2010)

Penggunaan asam kojat sebagai kontrol positif dalam pengujian inhibitor tirosinase karena asam kojat merupakan metabolit jamur seperti aspergillus, acetabacterdan penicillium. Mekanisme kerjanya adalah mengikat copper sehingga aktivitas enzim tirosinase terhambat. Keuntungan lain adalah asam kojat memiliki efek pengawet dan antibiotik sehingga bahan ini lebih stabil sebagai produk kosmetik (Baumann & Alleman, 2009)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki aktivitas inhibitor tirosinase
2. Ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki rata – rata persen inhibitor pada konsentrasi 55 ppm, 65 ppm, 75 ppm, 85 ppm, dan 95 ppm berturut – turut adalah 17,6 %, 19,5 %, 22,2 %, 25,9 % dan 35,7 %
3. Ekstrak jamur metanol tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki nilai IC_{50} 9,06 %
4. Ekstrak jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki kadar fenolik total 1,13 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar fenolik total tersebut memiliki daya hambat inhibitor tirosinase yang sangat kuat.

B. Saran

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut meliputi fraksinasi dan isolasi senyawa yang lebih spesifik dari ekstrak metanol jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) sebagai pencerah kulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam. Antioxidant activities and tyrosinase inhibitor effects of different extracts from *Pleurotus ostreatus* fruiting bodies. *Mycobiology Journal*. 2010
- Apsari Pramudita Dwi., a. S. Penetapan Kadar Fenolik Total Bunga Rosella Merah (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan Variasi Tempat Tumbuh secara Spektrofotometri. *Jurnal ilmiah Kefarmasian*. 2011
- Arung ET, k. I. Screening of Indonesian plants for tyrosinase inhibitory activity. *Journal Wood Science*. 2006
- Batubara I Darusman LK, M. T. Potency of Indonesia medicinal plants Drosinase inhibitors and as antioxidant agent. *Journal of Biologi Science*. 2010
- Chang T, D. H. Mushroom tyrosinase inhibitory effects of isoflavones isolated from soygerm koji fermented with *Aspergillus orzae* BCRC 32288. *Journal of Food chemistry*. 2007
- Chang, T. An updated review of tyrosinase inhibitor. *International Journal of molecular science*. 2009
- Chrinang P., I. K. Amino Acids and Antioxidant Properties of the Oyster Mushrooms, *Pleurotus ostreatus* and *Pleurotus sajor-caju*. *Science Asia Journal*. 2009
- Depkes, R. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI. 1979
- Djarajah. Budidaya Jamur Tiram. Kanisius. *Yogyakarta*. 2001
- Ezzedine K, G. C. Expatriates in high- UV index and tropical countries: sun exposure and protection behavior in 9,416 French adults. *Journal of Travel Medicine*. 2007
- Fawole A, M. N. Antibacterial, Antioxidant and Tyrosinase Inhibitor Activities of Pomegranate Fruit Peel Methanolic Extract. *BMC Complement & Altern Med*. 2012
- Fountoulakis. Removal of Phenolics in Olive Mill Wastewater Using the White-rot Fungus *Pleurotus ostreatus*. *Water Res*. 2007
- Ghasemzadeh, A. J. Synthesis of Phenolics and Flavonoids in Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) and Their Effects on Photosynthesis Rate. *IJMS*. 2010
- Gryglewski, R. R. Flavonoids are Scavengers of Super Oxide Anions. *Journal Biochemistry and Pharmacology*. 1988
- Gunawan, A. Budidaya Jamur Tiram. *PT Agro Media Pustaka*. 2004
- Halel, D. *Handbook of Cosmetic Skin Care, Second Edition*. United Kingdom: Informa Healthcare Ltd. 2009
- Harborne, J. *Metode Fitokimia. Penuntun Cara modern mengekstraksi Tumbuhan*. Bandung: ITB. 1987
- Herrling T., J. K. The important of melanin as protector against free radicals in skin. *SOFW Journal*. 2007
- Isriany, I. *Formulasi Kosemetik*. Makassar: Alauddin University Press. 2013

- Iwalokun B. A., u. U. Comparative Phytochemical Evaluation, Antimicrobial and Antioxidant Properties of *Pleurotus ostreatus*. *African Journal of Biotechnology*. 2007
- Jeong – H. K, S. –J.–R.–I.–C.–C.–J.–C. The Different Antioxidant and Anticancer Activities depending on the Color of Oyster Mushroom. *Journal of Medicinal Plant Research*. 2009
- Kiessoun, K. S.-M.-R. Polyphenol Contents, Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Six Meda, A., Lamidi, M., Malvaceae Species Traditionally used to Treat Hepatitis B in Burkina Faso. *Eur J. of Sci. Res*. 2010
- Lithiwitayawuid. Stilbenes with Tyrosinase Inhibitory Activity. *Current Science*. 2008
- Malik, A. A. Determonation of Phenolic and flavonoids contents of ethanolic extract of kanunang leaves (*Cordia myxa* L.). *International Journal Of PharmTech Research*. 2015
- Miller, A. L. Antioxidant Flavonoids Structure, Function and Clinical Usage. *ALT Med Rev*. 1996
- Parvez S, e. a. Survei and Mechanism of Skin Depigmenting and Lightening Agents. *Phytother Res Journal*. 2006
- Quishi. Evaluate he Effectiveness of the Natural Cosmetic Product Comparated te Chemical-Based Product. *International Journal of Chemistry*. 2009
- Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2014
- Sanjewa KKA, K. E. Bioactive properties and potentials cosmeceutical applications of phlorotannins isolated from brown seaweeds: a review. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2016
- Shahwar, D. S.-u.-R. Antioxidant Activities of the Selected Plants from the Family Euphorbiaceae, Lauraceae, Malvaceae and Balsaminaceae. *Af. J. of Biotechnol*. 2010
- Sheng, C. T. Natural Melanogenesis Inhibitor Acting Through the Down Regulation of Tyrosinase Activity. 2012
- Singla, V. S. Emulgel: A new platform for topical drug delivery. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*. 2012
- Smit N, V. J. The hunt for natural skin whitening agents. *International Journal of Molecular Sciences*. 2009
- Suriawiria, U. Sukses Beragrobisnis Jamur Kayu. *Jakarta: Penebar Swadaya*. 2000
- Susilawati, & R. Budidaya jamur tiram (*Pleurotus ostreatus* var *florida*) yang ramah lingkungan. *Materi Pelatihan Agribisnis bagi KMPH tidak dipublikasikan*. 2010
- Tjokrokusumo. Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Rehabilitasi Lingkungan. *JRL*. 2008
- Tranggono, R. L. *Buku Pengantar Ilmu Kosmetik*. Jakarta: Gramedia. 2007
- Vinayak B, R. Natural Ingredients For Creting Food Textured Cosmetics. *Cosmetic Science Technology Journal*. 2007


Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Diterjemahkan Oleh Soendani N.S.*
Yogyakarta: UGM Press. 1995

WorldHealthOrganization. *Global Solar UV index. A Practical Guide.* 2002

Zeo Draelos, D. A. *Dyspigmentation, Skin Physiology, And a Novel Approach to
Skin Lightening. Journal of Dermatology.* 2013



Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)




Lampiran 2. Skema Pembuatan Larutan Uji


a. Pembuatan larutan dapar fosfat




b. Pembuatan L-tirosin




c. Pembuatan larutan uji ekstrak jamur tiram putih







d. Pembuatan Larutan Kontrol Positif Asam Kojat



e. Pembuatan Larutan Enzim Tirosinase



Lampiran 3. Skema Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase



Lampiran 4. Perhitungan Rendamen Ekstrak

% Rendamen ekstrak jamur tiram putih

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot simplisia (gram)}} \times 100\%$$

$$= \frac{12,425 \text{ gram}}{150 \text{ gram}} \times 100\%$$


$$= 8,28 \%$$



Lampiran 5. Pengukuran Absorbansi Larutan standar

Table 6. Hasil pengukuran absorbansi larutan standar asam galat

Konsentrasi	2	4	6	8	10	12
Absorbansi	0,193	0,404	0,554	0,682	0,880	1,075



Gambar 5. Kurva kalibrasi asam galat

Lampiran 6. Perhitungan Kadar Fenolik Total

Kadar ekivalen :

$$y = 0,0852x + 0,0347$$

$$1,002 = 0,0852x + 0,0347$$

$$x = \frac{1,002 - 0,0347}{0,0852}$$

$$x = \frac{0,9673}{0,0852}$$

$$x = 11,35 \text{ ppm}$$

Kadar fenolik total :

$$= \frac{11,35 \text{ mg/L} \times 0,01 \text{ L}}{0,1 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,1135}{0,1}$$

$$= 1,13 \%$$


Lampiran 7. Perhitungan % Inhibitor Tirosinase

Tabel 7. % inhibitor tirosinase jamur tiram putih


Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
55 ppm	0,0878	0,0889	17,6 %
	0,0894		
	0,0894		
65 ppm	0,0801	0,0868	19,5 %
	0,0714		
	0,1089		
75 ppm	0,0824	0,0839	22,2 %
	0,0837		
	0,0855		
85 ppm	0,0863	0,0799	25,9 %
	0,0785		
	0,0749		
95 ppm	0,0630	0,0693	35,7 %
	0,0641		
	0,0807		
Kontrol (-)	0,1079		

Tabel 8. % inhibitor asam kojat

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
55 ppm	0,0670	0,0655	39,2 %
	0,0644		
	0,0652		
65 ppm	0,0653	0,0635	41,1 %
	0,0645		
	0,0606		
75 ppm	0,0614	0,0629	41,7 %
	0,0622		
	0,0652		
85 ppm	0,0619	0,0610	43,4 %
	0,0614		
	0,0596		
95 ppm	0,0635	0,0583	45,9 %
	0,0533		
	0,0581		
Kontrol (-)	0,1079		



Gambar 6. Kurva jamur tiram putih



Gambar 7. Kurva asam kojat



Lampiran 8. Perhitungan Nilai IC₅₀

1. Sampel

$$y = 4,26x + 11,4$$

Diketahui : $y = 50$

$$a = 11,4$$

$$b = 4,26x$$

$$y = a + bx$$

$$y = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 11,4}{4,26}$$

$$x = 9,06 \mu\text{g/mL}$$

2. Asam kojat

$$y = 1.57x + 37.55$$

Diketahui : $y = 50$

$$a = 37,55$$


$$b = 1,57x$$

$$y = a + bx$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 37,55}{1,57}$$

$$x = 7,92 \mu\text{g/mL}$$



Lampiran 9. Gambar Penelitian



Gambar 8. Sampel jamur tiram putih



Gambar 9. Ekstrak jamur tiram putih



Gambar 10. Hasil golongan fenolik



Gambar 11. Sampel pada microplate 96 well



Gambar 12. Pengujian pada ELISA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Suci Wahdaniyah biasa dipanggil SUCI, lahir pada tanggal 8 Mei 1998. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan orang tua Bachtiar dan Salmawati. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Inpres 205 Kallonggerasa kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Binamu kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Kesehatan Primanegara Jeneponto. Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi negeri di Makassar yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil konsentrasi jurusan Farmasi. Hidup di dunia Farmasi merupakan sesuatu yang penuh tantangan dan keseruan. Baginya farmasi itu adalah disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada aspek pengobatan dan penyembuhan kepada masyarakat secara umum. Oleh karena itu dia sangat termotivasi untuk mengembangkan wawasan dan disiplin ilmunya di bidang kefarmasian. Baginya obat itu adalah pahit tapi menyembuhkan. Tentunya dia berharap bisa menjadi seorang formulator yang memiliki kapasitas untuk memformulasi obat dengan ilmu kefarmasian, seni dan teknologi yang mampu merubah kehidupan masyarakat yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR