

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA  
(*Lannea coromandelica L.*) TERHADAP PENINGKATAN KADAR  
TROMBOSIT TIKUS (*Rattus norvegicus*) SEBAGAI TERAPI DEMAM  
BERDARAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARDITYA NOOR  
NIM. 70100113097

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arditya Noor  
NIM : 70100113097  
Tempat Tanggal Lahir : Sikeli, 6 September 1995  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Perum. Bumi Aroepala Blok C No. 51  
Judul : Uji Aktivitas ekstrak methanol kulit batang kayu jawa (*lannea coromandelica*) terhadap peningkatan kadar trombosit tikus (*rattus norvegicus*) sebagai terapi demam berdarah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR

Samata-Gowa, Desember 2017

Penyusun,

  
**Arditya Noor**  
NIM. 70100113097

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.) Terhadap Peningkatan Kadar Trombosit Tikus (*Rattus novergius*) Sebagai Terapi Demam Berdarah” Periode Desember 2017 yang disusun oleh **Arditya Noor**, NIM: **70100113097**, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 7 Desember 2017 M** yang bertepatan dengan **18 Rabi’ul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Makassar, 7 Desember 2017 M**  
**18 Rabi’ul Awal 1439 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt	(.....)
Penguji I	: Hacia, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Drs. H.M. Kurdi, M.HI	(.....)

Dekan,



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
**NIP. 195602031969121001**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh**

Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Semesta Alam Maha Pencipta dan Maha Segala Sesuatu. Sebagai hambaNya patutlah kita bersyukur karena telah diberikan banyak kelimpahan dan kenikmatan kepada kita sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula tetap terhaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. karena berkat-Nyalah kita dapat merasakan indahnya Islam dimana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah ” Uji Aktivitas Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) Terhadap Peningkatan Kadar Trombosit Tikus (*Rattus norvegicus*) Sebagai Terapi Demam Berdarah”.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Akhmad Nuryadin** dan Ibunda **Nurjaya** yang tak henti-hentinya memberi do’a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku Ilham Rusady, serta seluruh keluarga besar

penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, dan juga buat teman-teman farmasi angkatan 2013 yang selalu memberi semangat. Terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai Penguji Kompetensi.

7. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Isriany Ismail, S.Si., M.,Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt selaku dosen yang memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Drs. H.M. Kurdi, M.HI selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
12. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Samata-Gowa, Desember 2017

Penyusun



Arditya Noor

NIM : 70100113097



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACK .....	xvi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian .....	4
D. Kajian pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....	10
A. Tumbuhan .....	10
B. Uraian Hewan Coba .....	12
C. Ekstraksi .....	14
D. Angkak .....	19
E. Darah.....	19
F. Demam Berdarah Dengue.....	21
G. Terapi Demam Berdarah .....	28
H. Tinjauan Islam .....	31
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN.....	36

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Pendekatan Penelitian .....	36
D. Bahan dan Peralatan .....	36
E. Prosedur Kerja .....	37
F. Penyiapan Sampel Uji .....	38
G. Pelaksanaan Percobaan .....	38
H. Pelaksanaan Penelitian .....	40
I. Analisis Data .....	41
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 43
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	44
 BAB V PENUTUP.....	 53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
 KEPUSTAKAAN .....	 54
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 56
 RIWAYAT HIDUP.....	 81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tumbuhan Kayu Jawa ( <i>Lannea coromandelica</i> ).....	65
Gambar 2	Proses Perajangan simplisia.....	65
Gambar 3	Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa ( <i>Lannea coromandelica</i> )	65
Gambar 4	Proses Maserasi Kulit Batang Kayu Jawa .....	66
Gambar 5	Proses Evaporasi.....	66
Gambar 6	Tikusputih Jantan.....	66
Gambar 7	Pengamatan Trombosit.....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja.....	58
Lampiran 2	Perhitungan Trombosit.....	65
Lampiran 3	Gambar Pengamatan .....	66
Lampiran 4	Analisis Data .....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Biologik tikus .....	13
Tabel 2	Data Hasil Pengamatan Kadar Trombosit.....	43
Tabel 3	Tabel Analisis Varians .....	44



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Kenaikan Kadar Trombosit.....	44
----------	-------------------------------	----



## ABSTRAK

**Judul Skripsi : Uji Aktivitas Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) Terhadap Peningkatan Kadar Trombosit Tikus (*Rattus norvegicus*) Sebagai Terapi Demam Berdarah**

**Nama Penyusun : Arditya Noor**

**NIM : 70100113097**

**Pembimbing : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.**

**Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt**

---

Tumbuhan kayu jawa (*Lannea coromandelica*) merupakan salah satu jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengobati berbagai penyakit, diantaranya sebagai peningkat kadar trombosit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak metanol kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dalam meningkatkan kadar trombosit. Kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) diekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol, kemudian diujikan pada 25 ekor tikus (*Rattus norvegicus*) yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol negative (F1), kelompok kontrol positif (F2), kelompok ekstrak 0,25% (F3), 0,5% (F4), dan 1% (F5). Induksi anemia aplastik dengan menggunakan anilin dosis 0,35 ml/kg BB. Perhitungan jumlah trombosit dilakukan dengan perhitungan langsung metode kamar hitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dengan dosis 1 % terlihat peningkatan jumlah trombosit yang signifikan sekitar 42 % setelah penurunan jumlah trombosit.

**Kata kunci : Ekstrak metanol kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*), Tikus (*Rattus norvegicus*), kamar hitung, demam berdarah, trombosit.**

## ABSTRACT

**Title** : **Methanol Extracts Activity Test Java Wood Trunk Caucasian (*Lanneacoromandelica*) Toward Improved Levels Platelet Rat (*Rattus norvegicus*) As therapy Dengue Fever**

**Name** : **Noor Arditya**

**NIM** : **70100113097**

**Supervisor** : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si ., Apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt**

---

Plant Java timber (*Lanneacoromandelica*) is one of the plant species found in Indonesia which is traditionally used by communities in treating various diseases, such as boosting platelet levels. This study aimed to determine the effect of the methanol extract of the bark of the Java timber (*Lanneacoromandelica*) to increase platelet levels. Bark of wood Java (*Lanneacoromandelica*) extracted by using methanol, and then tested on 25 rats (*Rattus norvegicus*) were divided randomly into 5 groups: control group a negative (F1), the positive control group (F2), the group extracts 0, 25% (F3), 0.5% (F4), and 1% (F5). Aplastic anemia induced by using aniline dose of 0.35 ml / kg. Calculation of the platelet count is done by direct calculation method count room. The results showed that the methanol extract of the bark of the Java timber (*Lanneacoromandelica*) at a dose of 1% seen a significant increase in the number of platelets approximately 42% after a decrease in the number of platelets.

**Keywords** : **Wood bark methanol extract of Java (*Lanneacoromandelica*), Rat (*Rattus norvegicus*), room count, dengue fever, platelets.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Demam berdarah adalah penyakit yang banyak ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti* dan mengalami peningkatan 30 kali lipat selama lima dekade terakhir. Demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hampir setengah populasi di dunia merupakan daerah endemik dengan 50-100 juta infeksi demam berdarah setiap tahun di 100 negara endemik (World Health Organization, 2012 : 174 ).

Demam berdarah diidentifikasi sebagai satu dari 17 penyakit tropis yang diabaikan oleh WHO, setiap tahun dari ratusan ribu kasus yang muncul terhitung sekitar 20.000 mengalami kematian. Sekitar 1,8 milyar (< 70 %) populasi di dunia beresiko mengalami demam berdarah dan pada negara anggota WHO *South-East Asia Region* (SEAR) dan *Western Pacific Region*, sekitar 75% menanggung beban penyakit demam berdarah di dunia. Dari 11 negara SEAR, 10 negara termasuk india merupakan endemik demam berdarah, dengan pengecualian Republik Demokratik Rakyat Korea. Pada tahun 2012, negara-negara SEAR dilaporkan memiliki sekitar 0,29 juta kasus dimana Thailand memiliki persentase 30%, Indonesia 29%, India 20%. Demikian pula dengan negara Pasifik Barat dilaporkan sebanyak 0,33 juta kasus dimana Filipina memiliki persentase sebesar 52%, Vietnam 24%, dan Kamboja 14% (World Health Organization, 2012 : 176).

Demam Berdarah Dengue telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia selama 47 tahun terakhir. Sejak tahun 1968 terjadi peningkatan jumlah provinsi dan kabupaten/kota dari 2 provinsi dan 2 kota, menjadi 34 provinsi dan 436 (85%) kabupaten/kota pada tahun 2015. Terjadi juga peningkatan jumlah kasus DBD dari tahun 1968 yaitu 58 kasus menjadi 126.675 kasus pada tahun 2015. Peningkatan dan penyebaran kasus demam berdarah dengue tersebut dapat disebabkan oleh mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan wilayah perkotaan, perubahan iklim, perubahan kepadatan dan distribusi penduduk dan faktor epidemiologi lainnya yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. (pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, 2016: 4)

Jumlah kasus kejadian luar biasa Demam Berdarah Dengue yang dilaporkan meningkat dari 1.081 kasus pada tahun 2014 menjadi 8.030 kasus pada tahun 2015. Demikian juga dengan jumlah provinsi dan kabupaten yang melaporkan kejadian luar biasa Demam Berdarah Dengue dari tahun 2014-2015 meningkat, yaitu dari 5 provinsi dan 21 kabupaten pada tahun 2014 menjadi 7 provinsi dan 69 kabupaten pada tahun 2015. (pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, 2016:5)

Demam Berdarah Dengue disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dengue (DENV-1,-2,-3,dan-4), yang merupakan anggota dari genus *Flavivirus* dan family *Flaviviridae* (World Health Organization, 2011). Virus dengue bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan empat kriteria DBD yaitu, demam yang berlangsung selama 2-7 hari, adanya manifestasi pendarahan, trombositopenia (jumlah trombosit

<100.000/mm<sup>3</sup>), dan bukti peningkatan permeabilitas pembuluh darah (Tjitraresmi, Runadi, Ferdiansyah, Halimah, Wicaksono, & Ardhya, 2016:3)

Indonesia terkenal dengan banyaknya tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber bahan obat dan secara turun temurun digunakan untuk keperluan pengobatan. Penggunaan tumbuhan obat dalam upaya pemeliharaan kesehatan, maupun sebagai pengobatan menggunakan tumbuhan obat kecenderungannya terus meningkat. Seiring dengan hal itu, penelitian yang membuktikan khasiat dan keamanan obat tradisional atau obat asli Indonesia juga meningkat (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2010:5).

Perlunya upaya penelusuran tumbuhan di Sulawesi Selatan untuk menggali warisan budaya khususnya dalam upaya pengembangan obat tradisional, melestarikan dan mencegah dari kepunahan, salah satunya dengan meneliti tumbuhan kayu jawa. Kayu jawa (*Lannea coromandelica*) atau dalam masyarakat bugis dikenal dengan sebutan aju jawa adalah salah satu tanaman obat tradisional yang masih sering digunakan oleh masyarakat bugis sampai sekarang ini karena khasiatnya yang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati luka dalam maupun luka luar (Wirastuty, 2016:3)

Berdasarkan studi fitokimia, kulit batang tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) telah dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, glikosida jantung, terpenoid, tanin, dan flavonoid dan senyawa polifenol lain yang diketahui memiliki aktivitas inflamasi dengan menggunakan metode stabilisasi membran sel darah merah. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka potensi dalam menstabilkan membran sel darah merah yang diinduksi larutan hipotonik akan semakin meningkat. (Saputra, 2015:5)

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa kandungan kimia dari tanaman yang berperan penting adalah flavanoid yang dapat meningkatkan trombosit dalam kasus demam berdarah. Dan diketahui bahwa tanaman kayu jawa (*Lannea coromandelica*) memiliki kandungan flavanoid sehingga kemungkinan besar dapat digunakan sebagai peningkat trombosit darah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh ekstrak kulit batang kayu jawa terhadap peningkatan kadar trombosit tikus (*Rattus norvegicus*).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah terjadi peningkatan trombosit pada tikus (*Rattus norvegicus*) setelah pemberian ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*)?
2. Konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) terhadap peningkatan kadar trombosit tikus (*Rattus norvegicus*)?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Demam berdarah**

Demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) adalah jenis penyakit demam akut yang disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus lagi dengan genus Flavivirus dikenal dengan nama Virus dengue . Penyakit ini ditemukan manusia oleh nyamuk *Aedes aegypti*.

b. Ekstrak Metanol

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang didapatkan dengan cara maserasi, dibuat dengan menyari simplisia menggunakan penyari metanol, diluar pengaruh cahaya matahari langsung.

c. Kadar Trombosit

*Trombosit* atau keping sel darah merupakan salah satu komponen darah yang mempunyai fungsi utama dalam pembekuan darah. Trombosit akan bekerja dengan menutupi pembuluh darah yang rusak dan membentuk benang-benang *fibrin* seperti jaring-jaring yang akan menutup kerusakan tersebut. Penurunan sampai di bawah 100.000/ $\mu$ l berpotensi terjadi perdarahan dan hambatan pembekuan darah. Jumlah normal trombosit pada tikus adalah 150.000-460.000/ $\text{mm}^3$ . Trombosit berdiameter 1-4 mikrometer dan memiliki siklus hidup kira-kira 10 hari. Sepertiga dari jumlah total berada didalam limfa sebagai cadangan, dan sisanya berada didalam sirkulasi.

d. *Lannea coromandelica*

*Lannea coromandelica* merupakan deciduous tree atau pohon gugur yang dapat tumbuh hingga mencapai 25 m (umumnya 10-15 m). Memiliki permukaan batang berwarna abu-abu sampai coklat tua, kasar, ada pengelupasan serpihan kecil yang tidak teratur, batang dalam berserat berwarna merah atau merah muda gelap, dan memiliki eksudat yang bergetah. Daun meruncing, dan berjumlah 7-11. Bunga berkelamin tunggal berwarna hijau kekuningan. Buah berbiji, panjang 12 mm, bulat telur, kemerahan, dan agak keras.

e. Trombositopenia

Trombositopenia atau defisiensi trombosit, merupakan keadaan dimana trombosit dalam system sirkulasi jumlahnya dibawah normal. Trombositopenia biasanya dijumpai pada penderita anemia, leukemia, infeksi virus dan protozoa yang diperantarai oleh sistemn imun.

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian adalah untuk menentukan aktivitas ekstrak kulit batang kayu jawa dalam meningkatkan kadar trombosit tikus dengan menggunakan metode Rees Ecker.

### D. Kajian Pustaka

Kosasih Herman (2015). *The Epidemiology, Virology and Clinical Findings of Dengue Virus Infections in a Cohort of Indonesian Adults in Western Java*. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa dengue telah muncul sebagai salah satu penyakit menular yang paling penting dalam lima dekade terakhir. Bukti menunjukkan perluasan daerah endemik virus dengue dan akibatnya peningkatan secara eksponensial dari infeksi virus dengue di seluruh subtropis. Hasil dari studi kohort prospektif dari 4380 orang dewasa di Jawa Barat, Indonesia, 2000-2004 dan 2006-2009. Sebanyak 2167 episode demam didokumentasikan dan infeksi virus dengue dikonfirmasi oleh RT-PCR atau serologi di 268 kasus (12,4%). proporsi berkisar 7,6-41,8% setiap tahun. Tingkat kejadian secara keseluruhan dari infeksi virus dengue gejala adalah 17,3 kasus / 1.000 orang-tahun dan antara September 2006 dan April 2008 infeksi asimtomatik adalah 2,6 kali lebih sering dari infeksi simtomatik.

Saputra (2015), uji aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol 96% kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dengan metode stabilisasi sel darah merah secara in vitro. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa berdasarkan studi fitokimia, kulit batang tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) telah dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, glikosida jantung, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Hasil uji aktivitas antiinflamasi menggunakan metode stabilisasi membran sel darah manusia berdasarkan perhitungan persen stabilitas menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) pada konsentrasi 800 ppm mempunyai

aktivitas tertinggi yaitu sebesar 90,476%. Dengan demikian konsentrasi tersebut dapat dikatakan sebagai konsentrasi paling tinggi/efektif dalam memberikan perlindungan membran sel darah merah yang diinduksi oleh larutan hipotonik. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka potensi dalam menstabilkan membran sel darah merah yang induksi larutan hipotonik akan semakin meningkat, sehingga aktivitas menstabilkan membran sel darah merah dapat dikaitkan dengan konsentrasi.

Prawirdiharjo erwin (2014), uji aktivitas antioksidan dan uji toksisitas akut ekstrak etanol 70% dan ekstrak air kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*). Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa hasil uji aktivitas oksidan yang dilakukan menunjukkan nilai AAI (Antioxidant activity index) ekstrak etanol 70%, ekstrak air, dan vitamin C berturut-turut 5,5679 (sangat kuat); 0,0067 (lemah); dan 9,6254 (sangat kuat). Pengujian toksisitas juga dilakukan terhadap ekstrak etanol 70% dan ekstrak air menggunakan metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*). Hasil uji toksisitas yang diitung menggunakan metode probit menunjukkan ekstrak air tidak memiliki aktivitas toksik dengan nilai LC50 3,171 ppm, sedangkan ekstrak etanol 70% menunjukkan aktivitas dengan nilai LC50 23,774 ppm. Berdasarkan penelitian ini, ekstrak etanol 70% kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) diduga memiliki potensi antikanker.

Yunidasari (2016), studi pustaka kemampuan metabolit sekunder flavonoid dari batang jarak china (*Jatropha multifida* L.) dalam meningkatkan kadar trombosit penderita DHF. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa nilai hematokrit akan meningkat (hemo-konsentrasi) karena peningkatan kadar sel darah atau penurunan volume plasma darah, misalnya pada kasus DBD. Batang tanaman jarak china adalah tumbuhan yang dapat mengobati demam berdarah dengue. Kandungan batang jarak china yang paling berperan penting sebagai

antioksidan adalah flavonoid yang dapat meningkatkan kadar trombosit. Batang tanaman *Jatropha multifida* L. diisolasi dengan maserasi menggunakan etanol (96%), filtrat diuapkan menggunakan rotary evaporator. Pengukuran jumlah trombosit dengan menggunakan mikroskop pada *Mus musculus* jantan *Swiss Webster* dilakukan setelah 24 jam pemberian perlakuan. Pemberian senyawa flavonoid yang terkandung dalam batang tanaman *Jatropha multifida* L. dengan dosis sebesar 0,056 mg/kgBB pada *Mus musculus* jantan *Swiss Webster* dapat meningkatkan kadar trombosit sebesar 813.000/mm<sup>3</sup> sehingga dapat digunakan sebagai terapi demam berdarah dengue.

Marzuki (2012). Pengaruh pemberian sari buah kurma terhadap perubahan jumlah trombosit pada tikus (*Rattus norvegicus*). Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui jumlah trombosit dengan menggunakan hewan coba tikus yang dibagi dalam beberapa kelompok perlakuan berupa kontrol negatif, kontrol positif dan variasi konsentrasi sari buah kurma. Dilakukan penginduksian heparin terhadap hewan coba sebelum pemberian perlakuan untuk menurunkan kadar trombosit. Rata-rata kenaikan trombosit pada kelompok pertama sebagai kontrol negatif 37,7 0  $\mu$ L/100 g, kelompok kedua diberi sari buah kurma (2,5 g/100 g BB tikus) 235,7 0  $\mu$ L/100 g, kelompok ketiga diberi sari buah kurma (5 g/100 g BB tikus) 343,3 0  $\mu$ L/100 g, kelompok keempat diberi sari buah kurma (10 g/100 g BB tikus) 225,0 0  $\mu$ L/100 g dan kelompok kelima sebagai kontrol positif heparin 319,0  $\mu$ L/100 g. Berdasarkan hasil analisa statistik dengan metode rancangan acak lengkap memperlihatkan bahwa pemberian sari buah kurma secara nyata dapat meningkatkan jumlah trombosit pada tikus (*Rattus norvegicus*).

**E. Tujuan Penelitian**

a. Mengetahui terjadinya peningkatan trombosit pada tikus (*Rattus norvegicus*) setelah pemberian ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*).

b. Mengetahui konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) yang paling efektif terhadap peningkatan kadar trombosit tikus (*Rattus norvegicus*)

**F. Manfaat penelitian**

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) sebagai peningkat kadar trombosit dalam darah pada penderita demam berdarah

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pengobatan penyakit demam berdarah khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. *Tumbuhan Kayu Jawa (Lannea coromandelica)*

#### 1. Klasifikasi Tumbuhan

Klasifikasi tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) adalah sebagai berikut: (Tjitrosoepomo, 2010:10)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Class	: Dicotyledoneae
SubClass	: Rosidae
Order	: Sapindales
Family	: Anacardiaceae
Genus	: <i>Lannea</i>
Species	: <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.)

#### 2. Nama Lokal

Tammate (Sulawesi), kayu Cina, kayu Jawa, kedongdong laki (tangerang), Pohon Reo (flores).

#### 3. Nama Luar

Bangladesh : Jiga, jigar, kasmala, ghadi, kocha; India: Mohin, Kiamil, jhingan; Nepal: Halonre, thulo dabdabe; Myanmar: Baing; Pakistan: Jailbhadi, jhingan, wodier; Indonesia: kayu Jawa, kayu cina (Mozer, 2015:3)

#### 4. Uraian Tanaman

Kayu Jawa merupakan *deciduous* tree atau pohon gugur yang dapat tumbuh hingga mencapai 25 m (umumnya 10-15 m). Permukaan batang berwarna abu-abu sampai coklat tua, kasar, ada pengelupasan serpihan kecil yang

tidak teratur, batang dalam berserat berwarna merah atau merah muda gelap, dan memiliki eksudat yang bergetah. Daun imparipinnate (menyirip), meruncing, dan berjumlah 7-11. Bunga berkelamin tunggal berwarna hijau kekuningan. Buah berbiji, panjang 12 mm, bulat telur, kemerahan, dan agak keras. Tanaman ini berbunga dan berbuah dari bulan Januari hingga Mei. *Lannea coromandelica* memiliki sinonim *Odina wodier* yang tersebar di Himalaya (Swat-Bhutan), Assam, Burma, Indo-China, Ceylon, Pulau Andaman, China, dan Malaysia. (Kumar,R.A, 2004:2)

Tanaman Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) merupakan tanaman pekarangan yang dapat dimanfaatkan daun dan kulit batangnya dengan cara ditumbuk ataupun direbus untuk mengobati luka luar, luka dalam, demam dan perawatan paska persalinan . Kulit batang dapat digunakan sebagai astringen, mengobati sakit perut, lepra, ulcer, penyakit jantung, demam berdarah, disentri, dan sariawan. Kulit batang digunakan bersama dengan kulit batang *Aegle mermelos*, *Artocarpusheterophyllus* dan *Sygygiumcumini* berguna dalam penyembuhan impotensi. Kulit batang dapat dikunyah selama 2-3 hari untuk menyembuhkan glossitis. Perebusan daun juga dianjurkan untuk pembengkakan dan nyeri lokal (Wahid,2009:12).

##### 5. Kandungan Kimia

Kulit batang tanaman kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dilaporkan mengandung metabolit sekunder: Alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, flavonoid, dan glikosida jantung (Wahid,2009:20).

## B. Tikus (*rattus norvegicus*)

### 1. Klasifikasi Tikus (Akba,2010:7)

Kingdom	Animalia
Phylum	Chordata
Kelas	Mamalia
Ordo	Rodentia
Subordo	Sciurognathi
Famili	Muridae
Subfamili	Murinae
Genus	<i>Rattus</i>
Spesies	<i>Rattus norvegicus</i>

### 2. Karakteristik Tikus (*Rattus norvegicus*)

Tikus yang digunakan secara luas untuk penelitian di laboratorium adalah tikus putih yang berasal dari Asia Tengah. Terdapat beberapa galur yang memiliki kekhususan tertentu antara lain galur *sprague-dawley* yang berwarna albino putih berkepala kecil dan ekornya lebih panjang daripada badannya dan galur wistar yang ditandai dengan kepala besar dan ekor lebih pendek.

Tikus terutama yang muda memiliki jaringan lemak berwarna coklat di bagian leher sampai scapula yang jumlahnya berkurang setelah 14 dewasa. Tikus dapat di kandang bersama dalam satu kelompok besar yang terdiri dari jantan dan betina dari berbagai tingkat tanpa terjadinya perkelahian. Tikus dapat hidup lebih

dari tiga tahun dan produktif untuk berkembangbiak selama lebih dari sembilan bulan atau sampai usia satu tahun.

Tabel 1. Data Biologik Tikus (*Rattus norvegicus*)

- Konsumsi pakan per hari	5 g/100 g bb
- Konsumsi air minum per hari	8-11 ml/100 g bb
- Diet protein	12%
- Ekskresi urine per hari	5,5 ml/100 g bb
- lama hidup	2,5- 3 tahun
- Bobot badan dewasa	
Jantan	300-400 g
Betina	250-300 g
- Bobot lahir	5-6 g
- Dewasa kelamin (jantan=betina)	50+10 hari
- Siklus estrus (menstruasi)	5 hari (polyestrus)
- Umur sapih	21 hari, 40-50 g
- Mulai makan pakan kering	12 hari
- Rasio kawin	1 jantan – 3 atau 4 betina
- Jumlah kromosom	42
- Suhu rektal	37,5°C
- Laju respirasi	85 x/mn
- Denyut jantung	300 – 500 x/mn
- Pengambilan darah maksimum	5,5 ml/Kg
- Jumlah sel darah merah (Erythrocyt)	7,2-9,6 X 10 <sup>6</sup> / µl
- Kadar hemoglobin (Hb)	15,6 g/dl
- Pack Cell Volume (PCV)	46%
- Jumlah sel darah putih (Leucocyte)	14 10 <sup>3</sup> /µl

### C. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Sarker SD,2006:6).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, di antaranya (Sarker SD,2006:6).

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Jenis-jenis ekstraksi:

1. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian senyawa dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Dirjen POM,2000:10).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani,2014:2).

Selama proses maserasi atau perendaman dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih

cepat didalam cairan. Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengestraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight,1994:577).

## 2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (*Exhaustiva extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat seperti berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Dirjen POM,2000:11).

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani,2014:3).

## 3. Sokletasi

Soxkletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxklet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut

sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun,2014:4).

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.

#### 4. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani,2014:3).

#### 5. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Dirjen POM,2000:11).

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik

didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani,2014:3).

#### 6. Infusa

Infudasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infudasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Atun,2014:3-4).

#### 7. Dekoksi

Dekosi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infudasi, hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama ( $\geq 30$  menit) dan suhu pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang diinginkan (Atun,2014:4)

#### 8. *Ultrasound - Assisted Solvent Extraction*

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani,2014:2).

Getaran ultrasound ( $>20.000$  Hz) memberikan efek pada ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan (*cavitation*) sebagai stres dinamis serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi (Dirjen POM,2000:12).

#### **D. Sediaan yang dapat meningkatkan kadar trombosit**

##### **1. Angkak**

Angkak merupakan beras yang telah difermentasikan menggunakan *Monascus purpureus*, sejenis kapang yang tidak banyak ditemukan di alam namun dapat ditemukan dalam produk makanan misalnya beras. Proses fermentasi merubah warna beras, dari putih menjadi merah, oleh karena itu angkak disebut juga *red fermented rice* (Triana,2006:317).

Salah satu senyawa yang berhasil diisolasi dari *Monascus* adalah Monascidin, yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Dari penelitian selanjutnya ditemukan bahwa monacidin A adalah sitrinin, suatu mikotoksin yang bersifat nefrotoksik dan hepatotoksik, yang menyebabkan kerusakan fungsi dan struktur ginjal dan perubahan metabolisme. Kandungan kimia lainnya dalam angkak adalah sterol, isoflavin, asam lemak tak jenuh rantai tunggal (mono unsaturated fatty acid), serat, logam mineral seperti Mg, dan vitamin B kompleks (Erdogrul,2004:38).

##### **2. Jambu Biji**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak tanaman yang dapat dijadikan obat tradisional, salah satunya jambu biji. Daun jambu biji sudah lama digunakan untuk mengobati seseorang yang terkena demam berdarah dengue. Jambu biji sudah banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Secara empiris daun jambu biji bersifat antibiotik dan telah dimanfaatkan untuk antidiare. Jambu biji ternyata mengandung berbagai macam komponen yang berkhasiat

mengatasi demam berdarah. Kelompok senyawa tannin dan flavonoid yang dinyatakan sebagai quersetin dalam ekstrak jambu biji dapat menghambat aktivitas enzim reverse transcriptase sehingga dapat menghambat pertumbuhan virus dengue. (Rabbani, 2015:94).

Daun jambu biji mengandung flavonoid, tannin, fenolat dan minyak atsiri. Efek farmakologis dari jambu biji ini yaitu antiinflamasi, antidiare, analgesik, anti bakteri, antidiabetes, anti hipertensi dan penambah trombosit. (Rabbani, 2015:94)

### **E. Komponen-komponen Darah**

Darah merupakan medium transport tubuh, volume darah manusia sekitar 7% - 10 % berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada tiap-tiap orang tidak sama, bergantung pada usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darah. Darah terbagi atas 2 komponen, yaitu sebagai berikut.

1. Plasma darah, bagian cair darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah.
2. Butir-butir darah yang terdiri atas komponen-komponen, yakni eritrosit, leukosit dan trombosit (Haribowo,2008:85).

#### **Sel Darah Merah (Eritrosit)**

Sel darah merah merupakan cairan bikonkaf dengan diameter sekitar 7 mikron. Bikonkavitas memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membrane dan inti sel. Warnanya kuning kemerah-merahan, karena didalamnya mengandung suatu zat yang disebut hemoglobin.

Sel darah merah tidak memiliki inti sel, mitokondria dan ribosom, serta tidak dapat bergerak. Sel ini tidak dapat melakukan mitosis, fosforilasi oksidatif sel atau pembentukan protein (Haribowo,2008:86).

Komponen eritrosit adalah sebagai berikut.

1. Membrane eritrosit
2. System enzim : enzim G6PD
3. Hemoglobin,

### **Sel Darah Putih (Leukosit)**

Sel darah putih dibentuk di sumsum tulang dari sel-sel bakal. Jenis-jenis dari golongan sel ini adalah golongan yang tidak bergranula, yaitu limfosit T dan B; monosit dan makrofag serta golongan yang bergranula yaitu eosinophil, basophil, dan neutrofil (Haribowo,2008:87).

Fungsi sel darah putih adalah sebagai berikut.

1. Sebagai serdadu tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit/bakteri yang masuk kedalam tubuh jaringan RES (system retikulo endotel)
2. Sebagai pengangkut, yaitu mengangkut/membawa zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke pembuluh darah.

### **Keping Darah (Trombosit)**

Trombosit adalah bagian dari beberapa sel-sel besar dalam sumsum tulang yang berbentuk cakram bulat, oval, bikonveks, tidak berinti, dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit antara 150.000- 400.000/mL, sekitar 30-40% terkonsentrasi didalam limpa dan sisanya bersirkulasi didalam darah. Trombosit berperan penting dalam pembentukan bekuan darah. Trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh, trombosit tertarik ke daerah tersebut sebagai respon terhadap kolagen yang terpajan di lapisan subendotel pembuluh. Trombosit melekat ke permukaan yang rusak dan mengeluarkan beberapa zat (serotonin dan histamin) yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah (Haribowo,2008:87).

## F. Demam Berdarah Dengue

### 1. Pengertian

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang ditandai dengan demam mendadak dua sampai tujuh hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan (*Petechia*), ruam (*Purpura*). Kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun. Hal yang dianggap serius pada demam berdarah dengue adalah jika muncul perdarahan dan tanda-tanda syok/ renjatan (Mubin,2008:328)

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama asia tenggara, Amerika tengah, Amerika dan Karibia. *Host* alami DBD adalah manusia, *agensinya* adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus, terdiri dari 4 serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den3 dan Den-4, ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk *Aedes aegypti* dan *Ae. Albopictus* (Candra,2010:110).

### 2. Etiologi

Penyebab penyakit DBD adalah virus dengue yang terdapat dalam tubuh nyamuk *Aedes aegypti* (betina). Virus ini termasuk famili *Flaviviridae* yang berukuran kecil sekali yaitu 35-45 mm. Virus ini dapat tetap hidup (*survive*) di alam ini melalui 2 mekanisme. Mekanisme pertama, transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk, dimana virus yang ditularkan oleh nyamuk betina pada telurnya yang nantinya akan menjadi nyamuk. Virus juga dapat ditularkan dari nyamuk jantan pada nyamuk betina melalui kontak seksual. Mekanisme kedua, transmisi virus dari nyamuk ke dalam tubuh manusia dan sebaliknya. Nyamuk mendapatkan virus ini pada saat melakukan gigitan pada manusia yang pada saat itu sedang

mengandung virus dengue pada darahnya (*viremia*). Virus yang sampai ke lambung nyamuk akan mengalami replikasi (memecah diri/berkembang biak), kemudian akan migrasi yang akhirnya akan sampai di keejar ludah. Virus yang berada di lokasi ini setiap saat siap untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk (Darmowandowo,2006:28)

Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan mengakibatkan spectrum manifestasi klinis yang bervariasi antara yang paling ringan, demam dengue (DD), DBD dan demam dengue yang disertai renjatan atau dengue *shock syndrome* (DSS), ditularkan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Ae.albopictus* yang terinfeksi. Penularan virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk yang termasuk subgenus Stegomyia yaitu nyamuk *Aedes aegypti* dan *Ae. albopictus* sebagai vektor primer dan *Ae. polynesiensis*, *Ae.scutellaris* serta *Ae (Finlaya) niveus* sebagai vektor sekunder, selain itu juga terjadi penularan transexual dari nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui perkawinan serta penularan transovarial dari induk nyamuk ke keturunannya (Candra,2010:112).

Terdapat tiga faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus dan vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui nyamuk *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis* dan beberapa spesies yang lain dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan vektor yang kurang berperan. *Aedes* tersebut mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8 – 10 hari (*extrinsic incubation period*) sebelum dapat ditularkan kembali pada manusia pada saat gigitan berikutnya. Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut akan dapat menularkan virus selama hidupnya (infektif). Ditubuh manusia, virus memerlukan waktu masa tunas 4 – 6 hari

(*intrinsic incubation period*) sebelum menimbulkan penyakit. Penularan dari manusia kepada nyamuk dapat terjadi bila nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul (Hadinegoro,2001:10)

### 3. Patogenesis

Bionomik vektor adalah tata cara atau perilaku vektor. perilaku penyakit DBD adalah nyamuk aedes aegypti. Nyamuk ini memiliki kemampuan jarak terbang sejauh 40-100 meter dan tidak dapat hidup diatas ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut dan kurang dapat berkembang biak dengan baik didaerah bersuhu rendah . Pada dasarnya dalam kehidupan nyamuk terdapat 3 macam tempat yang dibutuhkannya, yaitu tempat untuk beristirahat (*resting places*), tempat untuk mendapatkan makanan (*feeding places*), dan tempat untuk berkembang biak (*breeding places*). Tempat berkembang biak nyamuk aedes berupa genangan air yang tidak langsung berhubungan dengan tanah, jernih dan gelap baik yang berada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dalam kehidupan di air, perkembangan nyamuk aedes dari telur sampai mencapai nyamuk dewasa membutuhkan waktu 7-14 hari, yaitu 2-3 hari untuk perkembangan dari telur menjadi jentik, 4-9 hari dari jentik menjadi pupa, 1-2 hari dari pupa menjadi nyamuk dewasa. Berdasarkan kesenangan untuk mendapatkan darah, nyamuk aedes biasanya menggigit manusia pada pukul 09.00-10.00 pagi dan antara pukul 16.00-17.00 petang (Hidayah,2009:20).

Virus dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk dan infeksi pertama mungkin memberi gejala sebagai demam dengue. Reaksi yang amat berbeda akan tampak bila seseorang mendapat infeksi yang berulang dengan tipe virus dengue yang berlainan (Hadinegoro,2001:11)

Hipotesis infeksi sekunder (*the secamdary heterologous infection/ the sequential infection hypothesis*) menyatakan bahwa demam berdarah dengue

dapat terjadi bila seseorang setelah terinfeksi dengue pertama kali mendapat infeksi berulang dengue lainnya. Re – infeksi ini akan menyebabkan suatu reaksi amnestif antibodi yang akan terjadi dalam beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit dengan menghasilkan titik tinggi antibodi Ig G antidengue. Disamping itu replikasi virus dengue terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi dengan akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya virus kompleks antigen – antibody (virus *antibody complex*) yang selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem komplemen pelepasan C3a dan C5a akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya plasing dari ruang intravascular ke ruang ekstrasvascular (Hendarwanto,2009:2773)

#### 4. Manifestasi klinik

Gambaran klinis yang timbul bervariasi berdasarkan derajat DBD dengan masa inkubasi antara 3-15 hari. Penderita biasanya mengalami demam akut atau suhu meningkat tiba-tiba, sering disertai menggigil, saat demam pasien *compos mentis* (Mubin,2008:328)

Gejala klinis lain yang sangat menonjol adalah terjadinya perdarahan pada saat demam dan tak jarang pula dijumpai pada saat penderita mulai bebas dari demam. Perdarahan yang terjadi dapat berupa :

- a. Perdarahan pada kulit atau *petechie, echimosis, hematoma*.
- b. Perdarahan lain seperti *epistaksis, hematemesis, hematuri* dan *melena*.
- c. Keluhan pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, sakit pada waktu menelan.
- d. Keluhan pada saluran pencernaan : mual, muntah, *anoreksia*, diare, konstipasi.
- e. Keluhan sistem tubuh yang lain: nyeri atau sakit kepala, nyeri pada otot tulang dan sendi, nyeri otot abdomen, nyeri uluhati, pegal-pegal pada seluruh tubuh, kemerahan pada kulit, muka, pembengkakan sekitar mata, lakrimasi dan

*fotofobia*, otot-otot sekitar mata sakit bila disentuh dan pergerakan bola mata terasa pegal (Mubin,2008:329).

Pada hari pertama sakit, penderita panas mendadak secara terus-menerus dan badan terasa lemah atau lesu. Pada hari kedua atau ketiga akan timbul bintik-bintik perdarahan, lembam atau ruam pada kulit di muka, dada, lengan atau kaki dan nyeri ulu hati serta kadang-kadang mimisan, berak darah atau muntah. Antara hari ketiga sampai ketujuh, panas turun secara tiba-tiba. Kemungkinan yang selanjutnya adalah penderita sembuh atau keadaan memburuk yang ditandai dengan gelisah, ujung tangan dan kaki dingin dan banyak mengeluarkan keringat. Bila keadaan berlanjut, akan terjadi renjatan (lemah lunglai, denyut nadi lemah atau tidak teraba) kadang kesadarannya menurun (Mubin,2008:329).

Untuk mengenali penyakit demam berdarah dengue berikut merupakan tanda dan gejala demam berdarah dengue yaitu demam penyakit ini didahului oleh demam tinggi yang mendadak, terus menerus berlangsung sampai hari. Panas dapat turun pada hari ke- 3 yang kemudian naik lagi, dan padahari ke- 6atau ke-7 panas mendadak turun. Derajat demam berdarah dengue dikelompokkan dalam empat derajat (pada setiap derajat ditemukan trombositopenia dan hemokonsentrasi), yaitu:

a. Derajat I

Demam yang disertai dengan gejala klinis tidak khas, satu-satunya gejala pendarahan adalah hasil uji Tourniquet positif.

b. Derajat II

Gejala yang timbul pada demam berdarah dengue derajat I, ditambah pendarahan spontan, biasanya dalam bentuk pendarahan di bawah kulit dan atau bentuk pendarahan lainnya.

c. Derajat III

Kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan denyut nadi yang cepat dan lemah, menyempitnya tekanan nadi ( $\leq 20$  mmHg) atau hipertensi yang ditandai dengan kulit dingin dan lembab serta pasien menjadi gelisah.

d. Derajat IV

Syok berat dengan tidak terabanya denyut nadi maupun tekanan darah.

1) Tanda-tanda perdarahan

Perdarahan ini terjadi disemua organ. Bentuk perdarahan dapat hanya berupa uji Tourniquet (*Rumple leede*) positif atau dalam bentuk satu atau lebih manifestasi perdarahan sebagai berikut: Petekie, Purpura, Ekimosis, Perdarahan konjungtiva, Epistaksis, Pendarahangusi, Hematemesis, Melenadan Hematuri.

Uji Tourniquet positif sebagai tanda perdarahan ringan, dapat dinilai sebagai *presumptiftest* (dugaan keras) oleh karena uji Tourniquet positif pada hari pertama demam terdapat pada sebagian besar penderita demam berdarah dengue. Namun uji Tourniquet positif dapat juga dijumpai pada penyakit virus lain (campak, demam chikungunya), infeksi bakteri (*Thypus adominalis*) dan lain-lain.

Petekie merupakan tanda pendarahan yang sering ditemukan. Tanda ini dapat muncul pada hari pertama demam. Epistaksis dan perdarahan gusi lebih jarang ditemukan, sedangkan perdarahan gastrointestinal biasanya menyertai renjatan. Terkadang dijumpai pula perdarahan konjungtiva serta hematuri.

2) Pembesaran hati (*hepatomegali*)

Sifat pembesaran hati pada umumnya dapat ditemukan pada permulaan penyakit. Pembesaran hati tidak sejajar atau tidak dapat diartikan dengan beratnya penyakit, serta nyeri tekan sering ditemukan tanpa disertai ikterus.

3) Renjatan (syok)

Adapun tanda renjatan yaitu: (1) Kulit terasa dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jaritangan, kaki; (2) Penderita menjadi gelisah; (3) Sianosisdi

sekitar mulut; (4) Nadi cepat, lemah, kecil sampai takteraba; (5) Tekanan nadi menurun, sistolik menurun sampai 80 mmHg atau kurang Sebab renjatan karena perdarahan, atau kebocoran plasma ke daerah ekstra vaskuler melalui kapiler yang terganggu.

#### 4) Trombositopenia

Jumlah trombosit  $\leq 100.000$  / $\mu$ l biasanya ditemukan diantara hari ke 3 sampai 7, pemeriksaan trombosit perlu diulang sampai terbukti bahwa jumlah trombosit dalam batas normal menurun. Pemeriksaan dilakukan pada saat pasien diduga menderita demam berdarah dengue, bila normal maka diulang tiga hari sampai suhu turun.

#### 5) Hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit)

Meningkatnya nilai hematokrit (Ht)  $\geq 20\%$  menggambarkan hemokonsentrasi selalu dijumpai pada demam berdarah dengue, merupakan indikator yang peka terjadinya perembesan plasma, sehingga dilakukan pemeriksaan hematokrit secara berkala. Pada umumnya penurunan trombosit mendahului peningkatan hematokrit (Departemen Kesehatan Republik Indonesia,2010:10-17)

Demam berdarah dengue ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang menjadi vektor utama serta *Aedes albopictus* yang menjadi vektor pendamping. Kedua spesies nyamuk itu ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, hidup optimal pada ketinggian di atas 1000 di atas permukaan laut,10 tapi dari beberapa laporan dapat ditemukan pada daerah dengan ketinggian sampai dengan 1.500 meter,44 bahkan di India dilaporkan dapat ditemukan pada ketinggian 2.121 meter serta di Kolombia pada ketinggian 2.200 meter.Nyamuk *Aedes* berasal dari Brazil dan Ethiopia, stadium dewasa berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lainnya (Lestari K,2007:14).

Kedua spesies nyamuk tersebut termasuk ke dalam Genus *Aedes* dari Famili Culicidae. Secara morfologis keduanya sangat mirip, namun dapat dibedakan dari strip putih yang terdapat pada bagian skutumnya. Skutum *Aedes aegypti* berwarna hitam dengan dua strip putih sejajar di bagian dorsal tengah yang diapit oleh dua garis lengkung berwarna putih. Sedangkan skutum *Aedes albopictus* yang juga berwarna hitam hanya berisi satu garis putih tebal di bagian dorsalnya (Candra,2010:117).

### **G. Terapi Demam Berdarah Dengue**

Infeksi virus dengue dapat mengenai semua kelompok umur, infeksi dengue dapat bervariasi dari asimtomatik sampai berat dan menjadi sindrom syok dengue. Sejak 50 tahun terakhir, prevalens dengue meningkat 30 kali lipat, menginfeksi sekitar 100 juta orang di seluruh dunia setiap tahun dan endemis di beberapa kawasan Asia, Amerika, Pasifik Barat, Mediterania Timur dan Afrika. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa DBD merupakan salah satu penyebab utama perawatan anak di rumah sakit di Asia, dengan 250.000-500.000 kasus setiap tahunnya dan tingkat mortalitas 1 – 5% pada pasien dengan syok (Sri Rezeki Hadinegoro,2012:40).

Menurut data World Health Assembly, dewasa ini terdapat 17 jenis penyakit tropis terabaikan yang telah disepakati bersama World Health Organization (WHO) dimana fokus tertuju pada DBD sebagai penyebab ancaman skala besar diseluruh dunia. Sekitar 90% infeksi terjadi pada golongan anak dibawah 15 tahun (I Wayan Adi Pranata,2017:22)

Tata laksana Demam Berdarah Dengue tanpa syok anak dirawat di rumah sakit :

1. Berikan anak banyak minum larutan oralit atau jus buah, air tajin, air sirup, susu, untuk mengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah/diare.
2. Berikan parasetamol bila demam. Jangan berikan asetosal atau ibuprofen karena obat-obatan ini dapat merangsang terjadinya perdarahan.
3. Berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang:
  - a. Berikan hanya larutan isotonik seperti Ringer laktat/asetat
  - b. Kebutuhan cairan parenteral
    - 1) Berat badan  $< 15$  kg : 7 ml/kgBB/jam
    - 2) Berat badan 15-40 kg : 5 ml/kgBB/jam
    - 3) Berat badan  $> 40$  kg : 3 ml/kgBB/jam
  - c. Pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium (hematokrit, trombosit, leukosit dan hemoglobin) tiap 6 jam
  - d. Apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan stabil. Cairan intravena biasanya hanya memerlukan waktu 24–48 jam sejak kebocoran pembuluh kapiler spontan setelah pemberian cairan.
4. Apabila terjadi perburukan klinis berikan tatalaksana sesuai dengan tata laksana syok terkompensasi (*compensated shock*).

Tatalaksana Demam Berdarah Dengue dengan Syok :

1. Perlakukan hal ini sebagai gawat darurat. Berikan oksigen 2-4 L/menit secara nasal.
2. Berikan 20 ml/kg larutan kristaloid seperti Ringer laktat/asetat secepatnya.
3. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml/kgBB secepatnya (maksimal 30 menit) atau pertimbangkan pemberian koloid 10-20ml/kgBB/jam maksimal 30 ml/kgBB/24 jam.
4. Jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun pertimbangkan terjadinya perdarahan tersembunyi; berikan transfusi darah/komponen.
5. Jika terdapat perbaikan klinis (pengisian kapiler dan perfusi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar), jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml/kgBB/jam dalam 2-4 jam dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis dan laboratorium.
6. Dalam banyak kasus, cairan intravena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Ingatlah banyak kematian terjadi karena pemberian cairan yang terlalu banyak daripada pemberian yang terlalu sedikit (World Health Organization, 2012:25-28)

#### **H. Tinjauan Islam Tentang Tanaman**

Di dalam al-Qur'an, telah dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk membuat manusia berpikir bahwa tak ada yang sia-sia atas penciptaannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah : 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ  
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Terjemahnya :

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Kementrian Agama RI, 2012: 203).

Allah SWT memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw, sebagai utusan Allah, memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barang siapa menyelidiki seluk-beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya di sekitarnya, akan mengenali kebijakan, Ilmu dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004; 15). Dalam Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah swt. tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk diantaranya adalah tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*). Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. Al-an'am/6: 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
مُخْرَجٌ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dia yang telah menurunkan air dari langit, lalu Kami mengeluarkan disebabkan olehnya segala macam tumbuhan-tumbuhan, lalu Kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan darinya butir yang

*saling bertumpuk; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman” (Kementrian Agama RI, 2012: 203).*

Dijelaskan pula dalam surah Al-Imran : 191 yang berbunyi

رَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Terjemahnya :

*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*

Serta pada surah Ash Shu'ara:7 menjelaskan tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang berguna dan berkhasiat bagi mahluk hidup, yang berbunyi :

وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧

Terjemahnya :

*Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik*

Ayat ini merupakan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuhan-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau.

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya berasal dari satu biji atau benih (Shihab,2002:13)

Selanjutnya Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir, yaitu bahwa: Dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman (Shihab,2002:14)

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuhan-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Adapun dalam ayat ini yang ditutup dengan *liqaumin yu'minun/* bagi kaum yang beriman, ia ditutup demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman. Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya

tidak disertai iman kepada Allah pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat. Atau, dapat juga penutup itu dipahami sebagai mengisyaratkan bahwa yang tidak mengetahui dengan dalam atau bahkan yang tidak mengetahui walau sepintas tentang bukti-bukti tersebut bukanlah orang yang beriman (Shihab,2002:20).

Dari penjelasan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia yang memiliki iman kepada Allah swt., hendaknya memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diciptakan-Nya karena tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia di muka bumi ini, diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Allah swt., menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di bumi dengan begitu banyak manfaatnya masing-masing, seperti tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) Allah swt., menciptakan tumbuhan dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan, karena di dalam itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya. Hal inilah mendorong manusia yang beriman dan berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, seperti tumbuhan Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*).

Sehingga, selain al-Qur'an sebagai penyembuh dan penawar terhadap penyakit dalam hal ini penyakit hati, manusia dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mencari, memahami dan mendapatkan obat dari penyakit selain penyakit hati yakni penyakit jasmani. Seiring perkembangan zaman, begitu banyak perkembangan ilmu pengobatan dan teknologi pengobatan yang kini dapat

memaksimalkan kesembuhan jasmani. Dari 'Abdu Rabbih bin Sa'iddari Abu AzZubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

*"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azzawajalla."* (Muslim, t.th: 1729).

Hadits tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia akan diturunkan obatnya oleh Allah swt. Setiap hari pakar spesialis menemukan obat bagi penyakit yang belum diketahui obatnya. Dapat diperhatikan bahwa ilmuwan terus berupaya menemukan obat bagi segala penyakit dengan satu keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Meskipun mereka belum mengetahuinya sekarang, mereka merasa harus mengetahuinya kelak. Masalah ini menjadi aksioma dalam hati mereka. Dari semua itu, akan ditemukan bahwa tidak ada kesalahan sedikitpun pada sabda Rasulullah saw. melainkan yang ada hanyalah kebenaran dengan sebenar-benarnya (Hawwa,2007:287).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah eksperimen laboratorium yang merupakan suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan, bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen tersebut. (Khaerani, 2010).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan design penelitian *true eksperimental* di laboratorium yang menguraikan atau menggambarkan suatu informasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

#### **D. Bahan dan Peralatan**

##### **1. Bahan Tumbuhan**

Kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) yang diambil dari Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

##### **2. Bahan Uji**

Bahan-bahan lain yang digunakan adalah madu angkak, metanol, air suling steril, alkohol 70%, anilin, larutan Rees Ecker, tikus jantan (*Rattus novergicus*)

### 3. Peralatan

Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, alat untuk ekstraksi seperti gelas erlenmeyer (PYREX<sup>®</sup>), toples kaca, vacuum rotary evaporator (IKA<sup>®</sup>RV 10), mikroskop (YAZUMI<sup>®</sup>), dan seperangkat alat hemositometer.

Alat yang digunakan pada penelitian antitemam berdarah antara lain labu erlenmeyer steril (PYREX<sup>®</sup>), kertas saring WHATTMAN<sup>®</sup> berukuran pori 0,22 µm, kaca preparat, pipet eritrosit, gelas ukur (PYREX<sup>®</sup>), gelas kimia (PYREX<sup>®</sup>), eksikator, cawan petri, kapas, dan spoit.

### E. Prosedur Kerja

#### 1. Penyiapan sampel

##### a. Pengambilan sampel

Sampel berupa kulit batang tanaman kayu jawa *Lannea coromandelica*. Pengambilan dilakukan dibagian batang utama dengan ukuran tertentu diambil tidak secara melingkar agar tidak merusak tumbuhan.

##### b. Pengolahan Sampel

Sampel kulit batang tumbuhan *Lannea coromandelica* dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa kontak langsung sinar matahari. Setelah bersih dan kering, dipotong kecil-kecil sampel kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca.

#### 2. Ekstraksi Sampel

Sebanyak 150 gram sampel Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) dimasukkan ke dalam toples, lalu dibasahi sampel dengan menggunakan pelarut metanol, ditambahkan pelarut metanol sebanyak 1,5 L ke dalam toples hingga seluruh sampel terendam dan ditutup toples dengan menggunakan aluminium foil kemudian ditutup rapat dengan penutup toples. Dibiarkan sampel terendam selama ± 24 jam menggunakan kain putih dan corong yang telah disumbat kapas.,

dilakukan proses remaserasi sampel yang telah disaring tadi sebanyak dua kali, kemudian ditampung hasil maserasi ditampung. Lalu dipisahkan ekstrak dengan penyari metanol dengan menggunakan alat rotary evaporator. Ekstrak hasil pemisahan dikeringkan diatas waterbath.

**a. *Penyiapan Hewan Coba***

Tikus jantan (*Rattus novergicus*) yang dipilih adalah jenis tikus putih Dilakukan pengadaptasian selama kurang lebih 2 minggu. Pada tahap ini dilakukan pengamatan umum dengan penimbangan berat setiap hari, tikus yang sakit dipisahkan dan hanya digunakan tikus yang masih sehat.

**b. *Pembuatan suspensi Na CMC 1 %***

Serbuk Na-CMC ditimbang sebanyak 1 gram kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit air suling panas dalam erlenmeyer, sambil di aduk lalu di cukupkan dengan air suling 100 ml.

**F. *Penyiapan Sampel Uji***

Dibuat Suspensi dalam 3 konsentrasi, konsentrasi 0,25% dengan menimbang 25 mg ekstrak kemudian disuspensikan dengan suspensi Na CMC 1 % sebanyak 10ml. Begitu pula untuk konsentrasi 0,5% dengan menimbang ekstrak 50 mg kemudian dilarutkan dengan 10 ml Na CMC 1%. Untuk konsentrasi 1 % dengan menimbang 100 mg ekstrak kemudian dilarutkan dengan 10 ml Na CMC 1%.

**G. *Pelaksanaan Percobaan***

**1. Pembagian Kelompok Tikus**

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus yang dibagi secara acak ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok menggunakan 5 ekor tikus. Skema percobaan sebagai berikut:

- a. P1 : tikus dibuat anemia dengan pemberian anilin.

- b. P2 : tikus dibuat anemia kemudian diberi larutan angkak (beras merah
- c. P3: tikus dibuat anemia kemudian diberi suspensi kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dosis 0,25 %.
- d. P4:, tikus dibuat anemia kemudian diberi suspensi kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dosis 0,5 %.
- e. P5: tikus dibuat anemia kemudian diberi suspensi kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dosis 1 %.

## 2. Pengambilan Darah Tikus

Darah diambil dari ekor tikus, tikus dimasukkan kedalam wadah isolasi dengan posisi ekor tikus melintang sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan dari tikus. Ekor tikus dibersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Selain dengan tujuan membersihkan, berfungsi juga untuk merangsang kelancaran aliran darah kemudian dibersihkan lagi dengan alkohol untuk memastikan bahwa daerah sekitar pemotongan bebas dari bakteri. Ekor tikus digunting sekitar 0,5 cm dari ujung. Darah diambil dengan pipet eritrosit sebanyak 0,5  $\mu$ l kemudian ditetaskan ke plat hemositometer yang telah dibersihkan untuk perhitungan jumlah trombosit, pengambilan darah dilakukan sebelum dan sesudah penyuntikan anilin 0,35 ml/kgBB. Pengambilan darah dilakukan 24 jam setelah pemberian anilin.

## 3. Penyuntikan anilin 0,35 ml/kgBB

Sebelumnya anilin yang dibuat adalah anilin 10 %. Sebanyak 1 ml anilin dilarutkan dengan 10 ml aquadest mendidih, lalu diaduk. Pembuatan anilin sesaat sebelum penyuntikan kepada tikus karena jika dalam waktu lama anilin menjadi tidak stabil dalam air.

Tikus dimasukkan kedalam kandang isolasi kemudian ekornya dibersihkan dengan air hangat agar pembuluh darah venanya terlihat. Setelah terlihat, pada

lokasi penyuntikan diberi alkohol 70 % untuk mencegah infeksi, lalu disuntikkan anilin.

## **H. Pelaksanaan Penelitian**

### **1. Penyiapan cat**

Larutan Rees Ecker dibuat dengan komposisi sebagai berikut, natrium sitrat 3,8 gram; formaldehid 40 % 2 ml; Brilliant Cresyl Blue 30 mg; air suling 100 ml. Harus disaring sebelum digunakan.

### **2. Pelaksanaan uji**

Darah diambil dengan pipet eritrosit sebanyak 50  $\mu$ l kemudian diencerkan dengan larutan Rees Ecker sekitar 10,1 ml (pengenceran 200x). Mulai saat ini trombosit harus selesai dihitung dalam waktu 30 menit, agar tidak terjadi desintegrasi sel-sel trombosit atau dengan kata lain membran sel pecah, mengeluarkan isinya termasuk hemoglobin. Pipet dikocok 3-5 menit kemudian kamar hitung dibersihkan, setelah pipet tersebut dikocok, dibuang 4 tetes pertama dan tetesan ke lima diisikan kedalam kamar hitung. Biarkan selama 15 menit, agar trombosit mengendap dan tidak terjadi penguapan. Kamar hitung diletakkan dibawah mikroskop, kondensor diturunkan atau diafragma dkecilkan dan posisi meja mikroskop dalam keadaan datar. Kamar hitung diletakkan dibawah lensa objektif. Perbesaran yang digunakan adalah 10x untuk melihat kamar hitung, kamar hitung yang digunakan untuk melihat sel trombosit adalah kamar hitung yang ditengah-tengah (25 bidang) dan untuk menghitung jumlah sel trombosit digunakan perbesaran 40x. Dihitung semua sel trombosit pada 25 bidang tersebut. Diperlukan pengamatan yang cukup teliti untuk menghitung jumlah trombosit karena trombosit biasanya tampak bergerombol. Hasil yang didapatkan dikalikan 2000, didapatkan jumlah sel trombosit per mL darah. Trombosit tampak refraktif

dan mengkilat berwarna biru muda/nila, lebih kecil dari eritrosit serta bentuk bulat, lonjong atau tersebar atau bergerombol.

### **I. Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan uji statistika yang sesuai, yang harus sudah ditulis dalam usulan penelitian. Uji hipotesis yang akan digunakan terhadap data yang mana harus pula sudah ditetapkan pada waktu perencanaan uji. Hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan uji hipotesis adalah skala pengukuran variable independen dan dependen, distribusi data (normal atau tidak normal), besar sampel, jumlah kelompok serta jumlah variable. Apabila variabel bebas berskala nominal lebih dari 2 kelompok sedangkan variabel efek berskala numeric, maka digunakan analisis varians (Anova) (Sastroasmoro, 2014).

Setelah kita mengetahui langkah-langkah pengolahan data, selanjutnya akan dibahas entry data menggunakan SPSS. SPSS merupakan paket program statistic yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Kemampuan yang dapat diperoleh dari SPSS meliputi pemrosesan segala bentuk file data, modifikasi data, membuat tabulasi berbentuk distribusi frekuensi, analisis statistic deskriptif, analisis lanjut yang sederhana maupun kompleks, dan sebagainya. (Hastono, 2006)

Bila jumlah kelompok lebih dari dua, maka uji hipotesis yang sesuai adalah Anova (analisis varians), dengan cara sekaligus membandingkan rerata antara semua kelompok. Bila Anova tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka pengujian selanjutnya tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila Anova memberikan hasil yang bermakna, maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya, dengan maksud untuk menentukan dimana letak perbedaan tersebut (Sastroasmoro, 2014).

Telah disebutkan bahwa uji hipotesis dimulai dengan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara dua variable (hipotesis nol). Dengan dasar asumsi tersebut, dan dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu, pada akhirnya akan diperoleh nilai  $p$  (Sastroasmoro, 2014).

Sebelum era computer, nilai  $p$  dilihat dari table pada tiap buku statistika, sehingga tidak akan diperoleh nilai absolutnya, melainkan dinyatakan sebagai  $p < 0,05$ ; atau  $p < 0,01$ , kini dengan computer nilai  $p$  yang tepat dapat diperoleh. Bila dinyatakan  $p > 0,05$ , maka ditafsirkan bahwa nilai  $p$  sebagai tidak bermakna (Sastroasmoro, 2014).

Analisis multi comparison (Post Hoc Test) bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda mean-nya bilamana pada pengujian Anova dihasilkan ada perbedaan bermakna ( $H_0$  ditolak). (Hastono, 2006)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

Tabel Hasil Pengukuran Kadar Trombosit Tikus

Perlakuan	Replikasi	Pengukuran			Kenaikan
		Trombosit Normal 150.000 – 500.000/mm <sup>3</sup>			
		Normal	Induksi	Terapi	
Kontrol Negatif (Anilin 0,3 ml/kg BB)	1	544.000	224.000	-	-
	2	538.000	298.000	-	-
	3	848.000	Mati	-	-
	4	700.000	Mati	-	-
	5	722.000	316.000	-	-
Rata-Rata		670.400	167.600	-	-
Kontrol Positif (Angkak)	1	478.000	202.000	370.000	168.000
	2	462.000	162.000	386.000	224.000
	3	574.000	188.000	582.000	394.000
	4	300.000	mati	mati	Mati
	5	496.000	384.000	552.000	168.000
Rata-Rata		462.000	187.200	378.000	190800
Dosis Ekstrak 0,25 %	1	584.000	204.000	318.000	114.000
	2	574.000	mati	mati	Mati
	3	500.000	mati	mati	Mati
	4	462.000	348.000	362.000	14.000
	5	464.000	322.000	286.000	-36.000
Rata-Rata		516.800	174.800	193.200	18400
Dosis Ekstrak 0,5 %	1	404.000	266.000	mati	Mati
	2	262.000	282.000	308.000	26.000
	3	454.000	206.000	352.000	146.000
	4	630.000	216.000	318.000	102.000
	5	502.000	276.000	mati	mati
Rata-Rata		450.400	249.000	195.600	54.800
Dosis Ekstrak 1 %	1	396.000	296.000	296.000	0
	2	402.000	258.000	372.000	114.000
	3	444.000	212.000	268.000	56.000
	4	440.000	354.000	mati	Mati
	5	552.000	416.000	380.000	-36.000
Rata-Rata		446.800	307.200	263.200	26.800

Grafik



### B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sampel kulit batang Kayu jawa (*Lannea coromandelica* Houtt.). Kayu jawa (*Lannea coromandelica*) sering digunakan masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Hasil skrining fitokimia ekstrak kulit batang Kayu jawa (*Lannea coromandelica*) oleh (Kumar, 2011) menyatakan bahwa tanaman tersebut mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, steroid, saponin dan glikosida jantung. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Rabbaniyah, 2015) yang menyatakan bahwa kelompok senyawa flavonoid dan tanin yang dinyatakan sebagai *quersetin* dalam ekstrak daun jambu biji dapat menghambat aktivitas enzim *reverse transcriptase* sehingga dapat menghambat pertumbuhan virus *dengue*.

. Sampel kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) yang digunakan dalam penelitian dari Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar,

Sulawesi Selatan dikarenakan pada daerah tersebut banyak terdapat populasi kayu jawa (*Lannea coromandena*) dan secara empiris masyarakat sekitar memanfaatkan sebagai obat luka, malaria dan juga demam berdarah.

Sampel kulit batang kayu jawa yang telah diambil, disortasi basah dilanjutkan dengan pengeringan tanpa terkena sinar matahari langsung, karena jika terpapar sinar matahari langsung dapat merusak senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman tersebut. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan sehingga tidak dapat ditumbuhi mikroba. Simplisia yang kering kemudian disortasi kering. Tujuan dari sortasi kering ini adalah agar simplisia tidak tercampur dengan bahan yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi kemurnian ekstrak. Selanjutnya dilakukan perajangan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga cairan penyari dapat menarik komponen kimia dengan cepat (Agust, 2014).

Sampel yang telah kering selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi. Metode maserasi digunakan karena metode ini lebih sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam simplisia sebanyak 150 gram dalam cairan penyari metanol sebanyak 1,5 L. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi didalam dan diluar sel. Filtrat yang dihasilkan dirotavapor pada suhu 60°C agar ekstrak menjadi pekat dan kental, kemudian untuk mendapatkan ekstrak kering diletakkan diatas waterbath.

Kemudian ekstrak ditimbang dan diperoleh bobot ekstrak sebesar 19,25 gram. Selanjutnya ekstrak kental di simpan dalam eksikator yang berisi silika gel yang telah aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada hewan coba untuk melihat pengaruh ekstrak methanol kulit batang kayu jawa (*Lannea coromancelica*) pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan (*Rattus novergicus*) sebagai hewan coba, adapun alasan digunakan tikus sebagai hewan coba dikarenakan tikus tidak bersifat fotofobik, aktifitasnya tidak terganggu oleh manusia, lebih tenang, lebih besar, relative resisten terhadap infeksi. Penggunaan tikus jantan dikarenakan tikus jantan mempunyai kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan kondisi biologi yang relatif stabil dibandingkan tikus betina. Kesesuaian jenis kelamin tergantung pada tujuan penelitian, apabila dibutuhkan penelitian pada obat-obatan hormon untuk wanita, maka digunakan betina. Diketahui tikus putih betina (*Rattus norvegicus*) adalah mamalia yang tergolong ovulator spontan. Pada golongan ini ovulasi terjadi pada pertengahan siklus estrus yang dipengaruhi oleh adanya lonjakan LH (Luteinizing hormone). Karena penelitian ini tidak diharapkan adanya pengaruh lain seperti hormon maka digunakanlah tikus putih jantan (*Rattus novergicus*) (Akhbar, 2010).

Tikus yang akan digunakan terlebih dahulu diadaptasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan lingkungan baru. Dalam penelitian ini untuk menurunkan kadar trombosit tikus digunakan anilin 0,35 ml/200g. Mekanisme terjadinya hemolitik akibat anilin, disebabkan karena adanya produksi hydrogen peroksida ( $H_2O_2$ ), yang dihasilkan dari proses oksidasi

oksihemoglobin menjadi methemoglobin, yang diperantarai oleh metabolit aktif anilin, fenilhidroksilamin.  $H_2O_2$  yang dihasilkan ini dapat menyebabkan oksidasi gugus SH yang penting dalam protein dan juga menimbulkan peroksidasi lipid dalam membrane sel darah merah sehingga mengakibatkan membran sel darah menjadi lisis. Beberapa penelitian tentang efek anilin pada tikus menunjukkan terjadinya peningkatan methemoglobin dan leukosit, serta penurunan jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematocrit (Ciccoli, 1999).

Dalam penelitian ini digunakan 25 ekor tikus putih jantan (*Rattus novergicus*) dengan berat 180-250 gram yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan. Kelompok I sebagai control negatif dengan pemberian anilin, kelompok II dengan pemberian anilin kemudian dilanjutkan dengan induksi Angkak yang dilarutkan dalam aquadest, kelompok III dengan pemberian anilin kemudian dilanjutkan dengan induksi ekstrak 0,25 % yang disuspensikan ke dalam NaCMC 1 %, kelompok IV dengan pemberian anilin kemudian dilanjutkan dengan induksi ekstrak 0,5% yang disuspensikan ke dalam NaCMC 1%, kelompok V dengan pemberian anilin kemudian dilanjutkan dengan induksi ekstrak 1% yang disuspensikan ke dalam NaCMC 1%.

Pemeriksaan trombosit dilakukan 3 kali. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum tikus diberi perlakuan anilin ataupun ekstrak untuk menghitung kadar trombosit awal. Pemeriksaan kedua dilakukan setelah 24 jam pemberian anilin ke semua kelompok tikus. Pemeriksaan ketiga dilakukan setelah 24 jam pemberian angkak dan ekstrak terhadap kelompok kontrol positif dan kelompok uji ekstrak.

Pengambilan darah dilakukan dengan memotong pada bagian ekor  $\pm 0,5$  cm dari ujung, lalu dimasukkan ke dalam pipet eritosit untuk mencampur darah dengan pewarna Rees Ecker. Pemilihan lokasi pengambilan darah karena darah yang dibutuhkan hanya sedikit. Bedanya jika darah yang dibutuhkan banyak, dapat dilakukan pengambilan darah pada bagian sinus orbitalis. Volume darah yang maksimal yang dapat diambil setiap pengambilan 5,5 ml berat badan tikus dan untuk penelitian ini cukup menggunakan 0.5 ml darah tikus untuk kamar hitung.

Pemeriksaan darah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung jumlah trombosit dengan metode kamar hitung. Perhitungan trombosit dengan cara Rees Ecker, yaitu darah diencerkan ke dalam larutan yang mengandung Brilliant Cresyl Blue, cat ini berfungsi untuk mewarnai sel trombosit menjadi biru muda. Sel trombosit dihitung dengan menggunakan kamar hitung standar dan mikroskop. Di bawah lensa mikroskop, trombosit terlihat refraktil dan mengkilat dengan warna biru muda dengan ukuran yang lebih kecil dari eritrosit serta berbentuk bulat, lonjong atau koma tampak tersebar tapi ada juga yang tampak bergerombol. Metode ini dipilih karena faktor kesalahan yang dapat ditimbulkan apabila menggunakan metode ini sekitar 16–25% yang didapat dari kemampuan visual pemeriksa saat menghitung jumlah trombosit, cahaya yang kurang terang, dan kesalahan faktor teknik pengambilan sampel yang biasanya menyebabkan trombosit bergerombol sehingga sulit dihitung, pengenceran yang dilakukan tidak akurat dan penyebaran trombosit yang tidak merata.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) mempengaruhi peningkatan kadar trombosit pada tikus (*Rattus novergicus*). Dilihat dari hasil penurunan trombosit untuk kelompok III tikus dengan jumlah trombosit setelah dibuat anemia 291.333/mL dan mengalami peningkatan jumlah trombosit setelah 24 jam pemberian ekstrak konsentrasi 0,25% dengan rata-rata 322.000/mL. Kelompok IV dengan rata-rata jumlah trombosit pada pemeriksaan setelah dibuat anemia 249.200/mL dan jumlah rata-rata trombosit setelah pemberian ekstrak adalah 326.000/mL dan untuk kelompok V dengan jumlah rata-rata trombosit setelah dibuat anemia adalah 307.000/mL dan jumlah rata-rata setelah pemberian ekstrak adalah 329.000. data ini menunjukkan peningkatan jumlah trombosit tikus pada setiap kelompok yang diberi perlakuan ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*).

Dari hasil pembacaan statistik Analisis varians (Anova) pada kolom Terapi yang menjadi objek penelitian didapatkan bahwa adanya perbedaan bermakna rerata antar kelompok. Dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tests LSD dan didapatkan bahwa pada ekstrak 1 % menunjukkan nilai signifikan  $p < 0,05$  yakni 0,023 dengan perbedaan rerata 263.200 terhadap kontrol negatif.

Sehingga dapat diketahui bahwa ekstrak kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) memiliki aktifitas peningkat trombosit dan konsentrasi yang paling baik dalam meningkatkan jumlah trombosit adalah kelompok V.

Tumbuhan kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*) dapat diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu obat alternatif untuk penyakit yang berhubungan dengan kekurangan trombosit yang dikenal dengan

trombositopenia, terutama dapat digunakan untuk penyakit demam berdarah. Hal ini membuktikan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatunya di dunia sebagai sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan umat manusia. Penelitian akan terus berlanjut terutama dalam dunia medis yang meneliti tentang obat-obatan, tidak akan berhenti untuk membuktikan hadits Rasulullah saw. bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dari Bukhari ra, bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya (Mushin, 1994: 938).*

Hadits-hadits ini cukuplah membuktikan kekuasaan Allah swt. Yang digambarkan oleh Rasulullah pada beberapa kasus. Ada akibat tentu dengan sebab, yang demikian merupakan ketentuan Allah swt. yang berlaku di jagad raya ini. Perkara-perkara ini memang tidak mutlak terjadi, namun mayoritas urusan makhluk tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Hukum ini merupakan hikmah Allah swt. yang lengkap dengan kebaikan. Makhluk mana pun tidak bisa menggapai keinginannya kecuali dengan hukum sebab dan akibat. Di alam nyata ini tidak ada sebab yang sempurna dan bisa melahirkan akibat dengan sendirinya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menguasai segala sesuatunya di jagad raya ini, termasuk segala sesuatu yang ada dan terjadi pada makhluk ciptaanNya termasuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan bahkan makhluk gaibNya. (Shihab, 2002)

Obat-obatan dalam bentuk bahan kimia yang mendominasi pasaran mulai tersingkirkan dengan bahan tradisional. Masyarakat mulai menggunakan obat-obatan herbal yang dipercaya dan diyakini lebih ampuh dan aman karena kealamiannya. Manusia-manusia terdahulu juga sudah menggunakannya. Para dokter pada zaman Rasulullah juga sudah menggunakannya, yang berkesimpulan bahwa tumbuh-tumbuhan mengandung zat-zat yang bermanfaat yang merupakan karunia, kekuasaan, hikmah dan ketentuan Allah swt., tumbuh-tumbuhan ini berfungsi tidak hanya pada saat sakit tetapi pada saat sehat juga. Begitu banyak yang dapat kita pelajari di dunia ini, Semua kembali kepada individu yang hendak mendekatkan diri dengan mempelajari alam ciptaanNya yang merupakan tanda bukti kebesaranNya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpula bahwa,

1. Ekstrak methanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) dapat meningkatkan kadar trombosit tikus.
2. P4 memiliki aktifitas tertinggi dalam meningkatkan kadar trombosit tikus (*Rattus novergicus*)

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada isolat Kulit Batang Kayu Jawa untuk mendapatkan senyawa aktif yang berperan meningkatkan kadar trombosit sebagai terapi demam berdarah.



## KEPUSTAKAAN

- Agust, K. (2014). *Uji Toksisitas Ekstrak Dari Kulit Batang Aglaia Glabrata Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*.
- Akbar, B. (2010). *Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa aktif yang Berpotensi sebagai Bahan Antifertilitas*. 4 Jakarta: Adabia Press..
- Atun, S. (2014). *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam. Jurnal Konservasi cagar Budaya, Dua*.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2010). *Acuan Sediaan Herbal (Vol. lima)*. Jakarta: BPOM RI.
- Candra, A. (2010). *Demam Berdarah Dengue: Epidemiologi, Patogenesis dan Faktor Resiko Penularan. Aspirator, 2(No. 2), 110*.
- Ciccoli, L. e. (1999). *Hemolytic drugs aniline and dapson induce iron release in erythrocyte and increase the free iron pool in spleen and liver. Toxicology letters*.
- Darmowandowo. (2006). *Demam Tifoid : Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak : Infeksi dan Penyakit Tropis Edisi I*. Jakarta: BP FKUI,2002.
- Darwis. (2000). *Teknik Dasar Laboratorium dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Penemuan dan Tatalaksana Penderita Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Dirjen P2L.
- Dirjen POM. (1995). *Materia Medika Indonesia (Vol. Enam)*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen POM. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Erdogrul, O. &. (2004). Review of the studies on the red yeast rice (*Monascus purpureus*). *Turkish electronic Journal of Biotechnology, 2, 37*.
- Hadinegoro, R. S. (2001). *Tata Laksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia*. Jakarta: Ditjen PPM & PL Depkes & Kesos RI.
- Haribowo, W. H. (2008). *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*. Jakarta: Salemba Medika.

- Hawwa, S. (2007). *Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Jakarta: Daarussalam.
- Hendarwanto (2009). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I Edisi III*. Jakarta: Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia.
- Hidayah, A. N. (2009). *Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Praktek Keluarga Tentang Pencegahan DBD di Rw 09 Kelurahan Kramatpela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tahun 2009*. Skripsi, 20-21.
- I Wayan Adi Pranata, I. G. (2017, mei). *Gambaran Pola Penatalaksanaan Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013*. *E-Jurnal Medika*, 22.
- Khaerani. (2010). *Uji aktivitas infusa daun ubi jalar (Ipomea batatas L)*.
- Kumar. (2011). *Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica)*.
- Kumar, R. A. (2004). *Pharmacological Investigations on the Standarized Leaf Extract of Lannea coromandelica (Houtt)*.
- Lestari K. (2007). *Epidemiologi dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia*. Jakarta: Farmaka.
- Mozer, H. (2015). *Antifungal Activity Test of Ethanol Extract of Ethanol 96% stem bark of kayu Jawa (Lanna coromondelica) Againts Aspergillus niger, Candida albicans, and Trichophyton rubrum*.
- Mubin. (2008). *Panduan Praktis Ilmu Penyakit Dalam Diagnosis dan Terapi*. Jakarta: EGC.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif*. *Jurnal Kesehatan, Ketujuh*(no.2), 363.
- pusat data dan informasi kementrian kesehatan RI. (2016). *situasi demam berdarah di Indonesia*. Jakarta Selatan: pusdatin.
- Rabbaniyah, F. (2015). *Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn.) terhadap Peningkatan Trombosit pada Pasien Demam Berdarah Dengue*.
- Saputra, A. (2015, Juli). *uji aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol 96% kulit batang kayu jawa (Lannea coromandelica) dengan metode stabilisasi membran sel darah merah secara invitro*. 2.

- Sarker SD, L. Z. (2006). *Natural Products Isolation* (Vol. Kedua). Jersey: Humana Press Inc.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan, keserasian Al-Qur'an Volume VI*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sri Rezeki Hadinegoro, M. K. (2012). *Update Management of Infectious Diseases and Gastrointestinal Disorders*. Jakarta: Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM.
- Syaikh, A. b. (2009). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Tjitraresmi, A., Runadi, D., Ferdiansyah, F., Halimah, E., Wicaksono, A. D., & Ardhya, D. (2016). *Potensi Kombinasi Herba Meniran (Phyllanthus niruri L.), Daun Pepaya (Carica papaya L.) dan Rimpang Kunyit (Curcuma longa L.) Sebagai Obat Herbal untuk Demam Berdarah*. *Farmaka*, 14(2), 3.
- Tjitrosoepomo, G. (2010). *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Triana, E. &. (2006). *Pengaruh pemberian beras yang difermentasi oleh Monascus purpureus terhadap darah tikus putih (Rattus Sp) hiperkolesterolemia*. *Biodiversitas*, 7(4), 317.
- Voight, R. (1994). *Pelajaran Teknologi Sediaan Farmasi* (Vol. lima). Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Wahid, A. (2009). *In vitro Phitocemical and biological Investigation of Lannea coromandelica (Famili: Anacardiaceae)*. *Biological Investigation of L. coromandelica*, 29.
- Wirastuty, R. Y. (2016). *Uji Efektifitas Gel Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu (Lannea Coromandelica) Pada Kelinci (Oryctolagus Cuniculus) Sebagai Obat Penyembuh Luka Bakar*. *Journal of Pharmaceutical Science and Herbal Technology* , 32.
- World Health Organization. (2011). *World Health Statistics 2011*. Prancis: World Health Organization.
- World Health Organization. (2012). *Handbook For Clinical Management of Dengue*. Geneva: WHO Library cataloguing-in-Publication Data.


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Kerja

#### a. Penyiapan Sampel



## b. Ekstraksi sampel




## c. Penyiapan hewan coba

Tikus jantan (*Rattus novergicus*)  
dengan berat rata-rata 25-30 g

- Dilakukan pengadaptasian selama  $\pm 2$  minggu
- dilakukan pengamatan umum (perhitungan berat badan, pemisahan yang sakit)

Tikus jantan (*Rattus novergicus*)  
siap uji

## d. Pembuatan suspensi Na CMC 1 %



## e. Pembuatan Larutan Rees Ecker

natrium sitrat 3,8 gram;  
formaldehid 40 % 2 ml;  
Brilliant Cresyl Blue 30 mg;




Aquadest 100 ml

- Dilarutkan pada

- Disaring lalu ditampung  
pada wadah

Larutan Rees Ecker

- f. Pengujian aktivitas ekstrak kayu jawa terhadap peningkatan trombosit tikus



## Lampiran 2. Perhitungan kadar trombosit

Perhitungan trombosit pada hari pertama pada pemeriksaan pertama jumlah sel trombosit yang dihitung 25 bidang besar sama dengan N maka :

$$\frac{N}{0,1} \times 200 = N \times 2000$$

### Kelompok I.

Kelompok kontrol negatif (tikus diberi anilin tanpa pemberian ekstrak kayu jawa)

$$N_1 = 112 \quad 112 \times 2000 = 224.000$$

$$N_2 = 149 \quad 149 \times 2000 = 298.000$$

$$N_5 = 158 \quad 158 \times 2000 = 316.000$$

### Kelompok II

Kelompok kontrol positif (tikus diberi anilin lalu diberikan angkak)

$$N_1 = 185 \quad 185 \times 2000 = 370.000$$

$$N_2 = 193 \quad 193 \times 2000 = 386.000$$

$$N_3 = 291 \quad 291 \times 2000 = 582.000$$

$$N_5 = 279 \quad 279 \times 2000 = 552.000$$

### Kelompok III

Kelompok pemberian anilin lalu diberikan ekstrak kayu jawa 0,25%

$$N_1 = 159 \quad 159 \times 2000 = 318.000$$

$$N_4 = 181 \quad 181 \times 2000 = 362.000$$

$$N_5 = 143 \quad 143 \times 2000 = 286.000$$

### Kelompok IV

Kelompok pemberian anilin lalu diberikan ekstrak kayu jawa 0,5%

$$N_2 = 154 \quad 154 \times 2000 = 308.000$$

$$N_3 = 176 \quad 176 \times 2000 = 352.000$$

$$N_4 = 159 \qquad 159 \times 2000 = 318.000$$

Kelompok V

Kelompok pemberian anilin lalu diberikan ekstrak kayu jawa 1%

$$N_1 = 148 \qquad 148 \times 2000 = 296.000$$

$$N_2 = 186 \qquad 186 \times 2000 = 372.000$$

$$N_3 = 134 \qquad 134 \times 2000 = 268.000$$

$$N_5 = 190 \qquad 190 \times 2000 = 380.000$$



#### Lampiran 4. Gambar penelitian



Gambar 1. Tumbuhan kayu jawa (*Lannea coromandelica*)



Gambar 2. Perajangan Kulit batang kayu jawa (*Lannea coromandelica*)



Gambar 3. Ekstrak metanol kulit kayu jawa (*Lannea coromandelica*)




Gambar 4. Proses Maserasi Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*)




Gambar 5. Proses Evaporasi Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*)



Gambar 6. Tikus putih jantan (*Rattus norvegicus*)



Gambar 7. Pengamatan Trombosit perbesaran 40 x



## Lampiran 4. Analisis Data

### Oneway

Notes		
Output Created		10-NOV-2017 10:58:02
Comments		
Input	Data	D:\ARI\ari.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	26
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis.

Syntax	ONEWAY awal induksi terapi BY sampel /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /PLOT MEANS /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=TUKEY DUNCAN LSD ALPHA(0.05).		
Resources	Processor Time	00:00:03.23	
	Elapsed Time	00:00:02.43	

### Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
awal kontrol negatif	5	670400.0000	130945.79031	58560.73770	507809.3265	832990.6735	538000.00	848000.00
kontroll positif	5	463800.0000	100688.62895	45029.32378	338778.5544	588821.4456	300000.00	574000.00
ekstrak 0,25%	5	516800.0000	58865.94941	26325.65289	443708.2699	589891.7301	462000.00	584000.00
ekstrak 0,5%	5	450400.0000	134702.63546	60240.84993	283144.5871	617655.4129	262000.00	630000.00
ekstrak 1%	5	446800.0000	62667.37588	28025.70249	368988.1755	524611.8245	396000.00	552000.00
Total	25	509640.0000	127240.21901	25448.04380	457117.8190	562162.1810	262000.00	848000.00
induksi kontrol negatif	5	167600.0000	156833.66985	70138.14939	-27134.7216	362334.7216	.00	316000.00

	kontroll positif	5	187200.0000	136591.36137	61085.51383	17599.4241	356800.5759	.00	384000.00
	ekstrak 0,25%	5	174800.0000	168544.35618	75375.32753	-34475.4592	384075.4592	.00	348000.00
	ekstrak 0,5%	5	249200.0000	35513.37776	15882.06536	205104.3174	293295.6826	206000.00	282000.00
	ekstrak 1%	5	307200.0000	80057.47935	35802.79319	207795.5101	406604.4899	212000.00	416000.00
	Total	25	217200.0000	127268.74453	25453.74891	164666.0442	269733.9558	.00	416000.00
terapi	kontroll negatif	5	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	kontroll positif	5	378000.0000	231788.69688	103659.05653	90196.3199	665803.6801	.00	582000.00
	ekstrak 0,25%	5	193200.0000	178418.60889	79791.22759	-28335.9633	414735.9633	.00	362000.00
	ekstrak 0,5%	5	195600.0000	179300.86447	80185.78428	-27031.4283	418231.4283	.00	352000.00
	ekstrak 1%	5	263200.0000	154800.51680	69228.89570	70989.7714	455410.2286	.00	380000.00
	Total	25	206000.0000	198379.26639	39675.85328	124113.0635	287886.9365	.00	582000.00

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		awal	induksi	Terapi
N		25	20	14
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	509640.000	271500.000	367857.142
	Std. Deviation	127240.219	70295.2420	92378.6998
		00	3	0
Most Extreme Differences	Absolute	.124	.150	.279
	Positive	.124	.150	.279

	Negative			
		-.106	-.067	-.140
Test Statistic		.124	.150	.279
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.004 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

#### Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
awal	1.027	4	20	.418
induksi	3.148	4	20	.037
terapi	3.022	4	20	.042

#### ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
awal	Between Groups	177272960000.00	4	44318240000.000	4.195	.013
	Within Groups	211288800000.00	20	10564440000.000		

	Total	388561760000.00 0	24			
induksi	Between Groups	71409600000.000	4	17852400000.000	1.125	.373
	Within Groups	317326400000.00 0	20	15866320000.000		
	Total	388736000000.00 0	24			
terapi	Between Groups	377819200000.00 0	4	94454800000.000	3.334	.030
	Within Groups	566684800000.00 0	20	28334240000.000		
	Total	944504000000.00 0	24			

## Post Hoc Tests

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Multiple Comparisons

Dependent Variable	(I) sampel	(J) sampel	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
awal	Tukey HSD	kontrol negatif	206600.00000*	65005.96896	.034	12077.7894	401122.2106
		ekstrak 0,25%	153600.00000	65005.96896	.167	-40922.2106	348122.2106

		ekstrak 0,5%	220000.00000*	65005.96896	.022	25477.7894	414522.2106
		ekstrak 1%	223600.00000*	65005.96896	.019	29077.7894	418122.2106
	kontrol positif	kontrol negatif	-206600.00000*	65005.96896	.034	-401122.2106	-12077.7894
		ekstrak 0,25%	-53000.00000	65005.96896	.923	-247522.2106	141522.2106
		ekstrak 0,5%	13400.00000	65005.96896	1.000	-181122.2106	207922.2106
		ekstrak 1%	17000.00000	65005.96896	.999	-177522.2106	211522.2106
	ekstrak 0,25%	kontrol negatif	-153600.00000	65005.96896	.167	-348122.2106	40922.2106
		kontrol positif	53000.00000	65005.96896	.923	-141522.2106	247522.2106
		ekstrak 0,5%	66400.00000	65005.96896	.843	-128122.2106	260922.2106
		ekstrak 1%	70000.00000	65005.96896	.816	-124522.2106	264522.2106
	ekstrak 0,5%	kontrol negatif	-220000.00000*	65005.96896	.022	-414522.2106	-25477.7894
		kontrol positif	-13400.00000	65005.96896	1.000	-207922.2106	181122.2106
		ekstrak 0,25%	-66400.00000	65005.96896	.843	-260922.2106	128122.2106
		ekstrak 1%	3600.00000	65005.96896	1.000	-190922.2106	198122.2106
	ekstrak 1%	kontrol negatif	-223600.00000*	65005.96896	.019	-418122.2106	-29077.7894
		kontrol positif	-17000.00000	65005.96896	.999	-211522.2106	177522.2106
		ekstrak 0,25%	-70000.00000	65005.96896	.816	-264522.2106	124522.2106
		ekstrak 0,5%	-3600.00000	65005.96896	1.000	-198122.2106	190922.2106
LSD	kontrol negatif	kontrol positif	206600.00000*	65005.96896	.005	70999.9249	342200.0751
		ekstrak 0,25%	153600.00000*	65005.96896	.028	17999.9249	289200.0751
		ekstrak 0,5%	220000.00000*	65005.96896	.003	84399.9249	355600.0751

		ekstrak 1%	223600.00000*	65005.96896	.003	87999.9249	359200.0751	
	kontrol positif	kontrol negatif	-206600.00000*	65005.96896	.005	-342200.0751	-70999.9249	
		ekstrak 0,25%	-53000.00000	65005.96896	.424	-188600.0751	82600.0751	
		ekstrak 0,5%	13400.00000	65005.96896	.839	-122200.0751	149000.0751	
		ekstrak 1%	17000.00000	65005.96896	.796	-118600.0751	152600.0751	
	ekstrak 0,25%	kontrol negatif	-153600.00000*	65005.96896	.028	-289200.0751	-17999.9249	
		kontrol positif	53000.00000	65005.96896	.424	-82600.0751	188600.0751	
		ekstrak 0,5%	66400.00000	65005.96896	.319	-69200.0751	202000.0751	
		ekstrak 1%	70000.00000	65005.96896	.294	-65600.0751	205600.0751	
	ekstrak 0,5%	kontrol negatif	-220000.00000*	65005.96896	.003	-355600.0751	-84399.9249	
		kontrol positif	-13400.00000	65005.96896	.839	-149000.0751	122200.0751	
		ekstrak 0,25%	-66400.00000	65005.96896	.319	-202000.0751	69200.0751	
		ekstrak 1%	3600.00000	65005.96896	.956	-132000.0751	139200.0751	
	ekstrak 1%	kontrol negatif	-223600.00000*	65005.96896	.003	-359200.0751	-87999.9249	
		kontrol positif	-17000.00000	65005.96896	.796	-152600.0751	118600.0751	
		ekstrak 0,25%	-70000.00000	65005.96896	.294	-205600.0751	65600.0751	
		ekstrak 0,5%	-3600.00000	65005.96896	.956	-139200.0751	132000.0751	
induksi	Tukey HSD	kontrol negatif	kontrol positif	-19600.00000	79665.09901	.999	-257987.8191	218787.8191
			ekstrak 0,25%	-7200.00000	79665.09901	1.000	-245587.8191	231187.8191
			ekstrak 0,5%	-81600.00000	79665.09901	.841	-319987.8191	156787.8191
			ekstrak 1%	-139600.00000	79665.09901	.427	-377987.8191	98787.8191
		kontrol positif	kontrol negatif	19600.00000	79665.09901	.999	-218787.8191	257987.8191

		ekstrak 0,25%	12400.00000	79665.09901	1.000	-225987.8191	250787.8191
		ekstrak 0,5%	-62000.00000	79665.09901	.934	-300387.8191	176387.8191
		ekstrak 1%	-120000.00000	79665.09901	.570	-358387.8191	118387.8191
	ekstrak 0,25%	kontrol negatif	7200.00000	79665.09901	1.000	-231187.8191	245587.8191
		kontrol positif	-12400.00000	79665.09901	1.000	-250787.8191	225987.8191
		ekstrak 0,5%	-74400.00000	79665.09901	.880	-312787.8191	163987.8191
		ekstrak 1%	-132400.00000	79665.09901	.478	-370787.8191	105987.8191
	ekstrak 0,5%	kontrol negatif	81600.00000	79665.09901	.841	-156787.8191	319987.8191
		kontrol positif	62000.00000	79665.09901	.934	-176387.8191	300387.8191
		ekstrak 0,25%	74400.00000	79665.09901	.880	-163987.8191	312787.8191
		ekstrak 1%	-58000.00000	79665.09901	.947	-296387.8191	180387.8191
	ekstrak 1%	kontrol negatif	139600.00000	79665.09901	.427	-98787.8191	377987.8191
		kontrol positif	120000.00000	79665.09901	.570	-118387.8191	358387.8191
		ekstrak 0,25%	132400.00000	79665.09901	.478	-105987.8191	370787.8191
		ekstrak 0,5%	58000.00000	79665.09901	.947	-180387.8191	296387.8191
LSD	kontrol negatif	kontrol positif	-19600.00000	79665.09901	.808	-185778.4846	146578.4846
		ekstrak 0,25%	-7200.00000	79665.09901	.929	-173378.4846	158978.4846
		ekstrak 0,5%	-81600.00000	79665.09901	.318	-247778.4846	84578.4846
		ekstrak 1%	-139600.00000	79665.09901	.095	-305778.4846	26578.4846
	kontrol positif	kontrol negatif	19600.00000	79665.09901	.808	-146578.4846	185778.4846
		ekstrak 0,25%	12400.00000	79665.09901	.878	-153778.4846	178578.4846
		ekstrak 0,5%	-62000.00000	79665.09901	.446	-228178.4846	104178.4846
		ekstrak 1%	-120000.00000	79665.09901	.148	-286178.4846	46178.4846

		ekstrak 0,25%	kontrol negatif	7200.00000	79665.09901	.929	-158978.4846	173378.4846
			konttrol positif	-12400.00000	79665.09901	.878	-178578.4846	153778.4846
			ekstrak 0,5%	-74400.00000	79665.09901	.361	-240578.4846	91778.4846
			ekstrak 1%	-132400.00000	79665.09901	.112	-298578.4846	33778.4846
		ekstrak 0,5%	kontrol negatif	81600.00000	79665.09901	.318	-84578.4846	247778.4846
			konttrol positif	62000.00000	79665.09901	.446	-104178.4846	228178.4846
			ekstrak 0,25%	74400.00000	79665.09901	.361	-91778.4846	240578.4846
			ekstrak 1%	-58000.00000	79665.09901	.475	-224178.4846	108178.4846
		ekstrak 1%	kontrol negatif	139600.00000	79665.09901	.095	-26578.4846	305778.4846
			konttrol positif	120000.00000	79665.09901	.148	-46178.4846	286178.4846
			ekstrak 0,25%	132400.00000	79665.09901	.112	-33778.4846	298578.4846
			ekstrak 0,5%	58000.00000	79665.09901	.475	-108178.4846	224178.4846
terapi	Tukey HSD	kontrol negatif	konttrol positif	-378000.00000*	106459.83280	.015	-696567.7000	-59432.3000
			ekstrak 0,25%	-193200.00000	106459.83280	.393	-511767.7000	125367.7000
			ekstrak 0,5%	-195600.00000	106459.83280	.381	-514167.7000	122967.7000
			ekstrak 1%	-263200.00000	106459.83280	.137	-581767.7000	55367.7000
		konttrol positif	kontrol negatif	378000.00000*	106459.83280	.015	59432.3000	696567.7000
			ekstrak 0,25%	184800.00000	106459.83280	.436	-133767.7000	503367.7000
			ekstrak 0,5%	182400.00000	106459.83280	.449	-136167.7000	500967.7000
			ekstrak 1%	114800.00000	106459.83280	.815	-203767.7000	433367.7000
		ekstrak 0,25%	kontrol negatif	193200.00000	106459.83280	.393	-125367.7000	511767.7000
			konttrol positif	-184800.00000	106459.83280	.436	-503367.7000	133767.7000

	ekstrak 0,5%	-2400.00000	106459.83280	1.000	-320967.7000	316167.7000	
	ekstrak 1%	-70000.00000	106459.83280	.963	-388567.7000	248567.7000	
ekstrak 0,5%	kontrol negatif	195600.00000	106459.83280	.381	-122967.7000	514167.7000	
	konttrol positif	-182400.00000	106459.83280	.449	-500967.7000	136167.7000	
	ekstrak 0,25%	2400.00000	106459.83280	1.000	-316167.7000	320967.7000	
	ekstrak 1%	-67600.00000	106459.83280	.967	-386167.7000	250967.7000	
ekstrak 1%	kontrol negatif	263200.00000	106459.83280	.137	-55367.7000	581767.7000	
	konttrol positif	-114800.00000	106459.83280	.815	-433367.7000	203767.7000	
	ekstrak 0,25%	70000.00000	106459.83280	.963	-248567.7000	388567.7000	
	ekstrak 0,5%	67600.00000	106459.83280	.967	-250967.7000	386167.7000	
LSD	kontrol negatif	konttrol positif	-378000.00000*	106459.83280	.002	-600071.3198	-155928.6802
		ekstrak 0,25%	-193200.00000	106459.83280	.085	-415271.3198	28871.3198
		ekstrak 0,5%	-195600.00000	106459.83280	.081	-417671.3198	26471.3198
		ekstrak 1%	-263200.00000*	106459.83280	.023	-485271.3198	-41128.6802
	konttrol positif	kontrol negatif	378000.00000*	106459.83280	.002	155928.6802	600071.3198
		ekstrak 0,25%	184800.00000	106459.83280	.098	-37271.3198	406871.3198
		ekstrak 0,5%	182400.00000	106459.83280	.102	-39671.3198	404471.3198
		ekstrak 1%	114800.00000	106459.83280	.294	-107271.3198	336871.3198
ekstrak 0,25%	kontrol negatif	193200.00000	106459.83280	.085	-28871.3198	415271.3198	
	konttrol positif	-184800.00000	106459.83280	.098	-406871.3198	37271.3198	
	ekstrak 0,5%	-2400.00000	106459.83280	.982	-224471.3198	219671.3198	
	ekstrak 1%	-70000.00000	106459.83280	.518	-292071.3198	152071.3198	

ekstrak 0,5%	kontrol negatif	195600.00000	106459.83280	.081	-26471.3198	417671.3198
	konttrol positif	-182400.00000	106459.83280	.102	-404471.3198	39671.3198
	ekstrak 0,25%	2400.00000	106459.83280	.982	-219671.3198	224471.3198
	ekstrak 1%	-67600.00000	106459.83280	.533	-289671.3198	154471.3198
ekstrak 1%	kontrol negatif	263200.00000*	106459.83280	.023	41128.6802	485271.3198
	konttrol positif	-114800.00000	106459.83280	.294	-336871.3198	107271.3198
	ekstrak 0,25%	70000.00000	106459.83280	.518	-152071.3198	292071.3198
	ekstrak 0,5%	67600.00000	106459.83280	.533	-154471.3198	289671.3198

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

## Homogeneous Subsets

		awal		
	sampel	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Tukey HSD <sup>a</sup>	ekstrak 1%	5	446800.0000	
	ekstrak 0,5%	5	450400.0000	
	konttrol positif	5	463800.0000	
	ekstrak 0,25%	5	516800.0000	516800.0000
	kontrol negatif	5		670400.0000

	Sig.		.816	.167
Duncan <sup>a</sup>	ekstrak 1%	5	446800.0000	
	ekstrak 0,5%	5	450400.0000	
	konttrol positif	5	463800.0000	
	ekstrak 0,25%	5	516800.0000	
	kontrol negatif	5		670400.0000
	Sig.		.336	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

**induksi**

		Subset for alpha =	
		0.05	
	sampel	N	1
Tukey HSD <sup>a</sup>	kontrol negatif	5	167600.0000
	ekstrak 0,25%	5	174800.0000
	konttrol positif	5	187200.0000
	ekstrak 0,5%	5	249200.0000
	ekstrak 1%	5	307200.0000
	Sig.		
Duncan <sup>a</sup>	kontrol negatif	5	167600.0000

ekstrak 0,25%	5	174800.0000
konttrol positif	5	187200.0000
ekstrak 0,5%	5	249200.0000
ekstrak 1%	5	307200.0000
Sig.		.130

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

		terapi		
	Sampel	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Tukey HSD <sup>a</sup>	kontrol negatif	5	.0000	
	ekstrak 0,25%	5	193200.0000	193200.0000
	ekstrak 0,5%	5	195600.0000	195600.0000
	ekstrak 1%	5	263200.0000	263200.0000
	konttrol positif	5		378000.0000
	Sig.		.137	.436
Duncan <sup>a</sup>	kontrol negatif	5	.0000	
	ekstrak 0,25%	5	193200.0000	193200.0000
	ekstrak 0,5%	5	195600.0000	195600.0000
	ekstrak 1%	5		263200.0000

kontrol positif	5		378000.0000
Sig.		.096	.126

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.



## BIOGRAFI



Nama Lengkap : Arditya Noor  
 Tanggal Lahir : Sikeli, 6 September 1995  
 Umur : 22 Tahun  
 Alamat : Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat  
 Kabupaten Bombana  
 Nomor Hp : 085299991339  
 Email : 70100113097@uin-alauddin.ac.id

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Akhmad Nuryadin dan Ibu Nurjaya. Pernah menempuh jenjang pendidikan di SDN No. 1 Sikeli, dan SMP Negeri 2 Kabaena, serta SMA Negeri 2 Bombana. Penulis kini tengah menempuh jenjang pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan menyusun tugas akhirnya. Penulis berharap, serangkaian tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang Farmasi khususnya dan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan umumnya. Motto dari penulis adalah *"Inna ma'al usri yusro"* *"Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan"*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R