

**KEANEKARAGAMAN IKAN AIR TAWAR DI PERAIRAN
DANAU TEMPE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RESKY YUNITA NASRUL

60300112099

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Resky Yunita Nasrul
NIM : 60300112099
Tempat/Tgl.Lahir : Sengkang, 09 Juni 1994
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi
Judul : Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2016

Penyusun,

RESKY YUNITA NASRUL
NIM. 60300112099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Resky Yunita Nasrul, NIM : 60300112099, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul “Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2016

St. Aisyah Sijid S.Pd.,M.Kes
Pembimbing II

Dr. Ernawati S.Kaseng M.Pi
Pembimbing I

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe” yang disusun oleh Resky Yunita Nasrul, NIM: 60300112099, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Agustus 2016
27 Dzulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Prof.Dr.H. Arifuddin Ahmad., M.Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Wasilah., S.T., M.T | (.....) |
| Penguji I | : Sitti Saenab.,S.Pd., M.Pd | (.....) |
| PengujiII | : Ulfa Triyani A.Latif S.Si., M.Pd | (.....) |
| PengujiIII | : Prof. Dr. Mustari Mustafa.,S.Ag.,M.Pd | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Ernawati S.Kaseng.,S.Pi., M.Si | (.....) |
| Pembimbing II | : St. Aisyah S.,S.Pd.,M.Kes | (.....) |
| Pelaksana | : Risnawati Salam., S.Sos | (.....) |

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof.Dr.H. Arifuddin Ahmad., M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dan penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan Do'a, semangat, dukungan dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi perkuliahan.
2. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. Mashuri Masri S.Si.M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologidan Baiq Farhatul Wahida, S.Si., M.S.i., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Dr. Ernawati S.Kaseng M.Si dan St. Aisyah Sijid S.Pd., M.Kes, selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Sitti Saenab S.Pd., M.Pd, Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd dan Prof. Dr. Mustari Mustafa, S.Ag., M. Pd selaku penguji I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
8. Laboran Jurusan Biologi yang telah banyak membantu selama melakukan praktikum dan telah memberikan dukungannya.
9. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi serta Kakanda Alumni IKA BIO FST UINAM.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala

bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin.

Makassar, 30 Agustus 2016

Penulis

RESKY YUNITA NASRUL

NIM. 60300112099

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 3 |
| D. Kajian Pustaka..... | 3 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| A. Teori tentang Danau Tempe..... | 5 |
| B. Teori tentang Ikan..... | 12 |
| C. Ayat yang Relevan..... | 28 |
| D. Kerangka Pikir..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| C. Variabel Penelitian | 35 |
| D. Defenisi Operasional Variabel | 35 |
| E. Alat dan Bahan | 35 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| G. Analisis data..... | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Hasil Pengamatan..... | 37 |
| B. Pembahasan..... | 41 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 57 |
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran..... | 57 |
| KEPUSTAKAAN..... | 59 |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun I yang terletak di Kab. Wajo..... | 37 |
| Tabel 4.2 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun I yang terletak di Kab. Wajo..... | 38 |
| Tabel 4.3 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun I yang terletak di Kab. Wajo..... | 39 |
| Tabel 4.4 Indeks Keanekaragaman Ikan di Danau Tempe..... | 40 |
| Tabel 4.5 Parameter Fisika Kimia..... | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Ikan Sepat Siam..... | 16 |
| Gambar 2.2 Ikan Nila | 16 |
| Gambar 2.3 Ikan Gabus..... | 17 |
| Gambar 2.4 Ikan Betok..... | 18 |
| Gambar 2.5 Belut..... | 18 |
| Gambar 2.6 Ikan Nilem..... | 19 |
| Gambar 2.7 Ikan Sidat..... | 20 |
| Gambar 2.8 Ikan Mas | 21 |
| Gambar 2.9 Ikan Patin..... | 22 |
| Gambar 2.10 Ikan Sapu-sapu..... | 23 |
| Gambar 2.11 Ikan Belanak | 24 |
| Gambar 2.12 Ikan Betutu | 25 |
| Gambar 2.13 Ikan Beloso..... | 26 |
| Gambar 2.14 Ikan Lele..... | 26 |
| Gambar 2.15 Ikan Tawes..... | 27 |
| Gambar 3.1 Peta Danau Tempe..... | 34 |

ABSTRAK

Nama : Resky Yunita Nasrul

NIM : 60300112099

Judul Skripsi : **Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe**

Penelitian tentang “Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe” dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis ikan air tawar di Perairan Danau Tempe. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling* dengan menentukan beberapa titik stasiun pengambilan sampel ikan yang diidentifikasi yakni daerah Kab. Wajo, aliran sungai Kab. Soppeng dan aliran sungai Kab. Sidrap, serta melakukan wawancara. Sampel diambil menggunakan jaring dan pukat harimau. Berdasarkan pengambilan sampel yang telah dilakukan diperoleh sejumlah 391 ikan dari 3 stasiun di perairan danau Tempe dan teridentifikasi dalam 16 spesies yang tergolong dalam 9 ordo dan 11 family.

Kata Kunci : Danau Tempe, Ikan Air Tawar

ABSTRACT

Name : Resky Yunita Nasrul

NIM : 60300112099

Thesis Title : **Freshwater Fish Diversity in Tempe Lake**

Research on "Freshwater Fish Diversity in Tempe Lake" with the aim to determine the level of diversity of freshwater fish species in Tempe Lake. Data collection method used in this research is purposive sampling method to determine some point the fish sampling stations were identified namely area Kab. Wajo, streams Kab. Soppeng and watershed district. Sidrap, and conduct interviews. Samples were taken using nets and trawling. Based on the sampling that has been done obtained a number of 391 fish from 3 stations in Tempe lake and identified in 16 species belonging to 9 orders and 11 family.

Keywords: Tempe Lake, Freshwater Fish

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat biodiversitas tertinggi setelah Brazil. Secara geografis wilayah Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik sehingga membuat keanekaragaman hayati melimpah. Keanekaragaman ikan di Indonesia sangat banyak. Di Asia Tenggara terdapat 2917 jenis ikan air tawar yang teridentifikasi. Jumlah jenis ikan air tawar Indonesia berdasarkan koleksi yang ada di Museum Zoologi Bogor sekitar 1300 jenis, hampir 44% ikan di Asia Tenggara berada di Indonesia. Jumlah setiap jenis ikan pada pulau-pulau besar di Indonesia berbeda. Jenis ikan di Kalimantan berjumlah sekitar 394 jenis dengan 149 jenis endemik (38%), di Sumatera ada 272 jenis dengan 30 jenis endemik (11%), di Jawa berjumlah 132 jenis dengan 52 jenis endemik (9%) dan di Sulawesi berjumlah 68 jenis dengan 52 jenis endemik (76%) (Kottelat et al, 1993)

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki kekayaan biota yang tinggi. Pulau ini termasuk dalam kawasan Wallacea bersama-sama dengan Philipina dan Nusa Tenggara merupakan daerah peralihan antara zoogeografi Oriental dan Australia (Whitten et al., 1987). Ada tiga tipe danau di Sulawesi, yaitu tipe danau vulkanik (Danau Tondano, Danau Mooat), tipe danau

tektonik (Danau Matano, Danau Towuti dan Danau Poso) dan tipe danau rawa banjiran (Danau Tempe, Danau Sidenreng). Danau Tempe dengan tipe danau rawa banjiran, terletak di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Luas sekitar 13.000 ha dengan kedalaman maksimum 5,5 meter dan dapat mencapai lebih dari 30.000 ha saat banjir besar dan pada musim kemarau luas genangannya hanya \pm 1.000 ha dengan kedalaman maksimum 1 meter. Perbedaan tinggi permukaan air pada waktu musim hujan dan musim kemarau \pm 4 meter. Pada musim kemarau daerah yang tidak digenangi air merupakan hamparan lahan yang subur yang digunakan sebagai lahan pertanian palawija, sedangkan areal yang digenangi air diperkirakan \pm 45 % permukaannya tertutupi oleh tumbuhan air, selebihnya merupakan areal penangkapan ikan dan alur pelayaran.

Jenis ikan yang ada di perairan Danau Tempe adalah gabus (*Channa striata*), betok (*Anabas testudineus*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), tambakan (*Helostoma temmincki*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*), lele (*Clarias batrachus*), mas (*Cyprinus carpio*), tawes (*Barbonymus gonionotus*), nilem (*Osteochilus vittatus*), mujair (*Oreochromis mossambicus*), nila (*Oreochromis niloticus*), bunaka (*Bunaka gyrioides*), bungo (*Glossogobius giuris*), masapi (*Anguilla marmorata*), belut (*Monopterus albus*) dan belanak (*Mugil cephalus*).

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang di Danau Tempe, semua pihak menyatakan bahwa kondisi danau sudah mengalami degradasi lingkungan yang sangat parah akibat sedimentasi, pencemaran dan blooming tanaman air. Akibat

kerusakan tersebut sehingga sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan di Danau Tempe khususnya nelayan bubu konde.

Berdasarkan teori diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat keanekaragaman jenis ikan air tawar di Perairan Danau Tempe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini yaitu keanekaragaman merupakan sekelompok berbagai jenis ikan air tawar yang hidup di Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

D. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Samuel dan Safran Makmur (2010) jenis ikan yang ada di perairan Danau Tempe adalah gabus (*Channa striata*), betok (*Anabas testudineus*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), tambakan (*Helostoma temmincki*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*), lele (*Clarias batrachus*), mas (*Cyprinus carpio*), tawes (*Barbonymus gonionotus*), nilem (*Osteochilus vittatus*), mujair (*Oreochromis mossambicus*), nila (*Oreochromis niloticus*), bunaka (*Bunaka gyrinoides*), bungo (*Glossogobius giuris*), masapi (*Anguilla marmorata*), belut (*Monopterus albus*) dan belanak (*Mugil cephalus*).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis ikan air tawar di Perairan Danau Tempe.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat setempat tentang keanekaragaman ikan yang terdapat di Perairan Danau Tempe dan faktor lingkungan yang mempengaruhi adaptasinya serta menjadi referensi untuk digunakan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori tentang Danau Tempe

Secara letak geografis Danau Tempe merupakan salah satu danau di Sulawesi Selatan yang termasuk tipe danau paparan banjir dengan titik kordinat antara 3°39' – 4°16' LS dan 119° 53' – 120° 27' BT. Danau Tempe yang mempunyai luas 14.406 hektar, terletak di tiga wilayah kabupaten yaitu Wajo (8.510 ha), Soppeng (3.000 ha), Sidrap (2.896 ha). Pada musim hujan luas Danau Tempe sekitar 45.000 ha, musim kemarau sekitar 1.000 ha (Unru, 2010).

Danau Tempe dikenal sebagai penghasil ikan air tawar yang sebagian ikan tersebut berasal dari ikan introduksi. Dari berbagai jenis ikan introduksi yang ditebar di danau ini, terdapat tiga jenis ikan yang masih dominan tertangkap dan salah satu jenis ikan tersebut adalah ikan sepat siam (*Trichogaster pectoralis*) (Samuel, 2011).

Umumnya Danau Tempe lebih dikenal terletak di Kecamatan Tempe dimana Ibu kota Kabupaten Wajo berada, serta wilayah tiga kecamatan lainnya yaitu Belawa, Tanasitolo dan Sabbangparu. Sedangkan wilayah lain dari Danau Tempe berada di Kabupaten Soppeng dan Sidrap (Samuel, 2011).

Hal ini dapat dilihat pada data Bappedal (1999) bahwa Danau Tempe menempati tiga wilayah kabupaten dengan tujuh kecamatan. Bagian danau terluas terletak pada Kabupaten Wajo yang terdiri empat kecamatan yaitu Kecamatan

Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Belawa. Kabupaten Soppeng dua kecamatan yakni Kecamatan Marioriawa dan Donri Donri, dan bagian yang tersempit adalah Kabupaten Sidrap dengan satu kecamatan yaitu Kecamatan Pancalautan. Danau Tempe berhubungan dengan dua danau lain yaitu Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap dan Danau Buaya di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Ketiga danau ini bersatu membentuk satu luasan perairan yang luas pada musim hujan dan dapat menutupi pemukiman masyarakat pada tiga kabupaten.

Secara topografi dan hidrologi Danau Tempe tidak terpisah dari 2 (dua) danau di sekitarnya yaitu Danau Sidenreng dan Danau Buaya yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 6.138 km², secara limnologi dan ekologi, danau ini termasuk tipe danau entropies, yaitu berbentuk cawan yang sangat datar dengan karakteristik tersedianya lahan pasang surut luas di sekitar danau. Pada umumnya Danau Tempe dalam setahun dapat menutupi areal seluas 10.000 ha dan pada musim kemarau dapat menurun menjadi 1000 ha (Amin dan Mustafa 2000).

Fluktuasi ketinggian air pada saat banjir mencapai sekitar 2 sampai 4 meter, sementara kedalaman danau hanya 5 sampai 7 meter. Banjir oleh kiriman dari daerah sekitarnya, yang sungainya bermuara ke Danau Tempe, sedangkan saluran pembuangan hanya satu yaitu sungai Cenrana yang bermuara di Teluk Bone. Untuk Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Soppeng, danau tersebut merupakan kantong air. Sumber air untuk danau ini berasal dari dua sungai besar yaitu Sungai Bila dari Pegunungan Latimojong dan Sungai Walannae dari Pegunungan Lompobattang dan

sungai-sungai kecil seperti Sungai Kalola, Sungai Lanciran dan Sungai Batu-batu (Tamsil, 2000).

Karakteristik Danau Tempe dengan kondisi banjir yang selalu terjadi setiap tahun pada musim hujan dapat dilihat pada keadaan danau dengan elevasi yang landai sehingga volume air yang bertambah melalui sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Iklim tropis serta curah hujan tinggi di sepanjang sungai yang bermuara di danau merupakan kondisi yang menyebabkan besarnya volume air yang tertampung dalam danau (Tamsil, 2000).

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Wajo selama 20 tahun (1976 – 1996) 145,1 mm. Kemudian data Bappedal (1999) menjelaskan bahwa Danau Tempe memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Data dari 1997 – 1999 menunjukkan bahwa musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai bulan Juli dengan curah hujan 153,6 mm/bulan pada ke-7 kecamatan yang berada disekitar Danau Tempe. Sedangkan musim kemarau hanya terjadi selama 2 bulan yakni bulan Agustus dan bulan September, selebihnya pada bulan Oktober sampai bulan Desember kembali musim hujan dengan curah hujan 126 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 11 hari. Pada saat musim hujan, volume air yang mengalir masuk ke Danau Tempe akan lebih banyak dibanding dengan volume air yang keluar melalui Sungai Cenrana. Hal ini terjadi karena terdapat dua sungai besar yang bermuara langsung ke Danau Tempe, yakni Sungai Bila dan Sungai Walanna ditambah beberapa sungai kecil lainnya. Ketika kondisi itu terjadi dimana volume air masuk lebih besar dari

volume air yang keluar, maka akan mengakibatkan air meluap menggenangi daerah-daerah sekitar Danau Tempe (Bappedal, 1999).

Kondisi lingkungan danau dengan kemiringan yang landai pada sekitar empat kecamatan di Kabupaten Wajo sehingga selalu dilanda banjir dapat diketahui dari proses terjadinya Danau Tempe. Danau Tempe juga dikenal sebagai sebuah cekungan yang menjadi tempat tertampungnya air sungai dan air hujan (Bappedal, 1999).

Menurut laporan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (1980) et al, bahwa terbentuknya Danau Tempe berasal dari proses geologis yang bersamaan dengan terbentuknya Sulawesi Selatan serta tiga danau lain yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparung Lapompaka dan Danau Labulang. Danau tempe terbentuk dari pengangkatan batuan sehingga mengakibatkan terjadinya patahan-patahan berarah kurang lebih Utara-Selatan dan memunculkan terban besar dan luas, terban Walenna. Terban ini memiliki relief lebih rendah dibanding daerah sekitarnya hingga merupakan suatu cekungan sedimentasi. Berakhirnya zaman es atau pasca glasial (zaman Halosen) muka laut naik dan menggenangi Daratan Sunda dan Daratan Sahul, termasuk dataran Danau Tempe. Pada waktu itu Dataran Tempe merupakan danau yang sangat luas yang disebut Danau Tempe (Tamsil 2000).

Proses geologis yang terjadi selanjutnya adalah pada zaman Halosen Tua terjadi pengangkatan (orogenesis) pada daerah daratan Danau Tempe, sehingga terjadi pendangkalan yang menyebabkan bergesernya garis pantai dan daerah sekitarnya menjadi dataran yang datar dan luas berawa-rawa, serta terbentuk danau-danau disekitarnya. Danau Tempe Purba inilah yang ada sampai sekarang dengan semua

proses alam yang terjadi selama ratusan ribu tahun sehingga kondisi Danau Tempe seperti sekarang (Tamsil, 2000).

Banjir yang terjadi membawa sedimen ke dalam danau sehingga terjadi pendangkalan yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik, kimia, dan biologi danau. Kondisi danau yang semakin dangkal ini menyebabkan fluktuasi ketinggian air sangat tinggi, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai suatu danau yang stabil, karena sudah menyerupai rawa. Akibat pendangkalan tersebut, beberapa bagian danau terutama bagian pesisir pada musim kemarau berubah fungsi menjadi lahan pertanian tanaman pangan dan palawija (Tamsil 2000).

Kondisi dan produktivitas Danau Tempe cenderung menunjukkan angka penurunan. Hal tersebut terjadi karena erosi tanah dan sebagian limbah yang mengalir dari Sungai Bila dan Sungai Walannae masuk ke danau yang mengakibatkan pendangkalan. Hal ini dipercepat oleh gulma air yang populasinya melebihi jumlah yang layak. Sungai-sungai yang bermuara di Danau Tempe adalah Sungai Batu-batu, Sungai Bilokka, Sungai Lowa (dari arah barat), Sungai Walannae (dari arah selatan) dan Sungai Bila (dari arah utara). Air yang masuk ke danau ini kemudian dialirkan ke timur melalui sungai Cenrana (Tamsil 2000).

Teori tentang Ikan di Danau Tempe Seumur dengan perkembangan budaya manusia di sekitar Danau Tempe, setua itulah sejarah perikanan di sana. Masyarakat sejak lama memanfaatkan sumberdaya ikan di Danau Tempe untuk kebutuhan gizinya. Di era tahun 1970an, Danau Tempe adalah salah satu pemasok utama

kebutuhan ikan konsumsi di Jawa. Bahkan Danau Tempe sempat menjadi sumber terbesar ikan sidat untuk kebutuhan ekspor Indonesia (Tamsil 2000).

Danau Tempe memang memiliki cukup ragam sumberdaya ikan, antara lain ikan sidat dan ikan bungo atau beloso. Selain ikan konsumsi, Danau Tempe juga punya ikan hias air tawar yaitu Binishi (*Oryzias celebensis*) dan Celebes Rainbow (*Telmatherina ladigesi*). Pemasaran keduanya mencapai benua Eropa dan Amerika (Effendi, 2007).

Perairan tawar berasal dari dua sumber, yaitu air permukaan (*surface water*) dan air tanah (*ground water*). Air permukaan adalah air yang berada di sungai, waduk, danau, rawa dan badan air lainnya yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Areal tanah yang mengalirkan air ke suatu badan air disebut *watersheds* atau *drainage basin*. Air yang mengalir dari daratan menuju suatu badan air disebut limpasan permukaan (*surface run off*), dan air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air sungai. Sekitar 69% air yang masuk ke sungai berasal dari hujan, pencairan es atau salju dan sisanya berasal dari air tanah (Effendi, 2007).

Ekosistem perairan tawar sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem perairan tawar tertutup dan ekosistem perairan tawar terbuka. Ekosistem perairan tawar tertutup adalah ekosistem yang dapat dilindungi terhadap pengaruh dari luar, sedangkan ekosistem perairan tawar terbuka adalah ekosistem perairan yang tidak atau sulit dilindungi terhadap pengaruh dari luar (Effendi, 2007).

Ekosistem perairan tawar terbuka dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem perairan tawar yang mengalir dan ekosistem perairan tawar yang menggenang.

Contoh dari perairan menggenang atau tidak mengalir (*lentic waters*) yaitu danau, waduk dan rawa. Perairan ini memiliki aliran tetapi aliran-aliran tersebut tidak memiliki peranan penting karena alirannya tidak besar dan tidak mempengaruhi kehidupan jasad-jasad di dalamnya. Yang memegang peranan penting dan berpengaruh besar terhadap jasad-jasad hidup di dalamnya adalah terbaginya perairan tersebut menjadi beberapa lapisan dari atas ke bawah (*stratifikasi*) yang berbeda-beda sifatnya karena airnya berhenti. Perairan mengalir (*lotic waters*) adalah mata air dan sungai. Aliran air pada perairan ini biasanya terjadi karena perbedaan ketinggian tempat dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah (Nybakken, 1988).

Perikanan merupakan sumberdaya hayati yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, 56% asupan protein masyarakat Indonesia berasal dari ikan atau produk perikanan. Penangkapan ikan yang merusak yang banyak dilakukan belakangan ini telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan ikan yang merupakan sumberdaya pangan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan laut (Azasi, 2009).

Danau dibagi menjadi 3 zona atau wilayah, yaitu daerah pinggiran (*Litoral zone*), zona tengah (*limnetik zone*) dan zona Dasar:

Daerah pinggiran merupakan daerah tepi danau yang paling kaya akan penghuni-penghuni yang dekat dengan tepi danau, yaitu berupa tumbuhan tingkat tinggi yang akarnya menjangkau dasar tepian danau.

1. Zona tengah merupakan zona luas terbuka yang ditumbuhi oleh fitoplanktonk terdiri atas bangsa ikan dan predatornya dapat berupa ikan-ikan karnivora.

2. Zona dasar merupakan bagian danau yang sedikit jauh dari tepi danau dan berada dibawah zona tengah sampai kedasar danau. Pada bagian ini dihuni oleh beberapa jenis jamur, bakteri dan ikan pemangsa sisa-sisa yang berupa zat organik dari tumbuhan maupun hewan yang hidup di zona atasnya (Kuncoro, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu pegawai perikanan bahwa Danau Tempe merupakan salah satu jenis danau alami yang terletak di Kabupaten Wajo Kecamatan Sengkang dengan luas \pm 40.000 ha. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kantor Perikanan yang bertempat di Kecamatan Sengkang, kedalaman Danau Tempe mengalami pendangkalan karena semakin menebalnya sedimen akibat dari pengendapan buangan rumah tangga, limbah kapal, dll yang terbawa oleh sungai-sungai yang terhubung dengan Danau (Unru, 2010).

B. Teori tentang Ikan

Ikan adalah anggota vertebrata yang berdarah dingin, hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Keanekaragaman tempat hidup mempengaruhi ikan penghuninya. Banyak variasi yang tak terhitung jumlahnya pada ikan yang menyangkut masalah struktur, bentuk, sirip dan sebagainya, merupakan modifikasi yang dikembangkan ikan dalam usahanya untuk menyesuaikan diri terhadap suatu lingkungan tertentu. Sungai yang deras dan sungai yang tenang memiliki arus yang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan ikan. Danau yang dangkal dan yang dalam mempunyai berbagai pola perubahan suhu secara musiman. Kedalaman samudra menyajikan kemungkinan untuk pegkhususan yang lain.

Lingkungan perairan samudera yang tampak sama di berbagai daerah di dunia ini sebetulnya sama sekali berbeda dalam hal sifat kimiawi airnya, tipe dasarnya dan perubahan musimnya. Ikan menyesuaikan diri terhadap segala kondisi tersebut (Khairuman, 2011).

Ikan air tawar merupakan komoditas perikanan air tawar yang saat ini banyak menghasilkan devisa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik, permintaan ikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Asia, selain sebagai produsen ikan terbesar, diperkirakan juga menjadi konsumen terbesar dari hasil perikanan dunia. Permintaan ikan di Asia meningkat mencapai 69 juta ton pada tahun 2010 atau setara dengan 60% dari total permintaan ikan dunia. Permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan, terlebih bagi Negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki potensial perairan yang cukup luas dan potensial untuk pengembangan perikanan baik penangkapan maupun akuakultur. (Khairuman, 2011).

Suatu spesies akan dipengaruhi oleh anggota-anggota spesies lain dalam suatu habitat tertentu, bila di suatu ekologi kedua spesies sama. Bila ada dua spesies yang kebutuhannya akan pangan dan atau faktor-faktor ekologi lainnya sama, maka akan terjadi persaingan (kompetisi). Selanjutnya dinyatakan secara umum kompetisi yang terjadi dalam suatu habitat bertindak sebagai pengatur, misalnya dalam mengatur kepadatan populasi suatu spesies terhadap kepadatan populasi spesies lain yang hidup dalam niche ekologi yang sama. Jenis ikan yang mempunyai luas relung yang luas,

berarti jenis ikan tersebut mempunyai peran yang besar dalam memanfaatkan pakan yang tersedia dan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi kesedian pakan, serta mempunyai daya reproduksi secara individual sangat besar. Jadi berdasarkan luas relung, jenis ikan mempunyai potensi yang paling besar untuk berkembang menjadi induk populasi di dalam ekosistem perairan dimana ikan tersebut hidup (Khairuman, 2011).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi populasi ikan di perairan, salah satunya yaitu mortalitas. Mortalitas adalah jumlah individu yang hilang selama satu interval waktu. Dalam perikanan umumnya dibedakan atas dua penyebab yaitu mortalitas alami (M) dan mortalitas penangkapan (F). Mortalitas alami yang tinggi didapatkan pada organisme yang memiliki nilai koefisien laju pertumbuhan yang besar dan sebaliknya mortalitas alami yang rendah didapatkan pada organisme yang memiliki nilai koefisien laju pertumbuhan yang kecil. Selanjutnya dikatakan pula mortalitas alami merupakan kematian yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain predasi, termasuk kanibalisme, penyakit, stres pada waktu pemijahan, kelaparan dan umur yang tua. Jika penangkapan dilakukan terus menerus untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa adanya suatu usaha pengaturan, maka sumber daya hayati ikan (waktu yang akan datang) dapat mengalami kelebihan tangkapan dan berakibat mengganggu kelestarian sumberdaya hayati (Suwarni, 2007).

Sumber daya perikanan berdasarkan sifatnya termasuk salah satu sumberdaya alam yang pengambilannya tidak diawasi atau dibatasi, yang berarti setiap orang secara bebas dapat mengambil sumberdaya tersebut (*open access*), karena sifat

sumberdaya perikanan seringkali disebut sumberdaya milik yang pengambilannya tidak diawasi atau dibatasi, yang berarti setiap orang secara bebas dapat mengambil sumberdaya tersebut (*open access*), karena sifat sumberdaya perikanan seringkali disebut sumberdaya milik bersama (Musa dkk, 2005).

Keanekaragaman ikan di Indonesia dikenal sangat tinggi, diperkirakan terdapat kurang lebih 8500 jenis ikan, dengan jumlah 800 jenis ikan terdapat pada perairan air tawar dan payau (Trijoko dan Pranoto, 2006).

Di perairan Indonesia bagian barat terdapat sekitar 99 suku dari keseluruhan 150 suku yang terdapat di Asia Tenggara, untuk wilayah Afrika terdapat 74 suku, dan Amerika terdapat 60 suku (Trijoko dan Pranoto, 2006).

Trichogaster pectoralis atau yang dikenal sebagai sepat siam adalah salah satu species yang paling terkenal diantara empat species ikan yang disebut sebagai sepat. Dari namanya, sepat siam memang berasal dari Siam (Thailand). Ikan ini didatangkan di Indonesia pada tahun 1934 dan merupakan salah satu species ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan perairan Indonesia (Sutrisna, 2007).

Sepat mempunyai kebiasaan memijah dengan membuat sarang busa seperti balon. Sarang tersebut dibuat oleh induk jantan dengan diameter sekitar 5 cm. Telur sepat yang telah dibuahi akan terapung di dalam busa dan dijaga oleh induknya. Seekor induk betina berumur 7 bulan dapat mengeluarkan 7.000 - 8.000 butir telur. Telur-telur yang dibuahi berwarna kuning atau putih kekuning-kuningan dan biasanya akan menetas 36 - 48 jam setelah pembuahan. Kantong kuning telur (*Yolk sack*) yang

merupakan makan awal larva akan habis dalam waktu 3-7 hari. Di alam sepat mulai memijah pada akhir musim hujan dan sepanjang musim kemarau (Sutrisna, 2007).



Gambar 2.1 Ikan Sepat Siam (Sutrisna, 2007)

Ikan nila berasal dari Sungai Nil di Afrika Utara dan masih berkerabat dekat dengan ikan mujair sehingga mempunyai sifat yang hampir sama (Sugiarto, 1988).

Ikan nila (*Oreochomis niloticus*) merupakan ikan yang mempunyai keunggulan antara lain : laju pertumbuhan cepat, toleransi tinggi, tahan terhadap penyakit, nilai ekonomi yang tinggi (Charraborty, 2009).

Potensi pengembangan budidaya ikan nila di Indonesia cukup besar, di pasar lokal maupun ekspor. Ikan nila merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan baik di kolam, karamba jaring apung maupun sawah (Khairuman dan Amri, 2011).



Gambar 2.2 Ikan Nila (Khairuman dan Amri, 2011)

Ikan Gabus sangat kaya akan albumin. Ikan ini merupakan sumber albumin bagi penderita hipoalbumin (rendah albumin) dan luka, baik luka pasca operasi maupun luka bakar. Dari hasil penelitian yang telah ada, bahwa berat badan ikan berpengaruh terhadap kandungan albumin. Mengingat pentingnya fungsi albumin dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya pengetahuan tentang uji kadar albumin ikan Gabus dengan kadar protein pakan komersial yang berbeda (Kusumaningrum, 2014).



Gambar 2.3 Ikan Gabus (Kusumaningrum, 2014)

Ikan betok (*Anabas testudineus*) juga sering disebut climbing perch merupakan jenis ikan ekonomis penting di perairan umum dan potensial untuk dikembangkan. Ikan betok merupakan jenis *blackwater fish*, yaitu ikan yang memiliki ketahanan terhadap tekanan lingkungan. Ikan betok merupakan ikan asli Indonesia yang hidup di rawa, sawah dan parit, juga pada kolam yang mendapatkan air atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan betok memiliki sifat biologis yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya dalam hal pemanfaatan air sebagai media hidupnya. Salah satu kelebihan tersebut adalah bahwa ikan betok memiliki *labyrinth* yang berfungsi sebagai alat pernafasan tambahan (Thoyibah, 2012).



Gambar 2.4 Ikan Betok (Thoyibah, 2012)

Belut adalah kelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk dalam suku *Synbranchidae*. Sebagai bahan pangan, ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Mengingat besarnya peranan gizi bagi kesehatan, ikan merupakan pilihan tepat untuk diet di masa yang akan datang (Sarwono, 1997).



Gambar 2.5 Belut (Sarwono, 1997)

Ikan nilem adalah salah satu komoditas ikan air tawar yang belum banyak dibudidayakan. Ikan nilem ini mempunyai cita rasa yang sangat spesifik dan gurih dibandingkan ikan air tawar lainnya karena ikan ini mengandung sodium glutamat dalam daging yang terbentuk alami yang mungkin disebabkan pengaruh kebiasaan

makan pakan alami plankton terutama ganggang yang tumbuh akibat pemupukan kolam. Ikan nilem tahan terhadap penyakit dan termasuk dalam kelompok omnivora (Ismayadi, 2012).



Gambar. 2.6 Ikan Nilem (Ismayadi, 2012)

Ikan Sidat (*Anguilla bicolor*) adalah species ikan yang berbentuk bulat memanjang dan memiliki sepasang sirip dada yang terletak tepat dibelakang kepala dan digolongkan sebagai ikan karnivora yang bersifat katadromus karena pada ukuran anakan sampai dewasa tinggal di perairan tawar namun ketika akan memijah beruaya ke laut dalam dan setelah memijah biasanya induk sidat akan mati. Dalam siklus hidupnya ikan sidat mempunyai beberapa tahap yakni Leptocephalus dengan bentuk lebar seperti daun, kemudian mengalami metamorphosis tubuh seperti layaknya ikan sidat namun tidak memiliki pigmen tubuh maka disebut dengan Sidat kaca (*glass eel*), Sidat kaca beruaya secara aktif kearah perairan tawar, mulai mengembangkan pigmen tubuh eksternal ketika memasuki kawasan pantai selanjutnya mulai menampakkan warna tubuh maka stadia ini disebut *elver*, perkembangan selanjutnya ikan sidat mencapai ukuran besar dengan warna tubuh coklat kekuning–kuningan hidup di perairan tawar yang disebut ikan sidat tahap (*yellow eel*). Tahap terakhir ikan sidat hidup di perairan tawar terlihat pada perubahan pigmen tubuh menjadi warna

perak, sehingga disebut ikan sidat perak (*silver eel*). Ikan sidat pada stadia ini siap melakukan ruaya dan selanjutnya memijah di laut dalam (Afandi, 2013).



Gambar. 2.7 Ikan Sidat (Afandi, 2013)

Ikan Mas sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1810-an dan mulai dibudidayakan sejak tahun 1860 di sekitar provinsi Jawa Barat. Tahun 1978 oleh Balai Penelitian Perikanan darat (sekarang Balai Penelitian Perikanan Air Tawar), ikan ini secara resmi diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani untuk dibudidayakan. Budidaya Ikan Mas yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan petani budidaya yakni di kolam, keramba, dan jaring apung (Gultom, 2002).

Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) termasuk ikan yang bersifat termofil karena mampu beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan yang ditempatinya. Dalam hal makanan, Ikan Mas tidak memilih-milih makanannya dan mudah menyesuaikan diri dengan makanan yang tersedia karena Ikan Mas tergolong omnivora (pemakan segala). Ikan Mas memiliki proses pertumbuhan yang cepat tetapi proses pematangan kelaminnya lambat sehingga sebagian besar energi pertumbuhan Ikan Mas digunakan untuk menambah berat badan tubuhnya. Hal ini menyebabkan Ikan Mas memiliki produktivitas yang tinggi. Sifat-sifat unggul inilah yang menyebabkan Ikan Mas


banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan petani budidaya, baik dalam skala kecil maupun skala besar (Gultom, 2002).



Gambar. 2.8 Ikan Mas (Gultom, 2002)

Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, berbadan panjang berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah, karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya (Hernowo, 2001).

Ikan patin (*Pangasius nasutus*) merupakan ikan istimewa, karena selain sebagai ikan konsumsi yang tergolong mewah, ikan patin juga digunakan sebagai ikan hias. Pada saat masih berukuran kecil (5-15 cm), ikan patin banyak dipelihara sebagai ikan hias. Sebagai ikan konsumsi, ikan patin mempunyai nilai ekonomis yang termasuk tinggi (Hernowo, 2001).



Gambar. 2.9 Ikan Patin (Hernowo, 2001)

Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika tropis yang termasuk dalam famili Loricariidae, namun tidak semua anggota Loricariidae adalah sapu-sapu. Dalam perdagangan ikan internasional ia dikenal sebagai plecostomus atau singkatannya, plecos dan plecs. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai tetapi alatnya yang dipakai sebagai nama (sapu) sedangkan di Malaysia orang menyebutnya “ikan bandaraya” karena fungsinya seperti petugas pembersih kota (“bandar”). Ikan sapu-sapu ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat (Susanto, 2004).

Ikan Sapu-sapu dapat hidup secara optimal di perairan tropis dengan kisaran pH 7-7,5 dan suhu antara 23-28°C. Walaupun demikian, ikan ini masih dapat hidup dengan baik pada kondisi fisika kimia perairan yang kurang baik sehingga dapat berperan sebagai indikator lingkungan. Ikan Sapu-sapu biasa mengkonsumsi alga yang melekat pada bebatuan, tumbuhan air, dan detritus. Sapu-sapu juga mengkonsumsi bangkai ikan dan hewan-hewan lain yang tenggelam di dasar perairan, sehingga Ikan Sapu-sapu digolongkan ke dalam kelompok omnivora (Susanto, 2004).



Gambar. 2.10 Ikan Sapu-sapu (Susanto, 2004)

Ikan belanak adalah ikan hetero seksual yang mana dalam satu spesies betina dan jantannya terpisah. Berdasarkan organ tempat embrio berkembang, ikan belanak tergolong dalam ikan ovipar (bertelur). Ovarium ikan belanak termasuk ke dalam tipe kriptovarian yang berarti ovariumnya bersatu dengan saluran telur. Jadi telur yang di ovulasikan tidak akan melalui rongga tubuh melainkan langsung ke saluran telur (Sulistiono, 2001).

Ikan dari famili Mugilidae termasuk ikan “circum global”, tersebar di laut, estuaria dan perairan pantai daerah tropik dan subtropik. Merupakan ikan bentopelagik (hidup didasar sampai permukaan air) dan bergerombol dalam jumlah banyak. Penyebaran ikan belanak sangat luas (all tropical and temperate seas) meliputi ; Indo-Pacific, laut merah, Jepang bagian utara, dan Afrika Selatan. Famili ini diperkirakan mempunyai 64 spesies dan sekitar 28 spesies ikan ini terdapat di Indonesia (Sulistiono, 2001).

Famili Mugillidae merupakan ikan yang mempunyai prospek yang paling baik untuk dijadikan ikan budidaya diantara ikan laut dan air payau. Hal ini disebabkan selain penyebarannya luas, ikan – ikan tersebut juga mampu bertoleransi pada

kondisi-kondisi yang ekstrim terhadap salinitas, suhu, dan juga dapat menyesuaikan terhadap keadaan makanan di berbagai macam habitat. Dilihat dari segi pemasaran, Ikan belanak banyak disukai masyarakat baik sebagai ikan segar atau sebagai ikan yang telah diawetkan secara tradisional (Sulistiono, 2001).

Ikan belanak (*Liza* sp, *Mugil* sp, *Valamugil* sp) merupakan jenis ikan pantai yang umumnya melakukan pemijahan di daerah pantai dengan salinitas yang agak tinggi. Telur-telur dikeluarkan begitu saja dan terbawa arus sampai ke muara sungai. Anak-anak belanak akan bergerak ke tambak dan bahkan ada yang masuk ke perairan tawar. Karena dilakukan pada kolam atau air terbuka, maka ikan belanak juga termasuk dalam golongan ikan Pelaghopil (Sulistiono, 2001).



Gambar 2.11 Ikan Belanak (Sulistiono, 2001)

Ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata*) merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial. Rasanya yang enak dan kandungan gizi yang tinggi membuat ikan ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi di antara ikan air tawar lainnya. Selama ini, ikan betutu sebagian besar langsung diambil dari alam dan masih sangat sedikit yang melakukan proses pembudidayaan (Effendi,2002).

Ikan Betutu (*Oxyeleotris marmorata*) adalah nama ikan air tawar. Dalam bahasa Inggris disebut marble goby atau marble sleeper, merujuk pada pola-pola warna di tubuhnya yang serupa batu pualam kemerahan. Meskipun jarang yang berukuran besar, ikan yang banyak terdapat di negara-negara Asia Tenggara ini (termasuk Indonesia) diburu oleh banyak pemancing karena tarikannya yang kuat dan tiba-tiba dan karena khasiat yang ditawarkan oleh ikan ini (Effendi,2002).



Gambar 2.12 Ikan Betutu (Effendi,2002)

Danau Tempe merupakan danau yang sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satu spesies ikan yang hidup di daerah tersebut adalah ikan beloso. Ikan beloso merupakan salah satu ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang mengalami penurunan populasi akibat tingginya tingkat eksploitasi dan perubahan kondisi lingkungan, dimana telah terjadi sedimentasi dan pencemaran di lingkungan perairan D. Tempe. Upaya pengelolaan terhadap sumberdaya ikan beloso (*Glossogobius giuris*) belum dilakukan secara optimal dikarenakan informasi mengenai pemanfaatan dan pengembangannya masih sangat minim (Unru, 2010)



Gambar 2.13 Ikan Beloso (Unru, 2010)

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air terbatas dengan padat tebar tinggi, teknologi budidaya yang relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, pemasarannya relatif mudah serta modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Lele juga kaya akan gizi yaitu protein sebesar 20 % dan sangat baik untuk kesehatan karena tergolong makanan dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan mineral yang tinggi. Dalam setiap 100 gram lele memiliki kandungan lemak hanya dua gram, jauh lebih rendah daripada daging sapi sebesar 14 gram apalagi daging ayam yaitu sebesar 25 gram (Khairuman, 2002).



Gambar 2.14 Ikan Lele (Khairuman, 2002)

Ikan tawes merupakan salah satu ikan asli Indonesia. Ikan tawes dalam habitat aslinya adalah ikan yang berkembang biak disungai, danau dan rawa-rawa dengan

lokasi yang disukai adalah perairan dengan air yang jernih dan terdapat aliran air, mengingat ikan ini memiliki sifat biologis yang membutuhkan banyak oksigen dan hidup di perairan tawar dengan suhu tropis 22 – 28°C, serta pH 7. Ikan ini dapat ditemukan di dasar sungai mengalir pada kedalaman hingga lebih dari 15 m, rawa banjir dan waduk. Ikan tawes adalah termasuk ikan herbivore atau pemakan tumbuhan (Khairuman, 2008).



Gambar 2.15 Ikan Tawes (Khairuman, 2008)

Menurut Effendie, (2000), menyatakan bahwa pertumbuhan dan kelimpahan populasi ikan di perairan ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi, disamping faktor fisik kimiawi yang berpengaruh langsung terhadap ikan maupun secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap jenis organisme makanan.

Populasi ikan ini terdapat di daerah Sulawesi Selatan meliputi sungai di Kabupaten Maros, Pangkep, Bone, Soppeng dan Gowa. Khusus ikan jantan yang memiliki penampilan menawan sebagai ikan hias, memiliki permintaan tinggi, menyebabkan penangkapan yang sangat intensif dan kerusakan kondisi habitat alaminya, sehingga ikan ini termasuk dalam kategori terancam punah dalam sejak IUCN 1996 (Kottelat, 1996, IUCN, 1996).

C. Ayat yang Relevan

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa dalil yang memiliki relevansi diantaranya. Dalam al-QS Al-Maidah/..96 Allah swt berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
 صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”.

Tafsir :

“Dihalalkan bagi kamu berburu binatang laut” Maksud ayat tersebut bahwasannya bukan laut saja, melainkan sungai dan danau atau tambak juga dihalalkan dalam pemburuan binatang laut. Ayat tersebut ulama sementara memahami kata-kata binatang buruan laut dalam arti segala sesuatu yang diperoleh dengan upaya atau usaha untuk mendapatkan binatang tersebut (Syihab, 2002).

“Dan makanannya adalah makanan lezat bagi kamu” . Makanannya berasal dari laut pula, seperti ikan, udang ataupun sejenisnya yang hidup di sana dan binatang laut tersebut tidak dapat hidup didarat (hidup di dua alam). Sedangkan yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan memburunya. Ada juga yang

memahami kata Makanan tersebut dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan, sehingga dalam memakannya terasa lezat bagi penikmatnya (Syihab, 2002).

“Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atas kamu binatang buruan darat, selama kamu dalam berihram” Ketika seseorang dalam keadaan berihram selama pejalanannya di Tanah Haram (Makkah), diharamkan atas orang tersebut membunuh binatang darat, *“Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”* (Syihab, 2002).

➤ Dalam QS Al-Fathir/12 Allah swt berfirman:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاعْلَمُوا تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”.

Tafsir :

Dalam ilmu dan ketetapan Kami, dua jenis lautan--kendati mengandung beberapa manfaat yang sama--tidak dapat disamakan. Yang satu airnya tawar dan dapat menghilangkan dahaga karena begitu segar, sedap dan mudah diminum, sedangkan yang lain mengandung unsur garam yang sangat asin. Dari kedua jenis

lautan itu, kalian dapat menyantap daging segar dari ikan-ikan yang kalian tangkap. Dari air asin, kalian dapat memperoleh sesuatu yang dapat dijadikan perhiasan semisal permata dan manik-manik (marjan). Dan perhatikanlah, wahai orang yang mengamati, bagaimana bahtera-bahtera itu berlayar membelah lautan dengan sangat cepat untuk berniaga mencari karunia Allah. Dengan adanya pelbagai nikmat itu, seharusnya kalian bersyukur kepada Tuhan. Di antara bukti kekuasaan Allah yang dapat dilihat manusia adalah berlayarnya bahtera membelah lautan sesuai hukum yang Allah tetapkan di alam raya ini, yang kemudian dijelaskan oleh suatu teori yang disebut dengan hukum benda terapung (*Qânûn al-ajsâm al-thâfiyah*) (Syihab, 2002).

Selain itu, merupakan sesuatu yang lazim kita dengar bahwa beberapa jenis perhiasan diperoleh dari laut yang asin. Karenanya, sebagian orang masih menganggap suatu hal yang mustahil jika air tawar pun mengandung perhiasan. Tetapi ilmu pengetahuan dan fakta menegaskan kesalahan anggapan itu. Mutiara, misalnya, beberapa jenis tertentu memang dihasilkan oleh lautan yang asin, tetapi jenis lainnya juga ditemukan dalam kerang-kerang sungai yang tawar. Dari itu, selain pencarian mutiara di lautan, kita juga mendengar adanya pencarian mutiara air tawar di beberapa negara seperti Inggris, Skotlandia, Cekoslovakia, Jepang dan lain-lain. Dalam konteks ini, kita bisa memasukkan batu-batu mulia yang dihasilkan oleh air tawar seperti berlian yang terendap dalam lumpur sungai kering yang dikenal dengan lumut. Yakut, sejenis safir berwarna biru atau hijau, juga ditemukan di beberapa sungai di Burma, Thailand dan Srilangka. Beberapa sungai di Brazil dan Siberia (Rusia) juga mengandung plorosikat aluminium yang berwarna kuning atau coklat.

Circon, batu mulia yang mirip berlian, dengan berbagai jenisnya, diperoleh dari sungai-sungai berair tawar. Di antara batu semi mulia yang ada di air tawar dan sering juga digunakan sebagai perhiasan adalah topaz (Syihab, 2002).

➤ Dalam QS An Nahl/14 Allah swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:


“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Tafsir :

Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan-ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian (Syihab, 2002).

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Allah tidak hanya menjamin air dan makanan untuk manusia dan diletakkannya di laut, tapi juga sampai masalah perhiasan manusia.
2. Satu keistimewaan laut adalah manusia dapat memanfaatkan perahu dan kapal untuk transportasinya dan ini merupakan perhatian Allah.


D. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi ikan air tawar di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Danau Tempe Kab. Wajo, Sulawesi Selatan.



Gambar 3.1 Peta lokasi Danau Tempe (Laporan Tahunan DKP Kab. Wajo, 2005)

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok ikan air tawar yang ada di perairan Danau Tempe yakni sepat siam, betok, belanak, bungo, bunaka, mas, tambakan, tawes, masapi, nila, lele, nilem, sepat rawa, belut, mujaer dan nila.

2. Sampel

Sampel adalah ikan air tawar yang ada di perairan Danau Tempe kemudian melakukan penangkapan di kabupaten Wajo, aliran sungai Kab. Sidrap dan aliran sungai Kab. Soppeng.

C. Variabel Penelitian

Jenis variabel pada penelitian ini adalah Variabel Tunggal yaitu keanekaragaman jenis ikan air tawar.

D. Defenisi Operasional Variabel

Identifikasi dilakukan dengan menggunakan sampel ikan air tawar di Danau Tempe Kabupaten Wajo.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jaring dan pukot harimau sebagai alat tangkap, perahu sebagai armada penangkapan, kamera untuk mengambil gambar, buku identifikasi untuk mengidentifikasi sampel ikan, mistar besi untuk mengukur panjang baku tubuh ikan, *coolbox* sebagai wadah penyimpanan ikan, *Water Quality Shaker* untuk mengukur kadar pH, DO, salinitas dan suhu.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis ikan yang ada di Danau Tempe dan formalin untuk pengawetan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling* dengan menentukan beberapa titik stasiun pengambilan sampel ikan yang diidentifikasi yakni daerah Kab. Wajo, aliran sungai Kab. Soppeng dan aliran sungai Kab. Sidrap, serta melakukan wawancara.

Sebagai data pendukung terhadap penelitian utama, diukur pula parameter kualitas air Danau Tempe yang terdiri dari parameter fisika (temperatur) dan parameter kimia (pH, DO dan Salinitas).

G. Analisis Data

Indeks Keanekaragaman dengan menggunakan rumus Shannon dan Wiener:

$$H = - \sum \left\{ \left(\frac{n_i}{n} \right) \ln \left(\frac{n_i}{n} \right) \right\} \quad (\text{Odum, 1993})$$

di mana:

H = Indeks Keanekaragaman

n_i = jumlah individu

n = jumlah total individu

dengan kriteria:

$H' < 1$ = Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang rendah

$1 > H' > 3$ = Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang sedang

$H' > 3$ = Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Keanekaragaman Ikan Air Tawar di Perairan Danau Tempe

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada stasiun I yang terletak di Kab. Wajo didapatkan 16 jenis ikan dengan jumlah populasi keseluruhan 142. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun I yang Terletak di Kab. Wajo

| STASIUN | CLASSIS | SPECIES | JUMLAH INDIVIDU | JUMLAH JENIS |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| I | PISCES | <i>Anabas testudineus</i> | 18 | 16 |
| | | <i>Anguilla australis</i> | 1 | |
| | | <i>Barbonymus gonionotus</i> | 14 | |
| | | <i>Channa striata</i> | 9 | |
| | | <i>Clarias batrachus</i> | 4 | |
| | | <i>Cyprinus carpio</i> | 1 | |
| | | <i>Glossogobius giuris</i> | 14 | |
| | | <i>Hypostomus plecostomus</i> | 23 | |
| | | <i>Monopterus albus</i> | 6 | |
| | | <i>Mugil cephalus</i> | 7 | |
| | | <i>Oxyeleotris marmorata</i> | 7 | |
| | | <i>Oreochromis mossambicus</i> | 6 | |
| | | <i>Oreochromis niloticus</i> | 3 | |
| | | <i>Osteochilus hasselti</i> | 16 | |
| | | <i>Pangasius nasutus</i> | 5 | |
| | | <i>Trichogaster pectoralis</i> | 8 | |
| JUMLAH | | | 142 | 16 |

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada stasiun II yang terletak di aliran sungai Kab. Soppeng didapatkan 16 jenis ikan dengan jumlah populasi keseluruhan 127. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun II yang Terletak di aliran sungai Kab. Soppeng

| STASIUN | CLASSIS | SPECIES | JUMLAH INDIVIDU | JUMLAH JENIS |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| II | PISCES | <i>Anabas testudineus</i> | 16 | 16 |
| | | <i>Anguilla australis</i> | 2 | |
| | | <i>Barbonymus gonionotus</i> | 10 | |
| | | <i>Channa striata</i> | 7 | |
| | | <i>Clarias batrachus</i> | 6 | |
| | | <i>Cyprinus carpio</i> | 3 | |
| | | <i>Glossogobius giuris</i> | 16 | |
| | | <i>Hypostomus plecostomus</i> | 17 | |
| | | <i>Monopterus albus</i> | 3 | |
| | | <i>Mugil cephalus</i> | 4 | |
| | | <i>Oxyeleotris marmorata</i> | 7 | |
| | | <i>Oreochromis mossambicus</i> | 9 | |
| | | <i>Oreochromis niloticus</i> | 5 | |
| | | <i>Osteochilus hasselti</i> | 9 | |
| | | <i>Pangasius nasutus</i> | 8 | |
| <i>Trichogaster pectoralis</i> | 5 | | | |
| JUMLAH | | | 127 | 16 |

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada stasiun III yang terletak di aliran sungai Kab. Sidrap didapatkan 16 jenis ikan dengan jumlah populasi keseluruhan 122. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Keanekaragaman Ikan pada Stasiun III yang Terletak di aliran sungai Kab. Sidrap

| STASIUN | CLASSIS | SPECIES | JUMLAH INDIVIDU | JUMLAH JENIS |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| III | PISCES | <i>Anabas testudineus</i> | 21 | 16 |
| | | <i>Anguilla australis</i> | 1 | |
| | | <i>Barbonymus gonionotus</i> | 8 | |
| | | <i>Channa striata</i> | 7 | |
| | | <i>Clarias batrachus</i> | 5 | |
| | | <i>Cyprinus carpio</i> | 3 | |
| | | <i>Glossogobius giuris</i> | 11 | |
| | | <i>Hypostomus plecostomus</i> | 20 | |
| | | <i>Monopterus albus</i> | 4 | |
| | | <i>Mugil cephalus</i> | 9 | |
| | | <i>Oxyeleotris marmorata</i> | 6 | |
| | | <i>Oreochromis mossambicus</i> | 6 | |
| | | <i>Oreochromis niloticus</i> | 2 | |
| | | <i>Osteochilus hasselti</i> | 6 | |
| | | <i>Pangasius nasutus</i> | 7 | |
| | | <i>Trichogaster pectoralis</i> | 6 | |
| JUMLAH | | | 122 | 16 |

2. Indeks Keanekaragaman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan indeks keanekaragaman ikan air tawar di Danau tempe dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.4 Indeks Keanekaragaman Ikan di Danau Tempe

| STASIUN | H' | KATEGORI |
|---------|--------|----------|
| I | 49,458 | TINGGI |
| II | 47,385 | TINGGI |
| III | 48,471 | TINGGI |

Keterangan :

- I : Kab. Wajo
- II : Aliran Sungai Kab. Soppeng
- III : Aliran Sungai Kab. Sidrap
- H' : Indeks Keanekaragaman

Grafik indeks keanekaragaman



Gambar 4.1 Grafik

Keterangan :

- I : Kab. Wajo
- II : Aliran Sungai Kab. Soppeng
- III : Aliran Sungai Kab. Sidrap

3. Parameter Lingkungan

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan pada parameter lingkungan di Danau tempe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Parameter Fisika Kimia

| STASIUN | SUHU (°C) | pH | DO | SALINITAS |
|---------|-----------|------|-------|-----------|
| I | 54 | 7 | 20,50 | 11,18 |
| II | 54 | 7 | 40,24 | 9,39 |
| III | 25 | 6,28 | 47,59 | 9,20 |

Keterangan :

- I : Kab. Wajo
- II : Aliran Sungai Kab. Soppeng
- III : Aliran Sungai Kab. Sidrap

B. Pembahasan

Berdasarkan pengambilan sampel yang telah dilakukan diperoleh sejumlah 391 ikan dari 3 stasiun di perairan danau Tempe dan teridentifikasi dalam 16 spesies yang tergolong dalam 9 ordo dan 11 family. Adapun jenis ikan tersebut sebagai berikut :

1. Belut (*Monopterus albus*)

Belut merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang tidak bersisik dan mampu hidup di air keruh. Hewan ini merupakan ikan darat yang tidak bersisik dan banyak dijumpai di daerah persawahan dan di rawa-rawa. Pada musim kemarau, belut membuat lubang didalam tanah yang lembab sebagai upaya untuk mempertahankan hidup.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan panjang belut mencapai 51 cm, dengan panjang kepala 1,2 cm dan panjang moncong 0,5 cm. Tidak memiliki sirip, kecuali sirip ekor yang memanjang. Bentuk tubuhnya menyerupai ular dengan tubuh licin.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Vertebrata
Class : Pisces
Ordo : Synbranchoidea
Family : Synbranchidae
Genus : *Monopterus*
Spesies : *Monopterus albus*
Nama Daerah : Bale Lenrong

2. Ikan Belanak (*Mugil cephalus*)

Ikan belanak (*Mugil cephalus*) tersebar luas di seluruh dunia mulai dari 42° LS sampai 42° LU, yang meliputi daerah estuaria, perairan tawar, maupun perairan

pantai. Ikan belanak memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Populasinya tersebar di perairan tropis dan subtropis. Kebanyakan ikan belanak ditemukan secara berkelompok 20-30 ekor yang berenang hilir mudik di permukaan estuaria. Ikan belanak merupakan jenis ikan yang berenang dengan cepat dan berhabitat di perairan laut yang memiliki aliran air relatif deras.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk ekor *homocercal*, sedangkan bentuk sisik pada ikan belanak *ctenoid* (berbentuk sisir) dan warna didominasi putih perak, letak mulut ikan terletak diujung depan kepala. Panjangnya mencapai 17 cm.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Percomorphi
Family : Mugilidae
Genus : Mugil
Spesies : *Mugil cephalus*

Nama Daerah : Bale Belanak

3. Ikan Beloso (*Glossogobius giuris*)

Ikan beloso termasuk ikan predator, makanannya berupa udang dan ikan-ikan kecil baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Ikan ini juga termasuk dalam kategori ikan demersal yakni ikan yang hidup dan makan di dasar (zona demersal). Ikan

beloso kecil dialamnya biasanya hidup secara bergerombol dan jarang berenang, mereka lebih suka berdiam atau menyembunyikan diri di pasir, namun ketika ada mangsa lewat ikan ini dengan gesit langsung berenang mengejarnya.

Adapun hasil pengamatan yang telah dilakukan ikan beloso memiliki panjang tubuh 14 cm, tubuhnya diselimuti dengan sisik, dengan tipe sisik *cycnoid*, bentuk mulut terminal. Tubuhnya berwarna perak dan abu-abu kecoklatan pada bagian punggungnya.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Perciformes
Family : Gobidae
Genus : *Glossogobius*
Species : *Glossogobius giuris*
Nama Daerah : Bale Bungo

4. Ikan Betok (*Anabas testudineus*)

Ikan betok merupakan jenis *blackwater fish*, yaitu ikan yang memiliki ketahanan terhadap tekanan lingkungan. Ikan betok merupakan ikan asli Indonesia yang hidup pada habitat perairan tawar dan payau. Di samping itu, ikan ini umumnya ditemukan di rawa, sawah dan parit, juga pada kolam yang mendapatkan air atau berhubungan dengan saluran air terbuka.

Ikan betok memiliki sifat biologis yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya dalam hal pemanfaatan air sebagai media hidupnya. Salah satu kelebihan tersebut adalah bahwa ikan betok memiliki *labyrinth* yang berfungsi sebagai alat pernafasan tambahan. Hal ini sangat efektif dalam membantu pengambilan oksigen di udara.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang ikan betok 15 cm, memiliki mulut kecil, bersisik keras kaku, sirip punggung berwarna gelap agak kecoklatan atau kehijauan. Pada bagian tubuhnya berwarna kekuningan, terutama dibagian bawah, dengan garis-garis gelap melintang yang samar dan tidak beraturan.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Percomorphi
Family : Anabantidae
Genus : Anabas
Spesies : *Anabas testudineus*

Nama Daerah : Bale Oseng

5. Ikan Betutu (*Oxyeleotris marmorata*)

Ikan betutu merupakan salah satu jenis ikan air tawar. Ikan ini memiliki penampilan yang sangat khas sehingga mudah diingat. Ikan betutu mendapatkan julukan ikan malas karena ikan ini memang malas berpindah tempat. Sekalipun

dusik, dia cenderung diam saja di dasar air. Hanya di malam hari ikan betutu aktif mencari makan (*nocturnal*) berupa udang-udang kecil, kepiting, dan siput air. Ikan ini banyak kita jumpai di sungai-sungai, rawa, waduk ataupun saluran-saluran air.

Dari hasil pengamatan morfologi yang telah dilakukan bentuk badan ikan betutu bulat dan memiliki panjang tubuh sekitar 13 cm, badan bagian depan bundar dan bagian belakang agak pipih, kepala rendah, mata besar, mulut lebar, rahang bawah agak kedepan dibandingkan rahang atas. Perut luas dan sirip punggung terdiri atas dua bagian. Memiliki sisik sangat kecil, halus dan lembut sehingga tampak hampir tidak bersisik. Tipe sisik pada sebagian tubuhnya merupakan tipe sisik ctenoid sedangkan dibagian kepala hingga bagian dada diselitnuti sisik *cycloid*. Warna badan kekuning-kuningan dengan bercak-bercak hitam keabu-abuan seperti di batik.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Phylum : Chordata
 Class : Pisces
 Ordo : Gobioidae
 Family : Eleotridae
 Genus : *Oxyeleotris*
 Spesies : *Oxyeleotris marmorata*
 Nama Daerah : Bale Lappuso

6. Ikan Gabus (*Channa striata*)

Ikan Gabus termasuk ke dalam hewan karnivora yang hidup di dasar perairan, cenderung hidup di rawa, sungai dan perairan keruh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bentuk tubuh ikan memanjang dengan panjang tubuh 24 cm, permukaan tubuh dan kepala ditutupi oleh sisik tebal dengan bentuk *ctenoid* dan permukaannya kasar. Kepala berbentuk seperti kepala ular, tubuh bagian punggung berwarna coklat kehitaman dan bagian perut putih kecoklatan.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Perciformes
Family : Channidae
Genus : *Channa*
Spesies : *Channa striata*
Nama Daerah : Bale Bolong

7. Ikan Lele (*Clarias batrachus*)

Ikan lele merupakan salah satu hasil perikanan budidaya yang menempati urutan teratas dalam jumlah produksi yang dihasilkan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan panjang ikan lele mencapai 26 cm, dengan tubuh yang licin. Memiliki kepala yang keras di bagian atas dengan mata yang kecil dan mulut lebar yang terletak di ujung moncong, dilengkapi dengan empat pasang sungut peraba yang berguna untuk bergerak di air yang gelap.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Cypriniformes
Family : Claridae
Genus : Clarias
Species : *Clarias batrachus*
Nama Daerah : Bale Samelang

8. Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)

Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik. Namun, makanan utamanya adalah tumbuhan dan binatang yang terdapat di dasar dan tepi perairan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ikan mas memiliki panjang tubuh 23 cm, bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Tubuhnya ditutupi oleh sisik dengan tipe *cycloid* (lingkaran) berwarna kuning keemasan. Memiliki sirip punggung (*dorsal*) berbentuk memanjang dan terletak di bagian permukaan tubuh, berseberangan dengan permukaan sirip perut (*ventral*) bagian belakang sirip punggung memiliki jari-jari keras sedangkan bagian akhir berbentuk gerigi, sirip dubur (*anal*) bagian belakang juga memiliki jari-jari keras, sirip ekor (*caudal*) berbentuk cagak dan berukuran cukup besar.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Cypriniformes
Famili : Cyprinidae
Genus : Cyprinus
Spesies : *Cyprinus carpio*
Nama Daerah : Bale Ulaweng

9. Ikan Mujair (*Oreochromis mossambicus*)

Ikan Mujair adalah sejenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Penyebaran alami ikan ini adalah perairan Afrika dan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Pak Mujair di muara Sungai Serang pantai selatan Blitar, Jawa Timur pada tahun 1939. Meski masih menjadi misteri, bagaimana ikan itu bisa sampai ke muara terpencil di selatan Blitar, tak urung ikan tersebut dinamai 'mujair' untuk mengenang sang penemu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan panjang tubuh ikan mujair mencapai 21 cm. Bentuk badannya pipih dengan warna hitam, keabu-abuan, coklat kekuningan, dengan tipe sisik *ctenoid*. Mulutnya agak besar dan mempunyai gigi yang halus. Letak mulut di ujung tubuh.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata

Class : Pisces
Ordo : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Oreochromis
Species : *Oreochromis mossambicus*
Nama daerah : Bale Mujair

10. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segala (omnivora), pemakan plankton, sampai pemakan aneka tumbuhan sehingga ikan ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan nila dapat hidup di perairan yang dalam dan luas maupun di kolam yang sempit dan dangkal. Nila juga dapat hidup di sungai yang tidak terlalu deras alirannya, di waduk, rawa, sawah, tambak air payau atau di dalam jaring terapung di laut.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan nila 17 cm, memiliki tipe sisik *ctenoid*, tipe ekor *homocercal*, dengan mulut terletak di bagian ujung kepala. Tubuhnya berwarna hitam, namun pada bagian ekor berwarna kemerahan.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Percomorphi

Divisi : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Oreochromis
Spesies : *Oreochromis niloticus*
Nama Daerah : Bale Kamboja

11. Ikan Nilem (*Osteochilus hasselti*)

Ikan nilem merupakan ikan sungai yang lincah umumnya di temukan di perairan mengalir atau agak tergenang serta kaya akan oksigen terlarut. Ikan nilem ini banyak tersebar luas di wilayah Asia seperti Indonesia, Malaysia serta Thailand dan secara umum dibudidayakan.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan nilem 13 cm, bentuk tubuh ikan nilem agak memanjang dan pipih, memiliki tipe sisik *cycloid*. Pada sudut mulutnya terdapat dua pasang sungut. Tubuhnya berwarna perak, pada bagian sirip dada dan sirip perut berwarna kecoklatan.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Ostariophysi
Famili : Cyprinidae
Genus : Osteochilus
Species : *Osteochilus hasselti*

Nama Daerah : Bale Doyo'

12. Ikan Patin (*Pangasius nasutus*)

Ikan patin adalah salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Ikan Patin merupakan jenis ikan air tawar yang mendiami kawasan-kawasan sungai dan danau. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah. Rasa dagingnya lezat dan gurih mengakibatkan harga jualnya tinggi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan panjang tubuh ikan patin 14 cm, bentuk tubuh memanjang, berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik, memiliki kepala yang kecil, mulut terletak diujung kepala agak ke bawah dan pada sudut mulut terdapat dua pasang sungut peraba.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phyllum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Ostariophysi
Family : Schilbeidae
Genus : Pangasius
Spesies : *Pangasius nasutus*
Nama Daerah : Bale Patin

13. Ikan Sapu-sapu (*Hypostomus plecostomus*)

Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika tropis yang termasuk dalam famili Loricariidae, namun tidak semua anggota *Loricariidae* adalah sapu-sapu. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai tetapi alatnya yang dipakai sebagai nama (sapu) sedangkan di Malaysia orang menyebutnya “ikan bandaraya” karena fungsinya seperti petugas pembersih kota (bandar). Ikan sapu-sapu ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja. Meskipun demikian, dia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan sapu-sapu 23 cm, memiliki tubuh yang ditutupi dengan sisik keras kecuali bagian perutnya, bentuk tubuh pipih, kepala lebar, mulut mengarah ke bawah, tubuh berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam diseluruh tubuhnya.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Siluriformes
Famili : Loricariidae
Genus : Hypostomus
Spesies : *Hypostomus plecostomus*
Nama Daerah : Bale Tokke'

14. Ikan Sepat Siam (*Trichogaster pectoralis*)

Ikan Sepat Siam merupakan ikan yang memiliki habitat di perairan tawar. Ikan Sepat Siam merupakan kelompok ikan yang mempunyai pernafasan tambahan berupa tulang tipis yang berlekuk-lekuk seperti buangan karang yang disebut labirin dengan mengambil oksigen langsung dari udara.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan sepat saim 18 cm, bentuk tubuh pipih, mulut kecil dan dapat disembulkan serta terdapat sungut pada sudut mulut. Warna badan pada bagian punggung hijau kegelapan. Pada bagian kepala dan badan terdapat garis-garis yang melintang dan dari mata sampai ekor terdapat garis memanjang yang terputus.

Klasifikasi menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Phylum : Chordata
 Class : Pisces
 Ordo : Perciformes
 Family : Osphronemidae
 Genus : *Trichogaster*
 Spesies : *Trichogaster pectoralis*
 Nama Daerah : Bale Cambang

15. Ikan Sidat (*Anguilla australis*)

Ikan sidat termasuk ke dalam famili *Anguillidae* dan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan banyak nama daerah. Beberapa nama daerah tersebut antara lain

ikan uling, masapi, moa, lumbon, larak, lubang, gateng, denong, mengaling, lara, luncah, sigili dan ikan pelus (Jawa).

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan sidat 53 cm dengan tubuh yang licin. Pada bagian sirip punggung berwarna coklat kehitaman dan pada bagian perut berwarna kekuningan.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Phylum : Chordata
 Classis : Pisces
 Divisio : Teleostei
 Ordo : Anguilliformes
 Family : Anguillidae
 Genus : *Anguilla*
 Species : *Anguilla australis*
 Nama Daerah : Bale Massapi

16. Ikan Tawes (*Barbonymus gonionotus*)

Ikan tawes merupakan salah satu jenis ikan sungai yang biasa dikonsumsi di daerah Asia Tenggara. Ikan tawes mempunyai ukuran tubuh sedang dan mudah dibudidayakan di kolam-kolam. Menurut catatan FAO, ikan ini pernah diintroduksi ke Filipina (1956) dan ke India (1972). Ikan ini masih berkerabat dengan ikan nilam.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan panjang tubuh ikan tawes 13 cm, bentuk badan agak pipih dengan punggung meninggi, memiliki kepala kecil, dengan

moncung meruncing dan mulut kecil. Tubuhnya berwarna putih perak, pada sirip ekor dan sirip dubur berwarna agak kekuningan.

Klasifikasi menurut Saanin (1968) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : *Barbonymus*
Spesies : *Barbonymus gonion*
Nama Daerah : Bale Kande

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan 16 jenis ikan pada setiap stasiun dengan jumlah populasi 142 pada stasiun I yang terletak di Kab. Wajo, sedangkan pada stasiun II terletak dialiran sungai Kab. Soppeng terdapat 127 populasi dan pada stasiun III terletak dialiran sungai Kab. Sidrap didapatkan 122 jumlah populasi dari keseluruhan jumlah spesies.
2. Indeks keanekaragaman pada stasiun I (Kab. Wajo) yaitu 2,382, pada stasiun II (Kab. Soppeng) yaitu 2,582 dan pada stasiun III (Kab. Sidrap) yaitu 2,526. Adapun parameter fisika kimia pada stasiun I (Kab. Wajo) yaitu suhu berkisar 54°C dan memiliki pH 7, sedangkan pada stasiun II (terletak dialiran sungai Kab. Soppeng) yaitu suhu 54°C dan pH 7, dan pada stasiun III (terletak dialiran sungai Kab. Sidrap) yaitu suhu 25°C dan pH 6,28.

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa begitu besar kuasa Allah SWT. yang telah menciptakan alam ini. Allah SWT. tidak hanya menciptakan hewan darat tetapi Allah SWT. juga menciptakan hewan yang berada di laut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan yakni agar kiranya masyarakat menjaga kelestarian Danau Tempe agar populasinya tidak mengalami kepunahan dan

tidak membuat Danau tersebut menjadi tercemar karena sesungguhnya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dengan adanya penelitian ini semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

KEPUSTAKAAN

- Afandi, Mochammad. *Aplikasi pakan komersil yang disubstitusi tepung silase daun mengkudu dengan inokulan khamir laut sebagai pakan ikan sidat (*Anguilla bicolor*)*. Surabaya: Universitas Hang Tuah. 2013.
- Amin, M dan Mustafa, A. *Kualitas air Danau Tempe pada saat air naik dan surut, hal. 183-198. Dalam Prosiding Semiloka Nasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau dan Waduk*. Bandung: Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, 2000.
- Azasi, I. *Komposisi Jenis, Kelimpahan, Ukuran, dan Tingkat Kematangan Gonad Ikan Yang Tertangkap Dengan Sero Di Desa Bontolebbang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makassar: Hasanuddin University Press. 2009.
- Bappedal. *Penataan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Lingkungan Perairan Danau Tempe, Sulawesi Selatan*. Draf. Laporan Akhir Bappedal Regional III. Kabupaten Wajo. 1999.
- Charraborty, S.B, and S. Banerjee. *Culture of Monoseks Nile Tilapia under Different Traditional and Non-Traditional Methods in India*. India: [jurnal]. Departement Zoology. Universitas of Calcuta. 2009.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo. *Laporan tahunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo*. Kabupaten Wajo. 2005.
- Effendi,H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007.
- Effendi, I. & Y. Hadiroseyani. *Peningkatan Kelangsungan Hidup Larva Ikan Betutu, *Oxyeleotris marmorata* (Blkr.), dengan Antibiotik*. Bogor: Jurnal Akuakultur Indonesia. 2002.
- Effendie, M.I. *Biologi Perikanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. 2000.

- Gultom. *Prospek Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas Dalam Jaring Apung di Danau Toba, Desa Pasar Pangururan, Kabupaten Toba Samosir*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bogor: IPB (tidak dipublikasikan). 2002.
- Hernowo. *Pembenihan Patin*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Penebar: Swadaya. 2001.
- Ismayadi A. *Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Benih Ikan Nilem (Osteochillus hasselti) yang Dipelihara dengan Kepadatan Berbeda*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda Bogor: Bogor. 2012.
- Khairuman dan Khairul A. *Budi Daya Lele Dumbo Secara Intensif*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka. 2002.
- Khairuman, dan Amri. *Buku Pintar Budidaya 15 Ikan Konsumsi*. Jakarta: Agromedia. 2008.
- Khairuman dan K. Amri. *Pembesaran Nila di Kolam Deras*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka. 2011.
- Kottelat, M. A. *Ikan Air Tawar di Perairan Indonesia Bagian Barat dan Sulawesi*. Jakarta: Periplus Edition (HK) Limited Bekerjasama Proyek EMDi. Kantor kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 1993.
- Kuncoro, E.B. *Ensiklopedia Populer Ikan Air Tawar*. Yogyakarta: Lyli Publisher . 2009.
- Kusumaningrum, G.A, Alamsjah, M.A dan Masithah E.D. *Uji Kadar Albumin dan Pertumbuhan Ikan Gabus (Channa striata) dengan Kadar Protein Pakan Komersial yang Berbeda*. Surabaya : Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Vol. 6 No. 1, April 2014.
- Musa, A. Amiluddin, Yusuf, D. *Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan*. Makassar: Hasanuddin University Press (LEPHAS). 2005.
- Nybakken, J.W. *Biologi Laut Setau Pendekatan Ekologi*. Jakarta: PT. Gramedia. 1988.

- Odum, Eugene. *Dasar-dasar Ekologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press. 1993.
- Saanin H. *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan 1*. Bogor: Binacipta. 1968.
- Saanin H. *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan 2*. Bogor: Binacipta. 1984.
- Samuel dan Safran Makmur. *Karakteristik Biologi Beberapa Jenis Ikan Introduksi di Danau Tempe*. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum. 2010.
- Sarwono, B. *Budidaya Belut dan Sidat*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1997.
- Sugiarto. *Teknik Pembenihan Ikan Mujair dan Nila*. Edisi I, Jakarta: C.V. Simplex. 1988.
- Sulistiono, M.A, Aziz, K.A. *Pertumbuhan Ikan Belanak (Mugil dussumieri) di perairan ujung pangkah*. Jawa timur: Jurnal iktiologi Indonesia, Vol. 1, No.2 . 39-47 hal. 2001.
- Susanto DA. *Pleco, Sapu-sapu Hias Eksotis*. Jakarta : Penebar Swadaya. 2004.
- Sutrisna, P.E., *Metode Truss Morphometric untuk Identifikasi Kelamin Ikan Sepat Siam (Tricogaster pectoralis)*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman. 2007.
- Suwarni. *Modul Praktikum Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2007.
- Syihab, M, Quraisyh. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Tamsil, A. *Ikan Bungo Biologi Reproduksi dan Upaya Pelestariannya*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2000.
- Thoyibah, Z. *Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Betok (Anabas testudineus) yang dipelihara pada Salinitas Berbeda*. Jurnal Ikan Betok. Mataram : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume 9, Nomor 2, Juli 2012, Halaman 1-8.

Trijoko. Pranoto, S. *Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sepanjang Aliran Sungai Opak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Prosiding Seminar Nasional Ikan IV'06. (2006).

Unru, A.B. *Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Danau Tempe*. Kabupaten Wajo: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo. 2010.

Whitten, A. J., M. Mustafa & G. S. Henderson. *Ekologi Sulawesi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada: 708-719 pp. 1987.

RIWAYAT HIDUP



Nama Saya Resky Yunita dan saya lahir di Sengkang, 09 Juni 1994, saya di lahirkan oleh seorang ibu yang bernama Syahriani dan ayah saya bernama Nasul. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Pada tahun 2000 saya memasuki bangku sekolah dasar di SDN 200 Tempe, 6 tahun saya bertahan disana hingga lulus dan beranjak ke tahun 2006 saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Sengkang dan pada tahun 2009 saya melanjutkan sekolah di SMAN 2 Sengkang hingga tahun 2012. Setelah lulus dari sekolah menengah atas saya melanjutkan studi ke tingkat perkuliahan pada tahun 2012 di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR dan mengambil jurusan BIOLOGI.