

ESTIMATOR KERNEL PADA FUNGSI REGRESI NONPARAMETRIK

DENGAN PENDEKATAN KERNEL GAUSSIAN

(Studi Kasus: Hasil Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Telah Menikah Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Daerah Sulawesi Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan Matematika pada Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

NIRMALA
60600112023

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Besarnya masalah yang dihadapi saat ini, seolah tidak ada solusi lagi adalah ujian bagi kita. Sejauh mana kita yakin akan kesabaran Allah, bahwa solusi itu ada, bahwa harapan itu masih ada. Ibrahim berkat“ tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-Nya, kecuali orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Hjr:56)

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :

Ayah (Mashud) dan Ibu (Hj. Nurhawi) tersayang dan atas doa, nasehat, motivasi, kekuatan yang luar biasa untuk saya, kalianlah yang menjadi motivator terbesar dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Saudaraku terkhusus kakak perempuanku (Alm. Saharani) dan untuk saudara-saudariku Musdalifah, Arisal, Wilma Santi, Arisandi sebagai peyemangatku untuk penyelesaian tugas akhir ini

Sahabat-sahabatku Mawar, Ina, Eka, teman-teman Andi Ekky, Risma, Wulland, Nuqrah, Anci, Anca, dan teman-teman Kurva 2012 yang selama ini menjadi keluarga kecilku dan telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Senior-senior khususnya kak Bangkit, kak Awi, kak Ali yang selalu member nasehat dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Almamater UIN Alauddin Makassar

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2016

Penyusun,

NIRMALA

NIM: 60600112023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis Regresi.....	8
B. Regresi Nonparametrik.....	9
C. Pemilihan <i>Bandwidth</i> Optimal.....	11
D. Kelahiran Bayi.....	18
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21

D. Definisi Operasional Variabel.....22

E. Prosedur Penelitian.....23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....25

B. Pembahasan.....35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....37

B. Saran.....37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGATAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kepada penulis berupa kesehatan jasmaniah dan rohaniyah serta masih memberikan iman dan ihsan. Shalawat dan salam kita panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang tidak bias diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memohonkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis bersyukur karena skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya kepada semua pihak-pihak yang membantu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,

2. Ayahanda yang tercinta Mashud, Ibu tersayang Hj. Nurhawi, Saudara-Saudariku Musdalifah, Arizal Wilma Santi, Arisandi Mashud, keponakan-keponakanku Nila Mulyani, Muh.Dwiki Mulyawan, Rafil Alfiasyah, Khanita, Zaidan, Mikel dan semua keluarga besarku yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Prof.Dr.Musafi Pababbari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar,
4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
5. Bapak Irwan, S.Si.,M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai peguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
6. Ibu Wahidah Alwi,S.Si.,M.Si., Sekertaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak/Ibu pada Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan do'a dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
8. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,

9. Ibu Khalilah Nurfadillah, S.Si. M.Si., penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
10. Bapak Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
11. Kepada sahabatku sekaligus teman seperjuangan dari semester awal hingga semester akhir Mawar Wardani, Maulidina, Eka yang telah selama ini memberikan dorongan dan banyak membantu pengerjaan skripsi ini, dan terima kasih semangat dan motivasinya,
12. Kepada senior-senior yang telah banyak membantu pengerjaan skripsi ini, dan terima kasih semangat dan motivasinya,
13. Teman-teman angkatan 2012 “KURVA” Eki, Risma, Wullan, Nuqe’, Anca dll, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Matematika 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang selalu memberikan semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini,
14. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas do’a dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua yang haus akan ilmu pengetahuan.

Aamin Ya Rabbal Alami

Samata, November 2016

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data persentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah menikah menurut penolong kelahiran terakhir.....	25
Tabel 4.2 Bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dengan GCV.....	29
Tabel 4.3 Nilai bandwidth dan hasil plot.....	31
Tabel 4.4 Nilai Estimasi \hat{f} untuk $n = 24$ pada $h_1=15$, $h_2=20$, $h_3=25$	34

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1** Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1).....27
- Gambar 4.2** Plot hubungan variabel (y) dengan variabel predictor dokter umum(x_2).....27
- Gambar 4.3** Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor bidan (x_3).....28

DAFTAR SIMBOL

Y = Variabel Respon

X = Variabel Prediktor

$f(x)$ = Parameter

Y_i = Variabel tidak bebas pada pengamatan ke- i

X_1 = Variabel bebas pada pengamatan ke-1

X_n = Variabel bebas pada pengamatan ke- n

β_0 = Parameter-parameter yang tidak diketahui

β_1 = Parameter-parameter yang tidak diketahui

ε_i = Error (kesalahan)

$\hat{f}_h(\cdot)$ = Densitas kernel

\hat{f}_h = Kernel

h = Bandwidth

R^2 = Koefisien determinasi

E = Spektasi

ABSTRACT

Authorship : Nirmala

Nim : 60600112023

Title : **On Logistic regression Nonparametric Kernel Estimator with Gaussian Kernel Approach (Case study: Results Percentage of Women Age 15-49 Who Was Married By Birth Attendant Recently in South Sulawesi)**

By using the data to model a state (variable) in the statistical analysis usually requires certain assumptions in order to use the analysis results in accordance with the actual situation. This study uses a nonparametric procedure to estimate a function in which the function does not lead to a certain model of a particular function. The main problem of regression analysis is to determine the shape estimation f .

One approach that can be used to determine f is a kernel estimator with a Gaussian kernel approach. The data used is data that the percentage of women aged 15-49 who have been married according to the last birth attendants in South Sulawesi with the gynecologist predictor variables (x_1), general practitioners (x_2), midwives (x_3), and the response variable (y) the number of women who have been married according to the last birth attendants. Methods GCV (*Generalized Cross Validation*) is used to obtain optimal bandwidth that is at $h_1 = 15$, $h_2 = 20$ and $h_3 = 25$ with GCV value is 719.6441. The optimum value is the maximum value of the percentage of women aged 15 – 49 who have been married according to the last birth attendants in South Sulawesi.

Keywords: nonparametric regression, Gaussian kernel approach, GCV (*Generalized Cross Validation*), the selection of bandwidth.

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nirmala
Nim : 60600112023
Judul : **Estimator Kernel Pada Fungsi Regresi Nonparametrik dengan Pendekatan Kernel Gaussian (Studi kasus : Hasil Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Yang Telah Menikah Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Daerah Sulawesi Selatan)**

Dengan menggunakan data untuk memodelkan suatu keadaan (variabel) dalam analisis statistic biasanya membutuhkan asumsi-asumsi tertentu agar penggunaan hasil analisis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan prosedur nonparametrik untuk mengestimasi suatu fungsi dimana bentuk fungsi tersebut tidak mengarah kesuatu model fungsi tertentu. Persoalan utama analisis regresi adalah menentukan bentuk estimasi f .

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan f adalah estimator kernel dengan pendekatan kernel Gaussian. Data yang digunakan yaitu data hasil persentase wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1), dokter umum (x_2), bidan (x_3), dan variabel respon (y) jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir. Metode GCV (*Generalized Cross Validation*) digunakan untuk mendapatkan bandwidth yang optimal yaitu pada $h_1 = 15$, $h_2 = 20$ dan $h_3 = 25$ dengan nilai GCV yaitu 719.6441. Nilai optimum yang diperoleh adalah nilai yang maximum hasil persentase wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Regresi nonparametrik, pendekatan kernel Gaussian, GCV (*Generalized Cross Validation*), pemilihan bandwidth.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan. Agar tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang akan terjadi dimasa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang baik.¹

Dalam hal menggunakan data untuk memodelkan suatu keadaan (variabel) dalam analisis statistik atau model statistik biasanya membutuhkan asumsi-asumsi tertentu agar penggunaan hasil analisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian halnya dengan jumlah data yang dibutuhkan agar dapat diperoleh model yang sesuai dan *smoothing*. Hal-hal tersebut, pada regresi parametrik biasanya membutuhkan asumsi-asumsi yang kuat seperti normalitas, linearitas, homogenitas, dll. Serta membutuhkan jumlah data yang signifikan agar dapat memenuhi asumsi-asumsi tersebut.

¹ Buchari Alma, "*Pengantar Statistika untuk penelitian: Pendidikan, social, komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*" Alfabeta. April 2011, hal,96.

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika suatu keadaan atau fenomena dunia nyata tidak atau sulit memenuhi asumsi-asumsi sebagaimana yang dimaksud pada bagian sebelumnya. Keadaan tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan analisis regresi nonparametrik karena prosedur-prosedur inferensialnya tidak bergantung pada asumsi-asumsi. Misalnya syarat kenormalan suatu data, ragam yang sama, dan lain-lain. Tetapi cukup pada asumsi yang umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kernel, karena pendekatan kernel memiliki bentuk yang lebih fleksibel dan perhitungan matematisnya mudah di sesuaikan.

Dalam al-Qur'an juga ada ayat yang membahas tentang parameter yang membedakan antara yang *haq* dan *batil*. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu Al-Furqan. Pembeda juga mencakup pengertian sebagai parameter karena parameter adalah pengukuran yang membedakan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lainnya.

Seperti dalam ayat berikut ini (QS. Ali-Imran/4:)

عَزِيزٌ وَأَلَّهُ شَدِيدٌ عَذَابٍ لَهُمُ اللَّهُ بِعَايَتِ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ الْفُرْقَانَ وَأَنْزَلَ لِلنَّاسِ هُدًى قَبْلُ مِنْ
 أَنْتِقَامِ ذُو

Terjemahnya:

“Sebelum (al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah

akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).”²

Menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar, ayat diatas menjelaskan bahwa “Dan Dia turunkan al-Furqan.” al-Furqan diambil dari kataal-farq, artinya pembatas, pembeda, penyisihan diantara yang benar dengan yang salah, yang hak dan yang batil, jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok berbelit-belit. Oleh sebab itu maka al-Qur’an sendiripun disebut juga al-Furqan, bahkan Tauratpun disebut juga al-Furqan. Maka menurut tafsir Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan al-Furqan disini ialah akal manusia sendiri. Artinya Rasul-rasul diutus, kitab-kitab diturunkan dan buat menampung wahyu Ilahi itu manusiapun diberi akal buat membedakan yang benar dari yang salah. Oleh sebab itu maka dengan adanya al-Furqan, akal itu, jika manusia menganut suatu kepercayaan, hendaklah yang benar-benar sesuai dengan akal mereka sendiri.³

Dari ayat diatas dapat diketahui al-Furqan dikenal sebagai nama lain dari al-Qur’an. Kata ini dihubungkan dengan fungsi al-Qur’an yang membedakan antara yang *haq* dan *batil*. Kata pembeda juga mencakup pengertian sebagai parameter, karena membedakan bisa dilakukan setelah ada pengukuran. Maka al- Qur’an sebagai *furqan* diterapkan dalam berbagai hal. Dalam pengertiannya yang sangat dalam, kata *furqan* meliputi semua pemilahan antara *haq* dan *batil*. Tidak sebatas dalam koridor hukum formal saja, tetapi hingga tingkat kesejatian dan kesemuan realitas.

²Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bogor:Syaamil Quran,2007)h.50.

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juzu’ 1-2-3(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982),hal,102

Peneliti Hengky Rizky Widiardi dengan metode yang digunakan yaitu metode regresi dengan pendekatan kernel, diperoleh *bandwidth* optimal dengan menggunakan fungsi kernel triangel adalah sebesar 9.2229.⁴ Peneliti Mifta Luthfin dkk 2014 yang mengkaji mengenai model regresi nonparametrik berdasarkan estimasi polinomial lokal kernel pada pertumbuhan balita, mempunyai nilai $MSE = 1,487844$.⁵ Peneliti Anna Fitriani, dkk 2015 yang mengkaji mengenai estimasi model regresi semiparametrik menggunakan estimator kernel uniform pada pasien DBD di RS Puri Raharja, dari hasil penelitian tersebut nilai MSE yang dihasilkan regresi semiparametrik sebesar 0,00437119 sedangkan nilai MSE yang dihasilkan dengan analisis regresi linear berganda sebesar 0,031. Peneliti Saraswati 2009 yang mengkaji tentang estimasi dentitas kernel epanechnikov rata-rata resampel bootstrap untuk penentuan waktu panen optimal tanaman rami, dan hasil penelitiannya adalah optimalnya yaitu $h_{opt} \approx 0,367$.⁶

Dalam laporan peneliti ini fokus pada fungsi kernel, oleh karena itu peneliti perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang fungsi-fungsi kernel salah satunya yaitu fungsi kernel *gaussian* dengan menggunakan model *regresi nonparametrik* Pada Kasus hasil persentase wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah menurut

⁴Hengky Rizky Widiardi, “*Model Regresi Nonparametrik Menggunakan Fungsi Kernel*”, Jurusan Matematika, F.MIPA, Universitas Brawijaya, hal.129.

⁵Mifta Luthfin, dkk, “*Model Regresi Nonparametrik Berdasarkan Estimator Polinomial Lokal Kernel Pada kasus Pertumbuhan Balita*”, Program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.2, No.1, Mei 2007, h.34.

⁶Saraswati, “*Estimasi dentitas kernel epanechnikov rata-rata resampel bootstrap untuk penentuan waktu panen optimal tanaman rami*”, Skripsi (Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, h.46.

penolong kelahiran terakhir daerah Sulawesi Selatan, pada penelitian ini, peneliti mengambil kasus yang berbeda dengan kasus yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana nilai dari estimasi data persentase wanita yang pernah menikah menurut penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan menggunakan estimasi *kernel gaussian* untuk model *regresi nonparametrik* ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkannilai dari estimasi data persentase wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan menggunakan estimasi *kernel gaussian* untuk model *regresi nonparametrik*.

D. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi diri sendiri adalah agar bisa mengetahui tingkat persentase wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir dan untuk mendapatkan hasil fungsi *MSE* terkecil dengan menggunakan *bandwidth* untuk model *regresi nonparametrik*.

2. Manfaat bagi orang lain adalah sebagai acuan pembelajaran dan menambah wawasan tentang tingkat persentase wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah data dari BPS (Badan Pusat Statistik) daerah Sulawesi Selatan dari pada tahun 2015. Dan materi yang di bahas hanya yang berkaitan dengan fungsi *kernel Gaussian* dan *regresi nonparametrik*, kelahiran bayi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rancangan isi penelitian ini, secara umum dapat dilihat dari sistematika penulisan di bawah ini :

I. PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian merupakan kajian pustaka berisi konsep-konsep yang menjadi landasan pembahasan masalah ya

ng memuat pembahasan teori-teori mengenai *analisis regresi*, *regresi parametrik*, *regresi nonparametrik*, *Estimator kernel*, Kelahiran bayi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini merupakan metodologi penelitian berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, Waktu dan lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Defenisi Operasional variabel, dan Prosedur Penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan tentang pemilihan *bandwidth*, dan pemilihan bandwidth yang optimal.

V. PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Regresi

1. Model Populasi Regresi

Regresi pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Diberi model populasi dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n \quad (2.1)$$

Keterangan :

Y_i = variabel tidak bebas pada pengamatan ke- i

X_1 = variabel bebas pada pengamatan ke-1

X_n = variabel bebas pada pengamatan ke- n

β_0 dan β_1 = parameter-parameter yang tidak diketahui.⁷

2. Model Sampel Regresi

Regresi populasi dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel regresi dengan sampel yang teramati dan melandaskan kesimpulan-kesimpulan yang menyangkut parameter-parameter populasi pada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi.

⁷ Hengky Rizky Widiardi, “*Model Regresi Nonparametrik Menggunakan Fungsi Kernel*“, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, hal.129.

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah kenormalan galat, yaitu bahwa galat berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan simpangan baku tertentu.⁸

Dalam pendekatan parametrik terdapat asumsi mengenai model yaitu kurva regresi yang dapat diwakili oleh suatu model parametrik, misal kurva berbentuk linier, kuadrat, kubik dan polinomial derajat p .

Bentuk hubungan antara satu peubah respon dengan satu peubah prediktor secara matematis dituliskan dalam model regresi:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

dengan:

Y_i = variabel tidak bebas pada pengamatan ke- i

X_i = variabel bebas pada pengamatan ke- i

β_0 dan β_1 = parameter-parameter yang tidak diketahui

ε_i = error (kesalahan).⁹

B. Regresi Nonparametrik

Regresi nonparametrik adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dimana bentuk kurva regresinya tidak diketahui. Ada sebanyak $q = p + 1$ variabel random (\mathbf{X}, Y) dimana Y adalah variabel dependen dan \mathbf{X} adalah vektor $p \times 1$ merupakan

⁸Hengky Rizky Widiardi, “*Model Regresi Nonparametrik Menggunakan Fungsi Kernel*“, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, hal.129.

⁹ Erwin Andrianto, “*Pendugaan Regresi Nonparametrik dengan Fungsi Kernel Gaussian*”, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, hal.466.

variabel prediktor. Jika $E(Y)$ berhingga, maka model regresi nonparametrik dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = f(x) + \varepsilon \quad (2.3)$$

dengan :

Y = variabel respon

$f(x)$ = parameter

ε = error

1. Nadaraya-Watson

Pendekatan konseptual sederhana untuk representasi adalah untuk menggambarkan bentuk $\{W_{ni}(x)\}_{i=1}^n$ dengan fungsi kepadatan peluang $W_{ni}(x)$ dengan parameter skala yang menyesuaikan ukuran dan bentuk bobot X . Sangat umum untuk merujuk pada fungsi bentuk ini sebagai kernel K . Jika kernel kontinu, dibatasi dan simetris, fungsi sebenarnya K yang mengintegrasikan satu,

$$\int K(u)du = 1 \quad (2.4)$$

urutan untuk kernel penghalus (satu dimensi x) didefinisikan sebagai berikut :

$$W_{ni}(x) = \frac{K_{hn}(x-X_i)}{\hat{f}_{hn}(x)} \quad (2.5)$$

dimana,

$$\hat{f}_{hn}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{hn}(x - X_i) \quad (2.6)$$

Kernel dengan faktor skala h_n , harus bergantung pada $h = h_n$ ukuran sampel n , kernel dengan pembobot $\{W_{ni}(x)\}_{i=1}^n$. Fungsi $\hat{f}_h(\cdot)$ adalah densitas kernel

Rosenblatt-Parzen. Dan kernel telah diusulkan oleh Nadaraya (1964) dan Watson (1964).

$$\hat{f}_h = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - X_i) Y_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - X_i)}$$

Oleh karena itu sering disebut dengan estimator Nadaraya-Watson. Bentuk kernel ditentukan oleh K , sedangkan ukuran parameter dengan h , yang disebut *bandwidth*. Normalisasi bobot $\hat{f}_h(\cdot)$ dengan intensitas lokal dari variabel X di samping itu, diketahui bahwa jumlah bobot yaitu satu. Secara umum ada berbagai fungsi kernel. Fungsi kernel yang mengambil nilai-nilai yang sangat kecil dapat menyebabkan underflow numerik pada komputer.

2. Estimasi Kernel Gaussian

Diberikan kernel Gaussian yang diberikan adalah :

Misalkan diberikan sampel data dari x_1 sampai x_n

$K_{hi}(x_1 - X_i) = \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2\right)$, sehingga:

$$\hat{f}_h = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2\right) Y_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2\right)} \quad (2.7)$$

C. Pemilihan *Bandwidth* Optimal

Bandwidth *hadalah* parameter pemulus (smoothing) yang berfungsi untuk mengontrol kemulusan dari kurva yang diestimasi. *Bandwidth* yang terlalu kecil akan menghasilkan kurva yang *under-smoothing* yaitu sangat kasar dan sangat fluktuatif, dan sebaliknya *bandwidth* yang terlalu lebar akan menghasilkan kurva yang *over-smoothing* yaitu sangat mulus, tetapi tidak sesuai dengan pola data. Oleh karena itu perlu dipilih *bandwidth* yang optimal. Salah satu metode untuk mendapatkan *h* optimal adalah dengan menggunakan kriteria *GCV* dengan rumus :

$$GCV(h) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}_h(x))^2}{\left(1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{K_h(x-X_i)}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n K_h(x-X_j)}\right)^2}$$

1. Mean Square Error (MSE)

Dalam estimasi pasti tidak lepas dari *Mean Square Error* (MSE) dan dua komponennya yaitu bias dan *standar error* atau varians. Kreteria rror yang digunakan dalam regresi nonparametrik ini yaitu dengan mencari nilai *Mean Square error* (MSE) yang terkecil. Penggunaan *bandwidth* yang optimal akan menghasilkan estimasi dengan MSE yang terkecil. Adapun rumus MSE yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} MSE(\hat{f}(x)) &= E(\hat{f}(x) - f(x))^2 \\ &= (E\hat{f}(x) - f(x))^2 + E(\hat{f}(x) - E\hat{f}(x))^2 \\ &= 2E(f(x) - Ef(x)) \left(Ef(x) - \hat{f}(x) \right) + E(Ef(x) - \hat{f}(x))^2 \\ &+ E(f(x) - Ef(x))^2 \end{aligned}$$

$$= \text{bias}^2 + \text{variansi}(\hat{f}(x))^{10}(2.8)$$

a. Mencari Bias $\hat{f}(x)$

Untuk memperoleh bias $\hat{f}(x)$ akan dijabarkan yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} (E\hat{f}(x)) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{\infty} K\left(\frac{x-t}{h}\right) f(t) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{\infty} K\left(\frac{x-t}{h}\right) f(t) dt \end{aligned} \quad (2.9)$$

transformasi,

$$z = \frac{x-t}{h} \quad (2.10)$$

dimana,

$$t = x - hz \left| \frac{dz}{dt} \right| = \frac{1}{h} \quad (2.11)$$

sehingga persamaan (2.8) menjadi

$$E(\hat{f}(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} K(z) f(x - hz) dz \quad (2.12)$$

Penjabaran $f(x - hz)$ dengan menggunakan deret Taylor

$$f(x - hz) = f(x) - h' z' f'(x) + \frac{1}{2} (hz)^2 f''(x) + O(h^2)$$

Akan menjadi,

¹⁰ Dedeh Kurniasih, "Efisiensi Relatif Estimator Fungsi Kernel Gaussian terhadap Estimator Polinomial dalam Peramalan USD Terhadap JPY", Skripsi (Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 2013, h.28.

$$\begin{aligned}
E(\hat{f}(x)) &= \int_{-\infty}^{\infty} K(z)f(x)dz \\
&\quad - \int_{-\infty}^{\infty} K(z)hzf'(x)dz \\
&\quad + \int_{-\infty}^{\infty} K(z)\frac{(hz)^2}{2}f''(z)dx + O(h^2) \\
&= f(x) \int_{-\infty}^{\infty} K(z)dz - hf'(x) \int_{-\infty}^{\infty} K(z)zdz + \frac{h^2}{2}f''(x) \int_{-\infty}^{\infty} Z^2 K(z)(z)dz \\
&\quad + O(h^2) \\
&= f(x) + \frac{h^2}{2}k_2f''(x) + O(h^2)
\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh bias $\hat{f}(x)$

$$E(\hat{f}(x)) - f(x) = \frac{h^2}{2}k_2f''(x)$$

$$Bias(\hat{f}(x)) \approx \frac{h^2}{2}k_2f''(x)$$

Persamaan di atas, tergantung dari h karena bias $\hat{f}(x)$ mendekati nol maka semakin kecil, k_2 yang berupa varians kernel dan tergantung $f''(x)$ lekukan kepadatan titik x .

b. Mencari Varians $\hat{f}(x)$

Untuk memperoleh varians $\hat{f}(x)$ akan dijabarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
Var(\hat{f}(x)) &= var\left(\frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)\right) \\
&= \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n Var\left(K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)\right)
\end{aligned}$$

Karena $x_i = 1, 2, 3, \dots, n$ distribusi bebas maka,

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(K \left(\frac{x - x_i}{h} \right) \right) &= E \left(K \left(\frac{x - x_i}{h} \right)^2 \right) - \left(EK \left(K \left(\frac{x - x_i}{h} \right) \right) \right)^2 \\ &= \int K \left(\frac{x - t}{h} \right)^2 f(t) dt - \left(K \left(\frac{x - t}{h} \right) f(t) dt \right)^2 \end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(\hat{f}(x) \right) &= \frac{1}{n} \int \frac{1}{h^2} K \left(\frac{x - t}{h} \right)^2 f(t) dt \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{h} \int K \left(\frac{x - t}{h} \right) f(t) dt \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \int \frac{1}{h^2} K \left(\frac{x - t}{h} \right)^2 f(t) dt - \frac{1}{n} \left(f(x) + \text{bias} \left(\hat{f}(x) \right) \right)^2 \quad (2.13) \end{aligned}$$

substitusi persamaan (2.10) ke dalam persamaan (2.13), maka diperoleh,

$$\text{Var} \left(\hat{f}(x) \right) = \frac{1}{nh} \int K(z)^2 f(x - hz) dz - \frac{1}{n} \left(f(x) + O(h^2) \right)^2$$

$$\text{Var} \left(\hat{f}(x) \right) = \frac{1}{nh} \int K(z)^2 f(x) - hzf'(x) + O(h) dz - \frac{1}{n} \left(f(x) + O(h^2) \right)^2 \quad (2.14)$$

Catatan:

$$\text{Var} \left(\hat{f}(x) \right) \approx \frac{1}{nh} f(x) \int K(z)^2 dz$$

Kebaikan suatu penduga dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Semakin kecil tingkat kesalahan suatu penduga maka semakin baik estimasinya. Kreteria untuk menentukan estimator terbaik dalam model regresi yaitu MSE dan nilai koefisien determinasi R-Square (R^2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{JKR}{JKT} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \end{aligned}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

JKR = Jumlah kuadrat residu atau variasi yang tidak bisa dijelaskan

JKT = Jumlah total kuadrat atau total variasi

Nilai R^2 terletak antara 0-1. Model dikatakan lebih baik jika R^2 semakin mendekati nilai 1.¹¹

MSE didefinisikan sebagai berikut :

$$MSE = \left(\hat{f}(x) \right) = E(\hat{f}(x) - f(x))^2 \quad (2.15)$$

Keterangan:

$\hat{f}(x)$ = y taksir

E = Spektasi

2. *Generalized Cross Validation (GCV)*

Defenisi dari MSE mengandung fungsi yang tidak diketahui yaitu $f(x_i)$. Sehingga untuk mengatasi hal ini digunakan metode *cross validation* dengan *leave one at* estimate $\hat{f}_{h,i}(x_i)$ didefinisikan sebagai berikut :

$$CV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}_{h,i}(x_i))^2$$

di peroleh,

$$CV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \hat{f}_{h,i}(x_i)}{1 - H(h)} \right)^2$$

¹¹ Erwin Andrianto, "Pendugaan Regresi Nonparametrik dengan Fungsi Kernel Gaussian", Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, hal.467.

dengan,

$$H(h) = \frac{K_h(x - X_i)}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n K_h(x - X_j)}$$

Namun metode CV mempunyai kelemahan. Jika nilai y_i mempunyai pengaruh yang kuat terhadap taksir $\hat{f}_h(x)$, maka nilai y_i akan besar pengaruhnya terhadap nilai $CV(h)$. Cara mengatasi hal ini maka persamaan $CV(h)$ diberi bobot. Persamaan $CV(h)$ yang diberi bobot disebut sebagai GCV (*Generalized Cross Validation*).

Metode GCV didefinisikan sebagai berikut :

$$GCV(h) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}_h(x))^2}{\left(1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{K_h(x - X_i)}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n K_h(x - X_j)}\right)^2} \quad (2.16)$$

Bandwidth optimal diperoleh dari *bandwidth* yang menghasilkan nilai GCV yang terkecil.

$$h_{opt} = \arg \min_h GCV(h)$$

Arg min h adalah notasi yang mengindikasikan bahwa memilih argumen h yang meminimumkan kriteria.¹²

¹²I Komang Gede Sukarsa, I Gusti Ayu Made Srinadi “*Estimator Kernel Dalam Regresi Nonparametrik*”. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran Bandung, Bali. Vol.2, No.1, Juni 2012, h.22.

D. Kelahiran Bayi

Kelahiran prematur yaitu bayi lahir hidup kurang dari 37 minggu kehamilan, menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas perinatal. Bayi yang lahir prematur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, resiko penyakit, disabilitas dalam hal motorik jangka panjang, kognitif, visual, pendengaran, sikap, emosi sosial, kesehatan, dan masalah pertumbuhan jika dibandingkan dengan bayi normal.

Ibu hamil yang mengalami anemia berpeluang 2,375 kali mengalami kelahiran prematur dibandingkan ibu yang tidak anemia.¹³

Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu (antara 20-37) atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram. Paritas ibu, riwayat prematur sebelumnya dan trauma ibu diduga merupakan penyebab terjadinya persalinan prematur.

Persalinan prematur merupakan penyebab utama yaitu 60-80% morbiditas dan mortalitas diseluruh dunia. Indonesia memiliki angka kejadian prematur sekitar 19% dan merupakan penyebab utama kematian perinatal.¹⁴

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang proses kelahiran manusia seperti dalam ayat berikut ini (Q.S Al-Insan/2:)

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا فَجَعَلْنَاهُ نَبْئِيلَهُ آمَشَاحٍ نُّطْفَةٍ مِنَ الْإِنْسَانِ خَلَقْنَاهُ﴾

¹³ Paembonan Novhita,dkk, “*Faktor-faktor kejadian kelahiran prematur di rumah sakit ibu dan anak Sitti Fatimah Kota Makassar*”, Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, h.2

¹⁴Novi Dhina Ariana,dkk,”*Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur*”,Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Semarang,2011,h.2

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.”¹⁵

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang manusia, bahwa dia telah menciptakannya setelah sebelumnya tidak pernah menjadi sesuatu yang disebut karena kerendahan dan kelemahannya. Kemudian Allah Swt telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yakni yang bercampur adalah sperma laki-laki dan ovum perempuan jika telah bersatu dan bercampur, lalu beralih dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dan dari satu warna ke warna berikutnya.¹⁶

Dalam Al-Qur'an yang membahas tentang penciptaan manusia juga terdapat dalam (Q.S Al-Mu'minun/13-14:)

وَنَاعِظُمَا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ ﴿١٣﴾ مَكِينٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ
 ﴿١٤﴾ الْخَلْقَيْنِ أَحْسَنَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ ۚ ۞ أَخْرَجْنَا نَسْلَهُ ثُمَّ لَحْمًا عَظِيمًا فَكَسَدَ

Terjemahnya :

“ kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus

¹⁵Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, (Bogor:Syaamil Quran,2007)h.76

¹⁶Abdullah Bin Muhammad, Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Bogor: Putaka Imam Asy-Syafi'i), h.7

dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”¹⁷

Adapun penjelasan ayat di atas yaitu Allah swt. menciptakan manusia dari saripati tanah, artinya Allah swt menciptakan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, keduanya mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang juga memperoleh makanan dari tanah. Sari pati makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita mejadi sperma dan sel telur.

Pembuahan menjadi segumpal darah dan yang selanjutnya menjadi segumpal daging hingga tulang belulang yang dibungkus daging. sesudah itu, Allah menciptakan anggota-anggota badan dan menyusun menjadi makhluk yang berbentuk seorang bayi manusia.

Air mani yang berasal dari saripati tanah, juga mengandung makna bahwa manusia pada akhirnya akan kembali pada tempatnya semula, yaitu tanah. Tanah yang dimaksud adalah liang lahat. Artinya manusia berasal dari tanah, dan akan kembali tinggal meyatuu dengan tanah.

¹⁷Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, (Bogor:Syaamil Quran,2007)h.41

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data pada tahun 2015.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupa data persentase wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

x_1 = Persentase jumlah wanitayang telah menikah dengan dokter kandungan sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan

x_2 = Persentase jumlah wanitayang telah menikah dengan dokter umum sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan

x_3 = Persentase jumlah wanita yang telah menikah dengan bidan sebagai penolong kelahiran terakhir di daerah Sulawesi Selatan

y = Jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir.

2. Definisi operasional variabel

Adapun definisi operasional variabel yaitu sebagai berikut :

1. Dokter kandungan (x_1) adalah yang membantu pasien khusus persalinan disetiap daerah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan di 24 kabupaten
2. Dokter umum (x_2) adalah yang membantu pasien ada di Rumah sakit/ Praktek untuk persalinan disetiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten.
3. Bidan (x_3) khusus untuk membantu persalinan bayi yang ada disetiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten.

4. Jumlah dari wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir (y) setiap daerah di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten.

E. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui estimasi *regresi nonparametrik* dengan *estimator kernel gaussian* pada kasus wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran di daerah Sulawesi Selatan yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Membuat *scattler* plot data.
3. Mendefenisikan fungsi *kernel gaussian* :

$$K_{hi}(x - X_i) = \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - x_i}{h_i}\right)^2\right)$$

4. Pemilihan bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dilakukan dengan mencoba semua nilai-nilai bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 yang mungkin.
5. MenentukannilaiGCV, dimana pendekatan kernel yang digunakan adalah kernel Gaussian dengan rumus :

$$GCV(h) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}_h(x))^2}{\left(1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{K_h(x-X_i)}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n K_h(x-X_j)}\right)^2}$$

berdasarkannilai *bandwidth* h yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Menentukan h optimal yang meminimumkan GCV untuk kernel *gaussian* ,
dengan rumus :

$$h_{opt} = \arg \min_h GCV (h)$$

7. Diperoleh nilai $\hat{f}(x)$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Data

Data dalam penelitian ini di peroleh dari data hasil persentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah menikah menurut penolong kelahiran terakhir.

Tabel 4.1 Data persentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah menikah menurut penolong kelahiran terakhir:


Penolong persalianan terakhir				
Kab/Kota	DK (x_1)	DU (x_2)	B (x_3)	(Y)
Selayar	11,51	1,94	72,26	28,57
Bulukumba	1,71	5,74	74,30	27,25
Bantaeng	11,06	0	52,67	21,24
Jeneponto	14,94	1,35	71,22	29,17
Takalar	14,96	1,47	74,15	30,19
Gowa	20,96	2,75	68,18	30,63
Sinjai	12,65	0	82,83	31,82
Maros	9,55	4,12	79,41	31,02
Pangkep	22,70	4,00	67,07	31,25
Barru	19,29	0	71,12	30,13
Bone	14,23	0,77	70,61	28,53
Soppeng	14,26	2,32	83,42	33,33
Wajo	4,94	1,95	91,76	32,88
Sidrap	19,82	2,02	76,86	32,9
Pinrang	15,86	1,20	77,75	31,60
Enrekang	24,22	2,53	55,37	27,37
Luwu	11,26	0,84	69,47	27,19

Kab/Kota	DK (x_1)	DU (x_2)	B (x_3)	(Y)
Luwu Utara	22,51	4,60	69,41	32,17
Luwu Timur	25,12	0	70,85	31,99
Toraja Utara	18,20	2,34	60,95	27,16
Makassar	42,53	6,04	46,55	31,70
Pare-pare	34,72	0	65,28	33,33
Palopo	13,86	0	84,04	32,63

Sumber : BPS (badan pusat statistik) Sulawesi selatan


Berdasarkan Tabel 4.1 di Kabupaten/Kota Selayar dokter kandungan (x_1) menolong pasien yang melahirkan sebanyak 11,51%, dokter kandungan (x_2) menolong pasien sebanyak 1,94 %, bidan (x_3) menolong pasien sebanyak 72,26%. Jumlah wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir (y) sebanyak 28,57%. Di Kabupaten/Kota Bulukumba dokter kandungan (x_1) menolong pasien yang melahirkan sebanyak 1,71%, dokter kandungan (x_2) menolong pasien sebanyak 5,74%, bidan (x_3) menolong pasien sebanyak 74,30%. Jumlah wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir (y) sebanyak 27,25%.

Selanjutnya akan diselidiki pola hubungan antara variabel variabel (y) dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1).




Gambar 4.1 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1)

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa dokter kandungan (x_1) belum diketahui hubungannya dengan jumlah wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir (y).



Gambar 4.2 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor dokter umum (x_2)

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa dokter kandungan (x_2) belum diketahui hubungannya dengan jumlah wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir (y).



Gambar 4.3 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor bidan (x_3)

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa dokter kandungan (x_3) belum diketahui hubungannya dengan jumlah wanita yang telah menikah menurut kelahiran terakhir (y).

Berdasarkan Gambar 4.1 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor dokter kandungan (x_1), Gambar 4.2 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor dokter umum (x_2), Gambar 4.3 Plot hubungan variabel (y) dengan variabel prediktor bidan (x_3) diketahui bahwa dari ketiga variabel prediktor (x_1), (x_2), dan (x_3) belum diketahui hubungannya dengan variabel respon (y). Untuk mengetahui hubungan dari ketiga variabel prediktor dengan variabel respon perlu digunakan estimator kernel pada fungsi regresi nonparametrik dengan pendekatan kernel Gaussian.

2. Pemilihan Nilai Bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3

Untuk pemilihan bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dilakukan dengan mencoba semua nilai nilai bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 yang mungkin. Jika nilai bandwidth h yang diambil adalah yang besar maka akan terlihat plot yang sangat kasar, sedangkan nilai bandwidth h yang diambil adalah yang kecil maka akan terlihat plot yang sangat halus.

3. Pemilihan bandwidth optimal

Memilih *bandwidth* berdasarkan nilai *GCV* diberikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GCV(h) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}_h(x))^2}{\left(1 - \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x-X_i)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x-X_i)}\right)^2}$$

Hasil perhitungan GCV diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Bandwidth h_1 , h_2 , dan h_3 dengan GCV



h_1	h_2	h_3	GCV
5	10	15	3.0823000
10	15	20	1.28193000
15	20	25	719.6441
30	35	40	841.7207
45	50	55	1.46523000
60	65	70	2.11713000
75	80	85	2.62173000




Jika bandwidth $h_1 = 1, h_2 = 2, h_3 = 3$ maka nilai GCV menghasilkan nilai yang tidak terdefinisikan dan juga akan menghasilkan kurva yang *over-*



smoothing yaitu sangat mulus. Salah satu metode untuk mendapatkan h optimal adalah dengan menggunakan kriteria *GCV*.

Pemilihan *bandwidth* h_1, h_2, h_3 pada tabel diatas dilakukan dengan mencoba memasukkan semua nilai-nilai *bandwidth* $h_1, h_2, dan h_3$ karena *bandwidth* yang dimulai dari $h_1 = 5, h_2 = 10, h_3 = 15$ dapat menghasilkan nilai *GCV*. Adapun rentang nilai pada pemilihan *bandwidth* yaitu 5, karena jika rentangnya kurang dari 5 maka plot kurvanya mendekati sama. Sehingga diperoleh *GCV* yang terkecil sebesar 719,6441. Oleh karena itu perlu dipilih *bandwidth* yang optimal Pada $h_1=15, h_2 =20, dan h_3=25$ yang merupakan *bandwidth* yang optimal.

Tabel 4.3 Nilai bandwidth dan hasil plot:

Bandwidth	Plot
a. Bandwidth $h_1=5$ $h_2=10$ dan $h_3=15$	<p data-bbox="959 491 1175 512">Surface Plot of yt vs x2, x1</p> 
b. Bandwidth $h_1=10$ $h_2=15$ dan $h_3=20$	<p data-bbox="959 968 1175 989">Surface Plot of yt vs x2, x1</p> 

Bandwidth	Plot
c. Bandwidth $h_1=15$ $h_2=20$ dan $h_3=25$	<p data-bbox="966 430 1177 451">Surface Plot of yt vs x2, x1</p> 
d. Bandwidth $h_1=30$ $h_2=35$ dan $h_3=40$	<p data-bbox="966 882 1177 903">Surface Plot of yt vs x2, x1</p> 
e. Bandwidth $h_1=45$ $h_2=50$ dan $h_3=55$	<p data-bbox="966 1333 1177 1354">Surface Plot of yt vs x2, x1</p> 

Bandwidth	Plot
f. Bandwidth $h_1=60$ $h_2=65$ dan $h_3=70$	
g. Bandwidth $h_1=75$ $h_2=80$ dan $h_3=85$	

4 Menghitung Estimasi \hat{f} Berdasarkan Bandwidth Optimal

Berdasarkan Tabel 4.3 untuk nilai bandwidth $h_1=15$, $h_2=20$ dan $h_3=25$ untuk nilai mencari estimasi \hat{f} dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\hat{f}_h = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2\right) Y_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2\right)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 3 diperoleh :

Tabel 4.3 Nilai Estimasi \hat{f} untuk $n = 24$ pada $h_1=15, h_2=20, h_3=25$

(x_1)	(x_2)	(x_3)	$\hat{Y}=\hat{f}(x_1, x_2, x_3)$
11,51	1,94	72,26	1,3707
1,71	5,74	74,30	0,9463
11,06	0	52,67	1,0261
14,94	1,35	71,22	1,4385
14,96	1,47	74,15	1,4384
20,96	2,75	68,18	1,4335
12,65	0	82,83	1,2971
9,55	4,12	79,41	1,2668
22,70	4,00	67,07	1,3974
19,29	0	71,12	1,4488
14,23	0,77	70,61	1,4251
14,26	2,32	83,42	1,3110
19,82	2,02	76,86	1,4127
15,86	1,20	77,75	1,4140
24,22	2,53	55,37	1,2224
11,26	0,84	69,47	1,3513
22,51	4,60	69,41	1,4012
18,20	2,34	60,95	1,3618
42,53	6,04	46,55	0,6278
4,72	0	65,28	1,0072
13,86	0	84,04	1,2904

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai maximum dari estimasi tingkat wanita yang telah menurut penolong kelahiran terakhir $\hat{f}(x^1, x^2, x^3)$ diperoleh sebesar 1,4488%. Kondisi maximum dicapai yaitu dokter kandungan $(x_1)= 19,29\%$ dokter

umum (x_2) = 0%, bidan (x_3) = 71,12%, yaitu pada daerah Kabupaten/Kota Barru yang mencapai nilai maximum dari 24 kabupaten yang ada di daerah Sulawesi Selatan.

B. Pembahasan

Pada Tabel 4.1 merupakan data dari hasil persentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah menikah menurut penolong kelahiran terakhir yang bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 24 kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan nonparametrik dan fungsi kernel Gaussian, maka interpretasi untuk setiap nilai optimum diperoleh kondisi yang paling terbaik dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir dan pemilihan *bandwidth* berdasarkan kriteria nilai *GCV* yang minimum atau kriteria nilai *GCV* yang terkecil.

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai estimasi dari *bandwidth* $h_1=15$, $h_2=20$, $h_3=25$ diperoleh sebesar 1,4488%. Nilai estimasi yang ini merupakan nilai maximum dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir pada kondisi maximum yang di capai (x_1) = 19,29 (x_2) = 0 (x_3) = 71,12. Kondisi optimum yang pertama oleh dokter kandungan (x_1) sebesar 19,29 %. Kondisi optimum yang kedua oleh dokter umum (x_2) sebesar 0%. Dan kondisi optimum yang terakhir oleh bidan (x_3) sebesar 71,12%.

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa dari ketujuh hasil estimasi dari *bandwidth* diketahui bahwa kondisi yang paling maximum terletak pada $h_1=15$, $h_2=20$, $h_3=25$

sebesar 1,4488%. Dengan nilai GCV sebesar 719,6441. Jika nilai $bandwidth\ h$ yang di ambil adalah yang terkecil maka akan terlihat plot data yang sangat kasar, jika nilai $bandwidth\ h$ yang diambil adalah yang optimal maka plot data tidak sangat kasar dan tidak juga sangat halus (*smooth*), dan jika nilai $bandwidth\ h$ yang diambil adalah yang besar maka akan terlihat plot tidak sangat berpotongan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu nilai maximum dari estimasi tingkat wanita yang telah menikah menurut penolong kelahiran terakhir $\hat{f} = (x_1, x_2, x_3)$ diperoleh sebesar 1,4488%. Dalam regresi kernel yang terpenting adalah pemilihan nilai *bandwidth* optimal, bukan pemilihan fungsi kernel, karena penggunaan fungsi kernel yang berbeda dengan nilai *bandwidth* optimal menghasilkan estimasi kurva regresi yang hampir sama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat nominal. Taksiran yang digunakan yaitu kepadatan kernel *Gaussian* dengan pemilihan *bandwidth* dengan metode *Generalized cross validation* (GCV) dengan pemilihan *bandwidth* h secara acak, pada penelitian ini diperoleh nilai *bandwidth* yang optimal di mana nilai *bandwidth* yang optimal di lihat dari nilai GCV dan \hat{f} terkecil. Untuk penelitian selanjutnya pemilihan nilai *bandwidth* sebaiknya dipilih nilai yang lebih kecil dari penelitian ini agar kurvanya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus dan bisa menggunakan data primer yang sifatnya update melalui observasi wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran questioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *“Pengantar Statistika untuk penelitian: Pendidikan, social, komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis”* Alfabeta. 2011.
- Alwi, Wahida. *“Estimator Integral Pada Regresi Nonparametrik dengan Pendekatan Kernel”* Tesis Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2008.
- Andrianto, Erwin *“Pendugaan Regresi Nonparametrik dengan Fungsi Kernel Gaussian”*, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya.
- Annisa, Nur, dkk. *“Proyeksi Angka Migrasi Penduduk Indonesia Tahun 2005-2010”*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya. Bogor: Syaamil Qur’an, 2007.
- Fitriani Anna, dkk, Vol.4 (4) *“Estimasi model regresi semiparametrik menggunakan estimator kernel uniform pada pasien DBD di Rs Puri Raharja”*. Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana, 2015.
- Gede, I Komang SukarsaI dan Gusti Ayu Made Srinadi, Vol.2 (1) *“Estimator Kernel Dalam Regresi Nonparametrik”*.Jurusan Matematika FMIPA Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran Bandung,Bali, 2012.
- Haslinda, Andi. *Multivariate Adaptive Regression Splines*. (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,2013).
- Härdle, W. *Applied nonparametric regression* New York: Cambridge University Prees, 1990.
- Kurniasih, Dedeh dkk, *“Efisiensi Relatif Estimator Fungsi Kernel Gaussian Terhadap Estimator Polinomial Dalam Peramalan USD Terhadap JPY”*, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2013.
- Luthfin, Mifta, dkk.Vol.2 (1) *”Model Regresi Nonparametrik Berdasarkan Estimator Polinomial Lokal Kernel Pada kasus Pertumbuhan Balita”*, Program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah semarang, 2007.

- Novi Dhina Ariana,dkk, "*Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur*", Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Semarang, 2011.
- Paembonan Novhita,dkk, "*Faktor-faktor kejadian kelahiran prematur di rumah sakit ibu dan anak Sitti Fatimah Kota Makassar*", Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Rizky, HengkyWidiardi, "*Model Regresi Nonparametrik Menggunakan Fungsi Kernel*", Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya.
- Saraswati, "*Estimasi Densitas Kernel Epanechnikov Rata-Rata Resampel Bootstrap Untuk Penentuan Waktu Panen Optimal Tanaman Rami*", Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Sprent, Peter. "*Metode Statistik Nonparametrik Terapan*," Universitas Indonesia.
- Sugiono. "*Statistika untuk Penelitian*," CV Alfabeta Bandung. 2000.
- Wand, M. P. *Kernel smooting*. New York: Chapman and Hall, 1995.

Lampiran 1: Program MSE untuk memilih *bandwidth* h_1, h_2, h_3 yang optimal

```

clc

% X:data dari x
% x:rata-rata dari x

X11=[11.51 1.71 11.06 14.94 14.96 20.96 12.65 9.55 22.70 19.29 14.23
14.26 4.94 19.82 15.86 24.22 11.26 33.40 22.51 25.12 18.20 42.53
34.72 13.86];
X21=[1.94 5.74 0 1.35 1.47 2.75 0 4.12 4.0 0 0 0.77 2.32 1.95 2.02
1.20 2.53 0.84 0 4.60 0 2.34 6.04 0 0];
X31=[72.26 74.30 52.67 71.22 74.15 68.18 82.83 79.41 67.07 71.12
70.61 83.42 91.76 76.86 77.75 55.37 69.47 49.39 69.41 70.85 60.95
46.55 65.28 84.04];
Y11=[28.57 27.25 21.24 29.17 30.19 30.63 31.82 31.02 31.25 30.13
28.53 33.33 32.88 32.9 31.60 27.37 27.19 27.59 32.17 31.99 27.16
31.70 33.33 32.63];
X1=X11'
X2=X21'
X3=X31'
Y1=Y11'
n=length(Y1);
x1=mean(X11')
x2=mean(X21')
x3=mean(X31')
h1=5;
h2=10;
h3=15;
% hitung f topi
for i=1:n
    Khx1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x1-X1(i))/h1)^2)
    Khx2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x2-X2(i))/h2)^2)
    Khx3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x3-X3(i))/h3)^2)
    % hitung Qt
    for j=1:n
        % hitung K
        KhX1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X1(j)-X1(i))/h1)^2)
        KhX2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X2(j)-X2(i))/h2)^2)
        KhX3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X3(j)-X3(i))/h3)^2);
        tmp1(j)=KhX1*KhX2*KhX3;
    end
    Qt=1/n*sum(tmp1);
    tmp2(i)=(Y1(i)*(1/n)*Khx1*Khx2*Khx3)/Qt;
    ft=1/n*sum(tmp2)
end
ft=1/n*sum(tmp2);
% hitung GCV
% - hitung GCV1 (pembilang)
for i=1:n
    tmp3(i)=(Y11(i)-ft)^2;

```

```

end
    GCV1=1/n*sum(tmp3);
% - hitung GCV2 (penyebut)
for i=1:n
for j=1:n
    Khx1(j)=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x1-X1(i))/h1^2));
    Khx2(j)=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x2-X2(i))/h2^2));
    Khx3(j)=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x3-X1(i))/h3^2));
    Khx(j)=Khx1(j)*Khx2(j)*Khx3(j);
    end
    tmpx=sum(Khx);
% - hitung sigma K (penyebut)
    for j=1:n
        KhX1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X1(j)-X1(i))/h1^2));
        KhX2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X2(j)-X2(i))/h2^2));
        KhX3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X3(j)-X3(i))/h3^2));
        tmp4(j)=KhX1*KhX2*KhX3;
    end
    tmp5=1/n*sum(tmp4);
    tmp6(i)=tmpx/tmp5;
end
    tmp7=sum(tmp6);
    GCV2=(1-1/n*tmp7)^2;
%GCV
    GCV=GCV1/GCV2

```

Lampiran 2: Program GCV untuk memilih $bandwidth h_1, h_2, h_3$ yang optimal

```

clc

% X:data dari x
% x:rata-rata dari x

X11=[11.51 1.71 11.06 14.94 14.96 20.96 12.65 9.55 22.70 19.29 14.23
14.26 4.94 19.82 15.86 24.22 11.26 33.40 22.51 25.12 18.20 42.53
34.72 13.86];
X21=[1.94 5.74 0 1.35 1.47 2.75 0 4.12 4.0 0 0 0.77 2.32 1.95 2.02
1.20 2.53 0.84 0 4.60 0 2.34 6.04 0 0];
X31=[72.26 74.30 52.67 71.22 74.15 68.18 82.83 79.41 67.07 71.12
70.61 83.42 91.76 76.86 77.75 55.37 69.47 49.39 69.41 70.85 60.95
46.55 65.28 84.04];
Y11=[28.57 27.25 21.24 29.17 30.19 30.63 31.82 31.02 31.25 30.13
28.53 33.33 32.88 32.9 31.60 27.37 27.19 27.59 32.17 31.99 27.16
31.70 33.33 32.63];
X1=X11'
X2=X21'
X3=X31'
Y1=Y11'
n=length(Y1);
x1=mean(X11')
x2=mean(X21')
x3=mean(X31')
h1=5;
h2=10;
h3=15;
% hitung f topi
for i=1:n
    Khx1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x1-X1(i))/h1)^2)
    Khx2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x2-X2(i))/h2)^2)
    Khx3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x3-X3(i))/h3)^2)
    % hitung Qt
    for j=1:n
        % hitung K
        KhX1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X1(j)-X1(i))/h1)^2)
        KhX2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X2(j)-X2(i))/h2)^2)
        KhX3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X3(j)-X3(i))/h3)^2);
        tmp1(j)=KhX1*KhX2*KhX3;
    end
    Qt=1/n*sum(tmp1);
    tmp2(i)=(Y1(i)*(1/n)*Khx1*Khx2*Khx3)/Qt;
    ft=1/n*sum(tmp2)
end
ft=1/n*sum(tmp2);
% hitung GCV
% - hitung GCV1 (pembilang)
for i=1:n
    tmp3(i)=(Y11(i)-ft)^2;

```

```
end
    GCV1=1/n*sum(tmp3);
    MSE=GCV1
end
```



Lampiran 3: Program mencari $\hat{f}(x_1, x_2, x_3)$ pada *bandwidth* h_1, h_2, h_3

```

% X:data dari x
% x:rata-rata dari x

X11=[11.51 1.71 11.06 14.94 14.96 20.96 12.65 9.55 22.70 19.29 14.23
14.26 4.94 19.82 15.86 24.22 11.26 33.40 22.51 25.12 18.20 42.53
34.72 13.86];
X21=[1.94 5.74 0 1.35 1.47 2.75 0 4.12 4.00 0 0.77 2.32 1.95 2.02
1.20 2.53 0.84 0 4.60 0 2.34 6.04 0 0];
X31=[72.26 74.30 52.67 71.22 74.15 68.18 82.83 79.41 67.07 71.12
70.61 83.42 91.76 76.86 77.75 55.37 69.47 49.39 69.41 70.85 60.95
46.55 65.28 84.04];
Y11=[28.57 27.25 21.24 29.17 30.19 30.63 31.82 31.02 31.25 30.13
28.53 33.33 32.88 32.9 31.60 27.37 27.19 27.59 32.17 31.99 27.16
31.70 33.33 32.63];
X1=X11'
X2=X21'
X3=X31'
Y1=Y11'
n=length(Y1);
x1=11.51
x2=1.94
x3=72.26
h1=10;
h2=15;
h3=20;
% hitung f topi
for i=1:n
    Khx1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x1-X1(i))/h1)^2)
    Khx2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x2-X2(i))/h2)^2)
    Khx3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((x3-X3(i))/h3)^2)
    % hitung Qt
    for j=1:n
        % hitung K
        KhX1=1/(h1*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X1(j)-X1(i))/h1)^2)
        KhX2=1/(h2*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X2(j)-X2(i))/h2)^2)
        KhX3=1/(h3*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((X3(j)-X3(i))/h3)^2);
        tmp1(j)=KhX1*KhX2*KhX3;
    end
    Qt=1/n*sum(tmp1);
    tmp2(i)=(Y1(i)*(1/n)*Khx1*Khx2*Khx3)/Qt;
    ft=1/n*sum(tmp2)
end
Qt=Qt
ft=1/n*sum(tmp2)
end

```





RIWAYAT HIDUP

Nama Nirmala, lahir pada tanggal 18 Agustus 1993 di Pattengko. Anak bungsu dari lima bersaudara, pasangan dari Mashud dan Hj.Nurhawi. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 288 Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur mulai 2000-2006. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tomoni Timur pada tahun 2006-2009. Penulis melanjutkan pendidikan SMAN 1 Tomoni Timur pada tahun 2009-2012. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan keperguruan tinggi Negeri mengambil Jurusan Matematika Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sewaktu kuliah penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK).