

**PENGARUH MASASE KAKI TERHADAP PENURUNAN TEKANAN
DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
ALAUDDIN
FITRIANI
M A K A S S A R
NIM: 70300111024

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, April 2015

Penulis,

Fitriani



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Masase Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa”, yang disusun oleh Fitriani, NIM: 70300111024, mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 17 April 2015 M, bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan.

Gowa, 17 April 2015 M.
27 Jumadil Akhir 1436 H.


DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	:	Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., A.pt	(.....)
Munaqisy I	:	dr. Ulfah Rimayanti Ph.D	(.....)
Munaqisy II	:	Drs. H. Muh. Dahlan M, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	:	Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	:	dr. Rosdianah, S.Ked., M.Kes	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung. Dzat yang telah menganugerahkan securah rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan darft skripsi ini yang berjudul “*Pengaruh Masase Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa*”. skripsi ini selain membahas secara konsep juga membahas terhadap pandangan islam. Sehingga, tentunya dengan sistem ini dapat membantu para pembaca yang budiman agar dapat mengintegrasikan disiplin ilmu kesehatan dengan Islam. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Untuk kedua orang tuaku Dg. Mata’ dan Nurbaeti Dg. Ngai sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A selaku PJs Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan izin dalam hal penyusunan skripsi ini.
3. DR. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan, arahan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penghargaan penulis yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes sebagai pembimbing I dan dr. Rosdianah, S.Ked., M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehatnya untuk membimbing penulis sejak dari awal rencana penelitian hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada dr. Ulfah Rimayanti selaku penguji I dan Drs. H. Muh. Dahlan, M.Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Pimpinan Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa yang telah memberikan izin untuk memperoleh data dan melakukan penelitian di institusinya.
7. Sahabat-sahabatku, Hutomo Mandala Putra, Resqi Awaliah, Armi Aulia Utami, Fitria Nur, Budi Yudha Prawira, Nasruddin, dan Yuridul yang telah memberikan dorongan dan motivasi sampai saat ini.

8. Teman-teman seperjuangan selama penyusunan skripsi Fitriani, Khairun Nisa, Ina Anggriani, Helmi Juwita, Valdesyiah, Etti Iswahyuni, Enita, Dinianti, dan Fatmawati akhirnya orang tua kita bisa menyaksikan kita memakai toga.
9. Teman-teman KKN angkatan 50 Desa Biangloe yang selama ini memberi dorongan semangat dan bisa memahami keadaan kami mahasiswa keperawatan yang sering meninggalkan posko karena urusan jurusan.
10. Seluruh teman mahasiswa keperawatan angkatan Oxigenasi UIN Alauddin Makassar yang tidak sempat saya sebut satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semogailmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Amin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A

Makassar, 09 Maret 2015

Penulis

Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tekanan Darah.....	11
1. Definisi.....	11
2. Pengukuran Tekanan Darah	12
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah	13
4. Mekanisme Pengontrolan Tekanan Darah	15
5. Gangguan Tekanan Darah.....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi.....	17
1. Defenisi	17
2. Klasifikasi Hipertensi.....	18
3. Manifestasi Klinis Hipertensi.....	19
4. Mekanisme Terjadinya Hipertensi	20
5. Respon Penderita Hipertensi	21
6. Penatalaksanaan Hipertensi.....	22
7. Komplikasi Hipertensi.....	32
8. Faktor Risiko Hipertensi	35
C. Tinjauan Umum Tentang Masase	37
1. Definisi	37
2. Manfaat Masase.....	37
3. Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Masase	39
4. Kontraindikasi Masase terhadap Hipertensi.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Masase pada Kaki	42
1. Definisi.....	42
2. Manfaat.....	42
3. Prosedur.....	43
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Meridian.....	44
F. Kerangka Pikir.....	45
G. Kerangka Konsep	47
H. Alur Penelitian.....	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Lokasi Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50

C. Populasi dan sampel.....	50
1. Populasi Penelitian.....	50
2. Sampel Penelitian.....	50
3. Teknik Pengambilan Sampel.....	50
D. Pengumpulan data.....	52
1. Sumber Data.....	52
2. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Instrumen penelitian.....	53
1. Wawancara.....	53
2. Pengukuran Observasi.....	53
F. Teknik Pengolahan dan analisis data.....	53
1. Teknik Pengolahan Data.....	53
2. Analisa Data.....	54
G. Pertimbangan Etik.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	58
B. Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hypertension Classification

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi

Tabel 4.3 Hasil Uji T-Test pada Kelompok Kontrol (Pre-Post Test Sistol)


Tabel 4.4 Hasil Uji *Wilcoxon Test* pada Kelompok Perlakuan Pre-Post Test Sistol dan Pre-Post Test Diastol) dan pada Kelompok Kontrol (Pre-Post Diastol)



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perubahan tekanan darah pre-post test pada kelompok perlakuan

Grafik 4.2 Perubahan tekanan darah pre-post test pada kelompok kontrol



ABSTRAK

Nama : Fitriani

NIM : 70300111024

Judul Skripsi : Pengaruh Masase Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa

Masase atau pijat merupakan penggunaan tekanan dan gerakan yang bervariasi untuk memanipulasi otot dan jaringan lunak lainnya. Dengan melemaskan jaringan lunak tubuh, lebih banyak darah dan oksigen dapat mencapai daerah yang terkena dampak dan mengurangi nyeri.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 23-29 Januari 2015.

Penelitian ini menggunakan metode the static group comparasion yaitu desain yang dirancang untuk meneliti pengaruh dari sebuah uji coba terhadap sekelompok objek penelitian dengan membandingkannya pada kelompok kontrol. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai tekanan darah pre dan post kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Analisa data menggunakan uji wilcoxon untuk membuktikan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa hasil dari pemberian intervensi masase kaki mempunyai pengaruh terhadap penurunan tekanan darah dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi masase kaki.

Kesimpulan penelitian didapatkan hasil uji wilcoxon didapatkan nilai signifikan $p=0.004$ (tekanan darah sistol) dan $p=0.005$ (tekanan darah diastol) hal ini mengidentifikasi adanya pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.

Saran untuk tenaga kesehatan khususnya tenaga perawat agar melakukan pelatihan masase kaki bagi perawat sebagai salah satu intervensi yang harus terus menerus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dalam menurunkan tekanan darah.

Kata Kunci

Masase Kaki, Tekanan Darah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang dikenal dengan istilah *silent killer* karena gejalanya hanya sedikit, bahkan terkadang tanpa gejala (Palmer, 2007). Hal ini yang menyebabkan sedikit sekali orang beranggapan bahwa kondisi ini mengancam jiwa padahal hipertensi merupakan penyebab utama stroke, serangan jantung, gagal jantung, gagal ginjal, dimensia dan kematian premature. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, umur penderitanya bisa diperpendek 10-20 tahun (Sheps, 2005).

Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2011 ada 1 milyar orang di dunia menderita hipertensi dan dua per-tiga diantaranya berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah-sedang. Prevalensi hipertensi diperkirakan akan terus meningkat, dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. Jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya, di Inggris (UK) penyakit ini diperkirakan mengenai lebih dari 16 juta orang. Di Inggris (England) 34% pria dan 30% wanita menyandang tekanan darah tinggi diatas 140/90 mmHg dan sedang menjalani pengobatan (Palmer, 2007).

Dari berbagai survei didapatkan dalam sepuluh tahun terakhir prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat secara bermakna. Hipertensi merupakan penyumbang kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) yang meningkat dari

41,7% menjadi 60%. Survey terakhir di Indonesia menunjukkan PTM mendominasi 10 urutan teratas penyebab kematian pada semua kelompok umur, dengan stroke yang merupakan komplikasi hipertensi sebagai penyebab kematian nomor satu. Dimana perempuan memiliki prevalensi hipertensi sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Peningkatan prevalensi hipertensi, menjadi ancaman serius bagi pembangunan kesehatan Indonesia karena di samping mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi juga mahalnya biaya pengobatan yang harus diberikan sepanjang hidup, sehingga berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Kesehatan, 2013).

Prevalensi hipertensi pada orang dewasa yang lebih tua dari 30 meningkat dari 22,3% menjadi 24,6% pada tahun 2007 dan menjadi 26,9% pada tahun 2008, dengan laki-laki memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (29,4% berbanding 26,4% perempuan). Prevalensi prehipertensi adalah 23,4% secara keseluruhan dan juga lebih tinggi pada laki-laki (28,4% berbanding 18,7% perempuan), dengan peningkatan yang signifikan dalam prevalensi dimulai pada usia 40-an (Kim,dkk, 2012).

Berdasarkan profil dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008, penyakit hipertensi menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus mencapai 63,66% sedangkan pada tahun 2009 jumlah kasus mencapai 49,56%. Pada tahun 2012, penyakit hipertensi menduduki peringkat kedua setelah penyakit asma untuk penyebab kematian terbesar di kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan jumlah penderita sebanyak 574 orang akibat penyakit hipertensi (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2012).

Walaupun demikian, hipertensi masih belum mendapat perhatian yang cukup. Penyebab utamanya karena penyakit ini baru menunjukkan gejala setelah tingkat lanjut. Hal ini yang menyebabkan pengobatan hipertensi belum mencapai hasil yang memuaskan, contohnya di Amerika Serikat keberhasilan terapi ini sampai tahun 1994 hanya sekitar 30% (Sheps, 2005). Penanganan hipertensi dapat dilakukan dengan cara farmakologis yaitu dengan obat-obat anti hipertensi atau secara non farmakologis yaitu dengan modifikasi gaya hidup atau bisa juga kombinasi dari kedua-duanya (Dekker, 1996).

Pada saat ini anti-hipertensi diperlukan, pengobatan non-farmakologis dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan efek pengobatan yang lebih baik (Dalimartha, 2008). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengobatan non farmakologis merupakan intervensi wajib yang harus dilakukan pada setiap pengobatan hipertensi (Smeltzer & Bare, 2002). Salah satu terapi non farmakologis yang ditawarkan untuk menurunkan hipertensi dengan terapi masase (pijat). Teknik pemijatan dapat menghilangkan sumbatan dalam aliran darah sehingga aliran darah dan energi di dalam tubuh kembali lancar (Dalimartha, 2008).

Pada kasus hipertensi terapi pijat melalui titik akupuntur memperkuat kembali energi tubuh dan raga yang sudah lemah. Akupuntur ini bekerja berdasarkan teori meridian yaitu *qi* (energy vital) dan darah yang bersirkulasi dalam tubuh melalui sistem saluran yang disebut meridian yang menghubungkan organ internal dengan eksternal. Dengan pemijatan, titik tertentu pada permukaan tubuh yang terletak dijalur meridian dirangsang sehingga aliran *qi* dan darah bisa

diatur sehingga resiko penyakit hipertensi dan komplikasinya dapat dimimalisir (Dalimartha, 2008).

Dalam terapi pijat tidak semua orang bisa melakukannya hanya orang-orang profesional yang bisa melakukan terapi pijat, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Mujadillah/58:11*:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadillah/58:11).

Bukti dari penelitian yang melibatkan perawat, meskipun dibatasi oleh jumlah dan kualitas, menunjukkan efek terapi pijat mengurangi potensi stres bila digunakan di tempat kerja klinis. Misalnya, seminggu sekali minimal 15 kali pijat secara signifikan mengurangi gejala psikologis kecemasan dalam akut perawat rumah sakit perawatan (Moyle,dkk, 2013).

Radar (2009) di RSUD Muhammadiyah Malang, masase kaki digunakan pada seorang yang menderita hipertensi tekanan darah sistoliknya sebelum di terapi adalah 180 mmHg setelah dilakukan terapi selama 30 menit tekanan darah sistoliknya menurun 150 mmHg. Penurunan tekanan darah sistolik

ini karena masase kaki bisa merilekskan tubuh dan pembuluh darah mengalami vasodilatasi.

Pristiwandono (2013) di wilayah kerja Puskesmas Patrang, remedian massage digunakan untuk penderita diabetes melitus tipe 2 yang mengalami keluhan terhadap gejala dari gangguan sirkulasi darah perifer seperti nyeri saat bersalin, mati rasa, mengalami kram, kesemutan, kaki mengalami nyeri seperti terbakar dan hilangnya nadi pedis. Pemberian remedian massage ini memberikan pengaruh terhadap gangguan sirkulasi darah perifer pada penderita diabetes melitus tipe 2.

Menurut penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2014) saat ini pengobatan untuk menangani hipertensi dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara untuk mengobati hipertensi adalah dengan cara masase. Teknik pemijatan berdampak terhadap lancarnya sirkulasi darah, menyeimbangkan aliran energi di dalam tubuh serta mengendurkan ketegangan otot. Meskipun peneliti menganggap teknik pemijatan tidak akan berdampak banyak pada hipertensi berat, namun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa masase dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan dan sedang. Seperti penelitian yang dilakukan di desa karyawangi Kab. Bandung Barat pada perempuan prehipertensi nilai rata-rata sistol sebelum masase kaki 133,4 setelah 15 menit menjadi 120. Diastol 83 setelah 15 menit menjadi 73,8 ini berarti terjadi penurunan tekanan darah.

Berdasarkan data awal dari Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa tahun 2013 dalam jumlah kunjungan (rawat jalan) di Kecamatan Bontomarannu pasien hipertensi terdapat 178 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 82 orang dan

perempuan 96 orang. Pada tahun 2014 pasien hipertensi mencapai 259 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 117 orang dan perempuan 142 orang. Dari data awal yang didapatkan sementara bisa dilihat bahwa pasien dengan kasus hipertensi lebih di dominasi oleh perempuan (Data Puskesmas Bontomarannu, 2014).

Menurut petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengelola data untuk kasus hipertensi, program yang telah dilakukan adalah pemberian pengobatan, menjalankan program senam untuk penderita hipertensi dalam memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang dilaksanakan di kantor Camat Bontomarannu. Penjelasan dari pengelola puskesmas mengatakan bahwa pemberian masase kaki belum pernah dilakukan di puskesmas tersebut (Data Puskesmas Bontomarannu, 2014)

Beberapa penelitian diatas dan data yang didapatkan dari puskesmas sangat menunjang penelitian ini tentang masase kaki. Penelitian ini mempunyai tujuan bahwa masase kaki dapat digunakan dalam perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satunya masase kaki dapat digunakan dalam menurunkan tekanan darah sehingga dapat menunjang untuk penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah masase kaki berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi?

C. Hipotesis

Ada pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Penurunan tekanan darah adalah keadaan dimana tekanan darah menurun secara signifikan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan tensimeter air raksa yang telah dikalibrasi, pengukuran dilakukan minimal 3 kali kemudian rata-rata dari hasil pengukuran pertama dijadikan hasil untuk tekanan darah (pre) setelah itu dilakukan lagi pengukuran minimal 3 kali dan rata-rata dari pengukuran kedua dijadikan hasil untuk tekanan darah (post).
- b. Masase kaki adalah pemijatan yang dilakukan di daerah belakang kaki, depan kaki, punggung kaki dan telapak kaki. Pemijatan dilakukan untuk melebarkan aliran darah dan merilekskan tubuh responden. Pemijatan ini dilakukan setelah pengukuran tekanan darah awal (pre), kemudian dilakukan pengukuran kedua (post) setelah intervensi diberikan. pemijatan ini dilakukan selama 7 kali/responden dengan frekuensi sekali sehari dengan lama pemijatan ± 20 menit.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Karena luasnya cakupan proyek pada penelitian ini, maka dilakukan pembatasan. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya dilakukan terhadap masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa yang menderita hipertensi.

E. Kajian Pustaka

1. Radar (2009) di RSUD Muhammadiyah Malang, masase kaki digunakan pada seorang yang menderita Hipertensi tekanan darah sistoliknya sebelum di terapi adalah 180 mmHg setelah dilakukan terapi

selama 30 menit tekanan darah sistoliknya menurun 150 mmHg. Penurunan tekanan darah sistolik ini karena masase kaki bisa merilekskan tubuh dan pembuluh darah mengalami vasodilatasi.

2. Pristiwandono (2013) di wilayah kerja Puskesmas Patrang, remedian massage digunakan untuk penderita diabetes melitus tipe 2 yang mengalami keluhan terhadap gejala dari gangguan sirkulasi darah perifer seperti nyeri saat bersalin, mati rasa, mengalami kram, kesemutan, kaki mengalami nyeri seperti terbakar dan hilangnya nadi pedis. Pemberian remedian massage ini memberikan pengaruh terhadap gangguan sirkulasi darah perifer pada penderita diabetes melitus tipe 2.
3. Masase merupakan teknik integrasi sensori yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom. Apabila seseorang mempersepsikan sentuhan sebagai stimulus rileks maka akan muncul respon relaksasi (Perry & Potter, 2005). Melakukan masase pada otot-otot besar pada kaki dapat memperlancar sirkulasi darah dan saluran getah bening serta membantu mencegah varises. Pada saat melakukan masase pada otot-otot kaki maka tingkatkan tekanan ke otot ini secara bertahap untuk mengendurkan ketegangan sehingga membantu memperlancar aliran darah ke jantung. Masase pada kaki diakhiri dengan masase pada telapak kaki yang akan merangsang dan menyegarkan kembali bagian kaki sehingga memulihkan sistem keseimbangan dan membantu relaksasi (Aslani, 2003).
4. Menurut penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2012) saat ini pengobatan untuk menangani hipertensi dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara untuk mengobati hipertensi adalah dengan cara masase. Teknik

pemijatan berdampak terhadap lancarnya sirkulasi darah, menyeimbangkan aliran energi di dalam tubuh serta mengendurkan ketegangan otot. Meskipun peneliti menganggap teknik pemijatan tidak akan berdampak banyak pada hipertensi berat, namun penelitian ini telah membuktikan bahwa masase dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan dan sedang. Seperti penelitian yang dilakukan di desa karyawangi Kab. Bandung Barat pada perempuan prehipertensi nilai rata-rata sistol sebelum masase kaki 133,4 setelah 15 menit menjadi 120. Diastol 83 setelah 15 menit menjadi 73,8 ini berarti terjadi penurunan tekanan darah.

5. Mulyati (2011), neuropati sensorik dan perubahan perfusi perifer merupakan jenis komplikasi jangka panjang pada pasien diabetes melitus tipe 2. Kedua masalah ini menyebabkan pasien berisiko mengalami trauma pada kaki. Gejala neuropati dapat berupa perubahan ankle brachial index (ABI). Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi gejala neuropati sensori dan perubahan perfusi perifer, salah satu diantaranya adalah masase kaki secara manual yang sampai saat ini belum ditemukan penelitian terkait. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah masase kaki secara manual berpengaruh terhadap peningkatan sensasi proteksi dan penurunan nyeri pasien diabetes melitus tipe 2.

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Responden

Responden dapat memilih perawatan alternatif salah satunya adalah pemberian masase kaki dalam penurunan tekanan darah.

2. Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan keilmuan, cakrawala pengetahuan dan pengembangan intervensi keperawatan nonfarmakologis serta sebagai ajang pengembangan diri, khususnya dalam bidang peneliti lapangan.

3. Bagi Perawat Puskesmas Bontomarannu

Petugas kesehatan dapat mengevaluasi dan dapat menjadikan metode masase kaki sebagai salah satu intervensi mandiri perawat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.

4. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan, dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan serta menjadi sumber motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan.

5. Bagi Peneliti Lain

Dapat dipakai sebagai sumber informasi dan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tekanan Darah

1. Defenisi

Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Darah yang dengan lancar beredar ke seluruh bagian tubuh berfungsi sangat penting sebagai media pengangkut oksigen serta zat-zat lain yang diperlukan bagi kehidupan sel-sel tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai sarana pengangkut sisa hasil metabolisme yang tidak berguna lagi dari jaringan tubuh (Gunawan, 2001).

Istilah “tekanan darah” berarti tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik di dalam tubuh manusia. Tekanan darah dibedakan antara tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik (Gunawan, 2001).

Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup (systole). Adapun tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali (diastole) (Gunawan, 2001).

Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik, dengan nilai dewasa normalnya berkisar dari 100/60 sampai 140/90. Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 (Brunner & Suddarth, 2001).

2. Pengukuran Tekanan Darah

Untuk mengontrol tekanan darah maka perlu dilakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pada metode langsung, kateter arteri dimasukkan ke dalam arteri. Walaupun hasilnya sangat tepat, akan tetapi metode pengukuran ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. Sedangkan pengukuran tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop (Brunner & Suddarth, 2001).

Sphygmomanometer tersusun atas manset yang dapat dikembangkan dan alat pengukur tekanan yang berhubungan dengan rongga dalam manset. Alat ini dikalibrasi sedemikian rupa sehingga tekanan yang terbaca pada manometer sesuai dengan tekanan dalam millimeter air raksa yang dihantarkan oleh arteri brakialis (Brunner & Suddarth, 2001).

Cara mengukur tekanan darah yaitu dimulai dengan membalutkan manset dengan kencang dan lembut pada lengan atas dan dikembangkan dengan pompa. Tekanan dalam manset dinaikkan sampai denyut radial atau brakial menghilang. Hilangnya denyutan menunjukkan bahwa tekanan sistolik darah telah dilampaui dan arteri brakialis telah tertutup. Manset dikembangkan lagi sebesar 20 sampai 30 mmHg diatas titik hilangnya denyutan radial. Kemudian manset dikempiskan perlahan, dan dilakukan pembacaan secara auskultasi maupun palpasi. Dengan palpasi kita hanya dapat mengukur tekanan sistolik. Sedangkan dengan auskultasi kita dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik dengan lebih akurat (Brunner & Suddarth, 2001).

Untuk mengauskultasi tekanan darah, ujung stetoskop yang berbentuk corong atau diafragma diletakkan pada arteri brakialis, tepat di bawah lipatan siku (rongga antekubital), yang merupakan titik dimana arteri brakialis muncul di antara kedua kaput otot biceps. Manset dikempiskan dengan kecepatan 2 sampai 3 mmHg per detik, sementara kita mendengarkan awitan bunyi berdetak, yang menunjukkan tekanan darah sistolik. Bunyi tersebut dikenal sebagai Bunyi Korotkoff yang terjadi bersamaan dengan detak jantung, dan akan terus terdengar dari arteri brakialis sampai tekanan dalam manset turun di bawah tekanan diastolik dan pada titik tersebut, bunyi akan menghilang (Brunner & Suddarth, 2001).

3. Faktor yang Mempertahankan Tekanan Darah

Menurut Pearce (1979), faktor-faktor yang mempertahankan tekanan darah yaitu:

- a. *Banyaknya darah yang beredar.* Untuk membuat tekanan dalam suatu susunan tabung maka tabung perlu diisi sepenuhnya. Oleh karena dinding pembuluh darah adalah elastis dan dapat mengembang, maka harus diisi lebih supaya dapat dibangkitkan suatu tekanan. Pemberian cairan seperti plasma atau garam akan menyebabkan tekanan naik lagi.
- b. *Viskositas (kekentalan) darah.* Viskositas darah disebabkan oleh protein plasma dan oleh jumlah sel darah yang berada di dalam aliran darah. Setiap perubahan pada kedua faktor ini akan merubah tekanan darah. Misalnya dalam anemia jumlah sel dalam darah berkurang dan dengan sendirinya tekanan menjadi lebih rendah, seandainya jantung dan sistem vasomotorik tidak bekerja lebih giat untuk mengimbangnya.

Besarnya geseran yang ditimbulkan oleh cairan terhadap dinding tabung yang dilaluinya, berbeda-beda sesuai dengan viskositas cairan. Makin pekat cairan makin besar kekuatan yang diperlukan untuk mendorongnya melalui pembuluh darah.

- c. *Elastisitas dinding pembuluh darah.* Di dalam arteri tekanan lebih besar dari yang ada dalam vena sebab otot yang membungkus arteri lebih elastis daripada yang ada pada vena.
- d. *Tahanan tepi (Resistensi perifer).* Ini adalah tahanan yang dikeluarkan oleh geseran darah yang mengalir dalam pembuluh. Tahanan utama pada aliran darah dalam sistem sirkulasi besar berada di dalam arteriole dan turunnya tekanan terbesar terjadi pada tempat ini. Arteriole juga “menghaluskan denyutan yang keluar” dari tekanan darah sehingga denyutan tidak kelihatan di dalam kapiler dan vena.
- e. *Kecepatan aliran darah.* Kecepatan darah mengalir tergantung pada ukuran palung yang ada pada pembuluh atau kelompok pembuluh. Darah dalam aorta bergerak cepat. Di dalam arteri kecepatannya berkurang dan menjadi sangat lambat di dalam kapiler.

Tekanan dapat dilihat ketika darah kembali mencapai pembuluh-pembuluh (vena) yang lebih besar di dekat jantung. Di dalam palung kapiler atau “kolam kapiler” seperti biasanya disebut, darah mengalir melalui pembuluh darah yang sangat kecil dalam jumlah yang sangat besar. Luas sebenarnya dari penampang daerah yang dialiri oleh pembuluh kecil-kecil ini kira-kira 600 kali lebih besar daripada yang dialiri oleh aorta.

Pelebaran daerah yang dilalui oleh aliran darah yang sama jumlahnya menyebabkan pelambatan arus secara nyata. Disinilah, di dalam aliran yang sangat lamban ini, terjadi pertukaran gas, peresapan zat makanan, dan bahan yang tak terpakai lagi, antara sel-sel darah merah dan plasma di dalam kapiler dengan cairan dan sel dalam jaringan tubuh.

Sesudah darah ditampung oleh vena maka kecepatan mengalir bertambah lagi dan darah yang mengalir melalui lumen (ruang) vena kava inferior dan superior secara bersamaan adalah sama cepatnya dengan arus dalam aorta. Untuk mempertahankan sirkulasi, maka darah yang mencapai jantung harus mempunyai volume yang sama dengan darah yang meninggalkan jantung. Tekanan darah dalam vena adalah rendah dan faktor lain yang membantu aliran darah kembali ke jantung mencakup:

Gerakan otot kerangka yang mengeluarkan tekanan di atas vena.

Gerakan yang dihasilkan pernapasan, khususnya oleh naik-turunnya diafragma yang bekerja sebagai pompa.

Kerja mengisap yang dikeluarkan oleh atrium yang kosong sewaktu diastole, menarik darah dari vena untuk mengisinya.

Tekanan darah arterial, meskipun sebagian besar telah berkurang oleh arteriol kapiler, tetapi masih cukup untuk mendorong darah maju.

4. Mekanisme Pengontrolan Tekanan Darah

Tekanan darah dikontrol oleh berbagai proses fisiologis yang berkerja bersamaan, serangkaian mekanisme inilah yang memastikan darah mengalir di sirkulasi dan memungkinkan jaringan mendapatkan nutrisi agar dapat berfungsi

dengan baik. Jika salah satu mekanisme mengalami gangguan, maka dapat terjadi tekanan darah tinggi (Palmer & Williams, 2005).

Tekanan darah diatur oleh serangkaian saraf otonom dan hormon yang memonitor volume darah dalam sirkulasi, diameter pembuluh darah, dan kontraksi jantung. Setiap faktor ini secara intrinsik berkaitan erat dengan pengaturan tekanan darah di dalam pembuluh darah (Palmer & Williams, 2005).

Nilai pembuluh darah bergantung pada kekuatan kontraksi jantung, diameter pembuluh darah, dan volume darah di dalam sirkulasi. Mekanisme kerjanya mirip dengan tekanan air keluar dari selang. Anda dapat meningkatkan kekuatan air dengan memutar air kram lebih besar (sama dengan membuat jantung berkontraksi lebih kuat dan lebih cepat) atau dengan menekan ujung selang dan meningkatkan tekanan selang (sama dengan pembuluh darah yang menyempit dan berkontraksi) (Palmer & Williams, 2005).

5. Gangguan Tekanan Darah

Pengaturan tekanan darah secara normal seperti yang dipaparkan sebelumnya sangatlah kompleks. Ketika jantung berdenyut, jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah dan tekanan darah meningkat. Ini disebut tekanan darah sistolik, yakni angka tekanan darah tertinggi. Pada saat jantung rileks (tidak berdenyut) tekanan darah jatuh ke tingkat terendah. Ini disebut tekanan darah diastolik, yakni angka terbawah. menyatakan bahwa pada 10 sampai 15 persen orang-orang dewasa, sistem regulasinya sering terjadi kelainan walaupun sedikit (Hayens, 2003).

Ada dua macam gangguan tekanan darah yaitu tekanan darah meningkat terus-menerus yang disebut tekanan darah tinggi atau hipertensi dan tekanan

darah dibawah normal yang dapat memicu kelelahan yang disebut tekanan darah rendah atau hipotensi. Akan tetapi komplikasi yang terjadi pada penderita tekanan darah rendah tidak seberat tekanan darah tinggi (Hayens, 2003).

Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada informasi tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi.

B. Hipertensi

1. Defenisi

Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi persisten dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg (Brunner & Suddarth, 2001).

Menurut Ganong (1998) dalam safitri (2012) mengatakan bahwa hipertensi adalah peningkatan menetap tekanan arteri sistemik. Jadi tekanan di atas dapat di artikan sebagai peningkatan secara abnormal dan terus menerus pada tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal.

Hipertensi terbagi menjadi beberapa jenis seperti hipertensi renal atau *Goldblatt* yang disebabkan konstriksi salah satu arteri ginjal sehingga terjadi peningkatan tekanan darah yang menetap (Ganong, 1998). Selain itu, kira-kira 20 persen penderita hipertensi mempunyai tekanan darah lebih tinggi di kantor dokter dibandingkan dengan aktivitas normal sehari-hari yang biasa disebut hipertensi jas putih. Pada 90 persen pasien yang mengalami peningkatan tekanan

darah yang tidak diketahui penyebabnya biasa disebut menderita hipertensi esensial (Sobel, 1998).

2. Klasifikasi Hipertensi

Menurut Martha (2012), Penyakit darah tinggi atau hipertensi dikenal dengan 2 tipe klasifikasi, di antaranya Hipertensi Primary dan Hipertensi Secondary.

- a. Hipertensi primary adalah suatu kondisi dimana terjadinya tekanan darah tinggi sebagai akibat dampak dari gaya hidup seseorang dan faktor lingkungan. Seseorang yang pola makannya tidak terkontrol dan mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas, merupakan pencetus awal untuk terkena penyakit hipertensi.

Begitu pula seseorang yang berada dalam lingkungan atau kondisi stressor tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bisa mengalami tekanan darah tinggi.

- b. Hipertensi secondary adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang mengalami atau menderita penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Sedangkan pada ibu hamil, tekanan secara umum meningkat saat kehamilan berusia 20 minggu, terutama pada wanita yang berat badannya di atas normal atau gemuk.

Menurut *Joint National Committee (JNC-8) 2011*, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi:

Table 1.1 Hypertension Classification

Classification	Systolic Blood Pressure	Diastolic Blood Pressure
Normal Blood Pressure	<120 mmHg	<80 mmHg
Prehypertension	120-139 mmHg	80-89 mmHg
Stage 1 Hypertension	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Stage 2 Hypertension	≥160 mmHg	≥100 mmHg

Sumber: *Joint National Committee (JNC-8) 2011*

3. Manifestasi Klinis Hipertensi

Hipertensi sulit disadari oleh seseorang karena hipertensi tidak memiliki gejala khusus (Martha, 2011).

Menurut Martha (2011), gejala-gejala yang mungkin diamati antara lain yaitu:

- a. Gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala.
- b. Sering gelisah.
- c. Wajah merah.
- d. Tengok terasa pegal.
- e. Mudah marah.
- f. Telinga berdengung.
- g. Sukar tidur.
- h. Sesak nafas.

- i. Rasa berat di tengkuk.
- j. Mudah lelah.
- k. Mata berkunang-kunang.
- l. Mimisan.

4. Mekanisme Terjadinya Hipertensi

Hipertensi terjadi melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh Angiotensin-Converting Enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. ACE yang terdapat di paru-paru, mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama (Martuti, 2009).

Pertama, dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituitary) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urine. Meningkatnya ADH, menyebabkan urine yang diekskresikan ke luar tubuh sangat sedikit (antidiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstra seluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Kemudian terjadi peningkatan volume darah, sehingga tekanan darah akan meningkat (Martuti, 2009).

Kedua, dengan menstimulasi sekresi aldosteron (hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal) dari korteks adrenal. Pengaturan volume cairan ekstraseluler oleh aldosteron dilakukan dengan mengurangi ekskresi NaCl

dengan cara mereabsorbsinya dari tubulus ginjal. Pengurangan ekskresi NaCl menyebabkan naiknya konsentrasi NaCl, yang kemudian diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Maka terjadilah peningkatan volume dan tekanan darah (Martuti, 2009).

5. Respon Penderita Hipertensi

Tekanan darah tinggi seringkali tidak menimbulkan keluhan-keluhan langsung, tetapi lama-kelamaan dapat mengakibatkan berbagai penyakit (Dekker, 1996). Menurut Price dan Wilson (2005) dalam Safitri (2012) bahwa perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan, dalam keadaan ini penderita hipertensi mungkin tidak menunjukkan gejala yang spesifik selama bertahun-tahun. Kemudian apabila terjadi gejala pada penderita maka biasanya hanya bersifat non-spesifik, misalnya sakit kepala atau pusing, tetapi masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna.

Pada waktu tidur malam hari tekanan darah berada dalam kondisi rendah, sebaliknya tekanan darah dipengaruhi oleh kegiatan harian sehingga bila semakin aktif seseorang maka semakin naik tekanan darahnya, apalagi pada waktu olahraga berat (Hayens, 2003). Dapat dibayangkan semakin tinggi tekanan darah seseorang maka semakin tinggi kekuatan yang mendorong darah dan dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan perdarahan (haemorrhage) yang dapat terjadi di otak dan jantung sehingga dapat mengakibatkan, stroke, gagal jantung bahkan kematian (Hayens, 2003).

Pada penderita hipertensi, faktor tekanan darah memegang peranan penting dalam menentukan boleh tidaknya berolahraga serta takaran dan jenis

olahraga yang sesuai dengan kondisi penyakitnya (Hayens,2003). Hal ini sangat penting terutama pada penderita hipertensi berat yang dalam keadaan diam tekanan darahnya sudah sangat tinggi maka apabila bergerak atau melakukan aktifitas fisik yang berat dapat lebih meningkatkan tekanan darahnya sehingga dapat berakibat fatal (Hayens, 2003).

Untuk menghindari hasil penelitian yang bias maka penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi dan terapi lainnya sehingga sangat berbahaya bila dilakukan pada penderita hipertensi berat dan maligna (Hayens, 2003).

6. Penatalaksanaan Hipertensi

a. Penatalaksanaan Farmakologis

Menurut Martuti (2009), penatalaksanaan farmakologis pada penderita hipertensi yaitu:

1) Diuretik

Diuretik biasanya diberikan sebagai obat pertama untuk mengobati hipertensi. Ia berdampak pada pengurangan volume cairan di seluruh tubuh dengan membantu ginjal membuang garam dan air. Diuretik dapat membuat daya pompa jantung menjadi lebih ringan dan pembuluh darah melebar. Diuretik juga membuat tubuh dapat bertindak cepat untuk melindungi diri dari kehilangan terlalu banyak air dan garam yang dapat sangat membahayakan. Dalam beberapa hari setelah penggunaan diuretik, terjadilah keseimbangan baru, tubuh hanya kehilangan sedikit air dan garam. Berkurangnya volume cairan berakibat pada hilangnya kalium melalui urine sehingga penggunaan diuretik kadang-kadang bersamaan dengan penambahan kalium atau obat penahan kalium.

Penggunaan diuretik sangat efektif pada penderita hipertensi berusia lanjut usia, obesitas, dan penderita gagal jantung atau penyakit ginjal menahun. Diuretik dapat dipakai secara tunggal, namun penggunaan dalam dosis kecil sering dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain untuk meningkatkan efek obat-obatan tersebut. Diuretik juga merupakan pilihan yang tepat bagi yang alergi terhadap obat-obatan *sulfa*, dan asam *ethacrynic*. Diuretik tidak boleh diberikan oleh wanita hamil.

Sebagia besar pasien yang menggunakan diuretik tidak mengalami efek samping, namun diuretik dapat menimbulkan perubahan kimia tubuh yang memicu masalah seperti penurunan atau peningkatan potassium (tergantung pada jenis diuretik yang digunakan), peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar asam urat, peningkatan kadar kolesterol dan masalah lain seperti meningkatnya pengeluaran urine sehingga mengalami dehidrasi, rasa lemas dan pusing karena penurunan tekanan darah terlalu besar. Efek samping lainnya adalah penurunan fungsi seksual pada pria.

2) Beta-blockers

Beta-blockers (penyekat beta) digunakan untuk mengontrol tekanan darah melalui proses perlambatan kerja jantung dan pelebaran (vasodilatasi) pembuluh darah sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras dan tekanan darah menurun. Jenis obat ini dapat mengatasi berbagai kondisi seperti hipertensi, galukoma, migraine, denyut jantung tidak teratur, gagal jantung, nyeri dada (angina), serangan jantung, kecemasan, dan hipertiroidisme.

Beta-blockers tidak diberikan bagi penderita asma karena dapat memicu serangan asma yang parah. Jenis obat ini juga bisa memengaruhi naiknya angkat

trigliserin dan sedikit penurunan high-density lipoprotein (HDL) yang sering disebut sebagai kolesterol baik. Perubahan ini sering kali hanya sementara tidak perlu menghentikan risiko terhadap serangan jantung atau masalah jantung lain. Efek samping dari beta-blockers antara lain kelelahan, tangan dingin, pusing, dan lemas. Efek samping yang jarang terjadi adalah napas pendek, sulit tidur, kehilangan gairah seks, dan denyut jantung lebih lambat.

Beberapa contoh obat jenis beta-blockers adalah *acebutolol* (nama dagang: Monitan, Sectral), *atenolol* (Tenormin), labetolol (Trandate), metoprolol (*Belatoc* dan *Lopresor*), nadolol (Corgard).

3) ACE Inhibitor

ACE (*Angiotensin-Converting Enzyme*) merupakan inhibitor kelompok obat yang penting dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Ia bekerja menghambat aksi dari sistem renin-angiotensin. Renin adalah enzim yang diproduksi oleh ginjal yang dapat mengubah protein (angiotensinogen) menjadi molekul yang lebih kecil seperti *angiotensin I*, yang kemudian diubah menjadi *angiotensin II* oleh ACE. ACE Inhibitor bekerja menurunkan efek enzim pengubah *angiotensin* sehingga menghambat pembentukan zat *angiotensin II*, zat yang menyebabkan peningkatan ACE Inhibitor ini tidak mengubah denyut jantung atau fungsi jantung, namun membuat kerja jantung lebih mudah dan efisien dengan memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Ia dapat meningkatkan aktivitas jantung pada penderita gagal jantung.

Obat ini dapat menyebabkan efek samping berupa batuk kering, meningkatnya potassium darah, ruam wajah, pusing, sakit kepala ringan, perubahan di indera pengecap, dan berkurangnya selera makan dalam beberapa

lama. Kadang ACE Inhibitor dapat menimbulkan bengkak pada jaringan (angioedema), biasanya terjadi pada perokok. Jika tenggorokan yang mengalami pembengkakan maka akan bisa mengancam jiwa. Wanita hamil atau yang merencanakan hamil sebaiknya tidak mengonsumsi obat ini, karena ACE Inhibitor dapat menyebabkan cacat kelahiran. ACE Inhibitor sebaiknya tidak digunakan pada penderita gangguan ginjal, karena dia dapat merusak fungsi ginjal setelah penyempitan arteri yang menuju kedua ginjal.

Beberapa contoh obat yang tergolong ACE Inhibitor antara lain *benazepril (lotensin)*, *Captopril (capoten)*, *cilazapril (inhibaze)*, dan *enalapril (Vasotec)*.

4) Angiotensin II Reseptor Blockers (ARBs)

Seperti halnya ACE Inhibitor, obat-obatan ARBs bekerja melindungi pembuluh darah dari efek *angiotensin II*, sebuah hormon yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dengan cara menyekat reseptor *angiotensin II*. Biasanya dokter menganjurkan obat-obatan ini untuk mencegah, mengobati atau meredakan gejala-gejala tekanan darah tinggi, gagal jantung, gagal ginjal pada penderita diabetes, dan penyakit ginjal kronis.

Efek samping yang biasa timbul pada pengguna ARBs di antaranya sakit kepala, pusing, hidung tersumbat, sakit punggung dan kaki, dan diare.

Efek samping yang jarang, namun serius adalah gagal ginjal, gagal liver, reaksi alergi, berkurangnya sel darah putih, dan bengkak jaringan. Seperti halnya ACE Inhibitor, ARBs juga dihindari pemakainnya pada wanita hamil atau yang merencanakan kehamilan, karena dapat mengakibatkan cacat kelahiran.

Ada berbagai macam obat ARBs namun yang terbaik bagi seseorang tergantung pada kesehatan dan kondisi masing-masing. Beberapa contoh obat-obatan ARBs adalah candesartan, irbesertan, losartan, olmesartan, telmisartan, eposartan, dan valsartan.

5) Calcium Channel Blockers (CCBs)

Obat-obatan CCBs (antagonis kalsium) membantu mencegah penyempitan pembuluh darah dengan menghalangi kalsium memasuki sel otot di jantung dan pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi rileks dan tekanan darah menurun. Berdasarkan kecepatan reaksinya dikenal dua jenis CCBs, yaitu yang bereaksi cepat dan bereaksi lambat. Pengobatan yang bereaksi cepat bekerja dengan cepat, tetapi efeknya hanya berlangsung beberapa jam. Sedangkan pengobatan yang bereaksi lambat membutuhkan waktu lebih lama untuk bekerja, namun efeknya juga lebih panjang. Pengobatan yang terbaik tergantung pada kesehatan dan kondisi penyakit pasien.

Biasanya dokter menganjurkan CCBs untuk kondisi-kondisi seperti tekanan darah tinggi, nyeri dada, migrain, komplikasi aneurisme otak, denyut jantung tak beraturan, *Raynaud's disease*, dan *pulmonary hypertension*. Efek samping CCBs adalah konstipasi, denyut jantung cepat, ruam wajah, mengantuk, mual, dan bengkak pada kaki.

Ada dua jenis CCBs yang dikenal. Pertama adalah golongan *dihydropyridines*, yang tidak memperlambat denyut jantung abnormal, obat ini biasanya berakhiran-*dipine*. contoh obat-obatan jenis ini adalah *amlodipine*, *nifedipine*, *felodipine*. Kedua adalah golongan *nondihydropyridines*. Contoh obat-obatan jenis ini yaitu *verapamil*.

6) Alpha Blockers

Alpha-blockers (penyekat alfa) bekerja dengan menghalangi hormon norepinefrin (nonadrenalin) dan menstimulasi otot di dinding arteri dan vena sehingga dinding pembuluh darah mengerut. Ini akan membuat otot-otot tertentu menjadi rileks dan membantu pembuluh darah yang kecil tetap terbuka. Ini akan menyebabkan meningkatnya aliran darah dan tekanan darah turun. Saat pertama kali minum obat ini, pasien mungkin akan mengalami penurunan tekanan darah dengan cepat dan merasa pusing, serta berkunang-kunang jika tiba-tiba bangkit dari duduk atau tiduran sehingga *alpha-blockers* sering disebut menimbulkan “efek dosis pertama”.

Beberapa contoh obat-obatan, *alpha-blockers* adalah doxazosin, prazosin, terazosin.

7) Clonidine

Clonidine (antagonis sentral) merupakan obat antihipertensi yang bekerja di pusat control sistem saraf di otak. *Clonidine* menurunkan tekanan darah dengan memperbesar arteri di seluruh tubuh.

Biasanya dokter memberikan jenis obat ini untuk mengatasi hipertensi, serangan kecemasan, dan untuk membantu menghentikan kebiasaan minum alkohol dan ketergantungan obat.

Obat ini jarang digunakan karena memiliki efek samping yang kuat seperti sakit kepala berat, pusing, impoten, konstipasi, mulut kering, penambahan berat badan, gangguan konsentrasi berfikir, dan masalah-masalah psikologis seperti depresi. Dan menghentikan obat ini secara tiba-tiba dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah mendadak yang berbahaya. Oleh karena itu, jika akan

menghentikan pengobatan hendaknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Contoh obat-obatan jenis ini adalah clonidine dan guanfacine.

8) Vasodilator

Vasodilator mengatasi hipertensi dengan melebarkan pembuluh darah. Ia bekerja langsung pada otot-otot di dinding arteri, membuat otot rileks, dan mencegah dinding menyempit. Aliran darah melalui arteripun menjadi lebih mudah, sehingga jantung tidak bekerja keras memompa darah, dan tekanan darah menurun.

Vasodilator dapat menyebabkan peniadaan efek penurunan tekanan darah yang dimilikinya karena ia menyebabkan ginjal menahan sodium dan air sehingga volumenya mengalami peningkatan. Efek samping vasodilator antara lain nyeri dada, retensi cairan, mual, pusing, sakit kepala, hidung tersumbat, kembung dan laju denyut jantung tidak tetap.

Beberapa contoh obat yang tergolong vasodilator adalah *hydralazine* dan *minoxidil*.

b. Penatalaksanaan Nonfarmakologis

Pada penderita hipertensi dimana tekanan darah tinggi >160 mmHg, selain pemberian obat-obatan anti hipertensi perlu terapi dietik dan merubah gaya hidup. Tujuan dari penatalaksanaan diet adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Disamping itu, diet juga ditujukan untuk menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak kolesterol dan asam urat dalam darah. Harus diperhatikan pula penyakit degeneratif lain yang menyertai darah tinggi seperti jantung, ginjal dan diabetes melitus (Oswari, 1992 dalam Safitri, 2012).

Menurut Oswari (1992) dalam safitri (2012), Penatalaksanaan hipertensi dengan nonfarmakologis terdiri dari berbagai macam cara modifikasi gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah yaitu:

1) Mengatur menu makanan

Mengatur menu makanan sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi untuk menghindari dan membatasi makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah serta meningkatkan tekanan darah, sehingga penderita tidak mengalami stroke atau infark jantung. Penderita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan yang lagi baik untuk menjaga kesehatan tubuh seperti yang dijelaskan pada QS. *Al-Baqarah/2:168*:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah/2:168).

Adapun jenis makanan-makanan yang harus dibatasi adalah:

- a) Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi (otak, ginjal, paru., minyak kelapa).
- b) Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium (biskuit, craker, keripik, dan makanan kering yang asin).
- c) Makanan dan minuman dalam kaleng (sarden, sosis, korned, sayuran serta buah-buahan dalam kaleng, soft drink).
- d) Makanan yang diawetkan (dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asing, selai kacang).

- e) Susu full cream, mentega, margarine, keju, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah (sapi atau kambing), kuning telur, kulit ayam).
- f) Bumbu penyedap seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium.
- g) Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, tape.

2) Suplementasi anti oksidan

Walaupun suplementasi anti oksidan masih memerlukan penelitian lebih lanjut, namun saat ini banyak sekali suplemen yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai tenaga medis harus berhati-hati memberikan anjuran minuman suplemen agar tidak terjadi overdosis.

- a) Vitamin dan penurunan homosistein: asam folat, vitamin B6, vitamin B12 dan riboflavin merupakan ko-faktor enzim yang essential untuk metabolisme homosistein. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar homosistein dalam darah akan meningkatkan risiko penyakit arteri koroner. Kadar asam folat yang rendah berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit koroner dan kadar vitamin yang rendah juga berkaitan dengan peningkatan risiko aterosklerosis, walaupun risiko aterosklerosis yang berhubungan dengan rendahnya kadar vitamin B6 tidak berhubungan dengan konsentrasi homosistein yang tinggi. Sedangkan vitamin B12 tidak berhubungan dengan penyakit vaskuler.
- b) Kacang kedelai dan isoflavon: kedelai banyak mengandung fitoestrogen yaitu isoflavon, yang memiliki aktivitas estrogen lemah. Penelitian meta analisis pada tahun 1995 menyimpulkan bahwa isoflavon dari protein kedelai lebih

bermakna menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL dan trigliserida, tanpa memengaruhi kadar kolesterol HDL. Sehingga dianjurkan mengonsumsi protein kedelai (20-50 gram/hari) dengan modifikasi diet pada penderita dengan kadar kolesterol (total dan LDL) yang tinggi. Tempe adalah hasil pengolahan kedelai yang melalui proses fermentasi, dengan kandungan gizi lebih baik dari kedelai. Sehingga tempe dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi sebagai sumber protein nabati.

- c) Tempe: tempe adalah salah satu makanan tradisional Indonesia, hasil fermentasi kapang *Rhizopus oligosporus* atau *Rhizopus oryzae* pada biji kedelai yang telah direbus. Ada berbagai macam tempe, yang dibicarakan disini adalah tempe yang terbuat dari kedelai, yang merupakan produk kompak, terbungkus rata oleh miselium kapang sehingga nampak berwarna putih, dan bila diiris kelihatan keping biji kedelai berwarna kuning pucat, diantara miselium. Fermentasi kapang menghasilkan perubahan pada tekstur kedelai, menjadi empuk dan nilai zat gizi tempe lebih baik dari kacang kedelai.

3) Terapi penunjang

Selain pengobatan dan pengaturan menu makanan pada penderita hipertensi, diperlukan juga terapi khusus lain seperti konseling masalah kejiwaan dan fisioterapi, terutama pada penderita pasca stroke atau infark penting. Pengertian juga diberikan kepada keluarga atau pengasuh untuk membantu menyiapkan makanan khusus serta mengingatkan kepada penderita, makanan yang harus dihindari atau dibatasi.

4) Garam natrium

Garam natrium terdapat secara alamiah dalam bahan makanan atau ditambahkan pada waktu memasak atau mengolah makanan. Makanan berasal dari hewan biasanya lebih banyak mengandung garam natrium dari pada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.

5) Terapi masase (pijat)

Menurut Dalimartha (2008), pada prinsipnya pijat yang dilakukan pada penderita hipertensi adalah untuk memperlancar aliran energi dalam tubuh sehingga gangguan hipertensi dan komplikasinya dapat diminimalisir, ketika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak lagi terhalang oleh ketegangan otot dan hambatan lain maka risiko hipertensi dapat ditekan.

Penatalaksanaan yang telah dikemukakan diatas bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dengan mengurangi jumlah darah, mengurangi kegiatan jantung memompa, dan mengurangi mengerutnya dinding-dinding pembuluh nadi halus sehingga tekanan pada dinding-dinding pembuluh darah berkurang dan aliran darah menjadi lancar sehingga tekanan darah akan menurun (Dekker, 1996).

7. Komplikasi Hipertensi

Menurut Shanty (2011), komplikasi hipertensi di antaranya adalah:

a. Stroke

Salah satu komplikasi darah tinggi adalah stroke. Penyakit stroke dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Stroke adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh berkurangnya atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Karena berkurang atau berhentinya suplai darah ke otak. Inilah, jaringan

otak yang mengalami hal ini akan mati dan tidak dapat berfungsi lagi. Stroke terkadang disebut dengan *cerebrovaskular accident*.

Stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul mendadak dalam waktu singkat akibat gangguan aliran darah ke otak karena penyumbatan (Ischemic stroke) atau perdarahan (hemorrhagic stroke). Dengan kata lain, menurut cara terjadinya, stroke dibedakan menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke hemoragik inilah yang biasanya merupakan komplikasi hipertensi.

b. Penyakit jantung

Peningkatan tekanan darah secara sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri sehingga beban jantung bertambah. Sebagai akibatnya, terjadi hipertrofi ventrikel kiri untuk meningkatkan kontraksi. Hipertrofi ini ditandai dengan ketebalan dinding yang bertambah, fungsi ruang yang memburuk, dan dilatasi ruang jantung. Akan tetapi, kemampuan ventrikel untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui dan terjadi dilatasi dan "payah jantung". Jantung semakin terancam seiring parahnya aterosklerosis koroner. Angina pectoris juga dapat terjadi karena gabungan penyakit arterial koroner yang cepat dan kebutuhan oksigen miokard yang bertambah akibat penambahan massa miokard.

c. Penyakit arteri koronaria

Hipertensi umumnya diakui sebagai faktor risiko utama penyakit arteri koronaria, bersama dengan diabetes melitus. Plak terbentuk pada percabangan arteri yang kearah arteri koronaria kiri, arteri koronaria kanan, dan agak jarang

pada arteri sirromfleks. Aliran darah ke distal dapat mengalami obstruksi secara permanen maupun sementara yang disebabkan oleh akumulasi plak atau penggumpalan. Sirkulasi kolateral berkembang disekitar obstruksi arteromasus yang menghambat pertukaran gas dan nutrisi ke miokardium. Kegagalan sirkulasi kolateral untuk menyediakan suplai oksigen yang adekuat ke sel yang berakibat terjadinya penyakit arteri koronaria.

d. Aneurisma

Pembuluh darah terdiri dari beberapa lapisan, tetapi ada yang terpisah sehingga ada ruangan yang memungkinkan darah masuk. Pelebaran pembuluh darah bisa timbul karena dinding pembuluh darah aorta terpisah atau disebut aorta disekans. Ini dapat menimbulkan penyakit aneurisma. Gejalanya adalah sakit kepala yang hebat serta sakit di perut sampai ke pinggang belakang dan di ginjal. Mekanismenya terjadi pelebaran pembuluh darah aorta (pembuluh nadi besar yang membawa darah ke seluruh tubuh). Aneurisma pada perut dan dada penyebab utamanya pengerasan dinding pembuluh darah karena proses penuaan (aterosklerosis) dan tekanan darah tinggi memicu timbulnya aneurisma.

e. Gagal ginjal

Gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis kerusakan ginjal yang progresif dan tidak dapat diperbaiki dari berbagai penyebab. Salah satunya pada bagian yang menuju ke kardiovaskuler. Mekanisme terjadinya hipertensi pada gagal ginjal kronis karena penimbunan garam dan air atau sistem renin angiotensin aldosteron (RAA).

f. Ensefalopati hipertensi

Ensefalopati hipertensi merupakan suatu keadaan peningkatan parah tekanan arteri disertai dengan mual, muntah, dan nyeri kepala yang berlanjut ke koma dan disertai tanda klinik defisit neurologi. Jika kasus ini tidak diterapi secara dini, sindrom ini akan berlanjut menjadi stroke, ensefalopati menahun, atau hipertensi maligna. Kemudian sifat reversibilitas jauh lebih lambat dan jauh lebih meragukan.

g. Hipertensi dipercepat dan maligna

Pasien hipertensi dipercepat mempunyai tekanan arteri diastolik yang meningkat disertai dengan retinopati eksudatif. Pada hipertensi maligna, progresif lebih lanjut, fundus optikus menunjukkan papiledema. Hipertensi maligna disertai penyakit parenkim ginjal yang parah seperti glomerulonefritis kronik.

8. Faktor Risiko Hipertensi

Hipertensi sering disebut sebagai salah satu penyakit degeneratif. Umumnya penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya (Martha, 2011).

Penyakit ini dikenal juga dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi. Namun lebih banyak ditemukan pada usia lanjut yang merupakan salah satu faktor resikonya (Martha, 2011).

Menurut Sheps (2005), ada empat faktor resiko utama yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dikendalikan pada hipertensi yaitu:

a. Ras

Data dari *Third National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES III, 1988-1991) menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi berkulit hitam 40% lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkulit putih. Diantara orang berusia 18 tahun ke atas, perbandingan jumlah penderita hipertensinya adalah 32,4% berkulit hitam dan 23,3% berkulit putih.

Di Amerika Serikat, angka tertinggi untuk penyakit hipertensi adalah pada orang berkulit hitam yang tinggal di negara-negara bagian sebelah tenggara. Pada golongan ini, hipertensi biasanya timbul pada usia lebih muda dibandingkan dengan orang berkulit putih, bahkan perkembangannya cenderung lebih cepat dan menonjol.

b. Usia

Seiring bertambahnya usia maka resiko untuk menderita penyakit hipertensi juga semakin meningkat. Meskipun penyakit hipertensi bisa terjadi pada segala usia, namun paling sering dijumpai pada orang berusia 35 tahun ke atas. Di antara orang amerika baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih yang berusia 65 tahun ke atas, setengahnya menderita penyakit hipertensi.

Peningkatan tekanan darah sesuai dengan pertambahan usia dan hal ini merupakan fisiologis tubuh. Peningkatan tekanan darah ini disebabkan oleh perubahan fisiologis pada jantung, pembuluh darah dan hormon.

c. Riwayat keluarga

Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika salah satu dari orang tua menderita penyakit hipertensi maka sepanjang hidup anaknya akan mempunyai 25% kemungkinan menderita hipertensi. Jika kedua orang tua

menderita penyakit hipertensi maka kemungkinan anaknya menderita penyakit hipertensi menjadi 60%. Penelitian terhadap penderita hipertensi pada orang yang kembar dan anggota keluarga yang sama menunjukkan bahwa kasus-kasus tertentu ada komponen keturunan yang berperan.

d. Jenis kelamin

Hipertensi banyak diderita pada jenis kelamin laki-laki baik pada dewasa awal maupun dewasa tengah. Namun, setelah usia 55 tahun ketika wanita mengalami menopause, hipertensi menjadi lebih lazim dijumpai pada wanita. Diantara penduduk Amerika yang berusia 18 tahun keatas 34% pria dan 31% wanita berkulit hitam menderita penyakit hipertensi. Pada pria berkulit putih 25% dan pada wanita berkulit putih 21% menderita penyakit hipertensi. Sedangkan pada keturunan Asia dan suku-suku di Kepulauan Pasifik ditemukan hanya 10% pria dan 8% wanita menderita penyakit hipertensi.

C. *Masase*

1. **Defenisi**

Masase atau pijat adalah penggunaan tekanan dan gerakan yang bervariasi untuk memanipulasi otot dan jaringan lunak lainnya. Dengan melemaskan jaringan lunak tubuh, lebih banyak darah dan oksigen dapat mencapai daerah yang terkena dampak dan mengurangi nyeri (Kamus Kesehatan).

2. **Manfaat Masase**

Masase merupakan teknik integrasi sensori yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom. Apabila seseorang mempersepsikan sentuhan sebagai

stimulus rileks maka akan muncul respon relaksasi (Perry & Potter, 2005 dalam Safitri, 2012).

Masase secara luas diakui sebagai tindakan yang memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Relaksasi

Menimbulkan relaksasi yang dalam sehingga meringankan kelelahan jasmani dan rohani dikarenakan sistem saraf simpatis mengalami penurunan aktivitas yang akhirnya mengakibatkan turunnya tekanan darah (Kaplan,2006).

b. Mengurangi nyeri

Memperbaiki sirkulasi darah pada otot sehingga mengurangi nyeri dan inflamasi dikarenakan masase meningkatkan sirkulasi baik darah maupun getah bening (Price, 1997).

c. Memperbaiki organ tubuh

Memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ internal berdasarkan filosofi aliran energi meridian masase mampu memperbaiki aliran peredaran energi (meridian) didalam tubuh menjadi positif sehingga memperbaiki energi tubuh yang sudah lemah (Thie, 2007; Dalimartha, 2008).

d. Memperbaiki postur tubuh

Mendorong kepada postur tubuh yang benar dan membantu memperbaiki mobilitas. Otot yang tegang menyebabkan nyeri dan bergesernya tulang belakang keluar dari posisi normal sehingga postur tubuh mengalami perubahan, masase berfungsi untuk menstimulasi saraf otonom yang dapat mengendurkan ketegangan otot (Perry & Potter, 2005).

e. Latihan pasif

Sebagai bentuk dari suatu latihan pasif yang sebagian akan mengimbangi kurangnya latihan yang aktif karena masase meningkatkan sirkulasi darah yang mampu membantu tubuh meningkatkan energi pada titik vital yang telah melemah (Price, 1997).

3. Faktor-faktor Pertimbangan dalam Masase

Menurut Price (1997), berbagai jenis gerakan bukan hanya bagian dari masase, yang sama pentingnya adalah cara bagaimana gerakan tersebut dilakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Mujadillah*/58:11:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. *Al-Mujadillah*:11).

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tekanan, kecepatan, irama, durasi, frekuensi yaitu:

a. Tekanan

Ketika menggunakan keseluruhan tangan untuk mengurut suatu daerah yang luas tekanan harus selalu dipusatkan di bagian telapak tangan. Jari-jari tangan harus dilemaskan sepenuhnya karena tekanan jari tangan pada saat ini tidak menghasilkan relaksasi yang diperlukan. Tekanan telapak tangan hanya boleh diberikan ketika melakukan gerakan mengurut ke arah.

b. Kecepatan

Sampai taraf tertentu kecepatan gerakan masase bergantung pada efek yang ingin dicapai. Umumnya, masase dilakukan untuk menghasilkan relaksasi pada orang yang dipijat dan frekuensi gerakan masase kurang lebih 15 kali dalam semenit.

c. Irama

Gerakan yang tersentak-sentak tidak akan menghasilkan relaksasi sehingga kita harus berhati-hati untuk mempertahankan irama yang tidak terputus-putus.

d. Durasi

Durasi atau lamanya suatu terapi masase bergantung pada luasnya tubuh yang akan dipijat. Rangkaian masase yang dianjurkan berlangsung antara 5 sampai 15 menit dengan mempertimbangkan luas daerah yang dipijat.

e. Frekuensi

Umumnya diyakini bahwa masase paling efektif jika dilakukan tiap hari, beberapa peneliti mengemukakan bahwa terapi masase akan lebih bermanfaat

bila dilakukan lebih sering dengan durasi yang lebih singkat. Menurut Breakey (1982) yang dikutip oleh Price (1997), masase selama 10 menit harus sudah menghasilkan relaksasi.

4. Kontraindikasi Masase terhadap Hipertensi

Kontraindikasi masase sangat bergantung pada tipe keadaan yang diderita pasien (Price, 1997). Ketika seseorang mengalami hipertensi, tekanan yang berlebihan merupakan usaha yang bertentangan terhadap dinding pembuluh darah. Suatu aktivitas yang mungkin meningkatkan tingginya tekanan *intra-vascular* yang beresiko membuat ruptur pembuluh darah. Salah satu efek fisiologis dari pijat, terutama pada daerah yang dipijat, hal ini merupakan aktivitas yang mampu meningkatkan sirkulasi darah. Peningkatan sirkulasi darah dapat meningkatkan tekanan *intra-vascular*. Ini adalah alasan di balik yang diwaspadai terapi masase dengan klien hipertensi (Cutler, 2007).

Meskipun banyak terapi masase yang mematuhi kontraindikasi, terdapat banyak bukti yang bertentangan. Banyak bukti menunjukkan bahwa pijat dapat mengurangi tekanan darah, salah satunya adalah para peneliti dari *Touch Research Institute, University of Miami School of Medicine* dan *Nova Southeastern University* awal tahun 1999 di Florida dilakukan studi tekanan darah tinggi dan gejala terkait telah dikurangi dengan pijat. Dalam studi ini, para peserta dengan hipertensi yang dikontrol secara acak ditugaskan ke salah satu grup terapi masase (pijat) atau grup relaksasi progresif. Hasil menunjukkan bahwa kedua kelompok telah mengalami penurunan tingkat kecemasan dan tingkat depresi, namun hanya grup terapi pijat yang menunjukkan penurunan tekanan darah diastol dan sistol serta tingkat *cortisol-stress hormone*.

D. Masase pada Kaki

1. Defenisi

Masase kaki adalah tindakan pijat yang dilakukan didaerah kaki (Aslani, 2003). Melakukan masase pada otot-otot besar pada kaki dapat memperlancar sirkulasi darah dan saluran getah bening serta membantu mencegah varises. Pada saat melakukan masase pada otot-otot kaki maka tingkatkan tekanan ke otot ini secara bertahap untuk mengendurkan ketegangan sehingga membantu memperlancar aliran darah ke jantung. Masase pada kaki diakhiri dengan masase pada telapak kaki yang akan merangsang dan menyegarkan kembali bagian kaki sehingga memulihkan sistem keseimbangan dan membantu relaksasi (Aslani, 2003).

2. Manfaat

- a. Menimbulkan relaksasi yang dalam sehingga meringankan kelelahan jasmani dan rohani dikarenakan sistem saraf simpatis mengalami penurunan aktivitas yang akhirnya mengakibatkan turunnya tekanan darah (Kaplan, 2006).
- b. Memperbaiki sirkulasi darah pada otot sehingga mengurangi nyeri dan inflamasi dikarenakan masase meningkatkan sirkulasi baik darah maupun getah bening (Price, 1997).
- c. Memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ internal berdasarkan filosofi aliran energi meridian masase mampu memperbaiki aliran peredaran energi (meridian) didalam tubuh menjadi positif sehingga memperbaiki energi tubuh yang sudah lemah (Dalimartha, 2008).
- d. Mendorong kepada postur tubuh yang benar dan membantu memperbaiki mobilitas. otot yang tegang menyebabkan nyeri dan bergesernya tulang

belakang keluar dari posisi normal sehingga postur tubuh mengalami perubahan, masase berfungsi untuk menstimulasi saraf otonom yang dapat mengendurkan ketegangan otot (Perry & Potter, 2005).

- e. Sebagai bentuk dari suatu latihan pasif yang sebagian akan mengimbangi kurangnya latihan yang aktif karena masase meningkatkan sirkulasi darah yang mampu membantu tubuh meningkatkan energi pada titik vital yang telah melemah (Dalimartha, 2008).

3. prosedur

Pemijatan ini dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, adapun langkah yang harus dilakukan menurut Aslani (2003) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat yang nyaman

Lingkungan tempat masase harus membuat suasana rileks dan nyaman, pemijat harus memperhatikan suhu ruangan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, penerangan yang cukup, permukaan tempat masase yang rata dan nyaman jika diperlukan gunakan karpet dengan busa karet agar menambah suasana nyaman pada klien.

- b. Menyeimbangkan diri

Ketenangan dan kenyamanan diri adalah hal yang penting jika ingin memberikan pijatan yang baik. Kenakan pakaian yang tidak membatasi gerak saat memijat, rilekskan diri dengan meletakkan kedua tangan dibawah pusar dan rasakan hangat tangan masuk memasuki daerah pusar kemudian bukalah mata perlahan-lahan.

c. Effleurage

Effleurage adalah istilah untuk gerakan mengusap yang ringan dan menenangkan saat memulai dan mengakhiri masase, gerakan bertujuan untuk meratakan minyak esensial dan menghangatkan otot agar lebih rileks.

d. Masase pada klien

Setelah persiapan diatas dilakukan maka klien telah siap untuk dilakukan masase (pijat). Prosedur masase ini dilakukan dengan posisi berbaring dengan menutup bagian klien dengan handuk besar mulai dari pinggang sampai kaki. Teknik pelaksanaan masase ini terdapat dalam lampiran.

E. Teori Meridian (Aliran Energi)

Di indonesia, pijat telah menjadi warisan leluhur dan terdapat kesamaan antara titik pijat di Indonesia dengan titik akupuntur yang ada di Cina. Pijat erat kaitannya dengan akupuntur, hal ini dikarenakan dalam memijat titik yang digunakan adalah titik akupunktur. Pijat bekerja berdasarkan 3 hal yaitu energi vital (*qi*), meridian, titik pijat atau akupunktur (Dalimartha, 2008).

Meridian adalah saluran energi yang terletak dalam jaringan dan organ tubuh (Thie, 2007; Dalimartha, 2008). Meridian digolongkan sebagai *yin* dan *yan* berdasarkan alirannya pada permukaan tubuh, meridian-meridian ini saling berhubungan di dalam tubuh namun yang dilakukan disini hanyalah yang berada dibagian permukaan tubuh dan dapat dicapai melalui teknik sentuhan (Thie, 2007). Pada umumnya energi *yin* mengalir dari kaki ke arah kepala dan energi *yan* mengalir dari kepala ke kaki (Thie, 2007).

Qi (energi vital) merupakan materi dasar yang dibentuk oleh nutrisi dan pengaruh lingkungan (Dalimartha, 2008). *Qi* disebut juga dengan energi daya

gerak atau energi universal yang dianggap sebagai napas kehidupan yang dihembuskan Tuhan kepada manusia (Thie, 2007).

Titik pijat atau akupunktur adalah tempat berkumpulnya energi vital, kedudukan titik pijat berada pada sejumlah jalur meridian yang utama, ada 14 jalur meridian yang utama (Dalimartha, 2008; Thie, 2007). Pemijatan pada titik tertentu di permukaan tubuh yang terletak di jalur meridian dirangsang, sehingga aliran *qi* dan darah bisa diatur, dengan demikian penyakit yang mengganggu dapat disingkirkan (Dalimartha, 2008).

Aliran meridian bersifat berkesinambungan atau alirannya tidak terputus-putus agar energi mengalir dari satu meridian ke meridian lainnya dalam urutan yang teratur (Thie, 2007). Oleh karena itu, pemijatan yang dilakukan tangan sama sekali tidak boleh diangkat karena akan memutuskan aliran pijat sebagai satu kesatuan yang utuh, tangan harus selalu menyentuh tubuh dalam semua gerakan maju mundur yang dilakukan secara berurutan (Price, 1997).

Prinsipnya, pijat yang dilakukan pada penderita hipertensi adalah untuk memperlancar aliran energi didalam tubuh sehingga gangguan penyakit hipertensi dan komplikasinya dapat diminimalisir. Ketika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak lagi terhalang oleh ketegangan otot dan hambatan lain maka resiko hipertensi dapat ditekan (Dalimartha, 2008).

F. Kerangka Pikir

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk meminimalisir komplikasi yang bisa terjadi pada hipertensi. Berdasarkan


tunjauan pustaka, baik dari faktor sistemik maupun lokal. Faktor sistemik bisa berasal dari faktor pola makan, diet khusus, obata-obatan yang dikonsumsi, berolahraga dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lokal seperti aliran darah, suplai darah dan lain sebagainya.

Faktor-faktor tersebut harus dikontrol guna untuk meminimalisir komplikasi yang mungkin terjadi. Terkait dengan faktor lokal yaitu aliran darah hal ini terkait dengan pemberian tindakan masase kaki untuk menurunkan tekanan darah.



Memperlancar kembali aliran darah merupakan kunci yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Pemilihan pemberian masase kaki sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dipercaya mampu memberikan manfaat untuk menurunkan tekanan darah karena pemberian tindakan ini mampu untuk memperlancar kembali aliran darah dan mampu merilekskan seseorang.

G. Kerangka Konsep Penelitian


Berdasarkan kajian teori, maka berikut akan diuraikan kerangka konsep yang bisa berfungsi sebagai penuntun dan alur pikir serta bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan hipotesis. Kerangka konseptual menjadi dasar penelitian ini adalah pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.



Keterangan:

-  : Variabel bebas
-  : Penghubung variabel yang diteliti
-  : Variabel terikat
-  : Variabel kontrol
-  : Penghubung variabel kontrol

H. Alur Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain *quasy experimental* yaitu mengungkapkan kemungkinan adanya sebab akibat antara variabel tanpa adanya manipulasi suatu variabel (Sugiono, 2010).

Adapun jenis rancangan yang akan digunakan yaitu metode *the static group comparasion* yaitu desain yang dirancang untuk meneliti pengaruh dari sebuah uji coba terhadap sekelompok objek penelitian dengan membandingkannya pada kelompok kontrol (Suyanto, 2011).

Desain rencana penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

O₁: pre test pada kelompok intervensi sebelum diberikan masase kaki.

O₂: post test pada kelompok intervensi sesudah diberikan masase kaki.

O₃: pre test pada kelompok kontrol tanpa diberikan masase kaki.

O₄: post test pada kelompok kontrol tanpa diberikan masase kaki.

X: merupakan perlakuan atau intervensi yang diberikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian yaitu dari 23-29 Januari 2014.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *quasy eksperimental* bersifat kuantitatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah 259 orang penderita hipertensi yang subjeknya memenuhi karakteristik yaitu pasien di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan jumlah sampel adalah 20 responden. Dimana 10 sampel kelompok perlakuan yang diberikan intervensi masase kaki dan 10 sampel dijadikan kelompok kontrol.

3. Teknik Pengambilan Sampel

a. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan

sampel dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi (Hidayat, 2008).

Israel (2009) memberikan beberapa saran praktis dalam menentukan ukuran sampel survey. Saran yang dikemukakan termasuk sensus untuk populasi kecil, meniru ukuran sampel dari penelitian serupa sebelumnya, menggunakan table yang sudah dipublikasi, dan menggunakan rumus menentukan ukuran sampel (Tiro. A, 2011).

Berdasarkan teori di atas, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 responden, dengan perincian 10 responden sebagai kelompok perlakuan dengan intervensi masase kaki dan 10 responden sebagai kelompok kontrol dengan tidak diberikan intervensi masase kaki.

Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan responden yang bersedia diberikan intervensi keperawatan masase kaki sebanyak 10 orang yang sesuai dengan criteria inklusi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu, Gowa. Setelah responden intervensi masase kaki didapatkan, lalu diobservasi pre dan post selama 7 kali pemberian intervensi yaitu pada hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, setelah kelompok intervensi masase kaki selesai diobservasi, peneliti mengumpulkan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi masase kaki sebanyak 10 responden, lalu diobservasi dalam jangka waktu yang sama.

b. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1) Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- a) Bersedia menjadi responden dan menandatangani surat persetujuan (*informed consent*).
 - b) Pasien yang terdiagnosa mengalami hipertensi primer.
 - c) Tekanan darah; SBP: 120-159 mmHg, DBP: 80-99 mmHg.
 - d) Pasien yang tidak mengonsumsi obat-obatan antihipertensi dalam seminggu terakhir.
 - e) Pasien berusia 40-65 tahun.
 - f) Pasien yang berjenis kelamin perempuan.
- 2) Kriteria Eksklusi
- a) Pasien yang drop out.
 - b) Pasien yang mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah secara rutin selama pemberian intervensi.
 - c) Pasien yang rutin berolahraga.
 - d) Pasien hipertensi yang memiliki komplikasi penyakit.
 - e) Pasien yang mengalami obesitas dengan $IMT \geq 30$.

D. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

b. Data Sekunder

Jumlah data pasien hipertensi di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa lembar observasi, tensimeter air raksa, dan minyak sebagai pelicin. Berisi identitas responden, hasil pengukuran tekanan darah serta pemberian masase kaki untuk mendapatkan informasi dari responden.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Nursalam (2008), instrument yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Data karakteristik responden diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden, yang isinya menekankan pada informasi karakteristik yaitu; nama, usia, jenis kelamin dan lain-lain.

2. Pengukuran Observasi

Pengukuran observasi dilakukan melalui lembar observasi. Penurunan tekanan darah dapat diobservasi adalah tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi serta tekanan darah sebelum dan sesudah tanpa intervensi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi lembar observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian dan konsistensi dari setiap jawaban.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban (pengkodean).

c. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisa data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan menggunakan program SPSS 20. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data Univariat dan Bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Rumus statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *paired T-test* dan *uji wilcoxon*

untuk mengetahui perbedaan masing-masing variabel kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dan uji Wilcoxon Test juga menjawab hipotesis apakah ada pengaruh masase kaki terhadap kriteria penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.

G. Pertimbangan Etik

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etis dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Peneliti menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang akan diberikan tidak menyakiti responden. Jika responden merasa ada ketidaknyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka manfaat penelitian yang akan diperoleh oleh pasien dan juga menjelaskan resiko-resiko apa saja yang akan mungkin didapatkan oleh responden terkait kesediannya berpartisipasi dalam penelitian ini.

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Peneliti memberikan hak yang terbuka kepada responden bahwa responden dapat memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian atau tidak.

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden. Meskipun intervensi masase kaki diberikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Peneliti berlaku adil terhadap pemberian intervensi tersebut.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya dengan kode responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut. Selain itu, semua data terkait informasi responden disimpan oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan.



BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Hasil Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 20 orang dengan 10 orang kelompok perlakuan dan 10 orang kelompok kontrol. Pemberian masase kaki dilakukan sebanyak 7 kali selama 1 minggu dimulai pada tanggal 23-29 Januari 2015.

1. Analisa Univariat

a. Distribusi Responden Berdasarkan Data Demografi

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi

DATA BIOGRAFI		n	Persentasi (%)
Umur	40-48 Tahun	8	40
	49-57 Tahun	6	30
	58-65 Tahun	6	30
Agama	Islam	20	100
	Kristen	-	-
	Hindu	-	-
	Budha	-	-
Suku	Makassar	20	100
	Bugis	-	-
Pekerjaan	Ada	-	-
	Tidak Ada	20	100

Sumber: data primer, 2015


Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa distribusi responden berdasarkan umur terbanyak adalah yang berusia 40-48 tahun sebanyak 8 responden (40%).

Pada distribusi responden berdasarkan agama terbanyak adalah yang beragama islam sebanyak 20 responden (100%). pada distribusi responden berdasarkan suku terbanyak adalah yang bersuku makassar sebanyak 20 responden (100%). pada distribusi responden berdasarkan pekerjaan terbanyak adalah yang tidak bekerja sebanyak 20 responden (100%).

b. Grafik Hasil Penelitian

1) Kelompok Perlakuan

Grafik 4.1
Perubahan Rata-Rata Tekanan Darah Pre-Post Test



Berdasarkan grafik 4.1, menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi masase kaki rata-rata tekanan darah sistol pada pengukuran hari pertama ke hari kedua mengalami penurunan yaitu dari 142.00 menjadi 133.80 tetapi hari kedua ke hari ketiga tidak mengalami penurunan, pada pengukuran hari ke empat sampai pengukuran hari ke tujuh menurun hingga rata-rata mencapai 129.40, berdasarkan grafik diatas dapat

disimpulkan bahwa rata-rata penurunan tekanan darah sebelum diberikan perlakuan terjadi pada pengukuran hari ke tujuh.

Setelah diberikan intervensi masase kaki rata-rata tekanan darah sistol pada pengukuran hari pertama dan hari kedua belum terjadi penurunan yaitu 120.00, pengukuran hari ketiga rata-rata tekanan darah sistol meningkat menjadi 121.60, pengukuran hari ke empat meningkat lagi menjadi 123.60 tetapi pengukuran hari ke lima menurun menjadi 121.80, pengukuran hari ke enam menurun lagi menjadi 110.60 tetapi pengukuran hari ke tujuh kembali meningkat menjadi 116.00. dapat disimpulkan bahwa rata-rata penurunan tekanan darah terjadi pada pengukuran hari ke enam.


Pada tekanan darah diastol sebelum diberikan intervensi masase kaki rata-rata tekanan darah pada pengukuran hari pertama ke hari kedua mengalami penurunan yaitu dari 93.00 menjadi 89.80 tetapi hari kedua ke hari ketiga terjadi peningkatan yakni dari 89.80 menjadi 91.60, pada pengukuran hari ke empat kembali meningkat menjadi 91.80, pengukuran hari kelima kembali menurun menjadi 87.10, pada pengukuran hari keenam rata-rata tekanan darah kembali meningkat menjadi 88.00 tetapi pengukuran pada hari ketujuh kembali menurun menjadi 87.00.

Setelah diberikan intervensi masase kaki rata-rata tekanan darah diastol pada pengukuran hari pertama ke hari kedua meningkat dari 86.00 menjadi 88.40, pada pengukuran hari ketiga rata-rata tekanan dara kembali menurun menjadi 86.20 tetapi pengukuran pada hari keempat kembali meningkat menjadi 88.00, pengukuran pada hari kelima kembali menurun

menjadi 85.20, pengukuran hari keenam juga menurun yaitu 83.60 dan pengukuran pada hari ketujuh juga menurun yaitu 79.00.

2) Kelompok Kontrol

Grafik 4.2
Perubahan Rata-Rata Tekanan Darah Pre-Post Test



Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sistol (pre test) pada saat pengukuran pertama dan hari kedua belum terjadi penurunan yaitu 134.00, pada pengukuran hari ketiga meningkat menjadi 138.00 tetapi pada pengukuran hari keempat kembali menurun menjadi 135.80, hingga hari ketujuh terjadi juga penurunan rata-rata menjadi 124.20 sedangkan pada tekanan darah diastolnya terjadi penurunan hanya dihari kelima yakni 87.70 tetapi hari keenam terjadi peningkatan lagi sampai hari ketujuh.

Setelah dilakukan pengukuran kedua (post test) rata-rata tekanan darah sistol pada saat pengukuran pertama yaitu 134.00 pada pengukuran

hari kedua menurun menjadi 133.10 tetapi pada pengukuran hari ketiga meningkat menjadi 137.50 pada pengukuran hari keempat dari hari kelima kembali menurun menjadi 131.00 tetapi pada hari keenam dan hari ketujuh pengukuran kembali meningkat menjadi 134.70. Pada rata-rata tekanan darah diastolnya pengukuran hari pertama ke hari ketiga menurun dari 89.00 menjadi 88.60 tetapi kembali meningkat pada pengukuran hari keempat menjadi 89.60 pada pengukuran hari kelima kembali menurun menjadi 88.80 tetapi pengukuran hari keenam sampai hari ketujuh kembali meningkat menjadi 89.90.

2. Analisa Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (masase kaki) dengan variabel dependen (penurunan tekanan darah) ditunjukkan dengan nilai $p < 0,05$. Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal pada data penurunan tekanan darah sebelum dan sesudah diberi intervensi masase kaki, maka digunakan uji *Shapiro-Wilk test*. Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa tidak semua data terdistribusi secara normal dimana hanya kelompok kontrol (tekanan darah sistolik) yang terdistribusi secara normal.

a. Hasil Uji Normalitas Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi

Kelompok	Shapiro Wilk
Perlakuan Pre Test Sistol	.055
Perlakuan Pre Test Diastol	.000
Perlakuan Post Test Sistol	.009
Perlakuan Post Test Diastol	.004
Kontrol Pre Test Sistol	.177
Kontrol Pre Test Diastol	.036
Kontrol Post Test Sistol	.209
Kontrol Post Test Diastol	.001

b. Hasil Uji beda *Paired T-Test* dan *Wilcoxon Test*

Tabel 4.3
Hasil Uji Paired T-Test pada Kelompok Kontrol (pre-post test sistol)

	Rerata (s.b)	Selisih (s.b)	IK95%	Nilai p
Tekanan darah sebelum masase kaki	134,00 (10,75)	0.70 (8,39)	5,30-6,70	Sistol:0.798 Diastol:-
Tekanan darah setelah masase kaki	134,70 (11,03)			

Uji t berpasangan; selisih antara sesudah dan sebelum

Setelah dilakukan Uji *T-Paired* Test didapatkan p-value pada kelompok kontrol (pre-post test sistol) sebesar 0.798 atau $p > 0.05$ berarti tidak ada pengaruh kelompok kontrol terhadap penurunan tekanan darah.

Tabel 4.4

Hasil Uji *Wilcoxon Test* pada kelompok perlakuan (pre-post test sistol dan pre-post test diastol) dan pada kelompok kontrol (pre-post diastol)

	Median (Minimum-Maksimum)	Nilai p
Tekanan darahh sebelum masase kaki	Sistol: 133 (130-160) Diastol: 92 (90-100)	Sistol: 0.004 Diastol: 0.005
Tekanan darah setelah masase kaki	Sistol: 110 (110-130) Diastol: 79 (74-82)	

Uji Wilcoxon, 10 responden tekanan darah menurun dan 10 responden meningkat

Setelah dilakukan uji wilcoxon signed ranks test didapatkan *p-value* pada kelompok perlakuan (pre-post sistol) sebesar 0.004 atau $p < 0.05$, kelompok perlakuan (pre-post diastol) sebesar 0.005 atau $p < 0.05$ berarti ada pengaruh variabel (kelompok perlakuan) terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sedangkan pada kelompok kontrol (pre-post diastol) sebesar 0.726 atau $p > 0.05$ berarti tidak ada pengaruh variabel terhadap penurunan tekanan darah. Dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji wilcoxon test dapat diketahui bahwa masase kaki berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah dilihat dari *p-value* pada tekanan darah sistol 0.004 dan tekanan darah diastol 0.005 yang artinya $p < 0.05$.

B. Pembahasan

Tekanan darah diatur oleh serangkaian saraf otonom dan hormon yang memonitor volume darah dalam sirkulasi, diameter pembuluh darah, dan kontraksi jantung. Setiap faktor ini secara intrinsik berkaitan erat dengan pengaturan tekanan darah di dalam pembuluh darah.

Nilai pembuluh darah bergantung pada kekuatan kontraksi jantung, diameter pembuluh darah, dan volume darah di dalam sirkulasi. Mekanisme

kerjanya mirip dengan tekanan air keluar dari selang. Anda dapat meningkatkan kekuatan air dengan memutar air kram lebih besar (sama dengan membuat jantung berkontraksi lebih kuat dan lebih cepat) atau dengan menekan ujung selang dan meningkatkan tekanan selang (sama dengan pembuluh darah yang menyempit dan berkontraksi).

Masase atau pijat adalah penggunaan tekanan dan gerakan yang bervariasi untuk memanipulasi otot dan jaringan lunak lainnya. Dengan melemaskan jaringan lunak tubuh, lebih banyak darah dan oksigen dapat mencapai daerah yang terkena dampak dan mengurangi nyeri. Masase merupakan teknik integrasi sensori yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom. Apabila seseorang mempersepsikan sentuhan sebagai stimulus rileks maka akan muncul respon relaksasi.

Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 20 orang. Penelitian ini dilakukan selama 7 kali selama seminggu yang dilakukan setiap hari. Adapun distribusi frekuensi responden berdasarkan umur adalah 40-48 tahun berjumlah 8 responden (40%), 49-57 tahun berjumlah 6 responden (30%) dan 58-65 tahun berjumlah 6 responden (30%). Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masing-masing sampel bahwa perbedaan umur mempengaruhi tekanan darah para sampel. Hal ini disebabkan karena penyempitan pembuluh darah yang terjadi akibat bertambahnya umur.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan agama adalah yang beragama islam sebanyak 20 orang (100%) yang beragama kristen, hindu dan budha 0 responden (0%). Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masing-masing sampel bahwa perbedaan agama tidak mempengaruhi tekanan darah para

sampel. Hal ini mungkin disebabkan karena rentang umur para sampel tidak terlalu jauh.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan suku adalah yang bersuku makassar sebanyak 20 orang (100%) yang bersuku bugis 0 responden (0%). Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masing-masing sampel bahwa perbedaan suku tidak mempengaruhi tekanan darah para sampel. Hal ini mungkin disebabkan karena rentang umur para sampel tidak terlalu jauh.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan adalah yang mempunyai pekerjaan 0 responden (0%) yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 20 orang (100%). Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masing-masing sampel bahwa pekerjaan tidak mempengaruhi tekanan darah para sampel. Hal ini mungkin disebabkan karena rentang umur para sampel tidak terlalu jauh.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden pada kelompok kontrol tidak mengalami penurunan tekanan darah. Hal ini terjadi karena pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apa-apa dimana hanya dilakukan pengukuran selama 2 kali yakni pengukuran pertama dan pengukuran kedua setelah 20 menit kemudian. Tidak terjadinya penurunan tekanan darah pada kelompok kontrol dipengaruhi juga karena ada beberapa responden yang masih mengonsumsi makanan seperti bakso, gorengan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan tekanan darah serta ada juga responden yang mempunyai masalah keluarga sehingga responden menjadi stress akibatnya pada saat pengukuran tidak terjadi penurunan bahkan terjadi peningkatan pada saat pengukuran kedua dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden pada kelompok perlakuan mengalami penurunan tekanan darah selama diberikan intervensi masase kaki tetapi ada satu responden yakni Ny. M yang belum mengalami penurunan tekanan darah pada hari pertama dan hari kedua setelah pemberian intervensi dilakukan. Hal ini terjadi karena responden belum mengatur pola makannya, dimana responden sudah mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah yaitu daging kambing. kandungan natrium dalam daging kambing lebih tinggi dibanding daging mamalia yang lain dan kandungan protein dari daging kambing sangat tinggi namun masih dibawah daging dari jenis seafood. Kandungan natrium yang tinggi akan memicu sistem ginjal untuk menghasilkan hormon angiotensin yang bila teraktivasi akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan kandungan protein yang tinggi akan menyebabkan tertahannya air di dalam tubuh sehingga merangsang ginjal untuk menahan natrium didalam darah. Tidak menurunnya tekanan darah pada responden juga dipengaruhi oleh tidak rileksnya responden pada saat dilakukan intervensi masase kaki karena pada saat sementara dilakukan intervensi responden marah-marah akibatnya kontraksi jantung meningkat. Di samping itu, ada satu responden pada kelompok perlakuan yang drop out dikarenakan pada saat hari ketiga pemberian intervensi responden sudah tidak ingin diberikan intervensi masase kaki. Hal ini terjadi karena responden merasa tidak nyaman pada saat diberikan perlakuan.

Tekanan darah para sampel penelitian pre test pada kelompok kontrol diketahui memiliki nilai tertinggi 150/100 mmHg dan nilai terendah 120/80 mmHg dengan rata-rata tekanan darah pre test 134.00 pada sistol dan 89.00 pada

diastol. Sedangkan sampel penelitian pre test pada kelompok perlakuan diketahui memiliki nilai tertinggi 160/100 mmHg dan nilai terendah 130/90 mmHg dengan nilai rata-rata tekanan darah pre test 142.00 pada sistol dan 93.00 pada diastol.

Setelah dilakukan uji wilcoxon test didapatkan *p-value* pada kelompok perlakuan (pre-post sistol) sebesar 0.004 atau $p < 0.05$, kelompok perlakuan (pre-post diastol) sebesar 0.005 atau $p < 0.05$ berarti ada pengaruh variabel (kelompok perlakuan) terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sedangkan pada kelompok kontrol (pre-post diastol) sebesar 0.726 atau $p > 0.05$ berarti tidak ada pengaruh kelompok kontrol terhadap penurunan tekanan darah. Dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji wilcoxon test dapat diketahui bahwa masase kaki berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah dilihat dari *p-value* pada tekanan darah sistol 0.004 dan tekanan darah diastol 0.005 yang artinya $p < 0.05$.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk pada tahun 2009 yang berjudul pengaruh masase kaki terhadap penurunan tekanan darah. Dengan metode percobaan klinik metode pra experiment dengan rancangan penelitian menggunakan pretest-posttest design. Populasi yang digunakan adalah perempuan penderita prehipertensi. Sampel pada penelitian berjumlah 10 orang. Penderita prehipertensi dipilih secara purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive sampling dilakukan untuk tujuan tertentu. Jenis sampling ini termasuk didalam nonprobability sampling dimana teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang yang sama dari setiap anggota populasi, yang bertujuan tidak untuk generalisasi, yang berasas pada probabilitas yang tidak sama. Instrumen yang digunakan adalah alat ukur

tekananan darah spigmomanometer air raksa, stetoskop dan lembar dokumentasi untuk mencatat tekanan darah responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan masase kaki, perempuan penderita prehipertensi dengan nilai rata-rata tekanan darah 133/83 mmHg. Setelah dilakukan masase tekanan darah turun menjadi normal dengan nilai rata-rata 120/75 mmHg. Ada perbedaan yang signifikan dengan dilakukannya masase kaki terhadap tekanan darah perempuan prehipertensi.

Penurunan tekanan darah disebabkan oleh terjadi relaksasi otot para responden. Responden diberikan intervensi masase kaki 7 kali selama 1 minggu berturut-turut yang mana otot-otot menjadi rileks. Rileksnya otot-otot akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah bagi para responden.

Menurut penelitian yang dilakukan Radar (2009) di RSUD Muhammadiyah Malang, masase kaki digunakan pada seorang yang menderita Hipertensi tekanan darah sistoliknya sebelum di terapi adalah 180 mmHg setelah dilakukan terapi selama 30 menit tekanan darah sistoliknya menurun 150 mmHg. Penurunan tekanan darah sistolik ini karena masase kaki bisa merilekskan tubuh dan pembuluh darah mengalami vasodilatasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masase kaki merupakan terapi yang sangat efektif. Masase kaki baik untuk merilekskan otot-otot, mengurangi nyeri, memperbaiki organ tubuh, memperbaiki postur tubuh, dan sebagai latihan pasif (Perry & Potter, 2005 dalam Safitri, 2012). Penurunan tekanan darah diakibatkan oleh teknik integrasi sensori yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom, apabila seseorang mempersepsikan sentuhan sebagai stimulus rileks maka akan muncul respon relaksasi.

Gerakan masase kaki terdiri dari gerakan effleurage, masase pada kaki, effleurage. Gerakan ini bersifat berkesinambungan atau alirannya tidak terputus-putus agar energi mengalir dari satu meridian ke meridian lainnya dalam urutan yang teratur (Thie, 2007). Oleh karena itu, pemijatan yang dilakukan tangan sama sekali tidak boleh diangkat karena akan memutuskan aliran pijat sebagai satu kesatuan yang utuh, tangan harus selalu menyentuh tubuh dalam semua gerakan maju mundur yang dilakukan secara berurutan (Price, 1997).

Prinsipnya, pijat yang dilakukan pada penderita hipertensi adalah untuk memperlancar aliran energi didalam tubuh sehingga gangguan penyakit hipertensi dan komplikasinya dapat diminimalisir. Ketika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak lagi terhalang oleh ketegangan otot dan hambatan lain maka resiko hipertensi dapat ditekan (Dalimartha, 2008).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masase kaki baik untuk menurunkan tekanan darah. Berdasarkan hasil lembar observasi bahwa responden yang diberikan intervensi masase kaki semuanya mengalami penurunan tekanan darah sedangkan pada kelompok yang tidak diberikan intervensi hampir semua responden tidak mengalami penurunan bahkan ada responden yang mengalami peningkatan tekanan darah setelah dilakukan pengukuran tekanan darah. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan khususnya dibidang akademik sedangkan bagi puskesmas khususnya perawat dapat menjadikan sebagai salah satu intervensi mandiri perawat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi.

Peningkatan tekanan darah dapat dipengaruhi oleh pola makan yang tidak sehat. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Untuk menghindari peningkatan tekanan darah, seseorang harus menghindari makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium, makanan dan minuman dalam kaleng, makanan yang diawetkan, susu full cream, mentega, margarine, keju, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol, bumbu penyedap, alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, tape (Oswari, 1992 dalam Safitri, 2012).

Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf/07:31:

﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, kenakan pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-Raaf/07:31).

Dalam Al-Qur'an prinsip makanan sehat adalah tidak berlebih-lebihan. Rasulullah bersabda: “Anak Adam tidak memenuhi suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka (ia dapat mengisi perutnya) dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Lalu prinsip lain yang disebutkan pada dalil lainnya adalah hala dan tayyiban, yang dimaksud dengan halal yakni diketahui atau jelas riwayat

makanannya (misalnya bersumber dari mana dan diproses dengan cara seperti apa) selain itu memenuhi standar halal makanan yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sementara istilah *tayyiban* disini yakni kualitas kandungan gizi/nutrisi dalam makanan serta tidak menjijikkan.

Dengan demikian, islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Telah terbukti dalam literatur kesehatan bahwa makanan yang berlebihan merupakan dasar dari berbagai penyakit. Kelebihan makanan dapat membuat obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain. Untuk menjaga agar terbiasa tidak makan berlebihan, islam juga mengatur puasa wajib di bulan ramadhan dan puasa sunnah di hari lainnya.

Adapun keterbatasan selama melakukan penelitian ini adalah jauhnya jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Program pengaturan diet pada responden juga belum dilakukan dengan ketat sehingga kemungkinan faktor pola makanan mempengaruhi hasil penelitian karena berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah ada beberapa responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah bahkan ada responden yang mengalami peningkatan tekanan darah setelah dilakukan pengukuran kedua (pada kelompok kontrol) dan yang melakukan pengukuran pre dan post test adalah peneliti sendiri sehingga masih bisa bersifat subjektif, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya yang mengukur antara pre dan post test adalah orang yang berbeda agar supaya hasil yang didapatkan lebih objektif serta ada beberapa responden yang diberi penjelasan yang lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang masase kaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa semua responden merupakan hipertensi primer yaitu sebanyak 20 responden (100%).
2. Ada hubungan antara masase kaki dengan penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi dimana hasil uji Wilcoxon Test diperoleh $p=0.004$ (tekanan darah sistol) dan $p=0.005$ (tekanan darah diastol) yang artinya ada hubungan yang signifikan. Selain itu, diperoleh bahwa masase kaki yang baik sebanyak 20 responden (100%) mengatakan puas dan tidak ada yang mengatakan tidak puas selama diberikan intervensi masase kaki.
3. Tidak ada hubungan pengukuran tekanan darah yang dilakukan dengan penurunan masase kaki (kelompok kontrol) dimana hasil uji Wilcoxon Test dan T-Test $p=0.798$ (tekanan darah sistol) dan 0.726 (tekanan darah diastol) yang artinya tidak ada perubahan yang signifikan.

B. Saran

1. **Bagi Puskesmas Bontomarannu**
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang keperawatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yakni tindakan mandiri perawat dalam memberikan intervensi keperawatan.
 - b. Melakukan pelatihan masase kaki bagi perawat sebagai salah satu intervensi yang harus terus menerus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dalam menurunkan tekanan darah.

2. Bagi Perawat

- a. Menambah pengetahuan perawat untuk mmenjadikan masase kaki sebagai intervensi mandiri untuk menurunkan tekanan darah.
- b. Dapat memberi gambaran atau informasi bagi peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aslani, marlilyn. *Teknik Pijat untuk Pemula*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Brunner & Suddarth. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8*. Jakarta: EGC, 2001.
- Budiman, Bestari. J dan Al Hafiz. “Epitaksis dan Hipertensi: Adakah Hubungannya?”. <http://www.jurnal.fk.unand.ac.id>. (19 oktober 2014).
- Culpepper, R. Michael. 2011. *Management Hypertension: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 8)*. <https://www.google.com/search?q=hypertension+classification+JNC+2011&ie=utf-8&oe=utf-8>. (15 Januari 2015).
- Cutler, N. 2007. “Hypertension: Massage Indication or Contraindication?”. <http://www.integrativehealthcare.org/mt/archives/200701/Hypertension.html>, (19 oktober 2014)
- Dalimartha, Setiawan, dkk. *Care Your Self; Hipertensi*. Jakarta: Penebar Plus, 2008.
- Dekker, Evert. *Hidup dengan Tekanan Darah Tinggi*. Jakarta: CV. Mulia Sari, 1996.
- Gunawan, Lany. *Hipertensi Tekanan Darah Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Hayens, R.B. dkk. *Buku Pintar Menaklukkan Hipertensi*. Jakarta: Ladang Pustaka, 2003.
- Hidayat, Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Kaplan, 2006. *Kaplan's Clinical Hypertension, Ninth edition*. Lippincott: williams & Willkins.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Panduan peringatan hari kesehatan sedunia 7 april 2013; Waspadai hipertensi kendalikan tekanan darah*. Jakarta, 2013.

- Kementrian Kesehatan republic Indonesia. *Profil kesehatan Sulawesi selatan 2012*. http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/2_6_profil_Kes.Prov.SulawesiSelatan_2012.pdf, (10 Oktober 2014).
- Martha, Karnia. *Panduan Cerdas Mengatasi Hipertensi*. Yogyakarta: Araska, 2012.
- Martuti, A. *Merawat dan Menyembuhkan Hipertensi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2009.
- Moyle, dkk. 2013. "The Effect of Foot Massage on Long-Term Care Staff Working with Older People with Dementia: A Pillot, Parallel Group, Randomized Controlled trial. <http://www.biomedcentral.com/1472-6955/12/5>. (02 Januari 2015).
- Mulyati, Leli. 2012. "pengaruh masase kaki secara manual terhadap sensasi proteksi, nyeri dan ankle bronchial index (ABI) pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Curup Bengkulu". Perpustakaan UI. <http://www.Digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-125096.pdf>. (02 Januari 2015).
- Nugroho, dkk. 2012. "Efektivitas Pijat Refleksi Kaki dan Hipnoterapi terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi". Volume 8, No 2. <http://www.digilib.stikesmuhgombang.ac.id/files/disk1/28/jtstikesmuhgo-gdl-irmawanand-1365-2-hal.57--3.pdf>. (02 Januari 2015).
- Nursalam. *konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Palmer, Anna dan Bryan Wiliams. *Simple Guide Tekanan Darah Tinggi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Pearce, Evelyn. *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Rahardjo, 1979.
- Pristiwandono, Yerry. 2013. "Pengaruh Remedial Massage Kaki terhadap Gangguan Sirkulasi Darah Perifer pada Klien Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Patrang Kab. Jember. <http://hdl.handle.net/123456789/10161>. (02 Januari 2015).
- Potter & Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan; Konsep, Proses dan Praktik Edisi 4 Volume 2*. Jakarta: EGC, 2005.
- Safitri, Putri. 2012. "Efektivitas Masase Kaki dengan Minyak Esensial Lavender

terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”. *Skripsi*. Sumatera utara: Fakultas Keperawatan Univ. Sumatera Utara.

Sari, dkk. 2014. “perbedaan Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Masase Kaki dengan Menggunakan Minyak Esensial Lavender terhadap Perempuan Prehipertensi di desa Karyawangi Kab. Bandung Barat”. <http://www.kti.unai.edu/wp.../2014/.../Dinny-Symbolon-Skripsi.pdf>. (02 Januari 2015).

Shanty, Meita. *Silent killer diseases*. Jogjakarta: Javalitera, 2011.

Sheps, S. G. *Mayo Clinic Hipertensi; Mengatasi Tekanan Darah Tinggi*. Jakarta: Intisari Mediatama, 2005.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Smeltzer & Bare. 2001. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, Ed.8. Vol.2*. Jakarta: EGC

Sobel, B.J. *Hipertensi; Pedoman Klinis Diagnosis dan Terapi*. Jakarta: Hipokrates, 1998.

Thie, J. *Touch for Health; Petunjuk Praktis untuk Kesehatan yang Alami dengan Sentuhan Akupresur*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Tiro, Muhammad Arif. *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher, 2011.

Tiro, Muhammad Arif dan Arbianingsih. *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher, 2011.

RIWAYAT HIDUP



Fitriani lahir di Sungguminasa Kab. Gowa, 25 Maret 1993 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Dg. Mata' dan Nurbaeti Dg. Ngai. Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK Bhayangkara pada tahun 1998-1999, SD Negeri Batang Kaluku pada tahun 1999-2005, SMP Negeri 2 Bontomarannu pada tahun 2005-2008, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bontomarannu Kab. Gowa pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan studi pada tahun 2015 tepatnya 22 April 2015 dan mendapat gelar Strata Satu (Sarjana) Keperawatan dengan diterimanya skripsi yang berjudul **“Pengaruh Masase Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kab. Gowa”**

Pada saat kuliah di UIN Alauddin Makassar, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya anggota divisi Advokat HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2012-2013, anggota divisi Dana dan Usaha HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2013-2014, menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar periode 2013-2014, pada tahun yang sama menjabat sebagai Bendahara Umum Studi Club SCLERA, kemudian bergabung di UKM Olahraga Badminton UIN Alauddin Makassar periode 2014 dan Himpunan Mahasiswa Bidik Misik UIN Alauddin Makassar.