

**PENGARUH PEMBERIAN JAMU HERBAL TERHADAP
UKURAN TIBIA DAN FEMUR
PADA BROILER**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan (S. Pt) Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh
Arsil
60700115077

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arsil
NIM : 60700115077
Tempat/Tgl. Lahir : Tombolo, 14 April 1996
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Abd Rasyid Dg Lurang Kasomberang No. 10
Judul : Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap ukuran Tibia dan Femur pada Broiler

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, November 2019

Penyusun,



Arsil
60700115077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Arsil**, NIM: 60700115077, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, **“Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Pada Broiler”**, Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar **Munaqasyah**. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, November 2019

Pembimbing I



Khaerani Kiramang, S.Pt., Mp
NIP: 19730828200604 2 001

Pembimbing II



Khaifa Asgaf, S.Tp., M.Si
Nip: 19850315 201903 2 012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P
NIP: 1975 09092009 121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Pada Broiler**, yang disusun oleh **Arsil**, NIM: **60700115077**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dalam Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, November 2019
28 Shawwal 1440

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Sjamsiah, S.Si., M.Si, Ph. D.**

Sekretaris : **Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si**

Munaqasya I : **Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M. Si**

Munaqasya II : **Dr. Muhammad, Shuhufi M.Ag.**

Pembimbing I : **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.**

Pembimbing II : **Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,**

Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustamil, M. Pd.
NIP. 19740412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur pada Broiler** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang.

Selama proses penulisan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moral dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenangkanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Ayahanda **Sikki Liwang**, Ibunda **Hadawiah So'na** dan saudaraku.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami S.Ag, M.Pd** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, **Sjamsiah, S.Si, M.Si., Ph.d** Selaku Wakil dekan **I** Fakultas Sains dan Teknologi, **Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.** Selaku Wakil Dekan **II** bagian administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si** Wakil dekan **III** Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri alauddin makassar.
3. Bapak **Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P.** Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingannya selama ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai meyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Tim Penguji, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si,** selaku Penguji I dan Bapak **Muhammad Suhufi S. Ag. M.Ag** selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka mupun arahan-arahan diluar perkuliahan.

7. **Andi Afriana, SE**, selaku pegawai Jurusan Ilmu Peternakan yang membantu dalam pengurusan berkas.
8. **Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan kakak **Hikmawati S.Pt**, Selaku laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang ikut membimbing, memberi kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. **Civitas Akademik** yang telah membantu dalam proses pengurusan berkas.
10. **Prof. Ir. H. Abd Latif Toleng, Mc** Selaku pengarah dan motivasi sekaligus memberikan tempat untuk melaksanakan penelitian.
11. Tim penelitian Unggas (**Ummi kalsum, Muh. Rusman, Fatul Rahman Azis, Muh. Sadiq Indra Jaya, Yulianingsi dan Sasmita**) yang senantiasa menjadi penyemangat selama proses penelitian.
10. Rekan seperjuangan **BISON (Angkatan 2015)** di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini dan tetap semangat dan tersenyumlah smile.
11. kawan-kawan Forum Kajian Mahasiswa Datarang Tinggi (**FORKARI**), Himpunan Mahasiswa Gowa (**HIPMA GOWA** Koordinat Tombolopao), Himpunan Mahasiswa Jurusan (**HMJ Peternakan**), Dewan Mahasiswa fakultas Sains dan Teknologi (**DEMA SAINTEK**), Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI**), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (**IMM**) Telah Memberikan Ruang Untuk Mencari Pengalaman.
12. Tim **PKL** di **PT SATWA INDO PERKASA**.
13. Tim **KKN** di Bonto Tangnga Kec Ulu Ere Kab. Bantaeng

14. kakanda-kakanda di **SIFS**.

15. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Samata, November 2019


Arsil



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Defenisi operasional.....	4
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
G. Hipotesis.....	5
H. Kajian Terdahulu.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Al-Quran.....	7
B. Ayam Broiler.....	10
C. Jamu Herbal.....	15
1. Pasal yang berkaitan sanitasi jamu Berstandar.....	18
2. Bawang Putih.....	22
3. Kayu Manis.....	26
4. Daun Sirih.....	29
5. Molases.....	33

6. EM-4	34
7. Tibia dan Femur.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	46
B. Alat Dan Bahan	46
C. Jenis Penelitian.....	46
D. Metode Penelitian.....	47
1. Rancangan Penelitian.....	47
2. Pemeliharaan Broiler	37
3. Pembuatan Jamu Herbal	48
4. Parameter Yang Diukur.....	49
5. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Pengamatan	50
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Starter	14
2. Komposisi Kimia Bawang Putih Segar dan Bubuk bawang Putih	26
3. Komposisi Kimia Kayu Manis (<i>Cinnamomum Burmanni</i>)	29
4. Komposisi Kimia Daun Sirih.....	31
5. Kandungan Nutrisi Pakan Komersial B11A.....	47



DAFTAR GAMBAR

1. Ilustrasi Tulang Femur, Tibia, Tarsometatarsus dan Jari Pada Ayam ...	44
2. Prosedur Pembuatan Jamu Herbal	48
3. Panjang Tibia	50
4. Panjang Femur	51
5. Besar Tibia	52
6. Besar Femur	53
7. Berat Tibia	54
8. Berat Femur	55
9. Lampiran	



ABSTRAK

Nama : Arsil
Nim : 60700115077
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia dan Femur pada Broiler

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jamu herbal agar meningkatkan kesehatan ternak, merangsang nafsu makan, meningkatkan pertumbuhan secara optimal, mempercepat adaptasi dalam perubahan pakan. serta untuk mengetahui level optimum pemberian jamu herbal terhadap ukuran Tibia dan Femur pada broiler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan, setiap ulangan terdiri dari 2 ekor ayam broiler sehingga terdapat 40 ekor. Perlakuan terdiri dari P0 (Kontrol), P1 (Jamu herbal 2,5 mL/1 L), P2 (Jamu herbal 5,0 mL/1 L) dan P3 (Jamu herbal 7,5 mL/1 L). Parameter yang diukur yaitu Panjang, Besar, Berat (Tibia dan Femur) pada broiler yang diukur Setelah Pemeliharaan Selama 30 hari, Pengukuran dilakukan menggunakan Meteran Baju, Jangka Sorong dan Timbangan Analitik. Berdasarkan hasil Anova (*Analysis Of Varian*) menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) Terhadap Panjang dan besar Tibia dan Femur akan tetapi Berat Tibia dan Femur Berpengaruh nyata ($P > 0,05$) pada ayam broiler yang diberikan jamu herbal.

Kata kunci: Jamu herbal, Broiler, Tibia dan Femur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Arsil
Nim : 60700115077
Department : Livestock Science
Title : Effect Of Giving Herbal Herbs To The Size Of Tibia And Femur In Broiler

This research aims to determine the influence of herbal medicine to improve livestock health, stimulate appetite, increase growth optimally, accelerate adaptation in feed change. And to know the optimum level of herbal medicine to the size of Tibia and Femur in broiler. The method used in this study is complete random draft (RAL) with 4 treatments and 5 times repeated, each replay consisting of 2 broiler chickens so that there are 40 tails. The treatment consists of P0 (control), P1 (herbal Medicine 2.5 mL/1 L), P2 (Herbal Medicine 5.0 mL/1 L) and P3 (herbal medicine 7.5 mL/1 L). The measured parameters are long, large, heavy (Tibia and Femur) in the broiler measured after 30 days of maintenance, measurement is carried out using the shirt meter, wheeled term and analytical scale. Based on the results Of Anova (Analysis Of variants) showed no real effect treatment ($P < 0.05$) against the length and large Tibia and Femur but the weight of Tibia and Femur real effect ($P > 0.05$) on the broiler chickens given herbal herbs.

Keywords: herbal herbs, Broiler, Tibia and Femur.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Broiler adalah salah satu komoditas unggas yang menjadi penghasil daging potensial di Indonesia. Broiler juga memiliki peranan penting dan mendukung ketersediaan protein hewan yang murah. Seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pola makan dan besarnya kebutuhan tubuh akan nutrisi. Membuat kebutuhan daging di Indonesia juga semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan daging yang cukup dan berkualitas. Sebagai produk utama, daging memiliki peran besar dalam usaha pemeliharaan ternak potong. Ketersediaan pakan baik kuantitas ataupun kualitasnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daging yang akan dihasilkan, sedangkan faktor penting lainnya adalah jenis bibit dan bagaimana manajemen pemeliharaan yang diterapkan.

Jamu (*Herbal medicine*) sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional, memegang peranan penting dalam pengobatan penduduk di negara berkembang. Diperkirakan sekitar 70-80% populasi di negara berkembang memiliki ketergantungan pada obat tradisional (Wijesekera, 1991; Mahady, 2001). Secara umum jamu dianggap tidak beracun dan tidak menimbulkan efek samping. Khasiat jamu telah teruji oleh waktu, zaman dan sejarah, serta bukti empiris langsung pada manusia selama ratusan tahun (Winarmo, 1997).

Jamu adalah ramuan tradisionan yang dibuat dari bahan alami terutama tumbuhan dan merupakan warisan budaya bangsa yang digunakan turun-menurun. Jamu yang dibuat berasal dari bawang putih, daun sirih dan kayu manis. Selain itu juga ditambah molasses dan EM4, yang dapat diberikan dalam bentuk larutan melalui air minum.

Salah satu kendala lemahnya daya saing produk pertanian Indonesia adalah tingginya residu yang ditinggalkan akibat penggunaan bahan-bahan kimia salah satu teknologi yang merupakan bentuk kearifan lokal adalah penggunaan jamu herbal untuk ayam.

Penggunaan jamu ini meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan sehingga menghasilkan kenaikan bobot badan ayam serta daging yang dihasilkan mampu bersaing dipasaran internasional.

Tulang mempunyai struktur yang sangat kompleks, bahan kering tulang ternak unggas terdiri dari 46% mineral, 36% protein dan lemak 18%. Komposisi ini bervariasi sesuai dengan usia ternak unggas dan pakan yang dikonsumsi. Fungsi kalsium dalam cairan tubuh yang berbentuk ion sangat penting, khususnya dalam tugas pembekuan darah, mempertahankan kepekaan normal jantung, otot, saraf, dan dalam aspek permeabilitas membran yang berlainan, membentuk dan mempertahankan struktur dan kerangka tubuh. (Bambang, 2003)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu diadakannya penelitian terhadap penggunaan Jamu herbal serta mengetahui pengaruhnya terhadap ukuran tibia dan femur broiler.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian jamu herbal terhadap ukuran tibia dan femur pada broiler ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian jamu herbal terhadap ukuran tibia dan femur pada broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga peternak dan pelaku bisnis di dalam rantai usaha peternakan broiler, sebagai objek penelitian dan pihak lainnya yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat mengenai manfaat jamu herbal sebagai air Minum yang dapat memberikan pengaruh terhadap ukuran femur dan tibia pada broiler.
2. Sebagai sumber informasi, bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang manfaat jamu herbal serta ukuran tibia dan femur broiler.
3. Memberi informasi, masukan, wawasan serta pengalaman sarana pembelajaran dan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh bagi peneliti.
4. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

E. Defenisi Operasional

Broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (*Broiler*) adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik.

Jamu merupakan minuman herbal khas Indonesia. Jamu biasanya terdiri dari berbagai jenis tanaman herbal dan rempah pilihan. Jamu tradisional nggak kalah manfaatnya dengan obat-obatan diapotek. Malah, jamu tradisional lebih alami dan bisa turut serta merawat warisan bangsa kita.

Tibia adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan dua ujung. Ujung atas memperlihatkan adanya kondil medial dan kondil lateral. Kondi-kondil ini merupakan bagian yang paling atas dan paling pinggir dari tulang. Permukaan superior memperlihatkan dua dataran permukaan persendian untuk femur dalam formasi sendi lutut.

Femur adalah tulang yang terbesar dan terkuat dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Femur atau tulang paha juga tempat melekat untuk banyak otot dan ligamen. Femur adalah yang terbesar dan terkuat tulang dalam tubuh manusia dan membuat seperempat dari tinggi tubuh.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jamu herbal terhadap ukuran tibia dan femur broiler.

G. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa pemberian jamu herbal dapat mempengaruhi ukuran pada tulang tibia dan femur broiler.

H. Kajian terdahulu

Hasil Penelitian Agustina (2006), yang menyatakan pengaruh penggunaan ramuan herbal sebagai imbuhan pakan untuk meningkatkan performa broiler. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan yaitu P0 (0 mL/L air minum), P1 (2,5 mL/L air minum) dan P2 (5 mL/L air minum) dengan 5 (lima) ulangan serta setiap perlakuan terdiri dari 5 ekor DOC. Pemeliharaan dilakukan selama 35 hari. Berdasarkan hasil dan pembahasan menunjukkan penggunaan ramuan herbal pada level 2,5 mL/L air minum dapat memberi pengaruh terbaik terhadap pertambahan bobot badan. Ditinjau dari aspek biologis, level ramuan herbal sebanyak 2,5 mL/L air minum cenderung memperbaiki konsumsi pakan, konversi pakan maupun rasio efisiensi protein.

Hasil Penelitian Mudarsyah (2017) yaitu pengaruh pemberian probiotik terhadap ukuran tibia dan femur pada ayam broiler yang dilaksanakan di kandang unggas dan Laboratorium animal husbandry Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Metode yang digunakan adalah eksperimen rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan. Parameter yang diukur yaitu pertambahan besar dan panjang tibia dan femur yang diukur setelah pemeliharaan selama 5 minggu, pengukuran dilakukan dengan menggunakan mistar dan meteran. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu, tanpa penambahan probiotik (P0), penambahan probiotik 1 ml (P1), penambahan probiotik 3 ml (P2) dan penambahan probiotik 5 ml (P3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata ($P < 0.05$) terhadap panjang dan besar tibia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Al-Qur'an*

Allah swt dengan kebesaran dan kekuasaannya telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan dengan segala kesempurnaanNya telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu diantara tanda-tanda akan kekuasaannya. Keanekaragaman tumbuhan dapat digunakan sebagai tumbuhan obat, dimana sistem pengobatan dalam Islam telah lama dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, disebut dengan *Ath- Thibbun Nabawi* (pengobatan cara nabi) adalah metode pengobatan yang digunakan Nabi Muhammad saw saat mengobati sakit yang dideritanya, atau beliau perintahkan pada keluarga serta para sahabat untuk melakukannya.

Allah swt menjelaskan dalam ayat Qs. Ali Imran /03: 191 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kemenag, 2012).

Tafsir Al-Muyassar Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam semua kondisi mereka, baik berdiri, duduk dan dalam keadaan mereka berbaring. Mereka mentadaburi dalam penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ”wahai tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan makhluk ciptaan ini dengan sia-sia. Dan Engkau Maha suci dari hal itu. Maka jauhkanlah dari kami siksaan neraka. Tafsir Hidayatul Insan Yakni dalam setiap keadaan. Menurut Ibnu Abbas, bahwa maksudnya mereka melakukan shalat sesuai kemampuan, yakni jika tidak sanggup berdiri, maka sambil duduk dan seterusnya. Namun demikian, ayat ini mencakup semua dzikir lainnya dengan lisan maupun hati.

Memikirkan kekuasaan Penciptanya atau memikirkan maksudnya. Ayat ini menunjukkan bahwa berpikir merupakan ibadah dan termasuk sifat wali-wali Allah yang mengenal-Nya. Setelah mereka memikirkannya, mereka pun tahu bahwa Allah tidak menciptakannya sia-sia. Yakni dari menciptakan sesuatu secara main-main. Termasuk juga didalamnya meminta surga, karena ketika mereka meminta dilindungi dari neraka, maka secara langsung mereka juga meminta surga, akan tetapi karena besarnya rasa takut dalam hati mereka, maka mereka menyebut sesuatu yang paling merisaukan mereka. Orang-orang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaan-Nya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniah yang terbentang di jagat raya ini, seraya berzikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota tubuh.

Mereka mengingat Allah sambil berdiri dan berjalan dengan melakukan aktivitas kehidupan. Mereka berzikir kepada-Nya seraya duduk di majelis-majelis zikir atau masjid, atau berzikir kepada-Nya dalam keadaan berbaring menjelang tidur dan saat istirahat setelah beraktivitas, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sebagai bukti kekuasaan Allah yang mahaagung seraya berkata, ya tuhan kami! kami bersaksi bahwa tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia melainkan mempunyai hikmah dan tujuan dibalik ciptaan itu semua. Mahasuci engkau, kami bersaksi tiada sekutu bagi-Mu. Kami mohon kiranya engkau melimpahkan taufik agar kami mampu beramal saleh dalam rangka menjalankan perintah-Mu, dan lindungilah kami dari murka-Mu sehingga kami selamat dari azab nerakamereka berdoa kepada Allah sang pencipta yang menghidupkan dan mematikan. Ya tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka karena menyekutukan-Mu dan akibat keangkuhannya, maka sungguh, engkau telah menghinakannya dengan menimpakan azab yang pedih, dan tidak ada seorang penolong pun yang dapat memberikan pertolongan bagi orang yang zalim. Karena orang-orang zalim pantas mendapatkan murka dan siksaan dari Allah.

Allah swt menjelaskan dalam Qs Abasa/80: 24 sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Kemenag, 2012).

Maksud dari ayat tersebut menurut Muhammad Quraisy Shihab (2002), dalam kitabnya yang berjudul tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat 24 mengajak untuk memerhatikan bahan makanannya dengan mata kepala dan mata hati. Ayat 24 seakan-akan berkata, jika manusia hendak memulai melaksanakan tugasnya dengan baik maka hendaklah memerhatikan dan melihat ke makanannya, serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Antibiotik dan probiotik sebagai pakan tambahan untuk ternak, maka harus diperhatikan apakah berdampak baik atau berbahaya untuk ternak atau hewan itu sendiri begitupula dengan pakan yang akan digunakan juga harus diperhatikan sumber, kandungan dan proses pengolahannya, disebabkan karena hal tersebut bisa mempengaruhi halal atau haramnya daging ternak yang dihasilkan jika dikonsumsi oleh hewan.

B. Ayam Broiler

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 1992).

Karakteristik Arbor Acres CP 707 yang dihasilkan PT. Charoen Phokphand antara lain :

Berat badan 8 minggu : 2,1 Kg

Konsumsi ransum : 4,4 Kg

Konversi ransum : 2,2

Berat bersih : 74%

Daya hidup : 98%

Warna kulit : Kuning

Warna bulu : Putih

(Rasyaf, 2000).

Ayam broiler merupakan ayam yang memiliki ciri khas tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipasarkan dalam waktu singkat. Pertambahan bobot badan diperoleh dengan pengukuran kenaikan bobot badan melalui penimbangan berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun (Tillman *et al*, 1991).

Hardjosworo dan Rukminasih (2000) menyatakan bahwa ayam broiler dapat digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging artinya dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi daging.

Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan faktor penyakit. Keunggulan ayam broiler akan terbentuk bila didukung oleh lingkungan, karena sifat genetik saja tidak menjamin

keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam broiler akan nyaman hidup dan berproduksi pada suhu lingkungan 18-21 °C. Namun kita ketahui bahwa suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi konsumsi ransum dan lebih banyak minum. Dengan demikian, faktor ransum menyangkut kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Pertumbuhan yang cepat tidak akan timbul bila tidak didukung dengan ransum yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam. Bila faktor suhu dan ransum sudah teratasi maka faktor manajemen perlu diperhatikan pula. Ayam broiler perlu dipelihara dengan teknologi yang dianjurkan oleh pembibit untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (Abun, dkk. 2006).

Ditinjau dari genetik, ayam broiler sengaja diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya. Oleh karena itu, istilah broiler adalah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya rekayasa genetika yang memiliki karakteristik ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur muda, serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, berserat lunak dengan kandungan protein yang tinggi. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai penambahan jumlah ataupun ukuran sel, bentuk dan berat jaringan-jaringan tubuh seperti tulang, urat daging, jantung, otak serta semua jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak dan pertumbuhan terjadi dengan cara yang teratur (Murtidjo, 1993).

Khusus untuk usaha peternakan ayam broiler dengan sistem plasma, faktor-faktor produksi seperti DOC, pakan, obat-obatan, vaksinasi, dan vitamin tidak harus dibayar langsung. Faktor-faktor produksi tersebut sudah bisa dipakai untuk diproduksi selama masa produksi yaitu selama 30-40 hari dan baru bisa dibayar setelah ayam broiler dipanen. Usaha peternakan ayam broiler dapat diusahakan dalam berbagai skala produksi, baik skala besar maupun skala kecil (Kadarsan, 2007).

Saat ini telah banyak para pelaku usaha ayam broiler yang menggabungkan beberapa unit usaha menjadi satu kesatuan unit usaha yang terintegrasi (*Integrated*). Misalnya usaha pembibitan ayam bergabung dengan usaha pakan ternak, usaha beternak ayam broiler komersial, dan proses pemotongan ayam. Bahkan banyak diantaranya yang menggabungkan usahanya dengan usaha pengolahan ayam, sehingga ayam potong yang dijual tidak hanya dalam bentuk ayam hidup ataupun dalam bentuk karkas tetapi bisa berupa produk hasil olahan seperti *Fillet* atau *Nugget*. Produk hasil olahan ini diproduksi berdasarkan permintaan konsumen yang terus berkembang (Rasyaf, 2003).

Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.472/Kpts/TN.330/6/96, usaha peternakan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Peternak rakyat, Pengusaha Kecil Peternakan, dan Pengusaha Peternakan. Peternak Rakyat adalah peternak yang mengusahakan budidaya ayam dengan jumlah populasi maksimal 15.000 ekor per periode. Pengusaha kecil peternakan adalah peternak yang membudidayakan ayam dengan jumlah populasi maksimal 65.000 ekor per periode. Pengusaha peternakan adalah

peternak yang membudidayakan ayam dengan jumlah populasi melebihi 65.000 ekor per periode (Rasyaf, 2003).

Subsektor peternakan yang merupakan bagian dari sektor pertanian, memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian regional maupun nasional. Berdasarkan data statistik, PDB subsektor peternakan mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat krisis ekonomi, dengan rata-rata pertumbuhan PDB antara tahun 2000-2006 sebesar 3,63 persen. Pada periode yang sama, angka tersebut berada di atas laju pertumbuhan sektor pertanian yaitu 2,66 persen, subsektor tanaman pangan 2,05 persen, subsektor perkebunan 3,24 persen, dan subsektor kehutanan -0,07 persen (Ilham 2006).

Subsektor peternakan mampu tumbuh dengan cepat, karena didukung oleh perkembangan industri peternakan terutama ayam ras dan sapi potong. Pelaku dua komoditi tersebut berpotensi dijadikan salah satu sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Salah satu komoditas peternakan yang memiliki potensi yang cukup tinggi di Indonesia adalah peternakan ayam ras pedaging (broiler), perkembangan jumlah populasi ayam broiler mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peluang tersebut maka perlu ditingkatkan daya saing komoditi hasil ternak ini (Ilham, 2006).

Kebutuhan nutrisi broiler periode starter dan finisher sesuai Standar Nasional Indonesia (2006) dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2, sebagai berikut :

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Starter

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar air	%	Maks. 14,0
2.	Protein kasar	%	Min. 19,0
3.	Lemak kasar	%	Maks. 7,4
4.	Serat kasar	%	Maks. 6,0
5.	Abu	%	Maks. 8,0
6.	Kalsium (Ca)	%	0,90 – 1,20
7.	Fosfor (P) total	%	0,60 – 1,00
8.	Energi Metabolisme (EM)	Kkal/Kg	Min. 2900

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2006)

Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Finisher

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar air	%	Maks. 14,0
2.	Protein kasar	%	Min. 18,0
3.	Lemak kasar	%	Maks. 8,0
4.	Serat kasar	%	Maks. 6,0
5.	Abu	%	Maks. 8,0
6.	Kalsium (Ca)	%	0,90 – 1,20
7.	Fosfor (P) total	%	0,60 – 1,00
8.	Energi Metabolisme (EM)	Kkal/Kg	Min. 2900

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2006)

C. Jamu (*Empirical Based Herbal Medicine*)

Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional Indonesia yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta

digunakan secara tradisional. Ada juga yang menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya (Ramuan Madura, 2010). Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris (Portal Pharmacy, 2010).

Jamu merupakan ramuan berbagai simplisia bahan alami yang dengan metode pengolahan sederhana mampu menghasilkan produk berkhasiat. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada jamu dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan aktif, yaitu bahan yang berperan dalam efek terapeutik. Bahan aktif dibedakan menjadi 2, yaitu bahan aktif utama dan bahan aktif pembantu.
- 2) Bahan sampingan, yaitu bahan yang dinyatakan sebagai beberapa senyawa yang mampu mempengaruhi efek terapeutik dari bahan aktif.
- 3) Bahan pengotor, yaitu bahan yang sangat tidak efektif. Keberadaannya dalam sediaan obat sangat tidak dikehendaki karena pengaruh negatifnya terhadap kerja obat. Pengaruh yang utama antara lain terjadi perubahan warna, bau dan rasa dari sediaan obat sehingga timbul kekeruhan yang dapat mengurangi stabilitas serta dapat mengganggu kumpulan analitik bahan aktifnya (Firmansyah, 2010).

Secara umum analisis obat tradisional jamu dikelompokkan menjadi dua macam analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berfungsi untuk mengidentifikasi jenis dari suatu zat atau simplisia yang

terdapat pada bahan bakunya, sedangkan analisis kuantitatif yaitu penetapan kadar atau kemurnian dari zat atau simplisia yang akan dianalisis. Pengujian secara kualitatif obat tradisional jamu biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis jenis bahan baku dari suatu simplisia baik dari jenis tumbuhan maupun hewan. Didalam pemeriksaan kualitatif ini, meliputi analisis sebagai berikut:

- 1) Pengujian organoleptik untuk mengetahui khusus bau dan rasa dari simplisia yang diuji.
- 2) Pengujian makroskopis yang dilakukan dengan kaca pembesar atau indera untuk mencari khusus morfologi ukuran dan warna simplisia yang diuji.
- 3) Pengujian mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang disesuaikan dengan keperluan simplisia yang diuji berupa sayatan melintang, radial, paradermal maupun membujur untuk mengetahui unsur-unsur anatomi jaringan yang khas dari Simplisia.
- 4) Reaksi warna dengan pereaksi tertentu (Firmansyah, 2010).

Dari pengujian tersebut diatas akan dapat diketahui jenis simplisia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik untuk masing-masing simplisia sedangkan untuk pengujian secara kuantitatif, umumnya dilakukan untuk menentukan kadar zat, baik dari bahan bakunya yang berupa kadar simplisia produk setengah jadi dari jamu yang berupa kandungan atau zat asing yang terdapat didalamnya serta produk jamu jadi. Penetapan secara kualitatif meliputi:

- 1) Penentuan kadar kandungan yang terdapat pada simplisia yang diuji meliputi penentuan kadar tanin, alkaloid, minyak atsiri, kadar keasaman, dan lain-lain.

2) Penentuan kadar air

3) Penetapan kandungan dan kadar zat asing (Firmansyah, 2010).

Saintifikasi jamu diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 003/MENKES/PER/I/2010. Dalam peraturan ini terdapat 6 bab dan 21 pasal yang memuat tentang tata cara, ketentuan, serta prosedur saintifikasi jamu yang berada dalam penelitian untuk dapat digunakan sebagai salah satu pelayanan kesehatan dimasyarakat. Selain itu, dalam peraturan ini juga memuat tentang standar kompetensi dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan komplementer alternatif khususnya yang berbasis pengobatan herbal. Adapun beberapa pasal yang berkaitan dengan saintifikasi jamu dan klinik jamu berstandar, antara lain:

BAB I: Ketentuan Umum

1) Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

- a) Saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis kesehatan.
- b) Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
- c) Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- d) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- e) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- f) Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
- g) Ilmu pengetahuan biomedik adalah ilmu yang meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, yang dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik.
- h) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik.
- i) Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

- j) Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
- k) Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

BAB II: Tujuan dan Ruang Lingkup

2) Pasal 2

Tujuan pengaturan saintifikasi jamu adalah:

- a) Memberikan landasan ilmiah (*Evidence based*) penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
- b) Mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif dan paliatif melalui penggunaan jamu.
- c) Meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu.
- d) Meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III: Penyelenggaraan

3) Pasal 4

a) Jamu harus memenuhi kriteria:

- (1) Aman sesuai dengan persyaratan yang khusus itu
- (2) Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris yang ada, serta
- (3) Memenuhi persyaratan mutu yang khusus untuk itu

b) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 5

Jamu dan/atau bahan yang digunakan dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan harus sudah terdaftar dalam vademecum, atau merupakan bahan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Sainifikasi Jamu.

5) Pasal 6

Sainifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan izin atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Pasal 7

a) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk saintifikasi jamu dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta

b) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:(1) Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO-OT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan.

- (2) Klinik Jamu
 - (3) Sentra Pengembangan dan Penerepan Pengobatan Tradisional (SP3T).
 - (4) Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)/Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM)
 - (5) Rumah Sakit yang ditetapkan
- c) Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO-OT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, ditetapkan sebagai Klinik Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri ini dan mengikuti ketentuan persyaratan Klinik Jamu Tipe A.
 - d) Klinik jamu dapat merupakan praktik perorangan dokter atau dokter gigi maupun praktik berkelompok dokter atau dokter gigi.
 - e) Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk saintifikasi jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b, c, d, dan e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tipe klinik ditetapkan sesuai pemenuhan persyaratan.

Dwiyanto dan Prijono (2007) menyatakan obat tradisional adalah obat yang terbuat dari bahan alami terutama tumbuhan dan merupakan warisan budaya bangsa yang telah digunakan turun temurun. Secara umum didalam tanaman obat terdapat rimpang, daun, batang, akar, bunga, dan buah mengandung senyawa aktif yang alkaloid, phenolik, tripenoid, minyak atsiri, glikosida yang bersifat sebagai antiviral, anti bakteri dan immunomodulator. Komponen senyawa aktif tersebut berguna untuk menjaga kesegaran tubuh serta memperlancar.

Bawang putih

Bawang putih (*Allium sativum*) adalah tanaman umbi lapis dan salah satu spesies dari genus *Allium sp.* Bawang putih memiliki kekerabatan dekat dengan bawang merah, bawang bombay dan daun bawang. Bawang putih adalah tanaman asli dari Asia Tengah. Dengan riwayat dimanfaatkan manusia lebih dari 7000 tahun, bawang putih telah menjadi bahan pokok di wilayah Mediterania, Afrika dan Eropa dan menjadi bumbu masak di wilayah Asia. Bawang putih telah dimanfaatkan orang Mesir kuno sebagai bahan medis dan bahan masak (Bayan *et al.*, 2014; Ehrlich, 2011). Penggunaan bawang putih dalam mengobati luka dimulai dari abad pertengahan hingga perang dunia dua, ketika bawang putih digunakan untuk mengobati luka dari tentara (Amagase *et al.*, 2001).

Bawang putih memiliki bunga hemaprodit dengan batang yang panjang dan tegak yang dapat mencapai tinggi dua hingga tiga kaki (0,6-0,91 m). Bawang putih memiliki tiga cara reproduksi; umbi lapis yang menjadi akar bunga (siung), umbi kecil yang secara botani disebut bulbil yang berasal dari bunga, dan dari biji. Bawang putih dalam liar diduga melakukan reproduksi seksual dan aseksual sekaligus tetapi pada pertanian hampir dilakukan secara aseksual dengan cara menanam langsung umbi bawang putih dalam tanah karena lebih mudah (Meredith dan Drucker, 2012).

Sebagai tanaman herbal, bawang putih memiliki banyak potensi klinis dari studi eksperimental (Kemper, 2005). Banyak bukti epidemiologi yang mendemonstrasikan tentang efek terapeutik dan preventif dari bawang putih. Efek-

efek ini memiliki implikasi dalam mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, mengurangi resiko kanker, memiliki efek hepatoprotektor, antioksidan dan antimikroba (Bayan *et al*, 2014).

Bawang putih setidaknya mengandung 33 senyawa sulfur, 17 asam amino, beberapa enzim dan mineral. Senyawa sulfur inilah yang membuat bawang putih memiliki bau tajam yang khas dan membuat bawang putih memiliki efek klinis (Kemper, 2005). Senyawa sulfur primer dalam siung bawang putih utuh adalah *V-glutamyl-S-alk(en)yl-L-cysteines* dan *S-alk-(en)yl-L-cysteine Sulfoxides* atau yang disebut sebagai alliin (Amagase *et al*, 2001). Senyawa senyawa paling aktif dari bawang putih, allicin (*Allyl 2-propenethiosulphinate*) dan hasil turunannya (dialil thiosulfinat dan dialil disulfida) tidak akan ada jika bawang putih dihancurkan atau dipotong; kerusakan pada sel bawang putih akan mengaktifkan enzim allinase yang merubah alliin menjadi allicin (Bayan *et al.*, 2014; Fujisawa *et al.*, 2009; Kemper, 2005).

Komponen aktif dalam bawang putih, alisin merupakan zat aktif yang mempunyai daya bunuh pada bakteri dan anti radang, alisin merupakan suatu asam amino yang bekerja sebagai antibiotik serta dapat menurunkan kolesterol darah dan daging pada broiler (Jaya, 2007). Pemberian kombinasi serbuk bawang putih (2.5%) dan mineral ZnO (120 ppm) dalam ransum cenderung memperbaiki performa, kadar kolesterol karkas dan status kesehatan (eritrosit, hemoglobin, hematokrit) (Purwanti, 2008). Berdasarkan penelitian lanjutan Purwanti (2015), fitobiotik ekstrak air bawang putih (EABP) dapat dijadikan alternatif *Feed additif* sebagai *Natural growth promoters* (NGPs) yang aman dalam pakan broiler,

mengingat penggunaan antibiotik sudah tidak diperbolehkan dalam pakan. Pemberian EABP yang optimal pada level 2.0% cenderung memperbaiki performa, kadar kolesterol karkas dan status kesehatan ayam broiler. Selain digunakan dalam pakan broiler, ekstrak fitobiotik ini dapat diaplikasikan pada ternak-ternak unggas lainnya.

Kehebatan bawang putih sebagai obat diduga karena kombinasi dua senyawa yang dikandungnya yaitu alisin dan scordinin. Alisin berfungsi sebagai antibiotik alami yang sanggup membasmi berbagai macam mikroba. Alisin mampu melawan infeksi yang disebabkan oleh amuba, bakteri, jamur atau virus yang dapat merusak jaringan organ dalam pencernaan. *Scordinin* memiliki kemampuan meningkatkan daya tahan tubuh dan juga berfungsi sebagai antioksidan (Syamsiah dkk, 2006)

Bawang putih merupakan tanaman herbal semusim berumpun yang memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Struktur morfologi bawang putih terdiri atas akar, batang semu, tangkai bunga pendek (Farrel, 1985). Bawang putih merupakan terna tegak dengan tinggi 30-60 cm membentuk rumpun. Tidak memiliki akar tunggang, hanya akar serabut yang tidak panjang, tidak terlalu dalam masuk ke dalam tanah. Daun berbentuk pipih, rata dan agak melipat ke dalam ke arah membujur, helai daun bisa lebih dari 10 helai, pelepah-pelepahnya saling membungkus hingga membentuk batang semu, bagian pangkalnya membentuk selaput tipis yang membungkus umbi kecil-kecil. Pada pangkal tanaman terdapat umbi berada didalam tanah, tiap umbi terdiri dari siung-siung kecil, siung terdiri dari tiga bagian, yaitu dua helai daun dewasa

(satu sebagai pelindung dan lainnya sebagai cadangan makanan) dan sebuah tunas vegetatif (Sri Sugati & Hutapea, 1991). Zat kimia dan komposisi bawang putih dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Kimia Bawang Putih Segar dan Bubuk Bawang Putih dalam 100 g

Kandungan	Bawang Putih	Bubuk Bawang Putih
	Segar	Putih
Air (g)	66,2– 71,0	6,5
Energi (kkal)	95 – 122	332
Protein (g)	4,5– 7,0	16,8
Lemak (g)	0,2– 0,3	0,8
Karbohidrat (mg)	23,1– 24,6	72,2
Kalsium (mg)	26,0– 42,0	80
Phospor (mg)	15,0– 19,0	417
Kalium (mg)	346	-
Abu (g)	-	3,3
Serat (g)	-	1,9
Potasium (mg)	-	101
Zat besi (mg)	-	3
Magnesium (mg)	-	58
Seng (mg)	-	3
Vitamin	-	Tidak tentu

Sumber: tunas vegetatif (Sri Sugati & Hutapea, 1991).

Kayu manis

Kayu manis (*Cinnamomum burmannii* Bl.) termasuk dalam family Lauraceae. Nama umum tanaman ini yaitu *Java Cinnamon* (kayu manis jawa), *Indonesian Cassia* dan *Padang Cassia*. Di Indonesia biasa disebut dengan nama Kayu Manis Padang. Tanaman ini memiliki sinonim yaitu: *Cinnamomum chinese* Bl., *Cinnamomum dulce* Ness. Dan *Cinnamomum kiamis* Ness. (Agusta, 2000).

Berbagai macam nama daerah dari tanaman kayu manis, antara lain: di Sumatra adalah holim, holim manis, modang siak-siak (Batak), kanigar, kayumanis (Melayu), madang kulit manih (Minangkabau). Di Jawa adalah hurumentek, kiamis (Sunda), ksnyegar (Kangean) dan di Nusa Tenggara adalah kesingar, kecingar, cingar (Bali), onte (Sasak), kaninggu (Sumba), puundinga (Flores) (Departemen Kesehatan RI, 1977).

Kulit batang kayu manis memiliki bau khas aromatik : rasa agak manis, agak pedas dan kelat. Pada pengamatan secara makroskopik, potongan kulit berbentuk gelondong, agak menggulung membujur, agak pipih atau berupa berkas yang terdiri dari tumpukan beberapa potong kulit yang tergulung membujur; panjang sampai 1 m, tebal kulit 1 mm sampai 3 mm atau lebih (Departemen Kesehatan RI, 1977). Permukaan luar kulit yang tidak bergabus berwarna coklat kekuningan atau coklat sampai coklat kemerahan, bergaris-garis pucat bergelombang memanjang dan bergaris-garis pendek melintang yang menonjol atau agak berlekuk, sedangkan permukaan luar yang bergabus berwarna hijau kehitaman atau coklat kehijauan, kadang-kadang terdapat bercak-bercak lumut

kerak berwarna agak putih atau coklat muda. Permukaan dalam kulit berwarna coklat kemerahan tua sampai coklat kehitaman. Bekas patahan tidak rata (Departemen Kesehatan RI, 1977).

Pada pengamatan secara mikroskopik, kulit yang lapisan luarnya belum dibuang akan tampak lapisan epidermis dengan kutikula berwarna kuning ; lapisan gabus terdiri dari beberapa sel berwarna coklat, dinding tangensial dan dinding radial lebih tebal dan berlignin ; kambium gabus jernih tanpa penebalan dinding. Korteks terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dengan dinding berwarna coklat, di antaranya terdapat kelompok sel batu, sel lendir dan sel minyak (Departemen Kesehatan RI, 1977).

Tanaman kayu manis terutama bagian kulit batangnya pada umumnya digunakan secara tradisional baik sebagai bumbu masakan maupun sebagai bahan dalam pengobatan tradisional, misalnya sebagai peluruh kentut (karminatif) (Tyler, Brady & Robbers , 1988). Kayu manis berkhasiat mengatasi masuk angin, diare, dan penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kayu manis juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Bisset & Wichtl, 2001).

Tanaman kayu manis diklasifikasikan dalam divisi *Magnoliophyta*, kelas *Magnoliopsida*, ordo *Lurales*, famili *Lauraceae*, genus *Cinnamomum* dan spesies *Cinnamomum verum*. Tanaman *Cinnamomum burmanni* (Blume) merupakan jenis tanaman berumur panjang yang tumbuh liar di hutan- hutan dan baru dalam masa penjajahan budidaya tanaman ini dilaksanakan dalam bentuk perkebunan. *Cinnamomum* menghasilkan kulit yang dinamakan kayu manis yang

dalam perdagangan internasional dikenal *Cassiavera* (Weber, 2003). Komposisi kimiawi *Cinnamomum* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi Kimiawi *Cinnamomum burmanni*

Karakteristik	Komposisi
Kadar Air	7,9%
Minyak Atsiri	3,4%
Alcohol Ekstrak	8,2%
Abu	4,5%
Abu larut air	2,23%
Abu tidak larut air	0,013%
Serat kasar	29,1%
Karbohidrat	23,3%
Ether ekstrak yang tidak terbang	4,2% (non - volatil)
Zat nitrogen	0,66%
BJ rata- rata	1,02- 1,07

Sumber : perdagangan internasional dikenal *Cassiavera* (Weber, 2003).

Daun Sirih

Tanaman sirih merupakan tanaman merambat dan mempunyai akar yang dapat merekat pada pohon lain (Hernani dan Yuliani, 1991). Sirih merupakan tanaman herbal paraniel, berdaun tunggal dengan letak daun alternat, bentuk bervariasi dari bundar telur sampai oval, ujung daun runcing pangkal daun berbentuk jantung dan agak bundar asimetris (Rosman dan Suhirman, 2006).

Darwis *et al.* (1991) melaporkan bahwa tanaman sirih merambat dengan menggunakan akar tambahan (pembantu) yang pendek dan banyak sekali. Tinggi dapat mencapai 2-4 m, batang kuat setengah berkayu, batang yang masih muda licin tidak berbulu. Pada bagian buku membesar dan dari sini keluar daun yang bentuknya bulat telur melebar, elips melonjong atau bulat telur melonjong, panjang 6-17,5 cm, dan lebar 3,5-10 cm. Bagian pangkal daun berbentuk seperti jantung dan belahan daun sering tidak samabesarnya. Ujung daun meruncing pendek, pinggiran daun rata tetapi agak berombak, helaian daun tebal, telapak dan punggung daun licin mengkilat, warna hijau terang, biasanya berurat daun 5-7 pasang, tangkai daun kuat, panjang 2-2,5 cm.

Syukur dan Hernani (2002) mendeskripsikan tanaman sirih sebagai tanaman yang berbatang lunak, bentuk bulat, beruas-ruas, beralur-alur, berwarna hijau abu abu. Daun berbentuk tunggal, letak daun berseling, bentuk bervariasi dari bundar sampai oval, ujung runcing, pangkal berbentuk jantung atau bundar asimetris, tepi rata, permukaan rata, pertulangan menyirip. Warna bervariasi dari kuning, hijau sampai hijau tua, bau aromatis.

Daun sirih irih mengandung minyak atsiri, senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri adalah kavikol, estragol, karvakrol, eugenol, metileugenol, dan tannin (Rostiana *et al.*, 1991) allikatekol 2,7-4,6%; kavikol 5,1-8,2 %; karyofilen 6,2-11,9%; kavibetol 0,01-1,2%; sineol 3,6-6,2%; estragol 7,0-14,6%; kadinen 6,7-9,1%; karvakrol 2,2-4,8%; eugenol 26,8-42,5; dan metileugenol 8,2-15,8% juga mengandung pirokatekin (Rosman dan Suhirman, 2006).

Daun sirih dapat dijadikan sebagai desinfektan alami untuk menyemprot kandang, karena bagian ini termasuk yang paling banyak ditinggali kuman atau menjadi sarang nyamuk. Selain itu daun sirih dapat dijadikan suplemen kesehatan alami bagi ayam Broiler. Selain membuat lebih sehat, daun sirih juga dapat mengurangi bau tidak sedap pada kotoran ternak. Daun sirih dapat dijadikan obat penyembuh mata kering atau luka, misalnya luka yang timbul dari tergores bagian kandang atau dipatuk ayam lain serta dapat mengobati penyakit ngorok pada *Broiler* (Rosman dan Suhirman, 2006).

Sirih (*Piper betle* Linn) berasal dari India, Ceylon dan Malaysia, kemudian menyebar sampai ke Afrika Timur. Sirih di Indonesia dikenal sejak tahun 600 SM (Darwis, 1991). Menurut Sugiati dan Hutapea (1991), sirih termasuk dalam divisi *Spermathophyta*, subdivisi *Angiospermae*, kelas *Dicotyledone*, ordo *Piperales*, family *Piperaceae*, genus *Piper* dan species *Piper betle* Linn. Komposisi kimia daun sirih dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi Kimia Daun Sirih dalam 100 g Bahan Segar

Komponen kimia	Kadar
Kadar air (mg)	85,40
Protein (mg)	3,10
Lemak (mg)	0,80
Karbohidrat (mg)	6,10
Serat (mg)	2,30
Bahan mineral (mg)	2,30
Kalsium (mg)	230,0
Fosfor (mg)	40,0
Besi (mg)	7,00

Besi ion (mg)	3,50
Karoten (IU)	9600
Thiamin (μg)	70
Riboflavin (μg)	30
Asam nikotinat (mg)	0,70
Vitamin C (mg)	5,0
Iodium (μg)	3,4
Kalium nitrat (mg)	0,26 – 0,42
Gula reduksi: glukosa (%)	1,4 – 3,2
Gula non reduksi (%)	0,6 – 2,5
Gula total (%)	2,4 – 5,6
Minyak atsiri (%)	0,8 – 1,8
Tanin (%)	1,0 – 1,3

Sumber: Sirih di Indonesia dikenal sejak tahun 600 SM (Darwis, 1991). Menurut Sugiati dan Hutapea (1991)

Darwis (1991) menyatakan daun sirih segar banyak mengandung asam amino esensial kecuali lisin, histidin dan arginin. Terdapat sejumlah besar asparagin, sedangkan glisin dalam bentuk gabungan, kemudian prolin dan orinitin. Cairan daun bersifat asam, mengandung asam malat dan asamoksalat, enzim diastase dan katalase. Sugiati dan Hutapea (1991) menambahkan bahwa daun sirih mengandung saponin, flavonoida dan polifenol.

Zulaikhah (2005) menyatakan bahwa Sirih mengandung minyak atsiri, tannin, diastase, gula, dan pati. kandungan minyak atsiri memiliki daya membunuh kuman, serta membunuh fungi atau jamur. Penggunaan daun sirih sebagai bahan obat mempunyai dasar yang kuat karena adanyakandungan minyak atsiri yang mempunyai komponen fenol alam yang mempunyai daya anti septik

sangat kuat (Prayogo dan Sutaryadi, 1991). Minyak atsiri daun sirih mempunyai aktivitas anti bakteri terhadap beberapa bakteri gram positif dan gram negatif (Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, 1996).

Molases

Molases merupakan hasil sampingan pada industri pengolahan gula dengan wujud bentuk cair. Molase adalah limbah utama industri pemurnian gula. (Cheeke, 1999). Molase atau yang biasa dikenal dengan tetes dapat digunakan sebagai bahan makanan ternak yang berenergi tinggi. Disamping rasanya manis, keuntungan penggunaan molase untuk pakan ternak adalah kadarkarbohidrat tinggi (48 - 60 % sebagai gula), kadar mineral cukup, dan rasanya disukai ternak. Kadar kaliummolase yang tinggi dapat menyebabkan diare jika konsumsinya terlalu banyak (Rangkuti et al., 1995).

Hasan dan Ishida (1992) menyatakan bahwa Molases atau tetes tebu adalah hasil sampingan pengolahan tebu menjadi gula. Bentuk fisiknya berupa cairan yang kental dan berwarna hitam. Kandungan karbohidrat, protein dan mineral protein cukup tinggi, sehingga bisa juga digunakan untuk pakan ternak walaupun sifatnya hanya sebagai pendukung. Disamping harganya murah, kelebihan tetes tebu adalah terletak pada aroma dan rasanya. Oleh karena itu apabila dicampur dalam ransum maka akan bisa memperbaiki aroma dan rasanya.

Tetes tebu (molase) adalah limbah utama industri pemurnian gula. Molasses merupakan sumber energi yang esensial dengan kandungan gula didalamnya sangat tinggi, tetes tebu (molase) merupakan limbah hasil produksi

pada industri pengolahan gula yang berbentuk cair yang berpotensi untuk dijadikan bahan tambahan minuman untuk ternak. Molase sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pakan ternak, karena molase mengandung sumber energi sangat tinggi (Priyono, 2009) .

Menurut Murtidjo (2003), Molase berwarna coklat kemerah merahan dan kandungan kadar gula sekitar 60 %. Penggunaan molase terbatas sekitar 5 % bila terlalu banyak akan menyebabkan kotoran (feses) ternak unggas menjadi basah Murtidjo (2003). Kadar air dalam cairan molase yaitu 15 - 25 % dan cairan tersebut berwarna hitam serta berupa sirup manis, molase dapat diberikan pada ternak ayam, babi, sapi dan kuda karena molase yang memiliki kandungan 25 - 40 % sukrosa dan 12 - 25 % gula pereduksi dengan total kadar gula 50 – 60 % atau lebih. Selain itu kadar protein kasar molase sekitar 3% dan kadar abu sekitar 8 – 10 %, yang sebagian besar terbentuk dari K, Ca, Cl, dan garam sulfat; *Beet-molase* merupakan pakan pencahar yang normalnya diberikan pada ternak dalam jumlah kecil. Disamping harganya molase yang murah, kelebihan lain dari molase ini adalah aroma dan rasanya (Priyono, 2009).

Effective Microorganism(EM-4)

EM4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan yaitu mikroorganisme inkubasi dan sintetik yang terdiri dari asam laktat, bakteri fotosintetik, *Actinomyces sp*, *Streptomyces sp*, ragi dan jamur pengurai sellulosa. EM4 bermanfaat menyehatkan ternak, mengurangi stres pada ternak, menyeimbangkan mikroorganisme dalam saluran pencernaan ternak, meningkatkan nafsu makan dan mengurangi polusi atau bau kandang dan

lingkungan. Dosis penggunaan EM4 pada ayam potong yaitu 1ml EM4 : 1 liter air putih dengan syarat. EM4 tidak diberikan bersamaan dengan pemberian vaksin, vitamin maupun antibiotik (Phillips, 1997).

Dalam saluran pencernaan unggas *Effective microorganism* meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganismenya yang menguntungkan sehingga dapat memperbaiki aktivitas pencernaan, meningkatkan kesehatan, menekan bakteri patogen, dan meningkatkan produktivitas. Fungsi dari mikroorganismenya tersebut adalah menjaga keseimbangan mikroorganismenya yang ada dalam saluran pencernaan sehingga memperbaiki absorpsi makanan dalam usus, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi serta stress yang ada dapat diantisipasi dengan cepat. Selain itu pemberian mikroorganismenya pada ternak akan menurunkan pH didalam yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen seperti *E.coli*, *Salmonella*, *Proteus* dan *Campylobacteria* (Lokapirnasari, 2007).

Laksmiwati (2006) melaporkan bahwa penambahan EM-4 pada air minum itik jantan umur 0-8 minggu dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi penggunaan ransum, tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Peningkatan dosis pemberian starbio dari 0,5 sampai 1,5 g/kg pakan dan EM-4 pada air minum dari 1 ml sampai 3 ml air minum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, konversi ransum, dan konsumsi ransum. Dilaporkan juga oleh Ritonga (1992) bahwa penggunaan probiotik pada ternak unggas ternyata sangat menguntungkan karena dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu pencernaan dan dapat menghasilkan zat antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganismenya yang merugikan. Surung (2008) menyatakan bahwa

penambahan EM-4 (Effective Microorganisms-4) dalam air minum dapat mengefisiensikan pemberian pakan dan dapat meningkatkan pertambahan berat badan ayam buras.

Effective microorganisms 4 (EM4) merupakan kultur campuran dalam medium cair berwarna coklat kekuningan, berbau asam dan terdiri dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Adapun jenis mikroorganisme yang berada dalam EM 4 antara lain : *Lactobacillus sp*, *Khamir*, *Actinomycetes*, *Streptomyces*.¹² EM 4 dalam keadaan *Dormant* / istirahat / belum aktif mengandung 90 % *Lactobacillus sp* dan sisanya / genus yang lain dan pada keadaan asam maka bakteri *Streptomyces sp* akan berperan lebih aktif dan jika sudah diaktifkan dengan pemberian air / molase / bahan organik maka total kandungan mikroorganismenya adalah 80 genus atau 109/gram dari kesemuanya ada lima kelompok mikroorganisme yang sama, yaitu : *Lactobacillus sp*, *Actinomycetes sp*, ragi / *Yeast*, bakteri fotosintetik (*Rhodospseudomonas sp*) dan bakteri fermentasi (*Penicillium* dan *Aspergillusniger*). Kadar pH EM 4 yang masih dormant jika belum rusak sekitar < 3,5 jika sudah melebihi 4 dan tidak berbau sedap lagi berarti EM 4 tersebut sudah rusak. EM 4 dapat bekerja optimal jika prosesnya dalam keadaan anaerob, pH rendah (3 - 4), kadar garam dan kadar gula tinggi, kandungan air sedang antara 30 – 40 %, suhu fermentasi sekitar 40 – 50° C dan untuk pengomposan secara umum pHnya sebesar 6,5 – 7,5 %.

Effectivemicroorganism-4(EM-4) adalah suatu campuran mikroorganisme yang bermanfaat terutama mengandung bakteri fotosintetik, asam laktat, Actinomycetes, jamur, kapang dan ragi (Struktur penyusun EM-4) merupakan mikroba yang menguntungkan, dapat bertahan dalam kondisi asam dengan pH di bawah 3,5. Mikroba-mikroba ini mampu memberikan fungsi yang beranekaragam yang dapat mempengaruhi budidaya peternakan, produksi panen dan perlindungan terhadap lingkungan (Mairizal, 2013).

EM-4 adalah salah satu jenis probiotik yang merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan ternak yang dapat digunakan sebagai inokulan untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme penggunaan EM-4 dapat meningkatkan kesehatan, pertumbuhan dan kualitas produksi tanaman dan ternak. EM-4 terdiri dari bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat (*Lactobacillus* sp), khamir (*Saccharomyces* sp) serta *Actinomycetes* (Winedar dkk, 2006).

D. Tibia dan Femur

Tulang merupakan suatu jaringan penghubung atau jaringan ikat yang spesial. Pada tulang, tiap sel tersimpan pada tiap lacuna (jadi hanya ada satu sel didalam lacuna), dan satu lacuna dihubungkan dengan lacuna yang lain melalui sejumlah canaliculi kecil menyerupai serabut, yang mempunyai tugas mentransfer sinyal. Serabut-serabut itulah yang dinamakan kolagen. Kolagen inilah yang apabila dihidrolisa akan terkonversi menjadi gelatin.(Meyer ,1960)

(Soengkawati, 1979) Secara umum susunan kimia pada tulang-tulang kerangka binatang, seperti dibawah ini :

Komposisi tulang ayam kerangka binatang Komponen Kandungan (%)

Air	:1.8- 44.3
Lemak	:1.2- 26.9
Kolagen	:15.8-32.8
Zat Anorganik	:28.0-56.3

Panjang tibia digunakan untuk melihat ukuran panjang tulang tibia pada umur 21 hari. Ukuran maksimal kerangka akan dicapai beberapa minggu sebelum melanjutkan pertambahan bobot badan selain itu pertumbuhan kerangka berjalan dengan cepat. Ayam muda ketika sedang tumbuh, sangat kecil pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh pembatasan pakan, tetapi PBB akan terhambat. Hal tersebut menyebabkan manipulasi pertumbuhan tulang lebih sulit dari pada pertumbuhan tubuh (Suprijatna, 2005).

Soeparno, (2015) Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Karakteristik atau penempilan seekor ternak dapat dibedakan atas sifat kualitatif maupun sifat kuantitatif. Sifat kuantitatif umumnya dipengaruhi oleh faktor genetika dan faktor lingkungan serta umumnya mempunyai kaitan erat dengan sifat ekonomis dengan seekor ternak seperti produktifitasnya (Noor, 2008).

Soeharsono (1976) perkembangan panjang menunjukkan produksi daging karena perletakan daging. Nozawa, (1980) melaporkan keragaman tubuh hewan disebabkan faktor genetika dan lingkungan. Ukuran tubuh ayam yang menentukan karakteristik antara lain: bobot badan, panjang *termosometatarsus*, jarak lebar pelvis, identifikasi sifat kuantitatif ternak seperti ukuran tubuh dan laju pertumbuhan dapat menunjukkan nilai ekonomi yang berpengaruh pada produktifitasnya (Irwan , 1996).

Sosimouski (1987) perubahan pada ukuran-ukuran tubuh menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan dari bagian-bagian tubuh. Menurut Williamns et al (1999) yang di sitasi oleh Drive et al (2005) bahwa kebutuhan (Ca) yang perlu tersedia dalam rangsum diperlukan tulang ayam yang masih muda, menurut Nguyen dan Bunchasok (2010) bahwa ayam yang masih muda lebih sensitif terhadap kecukupan nutrisi yang berasal dari asupan ransum

Nozawa (1980) melaporkan bahwa keragaman ukuran tubuh hewan disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Ukuran tubuh ayam yang menentukan karakteristik antara lain : bobot badan, panjang *Tarsometatarsus* , jarak lebar pelvik. Identifikasi sifat kuantitatif ternak seperti ukuran tubuh dan laju pertumbuhan dapat menunjukkan nilai ekonomis yang berpengaruh pada produktifitasnya (Irawan,1996).Suprijana Dkk (2005) tubuh besar memerlukan kerangka tulang yang kuat, pengukuran panjang, berat dan analisis kadar abu ,Ca pada tulang.

Pengujian Ca pada tulang tibia karena merupakan salah satu *Medullary bones* (tulang pipa) yang memiliki rongga sumsum yaitu tulang halus dan terjalin baik serta sebagai tempat penimbunan Ca (Suprijatna 2005). Kalsium dan P berhubungan erat dengan metabolisme terutama dalam pembentukan tulang (Wahju 2004).

Berdasarkan nilai biologis P (P tersedia) dan pengaruh kekurangan atau kelebihan P tersedia dalam pakan, maka perlu dilakukan pengujian biologis untuk mengetahui performa ternak. Ayam tipe pedaging (broiler) bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat (Suprijatna Dkk 2005), sehingga menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian pengujian biologis pakan dengan kandungan P tersedia yang berbeda. Tubuh besar memerlukan kerangka tulang yang kuat. Pengukuran panjang, berat dan analisis kadar abu, Ca dan P pada tulang tibia penting dilakukan untuk mempelajari kondisi tibia.

Ukuran tubuh mempunyai kaitan erat atau berkorelasi positif dengan produktifitas terutama sifat bobot badang ayam. Semakin besar ukuran tubuh maka bobot badan ayam akan semakin tinggi pula (Prasetyo dkk., 2002). Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan mineral tulang dan penting untuk pengaturan proses fisiologik dan biokimia. Kalsium diperlukan untuk memaksimalkan puncak massa tulang dan mempertahankan desintas tulang yang normal (Shorff and Pai 2000).

Groff. And gropper (2000) bahwa badan semakin kurus dan kecil maka berisiko mengalami keropos tulang. Pendapat ini didukung oleh Shorff and Pai (2000). Bahwa berat badan kurang merupakan salah satu faktor resiko keropos tulang. Karena sebagaimana kita ketahui indeks massa tubuh di hitung dengan membagi berat badan oleh kuadrat tinggi badan, jadi semakin besar badan, indeks massa tubuh semakin besar.

Ostoporosis berarti tulang koropos *Porous bone* yaitu adanya pengurangan dalam massa jaringan tulang per unit volume, tulang menjadi tipis, lebih rapu dan mengandung sedikit kalsium Liana (2000)

Beberapa hasil penelitian menjelaskan pertambahan bobot badan rata-rata ayam kampung adalah 64 g/ekor/minggu Iskandar dkk(1998).Lisin adalah salah satu asam amino essensial yang sering kekurangan dalam bahan pakan asal nabati.Penambahan asam amino lisin sintetis bisa dilakukan guna menyeimbangkan asam amino ransum. Protein dan lisin akan mempengaruhi pertumbuhan terutama tulang pada ayam fase starter. Tulang yang lebih panjang diduga memiliki ruang massa daging yang lebih besar, sehingga tulang dengan panjang optimal akan menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi. Menurut Prayitno (1994) terdapat korelasi positif antara panjang tulang dan bobot badan akhir dengan nilai korelasi sebesar 0,400.

Anggorodi (1995) fosfor dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pembentukan tulang. Bila fosfor dalam rangsum kurang tersedia, maka fosfor dalam tulang dirombak melalui proses mobilisasi fosfor dari tulang-tulang

panjang seperti tulang femur yang berakibat gangguan pertumbuhan tulang Djulardi Dkk. (2006).

Lisin sangat dibutuhkan oleh ternak dalam pertumbuhannya karena fungsi dari asam amino lisin dalam pertumbuhan ayam kampung yaitu dapat membantu penyerapan Ca dalam pembentukan tulang sehingga Ca untuk pertumbuhan tulang terpenuhi (Harland dan Oberleas, 2001).Ca pada ayam kampung kebanyakan dideposisikan di tulang terutama terjadi pada saat starter yaitu dimana saat ayam baru memulai pertumbuhan.Indikator pertumbuhan ayam bisa dilihat dari pertumbuhan tulangnya. Pertumbuhan tulang akan optimal apabila bahan penyusun tulangnya terpenuhi, terutama mineral Ca.


Sartika (2000) bobot badan berkorelasi positif dengan ukuran dan berat tulang tibia ditambah juga oleh Appegate Lilbura (2002) bobot badan menyumbang 90% - 98% variabilitas ukuran panjang tulang tibia. Bobot badan yang tinggi diindikasikan dengan pertumbuhan yang baik karena nutrisi dalam rangsum mampu digunakan oleh tubuh, tulang, daging maupun lemak. Bobot badan yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik serta semakin besar konformasi tulang, proses kalsifikasi tulang meningkat. Proses kalsifikasi tulang memerlukan jumlah kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang seimbang guna di bawah kedalam matriks tulang, kepadatan dan struktur tulang dan pemeliharaan (Wahju , (2004).

Faktor lain yang sangat mempengaruhi pembentukan dan penghilangan massa tulang adalah aktifitas atau gerak. Aktifitas dapat mengurangi kehilangan massa tulang bahkan menambah massa tulang dengan cara meningkatkan pembentukan tulang lebih besar dari pada resorpsi tulang (Henrich, 2003). Aktifitas berhubungan dengan penambahan kepadatan tulang.

Defisiensi kalsium, fosfor dan vitamin D₃ ditandai dengan terjadinya *Leg disorder* (kelumpuhan) seperti tulang yang kenyal (*Rikhitis*), *Tibial dyschondroplasia* (Anggorodi, 1997), *Osteoporosis*, *Rickets*, *Osteomyelitis*. Penyakit ini lebih sering menyerang bagian paha (*Femur*), tulang kering (*Tibia*) dan kaki (*Tarsometatarsus*). Ayam yang terserang penyakit *Leg disorder* akan mengalami kelumpuhan. Gejala ini ditandai dengan ketidakmampuan ayam untuk berdiri. *Tibial dyschondroplasia* (TDC) merupakan penyakit sistemik yang mempengaruhi zona pertumbuhan kartilaginous, terutama pada ayam pedaging. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik (bibit dengan tingkat pertumbuhan yang cepat lebih mudah terkena), umur (unggas muda lebih rentan), jenis kelamin serta faktor ransum. Penyakit TDC terjadi akibat kegagalan mendistribusikan mineral sampai ke zona kartilago dan saluran darah gagal menuju kartilago yang tidak normal. Proses tersebut akan lebih bahaya pada masa pertumbuhan. Berat tulang akan terpengaruh jika unggas telah tua. Penyakit *Leg disorder* tersebut dapat diobati dengan cara menambahkan vitamin D dan kalsium karbonat dalam bentuk kapsul gelatin ke dalam ransum (Fadilah dan Polana, 2004). Kelebihan kalsium dan ransum dapat menyebabkan kekurangan fosfor karena keseimbangan fosfor pada ginjal terganggu. Pada unggas muda

kelebihan kalsium bisa menimbulkan *Urolithiasis* pada ginjal (Rizal, 2006).

Tulang Femur, Tibia dan *Tarsometatarsus* diperlihatkan pada Ilustrasi.



Gambar 1. Ilustrasi Tulang Femur, Tibia, *Tarsometatarsus* dan Jari pada Ayam (Department of Animal and Poultry Science, 2008)

Forest *et al.* (1975) mengatakan bahwa pertumbuhan yang paling cepat adalah tulang dan setelah tercapai ukuran maksimal pertumbuhan tulang akan terhenti. Tulang lebih dulu tumbuh karena merupakan rangka yang menentukan konformasi otot. Ditambahkan oleh Enny Dkk. (2002), bahwa kecepatan mineralisasi tulang Femur terjadi lebih lambat dibandingkan dengan tulang *tibia* dan *Tarsometatarsus* dan diduga bahwa tulang Femur merupakan rangkaian penyebab abnormalitas perkembangan panjang tulang. Tulang Tibia merupakan tulang membentuk pipa yang kuat dengan bagian bawah berbatasan dengan penggabungan dari ruas-ruas atau tulang *Tarsal*. *Tarsometatarsus* terbentuk melalui penggabungan ruas paling bawah dari tulang *Tarsal* dan tulang *Metatarsal* jari II, III, IV (McLelland, 1990). Tulang *Tibia* merupakan sumber yang baik dari sumsum tulang, tidak seperti tulang lainnya. Panjang tulang Tibia berkorelasi positif dengan berat badan (Sartika, 2000). Tulang

Tarsometatarsus atau *Shank* sebagian besar ditutupi sisik dengan warna yang bervariasi. Warna kuning pada *Shank* mengandung pigmen karotenoid dalam epidermis ketika pigmen melanik tidak ditemukan (North dan Bell,1990). Pizauro junior, (2002) kalsium dan fosfor yang seimbang begitu penting dalam pembentukan formasi tulang karena kedua desposisi kedua mineral ini dalam tulang dapat meningkatkan berat tulang dalam proses pertumbuhan. Menurut Wilsom et al , (1991) jaringan tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor genetika, pakan dan fungsional hormon yang mempengaruhi laju pertumbuhan, bentuk tulang serta ukuran tulang. pertumbuhan tulang terjadi pada saat ternak masih dalam masa pertumbuhan , yang meliputi proses kalsifikasi dan penyusunan matriks tulang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Mei sampai Juni tahun 2019. Bertempat di Samata *Integrated Farming System* (SIFS), Samata-Gowa.

B. Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat seperti meteran baju, timbangan analitik dan jangka sorong

Bahan yang digunakan yaitu broiler sebanyak 40 ekor, jamu herbal dengan campuran bahan yaitu bawang putih 250 Gram, daun sirih 250 Gram, kayu manis 250 Gram, EM4 1 Liter dan molases 1 Liter. Pakan yang digunakan berasal dari pakan komersial B11A.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan masing- masing setiap ulangan terdiri dari 2 ekor broiler sehingga totalnya berjumlah 40 ekor.

Perlakuan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

P0 : menggunakan air (kontrol)

P1 : menggunakan jamu herbal 0,25 % Per 2,5 ml dalam 1 liter air

P2 : menggunakan jamu herbal 0,50 % Per 5,0 ml dalam 1 liter air

P3 : menggunakan jamu herbal 0,75 % Per 7,5 ml dalam 1 liter air

2. Pemeliharaan Ayam

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 1 bulan. Sebelum ayam atau DOC (*Day Old Chick*) dimasukkan ke dalam brooding terlebih dahulu dilakukan sanitasi kandang. Sebanyak 40 ekor ayam diambil secara acak kemudian di masukkan ke dalam kandang dengan jumlah 20 sekat terbuat dari bambu yang memiliki ukuran 60 × 60 cm. Masing – masing sekat terdapat tempat pakan, tempat minum dan lampu 15 watt sebagai penerang dan penghangat kandang.

Perlakuan diberikan mulai umur 1 hari hingga 30 hari. Pakan yang diberikan merupakan pakan komersial B11A yang diberikan 1 kali atau *Ad libitum* terkontrol yaitu pada pagi hari. Pemberian air minum dilakukan secara *Ad libitum* dengan campuran jamu herbal dalam beberapa tingkat persentase.


Tabel6. Kandungan Nutrisi Pakan Komersial B11A

No	Kandungan	Persentase (%)
1	Kadar air	13,0%
2	Protein	22.0-23,5%
3	Lemak	5,0%
4	Serat	5,0%
5	Abu	7,0%
6	Calsium	0,9%
7	Fosfor	0,6%

Sumber: Data Primer, 2018.

3. Pembuatan Jamu Herbal

Bahan untuk pembuatan jamu herbal (bawang putih, daun sirih, kayu manis) dibersihkan, kemudian dilakukan penimbangan masing - masing sebanyak 250 gr dan dihaluskan menggunakan blender, kecuali untuk kayu manis di tumbuk sampai halus. Ketiga bahan dicampur menjadi satu. Pencampuran molases dan Em4 juga dilakukan masing-masing sebanyak 1 liter kemudian ditambahkan air sebanyak 10 liter. Diaduk hingga semua bahan homogen. Setelah itu fermentasi di simpan selama 2 minggu sebelum jamu dipakai (Jamili, 2013).



Gambar 2. Prosedur pembuatan jamu herbal.

4. Parameter yang Diukur

Setelah proses pemeliharaan selama 30 hari, parameter yang digunakan untuk mengukur Panjang, lebar dan berat tulang tibia dan femur diamati secara manual. Tulang tibia dan femur yang sudah dipisahkan dari daging diukur menggunakan meteran pita, jangka sorong dan timbangan analitik (Siahaan, 2015).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan ANOVA (*analysis of varian*). Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel (1991) model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke- i dari pemberian Jamu herbal ke- j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke- i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3, P4, P5 (Perlakuan)

j = 1,2,3, (Ulangan)


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Panjang Tibia

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap panjang tibia pada broiler disajikan pada gambar 3.




Gambar 3. Panjang tibia pada setiap perlakuan

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap panjang tibia broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa panjang tibia tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) yang memiliki panjang rata-rata berturut-turut P0 (9,0 cm) P1 (9,10 cm) P2 (9,0 cm) dan P3 (9,60 cm).

2. Panjang femur

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap panjang femur pada broiler disajikan pada gambar 4.




Gambar 4 Panjang femur pada setiap perlakuan

Hasil ANOVA (*Analysis Of Variance*) terhadap panjang femur broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa panjang femur tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) yang memiliki panjang rata-rata berturut-turut P0 (6,90 cm) P1 (7,0 cm) P2 (7,0 cm) dan P3 (7,0 cm).

3. Besar tibia

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap besar tibia pada broiler disajikan pada gambar 5.




Gambar 5. Besar tibia pada setiap perlakuan

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap Besar tibia broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa Besar tibia tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) yang memiliki Besar rata-rata berturut-turut P0 (0,86 mm) P1 (1,00 cm) P2 (1,04 cm) dan P 3 (1,14 cm).

4. Besar femur

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap Besar femur pada broiler disajikan pada gambar 6.




Gambar 6. Besar femur pada setiap perlakuan

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap besar femur broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa besar femur tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) yang memiliki Besar rata-rata berturut-turut P0 (1,20 cm) P1 (1,21 cm) P2 (1,27 cm) dan P3 (1,36 cm).

5. Berat tibia

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap berat tibia pada broiler disajikan pada gambar 7.




Gambar 7. berat tibia pada setiap perlakuan.

Hasil ANOVA (*Analysis Of Variance*) terhadap berat tibia broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa berat tibia berpengaruh nyata ($P < 0.05$) yang memiliki berat rata-rata berturut-turut P0 (11,2 gram) P1 (14,6 gram) P2 (12,4 gram) dan P3 (16,2 gram).

6. Berat femur

Hasil penelitian selama 30 hari mencakup beberapa perlakuan pemberian jamu herbal terhadap berat femur pada broiler disajikan pada gambar 8.



Gambar 8. Berat femur pada setiap perlakuan.

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap berat femur broiler, masing-masing memperlihatkan bahwa berat femur berpengaruh nyata ($P < 0.05$) yang memiliki berat rata-rata berturut-turut P0 (9,2 gram) P1 (11 gram) P2 (11 gram) dan P3 (11,2 gram).

B. Pembahasan

1. Panjang tibia

Hasil ANOVA (*Analisis of varian*) terhadap panjang tibia memperlihatkan jamu herbal tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$). P0 (9,0 Cm), P1 (91,0 cm), P2 (9,0 cm), P3 (9,60). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P0 dan P2 sama akan tetapi P3 lebih panjang. Jamu herbal ini merangsang nafsu makan dan meningkatkan kesehatan ternak sehingga memberikan pengaruh bahwa semakin panjang tibia maka pertumbuhan dan produksi daging lebih baik, sesuai dengan pendapat Soeparno, (2015) Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat.

2. Panjang femur

Hasil ANOVA (*Analisis of varian*) terhadap panjang femur memperlihatkan jamu herbal tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$). P0 (6,9 cm), P1 (7,0 cm), P2 (7,0 cm) P3 (7,0 cm). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P3 lebih panjang. Jamu herbal ini mempercepat adaptasi dalam perubahan pakan sehingga proses mobilisasi Ca dan P dalam pertumbuhan daging lebih optimal sesuai pendapat (Djulardi Dkk, 2006) pemberian Ca dan P selain dapat mempengaruhi panjang tulang dan dapat mempengaruhi bobot daging. Bila fosfor dalam rangsum kurang tersedia maka fosfor dalam tulang dirombak melalui proses mobilisasi fosfor dari tulang femur yang berakibat gangguan pertumbuhan tulang.

3. Besar Tibia

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap Besar tibia memperlihatkan jamu herbal tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$). P0 (0,86 cm) P1 (1,00 cm) P2 (1,04 cm) dan P3 (1,14 cm). Hasil penelitian ini menunjukkan Perlakuan P3 lebih besar. Jamu herbal ini meningkatkan pertumbuhan secara optimal sehingga memberikan pengaruh semakin besar tibia akan semakin kuat sesuai pendapat Suprijana Dkk (2005) tubuh besar memerlukan kerangka tulang yang kuat, pengukuran panjang, berat dan analisis kadar abu , Ca pada tulang.

4. Besar femur

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap besar femur memperlihatkan jamu tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$). P0 (1,20 cm) P1 (1,21 cm) P2 (1,27 cm) dan P3 (1,36 cm). Hasil penelitian ini memperlihatkan kecenderungan P3 lebih besar. Jamu herbal ini dapat meningkatkan kesehatan ternak sehingga memberikan pengaruh dalam pembentukan bobot badan sesuai pendapat (Prasetyo dkk., 2002) Semakin besar ukuran tubuh maka bobot badan ayam akan semakin tinggi pula. Variasi ukuran ayam tubuh ayam disebabkan oleh kondisi lingkungan asal bibit yang berbeda, lingkungan pemeliharaan yang berbeda dan pengaruh iklim (Kusuma & Prijono, 2007).

5. Berat tibia

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap berat tibia, memperlihatkan jamu herbal berpengaruh nyata ($P < 0.05$). P0 (11,2 gram) P1 (14,6 gram) P2 (12,4 gram) dan P3 (16,2 gram). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P3 paling berat. Jamu herbal ini meningkatkan pertumbuhan secara optimal sehingga memberikan pengaruh semakin berat tulang maka semakin baik untuk pertumbuhan bobot badan sesuai pendapat (Prasetyo dkk., 2002) Semakin besar ukuran tubuh maka bobot badan ayam akan semakin tinggi pula menurut Sartika (2000) bobot badan berkorelasi positif dengan ukuran dan berat tulang tibia di tambah juga oleh Applegate dan Lilburn (2002) bobot badan menyumbang 90% - 98% variabilitas ukuran panjang tulang tibia. Bobot badan yang tinggi diindikasikan dengan pertumbuhan yang baik karena nutrisi dalam rangsum mampu digunakan oleh tubuh, tulang, daging maupun lemak.

6. Berat femur.

Hasil ANOVA (*Analysis Of Varian*) terhadap besar femur memperlihatkan bahwa jamu herbal berpengaruh nyata ($P > 0.05$). P0 (9,2 Gram) P1 (11 Gram) P2 (11 Gram) dan P3 (11,2 Gram). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P3 lebih berat. Jamu herbal ini meningkatkan kesehatan ternak dan mempercepat adaptasi perubahan pakan sehingga kebutuhan Ca dan P yang seimbang memberikan pengaruh semakin berat tulang semakin bagus pertumbuhan sesuai dengan pendapat Pizauro Junior, 2002) kalsium dan fosfor yang seimbang begitu penting dalam pembentukan formasi tulang karena kedua desposisi kedua mineral ini dalam tulang dapat meningkatkan berat tulang

dalam proses pertumbuhan. (Wahju, 2004) Bobot badan yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik serta semakin besar konformasi tulang, proses kalsifikasi tulang meningkat. Proses kalsifikasi tulang memerlukan jumlah kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang seimbang guna dibawah kedalam matriks tulang, kepadatan dan struktur tulang dan pemeliharaan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan jamu herbal tidak berpengaruh nyata terhadap panjang, besar tibia dan femur. Akan tetapi massa tulang tibia dan femur berpengaruh nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jamu herbal dengan level yang lebih tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abun. 2006. *Nutrisi Ternak Unggas Dan Monogastrik*. Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Agusta, A., 2000, *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia*, 1- 3, 29. Penerbit Bandung.
- Agustina, L. 2006. *Penggunaan Ramuan Herbal Sebagai Feed Additive Untuk Meningkatkan Performans Broiler*. Prosiding Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Usaha Ternak Unggas Berdaya Saing. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan: Bogor.
- Amagase H, Petesch Bl, Matsuura H, Kasuga S, Itakura Y 2001. *Recent Advances On The Nutritional Effects Associated With The Use Of Garlic As A Supplement*. *Jn*. 1:1118-9.
- Anggorodi, R. 1995. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Pt. Gramedia: Jakarta.
- Applegate, T. J Dan Lilburn, M. S. 2002. *Growth Of The Femur And Tibia Of A Commercial Broiler Line*. *Poultry Sci*. **81**:1289-1294. Ayam. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Bambang, Rahartati, 2003. *Menopause*. Nirmala: Jakarta.
- Bayan L, Koulivand Ph, Gorji A. 2014. *Garlic: A Review Of Potential Therapeutic Effects*. *Avicenna Journal Of Phytomedicine*. 4(1):1-1
- Bisset, N. G And Wichtl, M., 2001, *Herbal Drugs And Phytopharmaceuticals*, 2nd edition., 67-69, Medpharm Scientific Publishers, Germany.
- Cheeke, P. R. 1999. *Contemporary Issues In Animal Agriculture*. Prentice Hall, Upper Saddle River: New Jersey.
- Darwis, S. N., A. B. D. Modjo Indo Dan S. Hasiyah. 1991. *Tanaman Obat Familia Zingiberaceae. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Industri*: Bogor.
- Departemen Kesehatan RI, 1977, *Materia Medika Indonesia* Jilid I, 40-41 ; 43-45, Departemen Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Depkes Ri. 2009. *Balai Besar Penelitian Dan Pengobatan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional*. www.B2p2toot.Litbang.Depkes.Go.Id. (19 Oktober 2010).
- Diwyanto K, Prijono S N. 2007. *Keaneka Ragaman Sumber Daya Hayati Ayam Lokal Indonesia Dan Potensi*. Lipi Press: Jakarta.

- Djulardi, A., H. Muis Dan S.A., Latif. 2006 . *Nutrisi Aneka Ternak Dan Satwa Harapan* . Andalas University Press: Padang
- Driver Jp, Pesti Gm, Bakalli Ri, Edwards Hm. 2006. *The Effect Of Feed Calcium And Phosphorus-Deficient Diets To Broiler Chickens During The Starting And Growing-Finishing Phases On Carcass Quality*. J. Poul. Sci. 85:1939-1946.
- Driver, J. P., G. M. Pesti, R. I. Bakali And H. M. Edwards. 2005. *Effect Of Calcium And Nonphytate Phosphorus Concentrations On Phytase Efficacy In Broiler Chicks*. Poul. Sci. 84: 1406-1417.
- Enny, Y.W, Yuniwanti Dan T.R Saraswati. 2002. *Aktifitas Klasifikasi Tulang Tibia Broiler Jantung Dan Betina Setelah Pemberian 1,25-Dihidroxycholecalciferol*. Laporan Penelitian. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Fadilah, R. Dan A. Polana. 2004. *Aneka Penyakit Pada Ayam Dan Cara Mengatasinya*. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Farrel, K.T 1985 *Spices, Condiments And Seasonigs*. The Avi Publishing Company Inc, West Port, Connecticut 06881.
- Firmansyah, B. 2010. *Jamu (Obat Asli Indonesia)*. [Http:// Cacing Busuk. Blogspot. Com /2010/03/Jamu-Obat-Asli-Indonesia.html](http://CacingBusuk.blogspot.com/2010/03/Jamu-Obat-Asli-Indonesia.html). (19 Oktober 2010).
- Forest Et Al, 1975. *Principle Of Mean Scilence*. Freeman And Co. San Fransisco.
- Hardjosworo, P.S. Dan Rukmiasih, M.S., 2000. *Meningkatkan Produksi Daging Unggas*. Penebar Swadaya: Yogyakarta.
- Harland, B. F D Oberleas. 2001. *Effeck Of Dietary Fiber And Phytate On Homeostatis And Bioavibilityof Minerals*. Crcof Dietari Fiber In Human Nutrition, 3rd Ed. G.A Spller, Ed. Crc Press: Boca Raton
- Hasan & Ishida. 1992. *Effect Of Urea Treament Lvel On Nutrive Value Of Oil Palm Fround Silage In Kelah Kelantan Bulls*. Animal Science Congress: Bangkok.
- Henrich, J. 2003. *Calcium And Your Bones*. Word Ide Web [Http://Healt/Centers/Bone Health/104-207-208.html](http://Healt/Centers/Bone Health/104-207-208.html) Di Akses Tanggal 3 Juni 2004.
- Hernani Dan Yuliani. 1991. *Peranan Sirih Sebagai Obat Tradisional*. *Warta Tumbuhan Obat Indonesia*. 1 (1): 13-14.

- Ilham N. 2006. *Analisis Social Ekonomi Dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging* . Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 4 No 2 Juni: 131-145.
- Irawan A. 1996. Ayam-Ayam Pedaging Unggul. Cv. Aneka. Solo.
- Iskandar. , S., Zainuddin S. Sastrodihardjo T. Sartika P Setiadi T. Susanti. 1998. *Respon Pertumbuhan Ayam Kampung Dan Ayam Silangan Pelung Terhadap Pakan Berbeda Kandungan Protein*, Jurnal Ilmu Ternak Vateria 3(1):1-4
- Jamili, M. A. Muh, N.H Dan Amriana H. 2014. *Uji Daya Hambat Ramuan Herbal Terhadap Pertumbuhan Bakteri Stapylococcus Aureus Dan Bakteri Salmonella Typhi*. Jiip. 1(3):227-237.
- Jaya Ins 2007. *Pengaruh Penambahan Bawang Putih Dalam Pakan Dalam Pada Kadar Kolestrol Ayam Broiler*. Program Pascasarjana: Intitu Pertanian Bogor.
- Kadarsan, W.H. 1995. *Keuangan Pertanian Dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Yayasan Syeikh Ali Jaber: Jakarta.
- Kemper, K.J 2005. *Garlic (Allium Sativum) The Longwood Herbal Task Force And The Center For Holictic Pediatck Edication And Reseach*.
- Kusuma, D. & N.S. Prijono. 2007. *Keaneka Ragaman Sumber Daya Hayati Ayam Lokal Indonesia: Mamfaat Dan Potensi* . Lipi Press. Jakarta.
- Laksmiwati, M. 2006, *Pengaruh Pemberian Starbio Dan Effecttife Microorganism-4 (Em-4) Sebagai Probiotik Terhadap Penampilan Itik Jantang Umur 0-8 Minggu Jurusan Produksi Ternak*, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana: Denpasar.
- Liliana. 2000 *Metabolisme Dan Pencegahan Osteoporosis*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Dalam Eber Papyrus, 6 (1) : 33-42
- Lokapirnasari, H Setyono & T Nurhajati, 2007. *Teknologi Pakan Ika*. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Mairizal. 2013. *Pengaruh Penggantian Sebagian Ransum Komersil Dengan Bungkilkelapa Hasil Fermentasi Dengan Effective Microorganism-4 (Em-4) Terhadap Bobot Karkas Ayam Pedaging*. Jurnal Peternakan Indonesia, 15 (1): 1907-1760.

- Mclelland, J 1990. A. *Colour Atlas Of Avian Anatomy*. Wolfen Publishing Ltd: London.
- Meredith Tj. 2012. *The Complete Book Of Garlick: A Guide For Gardeners, Grower, And Serious Cooks*. Timber Press: London.
- Meyers, M. 1960 *An Herb Society Of America Guide*. Garlic:*The Herb Society Of America*.
- Mudarsyah. 2017. *Pengaruh Pemberian Pribiotik Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Pada Ayam Broiler*. Skripsi. Jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : Makassar.
- Murtidjo, B.A. 2003. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Kanisius: Yogyakarta.
- Murtidjo, Bambang Agus. 1993. *Pedoman Meramu Pakan Unggas*. Cetakan 17. Kanisius: Yogyakarta.
- Nguyen, T. V, C. Bunchasak, Dan S, Chantsavang, 2010. *Effects Of Growth Performance And Energy On Growth Performance And Carcass Characteristics Of Betong Chickens During Growing Period Int J Poult Sci.*, 9: 468-472
- Noor, R.R. 2008 *Genetika Ternak*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Nozawa, K. 1980. *Phylogenetic Studies On Native Domestic An Animal In East And Shoutheast Asia*. Tropical Agriculture Research Center, Japan Iv : 23- 43.
- Philip, 1997. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan , Implementasi Dan Pengendalian (Terjemahan Jaka Wasana)*. Salembang Empat: Jakarta.
- Pizauro Junior, J.M. 2002. *Hormonios E Regalacao Do Tecido Osseo*. In: Macari,
- Poultry Indonesia. 2018. *Produksi Dan Perdagangan Daging Dunia*. [Http://Www.Poultryindonesia.Com/News/Riset-Artikel-Referensi](http://www.poultryindonesia.com/news/riset-artikel-referensi). (Diakses Pada Tanggal 26/12/2018).
- Prasetyo, R.D, D.P Winata, Mashur, & A. Sauki 2002. *Kajian Fernetipe Produksi Ayam Kampung, Ayam Arab Dan Persilangan. Laporan Penelitian Kerja Sama Lembaga Penelitian Unram Dengan Balai Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*. Depertemen Pertanian: Mataram.
- Prayitno, D. S. 1994. *The Effects Of Colour And Intensity Of Light On The Behaviour And Performance Of Broilers*. University Of Wales, Bangor, Gwynedd, United Kingdom. (Thesis). Press: Yogyakarta.

- Priyono, M. 2009. *Pemanfaatan Dan Pengolahan Limbah Pabrik*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Proyogo, E.W dan Sutaryadi . 1991. *Pemanfaatan Siri Untuk Pelayanan Kesehatan*. *Warta Tumbuhan Indonesia*, The Jurnal On Indonesia Medical Plants 21-30.
- Purwanti, S, 2015. *Kajian Efektifitas Penambahan Kunyit , Bawang Putih Dan Mineral Zink Terhadap Ferforma , Kadar Lemak, Kolestrol Dan Status Kesehatan Broiler, Tesis Bogor*. Program Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor.
- Ramuan Madura. 2010. *Apa Itu Jamu? Pengertian Singkat Tentang Jamu*. [Http://Www.Jamuramuanmadura.Com/News/1/Apa-Itu-Jamu%3f-Pengertian-Singkat-Tentang-Jamu.Html](http://www.jamuramuanmadura.com/news/1/apa-itu-jamu%3f-pengertian-singkat-tentang-jamu.html). (19 Oktober 2010).
- Rangkuti, J. H. 1995. *Produksi Dan Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawah (Pe) Pada Kondisi Tatalaksana Yang Berbeda*. Departemen Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan. Fakultas Peternakan: Institut Pertanian Bogor.
- Rasyaf, M. 2003. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Ritonga, H. 1992. *Beberapa Cara Menghilangkan Mikroorganisme Patogen*. *Majalah Ayam Dan Telur* No. 73 Maret 1992. Hal : 24-26.
- Rizal, Y. 2006. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Andalas University Press: Padang.
- Rosman, R Dan S. Suhirman. 2006. *Sirih Tanaman Obat Yang Perlu Mendapat Sentuhan Teknologi Budaya*. *Warta Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Industri*, 12 (1): 13-15.
- Sartika, T. 2000. *Studi Keragaman Fenotipik Dan Genetik Ayam Kampung (Gallus Gallus Domesticus) Pada Populasi Dasar Seleksi*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. (Tesis Magister Ilmu Ternak).
- Sasimowski. 1987. *Animal Breeing And Production An Outline*. By. Pwn-Publish Scientific Publishers: Warszawa.
- Shilhab, M.Q .2002. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati: Jakarta.
- Shorffm., And Pai B.; 2002 *Osteoporosis, The Bettle Againts Brittel Bones*, *Jewings Magazine India*: 78-82
- Soeharsono. 2010. *Probiotik Basis Ilmiah, Aplikasi Dan Aspek Praktis*. Bandung: Widya Padjajaran.

- Soengkawati, A.M., 1979, "Riset Pengolahan Tulang Dan Kulit Sisa", Balai Penelitian Kulit. Departemen Perindustrian: Yogyakarta.
- Soeparno. 2015 *Ilmu Teknologi Daging*. Cetakan Keempat Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Sri Sugati Syamsuhidayat, Johnny Ria Hutapea. 1991. *Inventaris Tanaman Obat (1)*. Balitbangkes Dep Kes Ri: Jakarta.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)*. Sni 01-3930-2006.
- Steel, R.G.D. Dan Torrie, J. 1991. *Prinsip Dan Prosedur Statistika*. Pt Gramedia: Jakarta.
- Suprijatna, E, U. Atmomarsono Dan R. Kartasudjana. 2008. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Suprijatna, E. Atmomarsono, U. Dan Kartasujana, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penerbit Penebar Swadaya: Jakarta.
- Surung M, Y., 2008 *Pengaruh Dosis Em4 (Effectife Microorganism-4) Dalam Air Minum Terhadap Berat Badan Ayam Buras*. Jurnal Agrisistem, Volume 4.4
- Syamsiah N., N. Puspitaningtyas Dan D. Wahjuningrum. 2006. *Potensi Ekstrak Bawang Putih Allium Sativum Untuk Menginaktifasi Koi Herpesvirus (Khv) Pada Ikan Mas Cyprinus Carpio*. Jurnal Akuakultur Indonesia. 6(2): 147-154.
- Syukur, C Dan Hernani. 2002. *Budidaya Tanaman Obat Komersil*. Cetakan Ke-2. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Tillman, A.D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, Dan S. Lebdosoekojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Cetakan Kelima. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Hlm. 161-18.
- Wahju, J. 1997. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan Ke-6. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Weber, A(1929). *Alfred Waber's Theory Of Location Of Industries*. Terjemeh Oleh C.J Friendch. University Of Chicago Press: Chicago.
- Wijesekara, R.O.B. 1991 *The Medical Plant Indutri*. Crs Press: New York
- Wilson, H. R, M. A. Boone, A. S. Arofa And D. M. Janky. 1991. *Abdominal Fat Padreduction In Broiler With Thyroactive Iodinated Casein*. Poultry Sci. 62: 811-818.

Winarmo, F.G. 1993. *Pangan Gizi, Teknologi Dan Konsumen* . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Winarno, F.G., 1997. *Kimia Pangan Dan Gizi* . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Zulaikha, S Dan Gunawan. 2006. *Serapan Fosfat Dan Respon Fisiologi Tanaman Cabai Merah Cultivar Hot Beauty Terhadap Mikoriza Dan Pupuk Fosfat Pada Tanaman Ultisol*. Bioscientiae 3 (2) : 83-92.



LAMPIRAN: DOKUMENTASI PENELITIAN



Molases



Bawang Putih



Kayu Manis



Daun Sirih



Effetive Microorganisme-4 (EM-4)



Sanitasi Kandang



Kandang



Penimbangan Sisa Pakan



Air Minum Jamu Herbal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Pengambilan tulang tibia dan femur broiler



Tulang Tibia dan Femur



Sampel Penelitian

ALAUDDIN
MAKASSAR

Menyusuri Ustaz Munawar

Revisi

ORIGINALITY REPORT

Rabu 09. Oktober 2023.

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	pt.scribd.com Internet Source	1%
7	edoc.site Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%

10	tafsirweb.com Internet Source	1%
11	gudrilogo.blogspot.com Internet Source	1%
12	eninuraeni190793.blogspot.com Internet Source	1%
13	id.123dok.com Internet Source	1%
14	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
15	riduwanto.blogspot.com Internet Source	1%
16	docplayer.info Internet Source	1%
17	digilib.unimus.ac.id Internet Source	1%
18	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography Off

Menyetujui

Pembimbing I


 Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.
 NIP: 19730828200604 2 001

Pembimbing II


 Khaifan Asgaf, S.TP., M.Si
 NIP: 19850315201903 2 012



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 3224 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan ILMU PETERNAKAN Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama ARSIL NIM : 60700115077 tertanggal 13 November 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Serta Kandungan Kalsium Pada Tibia Dan Femur Pada Broiler"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Khaerani Kiramang, S. Pt., M.P. sebagai Pembimbing Pertama,
2. Khaifah Asgaf, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 13 November 2018

Dekan,
Kuasa No. B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018
Tanggal 12 November 2018



Dr. Ir. A. Suarda, M. Si.
NIP. 19630324 199403 1 001


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arsil
Nim : 60700115077
Judul : Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Pada Broiler
Pembimbing I : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.

No	Tanggal	Uraian	Tanda tangan pembimbing	Tanda tangan Mahasiswa
1.	01-10-2018	BAB I penyusunan latar belakang dan tujuan penelitian		
2.	27-11-2018	BAB II tinjauan pustakan yang terkait penelitian		
3.	26-11-2018	BAB III prosedur penelitian		
4.	03-12-2018	ACC Proposal		
5.	03-05-2019	Penelitian		
6.	25-07-2019	Analisis data		
7.	01-08-2019	BAB IV Teknik penyusunan hasil penelitian		
8.	06-08-2019	ACC Seminar Hasil		
9.	15-08-2019	Revisi seminar Hasil		
10	14-10-2019	ACC Ujian Munaqasyah		












Makassar, November 2019

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P
NIP: 1975 09092009 121001


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arsil
Nim : 60700115077
Judul : Pengaruh Pemberian Jamu Herbal Terhadap Ukuran Tibia Dan Femur Pada Broiler
Pembimbing II : **Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.**

No	Tanggal	Uraian	Tanda tangan pembimbing	Tanda tangan Mahasiswa
1.	01-10-2018	BAB I penyusunan latar belakang dan tujuan penelitian		
2.	27-11-2018	BAB II tinjauan pustakan yang terkait penelitian		
3.	26-11-2018	BAB III prosedur penelitian		
4.	03-12-2018	ACC Proposal		
5.	03-05-2019	Penelitian		
6.	25-07-2019	Analisis data		
7.	01-08-2019	BAB IV Teknik penyusunan hasil penelitian		
8.	06-08-2019	ACC Seminar Hasil		
9.	15-08-2019	Revisi seminar Hasil		
10	14-10-2019	ACC Ujian Munaqasyah		

Makassar, November 2019

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P
NIP: 1975 09092009 121001

RIWAYAT HIDUP



Nama : Arsil

Tempat Tanggal Lahir : Tombolo 14 April 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan

SDI Tombolopao

SMPN1 Tombolopao

SMAN1 TomboloPao

Pengalaman Organisasi

Ketua Bidang Media dan Informasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pikom Sains dan Teknologi 2016-2017.

Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Sains dan Teknologi 2017-2018.

Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (Hipma Gowa Koordinator Tombolopao) 2017-2018.

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan (Hmj peternakan) 2017-2018.

Pengurus Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP) Ketua lembaga Se-Fakultas Sains dan Teknologi 2018.

Ketua Bidang Seni dan Budaya Forum Kajian Mahasiswa datarang Tinggi (FORKARI) 2018-2019

Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (DEMA Saintek) 2018-2019.