

**HUBUNGAN POLA MAKAN DAN STATUS SOSIAL EKONOMI
DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK)
PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA TAHUN 2014**



SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Gizi Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

FITRIANINGSIH
70200110036

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia serta hidayah-Nya. Terutama nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada hamba-nya ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa setia dan menyebarkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari partisipasi banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibunda Irviani Ibrahim, SKM., M.Kes dan Ibunda Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dengan telaten dan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi, bimbingan, dan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. DR. H. Qadir Gassing, HT., MS, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
3. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Nurdiyana S, SKM., MPH, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

5. Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes, selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
6. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc, M.A selaku penguji agama yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
7. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti dan karyawan FIKES yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
8. Dr. Wahyudi selaku Kepala Puskesmas Tompobulu dan beserta staf Tata Usaha yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Tompobulu.
9. Seluruh anggota keluarga khususnya (Alm) Ibunda Hj. Rukiati dan Ayahanda Abd. Kadir. HB yang selalu memberikan pengarahan, motivasi, kasih sayang dan do'anya dengan tulus ikhlas.
10. Keempat kakak tercinta (Alm) Sukri, Muh. Suaib, Asran, dan Ahmad Kadri , beserta kakak ipar Rosmini, Herlina dan ponakan tercinta Mega, Suci, dan Naura yang telah memberikan banyak hal sebagai dukungan moral maupun material.
11. Sahabat-sahabatku "*Chingu Ji'eM*"; Angky, Itha, Icha, Dewi, Dilla, Amel, dan Usty. Terima kasih atas segala bentuk bantuannya selama ini. Terima kasih atas kenangan dan kebersamaannya yang telah terukir selama 4 tahun terakhir. Aku sayang kalian.
12. Sahabat sekaligus saudariku Rahmawita yang telah setia menemani dan membantu selama dalam melakukan penelitian.
13. Keluarga besar Pak Saleh di posko 4 Embun Pagi, Malino. Teman-teman seperjuangan PBL I, II, dan III; Nacil, Amhe', Pani, Muti, K' Ida, K'Ria, Andi, dan Dhika. Terima kasih atas motivasi dan kebersamaan selama kegiatan PBL.

14. Ibunda Hj. A. Bau Ratna, SKM. M.Kes dan seluruh jajaran staff seksi gizi Masyarakat, serta sahabat-sahabat Magang Dinkes Kota Makassar : Itha dan Dilla. Terima kasih atas pengalaman bekerja yang mampu membentuk motivasi dalam diri ini.
15. Keluarga besar Bapak Hasanuddin dan Ibu Muliati di Panciro Bajeng,. Teman-teman seperjuangan Posko KKN Reguler Angkatan 49; Naida, Ningsih, Uni, Azmi, Nana, Uti, Imran, dan Jabar. Terima kasih atas pelajaran hidup selama kegiatan KKN Reguler.
16. Teman-teman se-angkatan Jurusan Kesehatan Masyarakat, Kesmas A dan Gizi Kesmas 2010, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya, senang berteman dengan kalian semua.

Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan, selebihnya do'a dan harapan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semuanya. Penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik maupun saran demi hasil yang lebih baik, semoga skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 16 Desember 2014

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriainingsih
NIM : 70200110036
Tempat/Tgl. Lahir : Malakaji, 11 April 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Gizi
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1 Reguler
Alamat : Mannuruki 2
Judul : Hubungan Pola Makan dan Status Sosial Ekonomi Dengan
Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil di
Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 16 Desember 2014

Penyusun,

Fitriainingsih
NIM: 70200110036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL	ix-x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Hipotesis	3
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12-36
A. Tinjauan Umum Pada Ibu Hamil	12
1. Kebutuhan Gizi Pada Wanita Hamil	13
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ibu Hamil	17
3. Dampak Kekurangan Gizi pada Ibu Hamil.....	19
B. Tinjauan Umum KEK Pada Wanita Hamil	20
1. Klasifikasi Status KEK Pada Ibu Hamil.....	20
2. Metode dan Cara Penilaian Status KEK pada Ibu Hamil.....	22
3. Pencegahan KEK pada Ibu Hamil.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan.....	25
1. Jenis Makanan	26

2. Frekuensi Makan	27
D. Tinjauan Umum Tentang Status Sosial Ekonomi	28
1. Tingkat Pendidikan	28
2. Pendapatan	29
3. Jumlah Anggota Keluarga.....	29
E. Pandangan Islam Tentang Pola Makan KEK pada Ibu Hamil	30
F. Kerangka Pikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42-70
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan	56
C. Keterbatasan Penelitian	70
BAB V PENUTUP.....	71-72
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian	72
KEPUSTAKAAN	73-75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Umur Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	44
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	45
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Karakteristik Kehamilan Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	45
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Karakteristik Umur Kehamilan Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	46
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi KEK Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.....	47
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Pola makan Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun Tahun 2014	47
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Makan Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.....	48
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Jenis Makanan Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	49
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014J.....	50
Tabel 4.10	Distribusi Kategori Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014J.....	
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Pendapatan Keluarga Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	50
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	51

Tabel 4.13	Analisis Hubungan antara Pola Makan Dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	52
Tabel 4.14	Analisis Hubungan antara Pendidikan Terakhir dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	53
Tabel 4.15	Analisis Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	54
Tabel 4.16	Analisis Hubungan antara Jumlah Anggota Keluarga Kejadian KEK pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Matriks Tiap Variabel
- Lampiran 3 Output *SPSS* dan Sebaran Jawaban Hasil Penelitian
- Lampiran 4 Dokemtasi Penelitian
- Lampiran 5 Persuratan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	36
------------	---------------------------------	----

ABSTRAK

Nam : FITRIANINGSIH

NIM : 70200110036

**Judul : HUBUNGAN POLA MAKAN DAN STATUS SOSIAL EKONOMI
DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK)
PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS TOMPOBULU KABUPATEN
GOWA TAHUN 2014**

Di Indonesia banyak terjadi kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) terutama yang kemungkinan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi (energi dan protein), sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Pola makan dan Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Kabupaten Gowa Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah bersifat survey analitik dengan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dengan jumlah sampel 55 responden ibu hamil. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji *chi-square*.

Hasil penelitian yakni (40%) responden mengalami KEK. Dimana menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pola makan ($p = 0,02$), pendidikan terakhir ($p = 0,04$), pendapatan keluarga ($p = 0,01$) dengan kejadian KEK. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga ($p = 0,723$) dengan kejadian KEK.

Untuk mengurangi terjadinya KEK pada ibu hamil, Petugas kesehatan diharapkan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil supaya lebih memperhatikan kesehatan dan konsumsi makanan yang bergizi selama hamil serta diadakan lintas sektor antara pemerintah dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap ibu hamil yang berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Kata kunci: KEK, Pola Makan, Status Sosial Ekonomi, Ibu Hamil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak terjadi kasus KEK (Kekurangan Energi Kronik) terutama yang kemungkinan disebabkan karena adanya ketidak seimbangan asupan gizi (energi dan protein), sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan tubuh baik fisik ataupun mental tidak sempurna seperti yang seharusnya.

Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kematian ibu mendadak pada masa perinatal atau risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Pada keadaan ini banyak ibu yang meninggal karena perdarahan, sehingga akan meningkatkan angka kematian ibu dan anak (Chinue, 2009).

Jika status ibu sebelum dan selama hamil normal maka kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Sehingga dapat disimpulkan kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Seorang wanita dapat mengalami malnutrisi karena beberapa keadaan yang dimulai dari malnutrisi pada masa anak- anak hingga kehamilan diusia muda.

Menurut data WHO, sebanyak 99 persen kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di negara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450

kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di sembilan negara maju dan 51 negara persemakmuran. (WHO, 2011).

Menurut Depkes RI tahun 2009, prevalensi ibu hamil KEK yaitu 24,6%. Sesuai Program Pembangunan Nasional tentang program perbaikan gizi masyarakat pada tahun 2010 diharapkan menurunnya KEK pada ibu hamil menjadi 8-9 % .

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Indonesia yang dinilai jika Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm sebesar 31,3 % ibu hamil dan data Riskesdas 2013 nasional meningkat 7,2 % menjadi 38,5 % ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Secara umum di Sulawesi Selatan Prevalensi KEK 12,5% namun di Kabupaten Gowa mencapai 19,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Timur Indonesia masih memerlukan perhatian yang lebih besar dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. (Depkes, 2011).

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) di Kabupaten Gowa pada tahun 2013 di 25 puskesmas jumlah ibu hamil yang memiliki ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 ditemukan 997 ibu hamil dan jumlah dari bulan Januari sampai bulan April 2014 jumlah ibu hamil yang memiliki ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm ditemukan sebanyak 89 orang ibu hamil. Dari jumlah tersebut yang tertinggi ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas

(LILA) <23,5 cm adalah puskesmas Tompobulu dengan 20 ibu hamil yang mengalami KEK dari 55 jumlah ibu hamil. Sedangkan yang tidak ada ibu hamil yang mengalami KEK adalah puskesmas Pabbentengan, Gentungan, Pattallassang, dan Lauwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Hubungan Pola Makan dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan pola makan dan status sosial ekonomi dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu kabupaten Gowa Tahun 2014 dan bagaimana pandangan islam tentang pengaturan pola makan pada wanita hamil ?

C. Hipotesa Penelitian

1. Hipotesis Null (Ho)

- a. Tidak ada hubungan pola makan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.

- b. Tidak ada hubungan status sosial ekonomi dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.

2. Hipotesis Alternatif

- a. Ada hubungan pola makan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.
- b. Ada hubungan status sosial ekonomi dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil merupakan suatu keadaan dimana status gizi seseorang buruk yang disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).

Kriteria objektif

- a. KEK : apabila hasil pengukuran LILA $< 23,5$ cm
- b. Tidak KEK : apabila hasil pengukuran LILA $\geq 23,5$ cm

2. Pola makan

Pola makan adalah kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi makanan dalam sehari-hari untuk memenuhi berbagai zat gizi lainnya. Dalam hal ini mencakup 2 aspek yaitu frekuensi makan dan jenis makanan yang dikonsumsi dengan menggunakan *Food Frequency Questionnaire (FFQ)*.

Kriteria objektif :

Kurang : Jika salah satu atau keduanya (jenis makanan dan frekuensi makan) dikategorikan kurang.

Baik : Jika jenis makanan dan frekuensi makan dikategorikan baik.

a. Frekuensi makan

Frekuensi makan adalah jumlah berapa kali jenis makanan yang dikonsumsi ibu hamil dalam sehari.

Kriteria objektif :

Kurang: Bila frekuensi makannya < 3 kali sehari

Baik : Bila frekuensi makannya ≥ 3 kali sehari

(Khomsan, 2004).

b. Jenis Makanan

Jenis makanan adalah keanekaragaman makanan yang dikonsumsi ibu hamil setiap hari yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein, sumber nabati, sayuran, buah, susu, dan minyak (lemak). Diukur dengan menggunakan *Food Frequency*.

Kriteria objektif :

Kurang : Bila hasil perhitungan skor food frekuensi nilai rata-rata seluruh sampel.

Baik : Bila hasil perhitungan skor food frekuensi nilai rata-rata seluruh sampel.

(Suhardjo, dkk., 1987).

3. Tingkat pendidikan ibu

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh ibu hamil di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014.

Kriteria Objektif :

Rendah : jika tidak tamat SLTP/Sederajat (SLTP ke bawah).

Tinggi : jika minimal tamat SLTP/Sederajat (SLTP ke atas).

4. Pendapatan

Pendapatan dalam penelitian ini adalah penghasilan (gaji) yang didapat dalam keluarga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014 dalam sebulan dari berbagai sumber pendapat keluarga yang sesuai dengan UMP (Upah Minimum Propinsi) Sulsel Tahun 2014 sebesar Rp 1,800,000. (sumber <http://kngb-portal.blogspot.com/2013/12/klik-di-sini-daftar-ump-2014-dari-28.html>).

Kriteria Objektif :

Kurang : jika pendapatan keluarga UMP (Rp 1,800,000,.)

Cukup : jika pendapatan keluarga > UMP (Rp 1,800,000,.)

5. Jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga di Kecamatan Tompoblu Kabupaten Gowa Tahun 2014 yang menjadi tanggungan suatu keluarga.

Kriteria Objektif :

Besar : jika jumlah anggota keluarga > 4 orang

Kecil : Jika jumlah anggota keluarga 4 orang

(sumber : BKKBN, 2014).

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Erma Syarifuddin Ausa, Nurhaedar Jafar, dan Rahayu Indriasari melakukan penelitian tentang pola makan dan status sosial ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Kabupaten Gowa tahun 2013. Penelitian ini bersifat survey analitik dengan desain cross sectional Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dengan jumlah sampel 54 responden ibu hamil. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji *chi-square*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ($p = 0,324$), pekerjaan ($p = 0,475$), pendapatan ($p = 0,741$), kepemilikan barang ($p = 0,539$) dengan kejadian KEK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan protein ($p = 0,208$), sumber lemak ($p = 0,186$) dengan kejadian KEK. Selain itu, hasil menunjukkan ada hubungan antara asupan energi ($p = 0,005$) dengan kejadian KEK pada ibu hamil. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu diadakan lintas sektor antara pemerintah dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap ibu hamil yang berisiko KEK.

2. Penelitian Andi Rahmaniar, Nurpudji A. Taslim, Burhanuddin Bahar melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Tampa Padang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cross sectional study*, dengan tingkat pengetahuan, pola makan, makanan pantangan, distribusi makanan dalam keluarga, serta status anemia ibu hamil sebagai variabel independen, dan kejadian KEK sebagai variabel dependen. Pengetahuan, pola makan, makanan pantangan dan status anemia merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Tampa Padang, Mamuju, dengan nilai p masing-masing adalah $0,005$, $0,015$, $0,023$, $0,011$. Dari keempat variabel tersebut, variabel yang paling besar kontribusinya adalah makanan pantangan ($\text{Exp (B)} = 3,989$).

Disarankan kepada pihak puskesmas, agar melakukan penyuluhan mengenai KEK, yang meliputi faktor-faktor penyebabnya. Perlu pula dilakukan penelitian lanjutan, untuk mengetahui variabel lain yang mungkin berpengaruh.

3. Penelitian Putri Oktaviana, Siti Patonah melakukan penelitian dengan judul Hubungan Status Ekonomi Dengan Kurang Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Ngambon Kabupaten Bojonegoro. Desain penelitian ini adalah analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan : 1) Kurang dari sebagian responden dengan status ekonomi rendah; 2) Kurang dari sebagian responden mengalami kurang energi kronik (KEK); 3) Ada hubungan antara status ekonomi dengan kurang energi kronik (KEK) pada responden.
4. Penelitian Nora Puspita Sari¹, Nuke Devi Indrawati, dan Novita Kumalasari. Melakukan penelitian dengan judul Gambarann Karakteristik Ibu Hamil Yang Menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di Kecamatan Wonosalam Demak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pengambilan data dilakukan secara survei wawancara. Metode sampling yang digunakan adalah non random sampling dengan sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang menderita kekurangan energi kronis mempunyai pengetahuan cukup tentang kekurangan energi kronis dengan tingkat pendidikan tamat SMA dan mempunyai status ekonomi yang tinggi. Tidak semua ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis (KEK)

mempunyai tingkat pendidikan rendah dan status ekonomi yang rendah juga, tetapi masih banyak ibu hamil yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan status ekonomi yang tinggi juga dapat menderita kekurangan energi kronis (KEK).

5. Penelitian Sirajuddin dan Kameria Gani. Melakukan penelitian dengan judul Analisis Hubungan Pengeluaran, Asupan Protein, dan Kejadian Kurang Energi Kronik Pada Wanita Dewasa Di Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah desain analitik survey dengan rancangan *case control study*. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan antara besarnya pengeluaran dengan kejadian KEK. Semakin besar pengeluaran semakin kecil risiko kejadian KEK.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian tersebut dimana “untuk mengetahui hubungan pola makan dan status sosial ekonomi dengan kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu kabupaten Gowa Tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu kabupaten Gowa Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi dengan kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu kabupaten Gowa Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang pengaturan pola makan pada wanita hamil.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi instansi

Sebagai bahan informasi bagi puskesmas Tompobulu dan instansi terkait lainnya dalam mengarahkan kebijaksanaan perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil.

- b. Bagi pengetahuan

Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya masalah kesehatan serta menjadi bahan bacaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- c. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman berharga dan wacana proses untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang kejadian KEK pada ibu hamil.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum pada Ibu Hamil

Kehamilan adalah suatu hal dalam kehidupan yang dapat membuat bahagia. Pada kehamilan terjadi perubahan fisik dan mental yang bersifat alami. Para calon ibu harus sehat dan mempunyai gizi cukup (berat badan normal). Sebelum hamil dan setelah hamil, harus mempunyai kebiasaan makan yang teratur dan bergizi, berolahraga teratur dan tidak merokok. Jika ibu tidak mendapat gizi yang cukup selama kehamilan, maka bayi yang dikandungnya akan menderita kekurangan gizi. Jadi meskipun sudah cukup bulan, bayi tersebut akan lahir dengan berat badan di bawah 2500 gram atau bayi berat lahir rendah (BBLR), ibu yang menderita kekurangan gizi juga akan kekurangan Air Susu Ibu (ASI) bila telah menyusui.

Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi protein sekitar 2 – 2,5 g/kg berat badan. Protein yang bermutu adalah protein hewani yang dapat diperoleh dari telur, susu dan ikan. Selain Air Susu Ibu (ASI) ikan laut juga mengandung asam lemak omega 3 (DHA), sehingga dianjurkan ibu hamil untuk mengkonsumsi ikan laut. Di antaranya jenis-jenis ikan laut, yang terbanyak mengandung DHA adalah ikan lemuru. Untuk pertumbuhan maupun aktivitas janin memerlukan makanan yang disalurkan melalui plasenta untuk itu ibu hamil harus mendapat gizi yang cukup untuk dirinya sendiri maupun janinnya.

1. Kebutuhan gizi pada wanita hamil

Adapun angka kecukupan gizi pada ibu hamil adalah angka kecukupan gizi pada wanita tidak hamil dengan sedikit tambahan.

Tabel 2.1 Kecukupan gizi yang dianjurkan / Angka Kecukupan Gizi (AKG) ibu hamil.

Zat Gizi	Kebutuhan Wanita Tidak Hamil	Kebutuhan Wanita Hamil
Energi	1900 kal (19-24th) 1800 kal (30-49th)	Trimester I + 180 kal Trimester II, III + 300 kal
Protein	50 g	+ 17 g
Vitamin A	500 mikrogram retinol ekivalen /RE	+ 300 mikrogram RE
Vitamin D	5 mikrogram /hr	-
Vitamin B1	0,5 mg/ 1000 kal	+ 0,4 mg
Niasin	14 mg	+ 4 mg
Vitamin B6	1,3 mg	+ 0,4 mg
Vitamin B12	2,4 mikrogram	+ 0,2 mikrogram
Asam Folat	400 mikrogram	200 mikrogram
Vitamin C	IOM 75 mg/hari	+ 10 mg
Yodium/Y	150 mikrogram	+ 50 mikrogram
Zat Besi/Fe	26 mg	Trimester II + 9,0mg

	9mg	Trimester III + 13,0 mg
Seng/Zn	30 mikrogram	Trimester I + 1,7 mg
	800 mg	Trimester II + 4,2 mg
		Trimester III + 9,8 mg
Selenium/Se		+ 5 mikrogram
Kalsium/Ca		+ 150 mg

Sumber : Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 2004

Sulistyoningsih (2011 : 110) bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil harus meliputi enam kelompok, yaitu makanan yang mengandung protein, baik hewani maupun nabati, susu dan olahannya sumber karbohidrat baik dari roti ataupun biji-bijian, buah dan sayur yang tinggi kandungan- vitamin C, sayuran berwarna hijau tua, serta buah dan sayur lain. Berikut kandungan zat gizi yang cukup bagi ibu hamil.

1. Energi

Umumnya seorang ibu hamil akan bertambah berat badannya sampai 12,5 kg, tergantung dari berat badan sebelum hamil. Rata-rata ibu hamil memerlukan tambahan 300 kkal/hari/ atau sekitar 15% lebih dari keadaan normal (tidak hamil) atau membutuhkan 2.800-3.000 kkal makanan sehari. Menurut angka kecukupan gizi tahun 2004, penambahan kebutuhan energi perhari bagi ibu hamil pada trimester I adalah 180 kkal, trimester II dan III masing-masing 300 kkal. Total kalori yang dibutuhkan untuk mendapatkan

kenaikan berat badan 12,5 kg kira-kira sekitar 80.000 kkal, dari jumlah tersebut sebanyak 36.000 kkal digunakan untuk pembakaran, dan 44.000 kkal sisanya untuk pembuatan jaringan baru.

2. Protein

Ibu hamil memerlukan konsumsi protein lebih banyak dari biasanya. Berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2004, selama hamil ibu memerlukan tambahan protein sebesar 17 gram perhari. Pemenuhan protein bersumber hewani lebih besar dari pada kebutuhan protein nabati, sehingga ikan, telur, daging, susu perlu lebih banyak dikonsumsi dibandingkan tahu, tempe dan kacang. Hal ini disebabkan karena struktur protein hewani lebih mudah dicerna dari pada protein nabati.

3. Vitamin

Vitamin A dibutuhkan oleh ibu hamil oleh ibu hamil namun tidak boleh berlebihan karena dapat menimbulkan cacat bawaan. Vitamin B12 bersama dengan asam folat berperan dalam sintesis DNA dan memudahkan pertumbuhan sel. Vitamin ini juga penting untuk keberfungsian sel sumsum tulang, sistem persarafan, dan saluran cerna. Kebutuhan B12 sebesar 3 g perhari, bahan makanan sumber vitamin B12 adalah hati, telur, ikan, kerang, daging, unggas, susu, dan keju. Kekurangan vitamin D pada ibu hamil akan mengakibatkan gangguan metabolisme kalsium pada ibu dan janin. Gangguan dapat berupa hipokalsemi, tetani pada bayi baru lahir, dan osteomalasia pada ibu. Sumber vitamin D yang utama adalah sinar matahari.

4. Asam Folat

Kebutuhan asam folat selama hamil menjadi dua kali lipat. Asam folat dibutuhkan untuk perkembangan sel-sel muda, pematangan sel darah merah, sintesis DNA dan metabolisme energi. Kekurangan asam folat juga berkaitan dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Kebutuhan asam folat untuk trimester I sebanyak 280 µg, trimester II 660 µg dan trimester III 470 µg. Jenis makanan yang mengandung asam folat yaitu ragi, brokoli, sayuran hijau, asparagus, dan kacang-kacangan.

5. Zat besi

Anemia karena kekurangan zat besi masih banyak terjadi di negara berkembang. Angka anemia defisiensi zat besi di Indonesia mencapai 40,1 % (Depkes 2001). Kebutuhan akan zat besi pada perempuan hamil meningkat hingga 200-300 %. Pemberian dilakukan selama trimester II dan III dan dianjurkan untuk menelan 30-60 mg tiap hari mulai minggu ke 12 kehamilan sampai selama 3 bulan.

6. Yodium

Yodium dapat diperoleh dari air minum dan sumber bahan makanan laut. Kekurangan yodium pada ibu hamil akan mengakibatkan janin mengalami hipotiroid yang berkembang menjadi kretinisme juga dapat menyebabkan bayi lahir mati. Asupan yang dianjurkan adalah 200 µg . Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi garam beryodium

dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi garam beryodium serta konsumsi bahan makanan yang bersumber dari laut.

7. Kalsium

Metabolisme kalsium selama hamil mengalami perubahan, meskipun mekanisme terjadinya belum sepenuhnya dipahami. Kadar kalsium dalam darah wanita hamil menurun drastis sampai 5% ketimbang wanita yang tidak hamil. Secara kumulatif, janin menimbun kalsium sebanyak 30 g, dengan kecepatan 7, 110, dan 350 mg masing-masing pada trimester I, II, dan III. (Irviani, 2012 : 110).

8. Serat

Kebutuhan serat bagi ibu hamil juga harus diperhatikan, karena selain memberikan rasa kenyang lebih lama, juga dibutuhkan untuk memperlancar sistem pencernaan sehingga dapat mencegah sembelit. Serat dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, serelia atau padi-padian, kacang-kacangan, gandum, beras dan olahannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil

a. Umur kehamilan

Lebih muda umur kehamilan seorang wanita yang hamil, lebih banyak energi yang diperlukan.

b. Berat Badan

Berat badan yang lebih ataupun kurang dari pada berat badan rata-rata umur tertentu merupakan faktor untuk menentukan jumlah zat makanan yang harus diberikan agar kehamilannya berjalan lancar. Di negara maju penambahan berat badan selama hamil sekitar 12 sampai 14 kg. Kalau kekurangan gizi, pertambahannya hanya 7-8 kg dengan akibat akan melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

c. Suhu lingkungan

Suhu tubuh dipertahankan pada suhu $36,5^{\circ}$ - 37° C untuk metabolisme yang optimal. Dengan adanya perbedaan suhu antara tubuh dan lingkungannya maka tubuh melepaskan sebagian panasnya yang harus diganti dengan hasil metabolisme tubuh. Maka lebih besar perbedaan suhu tubuh dan lingkungan berarti lebih besar pula masukan energi yang diperlukan.

d. Aktivitas

Setiap aktivitas memerlukan energi, makin banyak energi yang diperlukan oleh tubuh.

e. Status kesehatan

Pada kondisi sakit asupan energi tidak boleh dilupakan. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi tablet yang mengandung zat besi seperti hati, bayam dan sebagainya.

f. Pengetahuan zat gizi dalam makanan

Di dalam perencanaan dan penyusunan makanan kaum ibu atau wanita dewasa sangat berperan penting. Banyak faktor yang mempengaruhi antara lain kemampuan keluarga itu untuk membeli makanan atau pengetahuan tentang zat gizi.

g. Kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan

Pada umumnya kaum wanita lebih memberikan perhatian khusus pada kepala keluarga dan anak-anaknya, sehingga kebutuhannya sendiri terabaikan. Ibu hamil harus mengkonsumsi kalori paling sedikit 3000 kalori setiap hari. Ibu hamil harus memeriksa kehamilannya kepada petugas kesehatan paling sedikit empat kali selama masa kehamilannya.

h. Status ekonomi

Baik status ekonomi maupun sosial sangat mempengaruhi seorang wanita dalam memilih makanannya.

3. Dampak Kekurangan gizi pada ibu hamil

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), terhambatnya pertumbuhan otak janin, bayi lahir dengan kurang darah (anemia), bayi mudah kena infeksi, dan dapat mengakibatkan abortus.

a. Anemia gizi besi

Kekurangan zat besi banyak di Indonesia sehingga para ibu hamil kita juga dianjurkan agar mengkonsumsi tablet zat besi atau mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi (hati, ayam, dll).

b. Kenaikan berat badan selama hamil yang rendah di negara maju rata-rata kenaikan berat badan selama hamil sebesar 12-14 kg, bila ibu hamil kurang gizi, maka penambahan hanya 7-8 kg yang berakibat melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

c. Masalah ngidam

Bila berlebihan disebut hiperemesis (tidak normal) sehingga harus memperhatikan kebutuhan gizi. Keadaan ini berlangsung pada triwulan I ketika janin belum tumbuh besar sehingga kebutuhan gizi ekstra belumlah mendesak. Pada triwulan II dan III emesis jarang terjadi lagi tetapi kebutuhan gizi ekstra untuk pertumbuhan juga perlu.

B. Tinjauan Umum KEK Pada Wanita Hamil

1. Klasifikasi Status KEK Pada Wanita Hamil

Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun/kronis dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Ambang batas LLA WUS dengan resiko KEK di Indonesia adalah 23,5cm (Depkes RI : 2002).

Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan ibu hamil yang menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil (dr. Budiyantri Wiboworini, M.Kes). Klasifikasi status Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil mempunyai dampak kesehatan terhadap ibu dan anak dalam kandungan, antara lain meningkatkan bayi lahir rendah, keguguran. Kelahiran premature dan kematian pada ibu dan bayi baru lahir.

Kebutuhan nutrien meningkat selama hamil namun tidak semua kebutuhan nutrient meningkat secara proporsional. Contohnya, kebutuhan zat gizi tiga kali lipat selama hamil, sedangkan kebutuhan vitamin B12 meningkat hanya sekitar 10%.

Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, maka WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester I, 350 kkal sehari pada trimester II dan III. Di Kanada, penambahan untuk trimester I sebesar 100 kkal dan 300 kkal untuk trimester II dan III, sementara di Indonesia berdasarkan Widya Karya nasional dan Gizi VI tahun 1998 di tentukan angka 285 kkal perhari selama kehamilan (Arisman, 2003 dalam Syahrini 2009).

Muatan energi di dalam makanan bergantung pada kandungan protein, lemak, karbohidrat dan alkoholnya. Komponen organik lain seperti asam

organik menyumbang hanya sejumlah kecil energi di bandingkan sebagian besarnya makanan.

Jumlah makanan yang dikonsumsi harus cukup dan proporsional artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan berkurang.

2. Metode dan Cara Penilaian Status Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil

Salah satu cara untuk mengetahui status Kekurangan Energi Kronik (KEK) Wanita hamil Usia Subur (WUS) umur 15-49 tahun adalah dengan melakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Hasil pengukuran ini biasa digunakan sebagai salah satu dalam mengidentifikasi seberapa besar seorang wanita mempunyai risiko untuk melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Pengukuran ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dapat digunakan untuk mengetahui status gizi bayi, balita, dan bumil, anak sekolah serta dewasa. Indeks ini dapat digunakan tanpa mengetahui umur (Proverawati, 2011 : 147).

Lingkar lengan atas (LILA) atas sebagaimana dengan berat badan merupakan parameter yang labil, dapat berubah ubah dengan cepat. Oleh karena itu, lingkar lengan atas merupakan indeks status gizi sekarang ini. Salah satu ukuran untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada wanita usia subur adalah ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm.

Cara pengukuran Lingkar Lengan Atas dilakukan melalui urutan yang telah di tetapkan. Adapun cara pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) yaitu :

- a. Menentukan titik *mid point* pada lengan
 1. Subjek diminta untuk berdiri tegak.
 2. Mintalah subjek untuk membuka lengan pakaian yang menutup lengan kiri atas (bagi yang kidal gunakan lengan kanan).
 3. Tekukan subjek membentuk 90° , dengan telapak tangan menghadap ke atas. Pengukur berdiri dibelakang subjek dan menentukan titik tengah antara tulang atas pada bahu kiri dan siku.
 4. Tandailah titik tengah tersebut dengan pena.
- b. Mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
 1. Dengan tangan tergantung lepas dan siku lurus disamping badan, telapak tangan menghadap ke bawah.
 2. Ukurlah Lingkar Lengan Atas (LILA) pada posisi *mid point* dengan pita LILA menempel pada kulit. Perhatikan jangan sampai pita menekan kulit atau ada rongga antara kulit dan pita.
 3. Lingkar Lengan atas dicatat skala 0,1 cm terdekat.

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dilakukan dengan pita LILA dan ditandai dengan sentimeter. Apabila tidak tersedia pita LILA dapat

digunakan pita sentimeter/meter yang biasa dipakai penjahit pakaian (Supriasa, 2002).

3. Pencegahan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil Cara pencegahan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebagai berikut :
 - a. Makan cukup, dengan pedoman umum gizi seimbang
 - b. Hidup sehat
 - c. Tunda kehamilan
 - d. Diberi penyuluhan dan melaksanakan anjuran

Kekurangan energi kronik merupakan suatu keadaan dimana status gizi seseorang buruk yang disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro. Kebutuhan wanita hamil akan meningkat dari biasanya dimana pertukaran dari hampir semua bahan itu terjadi sangat aktif terutama pada trimester III. Oleh karena peningkatan jumlah konsumsi makan perlu di tambah terutama konsumsi pangan sumber energi yang mana zat gizi makro untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan janinnya. Kekurangan konsumsi kalori tersebut pada ibu hamil akan menyebabkan terjadinya malnutrisi atau biasa disebut Kekurangan Energi Kronik (KEK). Kontribusi dan terjadinya Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil akan mempengaruhi tumbuh kembang janin antara lain dapat meningkatkan

risiko terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) (Dini Latief 1997 dalam Syahrini 2009).

Kondisi ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK) risiko kesakitan yang lebih besar terutama pada trimester III kehamilan sehingga dapat mengakibatkan kelahiran Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK) akan mengalami persalinan yang sulit karena lemah dan mudah mengalami gangguan kesehatan (Depkes, 1995 dalam Syahrini 2009).

C. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

Pola makan adalah gambaran pola menu, frekuensi dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari dimana merupakan bagian dari gaya hidup atau ciri khusus suatu kelompok (Suhardjo, 2003 dalam Udi Asmal (2013)).

Pola makan adalah jumlah dan jenis susunan makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam suatu hidangan lengkap setiap hari dan sering dipersiapkan berulang. Pola makan yang diukur dengan metode *24 jam recall* selama 2 hari atau 3 hari berturut-turut, untuk menghitung konsumsi energi, protein, dan zat besi makro lainnya yang dikonsumsi hari yang lalu mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Selain itu, juga digunakan metode *food frequency* (frekuensi makan) untuk memperoleh informasi retrospektif tentang pola makan dalam jangka lama misalnya perhari, perminggu, atau perbulan.

Metode ini sering digunakan sebagai suatu prosedur yang memperkirakan seberapa sering makanan tersebut di konsumsi oleh individu.

Pola makan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah : kebiasaan kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, lingkungan alam, dan sebagainya. Sejak zaman dahulu kala, makanan selain untuk kekuatan pertumbuhan, memenuhi rasa lapar, dan selera, juga mendapat tempat sebagai lambang kemakmuran, kekuasaan, ketentraman, dan persahabatan. Semua faktor diatas bercampur membentuk suatu ramuan yang kompak yang dapat disebut pola konsumsi (Santoso, 1999).

Pemberian makanan ibu hamil sebaiknya beraneka ragam, menggunakan makanan yang telah ditentukan sejak mengandung dan dikembangkan lagi dengan bahan makanan sesuai makanan keluarga. Pembentukan pola makan perlu diterapkan sesuai pola makan keluarga.

1. Jenis makanan

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) digambarkan dalam logo berbentuk –kerucut. Dalam logo tersebut, bahan makanan dikelompokkan berdasarkan 3 fungsi utama zat gizi yaitu :

- a. Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian atau serealia seperti beras, jagung dan gandum ; sagu ; umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan

talas; serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, macaroni, dan bihun.

- b. Sumber protein, yaitu sumber hewani, seperti daging, ayam, telur, susu, keju serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom.
- c. Sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah. Sayuran diutamakan yang berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat; serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan yang diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti papaya, mangga, nenas, nangka masak, jambi biji, apel sirsak, dan jeruk (Almatsier, 2005 dalam Rezky Aprianti Agus 2009).

2. Frekuensi makan

Frekuensi makan adalah jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok tertentu. Dibeberapa daerah pedesaan di Asia Tenggara umumnya makan satu dua kali sehari. Kalau hanya satu kali makan setiap hari, maka konsumsi pangan terutama bagi anak-anak, mungkin sekali kurang dan dapat berakibat buruk pada status gizinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Status Sosial Ekonomi

Faktor yang berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang adalah tingkat sosial ekonomi, dalam hal ini adalah daya beli keluarga. Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan antara lain tergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga, harga makanan itu sendiri, serta tingkat pengelolaan sumber daya lahan dan pekarangan (Syafiq, 2007).

Tingkat ekonomi terlebih jika yang bersangkutan hidup di bawah garis kemiskinan (keluarga prasejahtera), berguna untuk pemastian apakah ibu berkemampuan membeli dan memilih makanan yang bernilai gizi tinggi. Tingkat sosial ekonomi meliputi pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga yang merupakan penyebab secara tidak langsung dari masalah gizi (Arisman, 2004).

1. Tingkat pendidikan

Seseorang yang hanya tamat SD (Sekolah Dasar) tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi dibandingkan orang lain yang berpendidikan lebih tinggi. Karena sekalipun berpendidikan rendah, apabila orang tersebut rajin mendengarkan siaran televisi dan selalu turut serta dalam penyuluhan tentang gizi, maka tidak menutupi kemungkinan pengetahuan gizinya akan lebih baik.

Hanya saja memang perlu dipertimbangkan bahwa faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Hal ini bisa dijadikan

landasan untuk memberikan metode penyuluhan gizi yang tepat. Dari kepentingan gizi keluarga, pendidikan itu sendiri amat diperlukan agar seseorang lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi didalam keluarga dan bisa mengambil tindakan secepatnya (Apriadi, 1986 dalam Rezky Amalia 2009).

2. Pendapatan

Tingkat pendapatan akan mempengaruhi pola kebiasaan makan yang selanjutnya berperan dalam prioritas penyediaan pangan berdasarkan nilai ekonomi dan nilai gizinya. Bagi mereka dengan pendapatan yang sangat rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa sumber karbohidrat yang merupakan pangan prioritas utama. Apabila tingkat pendapatan meningkat, maka pangan prioritas kedua berupa sumber protein yang murah dapat dipenuhi. Pada masyarakat yang lebih mampu lagi, setelah terpenuhi semua kebutuhan pangan dan gizinya, dapat menginjak pada pangan prioritas terakhir yaitu bahan pangan komplementer, yang merupakan bahan makanan yang mahal harganya, dapat berupa hasil hewani dan prosuknya (Handajani, 1993 dalam Rezky Amelia 2009).

3. Jumlah anggota keluarga

Pada zaman modern seperti sekarang ini, tuntutan kebutuhan keluarga semakin tinggi, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer tetapi kebutuhan

lainnya sangat dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut akan memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota rumah tangga berjumlah kecil (Arifin, 1980 dalam Rezky Amelia 2009).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya membenahi dan memperbaiki kesejahteraan keluarga yang patut dilihat dalam hubungannya dengan masalah gizi.

Apabila pendapatan keluarga hanya pas-pasan, sedangkan anak banyak maka pemerataan dan kecukupan makanan dalam keluarga kurang bisa dijamin. Keluarga ini dapat disebut keluarga rawan karena kebutuhan gizinya hampir tidak pernah tercukupi dan dengan demikian penyakit pun akan terus mengintai (Apriadji, 1986 dalam Rezky Amelia 2009).

E. Pandangan Islam Tentang Pola Makan KEK pada Ibu Hamil

Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial (Sulistyoningsih, 2011 : 52).

Dalam HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban (Sumber Ahmad Multazam <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/03/hadis-tentang-etika-makan-dan-minum.html>) menjelaskan bahwa :

مَا مَلَأَ أَدْمِيُّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لِقَيْمَةٍ يُقَمِّنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ
لَأَمَحًا لَهُ فَأَعْلًا فَثُلُثٌ لِبَطْنِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ (رواه الترمذی وابن حبان)

Terjemahan :

"Tidak ada sesuatu yang dipenuhi lebih buruk dari perut, walaupun terpaksa dipenuhi, maka biarlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa, Nabi memerintahkan kita untuk makan yang cukup dan tidak memenuhi perut kita dengan makanan. Tetapi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Pembatasan makanan tidak berarti anjuran untuk menahan lapar terus menerus yang membuat orang lapar gizi. Al-hadis mengajarkan untuk makan setelah lapar, dan berhenti sebelum kenyang. namun yang dimaksud lapar di sini bukanlah lapar dalam pengertian lapar gizi.

Dengan demikian, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telah terbukti dalam literatur kesehatan bahwa makanan yang berlebihan merupakan dasar dari berbagai penyakit. Kelebihan makanan dapat membuat obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain.

Untuk kesehatan ibu selama kehamilan maupun pertumbuhan dan aktivitas diferensiasi janin, maka ibu dalam keadaan hamil harus cukup mendapat makanan bagi dirinya sendiri maupun bagi janinnya. Makanan yang bisa dikonsumsi baik kualitas maupun kuantitasnya harus ditambah dengan zat-zat gizi dan energi agar ibu dan janin dalam keadaan sehat. Makanan yang dikonsumsi ibu hamil berguna juga dalam rangka memudahkan kelahirannya dan untuk produksi Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi yang akan dilahirkan.

Allah SWT berfirman dalam (Q.S A' Basa : 80/24-31) tentang beberapa sumber protein nabati yaitu :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

Terjemahan :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran . zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan”. (Shihab, Volume 15 2009 : 80).

Maksud dari ayat di atas Makanan yang dipilih sebaiknya berasal dari bahan yang bernilai biologi tinggi (misalnya daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya yang mengandung kalsium); dan sekali-kali jangan mengonsumsi “junk food” (Arisman, 2002 dalam Syahrini 2009).

Dalam firman Allah SWT juga menjelaskan tentang anjuran agar kita memperhatikan makanan kita juga anjuran untuk mengkonsumsi makanan msialnya biji-bijian, daging, susu eperti yang tersurat dalam (Q.S Al mu'minum/23:21) :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahan :

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian dari padanya kamu makan” (Q.S Al mu'minum/23:21).

Maksud dari ayat di atas adalah anugrah Allah kepada hambanya sangatlah banyak, kami menghanugerahkan binatang-binatang untuk kamu antara lain ternak melalui pengamatan dan pemamfaatan binatang-binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunianya. Kami memberi kamu minum dan sebagian, yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya, dan juga selain susunya, terdapat padanya yakni pada binatang-binatangternak itu secara khusus terdapat juga faedah yang banyak untuk kamu seperti daging, kulit, minyak dan bulunya. Sebagian itu dapat kamu mamfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebagian darinya atas berkat Allah, kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi (Shihab, Volume 8 2009 : 351).

Jumlah makanan yang dikonsumsi harus cukup dan proporsional artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan berkurang.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk mengonsumsi makanan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu kikir sehingga hanya mengonsumsi saja dari berbagai makanan yang disediakan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT Q.s.Al-A'raf/7:31.


وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ....

Terjemahan :

“...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahannya).


Dari ayat di atas Allah menganjurkan kita supaya janganlah melampaui batas-batas makan yang dihalalkan, agar makanan yang dikonsumsi tidak membawa kemudharatan bagi manusia (Almahira, 2006 dalam Syahrini 2009).

F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Gambar Kerangka pikir Hubungan Pola Makan dan Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil.

Keterangan :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat survey analitik dengan desain *cross sectional*, dimana variabel bebas dan terikat diobservasi sekaligus pada saat yang sama (Mahfoedz, 2009) yakni untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan status sosial ekonomi dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa karena Kecamatan Tompobulu memiliki jumlah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode uji hipotesis secara asosiatif dan korelatif.

Pada penelitian kuantitatif, hipotesis-hipotesis diuji untuk menjelaskan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Ciri khas pada penelitian kuantitatif adalah digunakannya statistik dan teknik sampling. Untuk

dapat menguji hipotesis-hipotesis dengan statistik, maka data harus dapat dikuantitatifkan, hal ini berkaitan dengan penentuan tingkat objektivitas data yang dikumpulkan itu sendiri nantinya (Faiq, 2013).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Machfoedz, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berada di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas Tompobulu yang berjumlah 55 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Prasetyo & Miftahul, 2008). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang ibu hamil dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan penelitian.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden yaitu

wanita hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik yang berada di Puskesmas Kec. Tompobulu Kab. Gowa dengan menggunakan kuesioner.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung atau data yang dikumpulkan oleh kantor/instansi dan sudah dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Puskesmas Tompobulu dimana penelitian ini akan dilaksanakan.

E. Instrument Penelitian

Instrument dalam penelitian adalah alat-alat untuk pengumpulan data (Notoadmojo,2010) alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pita LILA yang digunakan untuk mengukur Lingkar Lengan Atas pada ibu hamil, kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan baik dimana interviewer tinggal memberikan jawaban atau memberikan tanda-tanda tertentu (Notoadmojo, 2002) dan *Food Frequency* yang berisi sejumlah daftar bahan pangan (makanan pokok, lauk hewani dan nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Semua data mentah yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan program Statistical Package for Sosial Science (SPSS) versi 17 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Data yang telah terkumpul dilakukan pengecekan kembali mengenai kelengkapan dan kejelasan data, serta melakukan pembersihan data.

b. Rekapitulasi

Setelah proses editing selesai dilakukan rekapitulasi dan pengkodean data. Rekapitulasi dilakukan dengan membuat tabel yang memuat semua data yang akan dianalisis meliputi :

- 1) Identitas (karakteristik ibu hamil)
- 2) Data jenis bahan makanan ibu hamil
- 3) Data frekuensi makan ibu hamil
- 4) Data tingkat pendidikan ibu hamil
- 5) Data pendapatan ibu hamil
- 6) Data jumlah anggota keluarga ibu hamil

c. Tabulating

Proses tabulating dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Tabel silang meliputi analisis Variabel bebas (jenis bahan makanan ibu hamil, frekuensi makan ibu hamil, tingkat

pendidikan ibu hamil, jumlah pendapatan keluarga ibu hamil, jumlah anggota keluarga ibu hamil) dengan Kejadian Energi Kronik (KEK).

2. Analisis data

a. Univariat

Analisis univariat yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap masing-masing variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini berguna untuk menilai kualitas data dan menentukan rencana analisis selanjutnya.

b. Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terdiri dari (jenis bahan makanan ibu hamil, frekuensi makan ibu hamil, tingkat pendidikan ibu hamil, jumlah pendapatan keluarga ibu hamil, dan jumlah anggota keluarga ibu hamil dengan variabel dependen. Dalam hal ini Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil. Analisis menggunakan uji statistic Chi Square (X^2) dengan Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternative (H_a). Tingkat kemaknaan yang dipilih adalah $\alpha = 0,05$. Uji statistic yang akan digunakan adalah uji Chi Square, dengan rumus:

$$X^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

$$df = (k-1)(b-1)$$

Keterangan:

X^2 = Chi square yang dicari

O = Nilai yang diamati (Observasi)

E = nilai yang diharapkan (Ekspektasi)

df = derajat kebebasan (*degree of freedom*)

k = Jumlah kolom

b = Jumlah baris

Interpretasi:

- 1) Jika $P > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak jadi tidak terdapat hubungan yang bermakna.
- 2) Jika nilai $P < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi terdapat hubungan yang bermakna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

Pengambilan data dilaksanakan pada dua lokasi yaitu di Puskesmas Tompobulu Kab. Gowa dan di rumah responden selama kurang lebih dua minggu, yaitu tanggal 18-30 Agustus 2014 dengan jumlah sampel sebanyak 55 orang ibu hamil. Prioritas utama pengambilan data dilakukan di puskesmas, namun jika responden tidak dapat ditemui di puskesmas maka peneliti melakukan kunjungan ke rumah responden.

Pengambilan data yang dilaksanakan di puskesmas dilakukan setiap hari kecuali hari libur yaitu dari jam masuk kerja hingga pulang, mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00. Jika dilakukan kunjungan rumah, pengambilan data dilakukan setiap hari setelah jam pulang kerja dan hari minggu. Namun pengambilan data lebih banyak dilakukan saat kunjungan rumah karena kurangnya responden yang melakukan pemeriksaan ke puskesmas, sehingga pengambilan data lebih banyak dilakukan di rumah responden daripada di puskesmas.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian diisi oleh responden. Dalam penelitian ini responden penelitian adalah ibu hamil yang memeriksakan kesehatan di puskesmas Tompobulu Kabupaten dengan karakteristik yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

a. Karakteristik berdasarkan umur responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Umur Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Umur ibu (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 th	12	21,8
20-35 th	41	74,5
> 35 th	2	3,6
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.1 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 41 orang (74,5%), sedangkan < 20 tahun yaitu sebanyak 12 orang (21,8), dan > 35 tahun sebanyak 2 orang (3,6%).

b. Karakteristik berdasarkan pekerjaan responden

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pekerjaan ibu	Frekuensi	Persentase (%)
Guru	5	9,1
IRT	40	72,7
Wiraswasta	10	18,2
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.2 di atas diketahui sebagian besar sampel adalah responden yang mempunyai pekerjaan sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga) yaitu sebanyak 40 orang (72,2%), sedangkan wiraswasta sebanyak 10 orang (18,2%), dan guru sebanyak 5 orang (9,1%).

c. Karakteristik berdasarkan kehamilan responden

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Kehamilan Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Kehamilan ibu	Frekuensi	Persentase (%)
1	24	43,6
2	13	23,6
3	12	21,8
4	6	10,9
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.3 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada kehamilan pertama yaitu sebanyak 24 orang (43,6), kehamilan yang kedua sebanyak 13 orang (23,6%), sedangkan pada kehamilan ketiga sebanyak 12 orang (21,8%), dan kehamilan keempat sebanyak 6 orang (10,9%).

d. Karakteristik berdasarkan umur kehamilan responden

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Karakteristik Umur Kehamilan Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Umur Kehamilan ibu (minggu)	Frekuensi	Persentase (%)
TM II (13-27)	16	29,1
TM III (28-40)	39	70,9
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.4 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada Trimester III (28-40) minggu yaitu sebanyak 39 orang (70,9%), sedangkan trimester II (13-27) minggu yaitu sebanyak 16 orang (29,1%).

2. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari variabel yang diteliti. Pada analisis univariat ini ditampilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel (dependen dan independen). Hasil analisis univariat adalah sebagai berikut.

a. Kejadian KEK ibu hamil

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi KEK Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

LILA Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
< 23,5 (KEK)	22	40,0
23,5 (Tidak KEK)	33	60,0
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.5 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada ukuran Lingkar Lengan Atas 23,5 (tidak KEK) yaitu sebanyak 33 orang (60,0%). Dan dengan ukuran Lingkar Lengan Atas < 23,5 (KEK) yaitu sebanyak 22 orang (40,0%).

b. Pola makan ibu hamil

1) Frekuensi makan ibu hamil

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Makan Ibu Hamil Di
Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Frekuensi Makan Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	18	32,7
Baik	37	67,3
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.6 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada frekuensi makan yang kurang yaitu sebanyak 18 orang (32,7%). Dan frekuensi makan yang baik sebanyak 37 orang (67,3%).

2) Jenis makanan ibu hamil

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Jenis Makanan Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Jenis Makanan Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	24	43,6
Baik	31	56,4
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.7 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada jenis makan yang kurang yaitu sebanyak 24 orang (43,6%). Dan pada jenis makan yang baik sebanyak 31 orang (56,4%).

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 dapat diketahui gambaran jenis dan frekuensi makan sampel. Tabel 4.8 berikut menampilkan gambaran pola makan ibu hamil berdasarkan jenis dan frekuensi makan sampel.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Pola Makan Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pola Makan Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	30	54,5
Baik	25	45,5
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.8 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada pola makan yang kurang yaitu sebanyak 30 orang (54,5%). Dan pada pola makan yang baik sebanyak 25 orang (45,5%).

c. Tingkat pendidikan terakhir ibu hamil

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pendidikan Terakhir Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
SD	15	27,3
SMP	15	27,3
SMA	20	36,4
D3	1	1,8
S1	4	7,3
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.9 di atas diketahui ibu hamil di Puskesmas Tompobulu sebagian besar mengenyam pendidikan sampai tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 20 orang (36,4%) dari 55 responden.

Berdasarkan data pada tabel 4.9, tingkat pendidikan sampel kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori (tinggi dan rendah) yang ditampilkan pada tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Distribusi Kategori Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pendidikan Terakhir Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	15	27,3
Tinggi	40	72,7
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.10 di atas diketahui sebagian besar sampel berada pada tingkat pendidikan yang rendah yaitu sebanyak 15 orang (27,3%). Dan pada tingkat pendidikan yang tinggi yaitu sebanyak 40 orang (72,7%).

d. Pendapatan keluarga ibu hamil

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Pendapatan Keluarga Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pendapatan Keluarga Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	32	58,2
Cukup	23	41,8
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.11 di atas diketahui sebagian besar sampel memiliki jumlah pendapatan keluarga yang kurang yaitu sebanyak 32 orang (58,2%). Dan pendapatan keluarga yang cukup sebanyak 23 orang (41,8%).

e. Jumlah anggota keluarga

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Ibu Hamil
Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Jumlah Anggota Keluarga Ibu Hamil	Frekuensi	Persentase (%)
Besar	10	18,2
Kecil	45	81,8
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.12 di atas diketahui sebagian besar sampel memiliki jumlah anggota keluarga yang besar sebanyak 10 orang (18,2%). Dan jumlah anggota keluarga yang kecil yaitu 45 orang (81,8%).

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji statistik. Uji statistik yang digunakan yaitu uji *Chi-Square*. Adapun syarat uji *Chi-Square* antara lain: 1) Kedua variabel yang diuji bersifat kategorikal (skala nominal atau ordinal). 2) Tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol. 3) Sel yang mempunyai nilai mempunyai nilai expected (nilai harapan) kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika syarat uji *Chi-Square* tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya yaitu uji *Fisher* untuk tabel 2x2.

Melalui uji statistik yang digunakan akan diperoleh nilai P (*P value*) dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan 0,05 berdasarkan tingkat kepercayaan 95%. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai P \leq 0,05 dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai P $>$ 0,05.

Berikut hasil analisis bivariat antar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini.

a. Hubungan Antara Pola Makan dengan Kejadian KEK

Tabel 4.13
Analisis Hubungan antara Pola Makan dengan Kejadian KEK
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pola Makan	KEK				Total		P Value	RP
	LILA < 23,5 (KEK)		LILA ≥ 23,5 (Tidak KEK)					
	(n)	(%)	(n)	(%)	(N)	(%)		
Kurang	18	60,0	12	40,0	30	100	0,02	3,75
Baik	4	16,0	21	84,0	25	100		
Jumlah	22	40	33	60	55	100		

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.13 diatas uji analisis antara pola makan dengan KEK menggunakan analisis *Chi Square*, didapatkan nilai signifikansi $p = 0,02$ ($p < 0,05$). hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dengan nilai $RP = 3,75$ artinya responden yang memiliki pola makan kurang memiliki peluang 3,75 kali lebih besar mengalami KEK dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami KEK.

b. Hubungan Antara Pendidikan Terakhir dengan KEK

Tabel 4.14
Analisis Hubungan antara Pendidikan Terakhir dengan Kejadian KEK
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pendidikan Terakhir	KEK				Total		P Value	RP
	LILA < 23,5 (KEK)		LILA ≥ 23,5 (Tidak KEK)					
	(n)	(%)	(n)	(%)	(N)	(%)		
Rendah	11	73,3	4	26,7	15	100	0,04	1,41
Tinggi	11	27,5	29	24,0	40	100		
Jumlah	22	40	33	60	55	100		

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.14 diatas uji analisis antara pola makan dengan KEK menggunakan analisis Chi Square, didapatkan nilai signifikansi $p = 0,04$ ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terakhir dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dengan nilai $RP = 1,41$ artinya responden yang memiliki pendidikan terakhir yang rendah memiliki peluang 1,41 kali lebih besar menderita KEK dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami KEK.

c. Hubungan Antara Pendapatan Keluarga dengan KEK

Tabel 4.15
Analisis Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Kejadian KEK
pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa
Tahun 2014

Pendapatan Keluarga	KEK				Total		P Value	RP
	LILA < 23,5 (KEK)		LILA ≥ 23,5 (Tidak KEK)					
	(n)	(%)	(n)	(%)	(N)	(%)		
Kurang	19	59,4	13	40,6	32	100	0,01	4,30
Cukup	3	13,0	20	87,0	23	100		
Jumlah	22	40	33	60	55	100		

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.15 diatas uji analisis antara pendapatan keluarga dengan KEK menggunakan analisis *Chi Square*, didapatkan nilai signifikansi $p = 0,01$ ($p < 0,05$). hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dengan nilai $RP = 4,30$ artinya responden yang mempunyai pendapatan yang kurang memiliki peluang 4,30 lebih besar menderita KEK dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami KEK.

d. Hubungan Antara Jumlah Anggota Keluarga dengan KEK

Tabel 4.16
Analisis Hubungan antara Jumlah Anggota Keluarga dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2014

Jumlah Anggota Keluarga	KEK				Total		P Value	RP
	LILA < 23,5 (KEK)		LILA ≥ 23,5 (Tidak KEK)					
	(n)	(%)	(n)	(%)	(N)	(%)		
Besar	3	30,0	7	70,0	10	100	0,723	0,71
Kecil	19	42,2	26	57,8	45	100		
Jumlah	22	40	33	60	55	100		

Sumber: Data Primer, 2014

Dari tabel 4.14 diatas uji analisis antara jumlah anggota keluarga dengan KEK menggunakan analisis *Chi Square*, didapatkan nilai signifikansi $p = 0,723$ ($p > 0.05$). hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dengan nilai $RP = 0,71$ artinya responden yang mempunyai jumlah anggota keluarga yang kecil memiliki peluang 0,71 lebih besar tidak menderita KEK dibandingkan dengan responden yang mengalami KEK.

B. Pembahasan

1. Gambaran Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun/kronis dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu (Depkes RI : 2002). Untuk mengetahui ibu hamil mengalami KEK atau tidak, dilakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), dengan kategori KEK jika pengukuran LILA $<23,5$ cm dan tidak KEK jika pengukuran $\geq 23,5$ cm.

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi umur ibu hamil jauh lebih banyak pada usia 20-35 tahun 74,5%. Adapun pekerjaan responden menunjukkan bahwa yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) 72,7% lebih banyak dibanding wiraswasta dan guru. Sementara Kehamilan ibu hamil lebih banyak pada kehamilan yang pertama 43,6%. Dan jumlah ibu hamil trimester III 70,9% lebih banyak daripada jumlah ibu hamil trimester II 29,1%.

Hasil analisis Univariat menunjukkan bahwa terdapat 40,0% ibu hamil di Puskesmas Tompobulu yang memiliki ukuran Lingkar Lengan Atas $<23,5$ cm . Hal ini berarti masih ada ibu hamil yang mengalami KEK yang berpotensi lebih besar melahirkan bayi dengan BBLR.

2. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

Pada penelitian ini pola makan ibu hamil di Puskesmas Tompobulu dikategorikan menjadi dua, yaitu kurang jika salah satu atau keduanya (jenis makanan dan frekuensi makan) dikategorikan kurang, dan dikategorikan baik jika jenis makanan dan frekuensi makan dikategorikan baik. Berdasarkan hasil univariat, diketahui bahwa terdapat 54,5% yang memiliki pola makan yang kurang dan sisanya memiliki pola makan yang baik sebanyak 45,5%.

Data yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil dengan pola makan yang kurang, hal ini disebabkan karena ibu hamil kurang memperhatikan pemenuhan makanannya sendiri yang akan berdampak pada keadaan gizi ibu hamil.

Berdasarkan hasil bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square Test* diperoleh hasil yang menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu, dengan nilai $p = 0,02$ ($p < 0,05$). Dimana ditunjukkan pada tabel 4.13 bahwa kejadian KEK pada ibu hamil lebih banyak terjadi pada pola makannya kurang yaitu sebesar 60,0%, sedangkan terdapat 84,0% ibu hamil tidak mengalami KEK dengan pola makan baik.

Dalam penelitian ini terdapat 40,0% ibu hamil memiliki pola makan yang kurang namun tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK). Begitupun sebaliknya terdapat 16,0% ibu hamil dengan pola makan yang baik namun

mengalami KEK. Hal ini dapat terjadi karena pola makan bukan merupakan faktor tunggal terhadap kejadian KEK pada ibu hamil.

Dalam penelitian ini, ditemukan ibu hamil yang tidak mengalami KEK namun pola makannya kurang. Kondisi seperti ini perlu diperhatikan oleh ibu hamil karena akan berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya. Ibu yang pola makannya kurang dapat diindikasikan bahwa ibu tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya sehingga berpeluang memiliki status gizi kurang. Jika kebiasaan ini berlangsung lama maka ibu hamil akan berisiko mengalami KEK, meskipun pada saat penelitian keadaan ibu hamil dikategorikan tidak mengalami KEK.

Adanya ibu yang memiliki pola makan kurang dapat diindikasikan bahwa ibu memiliki kebiasaan makan yang sama seperti kondisi sebelum hamil, padahal kebutuhan makanan ibu hamil 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa lebih banyak ibu hamil yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat diindikasikan bahwa aktifitas fisik yang dilakukan sebagai seorang ibu rumah tangga cenderung lebih rendah daripada ibu yang bekerja di luar rumah dengan kapasitas pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak tenaga. Hal ini setidaknya mengurangi pembakaran energi dalam tubuh yang dapat mengurangi cadangan energi di dalam tubuh ibu hamil. Tingkat aktifitas fisik seseorang berkaitan dengan jenis pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat aktifitas yang berat setiap harinya dan tidak diimbangi dengan asupan makan yang adekuat maka tubuhnya lebih rentan terkena penyakit infeksi dan mengakibatkan kekurangan energi kronis (Shetty dan James, 1994; Shetty et al., 1994 *dalam* Bisau dan Bose,

2008; Rotimi, 1999; Marlenywati, 2010). Menurut FAO (1988), seseorang akan mengurangi sejumlah aktivitas untuk menyeimbangkan masukan energi yang lebih rendah. KEK mengacu pada lebih rendahnya masukan energi dibandingkan besarnya energi yang dibutuhkan yang berlangsung pada periode tertentu, bulan hingga tahun (Norgan, 1987 dalam Syahnimar 2004). Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini ditemukan adanya ibu hamil yang memiliki pola makan kurang namun dikategorikan tidak mengalami KEK.

Dalam penelitian ini, adanya ibu hamil yang pola makannya baik namun mengalami KEK dapat diindikasikan bahwa makanan yang dikonsumsi ibu tidak adekuat terhadap kebutuhan tubuh ibu hamil pada kondisi tertentu. Konsumsi makanan yang adekuat untuk ibu hamil adalah yang jika dikonsumsi tiap harinya dapat memenuhi kebutuhan zat-zat gizi dalam kualitas maupun kuantitasnya. Artinya bahwa, adanya ibu yang hamil yang pola konsumsi dikategorikan baik namun mengalami KEK karena pada penelitian ini diketahui bahwa seluruh responden/ibu hamil berada pada trimester 2 dan 3 yang berarti bahwa semakin meningkatnya kebutuhan kalori/energi ibu hamil pada semester-semester akhir. Berdasarkan WNP (2004), tambahan kalori ibu hamil pada trimester 1 adalah 180 Kkal/hari dan 300 Kkal/hari selama trimester 2 dan 3, sedangkan tambahan protein selama kehamilan sebesar 17 gram/hari. Kebutuhan akan energi pada trimester 1 meningkat secara minimal. Setelah itu, sepanjang trimester 2 dan 3, kebutuhan akan terus membesar sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester 2 diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu. Sepanjang trimester 3, energi tambahan dipergunakan untuk

pertumbuhan janin dan plasenta. Hal ini sejalan Menurut Depkes RI (1996) yang dikutip oleh Zulhaida (2008) dalam jurnal penelitian status gizi ibu hamil serta pengaruhnya terhadap bayi yang dilahirkan, bila ibu mengalami kekurangan gizi pada trimester III akan menimbulkan masalah terhadap ibu dan proses persalinannya, yaitu gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi antara lain: KEK, anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini meskipun pola konsumsi ibu hamil dikatakan baik namun belum cukup mampu mendukung kebutuhan nutrisi ibu hamil yang berada pada trimester-trimester akhir, sehingga masih ada ibu hamil yang memiliki pola konsumsi baik namun termasuk dalam kategori KEK.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahmaniari (2011) di Tampa Padang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dengan nilai $p = 0,015$. Dimana pola makan mempengaruhi kejadian KEK pada ibu hamil, pola makan sehari-hari dari ibu hamil dipengaruhi juga dengan adanya kepercayaan memantang terhadap makanan tertentu untuk di konsumsi dengan alasan apabila di konsumsi pada saat hamil akan mengakibatkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan sehingga asupan makanan pada ibu hamil menjadi kurang.

Menurut Al-Quran dan hadis, jiwa manusia sebagaimana tubuh membutuhkan makanan yang baik. Untuk itu, Allah SWT dalam Al-Quran menegaskan urgensi gizi yang bersih dan sehat bagi jiwa manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran QS Abasa/80: 24.



Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Departemen Agama RI, 2005)

Dalam ayat ini diuraikan anugerah Allah kepada manusia dalam hidup ini yang berupa pangan, sekaligus mengisyaratkan bahwa itu merupakan dorongan untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. Allah menjelaskan bahwa hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan (Shihab, 2002, 15: 85).

3. Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

a. Hubungan antara Pendidikan Terakhir dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

Pada penelitian ini, pendidikan terakhir ibu hamil di Puskesmas Tompobulu dikategorikan menjadi dua, yaitu rendah apabila ibu hamil tidak tamat SLTP (SLTP ke bawah), dan dikatakan tinggi apabila tamat SLTP (SLTP ke atas). Berdasarkan hasil univariat, diketahui bahwa terdapat 27,3% ibu hamil yang berpendidikan rendah dan sisanya 72,7% adalah ibu hamil dengan pendidikan yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square Test* diperoleh hasil yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas

Tompobulu, dengan nilai $p = 0,04$ ($p < 0,05$). Hal ini ditunjukkan oleh tabel 4.14 bahwa kecenderungan kejadian KEK pada ibu hamil, lebih banyak pada ibu yang tingkat pendidikannya rendah yaitu sebesar 73,3 %. Begitupun sebaliknya, terdapat 24,0 % ibu hamil tidak mengalami KEK yang pendidikan terakhirnya tinggi.

Tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin banyak informasi yang diperoleh (menurut Gani 1981 dalam Yuniar 2001). Sesuai dengan teori Djeni (2000) dalam Syukriawati (2011:111), mengatakan bahwa tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi dan kesehatan.

Status pendidikan ibu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas konsumsi makanan, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang dimiliki menjadi lebih baik. Karena masalah gizi seringkali timbul karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang gizi.

Diharapkan dengan pendidikan yang cukup juga akan mempengaruhi pengetahuannya termasuk dalam memilih makanan. Berdasarkan Teori Empirisme oleh John Locke dalam Wawan (2010) pengalaman-pengalaman yang diperoleh individu termasuk pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan akan menentukan perkembangan seseorang individu dan mampu untuk membentuk pribadi individu tersebut. Pendidikan formal mempengaruhi pengetahuan seseorang, dimana

diharapkan orang yang berpendidikan tinggi akan semakin luas juga pengetahuannya (Februhartanty, 2010).

Sesuai hasil *crosstabs* dalam penelitian ini didapatkan bahwa ibu hamil dengan pendidikan terakhir rendah (27,3%) lebih sedikit dibandingkan dengan ibu hamil yang pendidikan terakhirnya tinggi (72,7%). Pada dasarnya pendidikan ibu hamil tidak berhubungan langsung terhadap terjadinya Kekurangan Energi Kronik (KEK), namun yang mempengaruhi Kekurangan energi Kronik (KEK) dilihat dari pengetahuannya karena pengetahuan gizi sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibu hamil dalam menentukan dan memilih bahan makanan yang dikonsumsi.

Ditemukan pula 26,7% ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan terakhir rendah tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dan terdapat 24,0% ibu hamil dengan tingkat pendidikan terakhir tinggi. Walaupun ibu hamil berpendidikan terakhir rendah belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi, dimana informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai media misalnya media elektronik. Namun tingkat pendidikan terakhir ibu hamil dalam penelitian ini sangat berhubungan dimana telah disebutkan sebelumnya kebanyakan pendidikan terakhir ibu hamil yang tinggi tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) sedangkan tingkat pendidikan terakhir yang rendah didominasi oleh ibu hamil pada kategori KEK.

Ditemukan pula 27,5% ibu hamil dengan tingkat pendidikan yang tinggi namun mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), penyebabnya bisa karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor aktifitas dari responden tersebut

diharuskan untuk beraktivitas di luar rumah akibat beban kerja sehingga membuat merasa lebih stres, pola hidup dan pola makan yang tidak teratur sehingga responden mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Johanis, bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Kelurahan Kombos Kota Manado dengan $p\text{-value} = 0,007$, dimana seorang ibu dengan pendidikan rendah belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Efrinita Nur Agustan (2010) di Kecamatan Jebres Surakarta dengan nilai $p = 0,678$, hasil tersebut mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh tidak langsung terhadap KEK.

b. Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil.

Pada penelitian ini, tingkat pendapatan dikategorikan menjadi dua, yaitu kurang apabila pendapatan keluarga Rp 1.800.000/bulan dan cukup apabila pendapatan keluarga $>$ Rp 1.800.000/bulan. Hasil univariat menunjukkan bahwa terdapat 58,2% keluarga yang memiliki pendapatan kurang, dan sisanya sebanyak 41,8% keluarga memiliki pendapatan yang cukup.

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square Test* diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan

antara tingkat pendapatan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Tompobulu, dengan nilai $p = 0,01$ ($p < 0,05$).

Pendapatan merupakan hal utama yang berpengaruh terhadap kualitas menu. Pernyataan itu nampak logis, karena memang tidak mungkin orang makan makanan yang tidak sanggup dibelinya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli yang rendah pula, sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan, keadaan ini sangat berbahaya untuk kesehatan keluarga dan akhirnya dapat berakibat buruk terhadap keadaan gizi ibu hamil.

Responden dalam penelitian ini sebagian besar tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga pendapatan keluarga hanya berasal dari suami. Pendapatan keluarga per bulan hanya berasal dari suami rata-rata UMP SULSEL tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 1.800.000,00.

Pada penelitian ini berdasarkan tabel diatas, persentase tertinggi masih terdapat pada keluarga berpendapatan yang cukup yang tidak mengalami kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.15 bahwa keluarga yang berpendapatan yang kurang mengalami kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) lebih banyak yaitu 59,4%. Sedangkan terdapat 87,0% ibu hamil tidak mengalami KEK dengan pendapatan yang cukup.

Pendapatan keluarga mencerminkan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan kesehatan dan

pemenuhan zat gizi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi kehamilan ibu (Hasnah, 2011 : 51). Tingkatan pendapatan menentukan pola makanan apa yang dibeli, semakin tinggi pendapatan semakin bertambah pula pengeluaran untuk belanja. Hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dalam keluarga terutama pemenuhan kebutuhan akan makanan yang memiliki nilai gizi dengan jumlah yang cukup. Dengan demikian pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan.

Selain itu, dalam penelitian ini terdapat 40,6% keluarga yang berpendapatan kurang tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK). Begitupun sebaliknya terdapat 13,0% mengalami KEK dengan pendapatan keluarga yang cukup.

Dengan pendapatan yang rendah, biasanya mengkonsumsi makanan yang lebih murah dan menu yang kurang bervariasi, sebaliknya pendapatan yang tinggi umumnya mengkonsumsi makanan yang lebih tinggi harganya, tetapi penghasilan yang tinggi tidak menjamin tercapainya gizi yang baik. Pendapatan yang tinggi tidak selamanya meningkatkan konsumsi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kenaikan pendapatan akan menambah kesempatan untuk memilih bahan makanan dan meningkatkan konsumsi makanan yang disukai meskipun makanan tersebut tidak bergizi tinggi. Terdapat keluarga dengan pendapatan tinggi kurang baik dalam mengatur belanja keluarga, mereka membeli pangan dalam jumlah sedikit serta mutu yang kurang, sehingga dapat mempengaruhi keadaan ibu hamil.

dikarenakan Allah telah mengatur sebab seseorang memperoleh rezeki adalah lewat ia berusaha dan bekerja keras. Disamping itu, kerja juga merupakan pokok utama untuk membangun agama dan dunia sekaligus, dan merupakan wahana vital untuk melaksanakan berbagai amal ibadah lainnya. Pahala dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia berusaha dan sebagaimana keikhlasannya dalam berusaha.

c. Hubungan antara Jumlah Anggota Keluarga dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

Pada penelitian ini, jumlah anggota keluarga dikategorikan menjadi dua, yaitu kecil jika jumlah anggota keluarga 4 orang, dan besar jika jumlah anggota keluarga > 4 orang. Hasil univariat menunjukkan bahwa terdapat 81,8% responden yang merupakan keluarga kecil, 18,2% termasuk keluarga besar.

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square Test* diperoleh hasil yang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah anggota keluarga dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di puskesmas Tompobulu, dengan nilai $p = 0,723$ ($p > 0,05$).

Jumlah anggota keluarga akan menggambarkan beban keluarga. Pada status ekonomi rendah dengan jumlah anggota keluarga besar tentu berbeda dari jumlah anggota keluarga kecil dalam pemerataan makanan. Keluarga dengan jumlah anak besar dan jarak kelahiran yang dekat akan menimbulkan masalah. Pendapatan dalam keluarga yang pas-pasan dan mempunyai jumlah anggota keluarga besar maka

pemerataan dan kecukupan makanan dalam keluarga kurang sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi.

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa responden jumlah anggota keluarganya baik itu kecil maupun besar, masih mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) yaitu keluarga kecil 42,2% mengalami KEK, 57,8% tidak mengalami KEK dan keluarga besar sebanyak 30,0% mengalami KEK dan 70,0% tidak mengalami KEK.

Dalam penelitian ini terdapat 70,0% yang memiliki jumlah anggota keluarga besar tidak mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan sebaliknya terdapat 42,2% mengalami KEK yang memiliki jumlah anggota keluarga yang kecil.

Selanjutnya ditemukan 70,0% ibu hamil yang memiliki jumlah anggota keluarga besar namun tidak mengalami KEK. Hal ini bisa disebabkan karena keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang besar memiliki pendapatan yang cukup maka keluarga lebih leluasa dalam pemilihan makanan yang beragam sehingga memungkinkan gizi ibu hamil baik. Sesuai yang dikatakan Suhardjo dalam Amelia (2009) bahwa jumlah anggota keluarga yang besar jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, akan memperburuk gizi keluarga. Selain itu, penyebabnya yaitu meskipun jumlah anggota keluarga besar namun apabila ibu hamil memperhatikan pola makan dengan baik dan seimbang tidak akan mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Selanjutnya ditemukan 42,2% mengalami KEK yang memiliki jumlah anggota keluarga kecil mengalami KEK. hal ini bisa disebabkan karena keluarga

memiliki pendapatan yang kurang sehingga keluarga kurang leluasa dalam pemilihan makanan yang beragam dan bergizi.

Walaupun hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga tidak berhubungan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil, tetapi jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi makanan yaitu jumlah dan distribusi makanan dalam rumah tangga. Semakin kecil jumlah anggota keluarga, kemampuan untuk menyediakan makanan yang beragam juga semakin besar karena tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli beragam makanan jika dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga besar. Namun jika jumlah anggota keluarga besar tanpa diimbangi dengan distribusi makanan yang tidak merata akan menyebabkan ibu hamil tersebut mengalami KEK. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka akan semakin kecil distribusi ke masing-masing anggota.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan Pada saat pengumpulan data, beberapa responden cukup pasif saat dilakukan wawancara dan terkesan tidak terbuka kepada peneliti sehingga sulit untuk menggali informasi-informasi tambahan seputar sampel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan pola makan dan status sosial ekonomi dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2014.
2. Terdapat hubungan antara pendidikan terakhir dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2014.
3. Terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2014.
4. Tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Gowa tahun 2014.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Bagi petugas kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil supaya lebih memperhatikan kesehatan dan konsumsi makanan yang bergizi selama hamil serta diadakan lintas sektor antara pemerintah dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap ibu hamil yang berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK).

2. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil

Diharapkan bagi ibu hamil agar dapat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan gizinya, agar terhindar dari Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan aktif dalam mencari informasi dan banyak bertanya yang lebih paham tentang kesehatan khususnya terkait masalah KEK.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lain karena masih banyak faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rezky. 2009. Hubungan Status Sosial Ekonomi dan Asupan Zat Gizi Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah di SD Inpres Perumnas Antang II/I Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2009. *skripsi*. Uin alauddin makassar.
- Agustian, Efrinita Nur. 2010. Hubungan Antara Asupan Protein dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil di Kecamatan Jebres Surakarta. *KTI*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aprianti Agus, Rezki. 2009. Hubungan Asupan Pola Makanan Asupan Zat Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Keluarga Nelayan di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun 2009. *skripsi*. Uin alauddin makassar.
- Astri Tunjung Pratiwi. 2011. Hubungan Pengetahuan Dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil TM I di Puskesmas Pamotan Kecamatan Rembang tahun 2011. *KTI*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBM) 2014
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Bulan Januari – April Tahun 2014
Data Riset Kesehatan Daerah Sulawesi Selatan 2007 dan 2013
Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemahan.
- Hasnah.2011. *Mari Beraksi Sebelum Terjadi Reaksi dalam Menurunkan Tingkat Kesakitan dan Kematian Ibu di Indonesia*. Alauddin University Press.
- Irviani. 2012. *Gizi Dalam Daur Kehidupan Manusia*. Alauddin University Press.
- Johanis A.2011. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kurang Energi Kronik pada Ibu Hamil di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Nurginaya. 2013. Hubungan Pola Makan dan Asupan Gizi Dengan Status Gizi Anak Usia 24-59 bulan Keluarga Petani Tambak Kecamatan- Labbakang Kabupaten Pangkep Tahun 2013. *Skripsi*. Uin Alauddin Makassar.

- Notoatmodjo. 2002. *Metodologi Ilmu Kesehatan*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- ._____. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Machfoedz, Ircham. 2009. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, Kedokteran*. Yogyakarta : Penerbit Fitramaya.
- Mohammad Sadli & Tanti Banurea. 2011. *Hubungan Pengetahuan, Penghasilan Keluarga dan Budaya dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil*. Jurnal Kesehatan Volume 2, Nomor 1 Juni.
- Multazams, Ahmad. *Hadist Tentang Etika Makan dan Minum*. <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/03/hadis-tentang-etika-makan-dan-minum.html>. (diakses 11 Juli 2014).
- Oktaviana, Putri dan & Siti Patonah. 2010. *Hubungan Status Ekonomi Dengan Kurang Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil di Puskesmas Ngambon Kabupaten Bojonegoro*. Asuhan Kesehatan, Vol I Desember. <http://ejournal.rajekwesi.ac.id/files/journals/1/articles/19/public/19-27-1-PB.pdf> (diakses 23 mei 2014).
- Prasetyo, Bambang & LinaMiftahulJannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Proverawati, Atika dkk. 2011. *Ilmu Gizi Untuk Keperawatan Dan Gizi Kesehatan*. Nuha Medika : Yokyakarta.
- Puspita Sari, Nora. 2011. *Gambaran Karakteristik Ibu Hamil Yang Menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/562/612 (Diakses 23 Mei 2014).
- Rahmaniar, Andi dkk. 2013. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Tampa Padang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat*. Media Gizi Masyarakat Indonesia, Vol.2,No.2,Februari. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/mgmi/article/download/449/391> (diakses 23 Mei 2014).

- Simarmata, Marine. 2010. Hubungan Pola Konsumsi, Ketersediaan Pangan, Pengetahuan Gizi dan Status Kesehatan dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil di Kabupaten Simanlungun 2008. *Tesis*. Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Konsentrasi Administrasi Kesehatan Komunitas/Epidemiologi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Shihab, Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Volume 8 Pesan Kesan, dan Kesorasian Al-quran*. Jakarta : Lentera Hati.
- _____.2009. *Tafsir Al-Mishbah Volume 15 Pesan Kesan, dan Kesorasian Al-quran*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sulistyoningsih, Hariyani. 2011. *Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syahrini. 2009. Hubungan Asupan Zat Gizi dan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Energi Kronik Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi Tahun 2009. *skripsi*. Uin alauddin makassar.
- Syarifuddin Ausa, Erma dkk. 2013. *Hubungan Pola Makan Dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian KEK Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Gowa*. Tahun2013.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5508/jurnal.pdf?sequence=1> (Diakses 23 Mei 2013)
- Syukriawati, Ria. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Kurang pada Anak Usia 24-59 Bulan di Kelurahan Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan Tahun 2011”. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar : Alauddin Press.

RIWAYAT HIDUP



Fitria Ningsih, lahir di Malakaji 11 April 1992. Anak bungsu dari empat bersaudara ini lahir dari pasangan Abd. Kadir HB dan Alm Hj. Rukiati. Inchi, adalah sapaan akrabnya, riwayat pendidikan dimulai dari TK Pertiwi tahun 1997, SD Negeri Center Malakaji tahun 1998 , SMP Negeri 1 Tompobulu tahun 2004, hingga MAN Malakaji tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan studi kejenjang S1 dengan mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2014 dengan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).