

**PENAMBAHAN BUBUK DAUN CENGKEH (*Syzygium aromaticum*)  
TERHADAP KUALITAS DAGING BROILER**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan  
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

Oleh :

**NURJIHAN ISLAMI ANSAR**  
**60700116064**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


1. Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjihan Islami Ansar

NIM : 60700116064

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
  - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 24 Juni 2020  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Penyusun

Nurjihan Islami Ansar  
60700116064

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) Terhadap Performans Broiler" yang disusun oleh **NURJIHAN ISLAMI ANSAR, NIM: 60700116064**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gowa, Agustus 2020

### Dewan Penguji

Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.


Sekretaris : Dr. H. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.

Pembimbing I : Astaty, S.Pt., M.Si.

Pembimbing II : Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.

Munaqisy I : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.S.

Munaqisy II : Dr. Sonrah, M.Ag.

()

()

()

()

()

()

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



**Prof. Dr. Muh. Hafifah Mustami, M.Pd.**  
NIP: 1971041 2000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil dari Penelitian selama 30 Hari yang berjudul **Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Daging Ayam Broiler** dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ucapan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua saya **Ayahanda tercinta Ansar Suaib** dan **Ibunda tercinta Salma** yang senantiasa mendoakan, membimbing dan merawat saya sejak kecil hingga dapat menyelesaikan tugas skripsi seperti sekarang. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atas semua dukungan yang diberikan baik dukungan materil maupun non materil.

Terima kasih tak terhingga kepada **Ibu Astaty, S.Pt., M.Si.** sebagai pembimbing I dan **Ibu Irmawaty, S.Pt., M.P.** sebagai pembimbing II saya yang telah mendidik dan membimbing serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk, arahan dan ilmu mulai dari awal melakukan Penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Terimah kasih tak terhingga pula kepada **Ibu Rayidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.** selaku Penasehat Akademik saya yang telah mendidik dan memberikan nasehat dari awal masuk kuliah hingga sekarang ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis:

1. **Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag.** selaku wakil rektor 1 bidang Akademik Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum.** selaku Wakil rektor 2 bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** selaku wakil rektor 3 bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H Muh Halifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Ibu Sjamsiah, S.Si., M.S., Ph.D.** selaku wakil dekan 1 bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, **Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.** selaku wakil dekan 2 bidang Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi serta **Bapak Dr. Muh Anshar Abubakar, S.Pt., M.Si.** selaku wakil dekan 3 bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.

3. **Bapak Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan **Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
5. Terima kasih kepada seluruh **Civitas Akademik** yang telah membantu pengurusan berkas sampai selesai.
6. **Ibu Andi Afriana, S.E.** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari awal hingga sekarang ini.
7. **Kak Hasrin, Kak Imran, Kak Putra, Kak Fadil, Kak Ime, Kak Resky** yang telah membantu kelancaran kegiatan Penelitian di kandang dan juga **Almarhum Kak Andi** yang waktu itu masih hidup yang juga sama-sama membantu kami dipenelitian, Terima kasih banyak kak Semoga Tenang Di Alam Sana :').
8. **Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** yang telah memberi bantuan dan bimbingan dalam penelitian ini sampai selesai.
9. Sahabat saya **Sita, Lulu, Daya, Rara, Fitria, Warda, Idul, Mul, Arfah, Wahyu, Fitrah, Fikri, Palaguna, Hikmal dan Irwan** kami tergabung antara 2 geng yaitu **Elora dan Barista** maka digabungkan menjadi **ELORISTA**. Eyyyyyyyy!! Terima Kasih

telah memberi dorongan dan semangat dari awal penelitian sampai skripsi ini selesai.

10. My Namja Chingu **Sunar Lestari Saputra** yang juga telah memberi dorongan dan lebih semangat memberi semangat dari awal laporan hingga selesai

11. Tim Penelitian saya **Andi Wardatul Jannah, dan Nurul Ilmy Hidayah** yang berjuang bersama, sama-sama lelah, sama-sama memberi semangat.

12. Dan juga terima kasih untuk semua angkatan **2016 (16uana)** yang telah sama-sama berjuang, sama-sama bertahan sampai dititik ini, kita semua kuat, kita semua bisa!!! Salam Peternakan, Salam Cinta Dari Ujung Kandang!!

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan laporan ini mendapat imbalan dari Allah swt.

Wassalamu AlaikumWr. Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Penulis

Gowa, 24 Juni 2020

## DAFTAR ISI

|   | Hal      |
|---|----------|
| JUDUL .....                                 | i        |
| KEASLIAN SKRIPSI.....                       | ii       |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                    | iii      |
| KATA PENGANTAR .....                        | iv       |
| DAFTAR ISI .....                            | viii     |
| DAFTAR TABEL .....                          | x        |
| DAFTAR GAMBAR .....                         | xi       |
| ABSTRAK .....                               | xii      |
| ABSTRACT .....                              | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....                      | 3        |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 3        |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 3        |
| D. Kegunaan Penelitian .....                | 3        |
| E. Hipotesis.....                           | 3        |
| F. Definisi Oprasional .....                | 4        |
| G. Kajian Terdahulu .....                   | 4        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>        | <b>6</b> |
| A. Kajian Integrasi .....                   | 6        |
| 1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Ternak .....  | 6        |
| 2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Tumbuhan..... | 7        |
| B. Broiler .....                            | 10       |
| C. Kualitas Daging .....                    | 15       |
| D. Sifat Fisik Daging .....                 | 21       |
| a. Nilai pH.....                            | 21       |
| b. Keempukan.....                           | 22       |
| c. Daya Ikat Air (DIA).....                 | 23       |
| d. Penentuan Susut Masak .....              | 24       |
| E. Cengkeh .....                            | 25       |
| a. Taksonomi.....                           | 27       |



|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| b. Deskripsi Tumbuhan.....        | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....   | 29 |
| A. Waktu dan Tempat.....          | 29 |
| B. Alat dan Bahan .....           | 29 |
| C. Jenis Penelitian .....         | 32 |
| D. Metode Penelitian .....        | 32 |
| E. Parameter yang Diamati.....    | 47 |
| F. Analisis Data .....            | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... | 49 |
| A. Hasil Penelitian.....          | 49 |
| B. Pembahasan.....                | 49 |
| 1. Daya Ikat Air .....            | 49 |
| 2. Keempukan (DPD Masak) .....    | 51 |
| 3. Keempukan (DPD Mentah).....    | 53 |
| 4. Susut Masak .....              | 54 |
| 5. pH .....                       | 55 |
| BAB V PENUTUP .....               | 57 |
| A. Kesimpulan.....                | 57 |
| B. Saran .....                    | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA.....               | 58 |
| LAMPIRAN                          |    |

## DAFTAR TABEL

| No. | Teks                                      | Hal |
|-----|---|-----|
| 1   | Komposisi Ransum Penelitian .....         | 31  |
| 2   | Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian ..... | 31  |
| 3   | Kandungan Nutrisi Daun Cengkeh .....      | 31  |



## DAFTAR GAMBAR

| No. | Teks                      | Hal |
|-----|---------------------------|-----|
| 1   | DOC Broiler.....          | 12  |
| 2   | Ayam Broiler .....        | 14  |
| 3   | Daging Ayam Broiler ..... | 20  |
| 4   | Pohon Cengkeh.....        | 25  |
| 5   | Daun Cengkeh.....         | 26  |



## ABSTRAK

**Nama** : Nurjihan Islami Ansar  
**NIM** : 60700116064  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Daging Broiler

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh terhadap daya ikat air, keempukan, susut masak, dan pH daging broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. P0 (Ransum Basal + control), P1 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 2%), P2 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 4%), P3 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 6%), P4 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bubuk daun cengkeh pada level tertentu dapat berpengaruh nyata pada daya ikat air ( $P > 0,05$ ) dibandingkan dengan susut masak, keempukan dan pH pada daging broiler.

**Kata Kunci** : Broiler, Bubuk daun cengkeh, Susut Masak, Daya Ikat Air, pH dan Keempukan.



## ABSTRACT

**Nama** : Nurjihan Islami Ansar  
**NIM** : 60700116064  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Daging Broiler

---

This study aims to determine the effect of clove leaf powder on cooking losses, tenderness, pH and water holding capacity of broiler meat. This study used a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 5 treatments and 3 replications. P0 (Basal ration + control), P1 (Basal ration + 2% clove leaf powder), P2 (Basal ration + 4% clove leaf powder), P3 (Basal ration + 6% clove leaf powder), P4 (Basal ration + Powder 4%) clove leaves 8%). The results showed that the use of clove leaf powder at a certain level can significantly influence the water holding capacity ( $P > 0.05$ ) compared to cooking losses, tenderness and pH of broiler meat.

**Keyword:** Broiler, clove leaf powder, cooking loss, water binding capacity, pH and tenderness.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Broiler adalah ayam penghasil daging, daging memiliki kandungan gizi yang tinggi dimana salah satu kebutuhan protein hewani bagi manusia yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Gizi yang tinggi pada daging ayam broiler dihasilkan melalui makanan atau pakan. Fungsi makanan yang diberikan pada ayam pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, membentuk sel-sel dan jaringan tubuh. Ayam broiler sangat cepat dalam pertumbuhannya yang dimana diperoleh dari asupan makanan yang relatif.

Pakan adalah semua makanan yang dimakan ternak yang mengandung nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhannya yang dicerna oleh ternak dan tidak merusak pencernaan ternak. Pada pertumbuhan ayam, selain pakan yang menjadi makanan utama ayam ada juga tambahan pakan untuk menunjang pertumbuhan ayam dan mempengaruhi karakteristik dan kualitas daging.

Pengaruh pakan tambahan terhadap kualitas daging itu bervariasi dikarenakan ada faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan. Daging adalah produk pangan yang mudah rusak, kandungan dari gizi daging adalah media dari pertumbuhan mikroba. Kerusakan kualitas daging dapat terjadi akibat benturan fisik, perubahan kimia, dan aktivitas mikroba. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor suhu penyimpanan, waktu, tersedianya oksigen dan kadar air daging. Untuk

menyeimbangkan penggunaan ransum dan membuat pertumbuhan lebih efisien maka dapat ditambahkan bahan aditif yang bersifat alami dan aman seperti tumbuhan. Karena bahan aditif seperti antibiotik dapat menyebabkan residu yang berefek negatif bagi ternak maupun konsumen. Tanaman herbal seperti bubuk daun cengkeh yang sudah terbukti meningkatkan nafsu makan, dan salah satu penghasil minyak atsiri yang bisa menggantikan antibiotik.

Daun cengkeh merupakan salah satu tanaman yang banyak mengandung anti bakteri salah satunya minyak atsiri. Minyak cengkeh dapat diperoleh dari bunga cengkeh (Clove Oil), tangkai atau gagang bunga cengkeh (Clove Steam Oil) dan dari daun cengkeh (Clove Leaf Oil). Kandungan minyak atsiri di dalam bunga cengkeh mencapai 21,3% dengan kadar eugenol antara 78-95%, dari tangkai atau gagang bunga mencapai 6% dengan kadar eugenol antara 89-95%, dan dari daun cengkeh mencapai 2-3% dengan kadar eugenol antara 80-85%. (Hadi S. 2012).

Minyak atsiri dari cengkeh mempunyai sifat kimiawi dan efek farmakologis yang berfungsi sebagai anestetik, antimikrobial, antiseptik (Nurhidayati, 2013), antioksidan, dan imunomodulator (Dehgani *et al*, 2012). Senyawa *fenolik* daun cengkeh juga bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dan senyawa *flavonoid* yang bertindak sebagai penangkal radikal bebas (Dibazar *et al*, 2014). Kandungan senyawa ekstrak daun yang dapat memicu imunitas spesifik dan non spesifik serta dapat mengaktifkan komponen seluler dari sistem imun, misalnya fungsi *fagositosis* tanpa berpengaruh pada imunitas humoral maupun seluler (Tursinawati, 2015).

Senyawa flavonoid pada cengkeh dimanfaatkan untuk penangkal radikal bebas flavonoid pada cengkeh tersebar pada semua bagian tumbuhan baik pada akar, daun, kulit kayu, bunga, buah, ataupun bunga (Hanani, E 2016). Antioksidan dalam senyawa flavonoid dapat membantu untuk memperbaiki kualitas daging seperti warna, bau serta menurunkan kadar kolesterol (Tugiyanti, 2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap kualitas daging broiler.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap kualitas daging broiler.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai pemanfaatan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) yang diformulasikan dengan bahan-bahan lain di dalam ransum ayam broiler untuk memperbaiki performanya serta menghasilkan produk hewani yang aman dan sehat bagi konsumen.

## **E. Hipotesis**

Terdapat pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap kualitas daging ayam broiler.



## F. Definisi Oprasional

1. Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) merupakan daun cengkeh yang kering lalu kemudian dibuat tepung dengan alat *blender* hingga halus.
2. Kualitas daging merupakan karakteristik yang dinilai oleh konsumen dalam memenuhi palatabilitasnya, berkaitan dengan penilaian sensorik atau organoleptik. Berdasarkan parameter kimia dan fisik, di antaranya adalah pH, daya ikat air (DIA), susut masak, keempukan, warna, dan penyebaran lemak marbling.
3. pH daging adalah ukuran konsentrasi dari ion hydrogen. Ukuran pH sendiri terdiri dari angka 0-14, yang artinya jika pH menunjukkan angka 0-6 berarti asam, jika menunjukkan angka 7 berarti netral, dan jika menunjukkan angka 8-14 maka berarti basa. Daya ikat air adalah kemampuan daging untuk menahan airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan. Susut masak adalah perhitungan berat hilang selama pemasakan atau pemanasan daging. Keempukan adalah besarnya regangan atau tegangan setiap otot saat sarkas didinginkan. Tarikan disebabkan oleh berat karkas dan kontraksi otot yang meyebabkan daging lebih empuk.

## G. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal yang hampir sama apa yang saya teliti yaitu sebagai berikut :

1. Sapsuha dkk (2017), Hasil penelitian tentang “Pengaruh Pemberian Daun Pala (*Myristica Franrans Houtt*) Dan Daun Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*) terhadap Karakteristik Fisik Daging Kambing Kacang (*Capra Hircus*)”, Terdapat empat perlakuan persentase R0 = ransum basal (tanpa penambahan daun pala dan cengkeh), R1 = Ransum basal + daun pala 5%, R2 = Ransum basal + daun cengkeh 5%, R3 = Ransum basal + daun pala 5% + daun cengkeh 5%, Setiap perlakuan diulang empat kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan daun pala dan cengkeh dalam ransum 5% tidak berpengaruh terhadap kualitas fisik daging kambing kacang ditinjau dari pH, susut masak dan daya ikat air.
2. Kiramang, K dan Jufri, M (2013), Hasil penelitian tentang “Pengaruh Pemberian Serbuk Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*) pada Ransum terhadap Performan Ayam Ras Pedaging (Broiler)” Perlakuan yang diberikan adalah; P1 = ransum basal dengan penambahan serbuk cengkeh 0,5%, P2= ransum basal dengan penambahan serbuk cengkeh 0,75%, P3= ransum basal dengan penambahan serbuk cengkeh 1% dan P4 = ransum basal dengan penambahan serbuk cengkeh 1,25% dengan masing-masing 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan serbuk cengkeh dalam ransum tidak memberikan pengaruh terhadap Performans Broiler.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Integrasi

##### 1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Ternak

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia (Zuroidah, 2011). Dasar hukum mengenai hewan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia dijelaskan dalam QS Al-Nahl/16:79:

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain dari pada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut jalalayn dalam kitab tafsir jalalayn (Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan) terbang (di angkasa bebas) di udara antara langit dan bumi. (Tidak ada yang menahannya) sewaktu ia melipat sayap atau mengembangkannya sehingga ia tidak jatuh ke bawah (selain daripada Allah) yakni dengan kekuasaan-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman) yaitu penciptaan burung itu sehingga dapat terbang dan penciptaan udara sehingga dapat memungkinkan bagi burung untuk terbang mengarunginya dan menahan burung untuk tidak jatuh ke tanah (Tujuan fashilah: Tafsir jalalayn).

Binatang ternak dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai binatang yang mempunyai banyak manfaat. Begitu istimewanya binatang ternak sehingga beberapa nama hewan dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an, misalnya ternak sapi betina (Al-Baqarah), hewan ternak (Al-An'am), dan lebah (An-Nahl). Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak, misalnya ternak unggas. Allah telah menciptakan binatang ternak bukan tanpa maksud dan tujuan, hal ini semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia.

## 2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan memiliki banyak manfaat bagi makhluk di muka bumi. Fungsi dan manfaat tetumbuhan yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan dijelaskan di dalam QS Al-An'am/27:141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut jalalayn dalam kitab tafsir jalalayn menyatakan (Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebon) yang mendatar di

permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak tehampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasar; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikitpun buat orang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka (Tujuan fashilah: Tafsir jalalayn).

Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam penting, yang memiliki nilai khusus baik dari segi ekonomi maupun manfaatnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan tumbuhan untuk kepentingan manusia. Tetapi manusia tidak dibenarkan hanya menikmati apa yang diciptakan Allah swt. kepada mereka begitu saja, tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ciptaan-Nya dan mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan.

Maka dari itu binatang dan tumbuhan yang Allah swt. ciptakan itu adalah 2 makhluk Allah yang merupakan tanda-tanda kebesaran tuhan dan semua itu masih bisa diolah, dikembangkan untuk kebutuhan hidup manusia.

Dijelaskan dalam QS Al-Imran/3:191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”

Menurut jalalain dalam kitab tafsir jalalain menyatakan (Yakni orang-orang yang menjadi ‘na’at’ atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu Abbas mengerjakan shalat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan (dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi) untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah, kata mereka: (“Wahai Tuhan Kami! Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu (Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia (maka lindungilah kami dari siksa neraka).

Penjelasan pada dalil sebelumnya menjelaskan keterkaitannya terhadap penelitian yang saya lakukan bahwa orang yang mau berfikir maka tidak ada yang mustahil untuk dikembangkan dalam rangka untuk lebih meningkatkan baik kualitasnya maupun pengembangbiakannya, termasuk dalam hal pengembangan atau peningkatan kualitas dari daging broiler.

Sains dan teknologi yang ditemukan ilmuan muslim maupun ilmuan barat pada masa lalu dan masa sekarang maupun yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-quran, karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Alquran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu dan ini termasuk bagian dari kemukjizatan Al-quran, dimana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk di kaji, didiskusikan, diuji dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun.

## **B. Broiler**

Broiler merupakan ayam yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengubah pakan menjadi daging secara efektif, karena perbaikan genetik dan didukung oleh faktor lingkungan yang sesuai maupun kebutuhan nutrisi yang cukup. Penanganan ayam sebelum pemotongan dapat mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Faktor antemortem yang menyebabkan stres pada ayam salah satunya yaitu proses transportasi dari peternakan menuju rumah pemotongan ayam (Windriasari E. 2017).

Hirarki klasifikasi ayam menurut Rasyaf (2004), adalah sebagai berikut:

|            |               |
|------------|---------------|
| Kingdom    | : Animalia    |
| Subkingdom | : Metazoa     |
| Phylum     | : Chordata    |
| Subphylum  | : Vertebrata  |
| Devisi     | : Carinathae  |
| Kelas      | : Aves        |
| Ordo       | : Galliformes |

Family : Phasianidae  
Genus : *Gallus*  
Spesies : *Gallus gallus domestica*

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, jenis ayam ini merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam karena mampu tumbuh cepat sehingga broiler dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5-7 minggu). Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia (Pramudyati, 2009).

Menurut Yuwanta (2004), Perkembangan produksi broiler di Indonesia sempat mengalami pasang-surut. Perkembangan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode perintisan (1953-1960)

Pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi pasar lokal, di antara jenis ayam yang diimpor adalah White Leghorn (WL), Island Red (IR), New Hampshire (NHS) dan Australop. Impor ayam tersebut dilakukan oleh Gabungan Penggemar Unggas Indonesia (GAPUSI). Aksi yang dilakukan adalah melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan hanya sebagai kesenangan dan hobi, bukan untuk komersial.

b. Periode pengembangan (1961-1970)



Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 1967. Saat itu, Direktorat Jendral Peternakan dan Kehewan saat itu menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi perkapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 3,5 gram/kapita/hari.

c. Periode pertumbuhan (1971-1980)

Bimas broiler tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi saat itu. Sejalan dengan itu, permintaan penduduk terhadap broiler meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemilikan ayam di Indonesia ditingkat peternak menurun hingga lebih dari 50%. Pada tahun 1999 usaha broiler dan layer mulai mengalami kebangkitan.

Pramudyati (2009), menambahkan bahwa prospek agribisnis ternak ayam broiler saat ini cukup baik dimana permintaan pasar selalu meningkat, sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi hewani. Produksi ternak ayam broiler saat ini berkembang dengan pesat dan peluang pasar yang bisa diandalkan. Pada saat ini seandainya mau memulai usaha peternakan ayam ras pedaging maka kebutuhan sarana dan prasarananya sudah tersedia di toko-toko pakan ternak (*Poultry Shop*) atau dapat memanfaatkan sistem kemitraan yang ditawarkan oleh pihak swasta.



Gambar. 1. DOC Broiler

Untuk bibitnya (DOC), berbagai macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar di pasaran, sehingga peternak tidak perlu risau dalam menentukan pilihannya. Sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki daya produktifitas relatif sama. Artinya seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak menyolok atau sangat kecil sekali. Dalam menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara, peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi bibit yang dijual di Poultry Shop. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah: Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman 202, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor acres, Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-Broiler, Ross, Marshall”m”, Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 707 (Pramudyati, 2009). Ayam ras pedaging disebut juga Broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.

Ayam pedaging adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang telah didomestikasikan dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging yang umumnya dipanen pada umur 4-5 minggu (Yuwanta, 2004).



Gambar 2. Broiler

Menurut Yashoda *et al* (2001), Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan dalam jumlah perbandingan yang seimbang. Selain itu, daging unggas lebih diminati oleh konsumen karena mudah dicerna, dapat diterima oleh mayoritas orang dan ditambahkan oleh Cohen *et al* (2007) yang menyatakan bahwa memiliki harga yang relatif murah. BPS (2014), melaporkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap daging ayam khususnya broiler terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data statistik dari tahun 2012-2014 rata-rata konsumsi daging broiler di Indonesia perkapita perminggu sebesar 0.078 Kg. Namun

peningkatan permintaan belum seiring dengan peningkatan kualitas terutama dari segi keamanan pangan dan kesehatan.

Usaha penyediaan daging ayam khususnya daging ayam segar perlu mendapat perlakuan khusus karena daging ayam segar merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak oleh mikroorganisme. Kondisi penjualan yang kurang higienis terutama pada pasar tradisional dapat menyebabkan daging ayam terkontaminasi oleh mikroorganisme baik yang bersifat patogen maupun *non patogen*. Mikroorganisme ini dapat merusak atau menyebabkan *deteriorasi* karkas atau daging sehingga secara langsung dapat mempengaruhi kualitas fisik dan kimia daging. Menurut BSN (2009) batas cemaran mikroba pada karkas dan daging ayam maksimum  $1 \times 10^6$  cfu/g dan *E. coli* harus negatif.

### **C. Kualitas Daging**

Menurut Abustam (2012) menyatakan bahwa karakteristik kualitas daging merupakan karakteristik yang dinilai oleh konsumen dalam memenuhi palatabilitasnya, berkaitan dengan penilaian sensorik atau organoleptik. Kualitas daging atau bahan pangan pada umumnya, dinilai oleh konsumen pada awalnya melalui pendekatan organ-organ panca indera. Sehingga karakteristik kualitas pada daging menyangkut warna, keempukan, cita rasa (*flavour*), dan kebasahan (*juiciness*). Secara organoleptik (sensorik), warna dinilai oleh organ penglihatan, keempukan dinilai melalui perabaan dan pencicipan (gigi, tangan, dan lidah), cita rasa dinilai melalui pencicipan dan penciuman (lidah dan hidung), dan kebasahan dinilai oleh pencicipan (lidah). Karakteristik kualitas ini sering pula disebut sebagai *eating quality* (kualitas makan). Penilaian karakteristik kualitas ini yang

pada awalnya dinilai oleh konsumen secara organoleptik berkembang menjadi penilaian dengan menggunakan peralatan untuk menghindari subyektifitas. Namun demikian para pakar dibidang organoleptik menyatakan bahwa justru penilaian dengan menggunakan alatlah yang lebih subyektif karena alat merupakan imitasi dari organ-organ panca indera yang digunakan lebih awal dalam penilian tersebut. Alat yang dipergunakan untuk menilai keempukan daging geligi (geraham) dalam melakukan gigitan pertama dan selama pengunyahan pada daging. Pendekatan statistik melalui penggunaan sejumlah panelis terlatih dan pengulangan berulang kali dalam penilaian kualitas secara sensorik/organoleptik dimaksudkan adalah untuk lebih mengobjektifkan hasil penilaian tersebut.

a. Faktor-faktor Sensori Pada Palatabilitas Daging

Sifat sensoris adalah suatu sifat produk yang dapat ditentukan dengan uji sensorismenggunakan panelis. Karakteristik daging yang ikut andil pada palatabilitas adalah karakteristik yang dapat disetujui dengan mata, hidung dan lidah (palat). Nilai daging didasarkan atas tingkat akseptabilitas (daya terima) konsumen. Kepuasan yang berasal dari konsumen daging tergantung pada respons fisiologis dan sensoris diantara individu. Faktor penampakan, harga pembelian, aroma selama pemasakan, susut masak (cooking loss), metode penyiapan, porsi yang dapat dimakan, keempukan,juiciness(kegurihan), flavourdan nilai nutrisiakan menentukan reaksi-reaksi komposit individu. Persepsi palatabilitas sangat bervariasi diantara individu (Soeparno, 2015).

### 1) Warna Daging

Unsur kualitas sensoris yang penting untuk daging proses adalah tampilan warna daging. Meskipun bau, rasa serta teksturnya menarik, namun jikatampilanwarna tidak menarik maka selera terhadap makanan tersebut menjadi berkurang. Warna daging ayam adalah putih, karena konsentrasi mioglobin pada otot sekitar 0,025% (Soeparno, 2015). Kesegaran daging dapat diamati dari parameter ini. Daging ayam sangat unik, karena memiliki perbedaan warna yang mencolok. Warna normal breastmeat dalam kondisi mentah adalah pink pucat, sedangkan paha dan lengan memiliki warna merah gelap. Warna daging ayam dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain umur, jenis kelamin, strain, pakan, lemak intramuskular, kandungan air, kondisi sebelum disembelih, hingga pengolahan. Warna daging sangat tergantung kepada keberadaan pigmen myoglobin dan hemoglobin. Perubahan warna terjadi karena jumlah pigmen tersebut berkurang atau mengalami perubahan bentuk kimia (Noer, 2009). Ditambahkan oleh Young and West (2001) mengemukakan bahwa daging merah cenderung berubah menjadi coklat dengan bertambahnya waktu ketika terpapar udara. Daging juga cenderung membusuk dengan bertambahnya waktu karena aktivitas mikrobiologis, Jadi pencoklatan Pada daging dengan bertambahnya waktu adalah indikator kasar terhadap pembusukan. Namun demikian, penting dalam merealisasikan kedua kejadian pencoklatan dan pembusukan, adalah independen dengan kontrol higienis, daging yang terpapar udara berubah menjadi coklat yang lama sebelum pembusukan berkembang.

Beberapa otot pada karkas berubah warnanya lebih cepat dari pada yang lain. Ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan mereduksi *metmyoglobin* *myoglobin reducing ability* (MRA) dari sejumlah otot. Beberapa otot mempunyai produksi yang berlebih, di mana besi pada *heme* dari molekul *myoglobin* dalam status tereduksi untuk suatu periode yang lama, menghasilkan *metmyoglobin* dalam bentuk *myoglobin* tereduksi atau *oxymyoglobin*. Hal ini yang menjelaskan mengapa beberapa potongan daging akan tahan 4 sampai 5 hari pada lemari pendingin, sementara yang lain akan berubah warna hanya sesudah 1 sampai 2 hari. Kemampuan mereduksi *metmyoglobin* didasarkan atas jumlah *glukosa* dan enzim pereduksi didalam otot. *Myoglobin reducing ability* (MRA) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor *antemortem* seperti status nutrisi dan perlakuan-perlakuan kasar yang diterima oleh ternak sebelum disembelih.

## 2) Keempukan Daging

Keempukan adalah salah satu sifat mutu yang penting pada daging. Faktor utama yang menentukan tingkat keempukan adalah tekstur yang dipengaruhi oleh jumlah ikatan silang protein (Erwanto *et al.*, 2007). Kesan keempukan secara keseluruhan meliputi tekstur dan melibatkan tiga aspek. Pertama, kemudahan awal penetrasi gigi kedalam daging, kedua, mudahnya daging dikunyah menjadi fragmen atau potongan-potongan yang lebih kecil dan ketiga, jumlah residu yang tertinggal setelah pengunyahan (Soeparno, 2015). Menurut Razali *et al.* (2005) keempukan bagian dada dari ayam hidup sehat yang sudah disembelih mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding pada bagian paha.

### 3. Flavour (Cita Rasa)

Cita rasa daging, merupakan fenomena yang dikompleks berkaitan dengan senyawa-senyawa yang larut dan *volatil*. Melibatkan organ pencicipan dan penciuman dalam penilaiannya.

Cita rasa bervariasi berdasarkan atas potongan daging dan tingkat infiltrasi lemak (*marbling*), tingkat perubahan yang terjadi selama maturasi, beberapa karakter *zootehnik* dan cara penyajian masakan (Abustam, 2012).

### 4. Kebasahan (*Juiciness*)

Abustam (2012) menyatakan bahwa kebasahan merupakan kemampuan daging untuk melepaskan jus (cairan daging) selama pengunyahan, sebaliknya kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan air disebut sebagai *water holding capacity* (WHC).

Kebasahan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian kualitas daging, bersama dengan keempukan dapat menjelaskan sampai >80% pilihan konsumen di negara maju terhadap kualitas daging. Daging yang empuk pada umumnya pada saat gigitan pertama akan menghasilkan jus yang cukup berarti. Terdapat korelasi yang baik antara pelepasan jus daging dengan keempukan. Kebasahan bervariasi berdasarkan pH, maturasi dan faktor stress.

Penyediaan daging atau produksi daging merupakan kegiatan agribisnis peternakan, diawali dari pengadaan sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak melalui pemberian pakan dan pemeliharaan yang efisien dan ekonomis. Kegiatan ini berakhir pada penyembelihan ternak dan penanganan pascapanen yang tepat untuk menghasilkan daging dalam jumlah dan kualitas yang tinggi.



Penanganan pascapanen daging diikuti dengan pemasaran produk di sektor hilir dari sub sistem agribisnis peternakan, biasanya disebut sebagai agroindustri. Merupakan suatu kegiatan penerapan industri pada hasil ternak, khususnya daging dalam rangka peningkatan mutu produk daging segar maupun olahannya yang pada akhirnya akan memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Harga jual yang lebih tinggi tiada lain adalah konsekuensi dari penambahan biaya produksi yang timbul akibat penerapan teknologi dalam proses memproduksi produk tersebut. Dengan demikian kegiatan ini pada umumnya dilakukan ditingkat pascamerta ternak diawali pada tingkat rumah pemotongan hewan (RPH) sampai pada tingkat industri baik skala rumah tangga maupun pada skala komersial. Penanganan pascapanen dan penerapan teknologi pengawetan dan pengolahan daging merupakan kegiatan agroindustri yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha dibandingkan dari suatu sistem agribisnis peternakan.

Daging sebagai salah satu bahan pangan asal hewan, kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh penanganan ternak semasa hidupnya (sebelum panen) tetapi juga tak kalah pentingnya adalah penanganannya setelah panen (pascapanen). Pemberian pakan berkualitas tinggi pada fase pertumbuhan dan pada fase penggemukan semasa hidupnya, tidak akan memberikan kualitas daging yang optimal setelah ternak disembelih jika tidak diikuti dengan penanganan pascapanen yang tepat.



Gambar 3. Daging Broiler

Prosedur pemotongan yang sesuai diikuti dengan pengkarkasan yang tepat dan dilanjutkan dengan “*aging*” (maturasi) yang layak dengan waktu yang optimal merupakan salah satu rangkaian yang seharusnya tak terpisahkan dalam penanganan pascapanen. Pascapanen yang tepat sesuai dengan yang seharusnya pada pengadaan daging segar dan produk olahannya akan meningkatkan mutu produk tersebut sekaligus nilai jual yang lebih tinggi.

#### **D. Sifat Fisik Daging**

##### **a. Nilai pH**

Menurut Saleh (2012) nilai pH digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman dan kebasaan suatu substansi. Jaringan otot hewan pada saat hidup mempunyai nilai pH sekitar 5,1-7,2 dan menurun setelah pemotongan, karena mengalami glikolisis dan menghasilkan asam laktat yang akan mempengaruhi pH. Henckel et al., (2000) menyatakan bahwa penurunan nilai pH setelah hewan mati ditentukan oleh kondisi fisiologis otot yang berhubungan dengan produksi asam laktat atau kapasitas produksi energi otot dalam bentuk ATP. Suparno (2009) juga

menyatakan bahwa pH daging akan mengalami penurunan sesuai dengan waktu penyimpanan, semakin lama penyimpanan akan semakin rendah pH daging sampai tercapai pH akhir pada kisaran 5,4 sampai 5,8.

Perubahan pH daging setelah pemotongan ternak dipengaruhi oleh ketersediaan asam laktat di dalam otot, ketersediaan asam laktat ini dipengaruhi oleh kandungan glikogen, dan kandungan glikogen dipengaruhi oleh penanganan ternak sebelum dipotong. Kandungan glikogen otot sangat rendah, yaitu pada kisaran 0,5 sampai 1,3 % dari berat daging segar (Soeparno, 2009), sehingga penurunan pH daging terjadi secara bertahap dan membutuhkan jangka waktu yang lama.

Menurut Lukman (2010) penurunan pH daging terdiri dari 3 pola yaitu: (1). Penurunan pH secara normal (penurunan pH yang lambat), yaitu dari nilai pH sekitar 7,0-7,2 akan mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 sampai 5,6-5,7 dalam waktu 6-8 jam postmortem dan akan mencapai nilai pH akhir sekitar 5,5-5,6. Nilai pH akhir (ultimate pH value) adalah nilai pH terendah yang dicapai pada otot setelah pemotongan (kematian); (2). Sedangkan pola nilai pH PSE atau Pale Soft and Exudative (penurunan pH yang cepat), nilai pH menurun relatif cepat sampai sekitar 5,4-5,5 pada jam-jam pertama setelah pemotongan dan mencapai nilai pH akhir 5,3-5,6; (3). Pola nilai pH DFD atau Dark Firm and Dry (penurunan pH yang lambat dan tidak lengkap), nilai pH menurun sedikit sekali pada jam-jam pertama setelah pemotongan dan tetap relatif tinggi; mencapai pH akhir sekitar 6,5-6,8 atau nilai pH akhir dicapai diatas 6,2.

b. Keempukan

Keempukan dan tekstur daging merupakan parameter yang penting dalam kualitas daging. Faktor yang mempengaruhi tingkat keempukan daging dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor antemortem dan faktor postmortem. Ditambahkan pula, bahwa keempukan daging ditentukan oleh besarnya tekanan yang dibutuhkan untuk tiap satuan luas ( $\text{kg/cm}^2$ ) produk, yang dapat diartikan semakin kecil angka keempukan yang diperoleh maka semakin empuk daging tersebut (Soeparno, 2005).

Komponen utama daging yang andil terhadap keempukan atau kealotan, yaitu jaringan ikat, serabut-serabut otot, dan jaringan adipose. Jaringan ikat lebih sedikit adalah lebih empuk daripada otot yang mengandung jaringan ikat dalam jumlah yang lebih besar dan semakin tinggi lemak marbling akan membuat daging semakin empuk (Soeparno, 2005).

Daging yang empuk adalah hal yang paling dicari konsumen (Komariah dkk, 2004). Semakin menurun nilai daya putus daging maka semakin empuk daging tersebut. Nilai pH daging mempunyai hubungan negatif dengan daya putus daging. Jumlah nutrient yang tersedia berbeda diantara pakan serat kasar dalam saluran pencernaan unggas dapat menjerat lemak, sehingga zat makanan yang terserap oleh tubuh unggas menurun. Penambahan asam lemak omega-3 pada pakan ayam akan diserap dan didepositkan ke jaringan tubuhnya tanpa ada perubahan (Hoffman et al., 2002).

c. Daya Ikat Air (DIA)

Menurut Saleh (2012) daya mengikat air atau dikenal dengan water holding capacity (WHC) merupakan kemampuan daging untuk mengikat air atau

air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar (pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan). Purbowati (2006) menyatakan daya ikat air atau Water Holding Capacity (WHC) atau Water Bonding Capacity (WBC) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan.

Daya mengikat air daging sangat dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir maka penurunan daya ikat air juga sedikit. Penurunan daya ikat air disebabkan oleh makin banyaknya asam laktat yang terakumulasi akibatnya banyak protein miofibriler yang rusak, sehingga diikuti dengan kehilangan kemampuan protein untuk mengikat air (Lawrie, 2003). Abustam (2009) juga menyatakan bahwa daya mengikat air juga dipengaruhi oleh pH, pada pH yang lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, sejumlah muatan positif dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan penolakan dari mikrofilamen dan memberi lebih banyak ruang untuk molekul air, semakin banyak molekul air dalam daging maka daya ikat air akan meningkat.

#### d. Penentuan Susut Masak

Susut masak adalah berat yang hilang selama pemasakan, makin tinggi suhu pemasakan dan atau makin lama waktu pemasakan, makin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. (Suradi, 2006). Susut masak menggambarkan jus daging dan merupakan fungsi pemanasan. Faktor yang memengaruhi susut masak adalah penurunan nilai pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi myofibril,

ukuran dan berat sampel, penampang dan lintang daging, pemanasan, bangsa ternak yang berkaitan dengan lemak daging (Saleh dkk, 2012).

Susut masak adalah berat yang hilang selama pemasakan, makin tinggi suhu pemasakan dan atau makin lama waktu pemasakan, makin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. Susut masak merupakan indikator nilai nutrient daging yang berhubungan dengan kadar jus daging, yaitu banyaknya air yang terikat didalam dan diantara serabut otot (Soeparno, 2009). Daging dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit (Suradi, 2006). Nurwantoro dan Mulyani (2003) menyatakan bahwa susut masak menggambarkan jus daging yang merupakan fungsi temperatur dan lama waktu pemasakan. Soeparno (2009) menambahkan bahwa daging dengan susut masak yang rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik, karena hilangnya nutrisi selama pemasakan menjadi lebih sedikit.

#### **E. Cengkeh**

Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) merupakan tanaman asli Maluku (Indonesia) yang tergolong ke dalam keluarga tanaman *Myrtaceae* pada ordo *Myrtales* (Razafimamonjison, *et al*, 2014) yang merupakan tanaman herbal telah lama digunakan di negara-negara Timur Tengah dan Asia (Dehghani *et al*, 2012). Cengkeh digunakan sebagai obat tradisional dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, dan juga penyedap masakan. Aroma cengkeh yang

khas dihasilkan oleh senyawa *eugenol*, yang merupakan senyawa utama (72-90%).



Gambar 4. Pohon Cengkeh

Pemanfaatan tanaman cengkeh di Sulawesi Utara sebagian besar hanya mencakup bagian bunganya saja sedangkan bagian daun hanya dianggap sebagai limbah, padahal di dalam daun cengkeh terkandung suatu komponen minyak atsiri dan komponen *fenolik* yang selama ini kurang dimanfaatkan secara maksimal (Rorong, 2008). Komponen *fenolik* merupakan antioksidan alami yang bermanfaat bagi manusia, antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh yang terbukti sebagai pelindung melawan efek bahaya radikal bebas dan diketahui pula mampu menurunkan resiko kanker, obat sakit gigi, penyakit jantung koroner, stroke, *artherosclerosis*, *osteoporosis*, inflamasi, penyakit *neurodegeneratif*, dan produk aroma terapi (Lumingkewas dkk, 2014).



Gambar 5. Daun Cengkeh

Cengkeh termasuk suku *Myrtaceae* yang banyak ditanam di beberapa negara termasuk Indonesia. Tanaman ini berpotensi sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak cengkeh dapat diperoleh dari bunga cengkeh (*Clove Oil*), tangkai atau gagang bunga cengkeh (*Clove Steam Oil*) dan dari daun cengkeh (*Clove Leaf Oil*). Kandungan minyak atsiri di dalam bunga cengkeh mencapai 21,3% dengan kadar *eugenol* antara 78-95%, dari tangkai atau gagang bunga mencapai 6% dengan kadar *eugenol* antara 89-95%, dan dari daun cengkeh mencapai 2-3% dengan kadar *eugenol* antara 80-85%. Kandungan terbesar minyak cengkeh adalah *eugenol*, yang bermanfaat dalam pembuatan vanili, *eugenil metil eter*, *eugenil asetat*, dll. Vanili merupakan bahan pemberi aroma pada makanan, permen, coklat dan parfum. Bunga cengkeh juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok (Saiful, 2012).

*Eugenol* juga memiliki sifat antiseptik dan anestetik. (Razafimamonjison, *et al*, 2015). Analisis senyawa daun cengkeh asal Bangladesh dengan metode GC-MS didapatkan senyawa *eugenol* 74,28%, *eucalyptol* 5,78%, *kariofilen* 3,85%,  $\alpha$ -*cardinol* 2,43%, *limonen* 2,08% (Bhuiyan *et al*, 2010).



Minyak atsiri dari cengkeh mempunyai sifat kimiawi dan efek farmakologis yang berfungsi sebagai anestetik, antimikrobal, antiseptik (Nurhidayati, 2013), antioksidan, dan imunomodulator (Dehgani *et al*, 2012). Senyawa *fenolik* daun cengkeh juga bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dan senyawa *flavonoid* yang bertindak sebagai penangkal radikal bebas (Dibazar *et al*, 2014).

a. Taksonomi

Divisio : Spermatophyta

Sub-Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Sub-Kelas : Choripetalae

Ordo : Myrtales

Famili : Myrtaceae

Genus : *Syzygium*

Spesies : *Syzygium aromaticum* L.

(Bulan, 2004).

b. Deskripsi Tumbuhan

Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20-30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat (Thomas, 2007). Daun tunggal, bertangkai, tebal, kaku, bentuk bulat telur sampai lanset memanjang, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, tulang daun menyirip, permukaan atas

mengkilap, panjang 6-13,5 cm, lebar 2,5-5 cm, warna hijau muda atau cokelat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua (Kardinan, 2003). Bunga dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan. Pada saat masih muda bunga cengkeh berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. Sedang bunga cengkeh kering akan berwarna cokelat kehitaman dan berasa pedas sebab mengandung minyak atsiri (Thomas, 2007). Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara *vegetatif* dan *generatif*. Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis di ketinggian 600-1.100 meter di atas permukaan laut di tanah yang berdrainase baik (Kardinan, 2007).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai November 2019 di *Samata Integrated Farming System (SIFS)*, Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayakan digunakan untuk menyaring bubuk daun cengkeh supaya menghasilkan bubuk yang halus, baskom sebagai tempat pencampur pakan, blender untuk menghaluskan daun cengkeh kering yang masih utuh, cutter atau pisau untuk alat bantu jika ada yang ingin dipotong, ember sebagai tempat penampungan air, kandang litter yang memiliki sekat, lampu pijar 15 watt sebanyak 15 buah untuk penghangat anak ayam dan juga sebagai penerang, meteran untuk mengukur pada saat membuat sekat, tempat pakan sebagai wadah makanan ayam, tempat minum sebagai wadah minum ayam, timbangan digital untuk menimbang pakan pada saat pencampuran, kabel 40 meter sebagai sambungan listrik, fitting lampu 15 buah, paku dan tirai untuk menutup dinding kandang.

Alat yang digunakan untuk mengukur kandungan nutrisi bubuk daun cengkeh yaitu buret 50 cc skala 0,1 ml, , cawan alumunium, cawan porselen 30 ml, corong buchner  $\varnothing$  4.5 cm, eksikator, erlenmeyer 250 cc, gelas piala khusus

600 ml, kertas saring bebas abu (merek whatman no 41), kertas saring bebas lemak, labu kjeldahl 300 ml, oven listrik, pembakaran bunsen atau hot plate, satu set alat destilasi, satu set alat pompa vakum, satu set alat soxhlet, tang penjepit, tanur listrik, timbangan analitik.

Alat yang digunakan untuk mengukur kualitas daging broiler yaitu carper press dengan tekanan 35 kg/m<sup>2</sup>, corer, kertas whatman 41 (diameter 9 cm), panci perebus, pH meter, planimeter, thermometer bimetal, timbangan digital, warner bratzler shear force device.

## 2. Bahan

Ayam yang digunakan diperoleh dari PT. Satwa Indo Perkasa sebanyak 45 ekor umur 1 hari (DOC) tanpa membedakan jenis kelamin, terdiri dari 5 perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari 3 ekor ayam.

Bahan yang digunakan untuk mengukur kandungan nutrisi bubuk daun cengkeh yaitu aquades panas, asam borax 5%, asam chorida (yang sudah diketahui normalitasnya), asam sulfat pekat, aseton, biji hekter, h<sub>2</sub>so<sub>4</sub> 1.25 %, indikator campuran (brom cresolgreen: methyl merah = 4:5 . sebanyak 0,9 gram campuran dilarutkan dalam alkohol 100 ml), kapas katalis campuran (yang dibuat dari cuso<sub>4</sub>.5h<sub>2</sub>0 dan k<sub>2</sub>so<sub>4</sub> dengan perbandingan 1:5), kloroform, naoh 1.25 %, natrium hydroxida 40%.

Bahan yang digunakan untuk mengukur kualitas daging broiler yaitu larutan buffer ph 7 dan 4, sampel daging dan tissue.

Ransum penelitian berasal dari pakan komersil B11A dari New Hope Indonesia, dan bubuk daun cengkeh, vitachick, ransum penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. **Komposisi Ransum Penelitian**

| Jenis Pakan            | Perlakuan      |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | P <sub>0</sub> | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> |
| Konsentrat (%)         | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| Bubuk daun cengkeh (%) | 0              | 2%             | 4%             | 6%             | 8%             |
| <b>Total (%)</b>       | <b>100</b>     | <b>102</b>     | <b>104</b>     | <b>106</b>     | <b>108</b>     |

Tabel 2. **Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian**

| Kandungan Pakan   | Jumlah Kandungan |
|-------------------|------------------|
| Protein Kasar (%) | 22,0-23,5%       |
| Serat Kasar (%)   | 5,0%             |
| Calcium (%)       | 0,9%             |
| Phospor (%)       | 0,60%            |
| Aflatoxin         | Max 50 ppb       |
| Lisin             | Min 1,20%        |
| Metionin          | Min 0,45%        |
| Met+Sistin        | Min 0,80%        |
| Triptofan         | Min 0,19%        |
| Treonin           | Min 0,75%        |

Sumber: New Hope. 2019.

Tabel 3. **Kandungan Nutrisi Daun Cengkeh**

| No       | Kode Sampel | Kompisisi (%) |               |             |             |       |      |
|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|------|
|          |             | Air           | Protein Kasar | Lemak Kasar | Serat Kasar | BETN  | Abu  |
| <b>1</b> | DC 1        | 13,01         | 24,87         | 10,56       | 25,93       | 33,68 | 4,96 |
| <b>2</b> | DC 2        | 13,24         | 24,06         | 10,43       | 26,09       | 34,36 | 5,06 |
| <b>3</b> | DC 3        | 13,55         | 24,74         | 10,24       | 25,86       | 34,07 | 5,09 |

Sumber : Laboratorium Kimia Makanan Ternak Jurusan Nutrisi Dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2019.

### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimen yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan dalam kondisi terkendali.

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari dua tahapan:

#### 1. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Penempatan perlakuan dilakukan secara acak, sedangkan komposisi bahan pakan setiap perlakuan sebagai berikut:

P0 : Ransum dasar (kontrol)

P1 : Ransum dasar + bubuk daun cengkeh 2% (60 gr)

P2 : Ransum dasar + bubuk daun cengkeh 4% (120 gr)

P3 : Ransum dasar + bubuk daun cengkeh 6% (180 gr)

P4 : Ransum dasar + bubuk daun cengkeh 8% (240 gr)

#### 2. Prosedur Penelitian

##### a. Tahap Persiapan

Pembuatan bubuk daun cengkeh dilakukan dengan cara dikeringkan dalam oven dengan 40-50° selama 72. Setelah itu daun cengkeh diperkecil partikelnya (diremas dengan tangan) agar saat penepungan lebih mudah.

Pembuatan kandang dengan mengambil bambu lalu dipotong menjadi beberapa bagian lalu di buat menjadi 15 sekat dengan ukuran 60x50 cm lalu

dinding sekat ditutup menggunakan koran dan lantainya di beri sekam sekitar 7 cm, kemudian beri lampu 15 watt setiap sekat.

*Biosecurity* sebelum kandang digunakan yaitu dengan terlebih dahulu membersihkan seluruh areal kandang baik di dalam kandang maupun luar kandang kemudian disemprotkan rodalon. 24 jam sebelum *Day Old Chick (DOC)* tiba, lampu kandang dinyalakan dengan tujuan menghangatkan ruang kandang.

#### b. Tahap Pelaksanaan

##### 1) Pengelompokan Ayam

Anak ayam yang baru tiba diberi air gula dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan semula. Selanjutnya anak ayam umur satu hari tersebut ditimbang bobot badan awalnya dan sekat kandang diberi nomor sesuai dengan pengacakan perlakuan dan ulangan dengan cara menggunakan potongan kertas. Penempatan ayam ke dalam unit kandang dilakukan secara acak pula.

##### 2) Pemberian Ransum

Ransum percobaan dengan kandungan bubuk daun cengkeh (*Syzigium aromaticum*) yang berbeda (2%, 4%, 6% dan 8%) diberikan kepada ayam percobaan secara *ad-libitum*. Setiap kali pemberian ransum diusahakan tidak ada yang tercecer. Satu minggu pertama makanan yang sudah pada wadah tempat pakan di letakkan di lantai agar DOC dapat menggapai makanan, setelah memasuki dua minggu dan seterusnya tempat pakan diangkat sampai batas tinggi ayam yang dapat dicapai. Bersamaan pemberian ransum dilakukan juga pemberian air minum.

### 3) Pengukuran Kandungan Nutrisi Bubuk Daun Cengkeh

#### a) Penentuan Kadar Air

##### 1. Cara Kerja

- a. Keringkan Cawan alumunium dalam oven selama 1 jam pada suhu  $100 - 105^{\circ} \text{C}$ .
- b. Kemudian dinginkan dalam eksikator selama 15 menit dan timbang beratnya (Catat sebagai A gram)
- c. Tambahkan ke dalam cawan alumunium tersebut sejumlah sampel/bahan lebih kurang 2-5 gram, timbang dengan teliti. Dengan demikian berat sampel/bahan dapat diketahui dengan tepat (Catat sebagai B gram). Bila menggunakan timbangan analitik digital maka dapat langsung diketahui berat sampelnya dengan menset *zero balans*, yaitu setelah berat alumunium diketahui beratnya dan telah dicatat, kemudian dizerokan sehingga penunjukan angka menjadi nol, lalu sampel langsung dimasukkan ke dalam cawan dan kemudian timbang beratnya dan catat sebagai C gram.
- d. Masukkan cawan+sampel ke dalam oven selama 3 jam pada suhu  $100 - 105^{\circ} \text{C}$  sehingga seluruh air menguap. (Atau dapat pula dimasukkan dalam oven dengan suhu  $60^{\circ}\text{C}$  selama 48 jam).
- e. Masukkan dalam eksikator selama 15 menit dan timbang. Ulangi pekerjaan ini dari tahap no 4 dan 5, sampai beratnya tidak berubah lagi. Catat sebagai D gram.



- f. Setiap kali memindahkan cawan alumunium (baik berisi sampel atau tidak, gunakan tang penjepit).

## 2. Pengamatan

- a. Berat Cawan alumunium .....
- b. Berat Cawan Alumunium + sampel .....
- c. Berat Sampel .....
- d. Berat Cawan Al+ sampel Kering .....
- (setelah pemanasan oven)

## 3. Perhitungan

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{(B - D)}{C} \times 100\% = \dots\dots\dots$$

## b) Penentuan Kadar Abu

### 1. Cara Kerja

- a. Keringkan cawan porselen ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 - 105<sup>0</sup> C.
- b. Dinginkan dalam eksikator selama 15 menit dan timbang, catat sebagai A gram.
- c. Masukkan sejumlah sampel kering oven 2 - 5 gram ke dalam cawan, catat sebagai B gram
- d. Panaskan dengan hot plate atau pembakar bunsen 1 sampai tidak berasap lagi.

- e. Masukkan kedalam tanur listrik dengan temperatur  $600 - 700^{\circ} \text{C}$ ,  
biarkan beberapa lama sampai bahan berubah menjadi abu putih  
betul. Lama pembakaran sekitar 3 – 6 jam.
- f. Dinginkan dalam eksikator kurang lebih 30 menit dan timbang  
dengan teliti, catat sebagai C gram)
- g. Hitung kadar abunya.

## 2. Pengamatan

- a. Berat cawan kosong (A) .....
- b. Berat cawan + sampel (B) .....
- c. Berat Sampel (B-A) .....
- d. Berat cawan + abu (C) .....
- e. Berat Abu (C-A) .....

## 3. Perhitungan

$$\text{Kadar Abu} = \frac{(C - A)}{(B - A)} \times 100\% = \dots\dots\dots$$

## c) Penentuan Kadar Protein Kasar

### 1. Cara Kerja

#### a. Destruksi

- 1) Timbang contoh sampel kering oven sebanyak  $\pm 1$  gram (Catat  
sebagai A gram)
- 2) Masukkan ke dalam labu Kjeldhal dengan hati – hati, dan  
tambahkan 6 gram katalis campuran.
- 3) Tambah 20 ml asam sulfat pekat

- 4) Panaskan dalam nyala api kecil di lemari asam. Bila sudah tidak berbuih lagi destruksi diteruskan dengan nyala api yang besar.
- 5) Destruksi sudah dianggap selesai bila larutan sudah berwarna hijau jernih, setelah itu dinginkan.

b. Destilasi

- 1) Siapkan alat destilasi selengkapnya, pasang dengan hati – hati jangan lupa batu didih, vaselin dan tali pengaman
- 2) Pindahkan larutan hasil destruksi ke dalam labu didih, kemudian bilas dengan aquades sebanyak lebih kurang 50 ml.
- 3) Pasangkan erlenmeyer yang telah diisi asam borax 5 % sebanyak 15 ml untuk menangkap gas amonia, dan telah diberi indikator campuran sebanyak 2 tetes.
- 4) Basakan larutan bahan dari destruksi dengan menambah 40 - 60 ml NaOH 40 % melalui corong samping. Tutup kran corong segera setelah larutan tersebut masuk ke labu didih.
- 5) Nyalakan pemanas bunsen dan alirkan air ke dalamran pendingin tegak.
- 6) Lakukan destilasi sampai semua N dalam larutan dianggap telah tertangkap oleh asam borax yang ditandai dengan menyusutnya larutan dalam labu didih sebanyak 2/3 bagian (atau sekurang-kurangnya sudah tertampung dalam erlenmeyer sebanyak 15 ml).

c. Titrasi

- 1) Erlenmeyer berisi sulingan tadi diambil (jangan lupa membilas bagian yang terendam dalam air sulingan)
- 2) Kemudian titrasi dengan HCl yang sudah diketahui normalitasnya catat sebagai B, Titik titrasi dicapai dengan ditandai dengan perubahan warna hijau ke abu-abu. sampai catat jumlah larutan HCl yang terpakai sebagai C ml.

2. Pengamatan

- a. Berat sampel (A) .....
- b. Normalitas HCl (B) .....
- c. Mililiter HCl yang terpakai (C) .....

3. Perhitungan

$$\% \text{ Protein Kasar} = \frac{C \times B \times 0.014 \times 6.25}{A} \times 100\%$$

**d) Penentuan Kadar Lemak Kasar (Cara Sokhlet)**

1. Cara Kerja

- a. Siapkan kertas saring yang telah kering oven (gunakan kertas saring bebas lemak) .
- b. Buatlah selongsong penyaring yang dibuat dari kertas saring, timbang dan catat beratnya sebagai A gram. Masukkan sampel sekitar 2 – 5 gram dalam selongsong kemudian timbang dan catat beratnya sebagai B gram. Tutup dengan kapas kemudian dihekt,

lalu timbang dan catat beratnya sebagai C gram. Berat sampel = (B - A) gram.

- c. Selongsong penyaring berisi sampel dimasukkan ke dalam alat soxhlet. Masukkan pelarut lemak (Kloroform) sebanyak 100 – 200 ml ke dalam labu didihnya. Lakukan ekstraksi (Nyalakan pemanas hot plate dan alirkan air pada bagian kondensornya).
- d. Ekstraksi dilakukan selama lebih kurang 6 jam. Ambil selongsong yang berisi sampel yang telah diekstraksi dan keringkan didalam oven selama 1 jam pada suhu 105<sup>0</sup> C. kemudian masukan ke dalam eksikator 15 menit dan kemudian timbang, dan catat beratnya sebagai D gram.
- e. Kloroform yang terdapat dalam labu didih, didestilasi sehingga tertampung di penampung soxhlet. Kloroform yang tertampung disimpan untuk digunakan kembali.

## 2. Pengamatan

- a. Berat selongsong (A) .....
- b. Berat selongsong + sampel (B)l .....
- c. Berat sampel (B-A) .....
- d. Berat selongsong + Sampel + kapas +hektek (C) .....
- e. Berat selongsong + Sampel akhir + kapas +hektek (D) .....

## 3. Perhitungan

$$\% \text{ Lemak kasar} = \frac{(C - D)}{(B - A)} \times 100\% = \dots\dots\dots$$

## e) Penentuan Kadar Serat Kasar

### 1. Cara Kerja

- a. Siapkan kertas saring kering oven dengan diameter 4,5 cm, catat sebagai A gram.
- b. Siapkan cawan porselen kering oven.
- c. Residu/sisa ekstraksi lemak masukkan kedalam gelas piala khusus sebanyak 1 gram, Catat sebagai B gram.
- d. Tambah asam sulfat 1,25 % sebanyak 100 ml kemudian pasang pada alat pemanas khusus tepat dibawah kondensor (reflux).
- e. Alirkan airnya dan nyalakan pemanas listrik tersebut.
- f. Didihkan selama 30 menit dihitung saat mulai mendidih
- g. Setelah cukup pemanasan, ambil dan saring dengan mempergunakan corong buchner yang telah dipasang kertas saring (kertas saring ini tidak perlu diketahui beratnya.
- h. Penyaringan menggunakan pompa Vacum (pompa isap) dan cuci/bilas) dengan mempergunakan aquades panas sebanyak 100 ml.
- i. Residu yang terdapat dalam corong buchner dikembalikan kepada beaker glass semula.
- j. Tambahkan NaOH 1,25% sebanyak 100 ml kemudian pasang kembali pada alat pemanas khusus seperti semula.
- k. Lakukan seperti pada 6 – 7. Tetapi menggunakan kertas saring yang telah diketahui beratnya (lihat no 1)
- l. Pada penyaringan ini cuci/bilas berturut – turut dengan :

- Air panas 100 ml
  - Asam sulfat panas 0.3 N (1.25%) 50 ml
  - Air panas 100 ml
  - Aceton 50 ml
- m. Kertas saring dan isisnya (residu) dimasukkan ke dalam cawan porselen gunakan pincet
- n. Keringkan dalam oven 100 - 105<sup>0</sup> C selama 1 jam.
- o. Dinginkan dalam exsikator selama 15 menit lalu timban, catat sebagai C gram)
- p. Panaskan dalam hot plate sampai tidak berasap lagi, kemudian masukan dalam tanur listrik 600<sup>0</sup>C –700<sup>0</sup>C selama 3 jam sampai abunya berwarna putih . Di sini serat kasar di bakar sampai habis.
- q. Dinginkan dalam exsikator selama 30 menit lalu timbang dan catat sebagai D gram.

## 2. Pengamatan

- a. Berat kertas saring (A) .....
- b. Berat residu lemak (B) .....
- c. Berat residu + cawan + kertas saring (C) .....
- d. Berat cawan + abu (D) .....

## 3. Perhitungan

$$\text{Kadar serat kasar} = B \times \frac{(C - D - A)}{100} \times 100\% = \dots\dots\dots$$

100- % LK

**f) Penentuan Kadar BETN**

Penentuan kadar BETN dapat dilakukan apabila kadar abu, protein kasar, serat kasar, dan lemak kasar telah diketahui. Karena kadar BETN diperoleh dari perhitungan  $100\% - (\text{abu} + \text{protein kasar} + \text{serat kasar} + \text{lemak kasar})$ .

**4) Pengukuran Kualitas Daging Broiler****a) Uji Daya Ikat Air****1. Cara Kerja**

- a. Timbang sampel sebanyak 0,3 gr dengan menggunakan timbangan Sartorius.
- b. Letakan sampel diantara 2 kertas saring, kemudian lakukan pengepresan dengan menggunakan Carper Press selama 5 menit.
- c. Setelah selesai dipress, pada kertas saring akan nampak dua lingkaran yang menunjukkan luas area daging yang kepress (Lingkar Dalam = LD) dan luas area dari air yang keluar dari daging hasil pengepressan (Lingkar Luar = LL atau luas area basah). Keringkan sebentar dan kemudian beri tanda dengan bolpoin kedua luasan area tersebut.
- d. Untuk mengetahui jumlah air bebas yang keluar dari daging, maka kita harus mengukur luasan kedua area tersebut dengan menggunakan Planimeter.



Prosedur penghitungan dengan Planimeter :

- e. Beri tanda pada kedua lingkaran tersebut (LL dan LD) sebagai titik awal penghitungan.
- f. Letakan Titik tengah pada kaca pembesar yang terdapat pada alat Planimeter pada tanda di lingkaran (LL atau LD). Lakukan penghitungan pada titik awal dengan membaca angka-angka yang tertera pada alat sebagai hitungan awal. Setelah dihitung, putar kaca pembesar pada alat Planimeter searah jarum jam mengikuti lingkaran yang sudah ditandai sampai titik awal. Lakukan penghitungan kembali sehingga didapat angka akhir.
- g. Hitung selisih antara hitungan akhir dengan hitungan awal pada masing-masing lingkaran (LL dan LD), kemudian bagi dengan 100. Nilai yang diperoleh menunjukkan luas area basah (dalam inch).
- h. Luas Area Basah =  $\frac{\text{selisih LL} - \text{selisih LD}}{100}$
- i. Setelah diperoleh luas area basah, maka masukan nilai tersebut kedalam rumus :  

$$\text{mgH}_2\text{O} = \text{luas area basah} \times 6,45 \text{ (konversi inch}^2 \text{ ke cm}^2) - 80,0948.$$
- j. Nilai yang diperoleh menunjukkan jumlah air bebas yang keluar dari daging (dalam milligram).

Sedangkan untuk mengetahui persentase dari berapa banyak jumlah air bebas yang keluar adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ air bebas} = \frac{\text{mgH}_2\text{O}}{300} \times 100 \%$$

- k. Semakin banyak air bebas yang keluar dari daging menunjukkan bahwa sampel daging tersebut memiliki kemampuan/daya mengikat air yang rendah.

## b) Uji Keempukan

### 1. Cara Kerja

- a. Siapkan sampel daging yang akan diuji dengan berat  $\pm 100$  gr.
  - b. Rebus air sampai mendidih.
  - c. Tusukan thermometer bimetal pada sampel daging sampai batas indikator yang terdapat pada alat.
  - d. Rebus sampel daging sampai suhu dalamnya mencapai  $81$  oC, lalu angkat dan dinginkan.
  - e. Daging dipotong searah serat dengan menggunakan corer. Lakukan beberapa kali pemotongan.
  - f. Nyalakan Warner bratzler shear force device. Letakan sampel daging hasil corer pada alat pemotongan warner bratzler shear force.
- Tingkat keempukan daging ditunjukkan oleh besarnya kekuatan ( $\text{kg/cm}^3$ ) yang diperlukan untuk memotong sampel daging tersebut.

Baca dan catat hasil pengukuran.

Angka 0-3 : empuk

Angka >3 – 6 : sedang

Angka > 6 : alot

**c) Uji Susut Masak**

1. Cara Kerja

- a. Siapkan sampel daging yang akan diuji dengan berat  $\pm 100$  gr.
- b. Rebus air sampai mendidih.
- c. Tusukan thermometer bimetal pada sampel daging sampai batas indikator yang terdapat pada alat.
- d. Rebus sampel daging sampai suhu dalamnya mencapai  $81\text{ }^{\circ}\text{C}$ , lalu angkat dan dinginkan.
- e. Timbang sampel sampai beratnya konstan. Persentase susut masak dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Susut Masak (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

**d) Uji pH**

1. Cara Kerja

pH meter dikalibrasi dengan buffer pH 7 dan 4. Prosedur kalibrasi adalah sebagai berikut :

- a. Tekan tombol ON pada alat pH meter, tunggu beberapa saat sampai pada layar display pH meter muncul tanda “CAL”
- b. Celupkan ujung pH meter (elektroda) pada larutan buffer pH 7, tunggu beberapa saat sampai terdengar bunyi pada alat yang

menunjukkan bahwa prosedur kalibrasi pada larutan buffer pH 7 selesai dilakukan.

- c. Celupkan ujung pH meter (elektroda) pada larutan buffer pH 4, tunggu beberapa saat sampai terdengar bunyi pada alat yang menunjukkan bahwa prosedur kalibrasi pada larutan buffer pH 4 selesai dilakukan.
- d. Alat pH meter siap untuk digunakan
- e. Tusukan ujung alat pH meter pada sampel daging, baca dan catat nilai pH yang tertera pada layar display alat pH meter.
- f. Lakukan beberapa kali pengukuran untuk memperoleh hasil nilai pH yang akurat
- g. Jika melakukan pengukuran pH dengan sampel yang berbeda, maka sebelum alat pH meter digunakan, ujung alat pH meter dibasuh terlebih dahulu dengan menggunakan aquades, kemudian keringkan dengan tissue. Setelah itu lakukan pengukuran terhadap sampel yang lain.
- h. Apabila alat sudah dimatikan atau mati, maka proses kalibrasi harus dilakukan kembali apabila pH meter akan digunakan kembali.
- i. Apabila selesai digunakan, ujung alat pH meter dibasuh dengan aquades sampai bersih, kemudian keringkan dengan tissue dan simpan kembali alat pH meter pada tempatnya.

### E. Parameter yang Diamati

a) Pengukuran Daya Ikat Air (DIA)

Pengukuran daya ikat air (DIA) dihitung dengan menggunakan

rumus :

$$\text{Daya Ikat Air} = \% \text{ kadar air} - \frac{\text{mgH}_2\text{O}}{300} \times 100$$

b) Susut Masak

Pengukuran usut masak dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Susut Masak} = \frac{\text{Berat sebelum pemasakan} - \text{berat setelah pemasakan}}{\text{berat sebelum pemasakan}} \times 100\%$$

c) Keempukan Pengukuran keempukan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Keempukan (mm/g/10 detik)} = \frac{\text{Rata-rata pengukuran}}{10 \text{ detik}}$$

d) Pengukuran pH, dengan menggunakan pH meter.

### F. Analisis Data

Pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh terhadap lemak abdominal menggunakan analisis ragam sesuai dengan rancangan Acak Lengkap (RAL) dan perlakuan yang memberi pengaruh nyata di Uji lebih lanjut dengan menggunakan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT merupakan pengujian lanjut untuk mengetahui perbedaan nilai tengah dari tiap perlakuan (Kusnandar, 2004).

Adapun model matematikanya yaitu :

$$Y_{ij} = \mu + T_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

$Y_{ij}$  = Hasil pengamatan dari perubah pada penggunaan bubuk daun cengkeh,

$\mu$  = Rata-rata pengamatan

$\epsilon_{ij}$  = Pengaruh perlakuan I

$T_i$  = Error/galat perlakuan dari perlakuan ke-I dan ulangan ke-J

Dimana: I = 1, 2, 3 dan 4

J = 1, 2, 3 dan 4

Untuk uji BNT atau LSD dengan model matematika sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BNT}_{(0,05)} &= t_{0,05} s \hat{Y}_i - \hat{Y}_i \\ &= T\alpha (2s^2/r)^{1/2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BNT}_{(0,01)} &= t_{0,01} s \hat{Y}_i - \hat{Y}_i \\ &= T\alpha (2s^2/r)^{1/2} \end{aligned}$$

Keterangan:

BNT = nilai tengah perlakuan bubuk daun cengkeh kombinasinya pada taraf 2% / 8%.

$T\alpha$  = Nilai derajat bebas galat pada table  $x^2$

$s^2$  = Nilai kuadrat tenga galat (KTG)

R = Ulangan

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian selama 30 hari tentang penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap kualitas daging broiler dengan parameter daya ikat air, susut masak, keempukan, dan pH dapat diperhatikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Rata-Rata Hasil Pengamatan Penambahan Bubuk Daun Cengkeh terhadap

| Parameter yang diukur  | Perlakuan  |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | P0         | P1         | P2         | P3         | P4         |
| Daya Ikat Air          | 34,40±5,27 | 23,13±3,94 | 28,07±6,40 | 33,31±3,16 | 21,78±1,22 |
| Keempukan(DPD masak)   | 0,40±0,04  | 0,56±0,15  | 0,56±0,01  | 0,63±0,05  | 0,85±0,09  |
| Keempukan (DPD mentah) | 0,23±0,07  | 0,30±0,06  | 0,30±0,02  | 0,28±0,07  | 0,25±0,06  |
| Susut Masak            | 9,58±0,74  | 11,55±1,59 | 12,06±2,65 | 12,79±1,87 | 11,64±1,03 |
| pH                     | 6,38±0,12  | 6,27±0,09  | 6,31±0,04  | 6,32±0,13  | 6,28±0,07  |

Sumber : Data Primer, 2019.

#### B. Pembahasan

##### 1. Daya Ikat Air

Kualitas daging ayam broiler dengan penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) menunjukkan rata-rata daya ikat air tertinggi pada perlakuan P3 (33,31) dan lebih rendah pada perlakuan P4 (21,78). Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap daya ikat air daging broiler.

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa nilai Daya Ikat Air pada daging broiler yang diberikan pakan dengan penambahan

bubuk daun cengkeh menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan penambahan bubuk daun cengkeh ( $P < 0,05$ ). Hal ini disebabkan karena kandungan nutrisi pada bubuk daun cengkeh dapat mempengaruhi daya ikat air pada daging broiler. Uji BNT dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perlakuan yang digunakan diantara P1(2%), P2(4%), P3(6%), dan P4(8%) mana yang terbaik.

Hasil uji lanjut BNT memperlihatkan bahwa yang terbaik ada pada level 6% dibandingkan pada level 2%, 4% dan 8%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bubuk daun cengkeh dengan kadar 6% dapat meningkatkan nilai gizi pada daging terutama protein. Peningkatan protein dalam daging dapat mempengaruhi kemampuan mengikat air daging. Semakin tinggi kadar protein daging maka kemampuan menahan air pada daging juga tinggi Hal ini sesuai dengan pendapat Pratama (2015), yang menyatakan bahwa daya ikat air ini pula berhubungan dengan protein karena molekul-molekul air bebas berjumlah sekitar 10% terikat diantara molekul protein akan menurun bila protein daging mengalami denaturasi. Hartono (2013), menyatakan bahwa otot dada diduga tidak banyak melakukan aktifitas mengingat ayam pedaging termasuk spesies unggas jarang bergerak sehingga otot dada lebih sedikit tersusun serabut myofibril dan kurang mengandung protein daging yang menyebabkan kapasitas menahan air lebih rendah. Maka dari itu bubuk daun cengkeh digunakan agar dapat menambah protein pada daging broiler.

Penggunaan protein diberikan batasan pada level maksimal dan penggunaannya juga harus berlevel sekian, jika itu berlebih biasanya tidak dapat



disimpan dan dapat langsung dikeluarkan oleh tubuh. Sedangkan yang perlu diketahui bahwa protein di dalam ransum itu nilainya mahal dan bila ditambahkan begitu banyak produsen akan rugi dan manfaat bagi tubuh ternak juga akan terbuang jika tidak dimanfaatkan, berbeda dengan karbohidrat dan lemak yang bisa tersimpan menjadi lemak abdominal di dalam tubuh yang suatu saat ketika tubuh kekurangan energi maka karbohidrat dan lemak yang tersimpan akan diubah menjadi energi.

Gultom (2014), menyatakan bahwa konsumsi protein yang tinggi akan mempengaruhi asupan protein pula ke dalam daging dan asam-asam amino tercukupi di dalam tubuhnya sehingga metabolisme sel-sel dalam tubuh berlangsung secara normal.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya variasi pada daya ikat air oleh daging yaitu faktor pH, faktor perlakuan maturasi, pemasakan atau pemanasan, faktor biologik seperti jenis otot, jenis ternak, jenis kelamin dan umur ternak. Dan juga faktor pakan, transportasi, suhu, kelembaban, penyimpanan dan preservasi, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan lemak intramuskular (Abustam E, 2012).

## **2. Keempukan (Daya Putus Daging Masak)**

Kualitas daging broiler dengan penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) menunjukkan rataan keempukan (daya putus daging masak) tertinggi pada perlakuan P4 (0,85) dan lebih rendah pada perlakuan P1 dan P2 (0,56). Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap Keempukan (DPD masak) daging broiler.

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa nilai keempukan (daya putus daging masak) pada daging broiler yang diberikan pakan dengan penambahan bubuk daun cengkeh menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan penambahan bubuk daun cengkeh ( $P < 0,05$ ). Hal ini disebabkan karena bubuk daun cengkeh mempengaruhi penyusun otot pada daging broiler. Uji BNT dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perlakuan yang digunakan diantara P1(2%), P2(4%), P3(6%), dan P4(8%) mana yang terbaik..

Hasil uji lanjut BNT memperlihatkan bahwa yang terbaik ada pada level 2%,4% dan 6% dibandingkan pada level 8%. Yaitu pada level 2,4, dan 6% tersebut memiliki tingkat daya putus daging rendah, sedangkan pada level 8% itu tinggi. Menurut Hartono (2013), menyatakan semakin tinggi nilai daya putus daging suatu sampel daging maka semakin tinggi pula nilai kealotannya atau keempukannya berkurang sebaliknya jika nilai daya putus daging rendah maka dapat menghasilkan daging yang empuk atau tingkat keempukannya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bubuk daun cengkeh dengan kadar 2,4 dan 6% mempengaruhi nilai keempukan yang rendah dimana kandungan pada daun cengkeh dapat mempengaruhi jaringan ikat, serabut-serabut otot, dan jaringan adipose pada daging broiler. Menurut Soeparno (2015), keempukan daging merupakan suatu karakteristik kualitas yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi keempukan daging digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik termasuk bangsa, spesies dan fisiologi, umur, manajemen, jenis kelamin dan stress dan faktor postmortem yang meliputi

metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan pembekuan termasuk faktor biokimia sebelum dan setelah penyembelihan.

Keempukan daging dapat diketahui dengan menggunakan daya putusnya, semakin rendah nilai daya putusnya, semakin empuk daging tersebut. Pengujian keempukan secara obyektif dapat dilakukan secara mekanik termasuk pengujian kompresi (indikasi kealotan jaringan ikat), daya putus warner-bratzler (WB), indikasi kekuatan myofibril, adhesi (indeks kekuatan jaringan ikat) dan susut masak (sensitive terhadap perubahan jus daging). Nilai daya putus WB ikut menunjukkan tingkat keempukan daging. Pengaruh pH terhadap pengerutan otot akan meningkatkan keempukan, karena panjang sarkomer myofibril meningkat (Soeparno, 2015).

### **3. Keempukan (Daya Putus Daging Mentah)**

Kualitas daging ayam broiler dengan penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) menunjukkan rataan keempukan (daya putus daging mentah) tertinggi pada perlakuan P1 dan P2 (0,30) dan lebih rendah pada perlakuan P4 (0,25). Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap keempukan (daya putus daging mentah) daging broiler.

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa nilai keempukan (daya putus daging mentah) pada daging broiler yang diberikan pakan dengan penambahan bubuk daun cengkeh pada pakan menunjukkan bahwa pada setiap perlakuan tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bubuk daun cengkeh pada pakan sampai kadar 8% terhadap daya

putus daging mentah tidak mempengaruhi keempukan pada daging broiler mentah. Abustam (2012), menyatakan bahwa faktor keempukan salah satunya yaitu kondisi pemasakan. Otot dengan potensi keempukan yang tinggi memerlukan suhu pemasakan dan waktu pemasakan yang cepat. Sebaliknya pada otot yang dalam keadaan mentah memperlihatkan kekerasan yang berarti memerlukan waktu pemasakan yang cukup lama.

#### **4. Susut Masak**

Kualitas daging broiler dengan penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) menunjukkan rata-rata susut masak tertinggi pada perlakuan P3 (12,79) dan lebih rendah pada perlakuan P1 (11,55). Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap susut masak daging ayam broiler.

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai susut masak pada daging ayam broiler yang diberikan pakan dengan penambahan bubuk daun cengkeh menunjukkan setiap perlakuan tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan kandungan bubuk daun cengkeh berperan dalam mengikat nutrisi pada daging broiler saat pemasakan sebagaimana yang dilaporkan Pratama (2015), daging yang memiliki susut masak rendah mempunyai kualitas daging yang baik karena nutrisi gizi yang hilang lebih sedikit. Daging dengan susut masak lebih rendah mempunyai kualitas relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit sehingga

daging ayam dengan susut masak rendah akan mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan daging ayam dengan susut masak tinggi.

## 5. pH

Kualitas daging broiler dengan penambahan bubuk daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) menunjukkan rata-rata pH tertinggi pada perlakuan P3 (6,32) dan lebih rendah pada perlakuan P1 (6,27). Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap pH daging broiler.

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa nilai pH pada daging broiler yang diberikan pakan dengan penambahan bubuk daun cengkeh menunjukkan bahwa setiap perlakuan tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan pemberian bubuk daun cengkeh pada pakan terhadap pH daging broiler masih ditahap normal. Hal ini disebabkan karena bubuk daun cengkeh yang digunakan tidak cukup kuat peranannya dalam meningkatkan pH daging. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2009), bahwa faktor pH daging juga dipengaruhi salah satunya adalah pakan. Pakan yang diberi campuran bubuk daun cengkeh sebagai perlakuan dapat menormalkan pH pada daging, yang dimana bubuk daun cengkeh banyak terdapat kandungan seperti anestetik, antimikrobia, antiseptik, antioksidan.

Kandungan senyawa antioksidan yang ada pada bubuk daun cengkeh dapat memperlambat peningkatan nilai pH yang dapat berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Nurhidayat (2013), bahwa minyak atsiri dari cengkeh mempunyai sifat kimiawi dan efek farmakologis yang berfungsi sebagai anestetik, antimikrobia, dan antiseptik. Lalu

dilanjut oleh Dehgani (2012), yang menyatakan bahwa cengkeh mengandung antioksidan dan imunomodulator. Dibazar (2014), juga menambahkan bahwa senyawa *fenolik* daun cengkeh juga bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dan senyawa *flavonoid* yang bertindak sebagai penangkal radikal bebas



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian bubuk daun cengkeh berpengaruh signifikan terhadap daya ikat air pada perlakuan P3 (6%) dan keempukan (daya putus daging masak) pada perlakuan P1(2%),P2(4%),dan P3(6%) dan tidak berpengaruh nyata pada keempukan (daya putus daging mentah), susut masak dan pH.

#### **B. Saran**

Adapun saran pada penelitian selanjutnya sebaiknya agar lebih teliti dalam pengukuran agar hasil yang lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abustam. E. 2009. Sifat-Sifat Daging Segar. Web-site: [www.sifat-sifatdaging.html](http://www.sifat-sifatdaging.html). Diakses: Tanggal 08 Maret 2016.
- Abustam E, 2012. *Ilmu Daging*. Masagena Press (Penerbit Yayasan Masagena Center), Makassar
- \_\_\_\_\_, 2009. Karakteristik Kualitas Daging. [www.kualitas-daging.html](http://www.kualitas-daging.html).
- Badan Standarisasi Nasional [BSN]. 2008. *Mutu Karkas dan Daging Ayam*. (SNI 3924:2009 ). Badan Standar Nasional, Jakarta.
- Bhuiyan, Md, N.I., Bagum, J., Nandi, N.C. and Akter, F. 2010. Constituents of The Essential Oil From Leaves and Buds of Clove (*Syzygium Aromaticum*). *African Journal of Plant Science*. 4 (11): 451-454.
- BPS, 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bulan R. 2004. Reaksi Asetilasi Eugenol dan Oksidasi Metil Iso Eugenol. *Laporan Penelitian*, Program Studi Teknik Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Cohen N, Ennaji H, Bouchrif B, Hassar M, Karib H. 2007. Comparative Study of Microbiological Quality of Raw Poultry Meat at Various Seasons and for Different Slaughtering Processes in Casablanca (Morocco). *The Journal of Applied Poultry Research* 16(4):502-508. doi:10.3382/japr.2006-00061, Morocco.
- Dehghani F, Heshmatpour, A., Panjehshahin, M.R. and Khozani, T.T. 2012. Toxic Effects of Water/ Alcoholic Extract of *Syzygium Aromaticum* on Sperm Quality, Sex Hormones and Reproductive Tissues In Male Mouse. *IUFS J Biol* 71 (2): 95 – 102.
- Dibazar S P, Fateh S, Daneshmandi S. 2014. Clove (*Syzygium Aromaticum*) Ingredients Affect Lymphocyte Subtypes Expansion and Cytokine Profile Responses: An In Vitro Evaluation. *Food and drug analysis*. 22:448454.
- Erwanto Y, Dkk. 2007. Pemanfaatan Microbial Transgluminase dalam Pembuatan Bakso dengan Bahan Dasar Daging Layu. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta. Buletin Peternakan 31 (2) : 82-93.



- Gultom S.M., Supratman, R.D.H., Abun. 2014. Pengaruh Imbangan Energi dan Protein Ransum Terhadap Bobot karkas dan bobot lemak abdominal ayam broiler umur 3-5 minggu. *Jurnal Fakultas Peternakan*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Hadi S, 2012. Pengambilan Minyak Atsiri Bunga Cengkeh (*Clove Oil*) Menggunakan Pelarut N-Heksana Dan Benzena. *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hanani E, 2016. *Analisis Fitokimia*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hartono E, Iriyanti N, Santoso SS. 2013. Penggunaan pakan fungsional terhadap daya ikat air, susut masak dan keempukan daging ayam broiler. *JIP*.1(1):10-19.
- Henckel, P, A. Karlsson, N. Oksbjerg dan J. S. Petersen. 2000. Control of post mortem pH decrease in pig muscles: Experimental design and testing of animal models. *Meat Sci* 55:131-138.
- Hoffman L. C. and Coetzee, G. J. M. 2002. Effect of Various Dietary N-3/N-6 Fatty Acid Ratios on The Performance and Body Composition Of Broilers. *J. Anim Sci.* 32 (3) : 175-184, South African.
- Kardinan, A. 2007. *Tanaman Pengusir dan Pembasmi Nyamuk Vol III*. Agro Media Pustaka, pp: 22-23, Jakarta
- Kiramang K, Jufri M. 2013. Pengaruh Pemberian Serbuk Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*) pada Ransum Terhadap Performan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*). *Jurnal Teknosains*. Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Komariah, I.I. Arief dan Y. Wiguna. 2004. Kualitas Fisik dan Mikrobial Daging Sapi yang Ditambah Jahe (*Zinger Officinale* Roecoe) Pada Konsentrasi dan Lama Penyimpanan yang Berbeda. *Media Peternakan* Vol. 28(2):38-87.
- Lawrie, R.A. 2003. *Ilmu Daging*. Edisi ke-5. Terjemahan: A. Parakkasi. Penerbit UI Press, Jakarta.
- Lukman, D. W. 2010. *Pembusukkan Daging. Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner*. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Lumingkewas M, Manarisi J, Indriaty F, Walangitan A, Mandei J, Suryanto E. 2014. Aktivitas Antifotooksidan dan Komposisi Fenolik dari Daun Cengkeh (*Eugenia Aromatic L*). *J Chem*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Unsrat (7):2.
- Nurhidayati, L. dan Sulistiowati. 2013. *Penetapan Kadar Eugenol dalam Minyak Atsiri dari Tiga Varietas Bunga Cengkeh (Syzygium Aromaticum(L) Merr. & L.M. Perry) Secara Kromatografi Gas*. Seminar Nasional dalam Rangka Lustrum X Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
- Nurwantoro dan S. Mulyani. 2003. *Buku Ajar Dasar Teknologi Hasil Ternak*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pramudyati Y.S, Effendy J. 2009. *Petunjuk Teknis Beternak Ayam Ras Pedaging (Broiler)*. Palembang: Gtz Merang Reed Pilot Project Bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan.
- Pratama A, Dkk., (2015). Evaluasi Karakteristik Sifat Fisik Karkas Ayam Broiler Berdasarkan Bobot Badan Hidup. *Jurnal Ilmu Ternak*. Universitas Padjadjaran.
- Purbowati, E., C. I. Sutrisno., E. Baliarti., S. P. S. Budhi dan W. Lestariana. 2006. Karakteristik Fisik Otot Longissimus dorsi dan Biceps Femoris Domba Lokal Jantan yang Dipelihara di Pedesaan pada Bobot Potong yang Berbeda. *J. Protein*. 13(2): 147-153.
- Rasyaf, M. 2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Razafimamonjison G, Jahiel M, Duclos T, Ramanoelina P, Fawbush F, Danthu P. 2014. Bud, Leaf and Stem Essential Oil Composition Of *Syzygium Aromaticum* From Madagascar, Indonesia And Zanzibar. *International Journal of Basic and Applied Sciences*. 3 (3) : 224-233.
- Razali Z Y, Dkk. 2005. *Bekatul Makanan yang Menyehatkan*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Rorong, J.A. 2008. Uji Aktivitas Antioksidan dari Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dengan Metode Dpph. *Chem. Prog*. Vol. 1, No. 2. *Jurnal Jurusan Kimia*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Saiful, H. 2012. Pengambilan Minyak Atsiri Bunga Cengkeh (*Clove Oil*) Menggunakan Pelarut N-Heksana dan Benzena. *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*. ISSN 2303-0623.

- Saleh, E., B. Kuntoro, E. Purnamasari, dan W. N. H. Zain. 2012. *Teknologi Hasil Ternak*. Suska Press, Pekanbaru.
- Soeparno, 2005. *Ilmu Dan Teknologi Daging*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_.2009. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_.2015. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan Ke – 6 (Edisi Revisi). Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suradi, K. 2006. Perubahan Sifat Fisik Daging Ayam Broiler Post Mortem Selama Penyimpanan Temperatur Ruang (Change of Physical Characteristics of Broiler Chicken Meat Post Mortem During Room Temperature Storage). *Jurnal Ilmu Ternak*, 6 (1): 23 – 27.
- Thomas, A.N.S. 2007. *Tanaman Obat Tradisional*. Kanisus pp: 22-24, Yogyakarta.
- Tugiyanti, E, Yuwanta T, Zuprizal and Rusman. 2014. Supplementation of Vitamin E and C In Feed on Meat Quality, Thiobarbituric Acid Reactive Substance (Tbars) and Myoglobin Level of Muscovy Duck Meat. *J Indonesian Trop Anim Agric*. 39(1):37-44.
- Tursinawati, Y, Dharmana, E. 2015. Efektivitas Pemberian Kombinasi Produk Herbal Antibiotik terhadap Infeksi Salmonella Typhimurium pada Mencit balb/C. *University Research Coloquium* (2): 231-237.
- Windriasari E. 2017. Pengaruh Jarak Transportasi yang Berbeda Terhadap Kualitas Daging (Ph, Warna Dan Whc) Ayam Broiler. *Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan*. Fakultas Peternakan Dan Pertanian Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yashoda K, Sachindra N, Sakhare P, RAO DN. 2001. Microbiological Quality of Broiler Chicken Carcasses Processed Hygienically in a Small Scale Poultry Processing Unit. *Journal of food quality* 24(3):249-259.
- Young, O.A, and J. West. 2001. *Meat Color*. In: *Meat Science and Applications* (Eds: Y.H. Hu, Wai-Kit Nip, Robert W. Rogers, Owen A. Young), Marcel Dekker, Inc, New York
- Yuwanta, T. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Kanisius, Yogyakarta.
- Zuroidah, Munifatus. 2011. *Hewan Ternak*. Universitas Brawijaya, Malang.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Analisis Ragam dan Uji Lanjut BNT Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Daya Ikat Air Daging Ayam Broiler

#### ANOVA

#### DIA (Daya Ikat Air)

Dependent Variable: nilai

| Source          | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|--------|------|
| Corrected Model | 6.592E7 <sup>a</sup>    | 4  | 1.648E7     | 45.656 | .000 |
| Intercept       | 1.733E7                 | 1  | 1.733E7     | 48.025 | .000 |
| Perlakuan       | 6.592E7                 | 4  | 1.648E7     | 45.656 | .000 |
| Error           | 3609403.515             | 10 | 360940.351  |        |      |
| Total           | 8.686E7                 | 15 |             |        |      |
| Corrected Total | 6.953E7                 | 14 |             |        |      |

a. R Squared = .948 (Adjusted R Squared = .927)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

### Multiple Comparisons

Dependent Variable: nilai

|     | (I) perlakuan | (J) perlakuan | Mean<br>Difference (I-J) | Std. Error | Sig.       | 95% Confidence Interval |             |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
|     |               |               |                          |            |            | Lower Bound             | Upper Bound |
| LSD | P0            | P1            | 11.2683                  | 490.53736  | .982       | -1081.7170              | 1104.2537   |
|     |               | P2            | 6.3303                   | 490.53736  | .990       | -1086.6550              | 1099.3157   |
|     |               | P3            | -5233.1717*              | 490.53736  | .000       | -6326.1570              | -4140.1863  |
|     |               | P4            | 12.6193                  | 490.53736  | .980       | -1080.3660              | 1105.6047   |
|     | P1            | P0            | -11.2683                 | 490.53736  | .982       | -1104.2537              | 1081.7170   |
|     |               | P2            | -4.9380                  | 490.53736  | .992       | -1097.9233              | 1088.0473   |
|     |               | P3            | -5244.4400*              | 490.53736  | .000       | -6337.4253              | -4151.4547  |
|     |               | P4            | 1.3510                   | 490.53736  | .998       | -1091.6343              | 1094.3363   |
|     | P2            | P0            | -6.3303                  | 490.53736  | .990       | -1099.3157              | 1086.6550   |
|     |               | P1            | 4.9380                   | 490.53736  | .992       | -1088.0473              | 1097.9233   |
|     |               | P3            | -5239.5020*              | 490.53736  | .000       | -6332.4873              | -4146.5167  |
|     |               | P4            | 6.2890                   | 490.53736  | .990       | -1086.6963              | 1099.2743   |
|     | P3            | P0            | 5233.1717*               | 490.53736  | .000       | 4140.1863               | 6326.1570   |
|     |               | P1            | 5244.4400*               | 490.53736  | .000       | 4151.4547               | 6337.4253   |
|     |               | P2            | 5239.5020*               | 490.53736  | .000       | 4146.5167               | 6332.4873   |
|     |               | P4            | 5245.7910*               | 490.53736  | .000       | 4152.8057               | 6338.7763   |
| P4  | P0            | -12.6193      | 490.53736                | .980       | -1105.6047 | 1080.3660               |             |
|     | P1            | -1.3510       | 490.53736                | .998       | -1094.3363 | 1091.6343               |             |
|     | P2            | -6.2890       | 490.53736                | .990       | -1099.2743 | 1086.6963               |             |
|     | P3            | -5245.7910*   | 490.53736                | .000       | -6338.7763 | -4152.8057              |             |

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 360940.351.

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

**Lampiran 2. Hasil Analisis Ragam dan Uji Lanjut BNT Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Keempukan (DPD Masak) Daging Ayam Broiler**

**ANOVA**

**Keempukan (DPD Masak)**

Dependent Variable:JUMLAH

| Source          | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | .329 <sup>a</sup>       | 4  | .082        | 11.405  | .001 |
| Intercept       | 5.484                   | 1  | 5.484       | 759.602 | .000 |
| PERLAKUAN       | .329                    | 4  | .082        | 11.405  | .001 |
| Error           | .072                    | 10 | .007        |         |      |
| Total           | 5.886                   | 15 |             |         |      |
| Corrected Total | .402                    | 14 |             |         |      |

a. R Squared = .820 (Adjusted R Squared = .748)

### Multiple Comparisons

JUMLAH

LSD

| (I)<br>PERLAKUAN | (J)<br>PERLAKUAN | Mean<br>Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval |             |
|------------------|------------------|--------------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
|                  |                  |                          |            |      | Lower Bound             | Upper Bound |
| KONTROL          | PERLAKUAN 1      | -.1567*                  | .06938     | .048 | -.3113                  | -.0021      |
|                  | PERLAKUAN 2      | -.1633*                  | .06938     | .040 | -.3179                  | -.0087      |
|                  | PERLAKUAN 3      | -.2500*                  | .06938     | .005 | -.4046                  | -.0954      |
|                  | PERLAKUAN 4      | -.4533*                  | .06938     | .000 | -.6079                  | -.2987      |
| PERLAKUAN 1      | KONTROL          | .1567*                   | .06938     | .048 | .0021                   | .3113       |
|                  | PERLAKUAN 2      | -.0067                   | .06938     | .925 | -.1613                  | .1479       |
|                  | PERLAKUAN 3      | -.0933                   | .06938     | .208 | -.2479                  | .0613       |
|                  | PERLAKUAN 4      | -.2967*                  | .06938     | .002 | -.4513                  | -.1421      |
| PERLAKUAN 2      | KONTROL          | .1633*                   | .06938     | .040 | .0087                   | .3179       |
|                  | PERLAKUAN 1      | .0067                    | .06938     | .925 | -.1479                  | .1613       |
|                  | PERLAKUAN 3      | -.0867                   | .06938     | .240 | -.2413                  | .0679       |
|                  | PERLAKUAN 4      | -.2900*                  | .06938     | .002 | -.4446                  | -.1354      |
| PERLAKUAN 3      | KONTROL          | .2500*                   | .06938     | .005 | .0954                   | .4046       |
|                  | PERLAKUAN 1      | .0933                    | .06938     | .208 | -.0613                  | .2479       |
|                  | PERLAKUAN 2      | .0867                    | .06938     | .240 | -.0679                  | .2413       |
|                  | PERLAKUAN 4      | -.2033*                  | .06938     | .015 | -.3579                  | -.0487      |
| PERLAKUAN 4      | KONTROL          | .4533*                   | .06938     | .000 | .2987                   | .6079       |
|                  | PERLAKUAN 1      | .2967*                   | .06938     | .002 | .1421                   | .4513       |
|                  | PERLAKUAN 2      | .2900*                   | .06938     | .002 | .1354                   | .4446       |
|                  | PERLAKUAN 3      | .2033*                   | .06938     | .015 | .0487                   | .3579       |

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .007.

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

**Lampiran 3. Hasil Analisis Ragam dan Uji Lanjut BNT Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Keempukan (DPD Mentah) Daging Ayam Broiler**

**ANOVA**

**Keempukan (DPD Mentah)**

Dependent Variable:JUMLAH

| Source          | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | .011 <sup>a</sup>       | 4  | .003        | .755    | .577 |
| Intercept       | 1.088                   | 1  | 1.088       | 303.375 | .000 |
| PERLAKUAN       | .011                    | 4  | .003        | .755    | .577 |
| Error           | .036                    | 10 | .004        |         |      |
| Total           | 1.135                   | 15 |             |         |      |
| Corrected Total | .047                    | 14 |             |         |      |

a. R Squared = .232 (Adjusted R Squared = -.075)



Multiple Comparisons

JUMLAH

LSD

| (I) PERLAKUAN | (J) PERLAKUAN | Mean Difference<br>(I-J) | Std. Error | Sig.  | 95% Confidence Interval |             |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
|               |               |                          |            |       | Lower Bound             | Upper Bound |
| KONTROL       | PERLAKUAN 1   | -.0667                   | .04890     | .203  | -.1756                  | .0423       |
|               | PERLAKUAN 2   | -.0667                   | .04890     | .203  | -.1756                  | .0423       |
|               | PERLAKUAN 3   | -.0467                   | .04890     | .362  | -.1556                  | .0623       |
|               | PERLAKUAN 4   | -.0167                   | .04890     | .740  | -.1256                  | .0923       |
| PERLAKUAN 1   | KONTROL       | .0667                    | .04890     | .203  | -.0423                  | .1756       |
|               | PERLAKUAN 2   | .0000                    | .04890     | 1.000 | -.1090                  | .1090       |
|               | PERLAKUAN 3   | .0200                    | .04890     | .691  | -.0890                  | .1290       |
|               | PERLAKUAN 4   | .0500                    | .04890     | .331  | -.0590                  | .1590       |
| PERLAKUAN 2   | KONTROL       | .0667                    | .04890     | .203  | -.0423                  | .1756       |
|               | PERLAKUAN 1   | .0000                    | .04890     | 1.000 | -.1090                  | .1090       |
|               | PERLAKUAN 3   | .0200                    | .04890     | .691  | -.0890                  | .1290       |
|               | PERLAKUAN 4   | .0500                    | .04890     | .331  | -.0590                  | .1590       |
| PERLAKUAN 3   | KONTROL       | .0467                    | .04890     | .362  | -.0623                  | .1556       |
|               | PERLAKUAN 1   | -.0200                   | .04890     | .691  | -.1290                  | .0890       |
|               | PERLAKUAN 2   | -.0200                   | .04890     | .691  | -.1290                  | .0890       |
|               | PERLAKUAN 4   | .0300                    | .04890     | .553  | -.0790                  | .1390       |
| PERLAKUAN 4   | KONTROL       | .0167                    | .04890     | .740  | -.0923                  | .1256       |
|               | PERLAKUAN 1   | -.0500                   | .04890     | .331  | -.1590                  | .0590       |
|               | PERLAKUAN 2   | -.0500                   | .04890     | .331  | -.1590                  | .0590       |
|               | PERLAKUAN 3   | -.0300                   | .04890     | .553  | -.1390                  | .0790       |

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .004.

**Lampiran 4. Hasil Analisis Ragam dan Uji Lanjut BNT Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Susut Masak Kualitas Daging Ayam Broiler**

**ANOVA**

**Susut Masak**

Dependent Variable:JUMLAH

| Source          | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | 17.087 <sup>a</sup>     | 4  | 4.272       | 1.456   | .286 |
| Intercept       | 1991.578                | 1  | 1991.578    | 679.058 | .000 |
| PERLAKUAN       | 17.087                  | 4  | 4.272       | 1.456   | .286 |
| Error           | 29.329                  | 10 | 2.933       |         |      |
| Total           | 2037.993                | 15 |             |         |      |
| Corrected Total | 46.415                  | 14 |             |         |      |

a. R Squared = .368 (Adjusted R Squared = .115)

Multiple Comparisons

JUMLAH

LSD

| (I) PERLAKUAN | (J) PERLAKUAN | Mean Difference<br>(I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval |             |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
|               |               |                          |            |      | Lower Bound             | Upper Bound |
| KONTROL       | PERLAKUAN 1   | -1.9733                  | 1.39830    | .189 | -5.0889                 | 1.1423      |
|               | PERLAKUAN 2   | -2.4833                  | 1.39830    | .106 | -5.5989                 | .6323       |
|               | PERLAKUAN 3   | -3.2133*                 | 1.39830    | .044 | -6.3289                 | -.0977      |
|               | PERLAKUAN 4   | -2.0600                  | 1.39830    | .171 | -5.1756                 | 1.0556      |
| PERLAKUAN 1   | KONTROL       | 1.9733                   | 1.39830    | .189 | -1.1423                 | 5.0889      |
|               | PERLAKUAN 2   | -.5100                   | 1.39830    | .723 | -3.6256                 | 2.6056      |
|               | PERLAKUAN 3   | -1.2400                  | 1.39830    | .396 | -4.3556                 | 1.8756      |
|               | PERLAKUAN 4   | -.0867                   | 1.39830    | .952 | -3.2023                 | 3.0289      |
| PERLAKUAN 2   | KONTROL       | 2.4833                   | 1.39830    | .106 | -.6323                  | 5.5989      |
|               | PERLAKUAN 1   | .5100                    | 1.39830    | .723 | -2.6056                 | 3.6256      |
|               | PERLAKUAN 3   | -.7300                   | 1.39830    | .613 | -3.8456                 | 2.3856      |
|               | PERLAKUAN 4   | .4233                    | 1.39830    | .768 | -2.6923                 | 3.5389      |
| PERLAKUAN 3   | KONTROL       | 3.2133*                  | 1.39830    | .044 | .0977                   | 6.3289      |
|               | PERLAKUAN 1   | 1.2400                   | 1.39830    | .396 | -1.8756                 | 4.3556      |
|               | PERLAKUAN 2   | .7300                    | 1.39830    | .613 | -2.3856                 | 3.8456      |
|               | PERLAKUAN 4   | 1.1533                   | 1.39830    | .429 | -1.9623                 | 4.2689      |
| PERLAKUAN 4   | KONTROL       | 2.0600                   | 1.39830    | .171 | -1.0556                 | 5.1756      |
|               | PERLAKUAN 1   | -.0867                   | 1.39830    | .952 | -3.0289                 | 3.2023      |
|               | PERLAKUAN 2   | -.4233                   | 1.39830    | .768 | -3.5389                 | 2.6923      |
|               | PERLAKUAN 3   | -1.1533                  | 1.39830    | .429 | -4.2689                 | 1.9623      |

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 2.933.

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

**Lampiran 5. Hasil Analisis Ragam dan Uji Lanjut BNT Penambahan Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap pH Kualitas Daging Ayam Broiler**

**ANOVA**

**pH**

**Tests of Between-Subjects Effects**

Dependent Variable:JUMLAH

| Source          | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | .024 <sup>a</sup>       | 4  | .006        | .680    | .621 |
| Intercept       | 597.494                 | 1  | 597.494     | 6.668E4 | .000 |
| PERLAKUAN       | .024                    | 4  | .006        | .680    | .621 |
| Error           | .090                    | 10 | .009        |         |      |
| Total           | 597.608                 | 15 |             |         |      |
| Corrected Total | .114                    | 14 |             |         |      |

a. R Squared = .214 (Adjusted R Squared = -.101)

Multiple Comparisons

JUMLAH

LSD

| (I) PERLAKUAN | (J) PERLAKUAN | Mean Difference<br>(I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval |             |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
|               |               |                          |            |      | Lower Bound             | Upper Bound |
| KONTROL       | PERLAKUAN 1   | .1133                    | .07729     | .173 | -.0589                  | .2855       |
|               | PERLAKUAN 2   | .0733                    | .07729     | .365 | -.0989                  | .2455       |
|               | PERLAKUAN 3   | .0667                    | .07729     | .409 | -.1055                  | .2389       |
|               | PERLAKUAN 4   | .1067                    | .07729     | .198 | -.0655                  | .2789       |
| PERLAKUAN 1   | KONTROL       | -.1133                   | .07729     | .173 | -.2855                  | .0589       |
|               | PERLAKUAN 2   | -.0400                   | .07729     | .616 | -.2122                  | .1322       |
|               | PERLAKUAN 3   | -.0467                   | .07729     | .559 | -.2189                  | .1255       |
|               | PERLAKUAN 4   | -.0067                   | .07729     | .933 | -.1789                  | .1655       |
| PERLAKUAN 2   | KONTROL       | -.0733                   | .07729     | .365 | -.2455                  | .0989       |
|               | PERLAKUAN 1   | .0400                    | .07729     | .616 | -.1322                  | .2122       |
|               | PERLAKUAN 3   | -.0067                   | .07729     | .933 | -.1789                  | .1655       |
|               | PERLAKUAN 4   | .0333                    | .07729     | .675 | -.1389                  | .2055       |
| PERLAKUAN 3   | KONTROL       | -.0667                   | .07729     | .409 | -.2389                  | .1055       |
|               | PERLAKUAN 1   | .0467                    | .07729     | .559 | -.1255                  | .2189       |
|               | PERLAKUAN 2   | .0067                    | .07729     | .933 | -.1655                  | .1789       |
|               | PERLAKUAN 4   | .0400                    | .07729     | .616 | -.1322                  | .2122       |
| PERLAKUAN 4   | KONTROL       | -.1067                   | .07729     | .198 | -.2789                  | .0655       |
|               | PERLAKUAN 1   | .0067                    | .07729     | .933 | -.1655                  | .1789       |
|               | PERLAKUAN 2   | -.0333                   | .07729     | .675 | -.2055                  | .1389       |
|               | PERLAKUAN 3   | -.0400                   | .07729     | .616 | -.2122                  | .1322       |

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .009.

## Lampiran 6. Dokumentasi Pembuatan Kandang



**6.1 Pembuatan Sekat kandang**



**6.2 Kandang Persekat dan Lampu setiap Sekat**



**6.3 Pemberian Sekam setiap Sekat Kandang**



**6.4 Pemberian Koran pada Dinding Sekat Kandang**

**Lampiran 7. Dokumentasi Pemeliharaan Ayam Broiler Dengan Pemberian Pakan Di Tambah dengan Bubuk Daun Cengkeh**



**7.1 Pengukuran Bubuk Daun Cengkeh untuk ditambahkan pada Pakan**



**7.2 Pencampuran Pakan dengan Bubuk Daun Cengkeh**



**7.3 Penimbangan Bobot Badan Doc Hari Pertama**



**7.4 Pemberian Pakan yang ditambahkan Bubuk Daun Cengkeh**



**7.5 Pemberian Air Minum**

## Lampiran 8. Dokumentasi Pembuatan Bubuk Daun Cengkeh



**8.1 Daun Cengkeh Kering**



**8.2 Penepungan Bubuk Daun Cengkeh dengan Blender**



**8.3 Pengayakan Bubuk Daun Cengkeh**



**Lampiran 9. Dokumentasi Pengujian Kualitas Daging Setelah 30 Hari  
Pemeliharaan**



**9.1 Penyembelihan Ayam  
Broiler**



**9.2 Pengambilan Daging Dada  
untuk diuji Kualitas**



**9.3 Uji Daya Ikat Air**



**9.4 Uji Keempukan (Daya  
Putus Daging)**



**9.5 Uji Susut Masak**



**9.6 Uji pH**

## BIOGRAFI



Penulis bernama Nurjihan Islami Ansar dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1997 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dilahirkan dari pasangan ayah bernama Ansar Suaib dan ibu bernama Salma, pekerjaan ayah sebagai karyawan swasta dan ibu seorang ibu rumah tangga, penulis mempunyai seorang adik bernama Fahira Azzahra biasa dipanggil cikal. Penulis memulai pendidikannya di SD Inpres Bira 1, Kec Tamalanrea kemudian pada saat kelas 3 pindah ke SD Inpres Sanging-sanging, Gowa. Melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP/MTS Guppi Samata, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gowa. Penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur masuk mandiri. Sejak memulai menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini sampai tugas akhir banyak pelajaran dan pengalaman yang dapat di ambil, mulai dari bersabar disiplin bertanggung jawab dan pantang menyerah. Penulis bersyukur dapat kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Peternakan.

## ABSTRAK

**Nama** : Nurjihan Islami Ansar  
**NIM** : 60700116064  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) terhadap Kualitas Daging Broiler

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian bubuk daun cengkeh terhadap daya ikat air, keempukan, susut masak, dan pH daging broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. P0 (Ransum Basal + control), P1 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 2%), P2 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 4%), P3 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 6%), P4 (Ransum Basal + Bubuk daun cengkeh 8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bubuk daun cengkeh pada level tertentu dapat berpengaruh nyata pada daya ikat air ( $P > 0,05$ ) dibandingkan dengan susut masak, keempukan dan pH pada daging broiler.

**Kata Kunci** : Broiler, Bubuk daun cengkeh, Susut Masak, Daya Ikat Air, pH dan Keempukan.