

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL KLIKA ANAK
DARA (*Croton oblangus burm. F*) TERHADAP BAKTERI PATOGEN
DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIFUSI AGAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

DESY NIRWANA SUCIATI
NIM. 70100109023

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

**UJI EFEKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK KULIT KAYU MANIS
(*Cinnamomum burmannii*) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*) YANG
DIINDUKSI GLUKOSA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

NUCIFERA
NIM. 70100109057

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nucifera
Nim : 70100109057
Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 4 Juni 1991
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1
Alamat : Perumahan Mangasa Permai, Jln. Talasalapang 1
Judul : Uji Efektivitas Antidiabetes Ekstrak Kulit Kayu Manis
(*Cinnamomum burmannii*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) yang Diinduksi Glukosa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2014

Penulis,

NUCIFERA
NIM. 70100109057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “UJI EFEKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK KULIT KAYU MANIS (*Cinnamomum burmannii*) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*) YANG DIINDUKSI GLUKOSA” yang disusun oleh Nucifera, NIM: 70100109057, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 M yang bertepatan dengan tanggal... Rabiul awal 1435 H , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, Januari 2015 M
Rabiul awal 1436 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.,Sc (.....)
Sekretaris : Nursalam Hamzah, S.Si.,M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing I : Haeria, S.Si.,M.Si. (.....)
Pembimbing II : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. (.....)
Penguji I : Mukhriani, S.Si, M.Si,Apt. (.....)
Penguji II : Drs. Dudung Abdullah (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc.
Nip. 19550203 198312 1001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah di berikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penyelesaian penelitian dan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Terutama kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Bapak Drs.Tenggarudin M.Pd., dan Ibunda Siti Najima.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang,SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci,M.Si.,Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Drs. Wahyuddin. G, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Nursalam Hamzah,S.Si.,M.Si.,Apt selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi sekaligus sebagai koordinator seminar yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.

8. Drs. Dudung Abdullah sebagai penguji keislaman yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
9. Haeria, S.Si.,M.Si., selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan.
10. Mukhriani,M.Si.,Apt., sebagai Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik selama di bangku kuliah.
12. Rekan-rekan mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 terkhusus kepada rekan-rekan angkatan 2009 dan para Laboran dan yang telah memberikan bantuan selama penelitian baik secara fisik maupun dalam bentuk motivasi.
13. Adik-adik mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Makassar, Oktober 2014

PENULIS

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Uraian Tanaman.....	7
1. Klasifikasi Tanaman.....	7
2. Penamaan Tanaman	7
3. Deskripsi Tanaman.....	8
4. Kandungan Tanaman	8
5. Kegunaan.....	9
B. Simplisia.....	10
C. Serbuk dan Pengayakan	11
D. Ekstraksi.....	13
1. Maserasi	13
2. Perkolasi.....	13
E. Uraian Mencit.....	15
1. Klasifikasi Hewan.....	15
2. Deskripsi Hewan	15
F. Uraian Diabetes Mellitus	17
1. Pendahuluan.....	17
2. Pengertian.....	19
3. Klasifikasi.....	20

	4. Etiologi.....	23
	5. Patofisiologi.....	26
	G. Pemeriksaan Kadar Gula Darah	28
	H. Tindakan Umum Untuk Diabetes	29
	I. Pengobatan	29
	J. Pemilihan Glibenklamid.....	30
	K. Penelitian Sebelumnya.....	31
	L. Tinjauan Islam Mengenai Kayu Manis	33
BAB	III METODE PENELITIAN	38
	A. Alat Dan Bahan Penelitian	38
	B. Prosedur Kerja.....	38
	C. Penyiapan Hewan Uji.....	40
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
	A. Hasil Penelitian	42
	B. Pembahasan	43
BAB	V PENUTUP	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran	47
	DAFTAR PUSTAKA	48
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51
	BIOGRAFI.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halus menurut FI edisi IV	12
2. Kadar glukosa darah mencit yang diberi Na.CMC	60
3. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak kayu manis 7,8 mg	60
4. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak kayu manis 15,6 mg.....	61
5. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak kayu manis 31,2 mg.....	61
6. Kadar glukosa darah mencit yang diberi suspensi glibenklamid 0,02 mg.....	62
7. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada jam ke-1	63
8. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada jam ke-2	64
9. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada jam ke-3	65
10. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada jam ke-4	66
11. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada jam ke-5	67
12. Perhitungan Statistik dengan Rancangan Acak Kelompok	68
13. Tabel Anava	72
14. Tabel Analisis BNT	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Skema kerja.....	51
2 Pohon kayu manis	74
3 Kulit kayu manis	74
4 Glukometer	75
5 Pengukuran kadar glukosa darah	75
6 Pemberian sampel melalui oral.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Skema kerja.....	55
2 Perhitungan dosis Glibenklamid	56
3 Data kadar glukosa darah dengan pemberian perlakuan.....	64
4 Persen penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1,2,3,4,5	67
5 Perhitungan statistik dan rancangan acak kelompok	72
6 Perhitungan Anava.....	74
7 Analisis Beda Nyata Terkecil (BNT).....	76
8 Gambar.....	78

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nucifera
NIM : 70100109057
Judul Skripsi : “Uji Efektivitas Antidiabetes Ekstrak Kulit Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) yang Diinduksi Glukosa”

Kayu manis mengandung flavonoid yang bekerja dengan meningkatkan metabolisme glukosa menjadi energi. Proses tersebut meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga kadar gula dalam darah menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) dalam mengatasi hiperglikemia atau diabetes mellitus. Penelitian ini termasuk jenis eksperimental laboratorik yang menggunakan pendekatan “Post test only control group design” dengan menggunakan binatang percobaan sebagai objek penelitian, dimana 15 ekor mencit putih jantan dengan berat 20 sampai 30 gram yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Seluruh mencit dibuat hiperglikemia dengan diinduksi glukosa 200 mg/30 g BB. Setelah kadar glukosa darah awal mencit diukur, pada kelompok I diberi Na.CMC sebagai kontrol negatif, kelompok II diberi ekstrak kulit kayu manis 7,8 mg/30 g BB, kelompok III diberi ekstrak kulit kayu manis 15,6 mg/30 g BB, kelompok IV diberi ekstrak kulit kayu manis 31,2 mg/30 g BB, dan kelompok V diberi suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB sebagai kontrol positif, lalu kadar glukosa darah mencit diukur dengan menggunakan glukometer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak kulit kayu manis dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit, dibuktikan dengan nilai F hitung perlakuan yang lebih besar yakni 189,8 dari pada nilai F tabel 5% dan 1% yakni 2,05 dan 3,55.

Kata kunci : Kayu Manis, Diabetes, dan Mencit.

ABSTRACT

Author name : Nucifera
NIM : 70100109057
Title of Script : “The Experiment of Effectiveness of Cinnamons Extract (*Cinnamomum burmannii*) as Antidiabetic to Mice (*Mus musculus*) with Glucose Induction”

Cinnamon has a flavonoid which work to improve glucose metabolism into energy. That process increasing cells sensitivity to insulin, so the blood glucose level will decrease. This research is purpose to find out the effectiveness of cinnamon’s extract (*Cinnamomum burmannii*) in dealing with hyperglycemic or diabetes mellitus. This study can be categorized as experimental laboratory research “Post test only control group design” that used animal as sample of study, which 15 white male mice, with the weight 20-30 gram and classificated in 5 groups , all mice were made to be hyperglycemic by giving them 200 mg/30 g BB glucose induction. After the initial of blood glucose level measured, for group 1 is given Na.CMC as negative control, group 2 is given 7,8 mg/30 g BB, group 3 is given 15,6 mg/30 g BB, group 4 is given 31,2 mg/30 g BB and group 5 is given Glibenclamid suspense 0,02 mg/30 g BB as positive control, then the blood glucose level were measured. This research shown that cinnamon extract can decrease blood glucose level of mice, it’s proven by value of F treatment 189,8 bigger than F table 5% and 1% which are 2,05 and 3,55.

Key words : Cinnamon, Diabetes Mellitus, and Mice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diabetes atau penyakit gula darah adalah salah satu penyakit yang cukup menonjol diantara penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit kanker. Penyakit ini ditemukan di semua belahan dunia dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Saat ini, diabetes telah menjadi epidemi dengan kejadian di seluruh dunia sekitar 5% dari semua populasi (Jarald, Joshi dan Jain, 2008). Menurut WHO, prevalensi penyakit ini akan tumbuh dari 171 juta pada tahun 2000 menjadi 366 juta di tahun 2030 (Cetto, Jimenez dan Vazquez, 2007). Indonesia berada di urutan ke-4 setelah negara India, China, dan Amerika dengan jumlah diabetes sebesar 8,4 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 21,3 juta orang di tahun 2030 (Depkes, 2010).

Diabetes mellitus merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif (Wadkar et al, 2008). Jika kadar gula dalam darah terus meningkat, sehingga tidak terkontrol, lama kelamaan akan timbul komplikasi. Komplikasi tersebut meliputi komplikasi mikrovaskular (retinopati, neuropati, nefropati) dan komplikasi makrovaskular (Jarald, Joshi dan Jain, 2008).

Untuk memperkecil resiko makin parahnya penyakit dan menurunkan resiko komplikasi diabetes mellitus, diperlukan penanganan secara disiplin yang mencakup terapi non-obat dan terapi obat (Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2005). Pengobatan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan pemberian insulin, obat

hipoglikemik oral dan obat herbal (Wadkar et al, 2007). Sejak 1997, WHO merencanakan program hidup sehat melalui *back to nature* karena obat-obat kimia selain harganya mahal biasanya mempunyai efek samping yang merugikan kesehatan (Setiadi dan Sarwono, 2007).

Banyaknya tanaman yang digunakan secara tradisional oleh masyarakat Indonesia sebagai obat diabetes, menyebabkan perlunya dilakukan pengujian efektivitas tanaman tersebut sebagai antidiabetes. Salah satu tanaman obat yang bisa dijadikan obat herbal untuk penyakit diabetes mellitus adalah kayu manis (Hongxiang, Tang dan Liang, 2009).

Dalam ilmu taksonomi tumbuhan kayu manis dikenal dengan nama latin *Cinnamomum burmanii* dan termasuk dalam familia *Lauraceae*. Sejak dulu kayu manis dikenal sebagai bumbu penyedap masakan dan pembuatan kue, dengan memakai batang kulitnya yang kemudian dikeringkan. Sejak 5000 tahun yang lalu kayu manis telah dikenal, konon tertulis di *Old Testament*. Di jaman Mesir kuno dipakai untuk membalsem mummi, di China tertulis dalam buku pengobatan tradisional sejak 2700 tahun sebelum Masehi (Hongxiang, Tang dan Liang, 2009).

Kayu manis, merupakan tumbuhan dengan pohon hijau dengan panjang 10-15 m dengan bunga kehijau-hijauan dan telah diketahui sejak zaman purbakala. Hal ini telah disebutkan dalam naskah Cina 4000 tahun yang lalu dan mesir. Biasanya kayu manis digunakan sebagai bumbu, preservatif, dan agen farmakologi. Tinjauan dari segi keamanan dan kemanjurannya sebagai antioksidant, mengobati infeksi *Helicobakter pilory*, mengaktifasi kortex olfaktori di otak, mencegah candidiasis oral pada penderita HIV dan mengobati infeksi kronik salmonella telah dipublikasikan.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan dalam kayu manis meningkatkan fungsi insulin (Kiran Panickar dkk, 2009).

Kayu manis mengandung flavonoid yang bekerja dengan meningkatkan metabolisme glukosa dan mengubah glukosa menjadi energi. Proses tersebut meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga kadar glukosa dalam darah menurun (Richard Anderson, 2004).

Banyak sekali obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan DM, salah satunya adalah kayu manis (*Cinnamomum burmanii*). Pengobatan DM dengan menggunakan kayu manis telah diteliti di USA, Malaysia, Pakistan (Fortune Star Indonesia, 2007). Hasilnya, kandungan kayu manis dapat menurunkan kadar glukosa darah.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang efek kulit kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) terhadap penurunan glukosa darah pada mencit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah ;

1. Apakah kulit kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) dapat menurunkan kadar gula darah mencit yang telah diinduksi glukosa?
2. Berapakah konsentrasi ekstrak kulit kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) yang dapat menurunkan kadar gula darah mencit ?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai tanaman kayu manis yang dapat digunakan sebagai alternatif penyembuhan penyakit?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Batasan Masalah

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekstrak Kulit Kayu Manis yang diperoleh dari Pasar Limbung Kab.Gowa, hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) sebanyak 15 ekor, dosis ekstrak kulit kayu manis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg dan parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah efektivitas antidiabetes pada hewan coba.

2. Definisi Operasional

- a. Ekstrak merupakan suatu hasil dari proses ekstraksi yang mengandung senyawa-senyawa kimia aktif baik itu dari tumbuhan, hewan dan mineral.
- b. Efektivitas antidiabetes merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh suatu ekstrak tumbuhan baik itu dari daun, kulit, biji, bunga, akar dan buah yang dapat mencegah dan menurunkan penyakit diabetes.
- c. Diabetes merupakan suatu keadaan peningkatan kadar gula (glukosa) dalam darah akibat kekurangan insulin baik relatif maupun absolut.

3. Variabel penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Variabel bebas: dosis ekstrak Kulit Kayu Manis 7,8 mg, 15,6 mg, 31,2 mg, Glibenklamid 0,02 mg, Na.CMC 1%.
- b. Variabel terikat: Penurunan kadar glukosa darah yang telah diinduksi pada hewan coba dengan menggunakan ekstrak kulit kayu manis.

D. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan rencana penelitian ini, Antara lain:

1. Pada tahun 2009, Paul Crawford, dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Kayu Manis dalam Menurunkan Hemoglobin A1C pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2: Metode Random dan Kontrol Percobaan”. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar glukosa darah manusia dalam waktu 40 hari dengan dosis 6 g/hari.
2. Pada tahun 2004, Mahpara Safdar dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “Efek Variasi Dosis Kulit Kayu Manis pada Glukosa Darah Penderita Diabetes”. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa kulit kayu manis mampu menurunkan kadar glukosa darah pasien dengan variasi dosis 1, 3, dan 6 g/hari
3. Pada tahun 2009, Stephanie Logamarta dengan judul penelitian, “Uji Efek Antidiabetes Ekstrak Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit (*Mus musculus*) yang Diinduksi Aloksan”. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) mampu menurunkan kadar glukosa darah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) dapat menurunkan kadar gula darah yang telah diinduksi glukosa.

- b. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) dapat menurunkan kadar gula darah mencit.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Islam mengenai tanaman kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) yang dapat digunakan sebagai alternatif penyembuhan penyakit.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu Farmakologi tentang Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) sebagai salah satu tanaman obat Indonesia.
- b. Manfaat praktis, apabila penelitian terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah, maka kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk penyakit Diabetes Mellitus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman*

1. Klasifikasi (Rismunandar dan Paimin, 2001).

Dunia	: Plantae
Divisi	: Gymnospermae
Subdivisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Sub kelas	: Dialypetalae
Ordo	: Polycarpicae
Famili	: Lauraceae
Genus	: Cinnamomum
Spesies	: <i>Cinnamomum burmannii</i>

2. Penamaan Tanaman

Nama ilmiah : *Cinnamomum burmannii* (Nees.) BI. Nama asing : Kaneelkassia, Cinnamomum tree (inggris); yin xiang (cina). Nama daerah : Sumatera: Holim; holim manis modang. Batak: siak-siak; kanigar. Melayu: kayu manis. Minang: madang kulit manih.. Jawa: Huru mentek. Sunda: kiamis. Kangean: kanyengar. Nusa Tenggara Kesinga: kecingar. Bali: cingar. Sasak: onte. Sumba: Kaninggu. Flores: Puu ndinga (Sarwono, 2007).

3. Deskripsi Tanaman

Dibudidayakan untuk diambil kulit kayunya, di daerah pegunungan sampai ketinggian 1.500 m. Tinggi pohon 1-12 m, daun lonjong atau bulat telur, warna hijau, daun muda berwarna merah. Kulit berwarna kelabu, dijual dalam bentuk kering, setelah dibersihkan kulit bagian luar, dijemur dan digolongkan menurut panjang asal kulit (dari dahan atau ranting). Daun kayu manis duduknya bersilang atau dalam rangkaian spiral. Panjangnya sekitar 9–12 cm dan lebar 3,4–5,4 cm, tergantung jenisnya. Warna pucuknya kemerahan, sedangkan daun tuanya hijau tua. Bunganya berkelamin dua atau bunga sempurna dengan warna kuning, ukurannya kecil. Buahnya adalah buah buni, berbiji satu dan berdaging. Bentuknya bulat memanjang, buah muda berwarna hijau tua dan buah tua berwarna ungu tua (Rismunandar dan Paimin, 2001).

4. Kandungan

Minyak atsiri yang berasal dari kulit komponen terbesarnya ialah cinnaldehid 60–70% ditambah dengan eugenol, beberapa jenis aldehida, benzylbenzoat, phelandrene dan lain-lainnya. Kadar eugenol rata-rata 80–66%. Dalam kulit masih banyak komponen-komponen kimiawi misalnya: damar, pelekat, tanin, zat penyamak, gula, kalsium oksalat, dua jenis insektisida cinnzelanin dan cinnzelanol, cumarin dan sebagainya (Rismunandar dan Paimin, 2001).

Kulit kayu manis mempunyai rasa pedas dan manis, berbau wangi, serta bersifat hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam kayu manis

diantaranya minyak atsiri eugenol, safrole, sinamaldehyde, tannin, kalsium oksalat, damar, -sitosterol, kolin dan zat penyamak (Hariana, 2007:16).

Kayu manis memiliki minyak atsiri, senyawa resin, asam sinamat, sinamaldehyd. Minyak atsiri seperti trans-sinamaldehyd, oksida caryophillene, L-borneol, L-bornil asetat, eugenol, b-caryophillene, E-nerolidol, dan sinamil asetat. Beberapa unsur lainnya adalah terpinolene, -terpineol, -cubebene, dan -thujene 1. (Jakhetia, 2010:19-23)

5. Kegunaan

Kayu manis biasanya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan pengawet dan agen farmakologi. Tetapi penelitian terbaru menemukan bahwa kayu manis dapat meningkatkan fungsi dari insulin sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan sebagai pelindung saraf (Kiran Panickar dkk, :87-88).

Dalam pengobatan, kayu manis bertindak seperti minyak atsiri lainnya dan memiliki khasiat untuk pilek, kayu manis juga telah digunakan untuk mengobati diare dan masalah lain dari sistem pencernaan. Kayu manis memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Minyak essensial dari kayu manis juga memiliki sifat antimikroba yang membantu dalam pengawetan makanan tertentu. Kayu manis telah dilaporkan memiliki efek farmakologis yang luar biasa dalam pengobatan diabetes tipe II. Kayu manis juga secara tradisional telah digunakan untuk mengobati sakit gigi dan menghilangkan bau mulut dan penggunaan regulernya diyakini untuk mencegah flu biasa dan membantu melancarkan pencernaan.(Jhaketia, 2010: 19-23)

Kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) mengandung antioksidan antara lain eugenol dan methylhydroxy chalcone polymer (MHCP). MHCP merupakan suatu polyphenol (flavonoid). MHCP mempunyai kerja seperti insulin, yaitu:

- a. Aktivasi sintesis glikogen
- b. Meningkatkan *up take* glukosa
- c. Menghambat glikogen sintase kinase 3
- d. Aktivasi insulin reseptor kinase
- e. Menghambat defosforilasi reseptor insulin

Flavonoid bekerja dengan meningkatkan metabolisme glukosa dan mengubah glukosa menjadi energi. Proses tersebut meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga kadar glukosa darah menurun (Richard A Anderson, 2004).

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat merah, ungu dan biru, dan sebagian zat warna kuning yang ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Senyawa-senyawa flavonoid terdapat dalam semua bagian tumbuhan tinggi, seperti bunga, daun, ranting, buah, kayu, kulit kayu dan akar. Flavonoid dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker (Arifin, 1986).

B. *Simplisia*

Simplisia adalah bahan alam yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman dengan eksudat tanaman, yang dimakdud dengan

eksudat adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dipisahkan dari sel nya. Simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa bahan kimia utuh atau zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, sedangkan simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan/mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni (Depkes, 1995).

Tahap penyiapan simplisia kulit kayu manis yakni:

- a) pencucian dan pembersihan, dalam hal ini persediaan air bersih dan mengalir.
- b) pengeringan kembali, tempat penjemuran yang bersih.
- c) pemotongan dan pemilihan, pemotongan menggunakan mesin pemotong yang akurat.
- d) penyediaan tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan agar tidak ada kontaminasi dengan kotoran tikus maupun rupa-rupa serangga, gudang dilengkapi dengan ventilasi yang cukup baik untuk menghindarkan terjadinya fermentasi lanjutan (nafermentasi), gudang disucihamakan dengan menggunakan insektisida.

C. Serbuk dan Pengayakan

Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral/dalam atau pemakaian luar. Diameter 1,2 – 1,7 mikrometer dengan atau tanpa vehikulum serta untuk penggunaan oral atau topical.

Pengayakan adalah sebuah cara pengelompokan butiran, yang akan dipisahkan menjadi satu atau beberapa kelompok. Dengan demikian, dapat dipisahkan antara partikel lolos ayakan (butir halus) dan yang tertinggal diayakan (butir kasar). Ukuran butiran tertentu yang masih bisa melintasi ayakan, dinyatakan sebagai butiran batas (Voigt, 1994). Teknik pemisahan dengan menggunakan pengayakan, merupakan teknik yang tertua, teknik ini dapat dilakukan untuk campuran heterogen khususnya campuran dalam fasa padat. Proses pemisahan didasari atas perbedaan ukuran partikel didalam campuran tersebut. Sehingga ayakan memiliki ukuran pori atau lubang tertentu, ukuran pori dinyatakan dalam satuan mesh.

Tabel 1. Klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halus menurut Farmakope Indonesia Edisi IV.

Klasifikasi Serbuk	Simplisia Nabati dan Simplisia Hewani			Bahan Kimia		
	Nomor Nominal Serbuk ¹	Batas derajat halus ²		Nomor Nominal Serbuk ¹	Batas derajat halus ²	
		%	Nomor Pengayak		%	Nomor Pengayak
Sangat Kasar	8	20	60			
Kasar	20	40	60	20	60	40
Setengah Kasar	40	40	80	40	60	60
Halus	60	40	100	80	60	120
Sangat Halus	80	100	80	120	100	120

Keterangan :

¹ semua partikel serbuk melewati pengayak dengan nomor nominal tertentu

² batas persentase yang melewati pengayak dengan ukuran yang telah ditentukan.

D. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Pelarut polar akan melarutkan solut yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan solut yang non polar atau disebut dengan “*like dissolve like*” (Ditjen POM, 1986).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Ditjen POM, 1979).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding (Parameter, 2000).

1. Ekstraksi dengan cara dingin:

a. Maserasi

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (suhu kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan atau penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) (Parameter, 2000).

2. Perkolasi dengan cara panas:

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

b. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50⁰C.

c. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur (96-98⁰C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

d. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai titik didih air (Parameter, 2000).

e. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi di dalam sebuah kantung ekstraksi

(kertas saring) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1955).

E. Uraian Mencit

1. Klasifikasi (Malole dan Promono, 1989).

Dunia	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub-filum	: Vertebrata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Rodentia
Sub-ordo	: Myoimorphia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Deskripsi Hewan

Mencit hidup di berbagai daerah mulai dari yang beriklim dingin, sedang maupun panas dan dapat hidup dalam kandang atau hidup bebas sebagai hewan liar. Mencit liar lebih suka suhu lingkungan yang tinggi namun dapat beradaptasi dengan baik pada suhu yang rendah. Bulu mencit liar berwarna abu-abu dan warna perut sedikit lebih pucat, mata berwarna hitam dan kulit berpigmen.

Berdasarkan sifat genetiknya terdapat tiga macam mencit:

- a. *Random Breed Mice* yaitu mencit yang dikawinkan secara acak dengan mencit yang tidak ada hubungan keturunan.
- b. *Inbreed mice* yaitu mencit hasil perkawinan antara saudara sebanyak lebih dari 20 turunan, dan
- c. *F1-Hybrid* yaitu mencit hasil perkawinan antara dua galur yang *inbreed* (Malole dan Promono, 1989).

Berdasarkan lingkungan hidupnya mencit dibagi dalam empat kategori:

- a. Mencit bebas hama yaitu mencit yang bebas dari mikroorganisme yang dapat dideteksi.
- b. Mencit yang hanya mengandung mikroorganisme tertentu.
- c. Mencit yang bebas mikroorganisme patogen tertentu, dan
- d. Mencit biasa yaitu mencit yang dipelihara tanpa perlakuan khusus.

Mencit merupakan hewan yang banyak digunakan sebagai hewan model laboratorium dengan kisaran penggunaan antara 40-80%. Berbagai keunggulan seperti: cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya tinggi dan sifat anatomi dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole dan Pramono, 1989).

Mencit banyak digunakan sebagai hewan laboratorium (khususnya digunakan dalam penelitian biologi), karena memiliki keunggulan-keunggulan seperti siklus hidup relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi, mudah ditangani, serta sifat produksi dan karakteristik reproduksinya mirip hewan lain, seperti sapi, kambing, domba, dan babi (Moriwaki et al, 1994).

F. Uraian Diabetes Mellitus

1. Pendahuluan

Pankreas merupakan organ abdomen difus dan besar yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin pankreas berkaitan dengan sintesis dan pengeluaran enzim-enzim pencernaan dan natrium bikarbonat dari sel-sel khusus pankreas yang disebut sel asinus (acini). Sedangkan fungsi endokrin pankreas adalah memproduksi dan melepaskan hormon insulin, glukagon, dan somastostatin. Sel-sel ini masing-masing diproduksi oleh sel-sel khusus yang berbeda di pankreas, yang disebut Pulau Langerhans (Corwin, 2008).

Sintesis insulin di pankreas berasal dari pembelahan enzimatik molekul proinsulin, yang merupakan produk pembelahan molekul preproinsulin yang lebih besar. Proinsulin terdiri dari fragmen peptida A yang berhubungan dengan fragmen peptida B oleh fragmen peptida C dan dua ikatan disulfida. Pemecahan enzimatik hubungan peptida C mengakibatkan peptida A dan B saling berikatan hanya melalui dua ikatan disulfida. Dalam bentuk ini insulin bersirkulasi tanpa ikatan di dalam plasma (Corwin, 2008).

Insulin dilepaskan pada tingkat/ kadar basal oleh sel-sel beta Pulau Langerhans. Stimulasi utama untuk pelepasan insulin di atas kadar basal adalah peningkatan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah puasa dalam keadaan normal 80-90 mg/100 ml darah. Apabila glukosa darah meningkat melebihi 100 mg/100 ml darah, maka sekresi insulin dari pankreas dengan cepat meningkat dan kembali ke

tingkat basal dalam 2-3 jam. Insulin adalah hormon utama pada stadium absorptif pencernaan yang terjadi setelah makan.

Insulin bersirkulasi dalam plasma dan bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor insulin yang terdapat di sebagian besar sel tubuh. Setelah berikatan, insulin bekerja melalui sistem perantara protein kinase perantara kedua untuk menyebabkan peningkatan transportasi molekul glukosatransporter, glukosa yang berada di luar membran sel. Molekul transporter-glukosa, yang disebut transpoter-glukosa glut-4, berperan penting untuk memfasilitasi pelarutan glukosa ke sebagian besar sel. Pada saat ditransportasikan masuk ke dalam sel, glukosa dapat digunakan segera untuk menghasilkan energi melalui siklus Krebs atau dapat disimpan di dalam sel sebagai glikogen, polimer glukosa, yang merupakan bentuk penyimpanan glukosa. Ketika glukosa masuk ke dalam sel, kadar glukosa dalam darah menurun, sehingga menurunkan stimulasi pelepasan insulin lebih lanjut. Pelepasan insulin juga dirangsang oleh beberapa asam amino dan hormon pencernaan (mis CKK, sekretin, dan GIP (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide)). Sistem saraf otonom juga menstimulasi pelepasan insulin melalui saraf parasimpatis ke pankreas. Pelepasan GIP dan pengaktifan sistem saraf otonom, keduanya mulai terjadi pada saat mulai makan, bahkan sebelum glukosa diserap. Stimulasi simpatis ke pankreas menurunkan pelepasan insulin (Corwin, 2008).

Insulin adalah hormon anabolik (pembentuk) utama tubuh dan memiliki berbagai efek lain selain menstimulasi transpor glukosa. Insulin juga meningkatkan transport asam amino ke dalam sel, menstimulasi sintesis protein, dan mencegah pemecahan cadangan lemak, protein, dan glukosa. Insulin juga menghambat glukoneogenesis yakni sintesis glukosa baru oleh hati. Secara ringkas insulin

menyediakan glukosa ke tubuh kita, membangun protein, dan mempertahankan kadar glukosa plasma rendah (Corwin, 2008).

Glukagon adalah suatu hormon protein yang dikeluarkan oleh sel alfa Pulau Langerhans sebagai respon terhadap kadar glukosa darah yang rendah dan peningkatan asam amino plasma. Glukagon adalah hormon utama paska absortif pencernaan yang terjadi selama periode puasa di antara waktu makan. Fungsi hormon ini terutama adalah katabolik. Secara umum kerja glukagon berlawanan dengan fungsi insulin. Sebagai contoh, glukagon bekerja sebagai antagonis insulin dengan menghambat perpindahan glukosa ke dalam sel. Glukagon juga menstimulasi glukoneogenesis hati dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen untuk digunakan sebagai sumber energi selain glukosa. Glukagon menstimulasi penguraian lemak dan pelepasan asam lemak bebas ke dalam aliran darah, untuk digunakan sebagai sumber energi selain glukosa. Fungsi-fungsi tersebut bekerja untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Pelepasan glukagon oleh pankreas distimulasi oleh saraf simpatis.

2. Pengertian

Diabetes berasal dari bahasa Yunani yang berarti “mengalirkan atau mengalihkan” (siphon). Mellitus dari bahasa Latin yang bermakna manis atau madu. Penyakit diabetes mellitus dapat diartikan individu yang mengalirkan volume urin yang banyak dengan kadar glukosa tinggi (Corwin, 2008).

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik relatif maupun absolut. Faktor-faktor penyebab timbulnya

DM antara lain: keturunan, kegemukan, pola makan proses menua, stress, dll (Sidartawan Soegondo, 2002).

Diabetes mellitus dapat didefinisikan sebagai suatu golongan gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinik termasuk jenis heterogen yang akhirnya dimanifestasikan oleh kehilangan toleransi karbohidrat. Pada diabetes yang secara klinik sudah berkembang dengan sepenuhnya, diabetes ditandai dengan hiperglikemia puasa, aterosklerotik dan penyakit vaskular mikroangiopatik, dan neuropati. Manifestasi klinik hiperglikemia biasanya sudah bertahun-tahun mendahului pengenalan klinis penyakit vaskularnya. Tetapi kadang-kadang terdapat pasien yang telah menderita akibat klinis penyakit vaskular yang berat meskipun kalinan toleransi glukosanya hanya ringan saja (Graber dkk, 2006: 239-240).

3. Klasifikasi

- a. DM tergantung insulin (IDDM; Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau DM tipe 1)
 - 1) biasanya terjadi pada anak-anak atau masa dewasa muda dan menyebabkan ketoasidosis jika pasien tidak diberikan terapi insulin. IDDM berjumlah 10 % dari kasus DM. DM tipe ini disebabkan oleh kegagalan sel Pulau Beta Langerhans oleh penyebab multifaktorial misalnya; predisposisi genetik, serangan virus, dan autoimun pada sel beta langerhans.
- b. DM tak tergantung insulin (NIDDM; Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau DM tipe 2) biasanya terjadi pada orang yang berusia > 40 tahun dan 60 % DM ini terjadi dengan fungsi sel beta yang masih normal, tetapi jaringan perifer

resisten terhadap insulin. Mungkin terjadi sedikit penurunan pembentukan insulin atau keadaan hiperinsulin.

- c. Diabetes Kehamilan (Gestasional) yang muncul pada saat hamil (Graber dkk, 2006: 239-240).

Tipe diabetes mellitus menurut dokumen konsensus tahun 1997 oleh *American Diabetes Association's Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus* menjabarkan empat kategori utama diabetes.

1) Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit hiperglikemia akibat ketiadaan absolut insulin. Diabetes tipe 1 biasanya dijumpai pada individu yang tidak gemuk berusia kurang dari 30 tahun, dengan perbandingan laki-laki sedikit lebih banyak daripada wanita. Karena insiden diabetes tipe 1 memuncak pada usia remaja dini, pada masa dahulu bentuk ini disebut sebagai diabetes juvenil. Akan tetapi, diabetes tipe 1 timbul pada semua kelompok usia.

Penyebab diabetes tipe 1 diperkirakan terjadi akibat destruksi autoimun sel-sel beta Pulau Langerhans. Individu yang memiliki kecenderungan genetik penyakit ini tampaknya menerima faktor pemicu dari lingkungan yang menginisiasi proses autoimun. Sebagai contoh, faktor pencetus yang mungkin antara lain infeksi virus seperti gondongan. Karena proses penyakit diabetes 1 terjadi dalam beberapa tahun, sering kali tidak ada faktor pencetus yang pasti. Karakteristik diabetes tipe 1 memperlihatkan kadar glukosa yang normal sebelum yang terkontrol awitan yang muncul. Pada masa dahulu diabetes tipe 1 dianggap penyakit yang terjadi tiba-tiba dengan sedikit tanda peringatan. Pada saat diagnosis diabetes tipe 1 ditegakkan,

biasanya pankreas tidak atau sedikit mengeluarkan insulin, dan lebih dari 80% sel beta pankreas telah dihancurkan (Corwin, 2008).

2) Diabetes Mellitus Tipe 2

Hiperglikemia yang disebabkan insensitivitas seluler terhadap insulin. Selain itu, terjadi defek sekresi insulin, ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan glukosa plasma yang normal. Meskipun kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal, jumlah insulin tetap rendah sehingga kadar glukosa plasma meningkat. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, diabetes mellitus tipe 2 yang sebelumnya disebut diabetes mellitus tak tergantung insulin atau NIDDM, sebenarnya kurang tepat karena banyak individu yang mengidap diabetes tipe 2 dapat ditangani dengan insulin. Lebih banyak wanita mengidap penyakit ini dibandingkan pria.

Penyebab diabetes tipe ini untuk kebanyakan individu, tampaknya berkaitan dengan kegemukan. Selain itu, kecenderungan pengaruh genetik yang menentukan kemungkinan individu mengidap penyakit ini cukup kuat.

Karakteristik diabetes tipe 2 yakni individu tetap menghasilkan insulin. Akan tetapi, sering terjadi keterlambatan awal dalam sekresi dan penurunan jumlah total insulin yang dilepaskan. Hal ini cenderung semakin parah seiring dengan penambahan usia pasien. Selain itu sel-sel tubuh, terutama sel otot dan adiposa, memperlihatkan resistensi terhadap insulin yang bersirkulasi dalam darah. Akibatnya, pembawa glukosa yang ada dalam sel tidak kuat membawanya sehingga glukosa tidak dapat digunakan untuk sel (Hongxiang, Tang dan Liang, 2009).

3) Diabetes gestasional

Adalah diabetes yang terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak mengidap diabetes. Meskipun diabetes tipe ini sering membaik setelah persalinan, sekitar 50% wanita pengidap kelainan ini tidak akan kembali ke status nondiabetes setelah kehamilan berakhir.

Penyebab diabetes gestasional dianggap berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi dan kadar estrogen serta hormon pertumbuhan yang terus menerus tinggi selama kehamilan. Hormon pertumbuhan dan estrogen menstimulasi pelepasan insulin yang berlebihan mengakibatkan penurunan responsivitas seluler (Ganong, 1996).

4. Etiologi

Ada bukti yang cukup kuat yang menguatkan beberapa etiologi yang heterogen. Artinya, berbagai lesi akhirnya dapat mengakibatkan insufisiensi insulin. Jenis-jenis gangguan berikut ini sekarang dianggap sebagai kemungkinan etiologi diabetes:

- a. Kelainan fungsi atau jumlah sel-sel beta yang bersifat genetik (menurun).
- b. Faktor-faktor lingkungan yang mengubah fungsi dan integritas sel beta.
- c. Gangguan sistem imunitas.
- d. Kelainan aktivitas insulin.

Dalam kondisi normal, tubuh kita mampu mengubah makanan menjadi gula atau glukosa yang digunakan untuk memproduksi energi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pankreas, organ yang terletak di dekat lambung. Pankreas memproduksi hormon insulin yang akan menempel pada reseptor di dinding sel, dan memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. Insulin berfungsi seperti kunci, membuka reseptor glukosa agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel kemudian

akan menggunakan glukosa dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Pankreas memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, tetapi karena beberapa hal, insulin tidak dapat mentransfer glukosa dari arah ke dalam sel secara optimal. Kelainan itu disebut “penolakan insulin”. Penolakan insulin dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Jumlah reseptor pada sel di bawah normal.
- b. Insulin tidak dapat menempel pada reseptor.
- c. Insulin yang diproduksi tidak sempurna.

Seiring bertambahnya usia, kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin akan semakin berkurang.

Determinan genetik dianggap sebagai faktor penting pada kebanyakan penderita diabetes. Pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus insulin dependen, determinan genetik ini dinyatakan oleh peningkatan atau penurunan frekuensi antigen histokompatibilitas tertentu (HLA), dan respon imunitas abnormal yang akan mengakibatkan pembentukan autoantibody sel Pulau Langerhans. Pada penderita diabetes mellitus insulin dependen, penyakit mempunyai kecenderungan familial yang kuat. Penyakit ini sering menyerang anak-anak, remaja dan dewasa dari keluarga yang sama secara autosom-dominan. Kelainan yang diturunkan ini dapat langsung mempengaruhi sel beta dan mengubah kemampuannya untuk mengenali dan menyebarkan rangsang sekretoris atau serangkaian langkah kompleks yang merupakan bagian dari sintesis atau pelepasan insulin. Besar kemungkinan keadaan ini meningkatkan kerentanan individu yang terserang penyakit tersebut terhadap kegiatan faktor-faktor lingkungan di sekitarnya, termasuk virus atau diet tertentu (Graber dkk, 2006: 239-240).

Beberapa faktor lingkungan dapat mengubah integritas dan fungsi sel beta pada individu yang rentan. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Agen yang dapat menimbulkan infeksi, seperti virus Cockcaskie B dan virus penyakit gondok.
- b. Diet-pemasukan kalori, karbohidrat dan gula yang diproses secara berlebihan.
- c. Obesitas.
- d. Kehamilan.

Kebanyakan faktor-faktor dengan sendirinya tidak dapat menimbulkan diabetes, tetapi secara genetik dapat mempengaruhi mereka yang peka dan mempercepat dekompensasi fungsi sel beta.

Gangguan sistem imun mungkin merupakan dasar timbulnya diabetes pada orang-orang tertentu. Sistem ini dapat dilakukan oleh:

- a) Autoimunitas disertai pembentukan sel-sel antibodi antipankreatis dan akhirnya akan menyebabkan kerusakan sel-sel pensекреksi insulin.
- b) Peningkatan kepekaan terhadap kerusakan sel beta oleh virus.

Pengurangan kepekaan terhadap insulin endogen juga dapat menyebabkan diabetes. Mekanisme ini terjadi pada pasien penderita kegemukan dan diabetes. Alasan akan gangguan kepekaan jaringan terhadap insulin mungkin pengurangan jumlah tempat-tempat reseptor insulin yang terdapat dalam membran sel yang responsif terhadap insulin atau gangguan glikolisis intrasel.

Faktor-faktor penyebab kadar gula darah tinggi (hiperglikemia):

- a. Mengonsumsi makanan yang mengandung gula sederhana dengan cepat dapat diserap tubuh, misalnya, permen, es krim, dan kue.
- b. Meminum minuman berkarbonasi dan sari buah.

- c. Hidup santai (sedentary) tidak membakar gula, karbohidrat, dan zat lain yang diperoleh dari makanan.
- d. Tidak cukup insulin atau jenis obat yang lain.
- e. Stres psikologis.

Beberapa gejala diabetes antara lain:

- a. Poliuria (peningkatan pengeluaran urin) karena air mengikuti glukosa yang keluar melalui urin.
- b. Polidipsia (peningkatan rasa haus) akibat volume yang sangat besar dan keluarnya air yang menyebabkan dehidrasi ekstra sel. Dehidrasi intrasel mengikuti dehidrasi ekstrasel karena air intrasel akan berdifusi keluar sel mengikuti penurunan gradient konsentrasi ke plasma yang hipertonic (konsentrasi tinggi).
- c. Rasa lelah dan kelemahan otot akibat katabolisme protein di otot dan ketidakmampuan sebagian besar sel untuk menggunakan glukosa sebagai energi.
- d. Polifagia (peningkatan rasa lapar) akibat katabolisme protein dan lemak, dan kelaparan relatif sel (Corwin, 2008).

5. Patofisiologi

Pada penderita diabetes tipe 1, sel-sel beta diserang oleh sistem kekebalan tubuh dan secara perlahan akan hancur. Penyebab serangan terhadap sistem kekebalan tubuh belum dapat dipastikan dan masih berupa teori. Sayangnya, meskipun penghancuran sel berlangsung selama bertahun-tahun (5-7 tahun), gejala-gejala diabetes mellitus tidak akan muncul sampai sekitar 80% sel beta rusak. Akibatnya tubuh tidak akan membuat insulin karena tidak memiliki sel beta lagi. Ketoasidosis muncul pada penderita diabetes tipe 1. Penyakit ini timbul karena

jumlah gula darah yang selalu tinggi (hiperglikemia). Gula darah terus terkumpul dalam tubuh karena sel-sel tubuh tidak mampu menyerapnya untuk membentuk energi. Oleh karena glukosa tidak tersedia, tubuh membakar lemak sebagai sumber energi dan menghasilkan sisa yang disebut keton. Penumpukan keton di dalam darah disebut ketosis. Proses pengeluaran keton dari tubuh bersama urin disebut ketonuria. Penumpukan keton dalam tubuh selama beberapa hari akan menyebabkan tubuh kekurangan cairan karena urin akan terus dikeluarkan untuk membuang keton. Hal ini menyebabkan dehidrasi yang membuat pH darah menjadi asam (kurang dari 7). Proses ketoasidosis pun dimulai. Bila tidak disadari dan tidak langsung dirawat, ketoasidosis dapat menyebabkan koma dan kematian.

Gejala ketoasidosis yakni: sering buang air kecil, sangat haus, mual dan muntah, pandangan kabur, mengantuk dan disorientasi. Jika kadar gula darah lebih dari 200 mg/dl pada dua tes berturut-turut, sebaiknya periksakan kandungan keton pada urin segera. Keton disebut juga aseton dan dapat dideteksi dengan uji aseton.

Pada diabetes tipe 2 jumlah insulin normal malah mungkin lebih banyak tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang. Reseptor insulin ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Pada keadaan tadi jumlah lubang kuncinya yang kurang, sehingga meskipun anak kuncinya (insulin) banyak, tetapi karena lubang kuncinya (reseptor) kurang, maka glukosa yang masuk ke sel akan sedikit, sehingga sel akan kekurangan bahan bakar (glukosa) dan glukosa dalam pembuluh darah meningkat. Dengan demikian keadaan ini sama dengan DM tipe 1. Perbedaannya adalah DM tipe 2 disamping kadar glukosa yang tinggi juga kadar insulin tinggi atau normal.

Sebagian besar patologi diabetes mellitus dapat dihubungkan dengan efek utama kekurangan insulin yaitu:

- a. Pengurangan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh, yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi glukosa darah sampai setinggi 300 hingga 1200 mg per 100 ml.
- b. Peningkatan mobilisasi lemak dan daerah penyimpanan lemak sehingga menyebabkan kelainan metabolisme lemak maupun pengendapan lipid pada dinding vaskuler.
- c. Pengurangan protein dalam jaringan tubuh.

G. Pemeriksaan Kadar Gula Darah

1. Tes kadar gula darah puasa

Kadar gula yang normal setelah puasa adalah 100 mg/dl. Jika hasil tes lebih tinggi, itu merupakan suatu indikasi mungkin terkena diabetes (Anjali, 2008).

2. Tes pascaprandial

Pascaprandial adalah tes yang dilakukan 2 jam setelah mengonsumsi makanan berat atau 75 gram glukosa. Jika hasil uji diatas 130 mg/dl bersamaan dengan hasil positif uji lainnya, itu menandakan diabetes (Anjali, 2008).

3. Uji glikosilasi haemoglobin

HbA1c adalah ukuran untuk mengetahui kadar gula darah selama 120 hari ke belakang. Lebih dari 6,1 % HbA1c menunjukkan adanya diabetes (Anjali, 2008).

4. Tes toleransi glukosa

Tes ini dilakukan setelah 10 jam puasa kemudian diperiksa kadar glukosa awalnya, lalu minum gula 75 mg, 2 jam kemudian diperiksa lagi kadar glukosa darahnya (Tandra, 2008).

H. Tindakan Umum Untuk Diabetes

1) Diet

Makanan perlu dipilih secara seksama, terutama pembatasan lemak total dan lemak jenuh untuk mencapai normalisasi kadar glukosa dan lipid darah.

2) Olahraga

Bila terdapat resistensi insulin, olahraga secara teratur dapat menguranginya. Hasilnya insulin dapat dipergunakan secara lebih baik oleh sel tubuh.

3) Berhenti merokok

Nikotin dapat mempengaruhi secara buruk penyerapan glukosa oleh sel (Tan, 2002).

I. Pengobatan

Beberapa golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya.

1) Golongan Sulfonilurea

Contoh senyawa: Gliburida/Glibenklamida, Glipizida, Glikazida, Glimepirida, Glikuidon. Mekanisme kerja obat-obat ini yakni merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel pankreasnya masih berfungsi dengan baik.

2) Golongan Meglitinida

Contoh senyawa: Repaglinid. Mekanisme kerjanya merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas.

3) Golongan Biguanida

Contoh senyawa: Metformin. Mekanisme kerjanya bekerja langsung pada hati, menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas.

4) Golongan Tiazolindindion

Contoh senyawa: Rosiglitazon, Troglitazon, Pioglitazon. Mekanisme kerjanya meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Berikatan dengan PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Receptor-gamma) di otot, jantung dan hati untuk menurunkan resistensi insulin.

5) Golongan Inhibitor α -Glukosidase

Contoh senyawa: Akarbose, Miglitol. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah.

J. Pemilihan Glibenklamid

Derivat-klormetoksi ini adalah obat pertama dari antidiabetika generasi ke-2 dengan khasiat hipoglikemisnya yang kira-kira 100 kali lebih kuat daripada tolbutamid. Sering kali ampuh di mana obat-obat lain tidak efektif lagi. Resiko “hipo” juga lebih besar dan lebih sering terjadi. Pola kerjanya berlainan dengan sulfonyleurea lainnya, yaitu dengan *single dose* pagi hari mampu menstimulir sekresi insulin pada setiap pemasukan glukosa (sewaktu makan). Dengan demikian selama 24 jam tercapai regulasi darah optimal yang mirip pola normal (Tan dan Kirana, 2007)

K. Penelitian Sebelumnya

Kayu manis banyak digunakan sebagai obat tradisional., misalnya bagian serbuk kulit kayunya telah digunakan oleh masyarakat di negara tropis termasuk Indonesia sebagai obat antidiabetes .

Baru-baru ini beberapa ilmuwan di Universitas Thames Valley di luar Kota London, Inggris, meninjau bukti relevan di area yang berjudul, "Potensi kayu manis untuk menurunkan tingkat glukosa darah pada penderita diabetes tipe-2 dan resisten terhadap insulin," dipublikasikan Desember 2009 dalam *Diabetes, Obesitas, dan Metabolisme*. Tinjauan tersebut mengamati delapan studi. Lima diantaranya, mengukur efek kayu manis pada tingkat gula darah pada penderita diabetes tipe-2. Tiga studi lain, kayu manis diujikan pada penderita non-diabetes.

Pada dua studi diabetes, tingkat gula darah diketahui dapat diturunkan dengan kayu manis dibandingkan dengan placebo. Satu studi menunjukkan penurunan 18 sampai 29 persen pada pengujian 'puasa glukosa darah', sementara lainnya menunjukkan penurunan sekitar 10 persen. Satu studi non-diabetes juga menunjukkan penurunan pada pengujian puasa glukosa darah sampai 8,4 persen. Penulis tinjauan ini menyimpulkan, "Meskipun penggunaan kayu manis sebagai terapi antidiabetes tidak dapat ditarik kesimpulan secara definitif, namun diketahui dia memiliki khasiat dan kemampuan untuk menurunkan tingkat glukosa darah setelah makan. Riset lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat korelasi yang mungkin terjadi antara garis dasar FBG (Fasting Blood Glucose, tes puasa glukosa

darah) dan penurunan glukosa darah dan untuk menilai kemampuan menurunkan komplikasi diabetes patogenik dengan suplemen kayu manis."

Dukungan lebih lanjut terhadap gagasan yang menyebutkan bila kayu manis mungkin bermanfaat untuk terapi diabetes berasal dari studi berjudul "Efektivitas kayu manis untuk menurunkan hemoglobin A1c (HbA1c) pada pasien penderita diabetes tipe-2: acak, percobaan terkendali," yang baru-baru ini dipublikasikan pada Jurnal American Board of Family Medicine edisi November 2009, dimana diabetes tipe-2 diterapi dengan satu gram kayu manis setiap hari selama 90 hari. HbA1c menawarkan ukuran tingkat gula darah selama 3 bulan pertama. Mereka yang mengonsumsi kayu manis sebagai tambahan atas perawatan diabetes standar, memperlihatkan penurunan signifikan secara statistik pada nilai HbA1c. Mereka yang hanya menerima pengobatan diabetes standar tidak memperlihatkan apapun. Studi ini dirintangi oleh fakta bahwa tidak ada kelompok placebo (kelompok yang menjalani pengobatan tanpa terapi spesifik apapun, sifatnya hanya sugesti) sebagai tambahan untuk pengobatan standar. Namun demikian, tampaknya hal ini mendukung gagasan bahwa kayu manis membantu menjaga kandungan gula darah. (Jhon, 2009).


Selain itu salah satu research oleh Richard Anderson yang menyatakan Kayu manis dapat membantu mencegah penyakit diabetes dan penyakit hati, Ungkap para ilmuwan seperti dikutip oleh Dailymail. Sebuah penelitian menemukan bahwa segelas air rebusan kayu manis mengandung antioksidan yang mampu mengurangi

kemungkinan dari serangan kedua penyakit tersebut hingga 23 persen. Para peneliti pada pusat ilmu pengetahuan kesehatan di Fairlawn, Ohio, AS meneliti sebanyak 22 obesitas yang "pre diabetes". Pre diabetes adalah keadaan sebelum terjangkit secara penuh penyakit diabetes. Setengah dari partisipan diberikan sebanyak 250 mg air kayu manis untuk dikonsumsi setiap hari, dan setengah lainnya menjalani plasebo. Penderita menjadi lebih tinggi resisten ketimbang dengan tingkat insulin normal - hormon itu digunakan untuk mengatur tingkat gula darah - yang diproduksi oleh pankreas. Darah dikumpulkan pada awal dan akhir dari survei tersebut. Peminum kayu manis tercatat mengalami penambahan antioksidan sekitar 13 hingga 23 persen yang berguna menurunkan tingkat gula darah. (Richard Anderson, 2004)

L. Tinjauan Islam Mengenai Kayu Manis

Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Rasulullah yang memberi motivasi agar manusia belajar meneliti tentang alam semesta dan isinya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk ciptaan-Nya yang lain, karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah swt dengan sia-sia.

Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran, ayat 191, yang berbunyi :




Terjemahannya:

. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Ayat ini menjelaskan yaitu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada kerendahan bumi serta pada kepadatannya. Dan juga tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat pada ciptaan-Nya yang dapat dijangkau oleh indra manusia pada keduanya (langit dan bumi), baik yang berupa: bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna, aneka ragam makanan dan bebauan. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, merupakan penyifatan tentang Ulul Albab. Orang yang berakal (Ulul Albab) adalah orang yang melakukan dua hal yaitu tazakkur yakni mengingat Allah dan tafakkur yakni memikirkan (ciptaan Allah). Dengan melakukan dua hal tersebut ia sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat (tazakkur) dan berfikir (tafakkur), yaitu mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa dibalik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta yakni Allah SWT. Selain itu 2 hal tersebut (tafakkur dan tazakkur) menjelaskan tentang keseimbangan antara menuntut ilmu dan menyucikan hati, sebab bila tidak seimbang bisa menyebabkan jiwa yang menjadi ekstrim, pemberontak dan terlalu

percaya diri akan ilmu yang dimilikinya sehingga melupakan konsep spiritual, begitu pula sebaliknya, terlalu tekun untuk menghaluskan hati akan mewarisi sifat penakut dan malas bahkan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang sungguh merupakan fenomena yang sangat kompleks yang terus menerus menjadi objek penelitian umat manusia sejak awal lahirnya peradaban manusia. Semua ciptaan Allah sebagai wujud kekuasaan-Nya dapat dijadikan objek pembelajaran dan ilmu pengetahuan oleh orang yang berfikir.

Firman Allah SWT dalam surah Ar-rad (13) ayat 4 yang berbunyi :




Terjemahannya :

“ Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menjelaskan bahwa di langit dan di bumi tempat kamu semua memijakkan kaki dan menghirup udara, kamu semua melihat dengan sangat nyata, ada kepingan-kepingan tanah yang saling berdekatan dan berdampingan namun

demikian kualitasnya berbeda-beda. Ada yang tandus, ada pula yang subur dan ada juga yang jenisnya sama yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang menjadi lahan kebun-kebun anggur, dan tanaman-tanaman persawahan dan ada juga yang menjadi lahan bagi perkebunan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Semua kebun dan tumbuhan itu disirami dengan air yang sama lalu tumbuh berkembang dan berbuah pada waktu tertentu. Namun demikian kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dalam rasanya demikian juga dalam besar kecilnya, warna dan bentuknya serta perbedaan-perbedaan yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menekankan bahwa kemanfaatan yang terkandung dalam alam baru bisa diperoleh bila manusia memiliki ilmu dan teknologi, alam merupakan sumber pelajaran dan ajaran bagi manusia, maka siapa dengan bersungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap alam dengan sikap apresiasi terhadap alam itu sendiri akan mengantarkannya kepada kenyataan bahwa alam sebagai tanda-tanda adanya Allah SWT.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syuara (26) ayat 7



Terjemahannya:

“ Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?”

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit dan ini merupakan anugrah Allah swt (M. Quraish, 2002).

Pengobatan dalam Islam terus berkembang sejak masa kenabian hingga masa para sahabat dan juga ulama. Sampai saat ini, ilmu-ilmu pengobatan herbal Islami tersebut pun masih tetap bertahan, karena telah diajarkan dan dicatatkan secara sistematis oleh seorang dokter muslim termasyhur bernama Ibnu Sina. Dalam pandangan Ibnu Sina, kayu manis masuk dalam kategori herbal aromatik, herbal ini berkaitan dengan masalah angin, bersifat menenangkan dan dapat memberi tenaga. Herbal aromatik mengandung minyak atsiri dan wangi-wangian yang khas. (Mukhlidah, 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1) Alat penelitian

Alat glukometer, batang pengaduk, cawan porselin, Erlenmeyer 100 ml, gelas ukur 100 ml, jarum oral, labu tentukur 100 ml, lumpang dan alu, pipet, spoit, timbangan analitik, timbangan kasar, toples dan vial.

2) Bahan penelitian

Air suling, etanol 96%, kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*), glukosa, mencit (*Mus musculus*), Na.CMC dan Tablet Glibenklamid.

B. Prosedur Kerja

1) Penyiapan sampel

Kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) diperoleh dari Pasar Limbung Kab. Gowa.

2) Pembuatan ekstrak

Sebanyak 200 gram serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah maserasi kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 300 ml, didiamkan selama 1 hari pada suhu kamar di dalam botol coklat. Kemudian rendaman disaring, filtratnya disimpan sementara residunya direndam kembali dalam pelarut yang sama, perlakuan

ini diulang sebanyak lima kali. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan pelarutnya sehingga diperoleh ekstrak kering.

3) Pembuatan larutan koloidal Na.CMC 1% b/v

Sebanyak 1 gram Na.CMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam air suling panas (70°C) sambil diaduk hingga terbentuk larutan koloidal, kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

4) Pembuatan larutan glukosa 200 mg/30 g BB

Glukosa sebanyak 20 gram ditimbang kemudian dilarutkan dengan air suling sebanyak 50 ml, dikocok hingga larut. Kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

5) Pembuatan suspensi pembanding glibenklamid

Suspensi glibenklamid dibuat dengan menimbang sebanyak 20 tablet glibenklamid kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Dimasukkan dalam lumpang dan digerus hingga halus. Kemudian ditimbang setara dengan 2 mg, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit larutan koloidal Na.CMC 1% sambil diaduk hingga homogen. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml dan dicukupkan volumenya dengan menggunakan larutan koloidal Na.CMC 1% hingga 100 ml.

6) Pembuatan suspensi ekstrak etanol kulit kayu manis

a. ekstrak etanol kulit kayu manis 7,8 mg/ 30 g BB

Ditimbang 0,78 gram ekstrak etanol kulit kayu manis, didispersikan ke dalam suspensi Na.CMC 1 % kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

b. ekstrak etanol kulit kayu manis 15,6 mg/ 30 g BB

Ditimbang 1,56 gram ekstrak etanol kulit kayu manis, didispersikan ke dalam suspensi Na.CMC 1% kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

c) ekstrak etanol 31,2 mg/ 30 g BB

Ditimbang 3,12 gram ekstrak etanol kulit kayu manis, didispersikan ke dalam suspensi Na.CMC 1% kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

C. *Penyiapan Hewan Uji*

1) Pemilihan hewan uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang dewasa dan sehat dengan berat 20-30 gram.

2) Pengelompokan hewan uji

Hewan uji yang digunakan sebanyak 15 ekor dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 ekor, dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok I : Kontrol negatif dengan pemberian larutan koloidal Na.CMC 1% secara oral.
- b. Kelompok II : Diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis dengan dosis 7,8 mg/30 g BB secara oral.
- c. Kelompok III : Diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis dengan dosis 15,6 mg/30 g BB secara oral.

- d. Kelompok IV : Diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis dengan dosis 31,2 mg/30 g BB secara oral.
- e. Kelompok V : Pembanding dengan pemberian larutan suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB secara oral.

3) Perlakuan hewan uji

Hewan uji dipuasakan selama 8 jam sebelum diperlakukan. Bobot badannya ditimbang dan kadar glukosa darahnya diukur sebagai kadar gula puasa. Diberikan larutan glukosa 200 mg/30 g BB secara oral, 60 menit kemudian diambil darahnya melalui vena marginalis untuk ditentukan kadar glukosa darah awal. Kemudian kelompok 1 diberi Na.CMC 1% b/v sebagai kontrol negatif, kelompok 2 diberi ekstrak kulit kayu manis dengan dosis 7,8 mg/30 g BB mencit, kelompok 3 diberi ekstrak kayu manis dengan dosis 15,6 mg/30 g BB mencit, kelompok 4 diberi ekstrak kulit kayu manis dengan dosis 31,2 mg/30 g BB mencit dan kelompok 5 diberi suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB mencit sebagai pembanding. Masing-masing pemberian dilakukan secara oral. Setelah itu diambil darahnya melalui vena marginalis dan ditentukan kadar glukosa darahnya dengan menggunakan alat glukometer tiap interval 1 jam selama 5 jam.

4) Penentuan kadar glukosa

Penentuan kadar glukosa dilakukan pada interval 1 jam selama 5 jam. Pengukuran dilakukan dengan cara mengambil darah pada ekor mencit. Sampel darah yang diperoleh dimasukkan dalam strip yang terpasang pada glukometer. Secara otomatis hasil pengukuran akan ditampilkan pada alat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 2. Hasil penelitian pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol kulit kayu manis 7,8 mg/30 g BB, ekstrak etanol kulit kayu manis 15,6 mg/30 g BB, ekstrak etanol 31,2 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg/30 g BB pada mencit menunjukkan :

No	perlakuan	Kadar glukosa darah awal (mg/dl)	Persentase penurunan kadar glukosa (%)					Keterangan
			Jam ke-1	Jam ke-2	Jam ke-3	Jam ke-4	Jam ke-5	
1	Na.CMC 1%	182,66 mg/dl	15,14%	23,72%	25,36%	27,55%	28,82%	Mengalami penurunan kadar glukosa darah
2	Eks. kulit kayu manis 7,8 mg/30 g BB	179,33 mg/dl	25,65%	33,83%	37,17%	47,77%	55,57%	Mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan
3	Eks. Kulit kayu manis 15,6/30 g BB	180,66 mg/dl	42,06%	47,78%	53,50%	59,03%	62,73%	Mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan
4	Eks. Kulit kayu manis 31,2 mg/30 g BB	180 mg/dl	36,3%	53,77%	61,85%	65,18%	68,33%	Mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan

5	Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB	179,33 mg/dl	38,10%	50,92%	60,22%	65,98%	66,73%	Mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan
---	------------------------------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

B. Pembahasan

Diabetes mellitus terjadi karena ketidakmampuan tubuh mengubah makanan menjadi energi. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh memiliki kadar gula dalam darah yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin baik relatif maupun absolut yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesis lemak. Akibatnya adalah glukosa bertumpuk dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan (glycosuria).

Pengujian efek antidiabetes dalam penelitian ini dilakukan secara enzimatik dengan menggunakan metode toleransi glukosa oral dan pengukuran kadar glukosa darah dengan glukometer yang menggunakan metode elektrokimia, yaitu berdasarkan pada pengukuran potensial (daya listrik) yang disebabkan oleh reaksi dari glukosa dengan bahan pereaksi glukosa pada elektroda strip. Sampel darah diserap masuk ke dalam ujung strip uji berdasarkan reaksi kapiler. Apabila darah mengisi ruangan reaksi pada strip uji, kalium ferisianida diuraikan dan glukosa sampel dioksidasi oleh enzim glukosa oxidase, menyebabkan penurunan bilangan oksidasi (kalium heksasianoferat (III) menjadi kalium heksasianoferat (II)). Aplikasi jumlah voltase yang konstan dari meteran mengoksidasi kalium heksasianoferat (II) kembali pada kalium heksasianoferat (III) dan memberikan elektron. Elektron yang dihasilkan untuk menimbulkan arus sebanding dengan kadar glukosa pada sampel. Setelah waktu 10 detik, konsentrasi glukosa dalam sampel ditayangkan pada layar monitor.

Nesco sebelum digunakan untuk penentuan kadar gula darah dikalibrasi dengan nomor kode yang disesuaikan dengan test strip yang akan digunakan. Untuk setiap pengukuran diperlukan selembar test strip. Setelah test strip diselipkan pada celah khusus pada alat tersebut, pada layar akan muncul gambar tetesan darah yang menunjukkan alat siap digunakan. Kemudian ekor mencit ditusuk menggunakan jarum glukometer tersebut hingga mengeluarkan darah. Tetesan darah mencit kemudian ditetaskan pada test strip pada glukometer. Dalam waktu 15 detik pada layar tertera kadar gula dalam satuan mg/dl.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek antidiabetes ekstrak etanol kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) pada hewan coba yang digunakan yaitu mencit. Mencit sebanyak 15 ekor dibagi ke dalam 5 kelompok, untuk kelompok 1 sebagai kontrol negatif diberikan suspensi Na.CMC 1% sesuai dengan berat mencit, kelompok 2 diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis dengan dosis yang telah dikonversi dari dosis manusia menjadi dosis mencit yakni 7,8 mg/30 g BB, kelompok 3 diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis 15,6 mg/30 g BB, kelompok 4 diberikan ekstrak etanol kulit kayu manis 31,2 mg/30 g BB dan kelompok 5 diberikan suspensi glibenklamid sebagai kontrol positif yang telah dikonversi dari dosis manusia menjadi dosis mencit yakni 0,02 mg/30 g BB. Sebagai kontrol positif digunakan Glibenklamid yang merupakan obat antidiabetes oral golongan sulfonilurea. Glibenklamid memiliki efek hipoglikemik yang kuat dengan dosis yang rendah. Kontrol positif ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar glukosa darah. Glibenklamid disuspensikan dengan Na.CMC 1% karena sifatnya yang praktis tidak larut dalam air.

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina yang mana memiliki kadar glukosa darah lebih tinggi pada saat hamil, sebab terjadi peningkatan hormon hiperglikemik. Selain itu kebutuhan nutrisi pada saat hamil meningkat

sehingga glukosa yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan pada saat tidak hamil sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Sebelum perlakuan mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 8 jam dengan maksud untuk menghindari pengaruh makanan pada saat dilakukan pengukuran glukosa darah. Larutan glukosa 200 mg/30 g BB diberikan pada mencit 1 jam sebelum pemberian sediaan uji yang bertujuan untuk menaikkan kadar glukosa darah yang merupakan kadar glukosa awal, sehingga kemampuan menurunkan glukosa darah dari sediaan uji dapat diamati. Setelah 1 jam kemudian diberikan perlakuan pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol 7,8 mg/30 g BB, 15,6 mg/30 g BB, 31,2 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg/ 30 g BB melalui oral.

Dalam penelitian ini kadar glukosa darah mencit diukur selama 5 jam dengan interval waktu 1 jam. Hal ini dikarenakan waktu yang diperlukan oleh glukosa untuk terabsorpsi dalam tubuh adalah sekitar 40 menit sampai 1 jam dan untuk melihat efek penurunan kadar glukosa yang lebih jelas maka digunakan jangka waktu selama 5 jam setelah pemberian ekstrak metanol kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*).

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisis variasi, terdapat perbedaan yang nyata dari tiap pemberian perlakuan. Dari hasil analisis statistik ini diperoleh nilai KK (Koefisien Keseragaman) 4,18%. Nilai KK kurang dari 10 % sehingga dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil. Uji ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antara sampel (ekstrak kulit kayu manis) dengan kontrol negatif dan kontrol positif. Dimana nilai F hitung (189,8) lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (2,05) dan 1 % (3,55).

Dari data yang diperoleh kemudian dihitung % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara glukosa darah akhir dengan glukosa darah awal kemudian dikalikan 100 %.

Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi pada kelompok kontrol negatif selama rentang waktu 5 jam disebabkan karena adanya penggunaan glukosa oleh menciit dalam pembentukan energi dan terjadinya absorpsi glukosa ke dalam sel yang disimpan sebagai gula cadangan.

Hasil analisis statistika dengan menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) pada perlakuan hewan uji dalam waktu 5 jam dengan interval waktu 1 jam, memperlihatkan perbedaan yang sangat nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

- a. Ekstrak kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi glukosa.
- b. Ketiga dosis ekstrak kulit kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) yakni 7,8 mg, 15,6 mg dan 31,2 mg menunjukkan efek penurunan glukosa darah secara berarti.
- c. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa alam merupakan sumber ilmu pengetahuan yang perlu dikaji sebagai objek penelitian bagi manusia, karena dengan bersungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap alam dengan sikap apresiasi terhadap alam itu sendiri akan mengantarkannya kepada kenyataan bahwa alam sebagai tanda-tanda adanya Allah SWT.

B. Saran

Disarankan agar lebih mengkaji lebih dalam tentang berbagai macam kandungan kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) beserta manfaat lainnya dalam mengobati penyakit.

BIOGRAFI



Nucifera biasa dipanggil Nuci, lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Juni 1991, kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs.Tenggarudin M, Pd. Dan Ibunda Siti Najima adalah motivator terbaik bagi penulis. Anak kedua dari lima bersaudara ini memulai jenjang pendidikan pertamanya di SD Negeri 1 Poasia Kendari, kemudian pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Kendari, dan menduduki bangku menengah atas di SMA Negeri 1 Kendari. Tahun 2009 melalui seleksi nasional, penulis terdaftar sebagai mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi, besar harapan penyusun agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalam Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Arifin, A.S. 1986. *Materi Pokok Kimia Organik Bahan Alam*. Jakarta: Penerbit Karunia.

Arora, Anjali. 2008. *5 Langkah Mencegah dan Mengobati Diabetes*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Briffa, Jhon. 2009. *American Board of Family Medicine*

Cetto, A.A., Jimenez, J.B & Vazquez R.C. 2007. Alfa-Glycosidase Inhibiting Activity of Some Mexican Plants Used in the Treatment of Type 2 Diabetes. *Journal of Ethnopharmacology*.

Depkes. 1995. *Materia Medika Jilid VI*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Diabetes Melitus Dapat Dicegah*. <http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1314-diabetes-melitus-dapat-dicegah.html>.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2005. *Pharmaceutical Care Untuk Diabetes Melitus*. Jakarta: DEPKES RI.

Dirjen POM. 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dirjen POM. 1986. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Elizabeth J. Corwin. 2007. *Handbook of Pathophysiology*, Edisi III. Jakarta: EGC.

Ganong, W.F. 1996. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 15*. Jakarta, Indonesia.

Graber. 2010. *A Life of Control: Stories of Living with Diabetes*. Singapore: Stallion Press.

Hariana, H.Arief. 2008. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Hongxiang, H., Tang, G & Liang W.G.V. 2009. Chinese Medicine: Hypoglycemic Herbs and Their Action Mechanisms. *Biomed Central*.

- Jakhetia, Vaibhavi. 2010. *Chemical Structure of Some Important Chemical of Cinnamon*. Journal Cinnamon A Pharmacological Review.
- Jarald, E., Joshi, S.B., Chain, D.C. 2008. *Diabetes and Herbal Medicines*. Irian Journal of Pharmacology & Therapeutics.
- Kiran, Panickar. 2009. *Moleculer Targets and Therapeutic Uses of Spices*. Singapore: Stallion Press.
- Malole, M.B.M., Pramono, C. Sri Utami. 1989. *Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan di Laboratorium*. Bogor: Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.
- Moriwaki, M., Suzuki, H., Miyashita, N. 1986. Evolutionary implication of heterogeneity of the nontranscribed spacer region of ribosomal DNA repeating units in various subspecies of *Mus musculus*. *Moleculer Biology and Evolution*.
- Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Obat*. 2000. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Richard, A., Anderson. 2008. Chromium and polyphenols from cinnamon improve insulin sensitivity. *Proceeding of the Nutrition Society*.
- Rismunandar & Farry B. Paimin. 2001. *Budidaya dan Pengelolahan Kayu Manis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Setiadi & Sarwono. 2007. *Tanaman Obat Keluarga*. Jakarta: Samindra Utama.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. I. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidartawan Soegondo. 2003. *Petunjuk Praktis Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2*. Jakarta: Perkeni dan Pusat Diabetes dan Lipid.
- Siregar, Mukhlidah Hanun. 2012. *Cara Sehat Dengan Resep-resep Ajaib Herbal Islami*. Jakarta: Gramedia.
- Tandra, Han. 2007. *Segala Sesuatu Yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjay, H. Tan & Rahardja Kirana. 2007. *Obat-obat Penting. Khasiat, Penggunaan & Efek-efek Sampingnya*. Jakarta: PT. Gramedia.

Voight, R. 1995. *Buku Pelejaran Teknologi Farmasi edisi V*. Yogyakarta: UGM Press.

Wadkar, K.A. 2008. Antidiabetic Potential and Indian Medical Plants. *Journal of Herbal Medicine and Toxicology*.