

**PENAMBAHAN JAMU HERBAL DAN VITAMIN TERHADAP
PROFIL ORGAN DALAM AYAM KAMPUNG UNGGUL
BALITNAK (KUB)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pernakan (S.Pt) Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

NURUL MASITA
60700116070

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

1. Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Masita

NIM : 60700116070

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
 - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI GOWA, Agustus 2020

ALA UDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

Nurul Masita
60700116070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan laporan hasil penelitian Saudari Nurul Masita, NIM: 60700116070, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Profil Organ Dalam Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)", memandang bahwa laporan hasil penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian manaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 03 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Muh. Nurhidayat S. Pt., M.P.
NIP: 197509092009121001

Pembimbing II



Astati S.Pt., M.P.
NIP: 197608212009122002


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin terhadap Profil Organ Dalam Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)” yang disusun oleh **Nurul Masita, NIM: 60700116070**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gowa, Agustus 2020

Dewan Penguji

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---|
| Ketua | : Sjamsiah, S. Si., M.Si., Ph.d | () |
| Sekretaris | : Dr. Hj. Jumariah Syam, S.Pt., M.Si | () |
| Pembimbing I | : Dr. Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M. P | () |
| Pembimbing II | : Astaty, S.Pt., M.Si | () |
| Munaqisy I | : Drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si | () |
| Munaqisy II | : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag | () |

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muh. Hafifah Mustami, M.Pd.
NIP. 1971041 2000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil dari Penelitian selama 45 Hari yang berjudul “**Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin terhadap Profil Organ Dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)**” dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ucapan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua saya **Ayahanda tercinta Syamsuddin** dan **Ibunda tercinda Suriani** yang senantiasa mendoakan, membimbing dan merawat saya sejak kecil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atas semua dukungan yang diberikan baik dukungan materil maupun non materil.

Terima kasih tak terhingga kepada **Bapak Dr. Muh. Nurhidayat S. Pt., M. P** sebagai pembimbing I dan **Ibu Astaty. S.Pt, M.Si.** sebagai pembimbing II saya yang telah mendidik dan membimbing serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk, arahan dan ilmu mulai dari awal melakukan penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Terima kasih tak terhingga kepada **Ibu Drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si** sebagai penguji I dan **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag** sebagai penguji II yang telah mendidik dan membimbing saya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada **Ibu Hj. Irmawaty, S.Pt., Mp.** selaku Penasehat Akademik saya yang telah mendidik dan memberikan nasehat dari awal masuk kuliah hingga sekarang ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis:

1. **Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D.** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Prof. Dr. Mardan., M.Ag.** selaku wakil rektor 1 bidang Akademik Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Dr. Wahyudin, M. Hum.** selaku Wakil rektor 2 bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** selaku wakil rektor 3 bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H Muh Khalifah Mustami. S.Ag., M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Ibu Sjamsiah, S.Si., M.S., Ph.D.** selaku wakil dekan 1 bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, **Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.** selaku wakil dekan 2 bidang Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi serta **Bapak Dr. Muh**

Anshar Abubakar, S.Pt., M.Si. selaku wakil dekan 3 bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.

3. **Bapak Dr. Muh. Nur Hidayat., M.P** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan **Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
5. **Ibu Andi Afriana, S.E.** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari awal hingga sekarang ini.
6. **Kak Hikmawaty, S.Pt dan kak Fatul Rahman Aziz S.Pt** selaku Staff Laboratorium Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu kegiatan penelitian.
7. Segenap **Civitas Akademika** yang telah membantu saya dalam pengurusan berkas dan segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan dari awal sampai saat ini
8. **Kak Imran, Kak Putra, Kak Fadil, Kak Ime, Kak Resky** yang telah membantu kelancaran kegiatan Pra-penelitian di kandang dan juga **Alm Kak Andi** semasa hidupnya sama-sama membantu Pra-penelitian, Terima kasih banyak kak Semoga Tenang Di Alam Sana. Terkhusus **kak Hasrin, S.Pt., M.Si** yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

9. **Kak Andi, Kak Rahmat, Kak Jihad dan Kak Ipin** yang telah membantu kelancaran penelitian di BPTP Sulsel
10. **Bapak dan Ibu Pegawai di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel** yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kelancaran penelitian.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar **16uana** Angkatan 2016 karena sudah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sehingga penulis tetap semangat mengerjakan skripsi.
12. Sahabat saya **Nurul Imy Hidayah, Nurjihan Islami Ansar, Rahmatang, Nurhidayat, Andi Wardatul Jannah, Fitria Nisar, Mulyadi, Syayyidul Istiqfar, Muh. Arfah, Wahyu Adiatma, Muh. Al-Fitrah Juanda, Fiqri Wijaya, Rabiul Awal Palaguna, Muh. Hikma Adil dan Irwan Pandi** yang telah memberi dorongan dan semangat dari awal penelitian sampai skripsi ini selesai.
13. Tim Penelitian saya **Nurhidayat, Jusfirah, Syayyidul Istigfar dan Fiqri Wijaya.**
14. Sahabat saya **Kurnia Syarif, Herlinsyah dan Nurcahya Asmita BS** yang telah memberikan semangat dalam mengejar cita-cita saya sampai sekarang.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamu AlaikumWr. Wb

Gowa, 10 Agustus 2020

Nurul Masita



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Definisi Penelitian..... | 4 |
| F. Hipotesis..... | 5 |
| G. Kajian Terdahulu..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kajian Integrasi | 11 |
| 1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Ternak | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Tumbuhan | 12 |
| B. Kajian Teoritis..... | 16 |
| 1. Pakan | 16 |
| 2. Imbuhan Pakan | 18 |
| 3. Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) | 21 |
| 4. Jamu Herbal | 23 |
| a) Bawang Putih..... | 24 |
| b) Kencur | 26 |
| c) Kunyit | 27 |
| d) Temulawak | 29 |
| e) Lengkuas | 30 |
| f) Jahe | 30 |
| g) Daun Sirih | 31 |
| h) Daun Pepaya | 32 |
| i) Sambiloto | 33 |
| j) Brotowali | 34 |
| k) Daun Mahkota Dewa | 35 |
| l) Kayu Manis | 36 |
| 5. Vitamin | 37 |
| 6. Sistem Pencernaan pada Ayam | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Waktu dan Tempat | 46 |
| B. Jenis Penelitian | 46 |

| | |
|--|-----------|
| C. Materi Penelitian | 46 |
| D. Prosedur Penelitian | 47 |
| E. Analisis Data | 50 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Hasil Penelitian | 52 |
| B. Pembahasan | 53 |
| 1. Hati | 53 |
| 2. Pankreas | 54 |
| 3. Usus Halus | 55 |
| 4. Jantung | 55 |
| 5. Seka | 56 |
| 6. Gizzard | 57 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

| No. | Teks | Hal |
|-----|---|-----|
| 1. | Bahan-bahan yang digunakan dalam Penelitian | 47 |
| 2. | Kandungan Nutrisi Pakan | 49 |
| 3. | Rataan Pesentase Berat Organ Dalam Ayam KUB | 52 |



DAFTAR GAMBAR

| No. | Teks | Hal |
|-----|---|-----|
| 1. | Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) | 23 |
| 2. | Saluran Pencernaan Ayam | 40 |
| 3. | Diagram Alir Proses Pembuatan Jamu Herbal | 48 |



ABSTRAK

Nama : Nurul Masita
NIM : 60700116070
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Profil Organ Dalam Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Rancangan Acak Lengkap (RAL) digunakan dalam penelitian ini, yaitu 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. P₀ (Tanpa jamu herbal dan vitamin), P₁ (Menggunakan jamu herbal 3 ml), P₂ (Menggunakan vitachick 0,5 gram) dan P₃ (Menggunakan Jamu herbal 3 ml + 0,5 gram vitachick). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jamu herbal dan vitamin tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap persentase organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) yang meliputi hati, pankreas, usus halus, jantung, seka dan gizzard.

Kata kunci: Ayam KUB, Jamu Herbal, Vitamin dan Organ dalam.

ABSTRACT

Nama : Nurul Masita
NIM : 60700116070
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Profil Organ Dalam Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

This study aims to determine how the effect of herbal and vitamin herbal administration on organs profiles in native chicken in Balitnak (KUB). This study used a Completely Randomizes Design (CRD) consisting of 4 treatments and 5 replications. P₀ (Without herbal and vitamin herbs), P₁ (Using 3 ml herbal medicine), P₂ (Using 0.5 gram vitachick) and P₃ (Using 3 ml herbal medicine + 0.5 gra, vitachick). The results of this study showed that the use of herbal herbs and vitamins had no significant effect ($P > 0.005$) on yhe percentage of organ in KUB Chickens which included liver, pancreas, small intestine, heart, seka and gizzard.

Keywords: KUB chicken, herbal medicine, vitamins and internal organs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam kampung unggul adalah persilangan antara ayam kampung yang memiliki beberapa keunggulan. Ayam kampung unggul saat ini banyak dibudidayakan karena dapat digunakan sebagai alternatif pengganti broiler. Ayam kampung memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan manusia antara lain pemeliharaannya sangat mudah karena tahan pada kondisi lingkungan, tidak memerlukan lahan yang luas untuk pemeliharaan, harga jualnya stabil, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pedaging lainnya dan tidak mudah stres terhadap perlakuan yang kasar dan daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan ayam pedaging lainnya. Ayam kampung unggul memiliki tekstur daging yang lebih padat sehingga memberikan rasa daging yang khas (Nuroso, 2020). Kualitas daging yang baik salah satu faktornya adalah pakan, dimana pakan yang diberikan kepada ayam tersebut harus berkualitas.

Pakan adalah semua makanan yang diberikan kepada ternak yang mengandung nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan ternak tersebut. Pada saat memelihara ayam, selain pakan yang menjadi makanan utama ada juga tambahan pakan untuk menunjang pertumbuhan ayam tersebut dan kualitas dagingnya. Pakan tambahan (*feed additive*) adalah pakan yang berasal dari zat non gizi. Pakan tambahan yang umumnya biasa digunakan adalah antibiotik. Fungsi dari imbuhan pakan adalah untuk menambah vitamin, mineral, menjaga dan

mempertahankan kesehatan tubuh terhadap serangan penyakit, merangsang pertumbuhan badan, dan menambah nafsu makan.

Pakan dapat mempengaruhi organ dalam dikarenakan pakan dapat meningkatkan kerja organ sehingga mempengaruhi berat dan panjang organ pencernaan. Saluran pencernaan broiler adalah organ vital yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan fungsi imunologis. Nutrisi diserap oleh usus dapat berlangsung secara optimal apabila usus dalam keadaan yang sehat.

Penggunaan antibiotik komersial pada ayam kampung unggulan terbukti dapat meningkatkan pendapatan peternak. Akan tetapi dapat menimbulkan masalah yang besar dikarenakan adanya mikroorganisme patogen yang ada di dalam saluran pencernaan menjadi resisten. Di samping itu ditemukannya resisten mikroba dan residu pada produk peternakan yang dihasilkan akibat penggunaan antibiotik. Beberapa *feed additive* seperti hormon dan antibiotik telah dilarang penggunaannya di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya isu global peternakan (unggas) saat ini, yaitu keamanan pangan hewani dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya bagi konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan. Beberapa jenis antibiotik yang masih dapat dipergunakan, diantaranya adalah *Avilamycin* dan *Flavomycin*.

Salah satu pakan imbuhan yang berpotensi untuk menggantikan antibiotik komersial adalah pemanfaatan tanaman-tanaman herbal seperti bawang putih, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, temulawak, daun sirih dan daun mahkota dewa yang ternyata lebih efektif meningkatkan persentase karkas dan persentase organ dalam, selain itu bahan-bahan tersebut murah dan mudah didapat. Ramuan herbal

juga memiliki khasiat untuk kesehatan ternak dan manusia sebagai konsumen daging ayam. Kandungan minyak atsiri dan kurkumin sebagai zat bioaktif dalam ramuan herbal dapat merangsang keluarnya getah pankreas dan akan mengeluarkan enzim lipase yang dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang sehingga dapat memperbaiki sistem organ pada ayam.

Tanaman obat dalam bentuk jamu herbal yang diberikan kepada ternak khususnya melalui air minum atau dicampur ke dalam pakan sebagai *feed additive* berdampak baik terhadap peningkatan kesehatan dan stamina ternak, pertumbuhan, produktivitas menjadi optimal, meningkatkan efisiensi pakan, lemak abdominal lebih sedikit, aroma karkas tidak amis dan saluran pencernaan dapat bekerja dengan baik. Selain penambahan jamu herbal pada air minum juga ditambahkan vitamin. Vitamin adalah sekelompok komponen organik dalam jumlah kecil diperlukan dalam makanan namun sangat penting untuk reaksi metabolik dalam tubuh serta diperlukan untuk pertumbuhan normal tubuh, pemeliharaan kesehatan, produksi dan reproduksi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diadakan penelitian terhadap penambahan jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

B. Rumusan Masalah

Jamu herbal adalah obat tradisional yang terbuat dari bahan alami yang berasal dari tumbuhan. Jamu herbal selain untuk dikonsumsi manusia dapat juga dikonsumsi hewan ternak. Jamu herbal memiliki fungsi antara lain dapat

merangsang keluarnya getah pankreas dan akan mengeluarkan enzim lipase yang dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang sehingga dapat memperbaiki sistem organ pada ayam. Vitamin adalah sekelompok komponen organik dalam jumlah kecil diperlukan dalam makanan namun penting untuk reaksi metabolik dalam tubuh serta diperlukan untuk pertumbuhan normal tubuh, pemeliharaan kesehatan, produksi dan reproduksi. Olehnya itu, terdapat rumusan masalah yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan masyarakat mengenai pengaruh pemberian jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).
2. Sebagai referensi mahasiswa yang melakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh pemberian jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

E. Definisi Operasional

1. Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) adalah ayam kampung unggulan yang merupakan hasil persilangan antara ayam kampung yang memiliki beberapa keunggulan.
2. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak yang merupakan sumber energi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup.
3. Pakan imbuhan (*feed additive*) adalah suatu bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan pada pakan yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas ternak tersebut.
4. Ramuan herbal adalah media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alami sebagai bahan bakunya.
5. Vitamin adalah sekelompok komponen organik dalam jumlah kecil diperlukan dalam makanan namun penting untuk reaksi metabolik dalam tubuh serta diperlukan untuk pertumbuhan normal tubuh, pemeliharaan kesehatan produksi dan reproduksi.
6. Sistem pencernaan ayam adalah suatu lintasan organ yang menghubungkan antara lingkungan dengan proses metabolisme alamiah pada unggas.
7. Organ dalam adalah suatu kelompok jaringan yang berada di dalam tubuh yang mempunyai beberapa fungsi yang berbeda.

F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian jamu herbal dan vitamin dapat mempengaruhi organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB).

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Sulistyoningsih (2015), telah memanfaatkan mengkudu, jahe dan lidah buaya sebagai imbuhan pakan (*feed additive*) pada broiler yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap organ dalam broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan. P₀ menggunakan pakan komersial 100%, P₁ campuran pakan komersial dan lidah buaya 0,75%, P₂ campuran pakan komersial dan mengkudu 5 g/1 kg ransum, P₃ campuran pakan komersial dan jahe 2% dalam ransum. Parameter yang dilihat dalam penelitian ini adalah berat tubuh, hati, jantung, ampela, usus dan limpa. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian variasi herbal berpengaruh nyata terhadap bobot badan, dan bobot hati broiler tetapi tidak berpengaruh terhadap bobot jantung, ampela, usus dan limpa. Hasil terbaik diperoleh pada pemberian herbal lidah buaya dan mengkudu pada pakan broiler, dilihat dari bobot badan, bobot hati, jantung, usus dan limpa.

Aqsa dkk (2016), telah memanfaatkan daun sirih sebagai imbuhan pakan (*feed additive*) pada broiler yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profil organ. Penelitian ini menggunakan 68 DOC berjenis kelamin jantan dan betina yang dibagi menjadi 15 unit kandang. Perlakuan dalam penelitian adalah pengganti sebagian ransum yang terdiri dari lima perlakuan yaitu tidak mengandung tepung daun sirih (P₀) dan ransum yang mengandung tepung daun sirih 0,1 % (P₁), 0,5% (P₂), 0,7% (P₃), dan 1% (P₄). Ransum dan air minum diberikan *ad libitum*. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 3 kali ulangan. Organ yang diukur adalah berat hati, berat jantung, berat pankreas, berat seka (Coeca) dan berat gizzard. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan tepung daun sirih dalam ransum tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap berat hati, berat jantung, berat pankreas, berat seka (Coeca) dan berat gizzard ayam broiler.

Widyaningsi (2008), telah memanfaatkan ransum crumble dengan berbagai macam bahan perekat pada broiler yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap persentase organ dalam ayam broiler. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu proses pembuatan ransum dilaksanakan di Laboratorium Industri Makanan Ternak, Pemeliharaan ayam broiler dilakukan di salah satu peternakan rakyat yang bertempat di Desa Megamendung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan pengamatan organ dalam dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi Unggas, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini adalah penambahan perekat ongkok, bentonit dan tapioka sebanyak 2% dalam ransum bentuk crumble tidak memberikan pengaruh terhadap persentase bobot hati, jantung, limpa, empela, duodenum dan jejunum serta panjang relatif duodenum, ileum dan seka. Persentase bobot ileum nyata ($P<0.05$) lebih tinggi pada ransum perlakuan berperekat tapioka dibandingkan dengan ransum komersial. Persentase bobot jantung, limpa, ampela dan usus halus (duodenum, jejunum dan ileum) serta panjang relatif usus halus dan seka lebih tinggi pada ransum perlakuan berperekat dibandingkan dengan ransum komersial.

Aditya (2016), telah memanfaatkan tepung bunga cengkeh sebagai imbuhan pakan (*feed additive*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap persentase karkas dan organ dalam ayam pedaging. Materi yang digunakan sebanyak 25 ekor, 1 ekor dari masing-masing perlakuan ulangan dari pemeliharaan 200 ekor ayam pedaging jantan strain Lohman MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Umur 1 hari dengan rata-rata bobot badan $47,93 \pm 3,08$ g/ekor dengan koefisien keseragaman sebesar 6,42% dipelihara selama 35 hari. Pakan yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu pakan starter dengan komposisi 55% konsentrat broiler dan 45% jagung, sedangkan pakan finisher 55% jagung, 45% konsentrat broiler dan 5% bekatul. Tepung bunga cengkeh diperoleh dari Materia Medica Batu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 5 ulangan. Level perlakuan yang digunakan yaitu P_0 = pakan kontrol, P_1 = pakan kontrol + 0,25% tepung bunga cengkeh, P_2 = pakan kontrol + 0,50% tepung bunga cengkeh, P_3 = pakan kontrol + 0,75% tepung bunga cengkeh, P_4 = pakan kontrol + 1,00 % tepung bunga cengkeh. Variabel yang diukur yaitu persentase karkas, deposisi bagian karkas (dada, paha, dan sayap), lemak abdominal serta persentase organ dalam meliputi jantung, hati, gizzard dan limpa. Data hasil penelitian ditabulasi dengan program Microsoft Excel dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari RAL, apabila terdapat perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh dalam pakan tidak berpengaruh nyata terhadap persentase karkas dan bagiannya (dada, paha dan sayap), lemak abdominal serta organ dalam yaitu jantung, hati, gizzard dan limpa ayam pedaging. Kesimpulan hasil penelitian bahwa pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh (*Syzygium aromaticum* L) sebagai *feed additive* dalam pakan sampai level 1% terhadap ayam pedaging umur 5 minggu tidak dapat meningkatkan persentase karkas, memberikan respon yang sama terhadap lemak abdominal dan persentase organ dalam ayam pedaging.

Marhayani dkk (2019), telah memanfaatkan tepung daun pepaya terhadap organ dalam ayam kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot organ dalam ayam kampung yang diberikan ransum dengan campuran tepung daun pepaya. Penelitian menggunakan ayam kampung sebanyak 100 ekor yang dipelihara selama 12 minggu. Bahan ransum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jagung giling, dedak halus, tepung kedelai, tepung ikan dan tepung daun pepaya sebagai perlakuan. Ransum perlakuan disusun dengan kandungan protein 16% dan energy 2740 EM 9kkl/kg). Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, dengan perlakuan sebagai berikut: $R_0 = 0\%$ Ransum tanpa penggunaan Tepung Daun Pepaya, $R_1 = 2,5\%$ tepung Daun Pepaya dalam ransum, $R_2 = 5\%$ Tepung Daun Pepaya dalam ransum, $R_3 = 7,5\%$ tepung Daun Pepaya dalam ransum dan $R_4 = 10\%$ Tepung Daun Pepaya dalam ransum. Variabel yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah organ dalam ayam kampung diantaranya jantung, hati, gizzard dan ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penambahan tepung daun pepaya dalam ransum ayam kampung umur 12 minggu tidak berpengaruh terhadap organ jantung, hati, gizzard dan ginjal, dimana bobot jantung didapatkan dalam penelitian ini berkisar 0.48-0.68%, organ hati berkisar 1,99-2,70%, organ gizzard berkisar 3,71-5,08% dan organ ginjal berkisar 0,25-0,31% dari bobot hidup ayam umur 12 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun pepaya hingga 10% dalam ransum ayam kampung tidak berdampak negatif terhadap organ dalam ayam kampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Integrasi*

1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Ternak

Allah menciptakan binatang ternak bukan tanpa maksud dan tujuan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan binatang ternak juga seperti unggas termasuk binatang yang dipelihara secara intensif atau dikandangkan agar mudah dikontrol sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Mu'Minun/23:21.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Shihab (2001), menyebutkan bahwa kuasa dan anugerah-Nya yang berkaitan dengan air yang dengannya terjadi kehidupan. Kini, disebut anugerah serta bukti kuasa-Nya yang lain dengan menyatakan bahwa: “Dan,” di samping anugerah yang lalu, kami juga menganugerahkan binatang-binatang untuk kamu, antara lain ternak. “Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak,” unta atau juga sapi dan kambing. “Benar-benar terdapat ‘Ibrah,” yakni pelajaran, “bagi kamu”. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah swt. dan karunia-Nya. “Kami memberi

kamu minum dari sebagian”, yakni susu murni yang penuh gizi, “yang ada dalam perutnya,” dan juga selain susunya, “padanya”, yakni pada binatang-binatang ternak itu, secara khusus “terdapat juga faedah yang banyak untuk kamu,” seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan “dan sebagian darinya,” atas berkat Allah swt., “kamu makan” dengan mudah lagi lezat dan bergizi. “Dan di atasnya,” yakni di atas punggung binatang-binatang itu, yakni unta “dan” juga “di atas perahu-perahu kamu” dan barang-barang kamu “diangkut” atas izin Allah menuju tempat-tempat yang jauh.

firman Allah swt. dalam QS An-Nahl/16:66.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشَّرِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (Kementerian Agama RI, 2013).

Setiap yang diciptakan Allah swt. memiliki manfaat, sebagaimana ternak unggas juga memiliki manfaat mulai dari bulu dapat dimanfaatkan sebagai alat pembersih seperti kemoceng, dagingnya dapat diolah menjadi makanan, tulangnya dapat dijadikan sebagai tepung tulang dan fesesnya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain itu ternak unggas juga dapat dijadikan bahan penelitian untuk mengetahui apa saja yang ada pada ternak unggas.

2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Tanaman

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang tanaman dan berbagai manfaatnya misalnya saja tanaman tersebut berguna sebagai obat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16:11.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Al-mahalli dkk (2007), menyatakan bahwa dia menumbuhkan bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu (hal yang telah disebutkan itu benar-benar ada tanda) yang menunjukkan akan keesaan Allah swt. (Bagi kamu yang memikirkan) mengenai ciptaan-Nya sehingga mereka mau beriman karenanya.

Segala sesuatu yang Allah swt. ciptakan tiada yang sia-sia, semua memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Jika manusia berfikir maka ia akan mendapatkan manfaat namun jika mereka ingkar dan sombong maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Segala yang diciptakan Allah swt. di bumi ini merupakan tanda-tanda akan kebesaran-Nya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-An'am/6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ



Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Abdul Azmi dkk (2006), menyatakan bahwa ini adalah salah satu nikmatnya yang besar yang diperlukan oleh manusia dan yang lainnya yaitu bahwa Allah menurunkan air dari langit yang datang silih berganti disaat orang-orang memerlukannya. Lalu Allah menumbuhkan segala sesuatu yang dikarunia Allah, hidup lapang dengan rezki-Nya dan bersuka cita dengan kebaikan-Nya. Kekeringan, kekurangan dan panceklik lenyap dari mereka. Hati berbunga-bunga, wajah berseri-seri, para hamba meraih rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berupa sesuatu yang dengannya mereka merasakan nikmat-nikmat, dengan menyembah-Nya dan ketika Dia menyebutkan bermacam pohon dan tumbuh yang ditumbuhkan oleh air, dia menyebutkan tanaman pangan dan pohon kurma karena manfaatnya sangat banyak, dan dia sebagai makanan pokok bagi manusia. Dia berfirman, “maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan darinya,” maksudnya, dari tanaman

yang hijau itu, “butir yang banyak,” sebagian diatas sebagian yang lain, berupa gandum, jewawut, pedi dan tanaman-tanaman pangan yang lainnya. Dan dari penjelasan ini menunjukkan bahwa butirnya bermacam-macam. Semuanya berasal dari bahan yang satu yang tidak bercampur aduk. Bahkan ia merupakan butir-butir yang terpisah-pisah dari pasal yang satu, dan ia juga menunjukkan kepada banyaknya dan keluasan hasil produknya, agar asal bijinya tetap ada sementara sisa dan jumlah yang besar dimakan dan disimpan.

“Dan dari pohon kurma,” Allah mengeluarkan “dari mayangnya,” yaitu janjang dan manger sebelum tangkai-tangkai yang menjuntai itu muncul, maka dari janjang tersebut “terurai tangkai-tangkai yang menjuntai.” Maksudnya, tangkai yang dekat, mudah diambil, merunduk kepada orang yang ingin memetikinya tanpa kesulitan. Walaupun ia panjang, namun padanya terdapat pelepah dan tatakan yang memudahkan untuk memanjatnya. “Dan,” dengan air itu Allah mengeluarkan “kebun-kebun anggur, dan kamu keluarkan pula Zaitun dan Delima.” Ini termasuk pohon yang besar dan banyak manfaat dan kegunaannya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan pohon dan tumbuhan secara umum. Firman-Nya, “Yang serupa dan yang tidak serupa.” Ada kemungkinan dia kembali kepada delima dan zaitun, yakni serupa buahnya. Ada kemungkinan lain, ia kembali kepada semua pohon dan buah-buahan. Sebagian lainnya dan cirri-cirinya tidak jauh berbeda, dan sebagian yang lain benar-benar berbeda. Dari itu semua manusia mengambil manfaat, menikmati buah-buahan dan menjadikannya bahan makanan dan mereka juga bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar mengambil

pelajaran dari-Nya. Dia berfirman, “perhatikanlah,” buah seluruh pohon khususnya kurma, “diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya.” Maksudnya, perhatikan waktu dia muncul dan waktu ia matang dan ranum. Karena hal itu mengandung pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti rahmat-Nya, keluasan karunia dan kemurahan-Nya, serta kesempurnaan kodrat, dan perhatian-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Akan tetapi tidak semua orang mau memperhatikan dan mengambil pelajaran, dan tidak semua yang merenungkan pasti mengetahui rahasia yang dimaksud. Oleh karena itu Allah membatasi pengambilan manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-rang Mukmin.

Setiap yang diciptakan Allah swt. memiliki manfaat, sebagaimana tanaman bawang putih, kencur, kunyit, temulawak, lengkuas, jahe, daun sirih, daun pepaya, sambiloto, brotowali, daun mahkota dewa dan kayu manis dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan selain itu juga tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jamu herbal.

B. Kajian Teoritis

1. Pakan

Pakan adalah campuran dari berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk ternak yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan. Ransum dapat diartikan sebagai pakan tunggal atau campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan pada ternak untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam baik diberikan sekaligus maupun sebagian. Ransum adalah kumpulan dari beberapa bahan pakan

ternak yang telah disusun dan diatur sedemikian rupa untuk 24 jam. Pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan sebagai sumber energi dan zat-zat gizi, istilah pakan sering diganti dengan bahan baku pakan, pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan yang menunjukkan penggunaan kata pakan diganti sebagai bahan baku pakan yang telah diolah menjadi pellet, crumble atau mash (Suprijatna, 2008).

Pakan memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak baik sebagian atau seluruhnya yang berasal dari bahan organik maupun anorganik yang tidak mengganggu kesehatan ternak. Pakan yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ternak. Bahan pakan itu sendiri terdiri dari 2 macam yaitu pakan kasar (hijauan) dan pakan konsentrat. Pakan kasar adalah jenis pakan yang mengandung serat kasar sebesar 18% atau lebih, sedangkan konsentrat merupakan pakan yang mengandung sumber energi dan protein bagi ternak. Pola pertumbuhan ternak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Pakan dengan kualitas baik biasanya dapat dikonsumsi oleh ternak dalam jumlah yang banyak daripada pakan kualitas rendah. Pemberian pakan yang baik kepada ternak tentu akan berkontribusi pada produksinya yang relatif lebih tinggi. Pakan memiliki kebutuhan yang paling tinggi yakni 60-70% dari total biaya produksi. Tingginya biaya tersebut mengharuskan peternakan untuk menjadikan pakan sebagai hal yang harus diperhatikan dalam usaha peternakan (Suminar, 2011).

Bahan makanan memang sumber pertama kebutuhan nutrisi ayam untuk keperluan hidup pokok dan produksinya, tidak ada bahan makanan yang sempurna, satu bahan mengandung semua nutrisi. Disinilah dasar penggunaan bahan makanan dengan sistem kombinasi bahan makanan dengan memanfaatkan kelebihan setiap bahan dan menekan kekurangan bahan-bahan yang dikehendaki (Murdifin, 2015).

Selanjutnya Murdifin (2015), menjelaskan bahwa tujuan pemberian ransum pada ayam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan berproduksi. Untuk produksi maksimum dilakukan dalam jumlah cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Ransum ayam KUB harus seimbang antara kandungan protein dengan energi dalam ransum. Disamping itu kebutuhan vitamin dan mineral juga harus diperhatikan. Sesuai dengan tujuan pemeliharaannya yaitu memproduksi daging sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, maka jumlah pemberian pakan tidak dibatasi (*adlibitum*). Ransum untuk ayam KUB dibedakan menjadi dua yaitu ransum untuk periode starter dan ransum untuk periode finisher.

Pemberian ransum pada ternak yang masih berumur sehari atau *Day Old Chick* (DOC) diletakkan di kertas atau tempat pakan dari nampan yang kecil. Setelah ayam berumur diatas 1 minggu, tempat pakan harus diganti dengan tempat pakan khusus yang digantung (Basmar, 2013).

Pemberian ransum dilakukan secara (*adlibitum*) dengan pemberian ransum berbentuk tepung pada periode starter, butiran pecah pada periode finisher dan terkadang diberikan ransum yang berbentuk pellet. Pemberian ransum

bertujuan menjamin pertambahan bobot badan dan produksi daging. Jenis bahan ransum dan kandungan gizinya harus diketahui untuk mendapatkan formula ransum yang telat. Menyatakan bahwa pemberian ransum pada ternak disesuaikan dengan umur, kesukaan terhadap ransum dan jenis ransum. Ransum untuk ayam yang belum berumur diberikan dalam bentuk tepung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pencernaan ransum di dalam saluran pencernaan (Sofyan, 2005).

2. Imbuhan Pakan

Imbuhan pakan adalah suatu bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan, biasanya dalam kuantitas kecil, ke dalam campuran makanan dasar, untuk memenuhi kebutuhan khusus, contohnya saja imbuhan pakan sebagai konsentrat, imbuhan pakan sebagai suplemen, imbuhan pakan premix dan imbuhan pakan bahan makanan (Azzahraatika, 2012).

Selanjutnya Azzahraatika (2012), menjelaskan bahwa imbuhan pakan adalah imbuhan yang umum digunakan dalam pembuatan pakan ternak, penambahan bahan biasanya hanya dalam jumlah yang sedikit, misalnya bahan konsentrat, bahan suplemen dan premix. Maksud dari penambahan adalah untuk merangsang pertumbuhan atau merangsang produksi.

Imbuhan pakan merupakan bahan makanan pelengkap yang dipakai sebagai sumber penyedia vitamin-vitamin, mineral-mineral dan juga antibiotik. Fungsi imbuhan pakan adalah untuk menambah vitamin-vitamin, mineral dan antibiotik dalam ransum, menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh terhadap serangan serangga penyakit dan pengaruh stres, merangsang pertumbuhan badan dan menambah nafsu makan, meningkatkan produksi daging maupun telur.

Macam ragam pakan imbuhan pakan antara lain imbuhan pakan pada bahan pakan (contohnya agensia antioksidan agensia cita rasa), imbuhan pakan untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi nutrien (contohnya buffer, enzim), imbuhan pakan untuk kesehatan ternak (contohnya obat cacing), imbuhan pakan melalui hormonal (contohnya hormon pertumbuhan, hormon reproduksi), imbuhan pakan untuk meningkatkan kualitas produk (contohnya agensia pewarna, agensia antiradikal) (Wahju, 2006).

Selanjutnya Wahju (2006), menyatakan bahwa berbagai macam imbuhan pakan yang bersifat tidak mempengaruhi kandungan nutrient ransum antara lain:

1. Makanan tambahan pelengkap untuk memperbaiki tekstur dan kekuatan pakan pellet.
2. *Flavoring agent* yaitu zat pemberi bau enak yang dipergunakan untuk meningkatkan palatabilitas pakan.
3. Enzim-enzim yang memperbaiki daya cerna dibawah kondisi tertentu.
4. Antibiotik, senyawa-senyawa arsen dan nitrofurans dipergunakan pada tingkat rendah untuk melindungi pakan dari serangan perusakan oleh mikroorganisme dan mencegah timbulnya keracunan yang disebabkan oleh mikroflora dalam usus.
5. Antibiotik yang mempunyai spektrum luas dan daya adsorpsi yang baik ditambahkan ke dalam pakan untuk memerangi penyakit khusus.
6. Senyawa-senyawa kimia tertentu dipergunakan untuk meningkatkan daya penyembuhan dari antibiotik terhadap penyakit.

7. Obat-obat pencegah cacing dalam saluran pencernaan.
8. Antioksidan untuk mencegah kerusakan asam-asam lemak yang tidak jenuh dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak karena proses peroksidasi.
9. Sumber-sumber karotenoid ditambahkan dalam pakan untuk memperbaiki pigmentasi dari broiler dan kuning telur.
10. Hormon-hormon yang digunakan untuk memperbaiki metabolisme ayam.

Menurut Sofyan (2012), menyatakan bahwa pemberian pakan imbuhan (*feed additive*) pada ternak unggas ditujukan untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi yang berujung pada tambahan keuntungan bagi peternak. Antibiotik adalah salah satu imbuhan pakan yang biasa digunakan sebagai pemacu pertumbuhan dan menaikkan efisiensi ransum.

Penggunaan antibiotik komersial pada ayam kampung unggulan terbukti dapat meningkatkan pendapatan peternak. Akan tetapi dapat menimbulkan masalah yang besar dikarenakan adanya mikroorganisme patogen yang ada di dalam saluran pencernaan menjadi resisten. Di samping itu ditemukannya resisten mikroba dan residu pada produk peternakan yang dihasilkan akibat penggunaan antibiotik. Beberapa *feed additive* seperti hormon dan antibiotik telah dilarang penggunaannya di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya isu global peternakan (unggas) saat ini, yaitu keamanan pangan hewani dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya bagi konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan. Beberapa jenis antibiotik yang masih dapat dipergunakan, diantaranya adalah *Avilamycin* dan *Flavomycin*.

Dasar dari pembuatan Peraturan Menteri Pertanian tentang klasifikasi obat hewan No 14 Tahun 2017 adalah bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian No 806/Ktps/TN. 260/12/94 tentang klasifikasi obat hewan yang dibuat pada tahun 1994 dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (4) Undang – Undang no 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan ke dalam Undang – Undang no 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Obat Hewan. Maksud dari Surat Keputusan Menteri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan.

3. Ayam Kampung Unggul (KUB)

Dalam upaya meningkatkan kebutuhan teknologi pembibitan ayam kampung unggul. Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor telah melakukan berbagai penelitian pada ayam kampung. Hasil penelitian menunjukkan, melalui teknologi seleksi dan sistem pemeliharaan yang intensif produktivitas ayam kampung dapat meningkat. Hasil seleksi tersebut menghasilkan ayam kampung unggul yang disebut dengan Ayam Kampung Unggul Balitnak atau di masyarakat dikenal dengan sebutan ayam KUB.

Penelitian untuk mendapatkan ayam kampung unggul, telah dimulai sejak tahun 1997 dengan metode mengambil calon bibit dari berbagai daerah di Jawa Barat. Calon bibit ayam kampung tersebut dipelihara secara intensif di kandang

Percobaan Balitnak Ciawi. Perkawinan dilakukan dilakukan dengan teknik inseminasi buatan (IB) yang diikuti dengan pencatatan yang ketat untuk menghindari terjadinya *in breeding*. Selama periode pemeliharaan, diberikan pakan standar yang sesuai dengan kebutuhan gizi ayam kampung.

Ayam kampung unggul balitnak (KUB) mempunyai kelebihan lainnya, yaitu mengandung gen MX^{++} 60%, gen penanda ketahanan terhadap flu burung sehingga membuatnya lebih tahan terhadap serangan AI. Sebagai perbandingan, ayam broiler tidak mengandung gen tersebut, sementara pada ayam kampung biasa kandungan gen tersebut di bawah 60%.

Ayam KUB merupakan jenis ayam kampung dengan galur baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Budidaya ayam KUB bertujuan untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ayam KUB memiliki keunggulan seperti sifat mengeram rendah dan produksi telur tinggi, sehingga menjadi indukan penghasil DOC yang banyak.

Ayam ini merupakan ayam hasil penemuan terbaru dengan kelebihan lainnya yaitu pada pemeliharaan intensif dengan diberi ransum komersial mampu menghasilkan daging secara cepat dalam waktu kurang dari 70 hari. Tinggi atau rendahnya tingkat energi metabolis dalam ransum mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsumsi ransum unggas. Ransum yang mengandung energi metabolis rendah mengakibatkan konsumsi ransum ternak meningkat (Wahju, 2006). Meningkatnya konsumsi ransum mempengaruhi bobot badan akhir yang tinggi dan akan menghasilkan bobot *idible* dan *in edible* yang tinggi pula, dengan demikian antara bobot badan akhir dengan bobot *edible* dan *in edible* berkolerasi

positif, artinya semakin tinggi bobot badan akhir yang dihasilkan maka akan diikuti bobot *edible* dan *in edible* yang tinggi pula. Keunggulan dari ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) pedaging, yaitu bobot badan dapat mencapai 1 kg pada umur 70 hari, keunggulan lain dari ayam KUB diantaranya konsumsi ransum rendah, mortalitas rendah, daya tetas telur yang tinggi dan pertumbuhan lebih cepat (Sartika dkk, 2013).



Gambar 2. Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)
(Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2017)

4. Jamu Herbal

Jamu herbal adalah obat tradisional yang terbuat dari bahan alami yang berasal dari tumbuhan dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Ramuan tanaman obat (jamu) selain untuk dikonsumsi manusia dapat juga digunakan untuk kesehatan ternak (Zainuddin, 2010).

Salah satu masalah yang di hadapi peternak ayam adalah biaya pakan dan obat-obatan yang tinggi serta tingginya angka kematian akibat penyakit. Untuk mengatasi masalah penyakit secara konvensional penggunaan jamu sudah dilakukan sejak dulu dan telah terbukti dapat mencegah berbagai penyakit pada manusia. Bahan jamu herbal sangat mudah didapatkan dimana saja karena masyarakat sejak dulu sudah memanfaatkannya.

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan tanaman obat, karena iklim di Indonesia memungkinkan untuk menanam tanaman sepanjang tahun sehingga kebutuhan terpenuhi. Obat tradisional digunakan sebagai alternatif penggunaan obat kimia dan beberapa penyakit ternyata sembuh dengan obat tradisional.

Campuran beberapa tanaman herbal yang digunakan ternyata memiliki zat bioaktif yang sama sehingga perlu mencoba mengurangi jenis bahan untuk mendapatkan performa yang efisien dan ekonomis tanpa menyebabkan kelainan fisiologi ayam (Agustina dkk, 2009).

a) Bawang putih

Bawang putih (*Allium sativum*) adalah tanaman umbi lapis dari genus *Allium sp.* Bawang putih memiliki kedekatan dengan bawang merah dan bawang bombay. Bawang putih merupakan tanaman asli Asia tengah. Bawang putih telah menjadi bahan pokok di wilayah Mediterania, Afrika dan Eropa dan menjadi bumbu masak di wilayah Asia. Bawang putih telah dimanfaatkan orang mesir kuno sebagai bahan medis dan bahan masak. Pemakaian bawang putih dalam mengobati luka dimulai dari abad pertengahan hingga perang dunia ke 2, ketika bawang putih digunakan untuk mengobati luka dari tentara (Bayan *et al*, 2014).

Bawang putih mempunyai batang yang panjang dan tegak yang dapat mencapai tinggi dua hingga tiga kaki (0,6-0,91 m). Bawang putih memiliki tiga cara reproduksi, umbi lapis yang menjadi akar bunga (siung), umbi kecil berasal dari bunga dan dari biji. Bawang putih diduga melakukan reproduksi seksual dan aseksual sekaligus tetapi pada pertanian hampir dilakukan secara aseksual dengan

cara menanam langsung umbi bawang putih dalam tanah karena lebih mudah. bawang putih memiliki banyak potensi klinis dari studi eksperimental. Banyak bukti epidermiologi tentang efek terapik dari bawang putih. Efek ini memiliki implikasi dalam mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, mengurangi resiko kanker, memiliki efek hepatoprotektor, antioksidan dan antimikroba (Meredith, 2008).

Bawang putih memiliki kandungan sekitar 33 senyawa sulfur, 17 asam amino, beberapa enzim dan mineral. Senyawa sulfur inilah yang membuat bawang putih memiliki bau tajam yang khas dan membuat bawang putih memiliki efek klinis. Senyawa paling aktif dari bawang putih, *allicin* (*allyl 2-propenethiosulphinate*) dan hasil turunannya (*dialil thiosulfinat* dan *dialildisulfida*) tidak akan ada jika bawang putih dihancurkan atau dipotong, kerusakan pada sel bawang putih akan mengaktifkan enzim *allinase* yang merubah *alliin* menjadi *allicin* (Bayan *et al*, 2014).

Komponen aktif dalam bawang putih yaitu *alisin*. *Alisin* merupakan zat aktif yang mempunyai daya bunuh pada bakteri dan anti radang, *alisin* merupakan suatu asam amino yang bekerja sebagai antibiotik serta dapat menurunkan kolesterol darah dan daging pada broiler (Boboye *et al*, 2008).

Berdasarkan penelitian lanjutan Purwanti (2015), menyatakan bahwa fitobiotik ekstrak air bawang putih (EABP) dapat dijadikan alternatif *feed additive* sebagai *Natural growth promoters* (NGPs) yang aman dalam pakan unggas, mengingat penggunaan antibiotik sudah tidak diperbolehkan dalam

pakan. Pemberian EABP yang optimal pada level 2.0% cenderung memperbaiki performa, kadar kolesterol karkas dan status kesehatan unggas.

Manfaat bawang putih sebagai obat dikarenakan kombinasi dua senyawa yang dikandungnya yaitu *alisin* dan *scordini*. *Alisin* mampu melawan infeksi yang disebabkan oleh amuba, bakteri, jamur atau virus yang dapat merusak jaringan organ dalam pencernaan. *Scordinin* memiliki kemampuan meningkatkan daya tahan tubuh dan juga berfungsi sebagai antioksidan (Syamsiah dkk, 2006).

b) Kencur

Menurut Sembiring (2012), menyatakan bahwa klasifikasi tanaman kencur termasuk kedalam famili *Zingiberaceae* dengan sistematikanya dapat dilihat sebagai berikut:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Kingdom | : Plantarum |
| Divisi | : Spermatophyta |
| Subdivisi | : Angiospermae |
| Kelas | : Monocotyledone |
| Ordo | : Zingiberales |
| Famili | : Zingiberaceae |
| Genus | : <i>Kaempferia</i> |
| Spesies | : <i>Kaempferia galanga</i> Linn |

Menurut Sembiring (2012), menyatakan bahwa kencur mempunyai daya adaptasi yang cukup tinggi. Rimpang kencur mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terkandung kurang lebih 23 macam senyawa, 17 diantaranya merupakan senyawa aromatik, *monoterpena* dan *seskuioterpena*. Semua bagian

kencur bermanfaat tetapi yang umum dipakai adalah rimpangnya untuk menambah nafsu makan dan memperlancar edaran darah. Kencur segar mengandung antibakteri walaupun sedikit.

c) Kunyit

Kunyit (*Curcuma domestica* Val) termasuk tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Menurut Winarno (2003), menyatakan bahwa klasifikasi tanaman kunyit adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Kingdom | : Plantae |
| Divisi | : Spermatophyta |
| Subdivisi | : Angiospermae |
| Kelas | : Monocotyledone |
| Subkelas | : Zingiberidae |
| Ordo | : Zingoberaceae |
| Family | : Zingiberaceae |
| Genus | : <i>Curcuma</i> |
| Spesies | : <i>Curcuma domestica</i> Val |

Kunyit merupakan tanaman herbal dan tingginya dapat mencapai 100 cm. Batang kunyit semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dan berwarna hijau kekuningan. Daun kunyit tunggal, berbentuk lanset memanjang, helai daun berjumlah 3-8, ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun rata, pertulangan menyirip dan berwarna hijau pucat. Rimpang kunyit mengandung minyak atsiri dan mengandung kurkumin (Mahendra, 2005).

Fungsi kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getas pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak dan protein. Disamping itu minyak atsiri yang terkandung dalam kunyit dapat mempercepat pengosongan isi lambung (Riyadi, 2009).

Kandungan utama rimpang kunyit terdiri dari minyak atsiri, kurkumin, resin, oleoresin, desmotoksi kurkumin dan bidesmetoksi kurkumin, damar, gom, lemak, protein, kalsium, fosfor dan besi. Zat warna kuning (kurkumin) dimanfaatkan untuk menambah cerah atau warna kuning kemerahan pada kuning telur. Kunyit jika dicampurkan pada pakan ayam, dapat menghilangkan bau kotoran ayam dan menambah berat badan ayam, juga minyak atsiri kunyit bersifat antimikroba (Rahardjo dan Rostiana, 2005).

Kunyit mengandung komponen aktif kurkumin yang memiliki sifat antibakteri. Umumnya penggunaan kunyit dalam pakan ayam diberikan dengan tujuan menurunkan tingkat populasi bakteri dalam saluran pencernaan ayam. Senyawa kimia yang ada dalam kunyit mampu menurunkan lemak dalam tubuh, berperan pada proses sekresi empedu dan pankreas yang dikeluarkan lewat feses. Komposisi dari kurkumin memiliki khasiat dapat memperlancar sekresi empedu.

d) Temulawak

Temulawak mempunyai nama ilmiah *Curcuma xanthorrhiza* Roxb adalah tanaman obat-obatan yang tergolong dalam suku temu-temuan (*Zingiberacea*). Temulawak banyak ditemukan di hutan-hutan daerah tropis. Temulawak juga berkembangbiak di tamah tegalan sekitar pemukiman, terutama pada tanah yang gembur, sehingga buah rimpangnya mudah berkembang menjadi besar. Daerah tumbuhnya selain di dataran rendah juga dapat tumbuh baik sampai pada ketinggian tanah 1.500 meter di atas permukaan laut (Afifah, 2005).

Menurut Wijayakusuma (2007), menyatakan bahwa temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* ROXB) merupakan tanaman asli Indonesia yang termasuk salah satu jenis temu-temuan atau jahe-jahe dengan klasifikasi sebagai berikut:

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Filum | : Spermatophyta |
| Sub filum | : Angiospermae |
| Kelas | : Monocotyledone |
| Ordo | : Zingiberales |
| Famili | : Zingiberaceae |
| Genus | : <i>Curcuma</i> |
| Spesies | : <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb |

Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang termasuk salah satu jenis temu-temuan atau jahe-jahean. Kandungan kimia rimpang temulawak dibedakan atas tiga komponen besar, yaitu fraksi pati, fraksi kurkuminoid dan fraksi minyak atsiri. Selain itu, berdasarkan penelitian, manfaat temulawak kini diketahui juga dapat mengatasi penyakit anemia, menurunkan kolesterol,

melancarkan peredaran darah, mengatasi gumpalan darah, mengobati demam, malaria, penyakit campak, mengatasi pegal linu, sakit pinggang, rematik, mengobati keputihan, ambeyen, sembelit, batuk dan penyakit lainnya (Rahayu dan Iswayuni, 2010).

Kandungan minyak atsiri temulawak sekitar 4,6%-11% yang berkhasiat untuk meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol dan mengaktifkan enzim pemecah lemak (Rahayu dan Iswayuni, 2010).

e) Lengkuas

Lengkuas (*Alpinia galanga* L.) disebut juga sebagai *Greater galanga* L atau *Lesser galang* L, termasuk kedalam keluarga Zingiberaceae. Tanaman ini diduga berasal dari Asia Tenggara atau China bagian selatan. Saat ini, lengkuas telah berkembang dan dibudidayakan di banyak negara termasuk di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan India. Lengkuas sering dipakai sebagai penyedap masakan. Manfaat lengkuas ini adalah bahan herbal yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan jamur kulit. Manfaat lain dari lengkuas ini adalah sebagai bahan pengawet makanan karena adanya mikroba pembusuk atau dijadikan sebagai pengganti formalin (Rahayu dan Iswayuni, 2010).

Menurut Syamsiah dan Tajuddin (2003), menyatakan bahwa bagian rimpang lengkuas mengandung 1% atsiri, sineol minyak terbang, eugenol, seksuiterpen, pinen kaemferida, galangan, galangol, Kristal kuning dan asam metil sinamat.

f) Jahe

Jahe (*Zingiber officinale*) adalah tanaman herbal yang tergolong family *Zingiberaceae*. Jahe dikelompokkan menjadi 3 yaitu jahe putih besar, jahe emprit dan jahe merah (Rostiana dkk, 2005).

Menurut Nursal dkk (2006), menyatakan bahwa jahe mengandung senyawa flavonoid, fenol, terpenoid. Manfaat jahe adalah dapat merangsang kelenjar pencernaan. Minyak atsiri yang terkandung dalam jahe memiliki manfaat farmakologi contohnya melancarkan peredaran darah, anti inflamasi, anti bakteri, melancarkan pengeluaran empedu dan antipiretik.

Jahe dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti Zingiberin, kamfer, lemonin, borneol, shogaol, sineol, fellandren, zingiberol, gingerol dan zingeron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Senyawa aktif yang juga terkandung dalam jahe yang bersifat anti-inflamasi dan antioksidan adalah gingerol, beta-caroten, capsaicin, asam cafeic, curcumin dan salicilat. Jahe juga berkhasiat untuk mengatasi gangguan pencernaan yang beresiko terhadap kanker usus besar dan sembelit, menyembuhkan penyakit flu, mengurangi resiko serangan kanker colorectal dan membantu meningkatkan kesehatan jantung (Ware, 2017).

g) Daun sirih

Sirih adalah tanaman yang menempel di batang pohon. Panjang tanaman ini antara 5-15 m. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan tempat yang ekstrim. Tanaman ini bisa hidup mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi sekitar 1000 m (Chasanah, 2009).

Sirih tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sering ditemukan di pekarangan. Tempat tumbuh yang disukai adalah ketinggian 200-1000 mdpl yang mempunyai curah hujan 2250-4750 mm per tahun. Tanaman ini tumbuh di daerah hutan agak lembab dengan keadaan tanah yang lembab, daerah yang teduh dan terlindung dari angin (Dalimartha, 2006).

Selanjutnya Chasanah (2009), menjelaskan bahwa minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih terdiri dari fenol, hidroksi kavikol, kavikol, kavibetol, seskuiterpena, estragenol, metil eugenol, karvanol dan lain sebagainya. Rasa daun sirih agak pedas di lidah. Khasiat daun sirih antara lain antibiotik, antiseptik dan stimulan. Secara tradisional, masyarakat memanfaatkan daun sirih untuk obat batuk, obat kumur, mengobati gusi dan hidung berdarah, menghilangkan bau badan dan bisa menyembuhkan penyakit maag.

h) Daun pepaya

Pepaya (*Carica papaya* L) adalah salah satu jenis tanaman buah-buahan yang daerah penyebarannya berada di daerah tropis. Buah pepaya tergolong buah yang populer dan umumnya digemari oleh bagian besar penduduk dunia. Hal ini disebabkan karena daging buahnya yang lunak dengan warna merah atau kuning, rasanya manis dan menyegarkan serta banyak mengandung air. Tanaman pepaya

ini merupakan tanaman tahunan sehingga buah ini dapat tersedia setiap saat (Barus, 2008).

Menurut Rukmana dkk (2008), menyatakan bahwa klasifikasi tumbuhan pepaya adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------|--------------------------|
| Kingdom | : Plantae |
| Subkingdom | : Tracheobionta |
| Super Divisi | : Spermatophyta |
| Divisi | : Magnoliophyta |
| Kelas | : Magnoliopsida |
| Sub Kelas | : Dilleniidae |
| Ordo | : Caricales |
| Famili | : Caricaceae |
| Genus | : <i>Carica</i> |
| Spesies | : <i>Carica papaya</i> L |

Pepaya memiliki nama latin *Carica papaya* L termasuk dalam family Caricaceae. Pepaya mengandung banyak air dan vitamin C. Batang, daun dan buah pepaya mengandung getah putih seperti susu yang mengandung enzim pemecah protein atau proteolitik yang dikenal dengan enzim papain. Enzim ini banyak digunakan dalam bidang industri seperti dalam bidang farmasi.

Dalam tanaman pepaya terkandung enzim papain. Enzim papain ini berfungsi untuk melancarkan saluran pencernaan. Selain kandungan enzim papain didalamnya pepaya juga mengandung sifat antiseptik yang berfungsi untuk mencegah perkembangbiakan bakteri jahat yang ada di usus.

Adapun senyawa yang ada di dalam pepaya antara lain enzim papain, alkaloid karpina, glikosid, karposid, sakarosa, dekstrosa, levulosa. Alkaloid karpina mempunyai efek seperti digitalis. Sementara buahnya mengandung karotene, galaktosa, arabinose, papain, papayotimin papain dan fitokinase. Manfaat lain dari daun pepaya adalah menambah nafsu makan, mencegah kanker dan melancarkan pencernaan.

i) Sambiloto

Tanaman sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai obat tradisional yang berfungsi sebagai antiradang, antiinflamasi dan antipiretik. Daun sambiloto mengandung senyawa kimia antara lain deoksiandrografolid, andrografolid, neoandrografolid, 12 dehidroandrografolid dan homoandrografolid (Hariana, 2006).

Menurut Dalimartha (2006), menyatakan bahwa klasifikasi tanaman sambiloto adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledone
Ordo : Solanaceae
Familia : Acanthaceae
Genus : *Andrographis*
Spesies : *Andrographis paniculata* Ness

Sambiloto memiliki tinggi sekitar 0,5-1 meter. Daun tunggal berbentuk bulat telur, terasa pahit, bagian atasnya berwarna hijau tua sedangkan bagian bawahnya lebih pucat. Bunga majemuk, kecil, berwarna putih dengan garis ungu. Buah berbentuk kotak, tegak, agak berbentuk silinder, bulat panjang, bagian ujungnya runcing dan tengahnya beralur, buah berwarna hijau, setelah daun tua berwarna hitam. Sambiloto digunakan sebagai antiradang, merendahkan demam dan untuk penawar racun. Pada uji pra klinik untuk efek antiradang menggunakan menit bahwa infus daun sambiloto 51, 4 mg/100 g BB, secara oral dapat meningkatkan efek antiradang (Achmad, 2007).

j) Brotowali

Brotowali merupakan jenis tumbuhan yang mudah ditemukan dan mudah dalam perawatannya, tumbuh liar di hutan, ladang atau depan rumah yang berfungsi sebagai tanaman obat (Dalimartha, 2008).

Brotowali merupakan tumbuhan merambat yang mempunyai panjang 2,5 meter atau lebih. Brotowali tumbuh di hutan daerah tropis. Brotowali menyebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa Negara di Asia Tenggara (Supriadi, 2001).

Menurut Dalimartha (2008), menyatakan bahwa klasifikasi brotowali adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledone

Bangsa : Ranunculales

Suku : Manispermaceae
Marga : *Tinospora*
Jenis : *Tinospora crispa* L

Batang brotowali dimanfaatkan untuk rematik, demam, menambah nafsu makan dan cacingan. Air rebusan daun brotowali sering dimanfaatkan untuk mencuci luka pada kulit atau gatal. Sedangkan rebusan daun dan batang brotowali dimanfaatkan untuk mengobati kencing manis. Seluruh bagian tanaman brotowali digunakan untuk pengobatan (Dalimartha,2008).

k) Daun mahkota dewa

Mahkota dewa (*Phaleria macrocarpa*) termasuk dalam famili *Thymelaeace*. Asal tanaman mahkota dewa belum diketahui. Akan tetapi dilihat dari nama botaninya *Phaleria papuana*, banyak orang memperkirakan tanaman ini populasi aslinya dari tanah papua Irian Jaya. Mahkota dewa tumbuh subur di tanah yang gembur dan subur pada ketinggian 10-1200 mdpl.

Mahkota dewa yang dijadikan obat herbal adalah daun, daging dan kulit buahnya. Daun dan kulit buah bisa digunakan segar atau yang telah dikeringkan, sedangkan daging buah digunakan setelah dikeringkan.

Tanaman yang awalnya ditanam sebagai tanaman peneduh ini tergolong dalam family *Thymelaeacea*. Dalam taksonomi tumbuhan, tanaman daun mahkota dewa diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnliophyta
Subkelas : Magnoliosida
Ordo : Myrtales
Family : Thymelaeaceae
Genus : *Phalero*
Spesies : *Phaleria macrocarpa*

1) Kayu manis

Kayu manis termasuk dalam family *Lauraceace*. Nama umum tanaman ini yaitu *Java cinnamon* (kayu manis Jawa). Tanaman ini mempunyai sinonim yaitu *Cinnamomum chinese* Bl, *Cinnamomum dulce* Ness dan *Cinnamomum kiamis* Ness (Agusta, 2000).

Kayu manis terutama bagian kulit batangnya pada umumnya digunakan secara tradisional baik sebagai bumbu masakan maupun sebagai bahan jamu herbal, misalnya sebagai peluruh kentut. Kayu manis bermanfaat mengatasi masuk angin, diare dan penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kayu manis juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Bisset and Wichtl, 2001).

5. Vitamin

Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amino yang bermolekul kecil yang berfungsi vital dalam metabolisme setiap organisme, yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Dilihat dari sisi enzimologi (ilmu tentang enzim), vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya,

senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal.

Vitamin adalah senyawa organik tertentu yang diperlukan dalam jumlah kecil, baik manusia maupun hewan. Tetapi, digunakan untuk reaksi metabolisme dalam sel dan penting untuk melangsungkan pertumbuhan normal serta memelihara kesehatan. Kebanyakan vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh. Beberapa diantaranya masih dapat dibentuk oleh tubuh, namun kecepatan pembentukannya sangat kecil sehingga jumlah yang terbentuk tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Oleh karena itu tubuh harus memperoleh vitamin dari makanan sehari-hari. Jadi, vitamin berperan mengatur metabolisme, mengubah lemak dan karbohidrat menjadi energi dan ikut mengatur pembentukan jaringan tulang.

Vitamin dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin C dan semua golongan vitamin B) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E dan K).

Salah satu vitamin yang sering digunakan dalam usaha peternakan adalah vita chicks. Manfaat dari vita chicks antara lain mengurangi angka kematian pada anak ayam, mencegah kekurangan vitamin, mempercepat pertumbuhan ayam, mengatasi stress pada ayam. Kelebihan dari vita chicks antara lain mengandung vitamin sangat lengkap yang berguna meningkatkan metabolisme tubuh dan memaksimalkan pertumbuhan ayam, air minum yang diberi sedikit larutan vita chicks dapat meningkatkan pertumbuhan ayam lebih maksimal, kandungan vitamin dan antibiotik perangsang pertumbuhan yang dikandung vita chicks

sangat stabil sehingga bisa tahan di simpan lama. Vita chicks mengandung multivitamin dan *Growth promoter antibiotic* yang aman untuk anak ayam dan vita chicks mudah larut dalam air sehingga mudah diberikan kepada ternak.


6. Sistem Pencernaan pada Ayam

Pencernaan adalah penguraian pakan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan agar bisa diserap dan digunakan oleh jaringan - jaringan tubuh. Pada umumnya bagian-bagian penting dari alat pencernaan adalah mulut, farink, esophagus, lambung, usus halus dan usus besar. Makanan yang bergerak dari mulut sepanjang saluran pencernaan oleh gelombang peristaltik yang disebabkan karena adanya kontraksi otot di sekeliling saluran. Di dalam empedal bahan makanan diproses secara mekanis. Partikel-partikel yang besar secara mekanik akan diperkecil dengan tujuan memudahkan proses pencernaan enzimatik di dalam mulut ataupun di dalam saluran pencernaan berikutnya. Untuk memudahkan proses pencernaan mekanis maupun enzimatik dalam mempersiapkan ransum ternak banyak dilakukan dengan menggiling bahan-bahan ransum (Khaeruddin, 2009).

Pencernaan ayam yang memiliki panjang 245-255 cm, tergantung pada umur dan jenis unggas memiliki prinsip pencernaan yang terdiri dari tiga macam, yaitu pencernaan secara mekanik (fisik), pencernaan secara kimiawi (enzimatik) dan pencernaan secara mikrobiologik yang terjadi di sekum dan kolon. Pencernaan secara mekanik (fisik), pencernaan ini dilakukan oleh kontraksi otot polos, terutama terjadi di empedal (*gizzard*) yang dibantu oleh bebatuan (*grit*). Pencernaan ini banyak terjadi pada ayam yang dipelihara secara umbaran

sehingga mendapatkan grit lebih banyak daripada ayam yang dipelihara secara terkurung. Sedangkan pencernaan secara mikrobiologik dengan jumlah yang sedikit dan terjadi di seka dan kolon. Secara umum pencernaan pada unggas meliputi aspek digesti yang terjadi pada paruh, tembolok, proventrikulus, ventrikulu, usus halus, usus besar dan seka absorpsi yang terjadi pada usus halus melalui vili-vili. Melabolisme yang terjadi pada sel tubuh yang kemudian disintesis menjadi protein, glukosa dan hasil lain untuk pertumbuhan badan, produksi telur atau daging, pertumbuhan bulu, penimbunan lemak, dan menjaga tubuh dan proses kehidupannya (Abidin, 2002).

Organ pencernaan ayam broiler terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, proventrikulus, rempela, usus halus, usus buntu (seka), usus besar, kloaka dan anus. Pencernaan tambahan pada ayam salah satunya adalah hati (Suprijatna, 2005).



Gambar 3. Saluran Pencernaan ayam Broiler (Sumber: Suprijatna, 2005)

a) Mulut

Ayam pertama kali memasukkan makanan lewat mulutnya yang mempunyai paruh dimana ayam termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan. Di dalam mulut ayam terdapat lidah keras runcing, seperti mata anak panah dengan arah ke depan, bentuk seperti kail pada belakang lidah yang berfungsi untuk mendorong

makanan ke esophagus. Di dalam mulut ayam tidak terdapat gigi dan kelenjar air liur seperti yang dimiliki oleh manusia. Di dalam mulut hanya terjadi pencernaan mekanik, dan tidak terjadi pencernaan secara kimiawi.

b) Kerongkongan

Setelah makanan masuk ke mulut, maka makanan akan menuju ke kerongkongan. Saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai permukaan tembolok. Dikerongkongan tidak terjadi proses pencernaan tetapi hanya menjadi alat untuk menyalurkan makanan dari mulut ke tiga bagian lambung yang terdapat pada ayam (Grist, 2008).

c) Tembolok

Tembolok mempunyai bentuk seperti kantung-kantung yang merupakan perbesaran dari esophagus sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Di tembolok terjadi pelunakan dan pencernaan dahulu yang dibantu oleh enzim. Pakan yang berupa serat kasar dan biji-bijian tinggal di tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman (Grist, 2008).

d) Proventrikulus

Proventrikulus merupakan salah satu organ pencernaan utama dan merupakan perluasan esofagus (Bell dan Weaver, 2002). Proventrikulus mensekresikan enzim pepsin dan merupakan awal dari pencernaan protein agar dapat dipecah menjadi komponen sederhana. Proventrikulus juga menghasilkan asam hidroklorida (Grist, 2008).

Pepsin bekerja dengan menghidrolisis ikatan-ikatan peptida protein menjadi peptida yang lebih kecil. Asam hidroklorida juga menyebabkan protein globular mengalami denaturasi sehingga ikatan peptida lebih terbuka terhadap hidrolisis enzimatis. Kerja proventrikulus mensekresikan enzim pepsin akan berdampak pada bobot proventrikulus (Elfiandra, 2007).

e) Ventrikulus

Ventrikulus berbentuk oval dengan kedua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah, bagian atas lubang merupakan pemasukan berasal dari lambung otot dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke duodenum. Ventrikulus berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik guna batuan grit dan batu kecil yang berada didalam yang ditelan ayam. Partikel batuan ini berfungsi untuk memperkecil makanan dengan adanya kontraksi otot dalam tembolok sehingga dapat masuk ke usus (Grist, 2008).

f) Hati

Hati ayam terdiri atas dua gelambir yaitu kanan dan kiri, berwarna coklat tua dan terletak diantara usus dan aliran darah. Bagian ujung hati yang normal berbentuk lancip, akan tetapi bila terjadi pembesaran dapat menjadi bulat. Hati berperan dalam sekresi empedu, metabolisme lemak dan protein telur, karbohidrat, besi dan vitamin, detoksifikasi, pembentukan darah merah dan penyimpanan vitamin. Persentase hati ayam broiler berkisar antara 1,7 – 2,8 % dari bobot hidup (Grist, 2008).

g) Rempela

Rempela merupakan organ pencernaan pada unggas yang biasa disebut perut otot (Bell and Weaver, 2002), karena di dalamnya tersusun otot-otot yang kuat (Grist, 2008). Kontraksi otot rempela terjadi apabila makanan masuk ke dalam rempela. Rempela berisi bahan-bahan yang mudah terkikis seperti pasir, karang dan kerikil. Partikel makanan yang berukuran besar akan dipecah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam saluran pencernaan (Bell and Weaver, 2002).

Menurut Bell dan Weaver (2002), menyatakan bahwa rempela berfungsi menggiling atau memecah partikel makanan supaya ukurannya menjadi lebih kecil. Kerja penggilingan dalam rempela yang terjadi secara tidak sadar oleh otot rempela yang memiliki kecenderungan untuk menghancurkan pakan seperti yang dilakukan oleh gigi.

h) Usus halus

Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Berbagai enzim terdapat dalam usus halus yang berfungsi mempercepat dan mengefisienkan pemecahan karbohidrat, protein, serta lemak untuk mempermudah proses absorpsi (Suprijatna dkk, 2008).

Proses absorpsi hasil pencernaan terjadi dipermukaan vili yang memiliki banyak mikrovili. Luas permukaan usus dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah vili usus yang berfungsi untuk penyerapan zat-zat makanan (Suprijatna dkk, 2008).

Bagian duodenum bermula dari ujung distal rempela. Bagian ini berbentuk kelokan yang biasa disebut *duodenum loop*. Prankreas menempel pada kelokan ini yang berfungsi mensekresikan *pancreatic juice* yang mengandung enzim amilase, lipase dan tripsin. Jejunum dan ileum merupakan segmen yang sulit dibedakan pada saluran pencernaan ayam. Beberapa ahli menyebutkan kedua segmen ini sebagai usus halus bagian bawah (Suprijatna dkk, 2008).

Panjang usus halus bervariasi tergantung pada kebiasaan makan unggas, ayam dewasa memiliki usus halus sepanjang 1,5 m (Suprijatna dkk, 2008). Unggas pemakan asal bahan hewan memiliki usus yang lebih pendek daripada unggas yang memakan bahan asal tanaman karena produk hewani lebih siap diserap daripada produk tanaman. Peningkatan kadar serat kasar dalam ransum cenderung akan memperpanjang usus. Semakin tinggi serat kasar dalam ransum, maka semakin lambat laju pencernaan dan penyerapan zat makanan. Penyerapan zat makanan akan maksimal dengan perluasan daerah penyerapan.

i) Usus besar

Usus besar terdiri atas sekum yang merupakan suatu kantong dan kolon yang terdiri dari bagian yang naik, mendatar dan turun. Bagian yang turun akan berakhir di rektum dan anus. Variasi pada usus besar (terutama pada bagian kolon yang naik) dari satu spesies ke spesies lain jauh lebih menonjol dibandingkan dengan pada usus halus. Usus besar tidak mensekresikan enzim, namun didalamnya terjadi proses penyerapan air untuk meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air ayam broiler karena usus besar merupakan tempat penyerapan kembali air dari usus halus. Usus besar juga

menyalurkan sisa makanan dari usus halus ke kloaka untuk dibuang. Air diserap kembali usus besar untuk ikut mengatur kandungan air sel-sel tubuh dan keseimbangan air. Panjang usus besar yang dimiliki ayam dewasa berkisar 8-10 cm/ekor. Usus besar merupakan kelanjutan saluran pencernaan dari persimpangan usus buntu ke kloaka (Bell dan Weaver, 2002).

j) Usus buntu

Panjang usus buntu mencapai 10-20 cm yang berisi calon feses. Di dalam usus buntu terjadi proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna serat kasar (Grist, 2008).

k) Kloaka

Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urine dan merupakan muara saluran reproduksi. Urine dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta putih. Pada kloaka terdapat 3 muara, yaitu urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, coprodeum sebagai muara saluran makanan dan proctodeum sebagai lubang keluar dan bagian luar yang berhubungan dengan udara luar sebut vent.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 di Kebun Percobaan Gowa Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP Sul-Sel) Desa Pabentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa eksperimen yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran atau observasi sebelum dan setelah perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

C. Materi Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aerator, baskom, blender, cutter, ember, talenan, blender, gayung, gelas ukur, kain saring, sikat gigi, tali rafia, plastik, kandang litter yang memiliki sekat, lampu pijar 25 watt sebanyak 20 buah, meteran, tempat pakan sebanyak 20 buah, tempat air minum sebanyak 20 buah, timbangan digital, neraca analitik, kabel 40 meter, fitting lampu sebanyak 20 buah, paku dan tirai.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air, DOC ayam kampung unggul balitnak (KUB) sebanyak 40 ekor dari Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP Sul-Sel) , bawang putih 150 gram, kencur 150 gram, kunyit 150 gram, temulawak 100 gram, lengkuas 25 gram, jahe 50 gram, daun sirih 25 gram, daun pepaya 25 gram. Sambiloto 25 gram, brotowali 25 gram, daun dan batang cabe rawit 25 gram, daun mahkota dewa 25 gram, tepung kayu manis 10 gram, gula merah 100 gram, prebiotik, Vita chick dan pakan yang digunakan berasal dari pakan starter komplet butiran ayam pedaging (BP11) Bravo dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

D. Prosedur Penelitian

prosedur penelitian ini terdiri dari dua tahapan:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari pembuatan jamu herbal:


a) Pembuatan Jamu Herbal

Tabel 1. Bahan - bahan yang Digunakan dalam Penelitian

| Jenis Tanaman Herbal | Jumlah |
|------------------------------|---------------|
| Bawang putih | 150 gram |
| Kencur | 150 gram |
| Kunyit | 100 gram |
| Temulawak | 100 gram |
| Lengkuas | 25 gram |
| Jahe | 25 gram |
| Daun sirih | 25 gram |
| Daun pepaya | 25 gram |
| Sambiloto | 25 gram |
| Brotowali | 25 gram |
| Cabe rawit (daun dan batang) | 25 gram |
| Daun mahkota dewa | 25 gram |
| Tepung kayu manis | 10 gram |

| | |
|------------|----------|
| Gula merah | 100 gram |
| Probiotik | 1 liter |
| Air sumur | 5 liter |

Bahan tersebut dibersihkan, kemudian bahan tersebut di potong kecil-kecil lalu bahan-bahan tersebut di blender. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam ember dan diberikan prebiotic sebanyak 1 liter lalu difermentasi selama 7- 10 hari. Berikut ini alur pembuatan jamu herbal.



Gambar 4. Pembuatan Jamu Herbal

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari ternak dan perlakuan ternak, pengelolaan ternak dan pemberian pakan dan parameter yang diukur:

a) Ternak dan Perlakuan Ternak

Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdapat 4 perlakuan dan 5 kali ulangan dengan masing-masing ulangan terdiri dari 2 ekor ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) sehingga totalnya 40 ekor. Penempatan perlakuan dilakukan secara acak, sedangkan komposisi bahan pakan setiap perlakuan sebagai berikut:

P0 : Tanpa jamu herbal dan vitamin

P1 : Menggunakan jamu herbal 3 ml dalam 1 liter air

P2 : Menggunakan vitachick 0,5 gram dalam 1 liter air

P3 : Menggunakan jamu herbal 3 ml + 0,5 gram vita chicks dalam 1 liter air

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pakan

| | |
|--------------|-------------|
| Air (%) | Max 13.0 % |
| Protein (%) | 21.0-23.0 % |
| Ca (%) | Min 0.9% |
| Lemak (%) | Max 5.0 % |
| Serat (%) | Max 5.0 % |
| Abu (%) | Max 7.0% |
| Phosphor (%) | Min 0.6 % |

Sumber: Phokphand, 2019.

b) Pengelolaan Ternak dan Pemberian Pakan

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 45 hari. Sebelum DOC dimasukkan ke dalam kandang terlebih dahulu dilakukan sanitasi kandang menggunakan disinfektan. DOC yang dimasukkan ke dalam kandang dengan jumlah sekat 20 buah sebanyak 40 ekor. Masing – masing sekat dilapisi dengan koran dan terdapat tempat pakan, tempat air minum dan lampu 15 watt sebagai penerang dan penghangat kandang.

Perlakuan diberikan mulai umur 1-45 hari. Pakan yang diberikan merupakan pakan komersial dan di beri air minum dengan campuran jamu herbal dan vitamin. Pemberian air minum dilakukan secara *ad libitum*. Penimbangan berat badan ayam dilakukan pada hari pertama, kemudian penimbangan selanjutnya di lakukan setiap minggu sampai pemanenan.

c) Parameter yang diukur

Pengukuran berat organ dalam diperoleh dari pembagian antara bobot organ dalam (hati, pankreas, usus halus, jantung, seka dan gizzard) dengan bobot hidup ayam KUB dikalikan dengan 100% setelah disisihkan lemak yang melekat (Auza, 2010).

$$\text{Persentase berat organ dalam} = \frac{\text{Berat organ dalam ayam KUB}}{\text{Berat hidup ayam KUB}} \times 100 \%$$

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran di analisis dengan analisis varians berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 x 5 yaitu 4 perlakuan dengan 5 ulangan di lanjutkan dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT

merupakan pengujian lanjut untuk mengetahui perbedaan nilai tengah dari tiap perlakuan (Steel dan Torrie, 1991). Adapun model matematikanya yaitu :

$$Y_{ij} = \mu + T_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan :

Y_{ij} = Hasil pengamatan dari perubah pada penggunaan jamu herbal dan vitamin

μ = Rata-rata pengamatan

T_i = Pengaruh perlakuan I

ε_{ij} = Error/galat perlakuan dari perlakuan ke-I dan ulangan ke-J

Dimana : I = 1, 2, 3 dan 4

J = 1, 2, 3 dan 4

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama 45 hari dengan penambahan jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut:

Tabel 3. Rataan Berat Organ Dalam Ayam KUB selama Pemeliharaan

| Parameter yang Diukur | Perlakuan | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | P0 | P1 | P2 | P3 |
| Hati (%) | 0.021±0.021 | 0.022±0.002 | 0.021±0.002 | 0.020±0.001 |
| Pankreas (%) | 0.005±0.000 | 0.005±0.001 | 0.005±0.000 | 0.005±0.001 |
| Usus Halus (%) | 0.042±0.004 | 0.038±0.004 | 0.040±0.007 | 0.038±0.004 |
| Jantung (%) | 0.006±0.001 | 0.006±0.001 | 0.010±0.000 | 0.010±0.000 |
| Seka (%) | 0.012±0.004 | 0.010±0.000 | 0.010±0.000 | 0.010±0.000 |
| Gizzard (%) | 0.040±0.000 | 0.042±0.004 | 0.042±0.008 | 0.042±0.004 |

Sumber: Data Penelitian, 2020.

P0 = Tanpa perlakuan

P1 = menggunakan jamu herbal 3 ml dalam 1 liter air

P2 = Menggunakan Vitachick 0.5 g dalam 1 liter air

P3 = Menggunakan jamu herbal 3 ml + 0.5 g Vitachick dalam 1 liter air

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan data tabel 3 di atas menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap persentase berat organ dalam ayam kampung unggul balitnak (KUB), baik pada hati, pankreas, usus halus, jantung, seka dan gizzard. Rata-rata data secara biologis berat organ dalam ayam kampung unggul balitnak (KUB) tiap perlakuan P0, P1, P2 dan P3 tertera pada tabel 3.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap persentase berat organ dalam ayam kampung unggul balitnak (KUB) meliputi hati, pankreas, usus halus, jantung, seka dan gizzard.

1. Hati

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap organ hati. Rata-rata data secara biologis berat organ hati tiap perlakuan adalah P_0 (0,021%), P_1 (0,022%), P_2 (0,021%) dan P_3 (0,020%) dari bobot potong ayam kampung unggul umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian yang dilaporkan oleh Marhayani dan Harmoko (2019), yang menyatakan bahwa bobot hati ayam kampung berkisar antara 1,99-2,70% dari bobot hidup. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Marhayani dan Harmoko (2019), disebabkan oleh umur ayam pada saat pematangan adalah 6 minggu sedangkan penelitian Marhayani dan Harmoko (2019) berumur 12 minggu.

Whittow (2002), menyatakan bahwa besar dan berat hati dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis hewan, umur, besar tubuh, genetik serta pakan yang diberikan. Sama seperti jantung, hati juga dipengaruhi oleh tingginya kandungan protein dan NaCl dalam pakan. Besarnya angka rata-rata berat hati mungkin disebabkan karena kerja hati yang semakin berat pada proses detoksifikasi

sehingga hati mengalami pembengkakan. Price dan Wilson (2006), menyatakan bahwa hati memiliki fungsi detoksifikasi yang dilakukan oleh enzim-enzim hati, yaitu dengan mengubah zat-zat yang kemungkinan membahayakan menjadi zat-zat secara fisiologis tidak aktif.

2. Pankreas

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap organ pankreas. Rata-rata data secara biologis berat organ pankreas tiap perlakuan adalah P_0 (0.005%), P_1 (0,005%), P_2 (0,005%) dan P_3 (0,005%) dari bobot potong ayam kampung umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Sturkie (2000), yang menyatakan bahwa bobot pankreas pada kisaran normal adalah sekitar 0,25-0.40% dari bobot hidup atau bisa dikatakan bobot pankreas dipengaruhi oleh umur. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Sturkie (2000), disebabkan oleh umur ayam pada saat pemotongan adalah 6 minggu sedangkan penelitian Sturkie (2000) berumur 12 minggu.

Menurut Yuanta (2004), pankreas berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas yang digunakan dalam pencernaan pati, lemak, dan protein. Pankreas juga memiliki dua fungsi dalam penggunaan energy ransum, yaitu eksokrin dan endokrin. Eksokrin berfungsi mensuplai enzim yang mencerna karbohidrat, protein dan lemak kedalam usus halus, sedangkan endokrin berfungsi mengatur nutrien berupa energi untuk diserap dalam tubuh dalam proses dasar pencernaan.

3. Usus Halus

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap organ usus halus. Rata-rata data secara biologis berat organ usus halus tiap perlakuan adalah P_0 (0,042%), P_1 (0,038%), P_2 (0,040%) dan P_3 (0,038%) dari bobot potong ayam kampung umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Manuaba (2017), yang menyatakan bahwa rata-rata berat usus halus yang dihasilkan berkisar antara 1,85-2,71% dari berat hidup. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Manuaba (2017) disebabkan oleh ukuran tubuh yang ayam yang tidak sesuai dengan umurnya dan juga pada saat pemotongan ayam berumur 6 minggu sedangkan penelitian Manuaba (2017) ayam berumur 12 minggu.

Menurut Amrullah (2004), menyatakan bahwa usus halus mempunyai fungsi sebagai tempat pencernaan dan penyerapan makanan. Panjang usus halus bermacam sesuai dengan ukuran tubuh, tipe makanan dan faktor lainnya. Panjang, tebal dan berat suatu organ pencernaan bukan merupakan besaran yang statis melainkan perubahan yang terjadi selama proses perkembangan karena dapat dipengaruhi oleh jenis ransum yang diberikan.

4. Jantung

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap organ jantung. Rata-rata data secara biologis berat organ jantung tiap perlakuan adalah P_0 (0,006%), P_1 (0,006%), P_2 (0,010%) dan P_3

(0,010%) dari bobot potong ayam kampung umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Sulistyoningsih (2015), yang menyatakan bahwa penggunaan bahan herbal sebagai campuran dalam ransum ayam kampung menghasilkan bobot jantung sekitar 0,48-0,55% dari bobot hidup. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Sulistyoningsih (2015), disebabkan oleh umur ayam pada saat pemotongan adalah 6 minggu sedangkan penelitian Sulistyoningsih (2015) berumur 12 minggu.

Ukuran jantung sangat berkaitan erat dengan keadaan fisik, ukuran dan spesies ternak, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Widyaningsih (2008), menyatakan bahwa ukuran jantung dipengaruhi oleh jenis, umur, besar dan aktivitas hewan. Jantung berfungsi mengedarkan darah ke paru-paru sehingga dapat menggantikan O_2 dan CO_2 untuk melakukan proses metabolisme tubuh.

Menurut Rahayu (2010), menyatakan bahwa jantung berfungsi sebagai organ yang memompa darah keseluruh tubuh, sehingga organ jantung sangat rentan terkontaminasi dengan racun dan zat antinutrisi yang menyebabkan pembesaran jantung karena adanya akumulasi zat racun.

5. Seka

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap organ seka. Rata-rata data secara biologis berat organ seka tiap perlakuan adalah P_0 (0,012%), P_1 (0,010%), P_2 (0,010%) dan P_3 (0,010%) dari bobot potong ayam kampung umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam

penelitian ini lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Murdifin (2015), yang menyatakan bahwa bobot seka ayam kampung berkisar antara 1,4-1,9%. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Murdifin (2015), disebabkan oleh ukuran tubuh yang ayam yang tidak sesuai dengan umurnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2010), yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi berat seka adalah perbedaan ukuran tubuh, umur dan kemampuan seka untuk mencerna makanan.

6. Gizzard

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan penambahan jamu herbal, penambahan vitachick dan penambahan keduanya tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap organ gizzard. Rata-rata data secara biologis berat organ gizzard tiap perlakuan adalah P_0 (0,005%), P_1 (0,005%), P_2 (0,005%) dan P_3 (0,005%) dari bobot potong ayam kampung umur 6 minggu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Sulistyoningsih (2015), yang mengatakan bahwa penggunaan bahan herbal sebagai campuran ransum ayam kampung mendapatkan bobot gizzard rata-rata 1,14-1,36% dari bobot hidup. Perbedaan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian Sulistyoningsih (2015), disebabkan oleh umur ayam pada saat pematangan adalah 6 minggu sedangkan penelitian Sulistyoningsih (2015) berumur 12 minggu.

Menurut Rosyani (2013), menyatakan bahwa ukuran gizzard mudah berubah tergantung pada jenis makanan yang biasa dimakan oleh unggas tersebut. Ukuran gizzard juga dapat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi ransum, karena

konsumsi ransum yang tinggi dapat mengakibatkan penebalan pada urat daging gizzard, sehingga ukuran gizzard pun akan semakin besar.

Menurut Amrullah (2003), menyatakan bahwa gizzard merupakan organ pencernaan yang berfungsi dalam proses pencernaan ransum secara mekanik, dimana jika ransum memiliki kandungan serat kasar relatif tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan gizzard, sehingga ukuran gizzard akan berubah sesuai dengan jenis ransum yang diberikan.

Menurut Yuanta (2004), menyatakan bahwa fungsi utama gizzard adalah melumatkan pakan dan mencampur dengan air menjadi pasta yang dinamakan *Chymne*. Ukuran dan kekuatan gizzard dipengaruhi oleh kebiasaan makan ayam tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan jamu herbal, vitamin ataupun gabungan keduanya sebagai imbuhan pakan tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap persentase berat organ dalam ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) meliputi hati, pankreas, usus halus, jantung, seka dan gizzard.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis dan lama pemeliharaan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) dengan pemberian jamu herbal dan vitamin terhadap profil organ dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azmi, Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil. 2006. *Al-Wajiz*, Cet.2. Pustaka As-Sunnah, Jakarta.
- Abidin, Z. 2002. *Meningkatkan Ayam Ras Pedaging*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Achmad, Z. 2007. Efek Sitotoksik dan Penghambatan Kinetiks Proliferasi Fraksi Khloroform Ekstrak Etanolik Tanaman Ceplukan (*Physalis Angulata* Linn) Terhadap Sel Hela. *Skripsi*. Fakultas Farmasi UMS, Surakarta.
- Aditya, B. S. 2016. Pengaruh Penggunaan Feed Additive Tepung Bunga Cengkeh dalam Pakan terhadap Persentase Karkas dan Organ Dalam Ayam Pedaging. *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Agusta, A. 2000. *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia*. ITB, Bandung.
- Agustina, L, Purwati, S. 2009. Penggunaan Ramuan Herbal sebagai Feed Additive untuk Meningkatkan Performans Broiler. *Prosiding Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi dalam Mendukung Usaha Ternak Unggas Berdaya Saing*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Alli, J. A, Boboye, B. E, Okonko, I. O, Kolade, A. F. Nwanze, J. C. 2011. Cellular Effects of Garlic (*Allium Sativum*) Extract on *Pseudomonas Aeruginosa* and *Staphylococcus Aureus*. *Pelagia Research Library*. 2 (4): 25-36.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, I, As-Suyuti. 2007. *Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Amagase, H, Petersch, B, L, Matsura, H, Kasuga, S, Itakura, Y. 2001. Recent Advances on The Nutritional Effects Associated with The Use of Garlic as A Supplement. *JN*. 1:8-9.
- Amrullah, I. K. 2003. *Nutrisi Ayam Broiler*. Lembaga Satu Gunungbudi, Bogor.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Itik Broiler*. Cetakan Ketiga. Penerbit Lembaga Gunungbudi, Bogor.
- Aqsa, A. D, Kiramang, K, Hidayat, M. N. 2016. Profil Organ Dalam Ayam Broiler yang diberi Tepung Daun Sirih sebagai Imbuhan Pakan. *Skripsi Jurusan Ilmu Peternakan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Auza, 2010. Penggunaan Tepung Kemangi dalam Pakan terhadap Bobot Karkas, Persentase Organ dalam dan Kolesterol Daging pada Ayam Pedaging. *Skripsi Peternakan*. Jurusan Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.

- Azzaahraatikah. 2012. *Feed Additive Imbuhan Pakan*. <http://azzahraatikah.blogspot.com/2012/09/feed-additive-imbuhan-pakan.html> (Diakses 3 Oktober 2019).
- Badan Standarisasi Nasional. 2017. *Standar Nasional SNI (Bibit Ayam Umur Sehari/Kuri- Bagian 1: KUB 1*. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Barton, M. D. 2000. *Antibiotic Use in Animal Feed and Its Impact on Human Health*. *Nutr Res. Rev.* 13: 279-299.
- Basmar, I. 2013. *Pemeliharaan Ayam Broiler*. Makalah Pengantar Ilmu Peternakan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bayan L, Koulivand PH, Gorji A. 2014. Garlic: A Review of Potential The Rapeutic Effects. *Avicenna Journal of Phytomedicine*. 4 (1): 1-14.
- Bell, D. D. and W. D. Weaver Jr. 2002. *Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5 th ed*. Springer Science+Business Media, Inc. Spring Street, New York.
- Bisset, N. G, Wichtl, M. 2001. *Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, 2nd Edition*. Medpharm Scientific Publishers, Germany.
- Charoen Pokphand Indonesia. 2016. *Manajemen broiler modern kiat-kiat memperbaiki FCR*. Laporan Technical Service dan Development Departement, Jakarta.
- Chasanah, N. 2009. Pengaruh Suplementasi Tepung Bawang Putih dan Tepung Temulawak terhadap Komposisi Kimia dan Kadar Kolesterol Ayam Broiler. *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dalimartha, S. 2008. *Atlas Tumbuhan Obat Jilid 1*. Trubus Agriwidya, Jakarta.
- Elfiandra. 2007. Pemberian Warna Lampu Penerangan yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Badan Ayam Broiler. *Skripsi*. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Grist, A. 2008. *Poultry Inspection. Anatomy, Phisiology, and Disease Conditions 2nd Edition*. Nottingham University Press, Nottingham.
- Hariana, A. 2006. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Haryoto. 1998. *Membuat Saus Pepaya*. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jaka Elektik Kanisius, Malang.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Cipta Bagus Setara, Bogor.

- Khaeruddin. 2009. *Sejarah Singkat Ayam Pedaging*. www. Wikipedia.com (Diakses 3 Oktober 2019).
- Mahendra, B. 2005. *13 Jenis Tanaman Obat Ampuh*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Manuaba. I. B. C., N.W. Siti dan N. S. Sukmawati. 2017. *Pengaruh Aditif Sari Daun Pepaya Terfermentasi terhadap Organ Dalam Ayam Kampung*. *Peternakan Tropika* Vol. 5 No. 1 37:49.
- Marhayani, M, Harmoko, H. 2019. Penggunaan Tepung Daun Pepaya terhadap Organ Dalam Ayam Kampung. *Jurnal Penelitian*. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Mujahidin Tolitoli, Tolitoli.
- Marhayani, M., Harmoko, H. 2019. Penggunaan Tepung Daun Pepaya Terhadap Organ Dalam Ayam Kampung. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 1 (2), 67-72.
- Meredith, T. J. 2008. *The Complete Book of Garlic: A Guide for Gardeners, Grower, and Serious Cooks*. Timber Press, London.
- Murdifin. 2015. *Laporan Praktikum System Pencernaan Pada Unggas*. [Http://Murdifin.sistem.pencernaan.unggas.html](http://Murdifin.sistem.pencernaan.unggas.html) (Diakses September 2019).
- Nursal, Wulandari, S, Juwita, W. S. 2006. Biokativitas Ekstrak Jahe (*Zingiber Officinale Roxb*) dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escheichia Coli* dan *Braciluuus Subtilis*. *Jurnal Biogenesis*. Vol. 2(2) 64-66.
- Nuroso. 2010. *Ayam Kampung Pedaging Hari Per Hari*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Price, S. A dan L. M. Wilson. 2006. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Edisi keenam. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Rahardjo, M, Rostiana, O. 2005. *Budidaya Tanaman Kunyit*. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatika. Sirkuler No.11.
- Rahayu, Hertik, I. D. 2010. Pengaruh Pelarut yang Digunakan terhadap Optimasi Ekstraksi Kurkumin pada Kunyit (*Curcuma Domestica vahl*). *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Riyadi, S. 2009. *Kunyit dan Jahe Baik untuk Ayam Broiler*. [Http://Slamet-riyadi03.blogspot.com/2009/04/kunyit-dan-jahe-baik-untuk-broiler.html](http://Slamet-riyadi03.blogspot.com/2009/04/kunyit-dan-jahe-baik-untuk-broiler.html) (Diakses 3 Oktober 2019).
- Rostiana, O, Nurliani, R. Mono. 2005. *Budidaya Tanaman Jahe*. Bahan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatika. Sikkuler No 11.

- Rosyani, S. 2013. Pemberian Pakan Konsentrat Mengandung Tepung Inti Sawit yang Ditambahkan Pollard atau Dedak dan Pengaruhnya Terhadap Persentase Organ Dalam Ayam Broiler. *Skripsi*. Intitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rukmana, R. 2008. *Pepaya, Budidaya dan Pasca Panen*. Kanasius, Yogyakarta.
- Shihab, M. Q. 2001. *Tafsir Al-Misbah*. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati, Jakarta.
- Sofyan, A. 2012. *Eptidobiotic, Antibiotik Generasi Baru Tanpa Residu*. http://bpptk.lipi.go.id/bpptk2.1/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aeptidobiotic&catid=46%Aberitamedia&itemid=66&lang=id (Diakses 1 Oktober 2019).
- Sturkie, P. D. 2000. *Avian Physiology*. 4 th Edition. Spinger-Verlag, New York.
- Sulistyoningsih, M. 2015. Pengaruh Variasi Herbal terhadap Organ Dalam Broiler. *Skripsi*. Universitas PGRI Semarang, Semarang.
- Supriadi. 2001. *Tumbuhan Obat Indonesia: Penggunaan dan Khasiatnya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suprijatna, E. U. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Suprijatna, E. U. 2008. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Syamsiah, I. S, Tajuddin. 2003. *Khasiat dan Manfaat Bawang Putih*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Usman, A. N. R. 2010. *Pertumbuhan Ayam Broiler (Melalui Sistem Pencernaannya) yang Diberi Pakan Nabati dan Komersial Dengan Penambahan Dysapro*. Institute Pertanian Bogor, Bogor.
- Wahju, J. 2006. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widianingsih, N. M. 2008. Persentase Organ Broiler yang diberi Ransum Crumble Berpekat Onggok, Bentonit dan Tapioca. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Winarno, W. P. 2003. *Khasiat dan Manfaat Kunyit*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Yuanta, T. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Kanisisus, Yogyakarta.
- Zainuddin, D. 2010. Racikan Ramuan Tanaman Obat dalam Bentuk Larutan Jamu dapat Mempertahankan dan Meningkatkan Kesehatan serta Produktivitas ternak Ayam Buras. *Prosiding Seminar Nasional XIX Tumbuhan Obat Indonesia*. Balai Penelitian Tanaman Obat. Departemen Pertanian, Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ Gizzard Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | .182 | .907 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |
| | P2 Vitamin | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| | P2 Vitamin | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| | P1 Jamu Herbal | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| | P1 Jamu Herbal | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| | P2 Vitamin | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |

**Lampiran 2. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap
Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ Seka
Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)**

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | 1.000 | .418 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | .00200 | .00141 | .176 | -.0010 | .0050 |
| | P2 Vitamin | .00200 | .00141 | .176 | -.0010 | .0050 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00200 | .00141 | .176 | -.0010 | .0050 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | -.00200 | .00141 | .176 | -.0050 | .0010 |
| | P2 Vitamin | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | -.00200 | .00141 | .176 | -.0050 | .0010 |
| | P1 Jamu Herbal | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | -.00200 | .00141 | .176 | -.0050 | .0010 |
| | P1 Jamu Herbal | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |
| | P2 Vitamin | .00000 | .00141 | 1.000 | -.0030 | .0030 |

**Lampiran 3. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap
Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ Usus
Halus Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)**

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | .667 | .585 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | .00400 | .00332 | .245 | -.0030 | .0110 |
| | P2 Vitamin | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00400 | .00332 | .245 | -.0030 | .0110 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | -.00400 | .00332 | .245 | -.0110 | .0030 |
| | P2 Vitamin | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |
| | P1 Jamu Herbal | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .00200 | .00332 | .555 | -.0050 | .0090 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | -.00400 | .00332 | .245 | -.0110 | .0030 |
| | P1 Jamu Herbal | .00000 | .00332 | 1.000 | -.0070 | .0070 |
| | P2 Vitamin | -.00200 | .00332 | .555 | -.0090 | .0050 |

**Lampiran 4. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap
Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ
Pankreas Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)**

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | 1.944 | .163 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | .000800 ^a | .000346 | .035 | .00007 | .00153 |
| | P2 Vitamin | .000400 | .000346 | .265 | -.00033 | .00113 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .000200 | .000346 | .572 | -.00053 | .00093 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | -.000800 ^a | .000346 | .035 | -.00153 | -.00007 |
| | P2 Vitamin | -.000400 | .000346 | .265 | -.00113 | .00033 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | -.000600 | .000346 | .102 | -.00133 | .00013 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | -.000400 | .000346 | .265 | -.00113 | .00033 |
| | P1 Jamu Herbal | .000400 | .000346 | .265 | -.00033 | .00113 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | -.000200 | .000346 | .572 | -.00093 | .00053 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | -.000200 | .000346 | .572 | -.00093 | .00053 |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|------|---------|--------|
| P1 Jamu Herbal | .000600 | .000346 | .102 | -.00013 | .00133 |
| P2 Vitamin | .000200 | .000346 | .572 | -.00053 | .00093 |

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 5. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ Hati Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | 1.561 | .238 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | -.000600 | .001068 | .582 | -.00286 | .00166 |
| | P2 Vitamin | .000000 | .001068 | 1.000 | -.00226 | .00226 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .001600 | .001068 | .153 | -.00066 | .00386 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | .000600 | .001068 | .582 | -.00166 | .00286 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|---------|-------|---------|--------|
| | P2 Vitamin | .000600 | .001068 | .582 | -.00166 | .00286 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .002200 | .001068 | .056 | -.00006 | .00446 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | .000000 | .001068 | 1.000 | -.00226 | .00226 |
| | P1 Jamu Herbal | -.000600 | .001068 | .582 | -.00286 | .00166 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .001600 | .001068 | .153 | -.00066 | .00386 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | -.001600 | .001068 | .153 | -.00386 | .00066 |
| | P1 Jamu Herbal | -.002200 | .001068 | .056 | -.00446 | .00006 |
| | P2 Vitamin | -.001600 | .001068 | .153 | -.00386 | .00066 |

Lampiran 6. Hasil Analisis Varians Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap Penambahan Jamu Herbal dan Vitamin Terhadap Organ Jantung Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)

Oneway

ANOVA

Berat

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|------|------|
| Between Groups | .000 | 3 | .000 | .222 | .880 |
| Within Groups | .000 | 16 | .000 | | |
| Total | .000 | 19 | | | |

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Berat

LSD

| (I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------|---------|--------|
| P0 kontrol | P1 Jamu Herbal | .000000 | .00034 6 | 1.000 | -.00073 | .00073 |
| | P2 Vitamin | .000200 | .00034 6 | .572 | -.00053 | .00093 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .000200 | .00034 6 | .572 | -.00053 | .00093 |
| P1 Jamu Herbal | P0 kontrol | .000000 | .00034 6 | 1.000 | -.00073 | .00073 |
| | P2 Vitamin | .000200 | .00034 6 | .572 | -.00053 | .00093 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .000200 | .00034 6 | .572 | -.00053 | .00093 |
| P2 Vitamin | P0 kontrol | -.000200 | .00034 6 | .572 | -.00093 | .00053 |
| | P1 Jamu Herbal | -.000200 | .00034 6 | .572 | -.00093 | .00053 |
| | P3 Jamu Herbal & Vitamin | .000000 | .00034 6 | 1.000 | -.00073 | .00073 |
| P3 Jamu Herbal & Vitamin | P0 kontrol | -.000200 | .00034 6 | .572 | -.00093 | .00053 |
| | P1 Jamu Herbal | -.000200 | .00034 6 | .572 | -.00093 | .00053 |
| | P2 Vitamin | .000000 | .00034 6 | 1.000 | -.00073 | .00073 |


Lampiran 7. Uji Kandungan Jamu

Chromatogram and Results

Injection Details

Injection Name: Run Time (min): **51.00**
 Vial Number: **2** Injection Volume: **0.10**
 Injection Type: **Unknown** Dilution Factor: **1.0000**
 Calibration Level: Sample Weight: **1.0000**
 Instrument Method: **MINYAK JAMU** Sign
 Processing Method: **MS QuantitativeNEW**
 Injection Date/Time: **04/Mar/20 22:59** () ()

Chromatogram




| Peak No. | Ret. Time min | 1st Hit SI | Library Compound | 2nd Hit SI | Library Compound | 3rd Hit SI | Library Compound |
|----------|---------------|------------|---|------------|--|------------|--|
| 1.00 | 31.96 | 711.00 | Cystine | 710.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydroxy-N- | 705.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- |
| 2.00 | 33.05 | 888.00 | trans-13-Octadecenoic acid | 886.00 | cis-13-Octadecenoic acid | 884.00 | cis-Vaccenic acid |
| 3.00 | 33.27 | 809.00 | 6-Octadecenoic acid | 759.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 753.00 | cis-Vaccenic acid |
| 4.00 | 33.34 | 754.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 745.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydroxy-N- | 733.00 | Oleic Acid |
| 5.00 | 33.65 | 789.00 | 6-Octadecenoic acid | 744.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 739.00 | Dodecanoic acid, 3-hydroxy- |
| 6.00 | 33.91 | 758.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 735.00 | 6-Octadecenoic acid | 725.00 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 7.00 | 35.25 | 734.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 732.00 | Pterin-6-carboxylic acid | 725.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- |
| 8.00 | 35.82 | 749.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- | 743.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydroxy-N- | 738.00 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 9.00 | 36.23 | 745.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 737.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- | 733.00 | Aspidospermidin-17-ol, 1-acetyl-19,21-epoxy-15,16- |
| 10.00 | 36.77 | 731.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 726.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydroxy-N- | 725.00 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 11.00 | 37.98 | 737.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 707.00 | Pterin-6-carboxylic acid | 696.00 | Cystine |
| 12.00 | 38.42 | 793.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 788.00 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-hydroxyethyl ester | 786.00 | Oleic acid, 3-hydroxypropyl ester |
| 13.00 | 38.54 | 767.00 | 6-Octadecenoic acid | 751.00 | n-Propyl 11-octadecenoate | 723.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydroxy-N- |
| 14.00 | 38.88 | 728.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 714.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- | 703.00 | Dodecanoic acid, 3-hydroxy- |
| 15.00 | 39.23 | 756.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 731.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- | 722.00 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 16.00 | 40.13 | 695.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 678.00 | 9-(2',2'-Dimethylpropanoilhydrazono)-3,6-dichloro-2,7- | 634.00 | Cystine |
| 17.00 | 40.77 | 718.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 690.00 | Pterin-6-carboxylic acid | 680.00 | i-Propyl 9-tetradecenoate |
| 18.00 | 43.11 | 741.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 718.00 | Imidazole, 2-amino-5-[(2-carboxy)vinyl]- | 718.00 | n-Propyl 11-octadecenoate |
| 19.00 | 44.21 | 710.00 | Benzenethanamine, 2,5-difluoro-β,3,4-trihydro | 694.00 | Pterin-6-carboxylic acid | 669.00 | Benzenethanamine, 2-fluoro-β,3-dihydroxy-N-methyl- |
| 20.00 | 46.04 | 845.00 | Squalene | 813.00 | 2,2,4-Trimethyl-3-(3,8,12,16-tetramethylheptadeca- | 802.00 | 1,6,10,14,18,22-Tetracosahexaen-3-ol, 2,6,10,15,19,23- |

Chromatogram

Injection Details

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Injection Name: | | Run Time (min): | 51.00 |
| Vial Number: | 2 | Injection Volume: | 0.10 |
| Injection Type: | Unknown | Dilution Factor: | 1.0000 |
| Calibration Level: | | Sample Weight: | |
| | 1.0000 | | |
| Instrument Method: | MINYAK JAMU | Sign | |
| Processing Method: | MS QuantitativeNEW | | |
| Injection Date/Time: | 04/Mar/20 22:59 | (|) |



| No. | Retention Time min | Area counts*min | Height counts | Relative Area % | Relative Height % |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 31.965 | 107637.408 | 1205413.086 | 1.08 | 1.08 |
| 2 | 33.053 | 3489309.014 | 35571289.223 | 34.90 | 31.84 |
| 3 | 33.271 | 455402.599 | 5390693.926 | 4.55 | 4.83 |
| 4 | 33.342 | 711551.351 | 4773649.325 | 7.12 | 4.27 |
| 5 | 33.652 | 179494.533 | 2333549.210 | 1.80 | 2.09 |
| 6 | 33.913 | 181844.366 | 1865602.992 | 1.82 | 1.67 |
| 7 | 35.247 | 196810.146 | 1982979.024 | 1.97 | 1.77 |
| 8 | 35.825 | 95420.972 | 1436914.602 | 0.95 | 1.29 |
| 9 | 36.226 | 77355.234 | 1549414.135 | 0.77 | 1.39 |
| 10 | 36.770 | 163784.282 | 2463356.121 | 1.64 | 2.20 |
| 11 | 37.985 | 70183.216 | 1558582.285 | 0.70 | 1.40 |
| 12 | 38.423 | 604154.017 | 10012518.319 | 6.04 | 8.96 |
| 13 | 38.539 | 126325.954 | 2087188.667 | 1.26 | 1.87 |
| 14 | 38.876 | 214620.774 | 3595746.503 | 2.15 | 3.22 |
| 15 | 39.226 | 69481.809 | 1302114.552 | 0.69 | 1.17 |
| 16 | 40.131 | 303897.487 | 3177119.023 | 3.04 | 2.84 |
| 17 | 40.770 | 108414.229 | 1338363.428 | 1.08 | 1.20 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 18 | 43.107 | 53282.333 | 1034465.539 | 0.53 | 0.93 |
| 19 | 44.205 | 108127.604 | 1368127.967 | 1.08 | 1.22 |
| 20 | 46.035 | 2681785.159 | 27670922.533 | 26.82 | 24.77 |
| Total: | | 9998882.489 | 111718010.460 | 100.00 | 100.00 |

Lampiran 8. Dokumentasi Pembuatan Kandang



Lampiran 9. Dokumentasi Pemeliharaan Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)



(Penimbangan Pemberian Pakan)



(Melakukan Vaksin)



(Pemberian Jamu Herbal ke dalam Air Minum)



(Pemberian Vitamin ke dalam Air Minum)



(Penimbangan Ayam KUB)

Lampiran 9. Dokumentasi pengujian profil organ dalam Ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB)



(Pengambilan Organ Dalam Ayam KUB)



(Penimbangan Organ Dalam Ayam KUB)



(Pengukuran Volume Organ Dalam Ayam KUB)

BIOGRAFI



Penulis bernama Nurul Masita dilahirkan di rumah sakit pada tanggal 23 Februari 1998 di Mamuju, Sulawesi Barat. Dilahirkan dari pasangan Ayah bernama Syamsuddin dan Ibu bernama Suriani, pekerjaan ayah sebagai karyawan swasta dan ibu

seorang ibu rumah tangga, penulis mempunyai seorang Adik yang Syifah Ramadhani Syam. Penulis memulai pendidikannya di SDN 256 Dongi, Sorowako, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bontomarannu, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bontomarannu. Penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur masuk mandiri. Sejak memulai menulis tugas akhir skripsi banyak hikmah yang dapat diambil, dimana kita diajari untuk bersabar, menjadi orang yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Penulis bersyukur dapat kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Peternakan.