

**PERTUMBUHAN BAKTERI *SALMONELLA* SP. DENGAN LEVEL
PENAMBAHAN BUBUK KAYU MANIS (*Cinnamomum Burmanni*)
PADA TELUR ASIN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUCI INDA SARI

NIM. 60700112097

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2016

Penyusun,

SUCI INDA SARI

NIM: 60700112097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **SUCI INDA SARI**, NIM: 60700112097 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Pertumbuhan Bakteri *Salmonella* Sp. dengan Level Penambahan Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum Burbanni*) Pada Telur Asin”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Khaerani Kiramang, S.Pt.,M.P.
Nip. 197308282006042001

Muh Nur Hidayat, S.Pt.,M.P.
Nip. 197509092009121001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
Nip. 195907121986031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pertumbuhan Bakteri *Salmonella Sp.* dengan Level Penambahan Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum Burbanni*) Pada Telur Asin”** yang disusun oleh SUCI INDA SARI, NIM: 60700112097, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 30 Agustus 2016
27 Syawal 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.M.Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Sekretaris : Rusny, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy I : Prof.Dr.Ir.Efendi Abustam, M.Sc. (.....)

Munaqisy II : Abbas, S.Pt., M.Sc. (.....)

Munaqisy III : Dr.M.Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing I : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P. (.....)

Pembimbing II : Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertumbuhan Bakteri *Salmonella Sp. dengan Level Penambahan Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum Burbanni*) Pada Telur Asin***” yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Subur Ballah** dan Ibunda tercinta **Darmiati** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr.Ir.M. Basir Paly, M.Si** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Prof.Dr.Ir.Efendi Abustam, M.Sc., Abbas, S.Pt., M.Sc. dan Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan,** khususnya **Ibu Astaty, S.Pt., M.Si** selaku Pembimbing Akademik dan **Ibu Rusny, S.Pt., M.Si,** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.

7. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan angkatan 2012 kelas C Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar khususnya:: **Asriani Budi, Nurfahmi Sukiman, Andi Gusti Jaya Saputra, Andi Zulfadli, Zulkifli Hasan, Juwita Hasnita Salim, Ridwan, Abdul Rahim, Yus Rival Anwar, Muh. Bustanil, Akbar, Aswar Anas, Akhmad Arista, Hasrianti, Adhar, Asbar Samsa, Jusnedi Nursal**, yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun penulis tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimah kasih untuk rekan-rekan penelitian penulis **Yulianti, Ardiansyah** yang telah menemani dikala penulis mengalami saat senang maupun susah dalam mengerjakan skripsi ini bersama-sama. Terima kasih pula karena sudah memberi motivasi yang sangat bermanfaat.
9. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak **Andi Afriana SE** selaku pegawai di jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas. Terima kasih pula kepada ibu **Drh Aminah Hajah Thaha** selaku kepala laboratorium ilmu peternakan, Kakak **Muh. Arsan Jamili S.Pt, dan Hikmawati S.Pt**, selaku laboran jurusan ilmu peternakan yang ikut membimbing, memberi kritikan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada jurusan biologi laboran biologi Kakak kurniati S.SI, jurusan biologi dan Kakak Eka serta teman-teman seperjuangan penelitian yang tak henti-hetinya memberi semangat dan motivasi dalam menjalankan penelitian.

11. Teman-teman **KKN-Reguler Angkatan 51 Kec. Parangloe Kabupaten Gowa** khususnys Desa **Belapunranga dan kelurahan Bontoparang**.
12. Terima kasih kepada Kakak –kakak senior 2006-2011 dan Adik-adik **2013-2014** yang tak henti-hetntinya mendukung selama dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, September 2016

Penulis

SUCI INDA SARI



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Oprasional.....	5
F. Penelitian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telur	7
B. Telur Asin	15
C. Tinjauan Al-Qur'an	22
D. Deskripsi Tanaman Kayu Manis	24
E. Bakteri <i>Salmonella</i> sp.....	28

F. Pertumbuhan Mikroorganisme	34
G. Keamanan Pangan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	40
B. Alat dan Bahan Penelitian	40
C. Metode Penelitian	40
D. Prosedur Kerja	41
E. Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan.....	45
B. Pembahasan	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagian-bagian Telur.....	8
Gambar 2. Telur Asin	21
Gambar 3. Kulit dan Bubuk Kayu Manis	30
Gambar 4. Gambar cawan petri total koloni pengasinan 7 hari.....	47
Gambar 5. Gambar cawan petri total koloni pengasinan 10 hari.....	49
Gambar 6. Gambar cawan petri total koloni pengasinan 715hari.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Kimia Telur.....	11
Tabel 2. Kandungan Gizi Telur.....	28
Tabel 3. Komposisi Kimia <i>Cinnamomum Burbanni</i>	28
Tabel 4. Total Koloni Bakteri dengan Level Penambahan Bubuk Kayu Manis.	45



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jumlah Koloni Bakter Pengasinan 7 Hari.....	47
Grafik 2. Jumlah Koloni Bakter Pengasinan 10 Hari	49
Grafik 3. Jumlah Koloni Bakter Pengasinan 15 Hari.....	52



ABSTRAK

Nama : Suci Inda Sari
Nim : 60700112097
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Level Penambaha Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanni*) pada Telur Asin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan level penambahan bubuk kayu manis yang berbeda pada telur asin dan bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan yang berbeda pada telur asin. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan cara mengetahui pertumbuhan bakteri *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis pada telur asin dengan lama pengasinan 7, 10, dan 15 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasinan 7 hari dengan konsentrasi 0% (55×10^1 cfu/g), 10% (46×10^3 cfu/g), 15% (80×10^2 cfu/g), 20% (161×10^1 cfu/g). Lama pengasinan 10 hari 0% (271×10^2 cfu/g), 10% (215×10^1 cfu/g), 15% (95×10^3 cfu/g), 20% (50×10^1 cfu/g). Lama pengasinan 15 hari 0% (205×10^1 cfu/g), 10% (54×10^1 cfu/g), 15% (98×10^1 cfu/g), 20% (62×10^3 cfu/g). Sebagai kesimpulan bahwa konsentrasi bubuk kayu manis 15% cenderung mengurangi pertumbuhan koloni *Salmonella* sp. dan untuk pengasinan tampaknya pertumbuhan *Salmonella* sp. cenderung menurun pada hari ke-10.

Kata Kunci: Telur Asin, Salmonella sp. Bubuk Kayu Manis dan Lama Pengasinan

ABSTRAK

Nama : Suci Inda Sari

Nim : 60700112097

Jurusan : Ilmu Peternakan

Title : Growth Of *Salmonella* Sp. With The Addition Of Level Cinamomum Ground (*Cinnamomum Burbanni*) In Salted Egg

This study aims to determine the growth of *Salmonella* sp. With the addition of *Cinnamon* powder level different on how salted eggs and growth of *Salmonella* sp. With long marinating different in salted egg. This research method is quantitative descriptive way of knowing growth of *Salmonella* sp. with the addition of level variation *Cinnamon* powder on old salting salted with 7, 10 and 15 days. The results showed that marinating 7 days with concentrations of 0% (55×10^1 cfu/g), 10% (46×10^3 cfu/g), 15% (80×10^2 cfu/g), 20% (161×10^1 cfu/g). Long marinating 10 days 0% (271×10^2 cfu/g), 10% (215×10^1 cfu/g), (15% 95×10^3 cfu/g), 20% (50×10^1 cfu/g). Long marinating 15 days 0% (205×10^1 cfu/g), 10% (54×10^1 cfu/g), 15% (98×10^1 cfu/g), 20% (62×10^3 cfu/g). As a conclusion that the concentration of *Cinnamon* powder 15% tends to reduce the growth of *Salmonella* sp. colonies and salting seems colony growth *Salmonella* sp. tends to decrease at day 10.

Key Word: Salted Egg, Salmonella sp. *Cinnamomum* Powder, and Long marinating

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Dari sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang sangat baik dan mudah dicerna. Telur merupakan salah satu bahan pangan dengan nilai nutrisi yang baik karena telur merupakan sumber protein yang terdiri dari berbagai asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi telur juga merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) karena banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan mikroba khususnya bakteri *Salmonella* sp. Salah satu cara mencegah proses pembusukan pada telur dengan cara melakukan mengawetkan telur asin sehingga menghasilkan produk telur asin.

Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan telur segar, memperpanjang masa simpan, membuang bau amis telur serta menciptakan rasa yang khas. Proses pembuatan telur asin yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 cara yaitu merendam telur dengan larutan NaCl jenuh dan membungkus dengan adonan, setelah itu dibersihkan (dicuci) dan direbus (Sarwono, 1995). Menurut Samosir (1983), lama pemeraman telur akan mempengaruhi tingkat keasinan dari telur asin tersebut.

Teknologi pengawetan telur asin yang berkembang yaitu dengan pemberian ekstrak pada telur asin untuk meningkatkan umur simpan dan kualitas telur asin, salah satunya dari rempah-rempah dan buah. Zulaekah dan Widyaningsih (2005), dengan perendaman teh, penelitian Anggraini (2007), dengan perendaman daun jambu dan Leitasari (2012), dengan perendaman jahe mampu meningkatkan umur simpan telur asin dan cita rasa telur asin.

Salmonella sp. adalah bakteri batang Gram negatif tidak berspora. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia secara peroral. Penyebaran terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi. *Salmonella* sp. dapat menyebabkan enteritis, infeksi sistemik, dan demam enterik. Empat serotipe penyebab demam enterik adalah *Salmonella typhi*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella paratyphi A* dan *Salmonella paratyphi B*. Sebagian besar *Salmonella* sp. bersifat patogen pada hewan reservoirnya seperti unggas, tikus, babi dan kura-kura (Brooks, et al,2004).

Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang kulit batang, cabang dan dahannya digunakan sebagai bahan rempah-rempah dan merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Tanaman kayu manis yang dikembangkan di Indonesia terutama adalah *Cinnamomum burmanii* Blume dengan daerah produksinya di Sumatera Barat dan Jambi dan produknya dikenal sebagai *cassia-vera* atau *Korinjii cassia*. Selain itu terdapat *Cinnamomum zeylanicum* Nees, dikenal sebagai kayu manis *Ceylon* karena sebagian besar diproduksi di Srilangka (*Ceylon*) dan produknya dikenal sebagai *cinnamon*. Jenis kayumanis ini juga terdapat di pulau Jawa. Selain kedua jenis tersebut, terdapat pula jenis *C. cassia*

yang terdapat di Cina. Sebagian besar kulit kayumanis yang diekspor Indonesia adalah jenis *Cinnamomum burmanii*. Kulit kayu manis dapat digunakan langsung dalam bentuk asli atau bubuk, minyak atsiri dan oleoresin dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan dan antibakteri yang dapat memperlambat proses kerusakan serta dapat memberikan aroma dan cita rasa khas kayu manis. Minyak kayu manis dapat diperoleh dari kulit batang, cabang, ranting dan daun pohon kayu manis dengan cara destilasi, sedangkan oleoresinnya dapat diperoleh dengan cara ekstraksi kulit kayu manis dengan pelarut organik (Abdullah, 1990).

Kayu manis merupakan tumbuhan asli Indonesia. Kayu manis adalah salah satu rempah yang biasa dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bumbu penyedap masakan dan pembuatan kue, kayu manis sejak dulu dikenal memiliki berbagai khasiat. Bahkan, kayu manis saat ini sudah menjadi bagian dari bahan baku dalam industri jamu dan kosmetika. Kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) memang memiliki efek farmakologis yang dibutuhkan dalam obat-obatan. Tumbuhan yang kulit batang, daun, dan akarnya bisa dimanfaatkan sebagai obat ini, berkhasiat sebagai peluruh kentut (*carminative*), peluruh keringat (*diaphoretic*), antirematik, meningkatkan nafsu makan (*istomachica*), dan menghilangkan sakit (*analgesik*). Kandungan kimia yang terdapat dalam kayu manis adalah minyak atsiri, eugenol, safrole, sinamaldehyde, tanin, kalsium oksalat, damar, dan zat penyamak. Sifat kimia dari kayu manis adalah pedas, sedikit manis, hangat, dan wangi. Menurut pakar obat-obatan herbal, Prof Hembing Wijayakusuma, kayu manis memiliki banyak khasiat obat. Di antaranya, obat asam urat, obat tekanan darah tinggi (*hipertensi*), obat

radang lambung atau maag (*gastritis*), tidak nafsu makan, sakit kepala (*vertigo*), masuk angin, perut kembung, diare, muntah-muntah, hernia, susah buang air besar, sariawan, asma, sakit kuning, dan lain-lain (Rismunandar dan Paimin, 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pemeraman pada telur untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk kayu manis pada pertumbuhan bakteri *Samonella* sp.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan level pemberian bubuk kayu manis yang berbeda pada telur asin?
2. Bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan yang berbeda pada telur asin?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan level pemberian konsentrasi bubuk kayu manis yang berbeda pada telur asin?
2. Mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan yang berbeda pada telur asin?

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai cara pembuatan telur asin dengan penambahan rempah.

E. Defenisi Oprasional

1. Pertumbuhan *Salmonella* sp. adalah perbanyakkan sel dan peningkatan ukuran bakteri. *Salmonella* sp. merupakan bakteri Gram negatif berbentuk basil, tidak berspora, panjangnya bervariasi dan kebanyakan spesies bergerak dengan flagen peritrik.
2. Penambahn level pada kayu manis karena memiliki aktivitas antioksidan alami karena didalam ekstrak kayu manis terdapat senyawa sinamaldehyd, eugenol, trans asam sinamat, senyawa fenol, dan tannin. Kayu manis diharapkan efektif sebagai antioksidan serta antibakteri sehingga dapat diaplikasikan sebagai antioksidan alami dan pengawet alami makanan. Minyak atsiri dan senyawa fenol kayu manis akan memperlambat proses kerusakan serta dapat meningkatkan flavor atau cita rasa yang lebih baik pada telur.
3. Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan cara penggaraman yang berperan sebagai pengawet yang dapat mempertahankan serta memperpanjang daya simpan sekaligus meningkatkan cita rasa telur itu sendiri.

F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Andriyanto (2013), Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Manis Terhadap Kualitas Sensoris, Aktivitas Antioksidan Dan Aktivitas Antibakteri Pada Telur Asin Selama Penyimpanan Dengan Metode Penggaraman Basah. Penambahan ekstrak kayu manis pada telur asin dapat menghambat pertumbuhan jumlah bakteri selama penyimpanan 14 hari pada suhu ruang. Jumlah bakteri selama penyimpanan akan semakin bertambah dari hari ke-0 sampai hari ke-14. Pada sampel telur asin tanpa penambahan ekstrak kayu manis (0%) hari ke-0 (1,9

$\times 10^3$ cfu/g) akan mengalami peningkatan sampai hari ke-14 ($2,79 \times 10^8$ cfu/g), sampel telur asin dengan penambahan ekstrak kayu manis 5% pada hari ke-0 ($6,0 \times 10^2$ cfu/g) akan mengalami peningkatan sampai hari ke-14 ($2,84 \times 10^7$ cfu/g), sampel telur asin dengan penambahan ekstrak kayu manis 20% pada hari ke-0 ($1,26 \times 10^3$ cfu/g) akan mengalami peningkatan sampai hari ke-14 ($2,69 \times 10^8$ cfu/g) telur asin penambahan ekstrak kayu manis 5% memiliki total bakteri paling sedikit jika dibandingkan dengan sampel telur asin lain selama penyimpanan, sedangkan sampel telur asin tanpa penambahan ekstrak kayu manis (0%) memiliki total bakteri paling banyak selama penyimpanan dibandingkan sampel yang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telur

1. Pengertian Telur

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Teknik pengolahan telur telah banyak dilakukan untuk meningkatkan daya tahan serta kesukaan konsumen (Irmansyah dan Kusnadi, 2009).

Telur mempunyai cangkang, selaput cangkang, putih telur (albumin) dan kuning telur. Cangkang dan putih telur terpisah oleh selaput membran, kuning telur dan albumin terpisah oleh membran kuning telur. Telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk olahan lain karena memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan protein pada telur terdapat pada putih telur dan kuning telur (Jacqueline, *et al.*, 2000).

Putih telur merupakan salah satu bagian dari sebuah telur utuh yang mempunyai persentase sekitar 58-60% dari berat telur itu dan mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan kental dan lapisan encer. Menambahkan bahwa lapisan kental terdiri atas lapisan kental dalam dan lapisan kental luar dimana lapisan kental dalam hanya 3% dari volume total putih telur dan lapisan kental putih telur mengandung protein dengan karakteristik gel yang berhubungan dengan jumlah *ovomuin* protein (Tan, *et al.*, 2012).

Menurut Hajrawati dan Aswar (2011), menyatakan bahwa pH telur akan naik karena kehilangan CO₂. Kadar air pada telur akan hilang akibat lama disimpan pada telur dan suhu penyimpanan untuk telur yang akan mempercepat terjadinya reaksi metabolisme dan pertumbuhan bakteri.

2. Komponen telur



Gambar 2.1: Bagian-bagian telur (Stadellman dan Cotterill, 1995)

Menurut Stadellman dan Cotterill (1995), menyatakan bahwa bagian-bagian telur memiliki fungsi yaitu:

1. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar-masuknya udara.
2. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara.
3. Rongga udara berfungsi sumber oksigen bagi embrio.
4. Keping germinal (zigot/sel embrio) merupakan calon individu baru.
5. Kuning telur (yolk) adalah cadangan makanan bagi embrio.

6. Putih telur (albumin) berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air.
7. Kalaza (tali kuning telur) berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur.

Menurut Sarwono (1995), menyatakan bahwa telur ayam ras memiliki fisik terdiri dari 10% kerabang (kulit telur, cangkang), 60% putih telur dan 30% kuning telur. Secara umum telur terbagi atas tiga komponen pokok, yaitu kulit telur atau cangkang 11%, putih telur 57%, dan kuning telur 32%.

Telur sangat tahan terhadap kehilangan isi karena ketahanan kerabang terhadap penyusup zat cair atau perbanyak jasad renik. Telur utuh terdiri atas beberapa komponen yaitu air 66%, dan bahan kering 34% yang tersusun atas protein 12%, lemak 10%, karbohidrat 1% dan abu 11%. Kuning telur adalah salah satu komponen yang mengandung nutrisi terbanyak dalam telur. Kuning telur mengandung air sekitar 48% dan lemak 33%. Kuning telur juga mengandung vitamin, mineral, pigmen, dan kolestrol. Putih telur terdiri atas protein terutama *lisosin* yang memiliki kemampuan anti bakteri untuk membantu mengurangi kerusakan telur (Akoso, 1993).

Kerabang telur atau *egg shell* mempunyai dua lapisan yaitu *spongy layer* dan *mamillary layer* yang terbungkus oleh lapisan lender berupa kutikula. Lapisan luar terbentuk dari kalsium, phosphor dan vitamin D yang merupakan lapisan paling keras yang berfungsi melindungi semua bagian telur. Putih telur atau albumen mempunyai proporsi yang tinggi dalam komposisi telur mencapai 60%

dari total berat telur. Presentasi putih telur pada ayam dan umur dari telur. Kuning telur merupakan bagian paling penting bagi isi telur, sebab pada bagian inilah terdapat dan tempat tumbuh embrio hewan, khususnya pada telur yang telah dibuahi. Bagian kuning telur ini terbungkus semacam selaput tipis yang kuat dan elastis yang disebut membrane vetelina, kuning telur memiliki komposisi gizi yang lebih lengkap daripada putih telur dan terdiri dari air lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin (Stadellman dan Cotterill, 1995).

3. Kandungan Gizi Telur

Telur adalah bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dan merupakan sumber asam amino esensial, kalori, vitamin dan mineral. Telur juga mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, dari sebutir telur didapatkan gizi yang sempurna. Selain itu, zat gizi tersebut mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan protein kuning telur yaitu sebanyak 16,5 % dan pada putih telur sebanyak 10,9%, sedangkan kandungan lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih telur terdapat dalam jumlah yang sedikit (Titik, 2000).

Disamping mengandung protein yang tinggi, telur juga merupakan sumber zat besi, beberapa mineral dan vitamin. Telur mengandung semua vitamin, kecuali vitamin C dan vitamin K, mineral. Mineral yang ada pada telur antara lain natrium, kalium, besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, magnesium, mangan, potasium, sodium, zinc, klorida dan sulfur (Titik, 2000).

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Telur

Komposisi	Telur utuh	Isi telur Tanpa cangkang	Kuning telur	Putih telur	Cangkang dan kulit membran
Seluruh telur	100	-	31,0	58,0	11,0
Air	65	75,0	48,0	87,0	2,0
Protein	12	12,0	17,5	11,2	4,5
Lemak	11	11,0	32,5	0,2	-
Karbohidrat	1	0,5	1,0	1,0	-
Abu	11	1,5	1,0	0,8	93,5

Sumber: Titik, 2000.

Telur itik tersusun atas krabang telur (10,25 %), putih telur (59,50 %), dan kuning telur (31,9 %), sedangkan menurut bahan yang terkandung, telur terdiri dari air dan bahan kering yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan mineral (Winarti, 2004)

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Telur Itik

No	Bagian (%)	Isi Telur	Putih Telur	Kuning Telur
1	Berat	6,6	40,4	26,6
2	Air	69,7	86,8	44,8
3	Bhn kering	30,3	13,2	55,2
4	Protein	13,7	11,3	17,7
5	Lemak	14,2	0,08	35,2
6	Karbohidr	1,2	1,0	1,1

Sumber: Winarti, 2004.

4. Faktor Kualitas telur

Menurut Stadellman dan Cotterill (1995), menyatakan bahwa kualitas fisik telur juga ditentukan oleh kuning telur, warna kuning telur tersebut disebabkan karena adanya kandungan *xantofil* diserap dan disimpan dalam kuning telur.

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi dan kulit telur. Oleh karena itu, penentuan kualitas telur dilakukan pada kedua bagian telur tersebut. Kualitas telur sebelumnya keluar dari organ reproduksi ayam dipengaruhi faktor: kelas, strain, *family*, dan individu; penyakit, umur, dan suhu lingkungan. Kualitas telur sesudah keluar dari organ reproduksi dipengaruhi oleh penanganan telur dengan penyimpanan (lama, suhu, dan bau penyimpanan) (Sudaryani, 2003).

Bentuk telur dipengaruhi oleh ransum yang dimana pembentukan telur sebagaimana telah diuraikan itu baru akan terjadi bila ada material yang berupa unsur-unsur gizi pendukung pembentukan telur tersebut dan dalam keadaan normal telur akan keluar dari tubuh induk dengan bentuk oval dan berat sesuai standard atau berat yang wajar. Bentuk telur yang normal yakni lonjong tumpul bagian atas dan runcing bagian bawah (Sudaryani, 2003).

Menurut Suprapti (2002), menyatakan bahwa kualitas telur ditentukan oleh beberapa hal antara lain oleh faktor keturunan, kualitas makanan, sistem pemeliharaan, iklim, dan umur telur.

1. Unggas yang dihasilkan dari keturunan yang baik dan diberi makanan yang berkualitas, umumnya akan menghasilkan telur yang berkualitas baik.
2. Makanan yang berkualitas dengan komposisi bahan yang tepat, baik, dari jumlah maupun kandungan nutrisinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan unggas. Sehingga menghasilkan telur yang berkualitas.
3. Sistem pemeliharaan antara lain berkaitan dengan kebersihan atau sanitasi kandang dan lingkungan di sekitar kandang. Sanitasi yang baik akan menghasilkan telur yang baik pula.
4. Iklim disekitar lokasi kandang akan sangat mempengaruhi kehidupan unggas yang dipelihara. Iklim akan sangat mendukung kesehatan dan laju pertumbuhan unggas.
5. Umur telur yang dimaksud adalah umur telur setelah dikeluarkan oleh unggas. Secara umum, telur memiliki masa simpan 2–3 minggu. Telur yang disimpan melebihi jangka waktu penyimpanan segar tersebut tanpa mendapatkan penanganan pengawetan, akan mengalami penurunan kualitas yang menuju kearah pembusukan.

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi telur. Kualitas isi telur dapat dikategorikan baik jika tidak terdapat bercak darah atau bercak lainnya, belum pernah dierami yang ditandai dengan tidak adanya bercak calon embrio, kondisi putih telurnya masih kental dan tebal (sebagai serta kuning telurnya tidak pucat. Telur segar memiliki ruang udara (*air cell*) yang lebih kecil dibandingkan telur yang sudah lama (Haryoto, 1996).

Menurut Sarwono dkk (1985), yang menyatakan bahwa kualitas telur konsumsi umumnya diklasifikasikan sesuai karakteristiknya, seperti:

- a. Bentuk telur, telur itik yang baik berbentuk oval.
- b. Warna kulit telur, kulit telur berwarna hijau umumnya lebih disukai konsumen dibanding kulit telur warna putih.
- c. Berat telur yang terbaik adalah telur itik dengan berat 60-80 gram.
- d. Keadaan kulit telur, menyangkut keutuhan, ketebalan, halus dan kasarnya kulit telur.

Pengelolaan produksi telur ditujukan untuk mempertahankan daya simpan telur sebagai bahan pangan yang tetap berkualitas tinggi, pengolahan telur harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menurunkan kandungan gizi telur. Kesalahan dalam mengolah telur tidak sengaja mempengaruhi rasa tetapi juga mengubah sifat telur menjadi padat karena pemanasan atau tercampur bahan lain. Pengolahan diharapkan agar telur tetap bernilai gizi tinggi, tidak merubah rasa, tidak berbau busuk dan warna isi tidak pudar. Telur yang segar memiliki ruang udara yang lebih kecil dibandingkan telur yang suda lama. Diluar negeri, kualitas telur dapat dikelompokan berdasarkan ukuran kedalaman ruang udaranya (Titik, 2000).

5. Faktor kerusakan telur

Dari penelitian yang dilakukan para ahli, Rasyaf (1991), menyatakan bahwa kerusakan isi telur disebabkan adanya CO₂ yang terkandung didalamnya sudah banyak yang keluar, sehingga derajat keasaman meningkat. Penguapan

yang terjadi juga membuat bobot telur menyusut, dan putih telur menjadi lebih encer.

B. Telur Asin

1. Defenisi Telur Asin

Telur asin dari telur itik merupakan olahan berkalsium tinggi. Bobot dan ukuran telur itik rata-rata lebih besar dibandingkan dengan telur ayam. warna kulit telurnya agak biru muda. karena bau amisnya yang tajam, penggunaan telur itik dalam berbagai makanan tidak seluas telur ayam. Selain baunya yang lebih amis, telur itik juga mempunyai pori-pori yang lebih besar, sehingga sangat baik untuk diolah menjadi telur asin. Telah banyak kajian mengenai kandungan gizi pada sebutir telur. Orang juga sudah banyak tahu betapa besar kandungan proteinnya. Namun, kajian mengenai nilai gizi telur asin belum begitu populer. Padahal selain mengandung hampir semua unsur gizi dan mineral lengkap, kandungan kalsium meningkat 2,5 kali setelah pengasinan (Hidayat, 2007).

Telur merupakan hasil ternak yang mempunyai ambil besar dalam mengatasi masalah gizi masyarakat, karena telur sarat akan zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat. zat-zat gizi yang ada pada telur sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Itulah sebabnya, maka telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil dan menyusui, orang yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan, serta usia lanjut ada banyak macam pengasinan telur, secara tradisional masyarakat kita telah mengawetkan telur dengan cara pengasinan menggunakan adonan garam, yaitu garam yang dicampur dengan komponen-

komponen lainnya seperti abu gosok, batu bata merah, kapur, tanah liat dan sebagainya. Selain itu pengasinan telur juga dapat dilakukan dengan menggunakan media cair yaitu dengan larutan garam jenuh (Astawan, 1988).

Telur asin adalah telur itik yang diolah dalam keadaan utuh, dimana kandungan garam dapat menghambat perkembangan mikroorganisme dan sekaligus dapat memberikan aroma yang khas, sehingga telur dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Telur asin adalah telur segar yang diolah dalam keadaan utuh, diawetkan sekaligus diasinkan dengan menggunakan garam, dimana kandungan garam dapat menghambat perkembangan mikroorganisme sehingga telur dapat disimpan lama (Sutrisno, 1991)

Menurut Samosir (1983), menyatakan bahwa telur itik yang diasinkan dapat mengandung keuntungan sebagai berikut:

1. Nilai gizi telur dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lama.
2. Nilai ekonomis telur dapat ditingkatkan.
3. Memenuhi selera konsumen.
4. Merupakan alternatif pemasaran disamping telur segar.

Menurut Samosir (1983), menyatakan bahwa dalam melakukan proses pengasinan telur asin, syarat telur yang akan diasinkan adalah:

1. Telur masih segar dan baru
2. Telur sudah harus dibersihkan dari kotoran
3. Kulit telur masih utuh dan tidak retak
4. Sebelum diasinkan, telur harus diampelas untuk memudahkan proses pengasinan.

Menurut Sutrisno (1991), menyatakan bahwa prinsip, dan proses pengawetan

Prinsip pengawetan telur adalah untuk :

1. Mencegah masuknya bakteri pembusuk ke dalam telur.
2. Mencegah keluarnya air dari dalam telur.

Beberapa proses pengawetan telur utuh yang diawetkan bersama kulitnya antara lain :

1. Proses pendinginan.
2. Proses pembungkusan kering.
3. Proses pelapisan dengan minyak.
4. Proses pencelupan dalam berbagai cairan.

Menjaga kesegaran dan mutu isi telur, diperlukan teknik penanganan yang tepat, agar nilai gizi telur tetap baik serta tidak berubah rasa, bau, warna, dan isinya. Telur asin adalah telur utuh yang diawetkan dengan adonan yang ditambahkan garam.

Menurut Sutrisno (1991), menyatakan bahwa Proses pembuatan telur asin adalah sebagai berikut :

Ada 3 cara pembuatan telur asin yaitu :

1. Telur asin dengan adonan garam berbentuk padat atau kering.
2. Telur asin dengan adonan garam ditambah ekstrak daun teh.
3. Telur asin dengan adonan garam, dan kemudian direndam dalam ekstrak atau cairan teh.

Cara Pembuatan telur asin adalah sebagai berikut :

1. Pilih telur yang bermutu baik (tidak retak atau busuk).
2. Bersihkan telur dengan jalan mencuci atau dilap dengan air hangat, kemudian keringkan.
3. Amplas seluruh permukaan telur agar pori-porinya terbuka.
4. Buat adonan pengasin yang terdiri dari campuran abu gosok dan garam, dengan perbandingan sama (1:1). Dapat pula digunakan adonan yang terdiri dari campuran bubuk bata merah dengan garam.
5. Tambahkan sedikit air ke dalam adonan kemudian aduk sampai adonan berbentuk pasta.
6. Bungkus telur dengan adonan satu persatu secara merata sekeliling permukaan telur, kira-kira setebal 1-2 mm.
7. Simpan telur dalam kualiti tanah atau ember plastik selama 15-20 hari. Usahakan agar telur tidak pecah, simpan di tempat yang bersih dan terbuka.
8. Setelah selesai bersihkan telur dari adonan kemudian rendam dalam larutan dan selama 8 hari (bila perlu).

Pembuatan telur dengan cara pemeraman adalah dengan membungkus telur dalam adonan garam. Ada beberapa macam adonan garam yang digunakan oleh pembuat telur asin. Adanya variasi bahan tersebut membuat cara pengasinan lebih beragam, di antaranya yang terkenal adalah cara pengasinan *pidan* dan cara pengasinan telur *halidan*. Cara pengasinan *pidan* berasal dari China (Romanoff and Romanoff, 1963). Cara ini menggunakan bahan pembungkus telur yang terbuat dari campuran serbuk gergaji, kapur dan garam dengan perbandingan

1:1:1. Cara pengasinan *halidan* menggunakan bahan pembungkus dari campuran tanah liat atau batu bata dan garam dengan perbandingan 1:1, dengan cara ini telur akan mampu bertahan selama 30 hari (agus, 2002). Menurut Margono dkk. (2000) telur asin dapat dibuat dengan adonan pengasin yang terdiri dari campuran abu gosok dan garam dengan perbandingan 1:1. Dapat pula digunakan adonan yang terdiri dari serbuk batu

bata dan garam. Telur kemudian diperam selama 15-20 hari. Telur asin matang yang dibuat dengan cara ini dapat bertahan selama 2-3 minggu.

Cara pembuatan telur asin dengan menggunakan adonan garam akan menghasilkan telur asin yang lebih bagus mutunya, warnanya lebih menarik serta memiliki cita rasa yang lebih enak, tapi proses pembuatannya lebih rumit dan waktu yang diperlukan lebih lama. Pemeraman dengan menggunakan adonan dari abu akan menghasilkan telur asin dengan kuning telur yang pucat dan bagian tepi kuning telur tersebut berwarna kehitaman (abu-abu). Sedangkan pemeraman dengan menggunakan adonan dari batu bata akan menghasilkan telur asin dengan warna kuning telur yang kemerah-merahan dan rasanya terkesan berpasir (Jawa: masir) (Suprapti, 2002).

2. Daya Tahan dan Cara Penyimpanan Telur Asin

Daya tahan telur asin sangat dipengaruhi oleh kadar garam telur asin. Semakin tinggi kadar garam dalam telur semakin lama pula daya tahan telur asin. Hal ini disebabkan fungsi garam yang menghambat pertumbuhan bakteri telur asin bisa disimpan sebelum dimasak (direbus atau dikukus) maupun setelah dimasak. Hasil penelitian telur asin matang yang dihasilkan

dengan perendaman larutan garam jenuh dapat bertahan hingga 9 hari pada penyimpanan suhu kamar, sedangkan telur asin yang masih mentah selama 2 minggu penyimpanan belum ada yang rusak dan pada minggu ke- 3 penyimpanan terdapat kerusakan sebesar 20% (Winarti, 2004).

3. Kualitas Telur Asin yang Baik

Telur asin berkualitas baik memiliki rasa asin yang cukup, kuning telur berwarna kemerahan, dan terkesan berpasir (masir). Pengasinan telur dikatakan berhasil dengan baik apabila telur asin yang dihasilkan bersifat stabil, dapat disimpan lama tanpa banyak mengalami perubahan, tidak berbau amoniak atau bau yang kurang sedap, penampakan putih dan kuning telur baik, serta berminyak dibagian pinggir. Telur asin yang baik, akan terlihat jika sudah dibelah. Kuningnya berada di tengah, minyaknya hanya terdapat di bagian pinggir atau masir, rasa dan aromanya enak. Bagian kuning telur mengandung hampir semua macam vitamin (kecuali vitamin C) dan juga sumber mineral seperti besi, fosfor, kalsium, tembaga, iodium, magnesium, mangan, kalium, natrium, seng, klorida dan sulfur serta vitamin D alami (Sutrisno, 1991).

Kandungan mineral yang lengkap pada telur tidak sama dengan bahan-bahan pangan tunggal lainnya, kecuali susu. Mineral-mineral penting yang terkandung dalam telur asin dibandingkan dengan telur itik segar, hampir tidak ada perubahan nilai gizi yang berarti akibat proses pengasinan. Kenaikan zat gizi yang cukup berarti terlihat pada kadar kalsiumnya, yaitu dari 56 mg pada telur itik segar menjadi 120 mg telur asin (Sarwono dkk, 1985).



Gambar 2.2 : Telur Asin (Sarwono, 1985).

Kenaikan kadar tersebut kemungkinan berasal dari kalsium yang ada pada garam dapur (sebagai kontaminan), abu gosok, serta kapur yang dipakai dalam pembuatan media pengasinan. Masuknya kalsium berlangsung melalui cara yang sama seperti unsur natrium dan klorida, yaitu melalui pori-pori kulit telur. Penurunan nilai gizi yang cukup berarti terlihat pada kandungannya, yaitu dari 1.230 Standar Internasional (SI) pada telur itik segar menjadi 841 Standar Internasional (SI) telur asin. Sejumlah ahli gizi merekomendasikan bahwa mengonsumsi telur asin, tak perlu takut kolesterol atau jantung (Sarwono dkk, 1985).

Mutu telur asin menurut Standar Nasional Indonesia meliputi, bau, warna, kenampakan, kadar garam, cemaran mikroba *salmonella* dan *Staphylococcus aureus*. Kadar garam telur asin yang dibuat dengan perendaman air garam jenuh selama 12 hari adalah kuning telur 0,58% dan putih telur 3,02%, kadar garam telur asin pada bagian putih telur 3,69–3,79% sedangkan pada bagian kuning telur 1,40– 1,96 % (Winarti, 2004).

C. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Telur

Dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, maka proses pengembangan pengendalian mutu dan keamanan pangan, mengenai produk pengolahan telur harus memperhatikan unsur nutrisi yang ada di dalam telur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses pengawetan dengan pengasinan. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-waaqi'ah/56:70 Allah swt, berfirman:

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur?

Dalam “*Tafsir Al Azhar*” disuruh memikirkan yang sedemikian, untuk memperdalam keyakinan betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia, sebagaimana ujung ayat Allah swt berfirman “Alangkah baiknya kamu berterima kasih” karena Allah swt dalam beberapa menit saja dapat menciptakan gumpalan awan, air yang asin menjadi air tawar, untuk ditumpahkan dalam daerah yang sangat memerlukannya dan jarang sekali Allah menjadikan air yang tawar menjadi asin, karena kasih sayang Allah swt kepada manusia, oleh sebab itu dianjurkan untuk bersyukur.

Dalam QS Nahl/16:69 Allah swt, berfirman:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

Dalam” *Tafsir Al-Mishbah.*” kemudian Allah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadikan buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya. Berkat petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan itu, lebah menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan sangat mudah. Dari dalam perut lebah keluar sejenis minuman beraneka warna dan berguna sekali bagi kesehatan manusia. Dan sesungguhnya pada ciptaan yang unik itu terdapat pertanda akan wujud sang Pencipta yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana. Orang-orang yang berakal akan merenungkan hal itu sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perfermentous (semacam zat gula yang sangat mudah dicerna) dalam porsi cukup besar. Melalui ilmu kedokteran modern didapat kesimpulan bahwa glukosa berguna sekali bagi proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit melalui injeksi atau dengan perantaraan mulut yang berfungsi sebagai penguat. Di samping itu, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi terutama vitamin B kompleks.

D. Deskripsi Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum Burmanni)

1. Pengertian Kayu Manis

Tanaman kayu manis yang dikembangkan di Indonesia terutama adalah *Cinnamomum burmannii* Blume dengan daerah produksinya di Sumatera Barat dan Jambi dan produknya dikenal sebagai *cassia-vera* atau *Korinjii cassia*. Selain itu terdapat *Cinnamomum zeylanicum* Nees, dikenal sebagai kayu manis *Ceylon* karena sebagian besar diproduksi di Srilangka (*Ceylon*) dan produknya dikenal sebagai *cinnamon*. Jenis kayu manis ini juga terdapat di pulau Jawa. Selain kedua jenis tersebut, terdapat pula jenis *C. cassia* yang terdapat di Cina. Sebagian besar kulit kayumanis yang diekspor Indonesia adalah jenis *Cinnamomum burmannii*. Kulit kayu manis dapat digunakan langsung dalam bentuk asli atau bubuk, minyak atsiri dan oleoresin. Minyak kayu manis dapat diperoleh dari kulit batang, cabang, ranting dan daun pohon kayu manis dengan cara destilasi, sedangkan oleoresinnya dapat diperoleh dengan cara ekstraksi kulit kayu manis dengan pelarut organik (Abdullah, 1990).

Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang kulit batang, cabang dan dahannya digunakan sebagai bahan rempah-rempah dan merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia (Sudiarto dkk, 1989).



Gambar 2.3: Kulit dan bubuk kayu manis (Abdullah, 1990).

Indonesia hanya mengekspor produk kayu manis (*Cinnamomum burmanii* Blume) dalam bentuk kulit yang merupakan komoditas ekspor penting bagi daerah tertentu seperti Sumatera Barat. Pada tahun 1987, dari 29.917 ton ekspor kayu manis dunia, 60% berasal dari Indonesia sebagai penghasil utama kayu manis. Negara pengimpor utama kayu manis Indonesia antara lain adalah Amerika, Kanada dan Jerman. Indonesia dikenal sebagai produsen utama kayu manis tetapi harga jual komoditas itu sangat rendah karena dalam bentuk bahan baku. Di masa depan sebaiknya harus diubah dengan terus berupaya melakukan diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah dengan mengolah kayu manis sebelum diekspor maka dipastikan akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dan mampu menaikkan harga di tingkat petani (Sudiarto dkk, 1989).

Menurut Rismunandar dan Paimin (2001), menyatakan bahwa klasifikasi tanaman kayu manis adalah sebagai berikut

Kerajaan : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Laurales
Suku : Lauraceae
Marga : Cinnamomum
Spesies : *Cinnamomum burmanii* Blume

Spesies kayu manis (*Cinnamomum* sp.) yang dikenal di dunia, 12 di antaranya terdapat di Indonesia. Tiga jenis kayu manis yang menonjol di pasar dunia yaitu *Cinnamomum burmannii* (di Indonesia) yang produknya dikenal nama cassiavera, *Cinnamomum zeylanicum* (di Sri Lanka dan Seycelles) dan *Cinnamomum cassia* (di China) yang produknya dikenal dengan Cassia China. Jenis-jenis tersebut merupakan beberapa tanaman rempah yang terkenal di pasar dunia. Tanaman kayu manis yang selama ini banyak dikembangkan di Indonesia adalah *Cinnamomum burmannii* Blume, yang merupakan usaha perkebunan rakyat, terutama diusahakan di Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara. Jenis *Cinnamomum Burmanii* Blume atau cassiavera ini merupakan produk ekspor tradisional yang masih dikuasai Indonesia sebagai negara pengekspor utama di dunia (Abdullah, 1990).

Menurut Gupta *et al.*, (2008), menyatakan bahwa minyak atsiri kayu manis sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri antara lain *Bacillus cereus*, *Salmonella aureus*, *Ecercia coli* *P. aeruginosa* dan *Klebsiella sp.* Penghambatan bakteri dengan minyak atsiri kayu manis ini disebabkan oleh senyawa aktif seperti sinamaldehyd dan asam sinamat. Minyak atsiri dan oleoresin kayu manis mempunyai efek antibakteri.

Senyawa sinamaldehyd, eugenol dan *linalool* dalam minyak atsiri kayu manis telah dilaporkan sebagai salah satu senyawa. Sinamaldehyd dan eugenol merupakan turunan dari fenol. Menurut Wijayanti dkk (2009), fenol merupakan senyawa dengan sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol berfungsi sebagai donor hidrogen pada radikal sehingga radikal tersebut menjadi stabil dan tidak reaktif lagi untuk membentuk radikal baru.

Leitasari (2012), mengatakan bahwa makin tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba akan semakin cepat sel mikroorganisme terbunuh atau terhambat pertumbuhannya. Sifat dari kayu manis yang higroskopis dan membentuk gel ketika dipanaskan dengan air mampu menyelubungi garam dan senyawa aktif dari kayu manis sehingga mempengaruhi penghambatan pertumbuhan bakteri.

Prasetyaningrum (2012), terhadap tanaman herbal dan rempah-rempah, menyebutkan bahwa senyawa fenolik merupakan salah satu senyawa utama yang memberikan efek antimikroba. Senyawa fenol akan berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Dalam kadar rendah akan terbentuk kompleks antara protein dengan fenol pada ikatan yang lemah, diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan menyebabkan presipitasi dan

denaturasi sel. Pada kadar yang tinggi, fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran lisis. Senyawa eugenol dan sinamaldehyd dalam kayu manis merupakan senyawa aktif dalam minyak essential kayu manis yang memiliki aktivitas antimikroba.

Tabel 2.3 Komposisi kimia *Cinnamomum burmanni*

Parameter	Komposisi
Kadar air	7,90 %
Minyaka atsiri	2,40%
Alkohol ekstrat	10-12%
Abu	3,55%
Serat kasar	20,30%
Karbohidrat	59,55%
Lemak	2,20%

Sumber : Thomas dan Duethi, 2001.

E. Bakteri Salmonella sp.

1. Pengertian Bakteri *Salmonella sp.*

Salmonella adalah suatu genus bakteri enterobakteria Gram-negatif terbentuk tongkat yang menyebabkan tipoid, paratifod, dan penyakit *foodborne*. Spesies-spesies *Salmonella* dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. *Salmonella* pertama kali diberinama oleh Daniel Edward Salmon, ahli patologi Amerika, walaupun sebenarnya, rekannya Theobald Smith (yang terkenal akan hasilnya pada anafilaksis) yang pertama kali menemukan bacterium tahun 1885 pada tubuh babi. *Salmonella* adalah penyebab utama dari penyakit yang disebarkan melalui makanan (*foodborne diseases*) Pada umumnya, serotipe *Salmonella* menyebabkan penyakit pada organ perorang pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh *Salmonella* disebut salmonellosis (Carli *et al.*, 2001).

Menurut Julius, (1990), yang menyatakan bahwa berdasarkan taksonomi ilmiah, klasifikasi *Salmonella* sp adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Bacteria
Filum : Proteobacteria
Kelas : Gamma Proteobacteria
Ordo : Enterobakteriales
Famili : Enterobakteriaceae
Genus : Samonella

Salmonella digolongkan kedalam bakteri Gram-negatif sebab *Salmonella* adalah jenis bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri Gram-positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara Gram-negatif tidak. Pada uji pewarnaan Gram, suatu pewarna penimbal ditambahkan setelah metal ungu, yang membuat semua Gram-negatif 1 menjadi berwarna merah/merah muda. Pengujian ini berfungsi mengelompokkan kedua jenis bakteri ini berdasarkan perbedaan struktur dinding sel mereka. Banyak species bakteri Gram-negatif bersifat patogen (penyebab penyakit) yang berarti mereka berbahaya bagi organisme inang. Sifat patogen ini berkaitan dengan komponen tertentu pada dinding sel Gram-negatif terutama lapisan lipopolisakarida atau dikenal sebagai endotoksin (Julius, 1990),

Salmonella merupakan bakteri fakultatif aerob, dengan suhu optimum pertumbuhannya antara 35-37 °C, pada pH netral. Sedangkan untuk pertumbuhan optimum *Salmonella* adalah 0,99 dan minimumnya sekitar 0,94. Meskipun

begitu, *Salmonella* masih dapat bertahan hidup pada keadaan kering untuk waktu yang lama (Ray, 2001).

Salmonella termasuk dalam kelompok bakteri enteropatogenik yaitu kelompok bakteri penyebab infeksi gastrointestinal. Bakteri enteropatogenik pada umumnya terdapat dalam jumlah kecil di dalam makanan, meskipun demikian jumlah tersebut sudah dapat menimbulkan penyakit. *Salmonella* merupakan bakteri yang sangat infeksius, yaitu hanya dengan jumlah kurang dari 100 sel cukup untuk menimbulkan penyakit. Bahkan pada keju *cheddar*, kontaminasi dalam jumlah 1-10 sel *Salmonella typhimurium* sudah dapat mengakibatkan keracunan makanan (Humphrey, 2006). Oleh karena itu, dalam uji kuantitatif kadang-kadang bakteri tersebut tidak dapat terdeteksi karena pertumbuhannya tertutup oleh mikroba-mikroba lainnya yang terdapat dalam bahan makanan. Dengan alasan ini, uji kuantitatif dianggap tidak efisien dilakukan terhadap bakteri ini dan cukup hanya dilakukan uji kualitatif (Fardiaz, 1992).

Kontaminasi *Salmonella* pada telur dapat berasal dari lingkungan atau terjadi kontaminasi silang pada saat telur disimpan bersama telur lain yang mengandung *Salmonella*. Kontaminasi *Salmonella* dapat berada pada bagian luar (cangkang telur) maupun pada bagian dalam telur. *Salmonella* dapat mengadakan penetrasi ke bagian dalam telur melalui pori-pori ataupun retakan pada cangkang telur (Humphrey, 2006).

a. Sifat-sifat Bakteri *Salmonella* sp

Salmonella sp tidak memfermentasi laktosa dan sukrosa, konsistensinya smooth, membentuk asam dan kadang gas dari glukosa dan manosa, biasanya

memproduksi *hydrogen sulfide* atau H_2S , pada biakan agar koloninya besar bergaris tengah 2-8 milimeter, bulat agak cembung, jernih, smooth, pada media BAP tidak menyebabkan hemolisis, pada media Mac Concey koloni. *Salmonella sp.* tahan hidup dalam air yang dibekukan dalam waktu yang lama, bakteri ini resisten terhadap bahan kimia tertentu (misalnya hijau brilliant, *sodium tetrionat*, *sodium deoxycholate*) yang menghambat pertumbuhan bakteri enteric lain, tetapi senyawa tersebut berguna untuk ditambahkan pada media isolasi (Julius, 1990).

b. *Salmonella* pada Telur

Salmonella berkembang pada saluran pencernaan ternak, tidak terkecuali pada ayam dan telur. Ayam yang terinfeksi bakteri *Salmonella* bisa menyebarkan penyakit tersebut lewat daging, telur, baik kulit maupun isinya. Karena itu, hendaknya kita berhati-hati mengonsumsi telur sebab media inilah yang paling banyak menularkan penyakit. Saat ini, banyak makanan yang dikonsumsi mengandung telur mentah atau setengah matang. Cara mengonsumsi makanan semacam ini sangat rawan terpapar bakteri tersebut. Karena itu, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi telur dalam kondisi matang dan melalui proses pemanasan yang baik agar bakteri *Salmonella* di dalamnya mati. Sebenarnya, secara alami, cangkang telur memiliki lapisan yang melindungi isi telur dari paparan bakteri *Salmonella*. Namun, lapisan tersebut hanya bertahan sekitar 10 hari. Belum lagi kalau lapisan pada bagian luar cangkang tersebut rusak karena air atau cairan lain. Bakteri *Salmonella* bisa menembus masuk ke dalam isi telur dan berkembang di dalamnya (Myint, 2004).

c. Pencemaran Akibat *Salmonella typhosa* pada manusia

Salmonellosis (gastroenteritis yang dikarakteristikan oleh mual, muntah, dan diare) adalah penyakit yang paling umum oleh organisma. Kejang abdominal (perut) juga mungkin terjadi. Jadi salmonellosis menghasilkan gejala-gejala yang umumnya dirujuk sebagai keracunan makanan (food poisoning). Meskipun keracunan makanan biasanya adalah penyakit ringan, mual, muntah, dan diare dapat menjurus pada dehidrasi dan bahkan kematian (kira-kira 500 per tahun di Amerika). Adalah penting untuk mencatat bahwa banyak organisme-organisme lain (contohnya, virus-virus, *Escherichia coli*, *Shigella*) dan racun-racun (contohnya, botulism, racun jamur, pestisida-pestisida) dapat menghasilkan gejala-gejala keracunan makanan. Bagaimanapun, lebih dari 1.4 juta kasus-kasus dari salmonellosis terjadi per tahun di Amerika, dan diseluruh negara-negara yang maju mempunyai angka-angka yang sama tingginya. Negara-negara dengan sanitasi yang buruk mempunyai kejadian yang lebih tinggi dari salmonellosis (Pettar, *et al.*, 2011).

Demam *typhoid* terjadi ketika beberapa dari organisma-organisma *Salmonella* (sering diidentifikasi sebagai *Salmonella typhi*) tidak terbunuh oleh pertahanan-pertahanan imun manusia yang normal (sel-sel macrophage) setelah mereka memasuki sistim pencernaan (*gastrointestinal tract*). *Salmonella* kemudian selamat dan tumbuh dalam limpa, hati dan organ-organ lain manusia dan mungkin mencapai darah (*bacteremia*). *Salmonella* dapat dilepaskan dari hati ke kantong empedu, dimana mereka dapat berlanjut selamat dan dikeluarkan kedalam feces pasien untuk sampai satu tahun. Gejala-gejala termasuk demam-

demam yang tinggi sampai 104⁰C, berkeringat, peradangan dari lambung dan usus-usus, dan diare. Gejala-gejala biasanya menghilang, namun banyak pasien-pasien menjadi pembawa *Salmonella* (*carriers*). Hampir separuh dari pasien-pasien mengembangkan denyut jantung yang lambat (*bradycardia*), dan kira-kira 30% dari pasien-pasien memperoleh noda-noda yang berwarna merah atau ros yang rata, sedikit menonjol pada dada dan perut. Demam *typhoid* juga dirujuk sebagai demam enteric (Pettar, *et al.*, 2011).

d. Cara Analisa Bakteri *Salmonella* sp. pada Telur Bebek

Menurut Susanti (2013), menyatakan bahwa contoh pengujian (isolasi dan identifikasi) terdapat bakteri *Salmonella* sp. dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bersihkan kulit telur kemudian desinfeksi dengan alkohol 70% di bagian runcing telur.
- b. Buka kulit bagian runcing telur dan masukan isi telur asin ke dalam gelas beaker steril.
- c. Homogenkan isi telur tersebut (ekstrak telur).
- d. Buat pengenceran 1:10 dengan cara memipet 11 ml atau 11 gram ekstrak telur ke dalam 99 ml pengencer steril (dalam gelas Erlenmeyer), Ikemudian homogenkan (dikocok sebanyak 25 kali). Ambil di 1 ml larutan dari pengenceran 1:10 tersebut ke dalam 9 ml larutan pengencer steril sehingga menjadi pengenceran 1:100. Pengenceran serial ini diteruskan sampai mendapatkan larutan yang dikehendaki (untuk telur, cukup sampai 10-4).
- e. Ambil 1 ml dari masing-masing pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan petri steril yang telah diberi label sebelumnya sesuai dengan pengencerannya.

- f. Tuang agar cair hangat (suhu 40 °C sampai 50 °C) ke dalam masing-masing cawan petri tersebut kemudian goyangkan secara hati-hati dan biarkan memadat.
- g. Setelah agar memadat, masukkan cawan petri tersebut ke dalam inkubator bersuhu 37 °C selama 24-36 jam.
- h. Hitung jumlah koloni yang tampak dari masing-masing pengenceran lalu laporkan jumlahnya sesuai dengan standar.
- i. Seluruh pekerjaan dilakukan secara aseptik dan di dekat nyala api bunsen.

F. *Pertumbuhan Mikroorganisme*

Pertumbuhan merupakan proses perubahan bentuk yang semula kecil kemudian menjadi besar. Pertumbuhan menyangkut pertambahan volume dari individu itu sendiri. Pertumbuhan pada umumnya tergantung pada kondisi bahan makanan dan juga lingkungan. Apabila kondisi makanan dan lingkungan cocok untuk mikroorganisme tersebut, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau masa zat suatu organisme, misalnya kita makhluk makro ini dikatakan tumbuh ketika bertambah tinggi, bertambah besar atau bertambah berat. Pada organisme bersel satu pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni, ukuran koloni yang semakin besar atau substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak, pertumbuhan pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri (Monack et al., 2004).

Menurut Monack et al (2004), Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase yaitu:

1. Fase lag (fase penyesuaian diri/fase adaptasi), pada fase ini tidak terjadi penambahan populasi karena bakteri belum berkembang biak. Aktivitas metabolisme tinggi, sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi dan bertambah ukurannya, substansi intraselluler bertambah. Pada umumnya fase lag berlangsung selama 2 jam.
2. fase log (fase pembelahan), pada fase ini terjadi pertumbuhan maksimal, dimana jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat, pada kebanyakan bakteri fase ini berlangsung 18-24 jam. Keadaan pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) juga terjadi pada fase ini.
3. Fase statis (fase stasioner/fase konstan), pada fase ini terjadi pemupukan jumlah zat beracun, jumlah makanan berkurang, bakteri mulai ada yang mati, sebagian membelah secara lambat sehingga jumlah kuman yang hidup tetap sama.
4. Fase penurunan (fase kematian/*death fase*), jumlah bakteri hidup berkurang karena sel mati lebih banyak dibanding sel yang terbentuk. Karena keadaan lingkungan sangat buruk pada beberapa jenis bakteri akan menyebabkan timbulnya bentuk yang abnormal.

Menurut Monack et al (2004), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan mikroba adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keasaman (pH)

Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6–7,0 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan khamir tumbuh pada pH yang lebih rendah.

2. Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0-20⁰C.
- b. Mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20- 45⁰C.
- c. Termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya diatas 45⁰C.

Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, yaitu tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhu kamar. Bakteri patogen umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37⁰C, yang juga adalah suhu tubuh manusia. Oleh karena itu suhu tubuh manusia merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri pathogen. Mikroba perusak dan pathogen umumnya dapat tumbuh pada kisaran suhu 4–66⁰C.

3. Nutrient

Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi dan sejumlah kecil logam lainnya. Ketiadaan atau kekurangan sumber-sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kondisi tidak bersih dan higienis pada lingkungan adalah kondisi yang menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sehingga mikroba dapat tumbuh berkembang di lingkungan seperti ini. Oleh karena itu, prinsip daripada menciptakan lingkungan bersih dan higienis adalah untuk mengeliminir dan meminimalisir sumber nutrisi bagi mikroba agar pertumbuhannya terkendali.

4. Oksigen

Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok sebagai berikut:

- a. Aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya.
- b. Anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen.
- c. Anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen.
- d. Mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong aerob, yaitu membutuhkan oksigen

untuk pertumbuhannya, kecuali bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia yang tergolong anaerob fakultatif.

G. Keamanan Pangan

Dalam UU No. 8 tentang Pangan tahun 2012 dijelaskan bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.

Dalam UU No. 18 tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan/minuman.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria.

Keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah itu secara alami terdapat dalam bahan makanan yang digunakan atau tercampur secara sengaja atau tidak sengaja ke dalam bahan makanan atau makanan jadi. Kontaminasi makanan adalah terdapatnya bahan makanan atau organisme berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisme bahaya

tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan kadang-kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetis dari makanan. Misalnya ada sehelai rambut pada makanan. Meskipun demikian, kontaminan dapat pula menimbulkan efek yang lebih merugikan antara lain sakit dan perlukaan akut, sakit kronis, bahkan kematian bagi orang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi (BPOM, 2007).

Menurut BPOM (2007), Kontaminasi atau pencemaran makanan dikelompokkan ke dalam empat macam, yaitu:

- a. Pencemaran mikroba, seperti bakteri, jamur dan cendawan.
- b. Pencemaran fisik, seperti rambut, debu, tanah dan kotoran lainnya.
- c. Pencemaran kimia, seperti pupuk, pestisida, merkuri, cadmium, arsen, dan sebagainya.
- d. Pencemaran radioaktif, seperti sinar alfa, gamma, radioaktif, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 Juni – 14 Juli 2016. Bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *autoclav*, bunsen, botol selai, cawan petri, vorteks, *hot plate*, *incubator*, *colony counter*, timbangan, tabung reaksi, gelas erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, kaki tiga dan kasa asbes, laminar air flow, mikropipet, neraca analitik, oven, rak tabung.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu abu gosok, garam, bubuk kayu manis, telur asin, media *Bismuth Sulfitate Agar (BSA)*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan cara mengetahui pertumbuhan bakteri *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis 10%, 15%, dan 20%. pada telur asin dengan lama pengasinan yaitu 7,10 dan 15 hari.

D. Prosedur kerja

1. Pembuatan bubuk kayu manis

- a. Mengoven batang kayu manis dengan suhu 50⁰C selama 2 jam.
- b. Memotong kecil batnag kayu manis yang telah dioven.
- c. Membelender batang kayu manis yang telah dipotong kecil menjadi halus.

2. Pembuatan Adonan

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
- b. Membuat konsentrasi 10%, 15%, dan 20%, dengan cara:

$$10\% = \frac{10}{100} \times 400 = 40 \text{ gram kayu manis}$$

$$15\% = \frac{15}{100} \times 400 = 60 \text{ gram kayu manis}$$

$$20\% = \frac{20}{100} \times 400 = 80 \text{ gram kayu manis}$$

- c. Menimbang bahan berupa abu gosok 400 gr, garam 200 gr, dan kayu manis 40 gr, 60 gr, dan 80 gr. Pada tiap konsentrasi.
- d. Mencampur abu gosok, garam, dan kayu manis, kedalam baskom kemudian menambahkan air secukupnya.
- e. Mengaduk bahan yang sudah dicampur sampai merata hingga membantuk adonan.

3. Pembuatan Telur Asin

- a. Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan.
- b. Membersihkan kotoran telur menggunakan air.
- c. Menipiskan kerabang telur itik menggunakan amplas .
- d. Membalur telur yang telah diampelas menggunakan adonan yang telah dibuat terlebih dahulu.

e. Menyimpan telur yang dibalur dengan adonan selama 7, 10, dan 15 hari.

4. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang terbuat dari kaca seperti cawan petri, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, disterilisasi dalam oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Proses sterilisasi media yang telah dibuat, cawan petri sebagai tempat media padat dan tabung reaksi yang akan digunakan untuk tempat media cair disterilkan pada *autoclav* dengan menyalakan api pada kompor. Media tersebut harus dibungkus aluminium foil beserta palstick silk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam *autoclav* selama 45 menit pada suhu 121°C ditandai dengan adanya suara yang berbunyi pada autoclav. Kemudian tahap selanjutnya menunggu selama 15 menit. Kemudian mematikan api pada kompor.

5. Pembuatan Media *Bismuth Sulfitate Agar (BSA)*

Bismuth Sulfitate Agar merupakan jenis media agar digunakan untuk mengisolasi *Salmonella* sp. Media ditimbang sebanyak 10,4 g dan aquadest 300 ml yang telah disaring dan di *autoclav*. Media dan aquadest tersebut dicampur kemudian dihomogenkan dengan stirrer pada hot plate. Setelah media telah homogen/larut. Selanjutnya menyiapkan kaki tiga, kasa asbes dan menyalakan api bunsen. Memanaskan media tersebut sambil menggoyang-goyangkan agar homogen sekitar 30 menit hingga mendidih. Biarkan media mendidih selama 1 menit kemudian matikan api bunsen.

6. Penyiapan Laminar Air Flow (LAF)

Laminar Air Flow adalah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu proses yang membutuhkan kondisi steril seperti penanaman bakteri. Proses

pengerjaan harus dilakukan dalam keadaan steril dengan menyemprotkan alkohol 70% sebagai desinfektan baik pada handgloves maupun meja pengerjaan untuk menjaga sterilitas selama pengujian. Setelah Laminar Air Flow sudah didesinfektan dengan alkohol 70%, tahap selanjutnya dengan melakukan Blower penyaringan untuk membasmi/kuman selama 5 menit. Kemudian melakukan UV untuk membunuh bakteri secara menyeluruh pada Laminar Air Flow selama 30 menit sampai 2 jam yang ditandai dengan nyala lampu sudah mati.

7. Pertumbuhan *Salmonella* sp pada Telur Asin dengan Variasi Konsentrasi Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanni*).

(Susanti, 2013).

1. Menyiapkan alat dan bahan yang sudah steril ke dalam laminar air flow
2. Mengambil telur asin yang telah diasinkan dengan pengasinan selama 7, 10 dan 15 hari dengan konsentarsi kayu manis 0 %, 10 %, 15 % dan 20 %.
3. Dibersihkan kulit telur lalu didesinfeksi dengan alkohol 70% di bagian runcing telur.
4. Dibuka kulit bagian runcing telur dan dituangkan isi telur ke dalam botol selai steril.
5. Dihomogenkan isi telur tersebut (ekstrak telur) dengan batang pengaduk.
6. Mengambil masing-masing tabung reaksi yang berisi aquadest steril 9 ml.
7. Membuat pengenceran 10^{-1} sampai dengan 10^{-4} . Kemudian memipet masing-masing 1 ml ke dalam cawan petri steril

8. Menuangkan media *Bismuth Sulfite Agar* 15-20 ml (suhu 40°C sampai 50°C) ke dalam masing-masing cawan petri tersebut kemudian digoyangkan secara hati-hati seperti angka delapan dan dibiarkan memadat.
9. Setelah agar memadat, dimasukkan cawan petri tersebut ke dalam inkubator bersuhu 37°C selama 24-36 jam.
10. Menghitung jumlah sel sampel yang mengandung 30-300 koloni atau sel dengan menggunakan colony counter.

E. Analisis Data

Data dianalisis dengan secara deskriptif dengan menghitung jumlah koloni *Salmonella* sp. dari hasil pengenceran bertingkat dari berbagai konsentrasi bubuk kayu manis yang berbeda dengan pengasinan 7, 10 dan 15 hari pada telur asin.

Rumus: (Helmiyati dan Nurrahman, 2010).

$N = n \times \frac{1}{FP}$ dimana : N = Jumlah sel/ml atau/gram sampel

FP n = Jumlah koloni pada cawan

FP = Faktor pengenceran

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan bakteri *Salmonella* sp. Dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) pada telur asin di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 Total Koloni Bakteri dengan Level Penambahan Bubuk Kayu Manis


Lama pengasinan (hari)	Konsentrasi (%)	Total koloni bakteri (cfu/g)
7	0	55×10^1
	10	46×10^3
	15	80×10^2
	20	161×10^1
10	0	271×10^2
	10	215×10^1
	15	95×10^3
15	20	50×10^1
	0	205×10^1
	10	54×10^1
	15	98×10^1
	20	62×10^3

Sumber: Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

B. Pembahasan


Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa konsentrasi bubuk kayu manis dapat mengurangi pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan beberapa hari penyimpanan. Keberadaan *Salmonella* sp. pada telur asin dapat dilihat pada cawan petri menggunakan *Bismuth Sulfitate Agar* (BSA). Jika koloni berwarna abu-abu, kecoklatan hingga dengan adanya bintik-bintik hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan BAM (2007), yang menyatakan bahwa selain coklat, koloni dari *Salmonella* sp. dapat berwarna coklat, tetapi seiring dengan berjalannya inkubasi, warna dapat berubah menjadi hitam.

Adapun pertumbuhan koloni bakteri *Salmonella* sp. pada hari ke-7 pengasinan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dapat dilihat pada Gambar cawan petri berikut:



A

B




C

D

Gambar 1: Konsentrasi 0% (A), Konsentrasi 10% (B), Konsentrasi 15% (C), Konsentrasi 20% (D)

Pertumbuhan koloni bakteri dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis dapat pula dilihat pada Grafik berikut.




Grafik 1: Jumlah koloni bakteri dari konsentrasi bubuk kayu manis pada pengasinan 7 hari.

Pada lama pengasinan 7 hari penambahan bubuk kayu manis dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20% terlihat pertumbuhan *Samonella* sp. pada cawan petri secara konsisten menurun dimana jumlah koloni bakteri secara berturut-turut

46×10^3 , 80×10^2 , dan 161×10^1 . Hal ini sesuai dengan pendapat Leitasari (2012), menyatakan bahwa bubuk kayu manis dapat menghambat pertumbuhan koloni *Samonella* sp. semakin tinggi konsentrasi maka semakin sedikit jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada telur asin.


Adapun pertumbuhan koloni bakteri *Salmonella* sp. pada hari ke-10 pengasinan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dapat dilihat pada Gambar cawan petri berikut.



A

B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR




C

D

Gambar 2: Konsentrasi 0% (A), Konsentrasi 10% (B), Konsentrasi 15% (C), Konsentrasi 20% (D)

Pertumbuhan koloni bakteri dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis dapat pula dilihat pada Grafik berikut.




Grafik2: Jumlah koloni bakteri dari konsentrasi bubuk kayu manis pada pengasinan 10 hari.

Pada lama pengasinan 10 hari dengan penambahan bubuk kayu manis dengan konsentrasi 10%, 15% dan 20% terlihat pertumbuhan *Salmonella* sp. pada cawan petri secara konsisten menurun pada konsentrasi 10% dan 20% jumlah jumlah koloni bakterit yaitu 251×10^1 , 90×10^3 , dan 50×10^1 . Hal telah dijelaskan oleh Rachmawati, (2012), yang menyatakan bahwa bubuk kayu manis senyawa sinamaldehyd, eugenol, trans asam sinamat, senyawa fenol, dan tannin. Kayu manis diharapkan efektif sebagai antioksidan serta antibakteri sehingga dapat diaplikasikan sebagai antioksidan alami dan pengawet alami makanan. Minyak atsiri dan senyawa fenol kayu manis akan memperlambat proses kerusakan serta dapat meningkatkan flavor atau cita rasa yang lebih baik pada telur.


Leitasari (2012), menyatakan bahwa pada konsentrasi 15% jumlah koloni yaitu 95×10^1 meningkat jumlah koloni bakteri ini terjadi karena beberapa faktor sebagaimana dijelaskan oleh Fardiaz (1992), menyatakan bahwa suhu inkubasi yang digunakan pada kisaran suhu tertentu karena setiap mikroba memiliki karakteristik suhu yang berbeda-beda untuk tetap hidup dan berkembang biak. Suhu inkubasi sendiri ditentukan dari suhu optimum pertumbuhan mikroba supaya mikroba dapat tumbuh dengan baik. Sehingga apabila suhu inkubasi dinaikkan atau diturunkan dari suhu semula maka akan mengganggu pertumbuhan mikroba bahkan menyebabkan kematian pada mikroba tersebut karena lingkungan tidak lagi sesuai dengan karakteristiknya, selanjutnya dikatakan juga Firdiaz (1992), terjadi karena pengenceran yang terlalu rendah, dan adanya kontaminasi. Kontaminasi bisa disebabkan karena alat yang digunakan, lingkungan dan diri yang tidak aseptis.

Adapun pertumbuhan koloni bakteri *Salmonella* sp. pada hari ke-15 pengasinan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dapat dilihat pada Gambar cawan petri berikut.



Gambar 3: Konsentrasi 0% (A), Konsentrasi 10% (B), Konsentrasi 15% (C), Konsentrasi 20% (D)

Pertumbuhan koloni bakteri dengan variasi konsentrasi bubuk kayu manis dapat pula dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 3: Jumlah koloni bakteri dari konsentrasi bubuk kayu manis pada pengasinan 15 hari.

Pada pengasinan 15 hari penambahan kayu manis dengan konsentrasi 10%, jumlah koloni bakteri yaitu 54×10^1 % mengalami sedikit peningkatan selanjutnya konsentrasi 15% dan 20% jumlah koloni bakteri yaitu 98×10^1 dan 62×10^3 mengalami peningkatan jauh lebih besar dibandingkan konsentrasi lainnya. Peningkatan jumlah koloni pada konsentrasi 20% dapat disebabkan oleh kayu manis memiliki sifat higroskopis dan membentuk gel yang memungkinkan dapat menghambat keluarnya senyawa aktif dari kayu manis. Gel ini terbentuk dapat menyelubungi garam dengan senyawa aktif dari kayu manis sehingga mengganggu proses difusi kedalam telur.

Lisawati,dkk (2002) ,menyatakan bahwa lama penyimpanan bakteri mengalami fase logaritmik. Fase logaritmik adalah fase dimana sel akan tumbuh dan membelah diri secara eksponensial. Menurut Zulaekah dan Widianingsih (2005), pada fase logaritmik sel jasad renik membelah dengan cepat dan konstan, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti kandungan nutrient, juga kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembaban udara. Dapat juga disebabkan oleh lama penyimpanan juga ditambah lagi lama pengasinan yang lebih lama karena sebagai pembuatan konsentrasi kayu manis dan lama pengasinan ini menyebabkan jumlah koloni bakteri jauh lebih besar dibandingkan pada konsentrasi 10% dan 15%.

Menurut Ekaprasada (2009), ekstrak kulit batang kayu manis (*Cinnamomum burmannii* Nees ex Blume) dengan kandungan kadar trans-sinamaldehyd yang cukup tinggi (68,65%) menjadi sumber senyawa antioksidan dengan kemampuannya menangkap radikal bebas atau *radical scavenger*. Dari penelitian tersebut dapat terlihat bahwa minyak atsiri dan oleoresin kayu manis jenis *Cinnamomum burmannii* mempunyai aktivitas antioksidan.

Menurut Gupta *et al.*, (2008) minyak atsiri kayu manis sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri antara lain *B. cereus*, *S. aureus*, *E. coli*, *P. aeruginosa* dan *Klebsiella sp.* Penghambatan bakteri dengan minyak atsiri kayu manis ini disebabkan oleh senyawa aktif seperti sinamaldehyd dan asam sinamat. Dari penelitian tersebut dapat terlihat bahwa minyak atsiri dan oleoresin kayu manis mempunyai efek antibakteri pula.

Proses pembuatan mempengaruhi kualitas minyak atsiri dan oleoresin yang dihasilkan. Minyak atsiri kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) yang diuji dalam penelitian ini berdasarkan metode Yulianto, (2012) sedangkan oleoresin kayu manis (*Cinnamomum burmannii*) berdasarkan metode Widiyanto (2011) dan Adi (2012). Dari penelitian pendahuluan tersebut dipilih minyak atsiri dan oleoresin yang memberikan rendemen optimum disertai dengan pengujian karakteristik mutunya. Rendemen optimum minyak atsiri kayu manis menggunakan metode destilasi uap-air dengan ukuran bahan gilingan kasar (15 mesh). Oleoresin kayu manis yang digunakan terdiri dari dua jenis sampel, yaitu oleoresin dengan proses ekstraksi langsung dan oleoresin proses ekstraksi tidak langsung (destilasi-ekstraksi). Oleoresin proses ekstraksi langsung menggunakan ukuran bubuk kayu manis 30 mesh, sedangkan oleoresin kayu manis proses ekstraksi tidak langsung (destilasi-ekstraksi) dengan ukuran bubuk kayu manis 50 mesh, dan suhu maserasi serta waktu kontak yang sama untuk kedua oleoresin tersebut yaitu 55°C selama 4 jam dengan pelarut metanol dapat memberikan kondisi rendemen oleoresin yang optimum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan level penambahan bubuk kayu manis pada telur asin adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi bubuk kayu manis 15% untuk cenderung mengurangi pertumbuhan koloni *Salmonella* sp.
2. Untuk pengasinan tampaknya pertumbuhan koloni *Salmonella* sp. cenderung menurun pada hari ke-10.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penggunaan konsentrasi kayu manis 15% dengan lama pengasinan 10 hari dalam pembuatan telur asin dapat diaplikasikan untuk menurunkan pertumbuhan *Salmonella* sp.

DAFTAR PUSTAKA

- Akoso, B. T., 1993. *Manual Kesehatan Unggas*. Penerbit kanisius, Yogyakarta.
- Astawan, 1988. *Teknologi Pengolahan Hewani Tepat Guna*. CV. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Ahyari, Agus. 2002. *Pengendalian Produksi*. BPFE. Yogyakarta.
- Adi, D, N, 2012. *Produksi Oleoresin Berbahan Baku Limbah Destilasi Kayu Manis (Cinnamomum burmannii)*. Skripsi S1. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Andriyanto. A, M. Adriani dan E. Widowati, 2013. Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Manis Terhadap Kualitas Sensoris, Aktivitas Antioksidan Dan Aktivitas Antibakteri Pada Telur Asin Selama Penyimpanan Dengan Metode Penggaraman Basah. *Jurnal Taknosais Pangan*.
- Anggraini, Winiati K. 2007. *Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun The, Daun Delima, Daun Jambu Biji Dan Laam Penyimpanan Terhadap Total Mikroba Dan Kadar Proteinserta Analisis Daya Terima Telur Asin*. Skripsi. Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro. Jawa Tengah
- Abdullah, A, 1990. *Kemungkinan Perkembangan Tiga Jenis Kayu Manis di Indonesia, dalam Tanaman Industri Lainnya*. Prosiding Simposium I Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, hal.1231-1244.
- Brooks, G.F., Butel J.S and S.A Morse, 2004. *Jawetz, Melnick and Adelberg's Medical Microbiology twenty second edition Lange Medical Books/McGraw-hill*. Medical publishing division.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Data Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Tahun 2007 di Indonesia*. 2007
- Carli, K. T., C. B. Unal, V. Caner, and A. Eyigor, 2001. *Detection of Salmonella in chicken feces by a combination of tetrathionate broth enrichment, capillary PCR, and capillary gel electrophoresis*. *J. Clin. Microbiol.* 39: 1871-1876.

- Ekapersada, M. Taufik. 2009. *Isolasi Senyawa Antioksidan Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum Burmanni Nees ex Blume)*. www. Ekadarmun. Wordpress.com. diakses tanggal 29 agustus 2016.
- Fardiaz, S. 1992. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Figoni, P, 2008. *Exploring the fundamental of baking science 2nd Ed*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Gupta, Charu, Amar P. Garg, Ramesh C. Uniyal and Archana Kumari. 2008. *Antimicrobial Activity of Some Herbal Oils Againsts Common Food-borne Pathogens*. African Journal of Microbiology
- Hidayat, A, 2007. *Pengaruh Perbedaan Cara dan Lama Pemasakan Telur Asin Terhadap Sifat Organoleptik*. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Hajrawati dan M. Aswar, 2011. *Kualitas interior telur ayam ras dengan penggunaan larutan daun sirih (Piper Betle L.) sebagai bahan pengawet*. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Makassar.
- Heyndrickx, M., D. Vandekerchove, and L. D. Zutter, 2002. *Routes for Salmonella contamination of poultry meat: epidemiological study from hatchery to slaughterhouse*. Epidemiol. Infect. 129: 253–265.
- Humphrey, T. J, 2006. *Growth of Salmonella in intact shell eggs: Influence of storage temperature*. Vet. Rec. 126: 292.
- Haryoto, 1996. *Pengawetan Telur Segar*. Kanisius. Yogyakarta.
- Helmiyati, A.F dan Nurrahman, 2010. *Penuntun Praktikum Rancangan Percobaan dengan spss*. Universitas Udayana.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al Azhar*. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Irmansyah, J dan Kusnadi, 2009. *Sifat listrik telur ayam kampung selama penyimpanan*. Media Peternakan 32 (1) : 22-30.
- Julius, E.S., 1990. *Mikrobiologi Dasar*. Binapura Aksara Latar. Jakarta.
- Jacqueline, P. Y.,R. Miles and M. F, Ben 2000. *Kualitas telur*. Jasa Ekstensi Koperasi, Lembaga Ilmu Pangan dan Pertanian Universitas Florida. Gainesville.

- Leitasari, F. Y., 2012. *Pengaruh Penambahan Ekstrak Jahe (Zingiber Officinale Rosc) Varietas Emprit Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Aktivitas Antibakteri pada Telur Asin Selama Penyimpanan dengan Metode Penggaraman Basah*. Ilmu dan Teknologi Pertanian. F. Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Lisawati, Y, S. B. Sulianti dan Chairul. 2002. *Pengaruh Waktu Distilasi Dan Derajat Kehalusan (Mesh) Serbuk Kulit Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii Nees Ex Bl.) Terhadap Kadar Sinamilaldehida pada Minyak Atsirinya*. Farmasi FMIPA. Universitas Andalas. Padang
- Pettar, A., W. Q. Alali, M. A. Harrison, and L. R. Beuchat, 2011. *Survival of Salmonella in Organic and Conventional Broiler Feed as Affected by Temperature and Water Activity*. Agriculture Food and Analytical Bacteriology.
- Myint, M. S, 2004. *Epidemiology of Salmonella Contamination of Poultry meat Products: Knowledge GAPS in the Farm to Store Product*. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
- Monack D.M., D.M. Bouley and S. Falkow.,2004. *Salmonella typhimurium Persists within Macrophages in the Mesenteric Lymph Nodes of Chronically Infected Nramp1 Mice and Can Be Reactivated by IFN γ Neutralization*. *J. Exp. Med.* Volume 199, Number 2, January 19, 2004. 231–241. The Rockefeller University Press.
- Margono, T., D. Suryati dan S. Hartinah. 2000. *Pengolahan Pangan : Telur Asin*. Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. PDII-LIPI.
- Rasyaf, M, 1991. *Pengelolaan Produksi Telur –Edisi Kedua*. Penerbit Kanisius.
- Ray, B. 2001. *Fundamental Food Microbiology*. 2nd Edition. CRC Press. New York.
- Rachmawati, R, M. R. Defiani dan N. L. Suriani. 2009. *Pengaruh Suhu Dan Lama Penyimpanan Terhadap Kandungan Vitamin C Pada Cabai Rawit Putih (Capsicum frutescens)*. Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Udayana, Bali.
- Romanoff, A. L. and A. J. Romanoff. 1963. *The Avian Eggs*. John Willey and Sons. Inc, New York.

- Prasetyaningrum, 2012. *Aktivitas Antioksidan, Total Fenol, Dan Antibakteri Pada Minyak Atsiri Dan Oleoresin Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii)*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rismunandar, Paimin, F.B., 2001. *Kayu manis budidaya dan pengolahan* Edisi Revisi, Penerbit penebar swadaya, Jakarta.
- Sudarmadji, S., B. Haryono dan Suhardi, 1997. *Prosedur Analisis untuk Bahan Makanan dan Pertanian*. Edisi ketiga. Liberty, Yogyakarta.
- Sudaryani, T, 2003. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Stadellman, J. W., and O. J. Cotterill, 1995. *Egg Science and Technology*, Fourth.
- Suprapti, L. M, 2002. *Pengawetan Telur*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sarwono. B., B .A. Murtidjo dan A .Daryanto, 1985. *Telur Pengawetan dan Manfaatnya*. Seri Industri Kecil. Cetakan I. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sarwono, B, 1995. *Pengawetan dan Manfaat Telur*. PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Samosir, D.J. 1983. Ilmu Ternak Itik. PT Gramedia, Jakarta.
- Sutrisno dan Koswara. *Perbaikan proses pengasinan telur Ayam dan Telur Itik*. Bogor: Pusbangtepa-IPB, 1991.
- Sudiarto, A., Ruhnyat dan H. Muhammad, 1989. *Tanaman Kayu Manis*. Jurnal Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
- Susanti, I. 2013. *Cara Mengisolasi Mikroba Pada Telur Asin*. Sabda Mojang, Garut.
- Sutrisno, K, 1991. *Perbaikan proses pengasinan telur*. Ayam dan Telur, 63, : 35-36.
- Shihab, M,Q. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Tan, T. C., K. Kanyarat and M. E. Azhar, 2012. *Evaluation of functional properties of egg white obtained from pasteurized shell egg as ingredient in angel food cake*. International Food Research Journal, 19 (1): 303- 308.
- Titik, S, 2000. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya, Jakarta.

- Thomas, J and P.P. Duethi, 2001. *Cinnamon Handbook of Herbs and Spices*. CRC Press, New York, pp.143-153.
- Winarti, E, 2004. *Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengkajian*. BPTP, Yogyakarta.
- Wijayanti, W., Agustina., Y. Zetra, dan P. Burhan. 2009. *Minyak Atsiri Dari Kulit Batang Cinnamomum Burmannii (Kayu Manis) Dari Famili Lauraceae Sebagai Insektisida Alami, Antibakteri, Dan Antioksidan*. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. ITS. Surabaya.
- Widiyanto, Ivan. 2011. *Proses Ekstraksi Oleoresin Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) : Optimasi Rendemen dan Pengujian Karakteristik Mutu*. Skripsi S1. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Yuliarto, Fuki Tri. 2012. *Pengaruh Ukuran Bahan dan Metode Destilasi (Destilasi Air dan Destilasi Uap-Air) terhadap Kualitas Minyak Atsiri Kayu Manis (Cinnamomum burmannii)*.
- Zulaekah, S dan E.N. Widiyaningsih. 2005. *Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Teh Pada Pembuatan Telur Asin Rebus Terhadap Jumlah Bakteri Dan Daya Terimanya*. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PROSES PEMBUATAN TELUR ASIN



Bahan-bahan untuk pembuatan telur asin



Telur Itik



Proses pencampuran bahan



Pencampuran adonan



Proses pembungkus telur



Telur yang sudah dibalut adonan dan disimpan selama beberapa hari



Alat-alat yang akan di sterilisasi



Alat dan bahan



Proses pembuatan media BSA
PROSES PENGECERAN







ALAUDDIN
MAKASSAR












Pertumbuhan *Salmonella* sp. selama 7 hari pengasinan




Konsentrasi 0%



Konsentrasi 10%



Konsentrasi 15%




Konsentrasi 20%


Pertumbuhan *Salmonella* sp. selama 10 hari pengasinan




Konsentrasi 0%



Konsentrasi 10%




Konsentrasi 15%




Konsentrasi 20%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


Pertumbuhan *Salmonella* sp. selama 15 hari pengasinan




Konsentrasi 0%



Konsentrasi 10%



Konsentrasi 15%



Konsentrasi 20%

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Suci Inda Sari. Lahir di Palopo pada tanggal 17 Agustus 1995. Penulis akrab disapa “Suci” adalah anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Subur Ballah dan Darmiati. Penulis memulai pendidikan awal di SDN 161 Landondou 2000 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Ke SMP N 2 Malangke Barat tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, melalui jalur ujian UMM dan diterima pada Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan. Selama kuliah penulis aktif organisasi HMJ Ilmu peternakan periode 2013-2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR