

**BIOAKUMULASI LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA
KERANG KIJING (*Pilsbryconcha exilis*) DI SUNGAI
SADDANG KABUPATEN PINRANG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
SAMSUL BAHRI
NIM: 60500111064

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SamsulBahri
NIM : 60500111064
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 26 Oktober 1993
Jurusan/Prodi : Kimia
Fakultas/Program : SainsdanTeknologi/ S1
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Kerang Kijing
(*Pilsbryconcha exilis*) di Sungai Saddang Kabupaten
Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini bena radalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, Maret 2016
Penyusun

Samsul Bahri
NIM: 60500111064

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kijing (*Pilsbryoconcha exilis*) di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang", yang disusun oleh Samsul Bahri, NIM: 60500111064, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	()
Sekretaris	: Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd.	()
Munaqisy I	: Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.	()
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si.	()
Munaqisy III	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	()
Pembimbing I	: Syamsidar HS, S.T., M.Si.	()
Pembimbing II	: Wa Ode Rustiah, S.Si., M.Si.	()


Diketahui oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar, 
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kijing (*Pilsbryoconcha exilis*) di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari arahan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Cundu dan Ibunda Hj. Biba yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan tak lupa saya haturkan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M. Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Ibu Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Syamsidar HS, S.T.,M.Si dan Ibu Wa Ode Rustiah, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Segenap kakak laboran Ahmad Yani, S.Si, Awaluddin IP, S.Si.,M.Si, Fitria Azis, S.Si.,S.Pd, Andi Nurahma, S.Si, Ismayanti, S.Sidan Nuraini, S.Si.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin YaRobbal 'Alamin....



Samata-Gowa, Maret 2016

SAMSUL BAHRI
NIM. 60500111064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pencemaran Logam.....	7
B. Logam Timbal (Pb).....	13
C. Kerang Kijing (<i>Pilsbryoconcha exilis</i>).....	17
D. Spektrofotometer Serapan Atom (AAS).....	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	26
B. Alat dan Bahan.....	26
C. Prosedur Kerja.....	27
1. Pengambilan Sampel Air, Sedimen dan Kerang Kijing.....	27
2. Preparasi Sampel.....	27
3. Pembuatan Larutan Baku Logam Timbal (Pb) 100 mg/L.....	30
4. Pembuatan Larutan Baku Logam Timbal (Pb) 10 mg/L.....	30

5. Pembuatan Larutan Standar Timbal (Pb)	30
--	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.....	31
B. Pembahasan	32
1. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada kerang Kijing (<i>Pilsbryconcha exilis</i>).....	33
2. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada air.....	34
3. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada sedimen.....	35
4. Faktor Bioakumulasi	39


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kandungan zat gizi.....	18
Tabel 2. Kadar Logam Timbal (Pb) pada kerang.....	31
Tabel 3. Kadar Logam Timbal (Pb) pada air	32
Tabel 4. Kadar Logam Timbal (Pb) pada sedimen	32
Tabel 4. Indeks Faktor Biokonsentrasi	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logam Timbal (Pb)	14
Gambar 2. Kerang Kijing (<i>Pilsbryconcha exilis</i>).....	20
Gambar 3. Anatomi Kerang Kijing (<i>Pilsbryconcha exilis</i>).....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian	46
Lampiran 2. Kerang Kijing	47
Lampiran 3. Sampel Sedimen	48
Lampiran 4. Sampel Air	49
Lampiran 5. Pembuatan Larutan Induk	50
Lampiran 6. Pembuatan Larutan Standar	51
Lampiran 7. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus, Konsentrasi dan Nilai Regresi Pada Timbal (Pb)	52
Lampiran 8. Tabel Absorbansi dan Grafik Absorbansi larutan standar	63
Lampiran 9. Perhitungan Faktor Bioakumulasi Kerang Kijing (<i>Pilsbryoconcha exilis</i>)	64
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian	66

ABSTRAK

Nama : SamsulBahri

NIM : 60500111064

Judul :Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*) di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam Pb pada air sungai, sedimen dan kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) di sungai Saddang Kabupaten Pinrang serta mengetahui nilai faktor bioakumulasi logam berat Pb pada kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom (SSA) untuk mengetahui kadar logam berat dari setiap sampel. Parameter yang diamati yaitu uji kimia dengan menghitung kadar Pb. Perlakuan pada saat proses destruksi dilakukan dengan destruksi basah untuk sampel air dan sedimen serta destruksi kering untuk sampel kerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai faktor bioakumulasi pada titik A1 untuk BCF_{0-w} yaitu 34,6957387 dan BCF_{0-s} yaitu 0,12255682 dan nilai faktor bioakumulasi pada titik A2 untuk BCF_{0-w} yaitu 260,129768 dan BCF_{0-s} yaitu 1,203554. Sedangkan nilai faktor bioakumulasi pada titik B1 untuk BCF_{0-w} yaitu 12,4576416 dan BCF_{0-s} yaitu 0,11235126 dan nilai faktor bioakumulasi pada titik B2 untuk BCF_{0-w} yaitu 20,7711092 dan BCF_{0-s} yaitu 0,15841224.

*Kata Kunci: Bioakumulasi, kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*), logam Pb.*

ABSTRACT

Name : SamsulBahri

NIM : 60500111064

Title : Bioaccumulation Heavy Metal Lead (Pb) In Mollusk gravestone (Pilsbryconcha exilis) in riverSaddangPinrang

This study aims to determine the levels of Pb in river water, sediments and shellfish gravestone (*PilsbryconchaExilis*) on the river SaddangPinrang and to know the value of heavy metals Pb bioaccumulation factor in barnacle shells (*PilsbryconchaExilis*). The method used in this research is by using an atomic absorption spectrophotometer (AAS) to determine levels of heavy metals from each sample. Parameters observed that a chemical test to calculate the levels of Pb. Treatment during the destruction process is done with wet digestion for samples of water and sediments as well as the destruction dry to sample shellfish. The results showed that the bioaccumulation factor at the point A1 to BC_{Fo-w} is 34.6957387 and BC_{Fo-s} is 0.12255682 and bioaccumulation factor value at the point A2 to BC_{Fo-w} is 260.129768 and BC_{Fo-s} is 1.203554. While the value of the bioaccumulation factor at the point B1 to BC_{Fo-w} is 12.4576416 and BC_{Fo-s} is 0.11235126 and bioaccumulation factor value at point B2 to BC_{Fo-w} is 20.7711092 and BC_{Fo-s} is 0.15841224.

Keynote: Biocccumulation, Pilsbryconchaexilis, metal lead.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sumber air yang memiliki kualitas yang baik semakin berkurang dengan bertambahnya manusia dan industri, sehingga bertambah banyak digunakan air sungai yang sebenarnya telah tercemar oleh limbah industri maupun buangan air kotor dari rumah-rumah penduduk.¹Salah satu sungainya yaitu sungai Saddang.Sungai Saddang merupakan sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang sebelah utara dari kota kabupaten Pinrang dimana manfaat dari sungai ini merupakan sebagai keperluan pertambakan yang terdapat di daerah hilir. Sungai Saddang berada dibabana yang terletak di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Sungai Saddang merupakan salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Sulawesi selatan sehingga buangan dari industri rumahan dan limbah rumah tangga yang melalui daerah tersebut akan mencemari pada aliran sungai Saddang

Pencemaran sungai Saddang selain berasal dari industri dan limbah rumah tangga juga berasal dari aktivitas kendaraan bermotor yang merupakanjalur Trans Sulawesi buangan/polusi dari kendaraan bermotor yang terus menerus dapat mencemari sungai Saddang tersebut, terutamaekosistem yang terdapat di sungai.

¹Nyoman Wijana, *Ilmu Lingkungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 229

Ekosistem yang terdapat di dalam sungai biasanya seperti ikan, udang, kepiting dan juga kerang-kerangan.

Kerang mendapatkan makanannya dengan menyaring makanan yang berupa mikroalga, bahan organik dan partikel lain yang terdapat dalam perairan. Namun akhir akhir ini kondisi perairan pesisir semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya buangan ke dalam perairan yang mengandung logam berat seperti logam Pb. Logam berat yang terakumulasi dalam kerang pada umumnya berasal dari air, sedimen, padatan tersuspensi dan fitoplankton. Menurut Yenni dan Murtini (2005) kerang merupakan biota yang paling potensial terkontaminasi logam berat karena sifatnya yang filter feeder sehingga biota ini sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada organisme laut.²

Sehubungan hal diatas, penjelasan tentang hewan yang diciptakan dari air terdapat dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS.An-Nur:45)³

²Chrisna Adhi Suryono. "Bioakumulasi Logam Berat Melalui Sistem Jaringan Makanan dan Lingkungan pada Kerang Bulu Anadara inflata". Ilmu Kelautan 11, no. 1. (2006): h. 19-22

³Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta:Qibla, 2014), h. 306

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dengan kehendaknya dia menciptakan semua jenis hewan dari asal yang sama yaitu air. Maka tidak satupun hewan yang tidak memerlukan air. Kemudian di jadikanlah hewan-hewan itu bervariasi dari segi jenis, potensi dan perbedaan-perbedaan lainnya. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan diatas perutnya seperti ikan dan binatang yang merangkak lainnya. Allah menciptakan makhluk yang dikehendaknya dengan cara bagaimanapun untuk menunjukkan kekuasaan dan pengetahuan-nya. Dia adalah zat yang berkehendak memilih dan mahakuasa atas segala sesuatu.⁴

Kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) termasuk jenis kerang air tawar. Kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) banyak terdapat di daerah perairan sungai Saddang yang terdapat di Babana kecamatan Duampanua. Kerang Kijing telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Paria dan Maroneng sebagai makanan alternatif selain dari kerang kerangan yang terdapat di laut. Kerang sangat merugikan apabila masyarakat setempat tidak mengetahui pencemaran pada kerang tersebut yang biasanya menyerap logam berat pada perairan. Salah satu logam tersebut adalah logam timbal (Pb).

Timbal (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan karena dampaknya sebagian orang akibat keracunan makanan atau

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.372.

udarayang terkontaminasi Pb memiliki sifat toksik berbahaya⁵. Logam berat ini selain mempengaruhi kualitas air sehingga kondisi lingkungan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya juga akan berpengaruh pada sumber daya hayati perairan, karena sifat logam berat yang akumulatif pada tubuh biota. Menurut Darmono (1995) dalam Aryo Sarjono menyatakan akumulatif terjadi karena adanya proses absorpsi logam berat yang masuk kedalam tubuh melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Proses ini semakin lama menyebabkan peningkatan logam berat dalam jaringan tubuh perairan dan dapat menyebabkan kematian organisme tersebut. Adanya logam berat di perairan sangat berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan biota perairan, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam yang sulit terdegradasi sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit dihilangkan, dapat terakumulasi dalam biota perairan termasuk kerang.⁶

Dari penelitian yang dilakukan oleh Destia Ayu Kusuma Wardani dalam jurnal “Akumulasi logam berat timbal pada daging kerang hijau di muara sungai banjir kanal barat Semarang” menyimpulkan bahwa logam berat Timbal (Pb) pada daging kerang hijau yang hidup di muara sungai banjir kanal barat Semarang masih dikatakan dibawah ambang batas yang di tetapkan oleh SNI No. 7387 tahun 2009.

⁵Alfa Yusuf Retyoadhi, dkk. “Kajian Cemaran Logam Timbal (Pb), Total Mikroba dan E. Coli Pada Kerang Darah Segar di Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Teknologi Pertanian* 6, no. 3 (2005): h. 203

⁶Aryo Sarjono. “Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara”, *Skripsi*(Bogor: IPB, 2009), h. 2

Kerang hijau yang hidup di muara tersebut, tidak layak untuk dikonsumsi karena bersifat akumulatif sehingga berpotensi mengganggu kesehatan.

B. Rumusan masalah

1. Berapa konsentrasi logam Pb pada kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*) sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu?
2. Berapa konsentrasi logam Pb pada air sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu?
3. Berapa konsentrasi logam Pb pada sedimen sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu?
4. Berapa nilai faktor bioakumulasi logam berat Pb pada kerang kijing (*Pisbryconcha exilis*)?

C. Tujuan Percobaan

1. Untuk mengetahui konsentrasi logam Pb kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*) sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu.
2. Untuk mengetahui konsentrasi logam Pb pada air sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu.
3. Untuk mengetahui konsentrasi logam Pb pada sedimen sungai Saddang di kabupaten Pinrang pada titik tertentu.
4. Untuk mengetahui nilai faktor bioakumulasi logam berat Pb pada kerang kijing (*Pisbryconcha exilis*)?

D. Manfaat Percobaan

Dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkhususnya pada kawasan di sungai Saddang KabupatenPinrang bahwa kerang mempunyai manfaat tetapi terdapat juga logamPb yang berbahaya apabila terakumulasi di dalam tubuh dan dapat mengganggu kondisi pencernaan pada tubuh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencemaran Logam

Dengan meningkatnya perkembangan sektor industri dan transportasi baik industry minyak maupun gas bumi, pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa dan aktivitas manusia lainnya, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan, udara dan tanah akibat berbagai kegiatan tersebut. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan semakin berat dan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pencemaran air
2. Pencemaran udara
3. Pencemaran tanah

Polusi air atau pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari normal, bukan dari kemurniannya.⁷

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang lebih buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan

⁷Khaina Rinda Fitriyah. "Studi Pencemaran Logam Berat Kadmium (Cd), Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada Air Laut, Sedimen dan Kerang Bulu (*Anadara antiquate*) di Perairan Pantai Lekok Pasuruan". *Skripsi*. h. 13

pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun atau toksik yang berbahaya bagi organisme. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.⁸

Asap kendaraan bermotor bias mengeluarkan partikel Pb yang kemudian bias mencemari udara, tanaman disekitar jalan raya dan mencemari makanan yang diujakan di pinggir jalan. Asap bias juga terserap oleh manusia secara langsung melalui pernapasan atau kulit. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kontainasi Pb dalam lingkungan adalah pemakaian bensin bertimbal yang masih tinggi di Indonesia.⁹

Adanya logam berat di dalam perairan berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat sifat logam berat yaitu sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (dihilangkan) yang akan membahayakan kesehatan manusia yang mengomsumsi organisme tersebut.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain

⁸Khaina Rinda Fitriyah. "Studi Pencemaran Logam Berat Kadmium (Cd), Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada Air Laut, Sedimen dan Kerang Bulu (*Anadara antiquate*) di Perairan Pantai Lekok Pasuruan". *Skripsi*. (Malang: UIN Malang, 2007). h. 12

⁹ Wahyu Widowati, dkk., *Efek Toksik Logam* (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 111-112

¹⁰Amriani, "Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan seng (Zn) pada Kerang Darah (*Anadara granosa. L*) dan Kerang Bakau (*Polymesoda bengalensis. L*) di Perairan Teluk Kendari" *Tesis*, (2011), h. 2

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Odum (1996) dalam Aryo Sarjono menyatakan pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan, kondisi kehidupan dan proses industri.¹¹ Mengacu pada nilai ambang batas (NAB) berdasarkan yang ditetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dengan batas kandungan logam untuk timbal (Pb) tidak boleh melebihi 0,03 mg/L dan 0,01 mg/L pada suatu perairan.¹²

Senyawa logam berat biasanya terdapat dalam limbah industri. Keberadaan logam berat di perairan berasal dari berbagai sumber, antara lain dari kegiatan pertambangan, rumah tangga, limbah pertanian dan buangan limbah industri. Dari keempat jenis limbah tersebut, limbah yang umumnya paling banyak mengandung logam berat adalah limbah industri hal ini disebabkan senyawa logam berat sering digunakan dalam industri, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun sebagai katalis.¹³

¹¹Aryo Sarjono. "Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 18

¹²Arief Happy R, dkk. "Distribusi Kandungan Logam Berat Pb dan Cd pada Kolom Air dan Sedimen Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu". *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3, no. 3. (2012): 176

¹³Endang Rochyatun, dkk, "Distribusi Logam Berat dalam Air dan Sedimen di Perairan Muara Sungai Cisadane", *Makara Sains*, Vol.10. no. 1. (2006), h. 35-36.

Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan khususnya perairan. Beberapa industri yang dapat memberikan kontribusi limbah pada lingkungan antara lain industri pengecoran, pertambangan, konduktor listrik, baterai, bahan bakar, percetakan, farmasi dan pertanian.¹⁴

Tingginya jumlah limbah industri yang dihasilkan per unit hasil industri merupakan salah satu penyebab utama pencemaran. Beberapa kawasan di Asia Pasifik malah menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena struktur industri yang dipakai hanya untuk mengejar keuntungan dan terlambat memasuki industrialisasi yang memungkinkan negara-negara tersebut menggunakan proses produksi yang telah disempurnakan dengan teknologi yang mutakhir sehingga dalam pengoperasiannya ramah lingkungan.¹⁵

Darmono (1995) dalam Sarjono mengklasifikasikan sumber pencemaran logam berdasarkan lokasinya :

1. Pada perairan estuaria, pencemaran memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan logam oleh manusia

¹⁴Mufidah Fitriati, "Bioakumulasi Logam Raksa (Hg), Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna viridis*) yang Dibudidayakan di Perairan Pesisir Kamal dan Cilincing Jakarta", *Skripsi*, h. 23

¹⁵Markus T. Laasut. "Metallothionin : Suatu Parameter Kunci yang Penting Dalam Penetapan Baku Mutu Air Laut (BMAL) Indonesia". *Ekoton* 2, No. 1. (2002), h. 61-68

2. Pada perairan laut lepas kontaminasi logam berat biasanya terjadi secara langsung dari atmosfer atau karena tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker yang melaluinya
3. Pada perairan sekitar pantai kontaminasi logam kebanyakan berasal dari mulut sungai yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri atau pertambangan.¹⁶

Adanya pembuangan limbah industri diduga dapat mencemari lingkungan perairan dan organisme dan organisme yang hidup di dalamnya. Terjadinya kontaminasi zat beracun pada organisme perairan dapat melalui 3 cara, yaitu:

1. Melalui permukaan organisme
2. Melalui respirasi atau ingesti dari air
3. Melalui pengambilan makanan (*Zooplankton dan Phitoplankton*) yang mengandung bahan pencemar kimia.

Zat beracun yang mencemari perairan salah satunya dari logam berat yaitu timbal (Pb) jika keberadaannya melebihi ambang batas yang diperbolehkan dapat membahayakan lingkungan, termasuk manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya akumulasi logam berat dapat menyebabkan kerusakan terhadap organ respirasi dan dapat juga menyebabkan timbulnya kanker pada manusia.¹⁷

¹⁶Aryo Sarjono. "Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 19

¹⁷Nanik Heru Suprapti. "Kandungan Chromium pada perairan, Sedimen dan Kerang Darah (*Anadar granosa*) di wialayah Pantai Sekitar Muara Sungai Sayung Desa Morosari Kabupaten Demak, Jawa Tengan". *Bioma* 10, No. 2 (2008): h. 36

Ada tiga mekanisme yang menyebabkan terkontaminasinya logam berat ke dalam jaringan tubuh kerang yaitu melalui makanannya berupa zooplankton yang telah terkontaminasi dengan logam berat, melalui pemanfaatan jarring-jaring lender untuk menangkap makanannya dalam hal ini yang terperangkap bukan hanya zooplankton tetapi juga sedimen, yang selanjutnya ikut tercerna di dalam tubuh kerang dan merupakan mekanisme yang paling penting, yaitu dengan mendorong atau menekan “mesenterial filament” untuk mengambil logam-logam berat yang terikat pada sedimen secara langsung. Terkontaminasinya logam berat pada rangka kerang ada beberapa mekanismenya, antara lain yaitu substitusi unsur kalsium oleh logam-logam tertentu, serpihan bahan-bahan organik yang mengandung logam berat yang masuk ke ruang pori-pori kerangka.¹⁸

Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup, walaupun diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui beberapa perantara, seperti udara, makanan maupun air yang terkontaminasi logam berat. Logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasi. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia.¹⁹

¹⁸Haryanto Kadir. “Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada Kerang Lunak *sinularia polydactyla* di Perairan Pulau LaeLae, Pulau Bonebatang dan Pulau Badi”.*Skripsi*(Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS, 2013), h. 7

¹⁹Yayat Dhahiyat, “ Bioakumulasi Logam Berat timbal (Pb) dan cadmium (Cd) pada Daging Ikan yang Tertangkap di Sungai Citarum Hulu” *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, vol.3 no. 4. (2012), h. 262

Faktor biokonsentrasi atau bioakumulasi dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan makhluk hidup dalam menyerap dan menyimpan suatu bahan pencemar. Biokonsentrasi dapat dilihat sebagai proses kesetimbangan yang ditentukan jumlah pengambilan (biosorpsi) dan pelepasan (eksresi) suatu senyawa oleh sel makhluk hidup di lingkungannya. Proses pemindahan antara fase-fase di lingkungan dengan sel makhluk hidup. Jumlah pengambilan senyawa ditentukan kemampuan absorpsi. Sehingga jumlah senyawa yang diekskresikan menentukan konsentrasi senyawa tersebut pada sel. Senyawa dapat ditimbun dalam sel, dapat pula diubah atau didegradasi apabila sel mampu. Penimbunan senyawa persisten maupun logam berat umumnya terjadi karena sifat lipofilik dari senyawa tersebut dalam proses absorpsi oleh sel juga melalui membran.²⁰

B. Logam Timbal (Pb)

Logam adalah unsur yang dapat diperoleh dari lautan, erosi batuan tambang dan vulkanisme. Proses alam seperti perubahan siklus alami mengakibatkan batuan-batuan dan gunung berapi memberikan kontribusi yang sangat besar ke lingkungan. Selain itu masuknya logam berat juga berasal dari aktivitas manusia, seperti pertambangan minyak, emas dan batu bara, pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam dan pabrik-pabrik pupuk serta kegiatan industri lainnya. Logam berat adalah unsur yang memiliki berat lebih besar dari 4 atau 5 dengan

²⁰Haryanto Kadir. "Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada Kerang Lunak *sinularia polydactyla* di Perairan Pulau LaeLae, Pulau Bonebatang dan Pulau Badi". *Skripsi*, h. 7-8

jumlah atom 22-34 dan 40-52, serta unsur antinida dan aklinida, serta memiliki pengaruh biokimiawi di dalam hewan ataupun tumbuhan. Beberapa logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan terutama adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), kromium (Cr) dan nikel (Ni). Di alam logam sangat jarang di temukan dalam elemen tunggal, biasanya dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain.²¹

Logam dan mineral lainnya hampir selalu di temukan dalam air tawar dan air laut, walaupun jumlahnya sangat terbatas. Logam berat yang masuk ke dalam perairan akan mencemari laut. Keberadaan logam berat dalam perairan akan sulit mengalami degradasi bahkan logam tersebut akan diadsorpsi dalam tubuh organisme padahal logam berat seperti Pb termasuk logam berat yang sangat berbahaya.²²

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat beracun dan berbahaya yang banyak ditemukan sebagai pencemar dan cenderung mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan. Adanya Pb yang masuk ke dalam ekosistem dapat menjadi sumber pencemar dan dapat mempengaruhi biota perairan. Pb yang masuk ke dalam perairan dapat berasal dari limbah buangan industri kimia, percetakan dan industri yang menghasilkan logam dan cat.²³

²¹Aryo Sarjono. "Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 20-21

²²Aryalan Ginting, dkk. "Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Air, Sedimen dan kerang Darah di pantai Belawan Provinsi Sumatera Utara". *USU* (Sumatera: 2013), h. 24

²³Sumah Yulaipi, "Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Hubungannya dengan Laju Pertumbuhan Ikan Mujair (*Oreochromis mosambicus*)," *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, Vol.2 No.2. (2013): h. 166



Gambar 2.1. Logam Pb

Logam Pb merupakan logam non esensial yang sifatnya sangat toksik, sehingga apabila logam ini masuk ke dalam tubuh dapat mengganggu fungsi enzimatik dan fungsi regenerasi seluler. Pemanfaatan logam timbal dalam perindustrian sangat banyak, bahkan sebagai bahan bakar mesin motor kapal yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan, sehingga tidak menutup kemungkinan logam ini dapat masuk ke perairan melalui sumber alamiah ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia.²⁴

Sifat toksik dan sifat terurainya suatu logam berat dalam perairan ditentukan oleh karakteristik fisik dan kimia suatu jenis logam berat dan ditentukan juga oleh faktor lingkungan. Lingkungan atau ekosistem laut yang mengalami gangguan kesetimbangan akibat polutan, dapat bersifat tetap atau sementara bergantung pada faktor-faktor berikut :²⁵

1. Kemantapan ekosistem (*constancy*) ; terkait dengan kecilnya pengaruh perubahan.

²⁴Destia Ayu Kusuma Wardani, dkk. “Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Daging Kerang Hijau (*Perna viridis*) di Muara Sungai Banjir Kanal Barat Semarang”. *Unnes J Life Sci* 3, no. 1. (2014): h. 1

²⁵Aryo Sarjono. “Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara”, *Skripsi* , h. 23

2. Persistensi ekosistem (*persistent*); terkait dengan lamanya untuk kelangsungan proses-proses normal ekosistem.
3. Kelembaman ekosistem (*innertia*); terkait dengan kemampuan bertahan terhadap gangguan eksternal.
4. Elastisitas ekosistem (*elasticity*); terkait dengan kekenyalan ekosistem untuk kembali ke keadaan semula setelah mengalami gangguan.
5. Amplitudo ekosistem (*amplitude*); terkait dengan besarnya skala gangguan yang masih memungkinkan adanya daya pulih.

Logam berat diketahui dapat mengumpul di dalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu lama sebagai racun yang terakumulasi. Kondisi perairan yang terkontaminasi oleh berbagai macam logam akan berpengaruh nyata terhadap ekosistem perairan baik perairan darat maupun perairan laut. Pb merupakan logam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sehingga logam ini juga menimbulkan dampak kontaminasi terhadap lingkungan.²⁶

Sifat-sifat timbal menurut Darmono dalam Aryo Sarjono antara lain:²⁷

1. Memiliki titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam bentuk cair hanya membutuhkan teknik yang cukup sederhana dan tidak mahal

²⁶E. Wulandari, dkk. "Kandungan Logam Berat Pb pada Air Laut dan Tiram *Saccostrea glomerata* Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur". *Jurnal Penelitian Perikanan* 1, no. 1 (2012): 10-14

²⁷Aryo Sarjono. "Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 26

2. Merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah menjadi berbagai bentuk
3. Timbal dapat membentuk logam campuran dengan logam lainnya dan logam yang terbentuk yang mempunyai sifat yang berbeda dengan timbal murni
4. Memiliki densitas yang tinggi dibanding logam yang lain kecuali emas dan merkuri, yaitu $11,34 \text{ gr/cm}^3$.

Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun, dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem biologis. Timbal adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan pada proses pertambangan, logam ini berbentuk sulfida logam (PbS) yang sering disebut *galena*. Di perairan alami timbal bersumber dari batuan kapur dan *galena*.²⁸

C. Kerang Kijing (*Pilsbryoconcha exilis*)

Bivalvia atau lebih banyak dikenal dengan nama kelompok kerang-kerangan banyak terdapat di perairan laut Indonesia. Disebut *Bivalvia* karena jenis binatang ini mempunyai 2 valve atau cangkang yang pada umumnya simetris. Jenis ini biasanya banyak dijumpai di daerah-daerah muara, perairan pantai dan juga ekosistem terumbu karang. Jenis-jenis kerang yang hidup di terumbu karang antara lain kerang hijau

²⁸Aryo Sarjono. "Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 26

(*perna viridis*), kerang darah (*anadara granosa*), tiram(*crassostrea spp*), serimping (*amuseum pleuronectes*) simping (*placuna placenta*).²⁹

Pemanfaatankerang-kerangan sebagai bahan makanan sudah dilakukan sejak lama, terutama bagi nelayan dan masyarakat yang hidup di tepi pantai. Masyarakat cenderung hanya mengambil atau memanen kerang-kerangan ini tanpa melakukan usaha-usaha untuk budidayanya. Di beberapa tempat kerang telah mengalami penurunan populasi secara drastis.³⁰

Kerang pada ekosistem perairan tawar biasa disebut kijing. Daging kijing (*Pilsbryconcha exilis*) mengandung asam lemak tak jenuh *eicosapentaenoic acid* (EPA) dan *docosahexaenoic* (DHA) yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Daging kijing juga mengandung protein hewani yang kaya akan asam amino esensial (arginin, leusin dan lisin).³¹

Menurut Suhardjo dalam Skripsi Purwati Ningsih (2009) kijing kaya akan asam amino esensial terutama leusin dan lisin. Kandungan zat gizi dari kijing dengan ukuran panjang kurang dari 9 cm yang berasal dari Cibalagung dan kebun Raya Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai beriku

Tabel 2.1. Kandungan Zat gizi per 100 g

Zat Gizi	Cibalagung	Kebun Raya
-----------------	-------------------	-------------------

²⁹Universitas Gajah Mada. *Teknik Budiadaya Bivalvia*.(Jogjakarta), h. 1

³⁰Universitas Gajah Mada. *Teknik Budiadaya Bivalvia*.(Jogjakarta), h. 1

³¹Purwati Ningsih, “Karakteristik Protein dan Asam Amino Kijing Lokal (*Pilsbryconcha exilix*) Dari Situ Gede Bogor Akibat Proses Pengukusan”, *Skripsi*. Bogor: IPB, (2009), h.1

Air (g)	87	85,1
Abu (g)	1,6	1,51
Lemak (g)	0,78	0,64
Protein (g)	7,37	7,31
Karbohidrat (g)	3,3	5,5
Kalsium (mg)	366	374
Fosfor (mg)	308	261
Besi (mg)	31,02	35,85
Vitamin A (µg)	115	112
Karoten (µg)	877	898
Vitamin B1 (µg)	100	70
Vitamin C (µg)	0	0
Kalori (kkal)	50	57
Bdd (%)	50	50

Pilsbryconcha exilis termasuk ke dalam filum moluska. Ciri umum dari filum ini mempunyai bentuk tubuh bilateral atau simetri, tidak beruas-ruas, tubuh lunak dan ditutupi mantel yang menghasilkan zat kapur, bentuk kepala jelas, tubuhnya berbentuk pipih secara lateral dan memiliki dua cangkang (valve) berengsel dorsal yang menutupi seluruh tubuh membuatnya termasuk kedalam kelas *pelecypoda*. Famili unionidae pada umumnya banyak ditemukan di kolam-kolam, danau, sungai, situ, atau perairan tawar lainnya.³²

Klasifikasi kijing lokal (*Pilsbryconcha exilis*)

Kingdom	: Animalia
Zubkingdom	: Metazoa
Filum	: Moluska
Kelas	: Pelecypoda (Bivalvia)
Ordo	: Eulamellibranchiata
Subordo	: Integripallia
Famili	: Unionidae
Genus	: <i>Pilsbryconcha</i>
Spesies	: <i>Pilsbryconcha exilis</i> Lea

³²Rodieiser Sembiring, “Analisis Kandungan Logam Berat Hg, Cd dan Pb Daging Kijing Lokal (*Pilsbryconcha exilis*) Dari Perairan Situ Gede, Bogor”, *Skripsi* (Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2009), h. 3



Gambar 2.2. Kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*)

Kijing terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu mantel, insang dan organ dalam. Mantel menggantung diseluruh tubuh dan membentuk lembaran yang luas di jaringan yang berada di bawah cangkang. Tepi mantel menghasilkan tiga lipatan yaitu dalam, tengah dan luar. Otot radial dan sirkular terdapat pada lapisan dalam, lapisan tengah berfungsi sebagai sensori, dan lapisan luar terdapat cangkang. Seluruh permukaan mantel mensekresi zat kapur.³³

Secara umum kerang atau tiram termasuk pada binatang yang *filter feeder* atau bahkan *non selektif filter feeder* (makan dengan cara menyaring tanpa pilih-pilih). Jika dilihat dan jenis makanannya maka kerang dikelompokkan menjadi kerang pemakan suspensi (*suspension feeder*) dan kerang pemakan endapan (*deposite feeder*). Contoh kerang *suspension feeder* yaitu kerang hijau, kerang mutiara, serimping, tiram dan kimah. Contoh kerang yang *deposite feeder* yaitu kerang tahu dan simping. Dengan cara makan seperti ini maka keram atau tiram akan sangat peka terhadap polutan yang ada diperairan, sehingga menempatkan kerang sebagai indikator biologis

³³Rodieiser Sembiring, "Analisis Kandungan Logam Berat Hg, Cd dan Pb Daging Kijing Lokal (*Pilsbryconcha exilis*) Dari Perairan Situ Gede, Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2009), h. 3

untuk pencemaran perairan. Keram atau tiram ini juga digunakan oleh para petambak untuk pengolahan kualitas air, khususnya untuk mengurangi partikel tersuspensi atau endapan organik di dalam petakan tambaknya. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387: 2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan menyatakan bahwa untuk kategori kekerangan (Bivalve) memiliki ambang batas maksimum yaitu sebesar 1,5 mg/kg³⁴


Menurut Pagoray (2001) dalam Herry V silalahi bahwa pertimbangan penggunaan kerang sebagai indikator biologis adalah karena jenis tersebut hidup menetap (*sessile*), organisme penyaring makanan (*filter feeder*) dan mempunyai sifat mengakumulasi bahan-bahan pencemar seperti pestisida, hidorkarbon, logam berat dan lain-lain kedalam jaringan tubuh.³⁵

Kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*) termasuk kerang yang berkelamin ganda (hermaphrodit). Proses pembuahan terjadi apabila kijing betina mengeluarkan sel telur ke ruang suprabrachial dan kijing jantan yang berada di sekitarnya mengeluarkan sperma melalui dorsal sifon. Aliran sperma tersebut masuk ke dalam insang kijing betina melalui ventral sifon, pembuahan terjadi di dalam insang.³⁶ Anatomi Kijing dapat dilihat pada gambar 2.3

³⁴Universitas Gajah Mada. *Teknik Budidaya Bivalvia*.(Jogjakarta), h. 3

³⁵Herry V Silalahi, dkk. “Analisis Kandungan Logam Berat Pb, Cu dan Zn pada Daging dan Cangkang Kerang kepah di Perairan Bagan Asahan Kecamatan tanjung Balai Asahan”. *UNSRI* (2014). h. 2

³⁶Purwati Ningsih, “Karakteristik Protein dan Asam Amino Kijing Lokal (*Pilsbryconcha exilis*) Dari Situ Gede Bogor Akibat Proses Pengukusan”, *Skripsi*. Bogor: IPB, h.1



Gambar 2.3. Anatomi Kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*)

Kerang mendapatkan makanannya dengan menyaring makanan yang berupa mikroalga, bahan organik dan partikel lain yang terdapat dalam perairan. Namun akhir akhir ini kondisi perairan pesisir semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya buangan ke dalam perairan yang mengandung logam berat seperti logam Pb. Logam berat yang terakumulasi dalam kerang pada umumnya berasal dari air, sedimen, padatan tersuspensi dan fitoplankton. Menurut Yenni dan Murtini (2005) dalam Chrisna Adhi Suryono menyatakan kerang sebagai biota yang paling potensial terkontaminasi logam berat karena sifatnya yang filter feeder sehingga biota ini sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada organisme laut.³⁷

D. Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)

Metode spektrofotometer serapan atom (SSA) berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu,

³⁷Chrisna Adhi Suryono. "Bioakumulasi Logam Berat Melalui Sistem Jaringan Makanan dan Lingkungan pada Kerang Bulu Anadara inflata". *Ilmu Kelautan* 11, no. 1. (2006): h. 19-22

tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan natrium menyerap pada 589 nm, uranium pada 358,5 nm, sedang kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi, berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Tingkat-tingkat eksitasinya pun bermacam-macam. Spektrum atomik untuk masing-masing unsur terdiri atas garis-garis resonansi. Garis-garis lain yang bukan garis resonansi dapat berupa spektrum yang berasosiasi dengan tingkat energi molekul, biasanya berupa pita-pita lebar ataupun garis tidak berasal dari eksitasi tingkat dasar yang disebabkan proses atomisasinya.³⁸

Logam-logam yang mudah diuapkan seperti tembaga (Cu), timbal (Pb), seng (Zn) dan cadmium (Cd), umumnya ditentukan pada suhu rendah sedangkan untuk unsur-unsur yang tidak mudah diatomisasi diperlukan suhu tinggi. Suhu tinggi dapat dicapai dengan menggunakan suatu oksidator bersama dengan gas pembakar, contohnya atomisasi aluminium (Al), titanium (Ti) dan berilium (Be). Atomisasi sempurna sampai saat ini sulit dicapai, meskipun sudah banyak kombinasi bermacam gas. Belakangan ini ada kecenderungan untuk menggunakan tungku grafit yang mudah dalam beberapa detik dapat mencapai temperatur 2000°K-3000°K.³⁹

Ditinjau dari hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, maka hukum Lambert Beer dapat digunakan jika sumbernya adalah monokromatis. Pada

³⁸S.M. Khopkar, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 288.

³⁹S.M. Khopkar, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, h. 290.

spektrofotometer serapan atom (SSA), panjang gelombang garis absorpsi resonansi identik dengan garis-garis emisi disebabkan keserasian transisinya. Untuk bekerja pada panjang gelombang ini diperlukan suatu monokromator celah yang menghasilkan lebar puncak sekitar 0,002-0,005 nm. Jelas pada teknik spektrofotometer serapan atom (SSA), diperlukan sumber radiasi yang mengemisikan sinar pada panjang gelombang yang tepat sama pada proses absorpsinya.⁴⁰

Spektrofotometer serapan atom (SSA) memiliki beberapa komponen, yaitu sumber sinar, tempat sampel, monokromator, detektor dan readout. Sumber sinar yang lazim dipakai dalam spektrofotometer serapan atom adalah lampu katoda berongga (*hollow cathode lamp*). Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (10-15 torr). Neon biasanya lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih rendah. Salah satu kelemahan penggunaan lampu katoda berongga adalah satu lampu digunakan untuk satu unsur saja.⁴¹

Analisis dengan spektrofotometer serapan atom (SSA), sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan asas.

⁴⁰S.M. Khopkar, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, h. 290.

⁴¹Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 305-306.

Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom yaitu: dengan nyala (*flame*) dan dengan tanpa nyala (*flameless*).⁴²

Monokromator dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinu yang disebut *chopper*. Sedangkan detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (*photomultiplier tube*). Komponen SSA yang lain adalah *readout*. *Readout* merupakan suatu alat petunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah dikalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau absorbansi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu *recorder* yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi.⁴³



⁴²Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*, h. 306.

⁴³Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*, h. 311-312.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai Januari 2016. di Laboratorium Kimia Anorganik dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS), tanur, *hot plate* (alat pemanas), lampu katoda Pb, oven, desikator, tabung reaksi, gelas ukur, gelas piala, labu ukur, neraca analitik, pipet volume, pipet ukur, corong, botol semprot, cawan porselin, batang pengaduk dan bulp.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam nitrat (HNO_3) pekat, asam perklorat (HClO_4), aquades (digunakan dalam proses pengenceran), aquabides (digunakan dalam proses destruksi/penghancuran), aluminium foil, botol polyetilen, larutan standar Timbal (Pb), kertas whatman no. 42, kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*), larutan standar Timbal (Pb), sampel air sungai dan sampel sedimen sungai.

C. Prosedur Kerja

1. Pengambilan sampel air, sedimen dan kerang kijing (*Pilsbryoconcha exilis*)

a. Sampel air

Pengambilan air sungai diambil pada setiap lokasi pengambilan kerang yaitu dilakukan dengan memasukkan sampel air sungai ke dalam botol sampel, selanjutnya dianalisis di laboratorium.

b. Sampel sedimen

Pengambilan sampel sedimen juga diambil pada setiap lokasi pengambilan kerang dan air sungai yaitu dilakukan dengan menggunakan pipa paralon yang ditancapkan pada sedimen dasar sungai lalu dimasukkan ke dalam kantong sampel.

c. Sampel kerang kijing (*Pilsbryoconcha exilis*)

Pengambilan sampel kerang kijing (*Pilsbryoconcha exilis*) diambil dengan menggunakan tangan langsung kemudian memasukkan ke dalam kantong plastik.

2. Preparasi sampel

a. Sampel air

Preparasi dalam sampel air dengan mengacu pada SNI 06-6989.8-2004 BSN, (2004) dengan prosedur kerja sebagai berikut :

- 1) Contoh air sebanyak 100 mL yang sudah dikocok sampai homogen dimasukkan ke dalam gelas kimia
- 2) Kemudian ditambahkan 5 mL asam nitrat (HNO_3)
- 3) Contoh dipanaskan di atas pemanas listrik sampai larutan sampel menjadi kering.
- 4) Kemudian ditambahkan 50 mL aquades, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL melalui kertas saring dan diimpitkan dengan aquades.
- 5) Sampel siap untuk dianalisis dengan AAS.

b. Sampel sedimen

Preparasi dalam sampel sedimen dengan mengacu pada SNI 06-6992.3-2004 BSN (2004) dengan prosedur kerja sebagai berikut:

- 1) Sampel sedimen yang diambil hanya pada kedalaman 1-3 mm.
- 2) Disiapkan gelas kimia 250 mL, menimbang contoh uji yang sudah dihomogenkan sebanyak kurang lebih 3 gram dan memasukkan ke dalam gelas kimia.
- 3) Ditambahkan 25 mL aquades dan diaduk, kemudian ditambahkan 5mL asam nitrat (HNO_3) pekat, diaduk hingga bercampur rata, menambahkan 3-5 butir batu didih kemudian dipanaskan sampai volume contoh uji ± 10 mL dan didinginkan.

- 4) Ditambahkan 5 mL asam nitrat (HNO_3) pekat dan 1 mL asam perklorat (HClO_4) pekat tetes demi tetes pada bagian dinding kaca gelas kimia. Dipanaskan kembali pada penangas listrik sampai timbul asap putih dan larutan contoh uji menjadi jernih.
 - 5) Setelah timbul asap putih, pemanasan dilanjutkan selama kurang lebih 30 menit. Mendinginkan larutan contoh uji dan disaring dengan menggunakan kertas saring whatman lalu menempatkan filtrat uji pada labu ukur 100 mL dan ditambahkan aquades sampai pada tanda batas.
 - 6) Filtrat contoh uji siap diukur dengan menggunakan AAS.
- c. Sampel kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*)
- Preparasi dalam sampel sedimen dengan mengacu pada SNI 06-6989.8-2004 BSN (2004) dengan prosedur kerja sebagai berikut:
- 1) Daging kerang diambil dengan menggunakan pisau untuk mengambilnya kemudian dibersihkan dari kotoran.
 - 2) Sampel dimasukkan kedalam oven pada suhu 105°C selama 2 hari.
 - 3) Selanjutnya ditimbang seberat 5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk di tanur sampai menjadi abu. Suhu yang digunakan adalah 500°C selama 2 jam.
 - 4) Sampel yang sudah menjadi abu kemudian didinginkan kemudian ditambahkan 5 mL asam nitrat pekat (HNO_3)

- 5) Setelah sampel sampel didinginkan kemudian dilarutkan dengan menggunakan aquades sebanyak 50 mL dan disaring dengan menggunakan kertas saring whatman ke dalam labu ukur 100 mL
- 6) Sampel diimpitkan sampai pada tanda batas
- 7) Sampel siap untuk dianalisis dengan menggunakan AAS

3. Pembuatan Larutan Baku Logam Timbal (Pb) 100 mg/L

Dipipet 10 mL larutan induk Timbal (Pb) 1000 mg/L ke dalam labu ukur 100mL. Diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas lalu dihomogenkan.

4. Pembuatan Larutan Baku Logam Timbal (Pb) 10 mg/L

Dipipet 10 mL larutan induk Pb 100 mg/L ke dalam labu ukur 100 mL, diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas lalu dihomogenkan.

5. Pembuatan Larutan Standar Timbal (Pb)

Dipipet 0,5 mL; 1 mL; 5 mL; 10 mL; 20 mL dan 50 mL larutan baku Pb 10 mg/L dengan masing-masing konsentrasi 0,05 ppm; 0,1 ppm; 0,5 ppm; 1 ppm; 2 ppm dan 5 ppm masing-masing ke dalam labu ukur 100 mL. Diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas lalu dihomogenkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dengan mengukur kadar logam timbal (Pb) pada kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom (SSA).

Analisis kadar timbal (Pb) pada kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*), air dan sedimen yang dilakukan dengan cara pengulangan pada saat setiap pengambilan sampel dapat dilihat jumlah absorbansi dan konsentrasi dari setiap sampelnya yaitu sebagai berikut:

1. Konsentrasi sampel kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*)

Tabel 4.1 Kadar logam timbal (Pb) dalam sampel

No.	Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Timbal (Pb)
1	Kerang A1 (512)	0,0042	2,2757282 mg/kg
2	Kerang A2 (513)	0,0449	24,05498 mg/kg
3	Kerang B1 (514)	0,0040	2,156642 mg/kg
4	Kerang B2 (515)	0,0042	2,255784 mg/kg

2. Konsentrasi sampel air

Tabel 4.2 Kadar logam timbal (Pb) dalam sampel

No.	Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Timbal (Pb)
1	Air A1 (508)	0,0024	0,065591 mg/L
2	Air A2 (509)	0,0034	0,092473 mg/L
3	Air B1 (510)	0,0064	0,173118 mg/L
4	Air B2 (511)	0,0040	0,108602 mg/L

3. Konsentrasi sampel sedimen

Tabel 4.3 Kadar logam timbal (Pb) dalam sampel

No.	Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Timbal (Pb)
1	Sedimen A1 (516)	0,0207	18,56876 mg/kg
2	Sedimen A2 (517)	0,0223	19,98661 mg/kg
3	Sedimen B1 (518)	0,0216	19,19553 mg/kg
4	Sedimen B2 (519)	0,0159	14,23996 mg/kg

B. Pembahasan

Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik jika dalam jumlah besar dan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perairan baik aspek ekologis maupun aspek biologi. Pb merupakan logam yang sangat beracun dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati. Logam Pb sangat berbahaya bagi tubuh apabila telah terakumulasi dengan organisme atau biota sungai yang sering dikonsumsi oleh manusia.

1. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Kerang Kijing (*Pilsbryconcha exilis*)

Kerang bersifat *filter feeder* yang dimana mekanisme pencernaan bergabung dengan mekanisme pernapasan. Zat – zat makanan seperti fitoplankton serta organisme mikroskopik lain akan ikut tersaring dan diubah menjadi jaringan tubuh ketika kerang menyaring air. Kerang mampu menyaring volume air sebanyak 300 ml/jam.⁴⁴

Hasil penelitian logam berat Pb dalam kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) bahwa pada titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 2,2757282mg/kg untuk A1 dan untuk A2 sebesar 24,05498 mg/kg sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 2,156642 mg/kg

⁴⁴Rodieiser Sembiring, “Analisis Kandungan Logam Berat Hg, Cd dan Pb Daging Kijing Lokal (*Pilsbryconcha exilis*) Dari Perairan Situ Gede, Bogor”, *Skripsi* (Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2009), h. 4

untuk B1 dan untuk B2 sebesar 2,255784mg/kg. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan yaitu 1,5 mg/kg. Maka dari hasil penelitian menyatakan bahwa dari setiap titik telah melebihi batas maksimum cemaran logam berat Pb dalam kerang.

Dari data titik pertama dengan kode A2 menghasilkan konsentrasi logam berat Pb yang sangat tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh terjadinya akumulasi yang tinggi pada salah satu sampel pengulangan karena pengambilan sampel berada di dekat mesin penghisap pasir sehingga terdapat perbedaan yang cukup besar. Selain itu faktor tingginya kandungan logam berat Pb pada semua sampel diduga karena letak lokasi dekat dengan jembatan trans Sulawesi yang setiap harinya membuang gas polutan yang akhirnya jatuh di aliran sungai dan terakumulasi di dasar sungai yang mempengaruhi kualitas air. Faktor lain yaitu terdapatnya aktivitas penambakan pasir yang dilakukan oleh warga sekitar sehingga buangan bahan bakarnya terakumulasi di aliran sungai dan kerang yang sifatnya sebagai penyaring (*filter feeder*) akan mengakumulasi logam berat tersebut ke dalam tubuhnya.

2. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada air

Berdasarkan hasil penelitian logam berat Pb pada air bahwa pada titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 0,065591mg/L untuk A1 dan untuk A2 sebesar 0,092473 mg/L sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 0,173118mg/L untuk B1 dan untuk B2 sebesar 0,108602 mg/L. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air batas maksimum logam Pb dalam air adalah 0,03 mg/L. Bila dilihat dari hasil kualitas air maka konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada sungai saddang sudah tercemar.

Data menunjukkan bahwa pada titik pertama dengan kode A memiliki jumlah konsentrasi logam Pb lebih rendah dari titik kedua dengan kode B. Hal ini disebabkan karena lokasi pengambilan sampel air pada titik kedua berada didekat lokasi tempat penambakan pasir. Daerah sekitar sungai Saddang terdapat jembatan trans Sulawesi dan terdapat aktivitas penambakan pasir serta terdapat truk yang sering melintasi jalur tersebut. Buangan kendaraan serta buangan bahan bakar dari penambakan pasir menghasilkan buangan limbah Pb yang akhirnya mempengaruhi kualitas air sungai di daerah aliran sungai Saddang. Data memberikan hasil konsentrasi yang berbeda karena jarak antara titik A dan titik B cukup jauh serta arus sungai juga mempengaruhi perbedaan konsentrasi tersebut.

3. Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) pada sedimen

Sedimen merupakan tempat tinggal tumbuhan dan hewan yang ada di dasar perairan. Dalam lingkungan perairan ada 3 media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat yaitu air, sedimen dan organisme hidup. Secara teoritis sedimen merupakan salah satu indikator penting dalam pemantauan pencemaran, khususnya logam berat.⁴⁵

⁴⁵Aryalan Ginting, dkk. "Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Air, Sedimen dan kerang Darah di pantai Belawan Provinsi Sumatera Utara". h. 29

Hasil penelitian logam berat Pb dalam sedimen pada titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 18,56876mg/kg untuk A1 dan untuk A2 sebesar 19,98661 mg/kg sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 19,19553mg/kg untuk B1 dan untuk B2 sebesar 14,23996 mg/kg. Berdasarkan *Reseau National d'Observation* (RNO) 1981 diacu oleh Hamidah 1986 (Aryalan Ginting, 2013) bahwa baku mutu kandungan logam berat Pb dalam sedimen adalah berkisar 10-70 ppm. Dari hasil penelitian dari konsentrasi logam Pb dalam sedimen menunjukkan bahwa konsentrasi masih berada diantara 10-70 ppm artinya masih dibawah baku mutu dan dapat dinyatakan tidak berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya logam berat Pb dalam sedimen yaitu adanya aktivitas penambakan pasir di area sungai Saddang yang dimana buangan bahan bakar dari aktivitas tersebut terbuang di aliran sungai sehingga terakumulasi sampai ketinggian bawah yaitu sedimen. Kontaminasi ini seiring dengan berjalannya waktu akan menimbulkan akumulasi baik pada tubuh biota yang hidup dan mencari makan di dalam maupun di sekitar sedimen atau dasar perairan, dimana akan berbahaya pula bagi manusia yang mengonsumsi biota tersebut.

Dalam perspektif islam, manusia dianjurkan untuk menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 60 yaitu :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرْنَا مِنْهُ آيَاتٍ كَثِيرًا مِّنْهُ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْكِتَابَ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُمْ عَلَيْنَا فَمَا أَكْفَرُوا بِآيَاتِنَا ۗ

عَلَّمَ كُلُّ أَنْاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing) Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Ayat ini menjelaskan tentang kepentingan dalam menjaga pelestarian lingkungan baik itu berupa makanan yang akan dikonsumsi dan air yang akan kita minum. Dalam tafsir Al-Qur'an menyatakan bahwa aku pancarkan air darinya buat kalian sebanyak dua belas mata air, bagi setiap suku diantara kalian terdapat mata airnya sendiri yang telah diketahui. Makanlah salwa dan manna dan minumlah air yang telah kupancarkan tanpa jerih payah dan usaha kalian dan sembahlah oleh kalian Allah SWT. yang telah menundukkan hal tersebut serta janganlah kamu mengacau dan membuat kerusakan di bumi. Diperingatkan kepada manusia umumnya, janganlah sampai setelah nikmat bertimpa-timpa datang, lalu lupa kepada yang memberikan nikmat, lalu berbuat kecacauan dan kerusakan. Jangan hanya menggerutu ketika kekeringan nikmat, lalu mengacau dan menyombongkan telah nikmat ada.⁴⁶

4. Faktor Bioakumulasi

Faktor bioakumulasi dihitung untuk mengetahui kemampuan kerang kijing (*Pilsbryoconcha exilis*) dalam mengakumulasi logam berat Pb melalui tingkat

⁴⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 208.

biokonsentrasi faktor (BCF). Faktor biokonsentrasi (BCF) dapat mengukur kemampuan suatu biota atau organisme air dalam mengakumulasi bahan pencemar yang ada disekitar lingkungan biota itu sendiri. Tabel 4.3 adalah indeks faktor biokonsentrasi menurut Van Esch 1977 dalam Suprapti 2008.

Tabel 4.3 Indeks faktor Bioakumulasi

Nilai BCF	Keterangan
BCF < 100	Polutan memiliki sifat akumulatif rendah
BCF = 100 – 1000	Polutan memiliki sifat akumulatif sedang
BCF > 1000	Polutan memiliki sifat akumulatif tinggi

Hasil faktor bioakumulasi pada titik A1 antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi air yaitu sebesar 34,6957387. Sedangkan faktor bioakumulasi antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi sedimen yaitu sebesar 0,12255682. Jika dibandingkan dengan indek bioakumulasi menurut Van Esch dalam Suprapti (2008), maka dari hasil penelitian faktor bioakumulasi antara kerang dan air menunjukkan bahwa sifat akumulatif yang rendah (BCF < 100). Sedangkan faktor bioakumulasi antara kerang dan sedimen menunjukkan sifat akumulatif yang rendah (BCF < 100).

Hasil faktor bioakumulasi pada titik A2 antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi air yaitu sebesar 260,129768. Sedangkan faktor bioakumulasi antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi sedimen yaitu sebesar 1,203554. Jika

dibandingkan dengan indek bioakumulasi menurut Van Esch dalam Suprapti (2008), maka dari hasil penelitian faktor bioakumulasi antara kerang dan air menunjukkan bahwa sifat akumulatif yang sedang ($BCF = 100-1000$). Sedangkan faktor bioakumulasi antara kerang dan sedimen menunjukkan sifat akumulatif yang rendah ($BCF < 100$).

Faktor bioakumulasi pada titik A1 dengan titik A2 memiliki perbedaan dalam jumlah BCF di sebabkan karena sifat kerang kijing itu sendiri yang berfungsi sebagai penyaring (*filter feeder*). Kerang menyaring makanannya dengan menyerap fitoplankton yang terdapat di dalam air yang apabila dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi pada tubuh biota kerang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan nilai faktor bioakumulasi antara kerang dan air memiliki nilai yang tinggi.

Hasil faktor bioakumulasi (BCF) pada titik B1 antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi air yaitu sebesar 12,4576416. Sedangkan faktor bioakumulasi antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi sedimen yaitu sebesar 0,11235126. Jika dibandingkan dengan indek bioakumulasi menurut Van Esch dalam Suprapti (2008), maka dari hasil penelitian faktor bioakumulasi antara kerang dan air menunjukkan bahwa sifat akumulatif yang rendah ($BCF < 100$). Sedangkan faktor bioakumulasi antara kerang dan sedimen menunjukkan sifat akumulatif yang rendah ($BCF < 100$).

Hasil faktor bioakumulasi (BCF) pada titik B2 antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi air yaitu sebesar 20,7711092. Sedangkan faktor

bioakumulasi antara konsentrasi organisme (kerang) dan konsentrasi sedimen yaitu sebesar 0,15841224. Jika dibandingkan dengan indeks bioakumulasi menurut Van Esch dalam Suprpti (2008), maka dari hasil penelitian faktor bioakumulasi antara kerang dan air menunjukkan bahwa sifat akumulatif yang rendah ($BCF < 100$). Sedangkan faktor bioakumulasi antara kerang dan sedimen menunjukkan sifat akumulatif yang rendah ($BCF < 100$).

Faktor bioakumulasi pada titik B1 dengan titik B2 memiliki perbedaan dalam jumlah BCF di sebabkan karena sifat kerang kijing itu sendiri yang berfungsi sebagai penyaring (*filter feeder*). Kerang menyaring makanannya dengan menyerap fitoplankton yang terdapat di dalam air yang apabila dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi pada tubuh biota kerang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan nilai faktor bioakumulasi antara kerang dan air memiliki nilai yang tinggi.

Nilai BCF dapat diperoleh dengan membandingkan kemampuan organisme (kerang) dalam menyerap logam dari air dan sedimen. Oleh karena itu terdapat dua nilai BCF, yaitu BCF organisme-air (BCF_{O-w}) dan BCF organisme-sedimen (BCF_{O-s}). BCF_{O-w} adalah nilai perbandingan antara konsentrasi logam yang diserap ke dalam jaringan kerang dengan konsentrasi logam dalam air. Sedangkan BCF_{O-s} adalah nilai perbandingan antara konsentrasi logam yang diserap ke dalam jaringan dengan konsentrasi logam di sedimen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kandungan logam Pb pada kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) di titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 2,2757282 mg/kg untuk A1 dan untuk A2 sebesar 24,05498 mg/kg sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 2,156642 mg/kg untuk B1 dan untuk B2 sebesar 2,255784 mg/kg.
2. Kandungan logam Pb pada air di titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 0,065591 mg/L untuk A1 dan untuk A2 sebesar 0,092473 mg/L sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 0,173118 mg/L untuk B1 dan untuk B2 sebesar 0,108602 mg/L.
3. Kandungan logam Pb pada sedimen di titik pertama dengan kode A memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 18,56876 mg/kg untuk A1 dan untuk A2 sebesar 19,98661 mg/kg sedangkan pada titik kedua dengan kode B memiliki konsentrasi logam Pb sebesar 19,19553 mg/kg untuk B1 dan untuk B2 sebesar 14,23996 mg/kg.
4. Nilai faktor bioakumulasi (BCF) logam berat Pb pada kerang kijing (*Pilsbryconcha exilis*) yaitu pada titik A1 antara organisme (kerang) dengan

air (BCF_{O-w}) adalah sebesar 34,6957387, sedangkan antara organisme (kerang) dengan sedimen (BCF_{O-s}) adalah sebesar 0,12255682 dan pada titik A2 antara organisme (kerang) dengan air (BCF_{O-w}) adalah sebesar 260,129768, sedangkan antara organisme (kerang) dengan sedimen (BCF_{O-s}) adalah sebesar 1,203554. Nilai faktor bioakumulasi (BCF) logam berat Pb pada kerang kijing (*Pilsbryoconcha exilis*) yaitu pada titik B1 antara organisme (kerang) dengan air (BCF_{O-w}) adalah sebesar 12,4576416 sedangkan antara organisme (kerang) dengan sedimen (BCF_{O-s}) adalah sebesar 0,11235126 dan pada titik B2 antara organisme (kerang) dengan air (BCF_{O-w}) adalah sebesar 20,7711092, sedangkan antara organisme (kerang) dengan sedimen (BCF_{O-s}) adalah sebesar 0,15841224.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji logam berat yang lain seperti kadmium (Cd) dan seng (Zn) untuk mendapatkan informasi pencemaran yang terdapat dari aliran sungai Saddang tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti parameter lingkungan seperti pengukuran oksigen terlarut dan pengukuran pH untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani. *Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan seng (Zn) pada Kerang Darah (Anadara granosa. L) dan Kerang Bakau (Polymesoda bengalensis. L) di Perairan Teluk Kendari. Tesis*, Semarang: UNDIP, 2011
- Dhahiyat, Yayat. *Bioakumulasi Logam Berat timbal (Pb) dan cadmium (Cd) pada Daging Ikan yang Tertangkap di Sungai Citarum Hulu. Jurnal Perikanan dan Kelautan*, vol.3 no. 4. 2012
- Fitriati, Mufidah. *Bioakumulasi Logam Raksa (Hg), Timbal (Pb) dan Kadmiun (Cd) pada Kerang Hijau (Perna viridis) yang Dibudidaya di Perairan Pesisir Kamal dan Cilincing Jakarta. Skripsi*, Bogor: IPB. 2004
- Fitriyah, KhainaRinda. *Studi Pencemaran Logam Berat Kadmiun (Cd), Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada Air Laut, Sedimen dan Kerang Bulu (Anadara antiquate) di Perairan Pantai Lekok Pasuruan. Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2007
- Gandjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ginting, Aryalan, dkk. *Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Air, Sedimen dan kerang Darah di pantai Belawan Provinsi Sumatera Utara. USU (Sumatera: 2013*
- Hamid, SyamsulRijal. *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Qibla. 2014.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Happy R, Arief dkk. "Distribusi Kandungan Logam Berat Pb dan Cd pada Kolom Air dan Sedimen Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu". *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3, no. 3. 2012
- Kadir, Haryanto. *Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada Kerang Lunak sinularia polydactyla di Perairan Pulau LaeLae, Pulau Bonebatang dan Pulau Badi. Skripsi*, Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS, 2013
- Khopkar, S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press, 2010.

- Laasut, Markus T. *Metallothionin : Suatu Parameter Kunci yang Penting Dalam Penetapan Baku Mutu Air Laut (BMAL) Indonesia*. Ekoton 2, No. 1. 2002
- Ningsih, Purwati. *Karakteristik Protein dan Asam Amino Kijing Lokal (Pilsbryconcha exilix) Dari Situ Gede Bogor Akibat Proses Pengukusan*. Skripsi. Bogor: IPB. 2009
- Retyoadhi, Alfa Yusuf, dkk. *Kajian Cemaran Logam Timbal (Pb), Total Mikroba dan E. Coli Pada Kerang Darah Segar di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Teknologi Pertanian 6, no. 3 2005
- Rochyatun, Endang, dkk. *Distribusi Logam Berat dalam Air dan Sedimen di Perairan Muara Sungai Cisadane*. Makara Sains, Vol.10. no. 1.2006.
- Sarjono, Aryo. *Analisis Logam Berat Cd, Pb, dan Hg pada Air dan Sedimen di Perairan kamal Muara Jakarta Utara*. Skripsi Bogor: IPB, 2009
- Sembiring, Rodieiser. *Analisis Kandungan Logam Berat Hg, Cd dan Pb Daging Kijing Lokal (Pilsbryconcha exilis) Dari Perairan Situ Gede, Bogor*. Skripsi Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 2009
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Silalahi, Herry V, dkk. *Analisis Kandungan Logam Berat Pb, Cu dan Zn pada Daging dan Cangkang Kerang kepah di Perairan Bagan Asahan Kecamatan tanjung Balai Asahan*. UNSRI. 2014
- Suprapti, NanikHeru. *Kandungan Chromium pada perairan, Sedimen dan Kerang Darah (Anadar granosa) di wialayah Pantai Sekitar Muara Sungai Sayung Desa Morosari Kabupaten Demak, Jawa Tengan*. Bioma 10, No. 2 2008
- Suryono, ChrisnaAdhi. *Bioakumulasi Logam Berat Melalui Sistem Jaringan Makanan dan Lingkungan pada Kerang Bulu Anadara inflata*. Ilmu Kelautan 11, no. 1. 2006
- Universitas Gajah Mada. *Teknik Budiadaya Bivalvia*. Jogjakarta
- Wardani, Destia Ayu Kusuma dkk. *Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Daging Kerang Hijau (Perna viridis) di Muara Sungai Banjir Kanal Barat Semarang*. Unnes J Life Sci 3, no. 1. 2014
- Widowati, Wahyudkk., *Efek Toksik Logam*. Yogyakarta: Andi. 2008

Wijana, Nyoman. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.


Wulandari, E dkk. Kandungan Logam Berat Pb pada Air Laut dan Tiram *Saccostrea glomerata* Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Perikanan* 1, no. 1. 2012.

Yulaipi, Sumah. *Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Hubungannya dengan Laju Pertumbuhan Ikan Mujair (Oreochromis mosambicus)*. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, Vol.2 No.2.2013.




DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1. SKEMA PENELITIAN




LAMPIRAN 2. SAMPEL KERANG



LAMPIRAN 3. SAMPEL SEDIMEN



LAMPIRAN 4. SAMPEL AIR



LAMPIRAN 5. PEMBUATAN LARUTAN INDUK

$$\begin{aligned}\text{Mr Pb(NO}_3)_2 &= [(1 \times \text{Ar Pb}) + (2 \times \text{Ar N}) + (6 \times \text{Ar O})] \text{ g/mol} \\ &= [(1 \times 207) + (2 \times 14) + (6 \times 16)] \text{ g/mol} \\ &= (207 + 28 + 96) \text{ g/mol} \\ &= 331 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{Ar Pb}}{\text{Mr Pb(NO}_3)_2} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{\text{Volume Sampel}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{207 \text{ g/mol}}{331 \text{ g/mol}} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{0,1 \text{ L}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{207 \times \text{Berat Sampel}}{33,1 \text{ L}}$$

$$\text{Berat Sampel} = \frac{1000 \text{ mg/L} \times 33,1 \text{ L}}{207}$$

$$\text{Berat Sampel} = \frac{33100 \text{ mg}}{207}$$

$$\text{Berat Sampel} = 159,9 \text{ mg}$$

$$\text{Berat Sampel} = 0,1599 \text{ g}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 6. PEMBUATAN LARUTAN STANDAR



Lampiran 7. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus,

	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	Xy
1	0,05	0.0013	0.0025	0.00000169	0.000065
2	0,1	0.0016	0.01	0.00000256	0.00016
3	0,5	0.0175	0.25	0.00030625	0.00875
4	1	0.0368	1	0.00135424	0.0368
5	2	0.0807	4	0.00651249	0.1614
6	5	0.1837	25	0.03374569	0.9185
n=6	x=8,65	y=0.3216	$x^2=30.262$	$y^2=0.0419229$	xy=1.125675

Konsentrasi

dan Nilai Regresi Pada Timbal (Pb)

Konsentrasi Logam Timbal (Pb)

No.	Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Timbal (Pb)
1	Air A1 (508)	0,0024	0,065591 mg/L
2	Air A2 (509)	0,0034	0,092473 mg/L
3	Air B1 (510)	0,0064	0,173118 mg/L
4	Air B2 (511)	0,0040	0,108602 mg/L
5	Kerang A1 (512)	0,0042	2,2757282

			mg/kg
6	Kerang A2 (513)	0,0449	24,05498 mg/kg
7	Kerang B1 (514)	0,0040	2,156642 mg/kg
8	Kerang B2 (515)	0,0042	2,255784 mg/kg
9	Sedimen A1 (516)	0,0207	18,56876 mg/kg
10	Sedimen A2 (517)	0,0223	19,98661 mg/kg
11	Sedimen B1 (518)	0,0216	19,19553 mg/kg
12	Sedimen B2 (519)	0,0159	14,23996 mg/kg

Keterangan: A1 = titik pertama pengambilan sampel
 A2 = pengulangan sampel titik pertama
 B1 = titik kedua pengambilan sampel
 B2 = pengulangan sampel titik kedua

1. Penentuan Nilai Slope (a)

Diketahui: n = 6

$$x = 8,65$$

$$y = 0.3216$$

$$x^2 = 30,2625$$

$$y^2 = 0.04192292$$

$$\Sigma xy = 1.125675$$

$$a = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{6(1,125675) - (8,65)(0,3216)}{6(30,2625) - (8,65)^2}$$

$$= \frac{6,75405 - 2,78184}{181,575 - 74,8225}$$

$$= \frac{3,97221}{106,7525}$$

$$= 0,03720953$$

$$= 0,0372$$

2. Penentuan Nilai Intersep (b)

$$b = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{(0,3216)(30,2625) - (8,65)(1,125675)}{6(30,2625) - (8,65)^2}$$

$$= \frac{9,73242 - 9,73708875}{181,575 - 74,8225}$$

$$= \frac{-0,00466875}{106,7525}$$

$$= -0,00004373434$$

$$= -0,00004$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

3. Penentuan Persamaan Garis Lurus

Diketahui: $a = 0,0372$

$$b = -0,00004$$

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0372x - 0,00004$$

4. Perhitungan Nilai Regresi

$$\begin{aligned} R &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[(n \sum x^2) - (\sum x)^2][(n \sum y^2) - (\sum y)^2]}} \\ &= \frac{6 (1.125675) - (8,65) (0.3216)}{\sqrt{[6(30,2625)] - (8,65)^2} \{ [6(0.04192292)] - (0.3216)^2 \}} \\ &= \frac{6,75405 - 2,78184}{\sqrt{\{(181,575) - (74,8225)\} \{ (0,25153752) - (0,10342656) \}}} \\ &= \frac{3,97221}{\sqrt{(106,7525)(0,14811096)}} \\ &= \frac{3,97221}{\sqrt{15,8112153}} \\ &= \frac{3,97221}{3,97633189} \end{aligned}$$

$$= 0,99896339$$

$$R^2 = 0,99792785$$

$$= 0,9979$$

5. Perhitungan Konsentrasi Timbal (Pb) dalam Sampel

$$y = ax + b$$

Keterangan: y = absorban

a = slope

x = konsentrasi

b = intersep

a. Sampel Air A1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0024 = 0,0372x - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0024 + 0,00004}{0,0372} = 0,065591 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,065591 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= \frac{0,0065591 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= 0,065591 \text{ mg/L}$$

b. Sampel Air A2

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0034 = 0,0372x_2 - 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0034 + 0,00004}{0,0372} = 0,092473 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,092473 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= \frac{0,0092473 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= 0,092473 \text{ mg/L}$$

c. Sampel Air B1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0064 = 0,0372x_1 - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0064 + 0,00004}{0,0372} = 0,173118 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,173118 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= \frac{0,0173118 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$



$$= 0,173118 \text{ mg/L}$$

d. Sampel Air B2

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0040 = 0,0372x_2 - 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0040 + 0,00004}{0,0372} = 0,108602 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,108602 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= \frac{0,0108602 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

$$= 0,108602 \text{ mg/L}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

e. Sampel Kerang A1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0042 = 0,0372x_1 - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0042 + 0,00004}{0,0372} = 0,113978 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,113978 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{5,0094 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,0113978 \text{ mg}}{0,0050094 \text{ kg}}$$

$$= 2,2757282 \text{ mg/kg}$$

f. Sampel Kerang A2

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0449 = 0,0372x_2 - 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0449 + 0,00004}{0,0372} = 1,208065 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{1,208065 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{5,0221 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,1208065 \text{ mg}}{0,0050221 \text{ kg}}$$

$$= 24,05498 \text{ mg/kg}$$

g. Sampel Kerang B1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0040 = 0,0372x_1 - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0040 + 0,00004}{0,0372} = 0,108602 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,108602 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{5,0357 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,0108602 \text{ mg}}{0,0050357 \text{ kg}}$$

$$= 2,156642 \text{ mg/kg}$$

h. Sampel Kerang B2


$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0042 = 0,0372x_2 - 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0042 + 0,00004}{0,0372} = 0,113978 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,113978 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{5,0527 \text{ g}}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

$$\begin{aligned} &= \frac{0,0113978 \text{ mg}}{0,0050527 \text{ kg}} \\ &= 2,255784 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

i. Sampel Sedimen A1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0207 = 0,0372x_1 - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0207 + 0,00004}{0,0372} = 0,557527 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,557527 \text{ mg} \times 0,1 \text{ L}}{3,0025 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,0557527 \text{ mg}}{0,0030025 \text{ kg}}$$

$$= 18,56876 \text{ mg/kg}$$



j. Sampel Sedimen A2

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0223 = 0,0372x_2 - 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0223+0,00004}{0,0372} = 0,600538 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,600538 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{3,0047 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,600538 \text{ mg}}{0,0030047 \text{ kg}}$$

$$= 19,98661 \text{ mg/kg}$$

k. Sampel Sedimen B1

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0216 = 0,0372x_1 - 0,00004$$

$$x_1 = \frac{0,0216+0,00004}{0,0372} = 0,58172 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,58172 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{3,0305 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,058172 \text{ mg}}{0,0030305 \text{ kg}}$$



$$= 19,19553 \text{ mg/kg}$$

1. Sampel Sedimen B2

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0159 = 0,0372x_2 + 0,00004$$

$$x_2 = \frac{0,0159 + 0,00004}{0,0372} = 0,428495 \text{ mg/L}$$

$$Pb = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{0,428495 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{3,0091 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,0428495 \text{ mg}}{0,0030091 \text{ kg}}$$

$$= 14,23996 \text{ mg/kg}$$


Lampiran 8. Tabel Absorbansi dan Grafik Absorbansi larutan standar

Absorbansi deret standar timbal (Pb) diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan panjang gelombang 283 nm.

a. Tabel Absorbansi Timbal (Pb)

No.	Larutan standar Pb	Absorbansi
1	0,05	0.0013
2	0,1	0.0016
3	0,5	0.0175
4	1	0.0368
5	2	0.0807
6	5	0.1837

b. Grafik Absorbansi Larutan Standar Timbal (Pb)



Lampiran 9. Perhitungan Faktor Bioakumulasi Kerang Kijing (*Pilsbryoconcha*

***exilis*)**

a. Titik A1

$$\text{BCF (o-w)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi Air}}$$
$$= \frac{2,2757282 \text{ mg/kg}}{0,065591 \text{ mg/ kg}}$$

$$= 34,6957387$$

$$\text{BCF (o-s)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi sedimen}}$$
$$= \frac{2,2757282 \text{ mg/kg}}{18,56876 \text{ mg/ kg}}$$

$$= 0,12255682$$

b. Titik A2

$$\text{BCF (o-w)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi Air}}$$
$$= \frac{24,05498 \text{ mg/kg}}{0,092473 \text{ mg/ kg}}$$

$$= 260,129768$$

$$\text{BCF (o-s)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi sedimen}}$$
$$= \frac{24,05498 \text{ mg/kg}}{19,98661 \text{ mg/ kg}}$$

$$= 1,203554$$

c. Titik B1

$$\text{BCF (o-w)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi Air}}$$

$$= \frac{2,156642 \text{ mg/kg}}{0,173118 \text{ mg/kg}}$$

$$= 12,4576416$$

$$\text{BCF (o-s)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi sedimen}}$$

$$= \frac{2,156642 \text{ mg/kg}}{19,19553 \text{ mg/kg}}$$

$$= 0,11235126$$

d. Titik B2

$$\text{BCF (o-w)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi Air}}$$

$$= \frac{2,255784 \text{ mg/kg}}{0,108602 \text{ mg/kg}}$$

$$= 20,7711092$$

$$\text{BCF (o-s)} = \frac{\text{Konsentrasi organisme}}{\text{Konsentrasi sedimen}}$$

$$= \frac{2,255784 \text{ mg/kg}}{14,23996 \text{ mg/kg}}$$

= 0,15841224



Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

A. Pengambilan Sampel



1) Pengambilan sampel di sungai (A)

2) Pengambilan sampel di sungai (B)



3) Sampel Sedimen

4) Sampel air



6) sampel kerang kijing
(*Pilsbryconcha exilix*)



7) sampel kerang kijing
(*Pilsbryconcha exilix*)



8) sampel kerang kijing
(*Pilsbryconcha exilix*)

9) sampel kerang kijing
(*Pilsbryconcha exilix*)

2) Proses pengerjaan dalam laboratorium



1) Sampel sedimen siap di destruksi



2) sampel kerang siap di destruksi



3).sampel air siap di destruksi

a. Destruksi sampel Air



1) sampel air + 5 mL HNO₃



2) proses destruksi



3) destruksi sampel air



4)Sampel air telah menjadi kering



5) menyaring sampel air ke dalam labu ukur 100 mL



3) Sampel air siap dianalisis dengan AAS

b. Destruksi sampel kerang kijing



1) Mengambil daging kerang 2) menimbang sampel A1 3) menimbang sampel A2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R



4) Penimbangan sampel (B1)

5) Penimbangan sampel (B2)

6) mengeringkan kerang sebelum di oven



7) Setelah di oven
(A1)



8) Setelah di oven
(A2)



9) Setelah di oven
(B1)



10) Setelah di oven



11) sampel dimasukkan ke dalam desikator



12) menyiapkan cawan



13) menimbang kerang
Yang telah di oven (A1)



14) menimbang kerang
Yang telah di oven (A2)



15) menimbang kerang Yang telah di oven (B1)



16) menimbang kerang Yang telah di oven (B2)



17) memasukkan dalam tanur dengan suhu 500°C selama kurang lebih 2 jam sampai menjadi abu



18) memasukkan kedalam desikator



19) sampel abu di tambahkan 5 mL HNO_3



20) sampel di saring dengan Kertas Saring



21) sampel siap di analisis dengan AAS

c. Destruksi sampel sedimen



1) menimbang sampel sedimen A1

2) menimbang sampel sedimen A2



3) menimbang sampel sedimen B1




4) menimbang sampel sedimen B2



5) menambahkan 25 mL aquades dan
5 mL HNO_3



6) sampel dipanaskan sampai volume
 $\pm 10 \text{ mL}$



7) mendinginkan dan menambahkan
5 mL HNO_3 dan 1 mL HClO_4



8) melanjutkan pemanasan sampai
timbul asap putih dan menjadi jernih



9) menyaring dengan kertas saring



10) sampel siap di analisis





BIOGRAFI

Samsul Bahri dilahirkan di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Oktober 1993 anak terakhir dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Cundu dan Hj. Biba. Pendidikan formal dimulai dari sekolah Dasar SDN Inpres Pajalele dan lulus padatahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lembang dan lulus pada tahun 2008, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Polewali dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R