

**RESPON BERAHI SAPI BALI TERHADAP PENYUNTIKAN  
SINKRONISASI HORMON PROSTAGLANDIN DENGAN MEREK  
DAGANG BERBEDA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Peternakan Pada Jurusan Ilmu Peternakan  
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas  
Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh:**

**RAMA**

**NIM: 60700116021**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rama, NIM: 60700116021, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Respon Berahi Sapi Bali Terhadap Penyuntikan Sinkronisasi Hormon Prostaglandin Dengan Merek Dagang Berbeda**" memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengajukan permohonan ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 12 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ir. Herry Sonjava, DEA., DES.  
NIP: 195701291980031001

Rasvidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.

MAKASSAR

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shalallaahu 'alaihi Wasallam.

Skripsi ini adalah skripsi yang digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana peternakan. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, telah melibatkan banyak pihak yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan, saran serta informasi-informasinya yang penulis perlukan.

Saran dan kritik dari dosen dan semua pihak yang tentunya bersifat membangun sangat kami harapkan agar dalam pembuatan skripsi berikutnya dapat lebih baik. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih.

Samata, 7 Desember 2020

Penulis

RAMA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	7
C...Tujuan Penelitian.....	8
D...Manfaat Penelitian.....	8
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
A...Kajian Integrasi .....	9
B...Kajian Teoritis .....	17
1.. Sapi Bali .....	17
2. Reproduksi Sapi Bali.....	20
3. Siklus Berahi Pada Sapi.....	21
4. Metode Sinkronisasi Berahi.....	25
5. Hormon Induksi dan Sinkronisasi Berahi.....	32
6. Gangguan Reproduksi.....	35
7. Kajian Terdahulu.....	37
C...Kerangka Pemikiran .....	40
<b>Bab III Materi dan Metode</b>	
A...Waktu danTempat Penelitian .....	41
B...Bahan dan Materi .....	41
C...Metode Penelitian .....	41
D.. Jenis dan Rancangan Penelitian .....	42
E... Analisis Data.....	48
F....Perubahan yang Diamati.....	48
G...Defenisi Oprasional .....	49

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

A...Persentase berahi .....	50
B...Intensitas Berahi.....	53

**Bab V Penutup**

A...Kesimpulan.....	58
B...Saran .....	58


<b>DaftarPustaka.....</b>	<b>59</b>
---------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Tiga Masa Berahi dan Tanda-Tandanya .....	29
2.2	Tingkat Keberhasilan Deteksi Berahi Pada Waktu yang Berbeda....	30
4.1	Persentase Berahi dengan Perlakuan Hormon Prostaglandin Merek Lutalyst dan Estron.....	50
4.2	Gejala Berahi Sapi Bali yang Diinduksi Hormon Prostaglandin Merek Lutalyst dan Estron.....	53



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
2.1..	Level Hormon dan Aktivitas Ovarium Pada Siklus Estrus.....	26
2.2..	Mekanisme Hormonal dalam Siklus Berahi.....	29
2.3..	Skema Kerangka Pemikiran.....	47
3.1..	Penyuntikan Hormon Prostaglandin.....	35
3.2..	Pemeriksaan kebuntingan (PKB) Sapi Bali.....	50
3.3..	Seleksi corpus luteum (CL).....	51
3.4..	Induksi Hormon Prostaglandin dengan Merek Dagang Lutalyst....	51
3.5..	Induksi Hormon Prostaglandin dengan Merek Dagang Estron.....	52
3.6..	Kalung Ternak.....	52
3.7..	Pemasangan Kalung Ternak.....	53
3.8..	Pengamatan Gejala Berahi.....	53
3.9..	Pengamatan Gejala Berahi.....	54
3.10..	Pengamatan Gejala Berahi.....	55
3.11..	Pengamatan Gejala Berahi.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Halaman
1..	Data Mentah Kelompok Ternak yang Disinkronisasi Menggunakan Hormon Prostaglandin Mertek Estron dan Lutalyse.....	xi
2.	Data Persentase Berahi Chi-Square.....	xii
3.	Data Persentase Berahi Chi-Square Prostaglandin Lutalyst.....	xiii
4.	Data Persentase Berahi Chi-Square Prostaglandin Estron.....	xiii



## ABSTRAK

Nama : Rama

Nim : 60700116021

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul Skripsi : Respon Berahi Sapi Bali Terhadap Penyuntikan Sinkronisasi Hormon Prostaglandin Dengan Merek Dagang Berbeda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyuntikan hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi induk sapi Bali. Penelitian merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 2 kelompok induk sapi Bali masing-masing 10 ekor, setiap kelompok mendapat perlakuan penyuntikan hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah persentase induk yang berahi dan intensitas berahi setelah penyuntikan Sapi penelitian berasal dari peternakan rakyat yang dipelihara di padang penggembalaan,. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang terdiri atas 2 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri atas 10 ulangan dengan perlakuan membandingkan hormon Prostaglandin merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi 2 kelompok indukan sapi Bali. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Persentase berahi pada Prostaglandin merek dagang Lutalyst jumlah yang berahi sebanyak 9 ekor (90%) dan tidak berahi yaitu 1 ekor (10%) sedangkan data perlakuan 2 persentase berahi Hormon Prostaglandin merek dagang Estron jumlah yang berahi sebanyak 7 ekor (70%) dan tidak berahi yaitu 3 ekor (3%). Intensitas berahi pada Prostaglandin merek dagang Lutalyse dan Estron memperlihatkan gejala-gejala berahi pada skor 3 dan 4 dengan intensitas tertinggi pada perlakuan pemberian Prostaglandin Lutalyse.

**Kata Kunci:** Sinkronisasi Berahi, Hormon Prostaglandin, Sapi Bali.

## ABSTRACT

Name : Rama


Nim : 60700116021

Department : Animal Science

Thesis Title : The Response of Cows in the Heat of Synchronizing Injection of Prostaglandin Hormones with Different Trademarks

This study aims to determine the effectiveness of injecting prostaglandin hormones with the brand names Lutalyse and Estron on the heat response of Bali cows. This research is an experimental study using 2 groups of Bali cows, 10 each. Each group is treated with injections of prostaglandin hormones with the trademarks Lutalyse and Estron. The parameters measured in this study were the percentage of cows in heat, the intensity of heat, signs of heat and the time of appearance of heat after injection. Research cows came from public farms that were extensively reared, grazed in the morning and in the evening were collected to be put in a cage. This study used a quantitative type of research consisting of 2 treatments and each treatment consisting of 10 replications with the treatment comparing the prostaglandin hormones Lutalyse and Estron to the sexual response of 2 groups of Bali cows. The results showed that the percentage of heat in the prostaglandin trademark Lutalyst was 9 (90%) in heat and 1 (10%) in heat, while the treatment data was 2, the percentage of heatiness for prostaglandin, the Estron trademark, was 7 (70). %) and not in heat, namely 3 heads (3%). The intensity of lust on prostaglandins Lutalyse and Estron brands showed symptoms of heatstroke at scores 3 and 4 with the highest intensity in the treatment of Prostaglandin Lutalyse.

**Keywords:** Synchronization of Lust, Prostaglandin Hormones, Bali Cows.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan peternakan di Indonesia tidak lepas dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. Kemajuan sektor peternakan di Indonesia memerlukan SDM unggul dibidangnya, upaya peningkatan populasi sapi sebelumnya telah dimulai dengan program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB). Sejak program GBIB dilaksanakan pada 2012, populasi sapi di Indonesia hanya tumbuh 1,04% per tahun sepanjang 2012-2014. Tahun 2012, populasi sapi nasional tercatat 18,03 juta ekor, lalu pada 2013 anjlok menjadi 14,2 juta ekor, dan pada 2014 naik lagi menjadi 16,56 juta ekor.

Pemerintah pada akhir tahun 2016 ini telah mencanangkan program Upaya khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dengan menggunakan teknologi reproduksi IB. Pada program ini didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK. 210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Kementerian Pertanian 2016). Pada program ini, penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB sangat besar peranannya dalam meningkatkan tingkat kelahiran sapi milik peternakan rakyat. Melalui teknologi ini peternak dapat memiliki ternak yang berkualitas tanpa harus memiliki pejantan unggul (Salisbury dkk, 1978). Untuk memenuhi konsumsi daging per kapita yang kian meningkat dari tahun ke tahun, Kementerian Pertanian meluncurkan Program Sikomandan pada awal 2020.

Sikomandan atau Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri merupakan program lanjutan dari Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Saat peluncuran Program Sikomandan, Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan konsumsi daging masyarakat akan mencapai 700 ribu ton per tahun. Sedangkan kemampuan produksi Indonesia hanya 300 ribu ton per tahun. Oleh karenanya, Syahrul Yasin Limpo optimistis Program Sikomandan menjadi titik terang agar kebutuhan akan konsumsi daging terpenuhi tanpa perlu impor dari negara lain. Program Sikomandan bertujuan meningkatkan populasi dan produksi sapi juga kerbau secara berkelanjutan dengan cara Inseminasi Buatan (IB). Harapannya, kelahiran sapi dan kerbau meningkat tiap tahun, sehingga populasi sapi dan kerbau terus bertambah. Jumlah populasi kumulatif sapi dan kerbau cenderung fluktuatif sejak 2017, ketika periode pertama Program Upsus Siwab dijalankan. Tahun lalu, angka sementara menunjukkan populasi sapi dan kerbau meningkat menjadi 18,82 juta ekor. Tahun 2020 ini, saat Program Sikomandan diluncurkan, diproyeksikan populasinya kian membesar menjadi 20 juta ekor. Namun penerapan teknologi IB dalam program UPSUS SIWAB dan SIKOMANDAN masih memiliki kendala berupa tingkat keberhasilan termasuk tingkat fertilitasnya masih cukup rendah) oleh karena itu pelaksanaan program IB harus ditingkatkan tekniknya yaitu dengan penerapan teknologi sinkronisasi berahi (Sonjaya dkk, 2019).

Pada penerapan teknik sinkronisasi berahi agar ternak betina dapat diinseminasi pada waktu yang telah dipastikan bersamaan atau hampir bersamaan, biasa dilaksanakan baik pada sapi perah maupun pada sapi potong. Sinkronisasi

berahi bertujuan mengatur waktu IB sesuai ketersediaan waktu dan tenaga inseminator, karena memungkinkan terjadinya berahi dan pelayanan IB pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, bahkan dalam suatu daerah yang memiliki ketersediaan pakan yang berlangsung musiman, teknik ini dapat mengatur waktu beranak sesuai ketersediaan pakan (Kune dan Nurcholida, 2007).

Deteksi estrus merupakan salah satu faktor kegiatan yang penting dalam menentukan keberhasilan program Inseminasi Buatan. Pada saat berahi, kondisi induk sapi memungkinkan untuk terjadi perkawinan dan pembuahan, yang dicirikan oleh serviks membuka, adanya lendir di dalam organ reproduksi betina dan terjadinya ovulasi. Kurangnya pemahaman atau kesalahan dalam mendeteksi estrus akan menimbulkan kesulitan, bahkan kegagalan dalam melakukan perkawinan. Estrus yang serentak ataupun estrus yang hampir bersamaan pada sejumlah ternak betina akan memudahkan proses perkawinan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien (tenaga dan biaya) (Hartono dan Santosa, 2011).

Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam. Bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia, baik yang di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak

Berdasarkan konsep pemberdayaan peternak yang ada dalam Islam, bahwa menjaga dan memelihara hewan ternak merupakan kewajiban setiap umat muslim. Begitu pentingnya peternakan di mata islam karena sebagian besar para nabi adalah

peternak. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia tidak mencintai dunia peternakan sebab di dalam al-Qur'an terdapat surat yang diberi nama dengan nama hewan/ternak. Contoh nama surat tersebut adalah Al-Baqarah (sapi betina) Al-An'am (binatang ternak), An-Nahl (lebah), An-Naml (semut), Al-Fill (Gajah), dan beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama hewan ternak. Melihat hal tersebut, patut bagi umat muslim untuk menjadi bahan renungan. Berikut ini adalah ayat tentang pemanfaatan ternak untuk kesejahteraan manusia.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16:5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. (Kementerian Agama RI, 2020)

(Dan binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing. Lafal al-an`am dibaca nashab karena dinashabkan oleh fi`il yang diperkirakan keberadaannya lalu fi`il tersebut ditafsirkan atau dijelaskan oleh lafal berikut ini, yaitu: (Dia telah menciptakannya untuk kalian) sebagian dari manusia (padanya ada kehangatan) yaitu bulu dan kulitnya dapat dibuat pakaian dan selimut untuk penghangat tubuh kalian (dan berbagai manfaat) yaitu dari anak-anaknya, air susunya dan dapat dijadikan sebagai kendaraan (dan sebagiannya kalian makan) zharaf didahulukan karena untuk tujuan fashilah (Tafsir Jalalain).

Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingan, seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya

juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam (bajak), dan alat industri lain (seperti peremas tebu). Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama.

Bagi peternak perlu mengamalkan ilmu atau keterampilan baru yang berguna untuk kesejahteraannya di dunia. Ilmu peternakan baru yang patut untuk dipelajari adalah ilmu tentang pembuatan pakan, kesehatan ternak, dan manajemen reproduksi pada ternak. Dengan ilmu tersebut maka peternak dapat mengembangkan peternakan dengan baik sehingga menjadikan peternak sapi potong mandiri. Oleh sebab itu, setiap peternak harus menyadari betapa pentingnya ilmu baru guna kesejahteraan peternak sapi.

Dalam Al-Qur'an manusia berperan sebagai kholifah dimana manusia mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Pada pandangan etika kekhalifahan, tidak di benarkan seseorang memetik bunga sebelum mekar karena ini mengakibatkan makhluk tersebut tidak mencapai tujuan penciptaanya. Darisisi Islam memperkenalkan apa yang dinamakan "persaudaraan semakhluk". Sebagai khalifah manusia harus mampu bersikap bijak dalam segala permasalahan, baik yang menyangkut permasalahan manusia itu sendiri ataupun permasalahan tentang lingkungan. Pada permasalahan lingkungan Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga dan melestarikanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'araf/7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Kementerian Agama RI, 2020)”

(Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi) dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat (sesudah Allah memperbaikinya) dengan cara mengutus rasul-rasul (dan berdoa lah kepadanya dengan rasa takut) terhadap siksaan-Nya (dan dengan penuh harap) terhadap rahmat-Nya. (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang yang taat (tafsir Jalalayn) sedangkan pada Tafsir Quraish Shihab mengemukakan bahwa Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan berharap pahala-Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana.

Hasbi berpandangan bahwa membuat kerusakan di bumi, meliputi usaha memusnakan manusia dengan pembunuhan dan penganiayaan, usaha merusak harta dengan mencuri dan merampas, merusak agama dengan kufur dan melakukan maksiat, serta merusak akal dengan minuman yang memabukan. Sedangkan Hamka tentang ayat diatas berpandangan bahwa manusia telah banyak membawa kemajuan dalam bidang kehidupan. Perbaikan pada pabrik, perbaikan pada lalu lintas dunia, perbaikan pada hidup yang lebih mewah, tapi sangat sedikit pada ikhtiar perbaikan pada jiwa manusia, sehingga kian lama dimuka bumi ini rasa permusuhan dan dendam lah yang tumbuh dimana-mana diantara bangsa-bangsa itu. Maka seorang muslim yang sadar akan agamanya mempunyai kewajiban supaya jangan

menambah kerusakan yang telah rusak, melainkan memelihara menyelesaikan yang telah ada, jangan di rusak lagi, dan berusaha membuat yang lebih baik dan selesai.

Proses sinkronisasi berahi pada ternak sapi biasanya menggunakan hormon berbasis zat aktif Prostaglandin dengan merek dagang yang berbeda, sehingga efektivitas hasilnya berbeda. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul respon berahi sapi bali terhadap penyuntikan sinkronisasi hormon prostaglandin dengan merek dagang yang berbeda.

### **B. Rumusan Masalah**

Prinsip induksi hormon Prostaglandin adalah melisiskan corpus luteum (CL) yang masih aktif, sehingga produk CL, yaitu hormon progesteron turun dan hambatan negatif terhadap hipotalamus dan hipofisa anterior tidak ada akhirnya hormon gonadotropin disekresikan dan merangsang pertumbuhan folikel serta terjadinya berahi. Efektifitas terjadinya berahi dipengaruhi oleh karakteristik hormon prostaglandin yang dibuat perusahaan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui perbandingan hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi sapi bali ?

### **C. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyuntikan hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi sapi bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang perbandingan hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi sapi bali.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Integrasi**

Kehadiran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw telah dapat menjamin kehidupan umat manusia sejahtera lahir dan batin. Manusia pasti akan merasa tidak lengkap kehidupannya bila di sekitarnya tak ada makhluk yang bernama hewan. Kita tidak pernah bayangkan, betapa sepiya hidup kita kalau tak ada bunyi kokok ayam di pagi hari, kicauan burung di sore hari. Hewan diciptakan Allah swt sebagai pelengkap kehidupan manusia, demi kepentingan Allah swt memberikan rahmat untuk hamba-Nya, seluruh alam dan isinya. “Sesungguhnya Allah swt, memiliki 100 macam rahmat (kebaikan) yang akan diturunkan satu rahmat dari pada-Nya di antara jin, manusia, binatang-binatang dan harimau. Dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai, dan dengan rahmat itu pulalah binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah akan mengakhirkan rahmat-Nya itu yang masih sebanyak 99 macam lagi untuk diberikan rahmat itu kepada hamba-Nya pada hari kiamat (HR-Bukhari Muslim)”.

Dalam beberapa penjelasan baik pandangan secara umum (KBBI) maupun pandangan dari para mufasir yang dinamakan lingkungan hanyalah segala sesuatu yang mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia. Sedangkan manusia mempunyai keterbatasan untuk mengetahui apa-apa saja yang mempunyai hubungan timbal balik/bermanfaat terhadap dirinya. Dan hal ini tentunya akan memunculkan pandangan bahwa jika manusia tidak mengetahui

hubungan timbal balik/manfaat sesuatu terhadap dirinya maka manusia tidak menganggap itu sebagai lingkungan. Dari pandangan ini manusia akan cenderung merasa boleh mengeksploitasinya secara berlebihan/merusaknya. Bahkan yang mereka anggap mempunyai hubungan timbal balik juga akan terancam dirusak jika kita menggunakan sudut pandang bahwa semua itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Dari pandangan-pandangan para mufasir maka kita mengetahui bagaimana peran manusia yang seharusnya menjaga alam, akan tetapi mereka malah merusaknya. Kerusakan yang di timbulkan berjalan terus menerus, dan sampai sekarang belum ada tindakan untuk menghentikan eksploitasi terhadap alam.

Alam merupakan tempat dimana manusia tinggal, hidup dan berkembang biak. Hubungan alam dan manusia pun saling terkait. Hubungan keterkaitan ini dalam istilah ilmu biologi disebut simbiosis mutualisme. Dari alam manusia mendapatkan penghidupan. Tanpa dukungan dari alam, kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya terancam, buktinya, berapa banyak korban yang ditelan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, asap tebal, tsunami, lumpur lapindo dan lain sebagainya. Karena itulah manusia memiliki peranan penting dalam hal ini (menjaga dan melestarikan alam), tidak untuk mencari kesenangan semata dengan cara merusak alam dan mengeksploitasi bumi habis-habisan dengan tanpa menghiraukan akibat selanjutnya Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri.

Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia.

Keberadaan hewan di alam mempunyai 3 fungsi utama:

1. Sebagai hewan ternak, yaitu apabila hewan telah didomestikasi dan dapat dibudidayakan untuk diambil hasil dari pemeliharaan tersebut. Misalnya untuk memperoleh daging, susu atau telur. Misalnya untuk jenis sapi pedaging atau juga disebut sapi potong maka tujuan pemeliharaannya utamanya untuk diambil dagingnya. Sapi perah dipelihara khususnya untuk mendapatkan susunya. Sementara untuk jenis unggas, tujuannya ada yang untuk mendapatkan dagingnya dan yang lainnya untuk mendapatkan telurnya. Mengenai hal ini telah diterangkan dalam *Al-Quran Asy-syu'ara/26: 133*

أَمْذَكُمْ بَأْنَعَامٍ وَبَيِّنِينَ ۙ ١٣٣

Terjemahnya:

“Dia (Allah) telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak (Kementerian Agama RI, 2020)”

Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi Yaitu unta, sapi dan kambing. Yakni Dia memperbanyak harta dan

keturunan kamu. Nabi Hud ‘alaihi salam mengingatkan mereka nikmat-nikmat-Nya, dan selanjutnya mengingatkan mereka terhadap azab Allah ‘Azza wa Jalla.

2. Sebagai hewan kesayangan, yaitu apabila tujuan hewan tersebut dipelihara adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lain karena menjadi teman, menikmati keindahan tubuhnya, menikmati suaranya, menikmati kecerdasannya untuk hal-hal tertentu dan sebagainya. Biasanya hewan kesayangan tidak bisa dinilai dengan materi oleh pemiliknya. Contoh dari hewan kesayangan biasanya adalah kucing, anjing, burung piaraan, dan jenis hewan lainnya.

3. Sebagai hewan liar, yaitu hewan-hewan yang dikategorikan hewan yang masih bebas di alam, hewan ini lebih berfungsi sebagai penyeimbang alam mi kelestarian ekosistem.

4. Sebagai penyedia Jasa, meski hal ini sudah jarang dilakukan tetapi tetap perlu diperhitungkan misalnya masih ada yang sampai saat ini menggunakan hewan sebagai alat pengangkut barang, demikian juga sebagai hewan tunggangan, atau penarik pedati.

Kepentingan yang paling utama dari hewan adalah sebagai penyedia pangan asal hewan sebagai sumber protein untuk kehidupan yang lebih sehat. Kita ingin mendapatkan pangan dari hewan tersebut berdasar asas manfaat. Artinya hewan sebagai sumber daging, susu atau telur yang kita inginkan adalah kandungan gizi didalamnya, biasa disebut produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Aman dalam artian tidak berbahaya terhadap kesehatan Sehat artinya mempunyai kandungan gizi Menurut as-Shobuni (2000), kata al-An’am menunjukkan bahwa hewan tersebut diciptakan oleh Allah swt semata-

mata untuk kemaslahatan manusia seperti unta, sapi, dan kambing. Sedangkan kata Manafiu menjelaskan bahwa pada hewan tersebut mengandung banyak manfaat salah satu diantaranya bermanfaat untuk anak keturunan adam, sebagai tunggangan, susu dan dagingnya dapat dimakan.

Sayyid Quthb (2003), berpendapat bahwa binatang ternak yang dulu pernah hidup dan dikenal di Jazirah Arab adalah unta, sapi, domba, dan kambing. Pada binatang ternak terdapat yang menghangatkan (bulu) dari jenis kulit, wol, kapas, dan rambut. Semua ini banyak sekali manfaatnya, begitu pula yang terdapat pada susu, daging, dan lain sebagainya. Dari situlah kita makan dagingnya, susunya, dan minyaknya.

Allah swt memberikan anugerah kepada hamba-Nya dengan apa yang diciptakan untuk mereka, berupa binatang-binatang ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Dan Allah swt menjadikan pula untuk mereka kemaslahatan dan kemanfaatan yang terdapat pada binatang-binatang itu, dapat minum susunya dan makan anak-anak binatang tersebut (Katsir, 2004).

Allah swt telah menjelaskan berbagai manfaat hewan ternak salah satunya sapi yang dijadikan objek dalam penelitian ini, manusia sebagai hambanya yang telah diberi anugerah tersebut harus menjaga, memelihara dan membantu keberlangsungan reproduksi binatang ternak tersebut agar binatang ternak yang dimaksud tetap dapat dimanfaatkan oleh keturunannya. Oleh karena itu dibutuhkanlah ilmu dan wawasan yang baik demi ketidak punahan binatang ternak, akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat, para peternak sering mengalami kegagalan bunting yang mengakibatkan rendahnya efisiensi

reproduksi sapi (dalam hal ini sapi perah). Rendahnya efisiensi reproduksi pada sapi perah mengindikasikan terjadinya gangguan reproduksi yaitu kawin berulang. Kejadian kawin berulang melanda hampir di seluruh dunia, yaitu berkisar antara 5,5-33,3% (Gustafsson dan Emanuelsson, 2002; Yusuf dkk, 2010).

Tingginya kejadian kawin berulang merupakan permasalahan dunia peternakan yang harus segera diatasi karena sangat merugikan peternak. Penyebab kawin berulang pada dasarnya disebabkan karena kegagalan fertilisasi dan akibat kematian embrio dini (Linares et al., 1980; Gustafsson, 1985). Kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini pada umumnya disebabkan karena faktor infeksi, gangguan hormonal, lingkungan, nutrisi, dan manajemen (Robert, 1986; Copelin et al., 1986). Faktor kesalahan manajemen (peternak) seperti jenis lantai kandang (Britt et al., 1986), rendahnya pemahaman siklus estrus dan diestrus, tidak akuratnya deteksi estrus, ketepatan perkawinan, rendahnya nutrisi, dan lingkungan (Windig et al., 2005) dapat menyebabkan kegagalan kebuntingan yang ditandai dengan adanya gejala kawin berulang.

Rasulullah saw pada dasarnya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak adalah bagian yang sangat penting dalam pembinaan kepribadian serta moral yang dimana akhlak tidak dapat terpisahkan dari ajaran islam.

Sebagaimana dalam sebuah hadis:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku diutus (Allah) adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Sebagai makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, secara sadar, manusia harus memelihara kelestarian lingkungannya, menjaga dan memanfaatkan alam terutama berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Akhlak terhadap hewan dapat dilakukan dengan cara memperlakukan hewan dengan baik dengan cara memberikan kesejahteraan pada ternak. Kesejahteraan ini melingkupi fisik dan mental sehingga terdapat banyak aspek yang dapat menilainya. Animal welfare atau kesejahteraan hewan dapat diartikan sebagai kondisi kecukupan dari aspek fisik dan mental (psikis) yang memperhatikan kebutuhan dasar hewan ternak. Kesejahteraan hewan dalam peternakan adalah memperlakukan hewan ternak sebagaimana mestinya dari aspek fisik dan psikis hewan ternak serta layak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar hewan dalam peternakan (Moss 1992) sebagai berikut:

1. Kondisi nyaman dan perlindungan yang layak.
2. Kecukupan air yang bersih dan pakan untuk menjaga kesehatan.
3. Kebebasan dalam bergerak.
4. Kebebasan untuk berinteraksi dengan hewan lain.
5. Kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan perilaku alaminya.
6. Pencahayaan yang cukup.
7. Lantai yang baik dan tidak rusak.

8. Pencegahan atau diagnosa berkala, pengobatan dari yang buruk, perlukaan, infestasi parasit dan penyakit.

9. Pencegahan dari pemotongan yang tidak beralasan.

Perhatian terhadap kebutuhan dasar ini secara langsung menjadi bagian dari prinsip kesejahteraan hewan. Prinsip pelaksanaan kesejahteraan hewan menurut OIE (Office International des Epizootica) dapat diterapkan pada hewan yang diperuntukkan dalam peternakan. Kesejahteraan hewan dapat diterapkan pada peternakan dari hulu hingga hilir dimana hewan mendapat perlakuan. Hal ini membuat perlakuan harus mensejahterakan hewan ternak di dalam peternakan, pasar hewan, proses transportasi hingga di rumah potong hewan. Proses mensejahterakan hewan ternak dari bagian hulu peternakan hingga bagian hilir (stable to table) sangat erat kaitannya dan terhubung dengan etika serta profesionalitas dokter hewan (WVA1997).

Masalah-masalah pokok ini secara garis besar dapat diperbaiki dengan memperhatikan kriteria penilaian kesejahteraan hewan. The Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) di United Kingdom percaya bahwa kesejahteraan pada hewan ternak dapat dipenuhi melalui pemenuhan lima kebebasan. Lima kebebasan (five freedom) diantaranya freedom from hunger and thirst (bebas dari lapar dan haus), freedom from discomfort (bebas dari ketidaknyamanan), freedom from pain, injury, and disease (bebas dari sakit dan penyakit), freedom from fear and distress (bebas dari takut dan tertekan) dan freedom to express normal behavior (bebas melakukan perilaku normal). Berdasar

dari five freedom tersebut maka masalah-masalah pokok kesejahteraan hewan dapat diatasi dengan tindakan seperti :

1. Perbaiki manajemen kandang.

Perbaikan manajemen kandang akan membuat hewan menjadi nyaman, tidak tertekan dan tidak takut. Hewan ternak akan tercukupi karena kondisi lantai yang baik, bahan perkandangan tidak melukai, penerangan yang nyaman, sanitasi yang baik (udara dan air bersih), pakan yang sehat, suhu dan kelembaban sesuai, pengelompokan umur yang sesuai dan kepadatan yang sesuai.

2. Perbaiki manajemen kesehatan.

Perbaikan manajemen kesehatan ini akan memberi kesehatan optimum dari hewan ternak karena program pemeriksaan berkala, pengobatan dan pemberian nutrisi yang cukup.

3. Perbaiki perilaku alami hewan. Perilaku alami hewan ternak bisa teraktualisasikan jika terdapat ruang yang cukup, adanya kesempatan, tidak tersakiti dan tidak terganggu.

4. Perbaiki penanganan penyakit. Dalam penanganan wabah penyakit pada hewan ternak terkadang dalam pemusnahan masal hewan yang terjangkit penyakit dilakukan tidak dengan manusiawi. Hewan yang terjangkit penyakit sebisa mungkin dalam memusnahkannya, hewan ternak tidak merasakan sakit. Hewan yang sakit selayaknya mendapat pemeriksaan, pengontrolan, dan pengobatan.

Beberapa hal tentang ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pemuliaan terdapat juga al-Hadist yang menggunakan hewan sebagai contoh. “Seorang laki-

laki mendatangi Nabi saw dan berkata: Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan anak yang berkulit hitam. Beliau bertanya : apakah kamu memiliki beberapa ekor unta? Ia menjawab: laki-laki itu menjawab: ya. Beliau melanjutkan bertanya: lalu apa saja warna kulitnya? Ia menjawab: Merah. Beliau bertanya lagi. Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu- abuan? Laki-laki itu menjawab: ya. Beliau bertanya: Kenapa bisa seperti itu? Laki-laki itu menjawab: mungkin itu berasal karena faktor keturunan. Beliau bersabda: Mungkin juga anakmu seperti itu (karena faktor keturunan) (HR-Al Bukhari). “Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan, dijadikannya kamu berkembang-biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S.:Asy-Syura/42 :11).

فَاطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۱

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Kementerian Agama RI, 2020)”

Tafsir Muyassar Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh: Allah Pencipta langit dan bumi dengan kekuasaan, kehendak, dan hikmah-Nya. Dia menjadikan pasangan dari diri kalian agar menjadi tenteram bersamanya, menjadikan hewan ternak berpasangan jantan dan betina, memperanakan kalian sehingga menjadi banyak. Tidak ada suatu makhluk pun yang serupa dan semisal dengan-Nya, tidak dalam

Dzat, nama, sifat, atau perbuatan-Nya. Semua nama-Nya adalah baik, sifat-Nya sempurna dan agung, perbuatan-Nya dalam menciptakan makhluk tidak bersekutu dengan yang lain. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun dari perbuatan dan ucapan makhluk yang tersembunyi dari pengawasan-Nya. Dia akan memberi balasan akan hal itu.

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an diterangkan bahwa pertanyaan yang diajukan bani Israil adalah perbuatan yang mempersempit daerah pilihannya (memilih sapi betina), pada awalnya masalah ini adalah lapang, mereka diperintah mencari sapi yang bersifat umum. Namun karena kebodohan mereka sendiri, mereka terbebani dengan mencari sapi betina yang lebih spesifik.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:68-69

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بُكْرٌ ۖ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْتُهَا تُسْرُ النَّظِيرِينَ ٦٩

Terjemahnya:

“68. Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang (sapi betina) itu.” Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, (tetapi) pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”

69. Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya.” Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman, bahwa (sapi) itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.”

Dalam tafsir Aidh al-Qarni dijelaskan pula bahwa warna kuning merupakan warna terbaik pada binatang, karena membuat terpesona bagi orang-orang yang memandangnya. Ada yang berpendapat mengenai warna sapi tersebut adalah warna hitam pekat, namun pendapat yang paling kuat adalah sesuai dengan makna lahir dalam Al Qur'an, yang menyebutkan sapi tersebut berwarna kuning

tua. Dalam tafsir Aidh al-Qarni disebutkan bahwa alasan mencari sapi yang tidak tua dan tidak muda adalah karena pada usia tersebut seekor sapi sedang berada pada masa pertumbuhan yang baik.

Dalam ayat 68 telah dijelaskan bahwa mereka dibebani dengan mencari sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, dan sekarang pada ayat 69 mereka lebih terbebani lagi dengan sapi yang berwarna kuning dan dapat membuat senang orang-orang yang memandangnya. Menyenangkan orang yang memandang tidak bisa terjadi kecuali jika tidak terdapat keindahan, vitalitas, kegesitan, dan warna yang indah. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rewel, namun mereka malah bertindak lebih dari itu dengan cara mempersulit diri sendiri, sehingga Allah SWT mempersulit mereka.

Manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan alam (bumi) ini untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ini. Manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengolah potensi alam yang diberikan Allah kepada manusia merupakan fardhu kifayah, karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menggali potensi alam yang diberikan tersebut. Untuk itu apabila manusia menyalahgunakan potensi alam artinya tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berarti mengabaikan fungsi manusia terhadap alamnya. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah/45:13

وَنَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ أَنْفِيَ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”

Tafsir Al-Mishbah oleh Muhammad Quraishyah Shihab “Hanya Dia pula yang, untuk maslahat kalian, menundukkan seluruh benda langit yang berupa bintang- bintang yang gemerlapan dan bermacam planet, dan semua yang ada di bumi berupa tanaman, susu yang banyak, tanah yang subur, air, api, udara, dan padang pasir. Semua itu ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala untuk menjamin kebutuhan hidup. Nikmat-nikmat yang disebutkan itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang mau merenungkan ayat-ayat itu”.

Dalam memenuhi tanggung jawab manusia terhadap alam, hendaknya selalu diusahakan agar keselamatan manusia tidak terganggu. Tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebih-lebihan, agar generasi mendatang masih dapat menikmatinya, karena potensi alam terbatas.

Sejatinya manusia mampu membuat rencana yang hebat. Mampu merencanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuannya dengan detail dan rinci. Akan tetapi, sebagus-bagusnya rencana manusia ketika Allah tidak meridhoi rencana itu terjadi manusia mampu berbuat apa. Mau tidak mau kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita baik ataupun buruk. Sehingga kita seringkali tidak menerima keadaan dan seringkali menyalahkan takdir Allah yang salah terhadap dirinya. Manusia mulai merasa bahwa nikmat yang diberikan Allah

adalah suatu ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Al-Quran Surah Al-Furqan/25:2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemahnya:

“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat”

Tafsir Al-Mishbah oleh Muhammad Quraish Shihab: Hanya Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan ukuran dan aturan yang sangat cermat kepada masing-masing berupa rahasia-rahasia yang dapat menjamin keberlangsungan tugasnya secara teratur (sistematis). Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa semua makhluk, dari sisi kejadian dan perkembangan yang berbeda-beda, berjalan sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan bersifat konstan. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah, Zat Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa.

Dari sisi kejadiannya, sudah jelas bahwa semua makhluk—terlepas dari perbedaan jenis dan bentuknya—terdiri atas kesatuan unsur-unsur yang sangat terbatas jumlahnya, hampir seratus unsur. Dari jumlah itu, baru sembilan puluh unsur di antaranya sudah dikenal saat ini. Sifat-sifat alami, kimiawi dan berat atomnya tumbuh secara berangsur-angsur

Demikian pula yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Masing-masing terbagi pada kelompok dan jenis yang berbeda. Sedangkan dalam tahapan perkembangannya, sifat-sifatnya berkembang dari makhluk hidup bersel

satu, seperti mikrobat, sampai kepada makhluk hidup yang bersel banyak, seperti manusia yang dapat dikatakan paling sempurna. Setiap jenis memiliki sifat-sifat tertentu yang diwarisi dari generasi ke generasi.

Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah, sebaliknya adanya hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah dan lain sebagainya. Begitu pula Allah mengatur setiap kebutuhan manusia dan menempatkan kondisi manusia dalam berbagai macam hal yang berbeda. Karena yang sedemikian itu adalah sebuah ketentuan yang sudah pasti baik adanya dan seharusnya manusia juga mampu mengimani sampai sedalam itu Semua itu berjalan menurut hukum dan aturan yang bersifat konstan dan teliti yang menggambarkan secara jelas kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Sapi Bali**

Sapi Bali (*Bos sondaicus*) merupakan sapi asli dari Indonesia yang diduga merupakan hasil *domestikasi* dari banteng liar. Sebagian ahli yakin bahwa proses *domestikasi* tersebut terjadi di Bali sehingga disebut sapi Bali. Sapi Bali menyebar ke pulau-pulau yang berada disekitar Bali yaitu melalui komunikasi antar raja-raja pada zaman dahulu (Guntoro, 2002).

Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala, dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariaanya. Hal ini terlihat dari lahirnya keputusan dewan Raja-Raja di Bali tanggal 25 Juli 1947

yang isinya dibuat untuk mempertahankan kemurnian genetik sapi Bali. Hal ini juga diperkuat dengan pergub Bali no. 45 tahun 2004, tentang pelestarian sapi Bali, dimana sapi dari luar Bali (termasuk juga sapi Bali) dilarang dimasukkan dan dipelihara di Bali, dengan demikian sapi bali yang ada di Bali sampai saat ini masih terjaga kemurnian genetiknya (Astuti, 2018). Adapun Taksonomi Zoologi sapi bali sebagai berikut:

Kingdom : *Animalia*  
Phylum : *Chordata*  
Class : *Mamalia*  
Ordo : *Artiodactyla*  
Sub-ordo : *Ruminantia*  
Family : *Bovidae*  
Genus : *Bos*  
Species : *Bos Sondaicus*.

Sapi bali merupakan jenis sapi yang sudah beradaptasi dengan lingkungan di daerah tropis, yang dapat dilihat dari tingkat reproduksi dan tidak selektif terhadap pakan yang tersedia. Dengan latar belakang yang menonjol ini, sapi bali sangat berpotensi untuk ditingkatkan produktivitasnya. Berdasarkan hal tersebut sapi bali telah disebarkan ke daerah lain di indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan daerah transmigrasi (Ardika, R, dan Djegho, 2011).

Guntoro, 2002 dalam bukunya menjelaskan bahwa ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sapi Bali betina adalah sebagai berikut:

1. Warna bulu pada badan merah bata
2. Tanduk agak berada di bagian dalam dari kepala, mengarah *latero-dorsal* dan membelok *dorsa-medial*
3. Tubuh relatif lebih kecil dibandingkan tubuh pada sapi jantan dan berat sapi dewasa 250-350 kg.

Pada saat lahir baik sapi Bali jantan maupun sapi Bali betina, memiliki bulu berwarna merah bata. Setelah dewasa kelamin, warna bulu sapi Bali jantan akan berubah menjadi hitam hal ini terjadi karena adanya pengaruh hormon testosteron (hormone kelamin betina). Karena itu apabila sapi Bali jantan dikelibiri, warna bulunya yang jantan akan berubah menjadi merah (Guntoro, 2002).

Lokasi penyebaran sapi Bali saat ini telah meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Jumlah sapi Bali terbesar adalah Sulawesi, NTB dan NTT (Guntoro, 2002). Sapi Bali memiliki keunggulan yaitu daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, mudah digemukkan dan produksi karkasnya tinggi. Namun sapi Bali juga memiliki kelemahan yaitu berahi setelah melahirkan panjang, interval beranak panjang, serta rentan terhadap beberapa jenis penyakit (Sugeng, 1993). Menurut Kardasih (2003), Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi. Perkembangan tubuh ternak sapi selain faktor genetik ternak, dipengaruhi oleh faktor sistem manajemen pemeliharaan, faktor lingkungan antara lain ketinggian tempat, curah hujan, ketersediaan air, suhu lingkungan, faktor penyakit, dan lain-lain (Rachma, 2007).

## **2. Reproduksi Sapi Bali**

Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi ternak dipengaruhi oleh lima . hal yaitu angka kebuntingan (*conception rate*); jarak antar kelahiran (*calving interval*); jarak waktu antara melahirkan sampai bunting kembali (*service periode*); angka kawin perkebuntingan (*service per conception*); angka kelahiran (*calving rate*) (Hardjopranjoto, 1995)

Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah melahirkan anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk kelahiran- kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua dan seterusnya (Hafez, 2000).

Daya reproduksi ternak pada umumnya dipengaruhi terutama lama kehidupan, dimana lama kehidupan produktif sapi potong lebih lama bila dibandingkan dengan sapi perah yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6 sampai 8 anak. Faktor ini sangat penting bagi peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis yang sangat penting (Toelihere, 1997).

(Sutiyono dan Samsudewa 2008) menjelaskan bahwa Organ reproduksi betina terdiri atas 3 komponen yaitu:

- a. Organ reproduksi primer, Organ reproduksi primer betina terdiri dari Ovaria (tunggal ovarium), yang menghasilkan ovum dan hormon-hormon reproduksi betina

b. Organ reproduksi sekunder, Organ reproduksi sekunder betina terdiri dari saluran reproduksi yang terdiri dari: tuba fallopi/oviduct, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Fungsi organ reproduksi sekunder hewan betina adalah menerima dan menyalurkan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, memberi makan dan melahirkan individu yang ada didalamnya


c. Organ pelengkap, organ reproduksi pelengkap pada hewan betina yaitu kelenjar mammae yang akan menghasilkan air susu untuk mendukung pertumbuhan pedet.

### **3. Siklus Berahi Pada Sapi**

Ternak betina memiliki berahi pada interval waktu yang teratur, namun berbeda dari spesies satu ke spesies yang lainnya (Frandsen, 1993). Berahi yaitu suatu periode fisiologis pada hewan betina yang bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Siklus berahi dibagi menjadi dua fase yang dapat dibedakan dengan jelas yaitu fase folikuler dan fase luteal (Sonjaya, 2006). Deteksi berahi yang tepat merupakan kunci utama keberhasilan IB, serta kecepatan dan ketepatan pelaksanaan IB itu sendiri dilaksanakan (Feradis, 2014).

Interval antara timbulnya satu periode estrus ke permulaan periode berikutnya disebut sebagai suatu siklus estrus. Siklus estrus terdiri atas 4 fase atau periode yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus (Marawali, dkk., 2001). Pada ternak sapi (Sonjaya, 2007) membagi siklus berahi yang terdiri atas fase folikuler dan fase luteal dimana fase folikuler terjadi dimana folikel sedang tumbuh dimulai pada saat progesterone turun sampai estrogen naik, pada saat progesterone meningkat progesterone aktif maka *corpus luteum* aktif dan

menghasilkan progesteron. Berikut ini dapat dilihat level hormon dan ovarium pada siklus estrus.



Gambar 2.1. Level Hormon dan Aktivitas Ovarium pada Siklus Estrus (Mottershead, 2001)

Menurut buku lama terdapat 4 golongan siklus estrus pada sapi yaitu Proestrus adalah fase sebelum estrus yang ditandai dengan folikel de graaf tumbuh di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol yang makin bertambah. Pada periode ini terjadi peningkatan di tuba fallopi, sekresi estrogen ke urine meningkat, dan terjadi penurunan konsentrasi progesteron dalam darah. Pada akhir periode ini hewan betina biasanya memperlihatkan perhatiannya pada hewan jantan (Toelihere, 1985).

Estrus didefinisikan sebagai periode yang ditandai oleh keinginan kelamin dan penerimaan pejantan oleh hewan betina (Toelihere, 1985). Menurut Frandson (1993), fase estrus ditandai dengan sapi yang berusaha dinaiki oleh sapi pejantan, keluarnya cairan bening dari vulva dan peningkatan sirkulasi sehingga tampak merah. Lama estrus pada sapi sekitar 12--24 jam (Toelihere, 1985 dan


Putro, 2008). Selama atau segera setelah periode ini, terjadilah ovulasi. Ini terjadi dengan penurunan tingkat FSH dalam darah dan kenaikan tingkat LH. Sesaat sebelum ovulasi, folikel membesar dan turgid serta ovum yang ada di situ mengalami pemasakan. Estrus berakhir kira-kira pada saat pecahnya folikel ovarium atau terjadinya ovulasi (Frandsen, 1993).

Metestrus adalah periode setelah estrus yang ditandai dengan corpus luteum tumbuh cepat dari sel-sel granulosa (Toelihere, 1985). Panjangnya metestrus dapat tergantung pada panjangnya LTH (Luteotropic Hormone) yang disekresi oleh adenohipofisis. Selama periode ini terdapat penurunan estrogen dan kenaikan progesteron yang dibentuk oleh ovarium (Frandsen, 1993). Selama metestrus, rongga yang ditinggalkan oleh pemecahan folikel mulai terisi dengan darah. Darah membentuk struktur yang disebut korpus hemoragikum. Setelah sekitar 5 hari, korpus hemoragikum mulai berubah menjadi jaringan luteal, menghasilkan *corpus luteum*. Fase ini sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh *corpus luteum* (Frandsen, 1993). Pada sapi, kuda, babi, dan domba lama metestrus kurang lebih 3--4 hari (Toelihere, 1985).

Diestrus adalah periode terakhir dan terlama pada siklus estrus, corpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata (Marawali, dkk., 2001). Pada fase ini mulai terjadi perkembangan folikel-folikel primer dan sekunder dan akhirnya kembali ke proestrus. Pada sapi lama diestrus kurang lebih 13 hari (Toelihere, 1985).

Pengaturan siklus berahi melibatkan interaksi timbal balik antara hormon-hormon reproduksi pada hipotalamus, pituitari anterior, dan ovarium.

Progesteron mempunyai peranan dominan dalam mengatur siklus berahi. Selama diestrus dengan fungsional corpus luteum, konsentrasi hormon progesteron yang tinggi menghambat pelepasan FSH dan LH melalui kontrol umpan balik negatif terhadap hipotalamus dan pituitari anterior, yang juga progesteron menghambat tingkah laku estrus. Dan juga selama kebuntingan progesteron menghambat pelepasan hormon gonadotropin dan juga tingkah laku estrus. Untuk kontrol hormon pengaturan siklus berahi ini telah digambarkan pada bab sebelumnya mengenai regulasi hormon reproduksi (Yusuf, 2012).



Gambar 2.2 Mekanisme hormonal dalam siklus berahi (Sonjaya, 2007)

Gambar 2.2. Memperlihatkan ketika Hypotalamus mendapatkan rangsangan maka akan mensekresikan hormon GnRH yang akan merangsang Hipofisa Anterior untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Hormon pemacu folikel (FSH) (FSH) dari Hipofisa Anterior menggalakkan pertumbuhan folikel di ovarium. Di bawah pengaruh hormon itu satu atau lebih dari satu folikel dapat

tumbuh menjadi cukup besar untuk membentuk benjolan bening dipermukaan ovarium (folikel matang). Karena pertumbuhan ini, ovarium menghasilkan hormon yang disebut estrogen, yang menyebabkan sapi dara atau sapi dewasa menampakkan tanda-tanda berahi. Hormon kedua dari Hipofisa Anterior, yaitu LH untuk membantu terjadinya ovulasi dan pengawalan pertumbuhan tenunan luteal untuk membentuk korpus luteum didalam rongga yang ditinggalkan oleh folikel yang pecah. Dibawah pengaruh hormon ketiga dari kelenjar Hipofisa Anterior, hormon luteotropik, korpus luteum mulai memproduksi hormon progesteron yang menghambat pendewasaan lebih banyak folikel dan mempersiapkan uterus untuk menerima dan memelihara ovum yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan tetap aktif untuk 17 sampai 19 hari, dan pada akhir waktu itu FSH memacu folikel lain untuk menjadi masak. Dalam waktu 2 sampai 3 hari cukup estrogen yang terbentuk untuk menyebabkan berahi lagi (Sonjaya, 2012).

#### **4. Metode Sinkronisasi Berahi**

Sinkronisasi berahi merupakan suatu usaha untuk menimbulkan berahi ada sekelompok ternak secara bersamaan sehingga diperoleh peningkatan angka kebuntingan. Dengan dilakukannya sinkronisasi berahi, maka penanganan reproduksi akan lebih efektif. Hal ini didasarkan pada periode kebuntingan yang sama, proses kelahiran akan serentak serta waktu melahirkannya dapat diatur (Natalia, 2016).

Beberapa hormon yang berperan dalam proses reproduksi khususnya dalam sinkronisasi berahi diantaranya hormon prostaglandin ( $\text{PGF2}\alpha$ ), GnRH,

estrogen dan progesteron. Sinkronisasi berahi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan hormon prostaglandin dengan satu kali penyuntikan. Kelemahan sinkronisasi berahi dengan metode ini adalah ternak harus berada dalam keadaan siklik (terdapat korpus luteum). Salah satu metode sinkronisasi yang banyak dikembangkan adalah metode Ovsynch (Natalia, 2016).

Ovsynch adalah salah satu metode sinkronisasi ovulasi dengan menggunakan kombinasi hormon GnRH dan PGF2 $\alpha$ . Metode Ovsynch difokuskan kepada sinkronisasi terjadinya ovulasi dan dilakukan inseminasi pada waktu yang telah ditentukan. Keunggulan metode ini adalah waktu tepat ovulasi dapat ditentukan sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendeteksi berahi. Metode Ovsynch ini lebih banyak dilakukan pada bangsa sapi Eropa dan pada sapi perah namun masih terbatas dilakukan pada sapi Bali. (Natalia, 2016).

Sinta dan Carpenter, (2007) menyatakan bahwa PG satu suntikan (diperlukan deteksi estrus 12 hari) Ini adalah program berbiaya rendah dan berisiko rendah. Ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, tetapi itu juga memungkinkan hewan diamati untuk siklus. Oleh karena itu, kemungkinan limbah semen pada hewan non daur ulang diminimalkan. Hari 0 hingga 6. Tidak ada suntikan yang diberikan. Mulai deteksi estrus dan IB dengan aturan AM-PM (yaitu, wanita diinseminasi 12 jam setelah onset estrus). Lanjutkan deteksi estrus dan IB selama 6 hari. Hari 0 harus bertepatan dengan awal musim kawin yang biasa. Hari 6. Hitung persentase wanita yang diinseminasi dalam 6 hari pertama. Jika kurang dari 15 persen, jumlah perempuan estrus-siklik mungkin tidak

membenarkan melanjutkan program. Jika lebih dari 15 persen, suntik semua wanita yang tidak diinseminasi dalam 6 hari pertama dengan suntikan prostaglandin intramuskular. Dosis akan tergantung pada jenis prostaglandin yang digunakan. Baca dan ikuti label atau petunjuk yang ditentukan. Hari 6 hingga 12. Lanjutkan deteksi estrus dan IB (mengikuti aturan AM-PM).

CIDR® - PG (Diperlukan 3 atau 4 hari deteksi estrus) Hari 0. Masukkan perangkat CIDR. Hari 6 (atau 7). Lepaskan CIDR dan suntikkan prostaglandin. (Label merekomendasikan hari 6, tetapi penelitian menunjukkan hari 7 dapat diterima.) Hari 7 (atau 8). Mulai deteksi estrus dan AI selama 3 hingga 4 hari lagi (aturan AM-PM).

Sinkronisasi AI Waktu Tetap (TAI) + CIDR® (Tidak diperlukan deteksi estrus) Hari 0. Masukkan perangkat CIDR® . Suntikkan GnRH. Hari 7. Lepaskan perangkat CIDR® dan suntikkan prostaglandin. Jika Anda memperlakukan sapi menyusui dalam kondisi tubuh "marjinal", pemindahan anak sapi selama 48 jam dapat meningkatkan respons. Hari 9. Suntikkan GnRH dan mulailah menghitung waktu (atau massa) IB pada  $54 \pm 2$  jam untuk sapi muda,  $60 \pm 6$  jam untuk sapi.

Keberhasilan inseminasi Buatan dan Transfer Embrio tergantung dari sinkronisasi estrus yang memiliki siklus estrus yang normal. *Standing heat* adalah pertanda sapi yang estrus yang ditandai dengan sapi akan diam jika dinaiki sapi lain. Walaupun pengamatan secara langsung dengan mata adalah metode deteksi estrus yang terbaik, namun saat ini terdapat peralatan yang mampu membantu deteksi estrus seperti *heat mount detector* atau *paint stick* (Feradis, 2014).

Keuntungan penyerentakan berahi pada ternak adalah sebagai berikut (Sonjaya, 2006):

- 1) Memudahkan dan efisiensi terjadinya berahi
- 2) Memudahkan dalam pelaksanaan kawin buatan khususnya IB
- 3) Mensinkronkan waktu kawin yang berdampak waktu ovulasi dan waktu melahirkan induk bersamaan
- 4) Dapat menyamakan kondisi fisiologis ternak donor dan ternak resipien sehingga dapat meningkatkan keberhasilan transfer embrio.
- 5) Mendapatkan waktu yang tepat untuk inseminasi (IB) akan menurunkan biaya yang dikeluarkan.

Feradis, 2014 dalam bukunya Bioteknologi Reproduksi pada Ternak mengemukakan bahwa tanda-tanda berahi pada sapi betina (Tabel 1) adalah;

- a. Ternak gelisah
- b. Sering berteriak
- c. Suka menaiki dan dinaiki sesamanya
- d. Vulva: bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat (3 A dalam bahasa jawa; Abang, Abuh, Anget atau 3 B dalam bahasa sunda: Beureum, Bareuh, dan Baseuh)
- e. Dari vulva keluar lender yang bening dan tidak berwarna
- f. Nafsu makan berkurang

Gejala-gejala berahi pada Tabel 1 sebaiknya diperhatikan minimal 2 kali sehari. Jika tanda-tanda berahi sudah muncul maka pemilik ternak tidak boleh menunda-nunda laporan kepada petugas inseminator agar sapi dapat memperoleh pelayanan

IB. Sapi dara umumnya menunjukkan gejala yang lebih jelas jika dibandingkan dengan sapi yang telah beranak.

Tabel 2.1 Tiga masa berahi tanda-tandanya (Feradis, 2014)

No	Berahi awal (< 6-10 jam)	Standing Heat (< 18 Jam)	Akhir Standing Heat
1	Sapi betina membaui sapi lainnya	Sapi betina akan diam bila dinaiki	Sapi tidak akan diam apabila dinaiki
2	Berusaha untuk menaiki sapi betina lainnya, tetapi tidak mau dinaiki	Lebih sering mengeluh	Membaui dan mengendus sapi lainnya
3	Vulva mulai membesar dan membengkak	“hold milk”	Banyak keluar lendir yang membasahi sekitar ekor dan tulang ekor
4	Lebih sering urinasi	Menggosok-gosok bagian belakang	
5	Meletakkan dagunya pada bagian belakang betina lainnya	Terdapat lendir pada bagian vulva dan ekor	

Sumber: Feradis (2014)

Waktu dan tempat deteksi berahi merupakan suatu hal yang sangatlah penting (Tabel 2). Keadaan yang panas selama siang hari cenderung menekan tanda-tanda berahi, hasil yang baik didapatkan apabila sapi betina diamati pada udara yang sejuk, sepanjang pagi atau malam (Feradis, 2014).

Tabel 2.2 Tingkat keberhasilan deteksi berahi pada waktu yang berbeda menurut Feradis, 2014

No	Waktu pengamatan deteksi berahi	%
----	---------------------------------	---

1	Hanya malam	42
2	Hanya subuh	50
3	Subuh dan malam	81
4	Subuh, malam dan siang	86

Sumber: Feradis (2014)

Cara paling efektif dalam mendeteksi sapi berahi adalah dengan mengikuti sapi tersebut saat digembalakan. Namun terdapat beberapa sapi betina yang memiliki siklus berahi yang sangat pendek yaitu 6 jam, sehingga berahinya sulit terdeteksi jika terjadi pada malam hari yang berakibat tidak dapat dikawinkan

Hasil dari deteksi berahi akan lebih baik apabila didukung oleh:

1. Catatan yang akurat dan lengkap mengenai berahi dan perkawinan yang telah dilakukan
2. Sapi-sapi betina diawasi selama merumput kurang dari 2 kali setiap hari untuk total 30 menit
3. Cara yang paling mudah, tetapi hanya sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti, yaitu pengamatan mata.

Terdapat beberapa cara praktis yang baik digunakan untuk mendeteksi berahi diantaranya identifikasi sapi betina yang akurat, catatan tanggal kelahiran yang akurat, catatan tanggal berahi sapi betina dan pengamatan sapi betina minimal 3 kali sehari

Beberapa pertolongan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi berahi seluruh sapi betina, yaitu:

1. Test progesterone susu

Test progesterone susu di peternakan dilakukan dengan *reagent ovuchek* dan *enzyghost*. Progesterone adalah hormone yang dikeluarkan oleh betina selama kebuntingan pada tahap tertentu dari siklus berahi. Suatu sampel susu diambil dan dicampur dengan reagent dan dengan mengamati perubahan warna dapat ditentukan status reproduksi sapi betina. Biaya test ini cukup tinggi sehingga tidak ekonomis dilakukan pada peternakan rakyat. Akan tetapi penilaian mungkin menguntungkan bila ditemui kesulitan untuk mendeteksi sapi-sapi bermasalah.

## 2. Catatan yang baik

Catatan yang baik menolong untuk mengurangi jumlah sapi betina yang harus diawasi. Pada sapi yang tidak bunting, satu siklus berahi yang normal terjadi setiap 18-24 hari. Pada suatu peternakan dengandeteksi yang sempurna (excellent), rata-rata panjang siklus akan kurang dari 25 hari. Jika bertambah diatas 30 hari, perlu perhatian mengenai deteksi berahi yang jelek, nutrisi rendah, penyakit atau oleh ketiganya. Sapi betina yang melebihi panjang siklus biasanya betina yang telah melahirkan atau adanya gangguan pada sistem reproduksinya.

Beberapa hal yang menyebabkan lamanya siklus berahi tidak beraturan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berahi semu, kematian embrio dini yang dapat bersatu dengan penyakit seperti *vibriosis*, stress makanan dan produksi sangat tinggi dapat menekan berahi serta ketidakseimbangan hormon. Tahap paling penting dari siklus ini adalah periode dimana sapi betina menunjukkan berahi. Biasanya lebih dari 18 jam tetapi dapat beragam antara 6 sampai 27 jam, akan tetapi sekor sapi betina umumnya menunjukkan berahi yang tetap dari satu berahi ke berahi selanjutnya.

Deteksi berahi adalah salah satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya program IB pada ternak sapi. Hasil penelitian di New Shout Wales terhadap sekelompok sapi perah betina menyatakan bahwa reproduksi yang baik ditunjukkan oleh terdeteksi atau tidaknya sapi tersebut pada waktu berahi. Pada kenyataannya hanya 44 % dari sekelompok sapi tersebut terdeteksi berahinya pada waktu yang tepat.

### **5. Hormon Induksi dan Sinkronisasi Berahi**

Hormon merupakan senyawa-senyawa ataupun ion-ion organik yang bukan merupakan nutrisi yang dapat bekerja secara aktif dalam konsentrasi rendah. Intinya hormon merupakan zat yang dapat menggerakkan (trigger) suatu perubahan metabolisme sebagai bentuk dari respon fisiologis (Liu, 2012).

Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin dan merupakan senyawa kimia yang dibawa melalui darah ke sel-sel target organ atau sel-sel target lain dimana hormon tersebut mengatur aktivitas fisiologis tertentu (Yusuf, 2012).

Jainudeen and Hafez (2008) menerangkan bahwa  $PGF2\alpha$  pertama kali diketahui adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar aksesoris pejantan yaitu kelenjar prostat, dan diketahui bahwa  $PGF2\alpha$  merupakan bahan luteolisis alami yang menyebabkan terjadinya regresi CL pada fase luteal didalam siklus estrus.  $PGF2\alpha$  merupakan hormon yang digunakan dalam program sinkronisasi birahi. Perry (2004) menambahkan bahwa kegagalan kebuntingan akan memberikan respon terhadap uterus untuk memproduksi hormon prostaglandin  $F2\alpha$  ( $PGF2\alpha$ ), hormon  $PGF2\alpha$  akan segera meregresi CL, Apabila fase luteolisis tidak terjadi, siklus birahi pada sapi betina tidak akan dapat terjadi kembali dan hal tersebut

akan menyebabkan hilangnya kesempatan betina dapat bunting dalam masa pembiakan.

Fungsi alami dari hormon PGF2 $\alpha$  adalah sebagai hormon yang merangsang proses terjadinya luteolisis. Tujuan penyuntikan PGF2 $\alpha$  yaitu untuk memperpendek fase luteal pada siklus birahi. Paul, Yousungnern and Bunaparte (2015) menjelaskan bahwa PGF2 $\alpha$  hanya akan bekerja secara efektif pada saat CL aktif secara fungsional, dan terdapat variasi waktu kemunculan tanda-tanda birahi, dimulai dari hari ke 2 hingga ke 5, variasi ini disebabkan oleh adanya perbedaan dari ukuran folikel dominan pada ovarium saat proses penyuntikan PGF2 $\alpha$ . Castilho, Gambini, Fernandes, Trica, Telxeira and Barros (2000) menambahkan bahwa pemberian GnRH dan 7 hari setelahnya diikuti dengan pemberian PGF2 $\alpha$  merupakan sistem sinkronisasi, perlakuan tersebut mengakibatkan terjadinya homogenisasi perkembangan folikel yang lebih baik dan merangsang terjadinya luteolisis.

Kelenjar-Kelenjar endokrin merupakan endokrin merupakan kelenjar kelenjar yang yang tidak mempunyai tidak mempunyai saluran saluran dan dan mensekresikan secara internal langsung ke pembuluh darah. Kelenjar endokrin ini kebalikan mensekresikan secara internal langsung ke pembuluh darah. Kelenjar endokrin ini kebalikan dari kelenjar eksokrin yang mempunyai saluran. Kelenjar endokrin mensekresikan hormon. dari kelenjar eksokrin yang mempunyai saluran. Kelenjar endokrin mensekresikan hormon (Yusuf , 2012)

Hipotalamus merupakan kelenjar neuroendokrin yang membentuk sepanjang dasar dan dinding lateral entrikel ketiga dari otak yang sangat dekat hubungannya dengan pituitary.

Sekresi hormon gonadotropik dari pituitary anterior dikontrol oleh hormon pelepas peptida (peptide-releasing hormone) yang diproduksi oleh sel-sel neurosecretory di dalam hipotalamus. Salah satunya adalah gonadotropin releasing hormone (GnRH) yang menyebabkan pelepasan follicle stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH) dari pituitary anterior

Peptida-peptida endogenous opioids telah diidentifikasi di jaringan otak yang salah satunya adalah B-endorphin. B-endorphin ini diidentifikasi dengan konsentrasi tinggi pada hipotalamus dan portal darah hypophyseal yang konsentrasinya berubah selama siklus berahi dan selama perbedaan status reproduksi. Dengan penyuntikan peptida opioid akan menghambat sekresi FSH dan LH namun menstimulir pelepasan prolaktin.

Kelenjar pineal berlokasi di bagian belakang hipotalamus diantara belahan-belahan otak dan mempunyai hubungan langsung dengan sisetim saraf pusat. Kelenjar ini member respon terhadap cahaya lingkungan dan peka terhadap perubahan cahaya (panjang siang). Hormon yang dikarakterisasi pada kelenjar pineal adalah melatonin yang merupakan turunan dari asam amino triptopan.

## **6. Gangguan Reproduksi**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi dan genetik Sapi Bali melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) yang diterapkan pada peternak rakyat. Dengan IB peternak tidak perlu memelihara sapi pejantan sehingga kemungkinan terjadinya inbreeding dapat dihindari. Namun, IB dapat merugikan peternak akibat peternak dalam melakukan deteksi birahi kurang akurat dan inseminator kurang trampil. Salah (Suharyati dan Hartono, 2015).

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai oleh petani ternak dalam mengembangkan populasi ternak adalah rendahnya efisiensi reproduksi. Untuk mengetahui tinggi rendahnya efisiensi reproduksi dapat dilakukan dengan menghitung angka kebuntingan atau conception rate; jarak antara melahirkan atau calving interval; angka perkawinan per kebuntingan atau service per conception; dan angka kelahiran atau calving rate; serta repeat breeder (Hardjopranjoto, 1995). Dengan mengetahui nilai efisiensi reproduksi dan faktor-faktor manajemen peternak yang memengaruhinya diharapkan mampu untuk memecahkan permasalahan yang menyebabkan rendahnya efisiensi reproduksi, dengan demikian akan membantu program percepatan peningkatan populasi ternak khususnya ternak sapi.

Skor kondisi tubuh ternak berkaitan dengan per- tumbuhan dan potensi reproduksi. Menurut Awaluddin dan Panjahitan (2010), pada skor 1 (sangat kurus), maka sapi betina dewasa akan mengalami gangguan re- produksi berat yang ditandai dengan berhentinya siklus birahi. Pada skor 2 (kurus) sapi betina masih menga- lami gangguan reproduksi yang ditandai

dengan siklus birahi yang tidak teratur, cenderung kurang dari 21 hari serta lama birahi lebih pendek. Aktivitas reproduksi sapi betina dewasa akan normal jika skor kondisi sapi pada angka 3 (sedang/menengah), bahkan pada skor 4 (baik) dan skor 5 (gemuk) aktivitas reproduksi ternak sapi betina akan bertahan selama musim kering atau kekurangan (Sugama dan Budiari, 2012).

Upaya untuk mempercepat timbulnya berahi akibat kekurangan nutrisi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pemberian pakan berkualitas. Konsentrat sebagai pakan penguat dapat meningkatkan pencernaan karena konsentrat tersusun dari bahan pakan yang mudah dicerna oleh ternak. Sapi muda membutuhkan pakan yang mempunyai kandungan protein dan energi tinggi, karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Sapi Bali di peternak pada umumnya diberi pakan seadanya, berupa jerami dan atau rumput saja, tanpa penambahan konsentrat. Tingkat nutrisi yang lebih baik diharapkan mempercepat timbulnya berahi pada sapi Bali dara (Tahir, 2016).

Salah satu penyebab lambatnya penambahan bobot badan sapi bali, kemungkinan mengalami kekurangan mineral, terutama pemeliharaan ternak sapi yang tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas pakan. Mineral yang dibutuhkan ternak sapi memang sedikit, namun sangat penting untuk kesempurnaan makanan yang dikonsumsi terutama mineral magnesium dan tembaga. pada mineral tembaga merupakan komponen dari berbagai enzim yang diperlukan untuk menghasilkan energi, anti oksidasi, dan sintesa hormon adrenalin serta untuk pembentukan jaringan ikat. Tembaga juga berperan sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah, membantu absorpsi unsur Fe, memelihara

fungsi saraf pusat, pigmentasi bulu, dan paling sering berpengaruh ada reproduksi (Stoltz, dkk., 1985).

## **7. Kajian Terdahulu**

Natalia (2016), Pengaruh Metode Ovsynch Terhadap Respon Berahi Sapi Bali Induk Dan Dara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon berahi sapi Bali induk dan dan dara yang disinkronisasi dengan metode Ovcynch. Penelitian ini menggunakan 21 ekor sapi Bali yang terdiri atas 9 ekor sapi Bali induk dan 12 ekor sapi dara. Metode Ovcynch dilakukan dengan penyuntikan GnRH pada hari ke-0, diikuti dengan penyuntikan hormon prostaglandin pada hari ke-7, kemudian pada hari ke-9 GnRH disuntikkan untuk kedua kalinya. Pada hari ke-10 semua ternak dilakukan inseminasi buatan (IB). Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah jumlah ternak yang menunjukkan tanda-tanda berahi, intensitas berahi (skor 1-4), interval antara penyuntikan prstaglandin dan GnRH sampai puncak berahi, skor kondisi tubuh (SKT) dan deposisi semen pada saat dilakukan IB. Data dianalisis dengan uji Chi-square untuk persentase berahi, interval dari penyuntikan prostaglandin dan GnRH sampai pelaksanaan IB dilakukan dengan uji T, sedangkan hubungan antara intensitas berahi, SKT, dan deposisi semen dianalisis dengan korelasi spearman rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon berahi ternak sapi Bali induk dan dara masing-masing sebesar 100 dan 75%. Intensitas berahi dengan skor 3 lebih tinggi pada induk dibandingkan dengan dara (66,6% vs 16,6%). Interval antara waktu penyuntikan prostaglandin sampai IB dan interval penyuntikan GnRH sampai IB tidak berbeda nyata antara sapi Bali induk dan dara (69,6 vs 71,9 jam dan 47,7 vs 47,9 jam).


Skor kondisi tubuh ternak sapi Bali induk dan dara menunjukkan korelasi positif terhadap intensitas berahi ( $r=0,316$ ;  $P=0,407$  dan  $r=0,478$ ;  $P=0,193$ ). Sedangkan korelasi antara intensitas berahi dan deposisi semen pada ternak sapi Bali induk dan dara adalah  $r=0,750$ ;  $P=0,020$  dan  $r=0,323$ ;  $P=0,397$ . Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Ovsynch efektif menimbulkan respon berahi pada sapi Bali induk dan dara.

Melia, dkk (2015), Proses Regresi Corpus Luteum Sapi Aceh Yang Disinkronisasi Estrus Menggunakan Prostaglandin F2 ALFA ( $PGF2\alpha$ ). Penelitian ini bertujuan mengetahui lama waktu proses regresi corpus luteum (CL) menggunakan teknik ultrasonografi (USG) pada sapi aceh yang disinkronisasi estrus dengan prostaglandin F2 alfa ( $PGF2\alpha$ ) secara intramuskular. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ekor sapi aceh yang telah didiagnosis sehat secara reproduksi, umur 5-8 tahun, bobot badan 250-350 kg, dan mempunyai minimal 2 siklus regular dengan skor kondisi tubuh 3-4 pada skala skor 5. Pada hari ke-1 dilakukan diagnosis keberadaan CL, kemudian pada hari ke-2 dilakukan penyuntikan 25 mg  $PGF2\alpha$  secara intramuskular, dan pada hari ke-3 sampai hari ke-5 dilakukan pengamatan regresi CL. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk rataan dan simpangan baku. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rataan diameter CL setelah penyuntikan  $PGF2\alpha$  masing-masing adalah  $6,25\pm 2,71$ ;  $4,50\pm 1,77$ ;  $3,25\pm 0,89$  mm. Gambaran proses regresi CL yang diamati menggunakan USG mengalami penurunan dari hari ke-1 sampai hari ke-3 setelah penyuntikan dan akan diikuti

dengan ovulasi. Dapat disimpulkan bahwa PGF2 $\alpha$  melisiskan CL selama tiga hari sampai terjadinya peristiwa ovulasi.

Pasambe dkk (2016), Perbaikan Reproduksi Pada Induk Sapi Potong Melalui Penyertakan Berahi Dengan Hormon Estro-Plan Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Tatae dan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan selama satu tahun yang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon reproduksi pada induk sapi melalui penyertakan berahi dengan hormon estro-plan Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Pengaruh penyuntikan hormon estro-plan terhadap keserentakan berahi pada sapi Bali memperlihatkan bahwa penyuntikan estro-plan sebanyak 3 ml (perlakuan B) memperlihatkan respon berahi yang lebih tinggi dibandingkan penyuntikan 2 ml (perlakuan A), dengan perbedaan respon berahi sekitar 17.11% Tingginya respon berahi pada perlakuan B ternyata juga mempengaruhi terhadap keberhasilan kebuntingan. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kebuntingan yang diperoleh pada perlakuan B (85,25%) dibandingkan dengan perlakuan A (68.28%), dan dari hasil analisa statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata ( $P < 0.05$ ) diantara kedua perlakuan. Perbedaan hasil kebuntingan diantara kedua perlakuan sekitar 17%. Lingkar dada, panjang badan, tinggi pundak, bobot badan dan penambahan bobot badan harian pedet yang dihasilkan terjadinya kenaikan sesuai dengan penambahan umur ternak dalam artian bahwa umur berkorelasi positif terhadap ukuran tubuh ternak hasil IB.

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar 3.3 Skema kerangka Pikiran Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah pada tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, dan bertempat di Desa Maggenrang, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

#### **B. Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Alat

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, coolbox, ember, kamera, kartu ternak, gunting dan, pencatat waktu.

##### 2. Bahan

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini pada sinkronisasi berahi meliputi: Hormon prostaglandin dengan merek dagang *Estron* , *Lutalyst*, spoit dan tissue.

#### **C. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang terdiri atas 2 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri atas 10 ulangan. Perlakuan yang diamati terdiri dari dua jenis yaitu:


P1 = Hormon Prostaglandin *Lutalyse*

P2 = Hormon Prostaglandin *Estron*

#### D. Pelaksanaan Penelitian

Sistem pemeliharaan pada sapi Bali induk milik peternak adalah pada pagi hari diberikan pakan berupa dedak, selanjutnya digembalakan untuk makan hijauan, siang hari digiring ke sungai untuk minum sore harinya digembalakan lagi hingga pagi. Selama pelaksanaan penelitian dilakukan pengamatan tanda-tanda berahi pada ternak dimana semua ternak diperiksa organ reproduksinya . Penelitian ini membandingkan 2 jenis hormon prostaglandin dengan merek dagang Lutalyse dan Estron terhadap respon berahi pada sapi bali dengan metode penyuntikan secara intramuscular.

Skema penelitian



Gambar 3.1 Skema penyuntikan Prostaglandin

Teknis pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Menyeleksi induk-induk sapi Bali yang kondisi siklus berahi normal , mempunyai corpus luteum (CL) yang aktif dan tidak bunting. Pada seleksi ini dilakukan dengan pemeriksaan kebuntingan (PKB) melalui palpasi rektal. Seleksi indukan sapiu bali dapat dilihat pada Gambar



Gambar 3.2 Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) sapi bali



Gambar 3.3 Seleksi corpus luteum (CL)

- b.. Melakukan penyuntikan sinkronisasi dengan menggunakan hormon Prostaglandin Lutalyse dengan dosis 5 ml/ekor secara intra muskuler pada 10 ekor kelompok sapi 1 dan hormon Prostaglandin Lutalyst dengan dosis 2 ml/ekor secara intra muskuler pada 10 ekor kelompok sapi 2 dan pemasangan



Gambar 3.4 Induksi hormone prostaglandin merek dagang Lutalyst



Gambar 3.5 Induksi hormone prostaglandin merek dagang Estron



Gambar 3.6 Kalung ternak




Gambar 3.7 Pemasangan kalung ternak

- c. Pengamatan tanda-tanda berahi dilakukan setelah 24 jam penyuntikan Prostaglandin sampai 2 siklus berahi setelah penyuntikan.




Gambar 3,8 Pengamatan gejala berahi

- d. Pengamatan berahi dilakukan 3 kali dalam sehari (pagi, siang, dan sore) selama 3 hari dimulai pada hari ke-1 setelah penyuntikan. Kecepatan munculnya berahi dihitung dari waktu pertama kali munculnya berahi, sedangkan lama berahi dihitung sejak munculnya tanda-tanda berahi hingga menghilangnya tanda-tanda berahi ;




Gambar 3.9 Pengamatan gejala berahi

e. pengamatan berahi pada sapi dilakukan secara visual dengan cara mendeteksi gejala-gejala berahi sebagai berikut: keluar lendir jernih dari servik yang mengalir melalui vagina dan vulva, sapi nampak gelisah dan ingin keluar dari kandang, sering melenguh-lenguh, mencoba menunggangi sapi lain, pangkal ekor terangkat sedikit, nafsu makan dan minum berkurang, vulvanya bengkak, hangat, dan berubah warna menjadi sedikit kemerah-merahan (Partodihardjo, 1980).



Gambar 3.10 Pengamatan gejala berahi



Gambar 3.11 Pengamatan gejala berahi

- f. Setelah muncul tanda-tanda berahi dan puncak berahi dilakukan inseminasi buatan ataupun kawin alam.

#### **E. Analisis Data**

Data persentase berahi dianalisis menggunakan uji square, tingkat persentase berahi hormon 1 dan hormon 2 dan intensitas berahi kemudian data akan diolah menggunakan software SPSS

#### **F. Perubahan Yang Diamati**

Perubahan yang diukur dalam penelitian ini adalah:

1. Kecepatan timbulnya estrus (jam) yaitu selang waktu (jam) dari mulai penyuntikan kedua sampai timbulnya gejala estrus;
2. Lama estrus (jam), yaitu selisih waktu sejak munculnya tanda-tanda estrus sampai menghilangnya tanda-tanda estrus (Toelihere, 1985).

Parameter yang diukur dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jumlah ternak yang menunjukkan tanda-tanda berahi dengan persentase berahi yang dihitung menggunakan rumus:

$$\% \text{ Berahi} = \frac{\text{Jumlah Sapi Yang Berahi}}{\text{Jumlah Sapi Perlakuan}}$$

2. Intensitas berahi Intensitas berahi menunjukkan kejelasan tanda-tanda berahi.

Gejala berahi meliputi vulva merah, vulva bengkak, terdapat lendir, dinaiki/ menaiki pejantan. Skoring dilakukan berdasarkan gejala berahi yang muncul :

1. Skor 4 = vulva merah, vulva bengkak, terdapat lendir, menaiki/dinaiki pejantan.

2. Skor 3 = tiga dari empat gejala berahi yang muncul
3. Skor 2 = dua dari empat gejala berahi yang muncul
4. Skor 1 = satu dari gejala berahi yang muncul

#### **G. Definisi Operasional**

1. Prostaglandin adalah hormon yang dihasilkan oleh uterus berfungsi melisiskan corpus luteum yang berpengaruh terhadap terjadinya berahi dan digunakan untuk sinkronisasi / induksi berahi.

2. Berahi adalah suatu periode atau suatu kondisi fisiologis betina dewasa yang siap untuk menerima pejantan untuk kawin yang ditandai dengan gejala-gejala berahi seperti keluarnya lendir pada vulva.

3. Siklus berahi merupakan satu periode dari satu estrus ke estrus berikutnya atau interval antara timbulnya satu periode estrus ke permulaan periode estrus berikutnya (Nursalam, 2013)

4. Sapi Bali merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang sangat potensial sebagai penghasil daging.

5. Prostaglandin Estron adalah hormon dengan komposisi Cloprostenol (PGF<sub>2</sub> analog sintetis) 250 mg / ml

6. Prostaglandin Lutalyse adalah hormone dengan Komposisi: dalam 1 ml mengandung Dinoprost tromethamin 5 mg, Benzil Alkohol 9.45 mg

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Persentase Berahi

Data yang diperoleh didapat dari pengamatan birahi secara langsung (pengamatan visual). Persentase berahi pada sapi bali yang memperlihatkan gejala berahi dari perlakuan kedua jenis hormon prostaglandin merek Lutalyst dan Estron disajikan pada Tabel 1.

Tabel 4.1 Persentase berahi dengan perlakuan hormon prostaglandin merek Lutalyst dan Estron

<b>Perlakuan</b>	<b>Jumlah (ekor)</b>	<b>%</b>
<b>Lutalyst</b>		
Berahi	9	90
Tidak Berahi	1	10
<b>Estron</b>		
Berahi	7	70
Tidak berahi	3	30

Sumber : Data Primer, 2020

Tabel 1. menunjukkan data persentase respon berahi sapi bali di desa Maggenrang Kec. Kahu Kab. Bone yang diinduksikan secara intramuscular yaitu pada perlakuan 1 hormon Prostaglandin merek dagang Lutalyst jumlah yang berahi sebanyak 9 ekor (90%) dan tidak berahi yaitu 1 ekor (10%) sedangkan data perlakuan 2 persentase berahi Hormon Prostaglandin merek dagang Estron jumlah yang berahi sebanyak 7 ekor (70%) dan tidak berahi yaitu 3 ekor (3%).

Pada perlakuan 1 dan 2 tidak timbulnya gejala berahi 4 ekor pada kedua perlakuan disebabkan karena sapi kekurangan pakan yang dapat menurunkan daya produksi dan pelepasan hormon hipofisa sehingga produksi hormon pada ovarium

khususnya yang akan memanifestasikan tanda-tanda birahi yaitu hormon estrogen akan terganggu. Rizki *dkk* (2017). Mengemukakan bahwa hormon  $PGF2\alpha$  hanya berperan dalam meregresi Korpus Luteum untuk memperpendek siklus birahi dan mengembalikan siklus birahi pada fase folikuler. Pada kejadian silent heat hormon LH mampu untuk menumbuhkan folikel pada ovarium sehingga terjadi ovulasi, tetapi tidak cukup mampu dalam mendorong sintesa hormon estrogen oleh sel granulosa dari folikel de Graaf yang menyebabkan tidak munculnya birahi. Penanganan kasus silent heat dan sub estrus dapat diatasi dengan peningkatan kualitas pakan agar ternak mendapat nutrisi yang cukup sehingga mekanisme hormonal dalam tubuh dapat berjalan dengan baik (Hafez and Hafez, 2000).

Proses ovulasi pada sapi silent heat berjalan secara normal dan bersifat subur, tetapi tidak disertai dengan gejala birahi atau tidak ada birahi sama sekali. Silent heat terjadi karena rendahnya kadar estrogen dalam darah. Defisiensi nutrisi :  $\beta$  karotin, P, Co dan berat badan yang rendah akan menyebabkan kejadian silent heat dan subestrus pada sapi. Kejadian ini sering terjadi pada sapi post partus. sebagai predisposisi dari kasus silent heat dan sub estrus adalah genetik. Hormon LH pada kejadian silent heat dan sub estrus mampu menumbuhkan folikel pada ovarium sehingga terjadi ovulasi, tetapi tidak cukup mampu dalam mendorong sintesa hormon estrogen oleh sel granulosa dari folikel de Graaf sehingga tidak muncul birahi (Putro, 2008). Tidak adanya korpus luteum pada siklus birahi sebelumnya menyebabkan konsentrasi progesteron sangat rendah dalam darah saat ovulasi pertama setelah melahirkan, hal ini menyebabkan ovarium kurang

responsif terhadap hormon yang dikeluarkan oleh hipofisa anterior. Oleh karena itu, pada siklus berahi berikutnya menyebabkan silent heat (Hafez, 2000).

Iklim dapat mempengaruhi reproduksi pada ternak sapi betina misal pada musim hujan yang berkisar antara bulan Juni sampai Oktober pakan melimpah karena kebutuhan air tanaman terpenuhi pada rumput lapangan sedangkan pada musim kemarau maka hijauan di lapangan yang merupakan makanan ternak akan kekurangan air yang berakibat pada menurunnya jumlah pakan hijauan serta kebutuhan nutrisi tidak diimbangi dengan nutrisi yang lengkap misal dengan pemberian konsentrat yang berakibat pada kurangnya protein yang didapat pada ternak. Sapi yang tidak berahi dapat disebabkan karena kekurangan nutrisi pada ternak. Kekurangan protein pada ternak dapat menyebabkan munculnya tanda berahi yang kurang jelas. Protein merupakan prekursor biosintesis hormon gonadotropin yang menghasilkan FSH dan LH yang memicu timbulnya berahi dan ovulasi. Abidin dkk. (2012) menyatakan bahwa nutrisi sangat diperlukan untuk fisiologis reproduksi pada ternak. Nutrisi pakan yang kurang menyebabkan terganggunya sintesa dan regulasi hormone reproduksi yang mengakibatkan respon berahi kurang jelas.

## B. Intensitas Berahi

Intensitas berahi menunjukkan bahwa kejelasan tanda-tanda berahi. Gejala berahi sapi bali yang diinduksikan dengan hormon Prostaglandin Lutalyse dan Estron disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Gejala Berahi Sapi Bali yang diinduksikan Hormon Prostaglandin Lutalyse dan Estron Secara Intramuscular

Jenis Ternak	Jumlah Ternak (n)	Intensitas Berahi				Tidak Berahi (%)
		Skor 1 (%)	Skor 2 (%)	Skor 3 (%)	Skor 4 (%)	
Lutalyse	10	0 (0)	0 (0)	5 (25)	4 (20)	1 (5)
Estron	10	0 (0)	2 (10)	1 (5)	4 (20)	3 (15)

Sumber : Data Primer, 2020

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sapi Bali yang diinduksi secara intramuscular dengan menggunakan hormon Prostaglandin merek dagang Lutalyse dan Estron memperlihatkan gejala-gejala berahi pada skor 3 dan 4 dengan intensitas tertinggi pada perlakuan pemberian Prostaglandin Lutalyse. Hal tersebut diduga karena tidak semua sapi mampu memperlihatkan gejala birahi dengan intensitas yang jelas. Skor intensitas birahi tinggi menunjukkan kualitas birahi yang baik. Skor intensitas birahi yang menunjukkan nilai kumulatif dari penampilan vulva, kelimpahan lendir, dan tingkah laku. Perbedaan skor intensitas birahi antar satu sapi dengan sapi lain bisa disebabkan oleh faktor-faktor non perlakuan seperti faktor kondisi ternak, faktor individu, aktivitas kerja yang dilakukan, dan interaksi ternak (Kune dan Najamudin, 2002).

Perbedaan kualitas birahi yang muncul diindikasikan akibat adanya perbedaan kemampuan sekresi hormon-hormon birahi secara maksimal dari tiap

individu. Semakin tinggi hormon estrogen yang diproduksi maka semakin tinggi kualitas birahi yang akan muncul Rizki *dkk* (2017).

Perubahan kondisi vulva seperti warna, ukuran, dan mengeluarkan lendir memiliki keterkaitan dengan hormon estrogen yang meningkat pada kondisi estrus, sesuai dengan pendapat Frandson *dkk.* (2003) bahwa estrogen yang merangsang penebalan dinding vagina, peningkatan vaskularisasi sehingga alat kelamin bagian luar mengalami pembengkakan dan berwarna kemerahan, serta peningkatan sekresi vagina sehingga dijumpai adanya lendir menggantung divulva atau menempel pada sekitarnya. Saara *dkk.* (2011) juga menambahkan bahwa kenaikan level estrogen berhubungan dengan memerah dan membengkaknya vulva saat estrus yang merangsang aliran darah ke saluran reproduksi dan organ genital terkait.

Tsiliganni, *dkk* (2011) lender servik diproduksi oleh sel-sel sekresi yang terdapat pada endoservik, kualitas dan kuantitas lender servik sangat dipengaruhi oleh kondisi hormone yang disekresikan pada saat birahi. Hafizuddin, *dkk* (2012) mendukung bahwa sirkulasi hormone dalam tubuh sangat mempengaruhi proses pertumbuhan folikel, ovulasi, dan pembentukan CL. Kune dan Najamuddin (2002) menambahkan perbedaan kualitas birahi pada sapi dapat disebabkan oleh faktor individu yang berhubungan dengan kondisi hormonal terutama kondisi hormone estrogen dalam merangsang aktivitas birahi. Perubahan kondisi fisik vulva pada fase birahi diindikasikan akibat adanya interaksi hormone estrogen dengan organ reproduksi betina. Hormone estradiol merangsang terjadinya pembengkakan dan perubahan warna kemerahan pada kelamin bagian luar, dan

terjadinya peningkatan sekresi vagina sehingga pada beberapa spesies terdapat lendir yang keluar pada vulva (Frandsen, dkk 2003)

Kemunculan lendir pada fase birahi dapat digunakan sebagai indikator tingkat birahi. Hal tersebut diindikasikan bahwa tanda-tanda birahi semakin nampak diiringi dengan meningkatnya kadar hormone estrogen. Peningkatan produksi lendir servik terjadi saat puncak birahi, hal ini disebabkan oleh aktivitas hormone estrogen yang meningkat sehingga lendir servik lebih banyak ditemui di sekitar vagina dan vulva Silaban, dkk (2012). Bernardi, dkk (2015) menambahkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa saat munculnya lendir servik jumlah hormone progesterone pada serum adalah 0,17 ng/ml-0,44 ng/ml sedangkan jumlah hormon estrogen adalah 30,95 pg/ml – 54,77 pg/ml, dapat diartikan bahwa saat munculnya lendir servik adalah saat terjadinya fase folikular pada siklus birahi.

Penampilan gejala estrus yang kurang jelas salah satu kemungkinannya disebabkan oleh asupan pakan yang kurang memenuhi kebutuhan sehingga mengganggu sintesis dan regulasi hormon-hormon reproduksi yang berperan dalam penampilan gejala estrus (Suharto, 2003). Kondisi peternakan yang masih menggunakan sistem pemeliharaan tradisional dengan model diikat di padang penggembalaan sehingga ternak makan hijauan seadanya mengakibatkan ternak mengalami kekurangan nutrien yang diperlukan dalam aktivitas reproduksi Abidin dkk. (2012) Hasil juga didukung Suharto (2003) yang menunjukkan bahwa pada ternak yang diberi ransum dengan kualitas baik akan menunjukkan intensitas estrus lebih tinggi.

Pada sapi Bali yang disinkronisasi dengan metode intramuscular menggunakan Prostaglandin Lutalyse dan Estron terdapat 4 ekor sapi yang tidak memperlihatkan gejala-gejala berahi. Hal ini disebabkan karena Nutrisi sangat berpengaruh besar terhadap kinerja fungsional tubuh terutama pada organ reproduksi yaitu pada pelepasan hormon dan kinerja kelenjar-kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi perkembangan folikel. Kebutuhan nutrisi pada sapi bali harus di imbangi antara hijauan dan konsentrat, pada penelitian ini beberapa sapi tidak diberikan pakan sumber protein melainkan hanya hijauan berupa rumput lapangan sehingga kebutuhan protein tidak terpenuhi hal ini sesuai dengan penelitian Tahir (2016) yang menunjukkan bahwa pemberian PK 12% sampai PK 14% memberikan memperlihatkan timbulnya berahi lebih cepat dibandingkan pemberian PK 10% hal ini dapat terjadi karena Protein sebagai sumber nutrisi mempengaruhi fungsi otak sebagai pusat rangsangan yang menjadi faktor pelepas hormon reproduksi.terdapat penelitian yang melaporkan bahwa beberapa sapi yang hidup dengan kadar protein rendahmasih memperlihatkan gejala berahi, bunting dan melahirkan kasus seperti ini mungkin terjadi karena kecukupan cadangan energi tubuh ternak itu sendiri yang diberikan pakan hijauan secara adlibitum, sehingga perbaikan nutrisi tidak terlalu berpengaruh.

Kecepatan timbulnya berahi dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya dapat dilihat dari umur ternak hal ini sesuai dengan penelitian Sali., *dkk* (2017) menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok umur, kelompok sapi dengan kisaran umur 5-6 tahun menunjukkan respons estrus lebih awal yaitu 70,77 jam setelah penyuntikan sedangkan sapi pada kelompok umur 3-4 menunjukkan respons

estrus pada 72,68 jam setelah penyuntikan hormon. Demikian halnya dengan kualitas estrus sapi bali pada kelompok umur 5-6 tahun menunjukkan kualitas estrus yang cenderung lebih baik (2,6) dibandingkan sapi bali pada kelompok umur 3-4 tahun dengan kualitas estrus 2,4 (skala kualitas estrus 1-3). Rizki *dkk* (2017) Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kemunculan tanda-tanda birahi setelah penyuntikan PGF2 $\alpha$  paling cepat terjadi pada jam ke 27 dan kemunculan paling lambat terjadi pada jam ke 69. Kemunculan tanda-tanda birahi setelah penyuntikan PGF2 $\alpha$  paling banyak terjadi pada jam ke 30 - 40 dengan jumlah 21 ekor dari 40 ekor dengan persentase sebesar 52,50% dari populasi. Saili *dkk* (2016) menyatakan bahwa Beberapa cara dapat ditempuh untuk dapat meningkatkan produktivitas ternak sapi baik melalui perbaikan kualitas dan penyediaan pakan yang cukup, pengendalian penyakit ternak, maupun perbaikan manajemen reproduksi ternak.

Metode sinkronisasi juga berpengaruh terhadap kecepatan munculnya birahi metode sinkronisasi birahi secara intrauterine lebih cepat memperlihatkan gejala birahi dibandingkan dengan metode induksi secara intramuscular hal ini sesuai dengan penelitian Kota dan Gde (2019) yang mengemukakan bahwa munculnya birahi lebih cepat nampak pada pemberian PGF2 alfa secara intrauterine yaitu 40,80 jam dibandingkan dengan pemberian secara intramuscular yaitu 65,60 jam. Hal demikian dapat terjadi karena PGF2 alfa secara intrauterin tidak melalui peredaran darah umum melainkan melalui counter current mechanism (Hafez, 2000).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persentase berahi paling banyak terjadi pada induksi hormon prostaglandin merek dagang Lutalyst dan intensitas berahi memperlihatkan gejala-gejala berahi pada skor 3 dan 4 dengan intensitas tertinggi pada perlakuan pemberian Prostaglandin Lutalyse.

#### **B. saran**

Sebaiknya untuk aplikasi sinkronisasi berahi menggunakan hormon Prostaglandin merek dagang Lutalyst yang disertai skor kondisi tubuh yang baik dan diimbangi dengan pemberian pakan hijauan dan konsentrat yang sesuai untuk kebutuhan indukan sapi bali agar mendapat kualitas berahi yang diharapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Y. S. Ondho dan B. Sutiyono. 2012. Penampilan berahi sapi jawa berdasarkan poel 1, poel 2, dan poel 3. *Journal Animal Agriculture* 1 (2) : 86 – 92
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Ardika, N, Indrawati R. R, dan Johannes D. 2011. Parameter Genetik Sifat Produksi dan Reproduksi Sapi Bali Di Daerah Bali. *Majalah Ilmiah Peternakan* 14(1): 1–4.
- As-Shobuni, Muhammad Ali Ash-shobuni, Tafsir As-Shobuni. 2000. Shofwatu At-Tafasir. Cairo, Mesir: Darus shobuni.
- Astiti, Ni M.A.G.R. 2018. *Sapi Bali dan Pemasarannya*. Denpasar Bali: Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa.
- Awaluddin dan T. Panjaitan. 2010. *Petunjuk Teknis Pangukuran Ternak Sapi Potong*. Kementrian Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian NTB. NTB.
- Castilho C., A.L.G. Gambini, P. Fernandes, L.A. Trica, A.B. Telxeira, dan C.M. Barros. 2000. Synchronization of Ovulation in Crossbred Dairy Heifers Using Gonadotrophin F2 $\alpha$  and Human Chorionic Gonadotrophin or Estradiol Benzoate.
- Feradis. 2014. *Bioteknologi Reproduksi pada Ternak*. Alfabeta. Bandung
- Frandsen, R. D. 1992. *Anatomi dan Fisiologi Ternak*. Penerjemah Srigandono Dan Koen Praseno. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Frandsen, R. D., W. L. Wilke, dan A. D. Fails. 2003. The Ovary and Estrous Cycles in: *Anatomy and Physiology of Farm Animal* 7th edition (Edited by R. D. Frandsen), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. pp : 395 – 404
- Guntoro Suprio. 2002. *Membudidayakan Sapi Bali*. 7th ed. Yogyakarta: kanisius.
- Gustafson dan Emanuelsen (2010). TBscore: Signs and Symptoms From Tuberculosis Patients In A Low- Resource Setting Have Predictive Value And May Be Used To Assess Clinical Course. *Scandinavian Journal Of*

*Infectious Diseases*, 40 (2): 111 – 120.

Hafez, E.S.E dan Hafez, B. 2000. *Reproduction in farm animal*. 7 Th Ed. Lippincott Williams And Walkins. South Carolina.

Hafizuddin, T.N. Siregar dan M. Akmal. 2012. Hormon dan Perannya Dalam Dinamika Folikuler Pada Hewan Domestik. *JESBIO*, 1 (1): 21-24.

Hartono, Madi, dan Purnama E.S. 2011. Respon Kecepatan Timbilnya Estrus Dan Lama Estrus Pada Berbagai Paritas Sapi Peranakan Ongole (Po) Setelah Dua Kali Penyuntikan Prostaglandin F<sub>2α</sub> (Pgf<sub>2α</sub>). *Penelitian peternakan*: 41–49.

Inounu dan Ismeth. 2017. “Dukungan Sains Dan Teknologi Reproduksi Untuk Mensukseskan Program Sapi Indukan Wajib Bunting.” *Wartazoa* 27(1): 23–34.

Jainudeen, M. R. dan E.S.E. Hafez. 2008. *Cattle and Bufallo Reproductive Cycle Reproduction in Farm Animal, 7th Edition*. Edited by Hafez E. S. E. Lippincott Williams & Wilkins. USA: 159-171.

Kadarsih S. 2003. Peranan Ukuran Tubuh Terhadap Bobot Badan Sapi Bali di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian UNIB*

Katsir, I. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5. Bogor. Pustaka Imam as-Syafi'i.

Kune, P. dan Najamudin. 2002. Respon Estru Sapi Potong Akibat Pemberian Progesteron, Prostaglandin PGF<sub>2α</sub> dan Estradiol Benzoat dalam Kegiatan Sinkronisasi Estrus. *Jurnal Agroland*. 9(4): 380 – 384.

Kune, P, dan Nurcholidah S. 2007. Tampilan Berahi Dan Tingkat Kesuburan Sapi Bali Timor Yang Diinseminasi ( The Performance of Estrus and Fertility Rate of Timor Bali Cow Inseminated ). *Jurnal Ilmu Ternak*, Juni 2007 7(1): 1–5.

Marawali. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Reproduksi Ternak*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur. Jakarta.

Natalia, W. 2016. “Pengaruh Metode Ovsynch Terhadap Respon Berahi Sapi Bali Induk Dan Dara.” Universitas Hasanuddin.

Nursalam, 2016, metode penelitian. 2013. Dasar-Dasar Pembibitan Ternak . *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Melia T, Agustina, dan Yulius J.C. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*. Business Accounting

Review Vol. 3 No. 1, Januari 2015 223-232.

Hardjopranjoto, S. 1995. *Ilmu Kemajiran pada Ternak*. Airlangga University Press. Surabaya

National Research Council (NRC). 2009. Nutrient Requirement of Swine. National Academi of Science, Washinton D.C.

Partodihardjo, S. 1980. *Ilmu Reproduksi Hewan*. Penerbit Mutiara, Jakarta.

Pasambe, Daniel, dan Nurhayu. 2016. *Perbaikan Reproduksi Pada Induk Sapi Potong Melalui Penyertakan Berahi Dengan Hormon Estro-Plan Di Sulawesi Selatan.* : 10–17.

Paul, A.K., T. Yousungnern, dan Bunaparte. 2015. Hormonal Treatment and Estrus Synchronization In Cows: A Mini-Review. *Journal Advance Veerinary Animal Research*. 2(1): 10 – 17.

Perry, G. 2004. The Bovine Estrous Cycle. Extension Beef Reproduction Management Specialist.

Putro, P. P. 2008. *Sapi Brahman-Cross, Reproduksi dan Permasalahannya*. Bagian reproduksi dan Kebidanan FKH UGM Yogyakarta.

Rachma. S.A.B. 2007. Pertumbuhan dimensi tubuh pedet jantan sapi Bali di kabupaten Bone dan Barru Sulawesi Selatan. *Jurnal Sains dan Teknologi*. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Saara, C. S., S. G. Clark, R. V. Knox, dan M. A. Tamassia. 2011. Vulva skin temperature changes significantly during estrus in swine as determined by digital infrared thermograph. *Journal of Swine Health and Production* 19 (3) : 152

Sayyid Q. 2003. Visi Politik, dalam Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Mizan.

Salisbury, G. W., N. L. Vandemark dan Jr. Lodge. 1978. *The reproductive system of the cow. in physiology of reproduction and artificial insemination of cattle. 2nd Edition*. WH. Freeman And Company, San Fransisco : 35-51.

Shihab, M. Quraish, 1994, *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

Sihombing, Moss 1992. *Ilmu Ternak Babi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Silaban, T. F., Santoso, L., dan Suparmono. 2012. Dalam Peningkatan Kerja Filter Air untuk Menurunkan Konsentrasi Amonia pada Pemeliharaan Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). *Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan* 1:47-56.
- Sinta, L.R. dan Carpenter, B.B. 2007. *Synchronizing Estrus in Cattle*. Department of Surgery and Theriogenology College of Veterinary Medicine University of Mosul.
- Sonjaya, H. 2007. *Bahan Ajar Mata Kuliah Ilmu Reproduksi Ternak*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- . 2012. *Dasar Fisiologi Ternak*. IPB Press, Bogor.
- , Iskandar, H., Damatanti, E., 2019. *Seminar Peternakan*. Hotel Dalton, Makassar.
- Stoltz, P.G. 1985. Adversity Quotient, *Mengubah Hambatan Menjadi Peluang* (diterjemahkan oleh T Hermaya). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suharto, K. 2003. Penampilan potensi reproduksi sapi perah frisien holstein akibat pemberian kualitas ransum berbeda dan infusi larutan iodium povidon 1% intra uterin. Tesis Program Studi Magister Ilmu Ternak, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugama, I.N, dan Budian. G.B. 2012. “Pemanfaatan Jerami Padi Sebagai Pakan Alternatif Untuk Sapi Bali Dara.” *Majalah Ilmiah Peternakan* 15: 22–25.
- Sugeng, Y.B., 1993. *Pembiakan Ternak Sapi*. Gramedia. Jakarta.
- Suharyati, S, dan Hartono. 2015. Pengaruh Manajemen Peternak Terhadap Efisiensi Reproduksi Sapi Bali Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung The Influence of Farmer Management on Bali Cattle Reproduction Efficiency In Pringsewu Regency, Lampung Province.” *Penelitian pertanian Terpadu* 16(1): 61–67.
- Sutiyono, B, dan Samsudewa .D. 2008. *Petunjuk Praktikum Pengantar Reproduksi Ternak*. Semarang.
- Tahir, Trianta. 2016. IOSR Journal of Economics and Finance “Percepatan Berahi Pada Sapi Bali Dara Melalui Pemberian Konsentrat Dengan Level Protein Yang Berbeda.
- Toelihere, M.R. 1997. *Fisiologi Reproduksi pada Ternak*. Angkasa, Bandung.

Yusuf. M. 2012. *Ilmu Reproduksi Ternak*. Makassar: Jurusan Produksi Ternak  
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.





# **LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN I

### Data Mentah Kelompok Ternak Yang Disinkronisasi Menggunakan Hormon Prostaglandin Lutalyse Dan Estron

No	Nama Pemilik	Umur Sapi	Waktu Induksi Hormon	Tanggal Berahi	Waktu Berahi	Gejala Berahi	Ko
1	Adi	4 tahun	12.20	05/10/2020	13.00-22.30	3	Luta e
2	Mansur	4 tahun	12.28	17/09/2020	18.00-06.00	3	Luta e
3	Mansur	7 tahun	12.35	03/10/2020	06.00-15.00	3	Luta e
4	Masnurang	9 tahun	12.40	14/09/2020	06.00-15.40	4	Luta e
5	Irfan	12 tahun	12.44	20/09/2020	10.00-21.00	4	Luta e
6	Agustandi	8 tahun	12.56	18/09/2020	05.00-15.00	4	Luta e
7	Agustandi	7 tahun	13.01				Luta e
8	Sahka	5 tahun	13.07	07/10/2020	05.00-17.00	4	Luta e
9	Sahar	8 tahun	13.12	21/09/2020	08.00-15.00	3	Luta e
10	Arifuddin	8 tahun	13.17	18/09/2020	02.00-22.00	3	Luta e
11	Agustandi	12 tahun	13.21	15/09/2020	07.00-18.00	3	Estr
12	Husain	3 tahun	13.35				Estr
13	Jusman	10 tahun	13.39	04/09/2020	08.00-19.30	4	Estr
14	M. Said	6 tahun	13.45	08/09/2020	09.00-17.00	4	Estr
15	M. Said	5 tahun	13.52				Estr
16	M. Said	5 tahun	14.10				Estr
17	M. Said	9 tahun	14.19	12/10/2020	17.00-09.00	4	Estr
18	Senni	5 tahun	14.29	02/10/2020	13.00-22.00	4	Estr
19	Senni	8 tahun	14.45	04/09/2020	07.45-17.30	2	Estr
20	Seniman	4 tahun	14.57	13/09/2020	08.00-18.00	2	Estr

Case Processing Summary

## LAMPIRAN 2. DATA PERSENTASE BERAHI Chi-Square

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hormon * Respon Berahi	20	100.0%	0	0.0%	20	100.0%

### Hormon \* ResponBerahi Crosstabulation

Count

		ResponBerahi		Total
		Berahi	Tidak Berahi	
Hormon	Lutalyse	9	1	10
	Estron	7	3	10
Total		16	4	20

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.250 <sup>a</sup>	1	.264	.582	.291
Continuity Correction <sup>b</sup>	.313	1	.576		
Likelihood Ratio	1.297	1	.255		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.188	1	.276		
N of Valid Cases	20				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Statistics

Lutalyse

N	Valid	10
	Missing	10

## LAMPIRAN 3

### Data Intensitas Berahi Chi-Square Prostaglandin Lutalyst

#### Lutalyse

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	5.0	10.0	10.0
	Skor 3	5	25.0	50.0	60.0
	Skor 4	4	20.0	40.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		

#### Statistics

Estron

N	Valid	10
	Missing	10

### LAMPIRAN 4

### Data Intensitas Berahi Chi-Square Prostaglandin Estron

#### Estron

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	15.0	30.0	30.0
	Skor 2	2	10.0	20.0	50.0
	Skor 3	1	5.0	10.0	60.0
	Skor 4	4	20.0	40.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		