

**KUALITAS SEMEN SEGAR DAN PRODUKSI
SEMEN BEKU SAPI BALI (*Bos Javanicus*)
PADA UMUR YANG BERBEDA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Peternakan (S.Pt) Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains
Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

**ISMAYANTI
60700116061**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismayanti

NIM : 60700116061

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini tidak asli atau plagiasi, maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini yang dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Samata, Januari 2021

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismayanti', is written over the printed name.

Ismayanti
60700116061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara Ismayanti, NIM: 60700116061, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Kualitas Semen Segar dan Produksi Semen Beku Sapi Bali (*Bos javanicus*) pada Umur yang Berbeda" memandang bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 18 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si.
NIP:198209132008042002

Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.
NIP. 70010047

ALA UDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmalullahi Wabarakaluh

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah swt. atas Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Kualitas Semen Segar dan Produksi Semen Beku Sapi Bali (*Bos Javanicus*) Pada Umur yang Berbeda” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda tercinta Bungalia yang tanpa pamrih, telah menjadi sosok panutan dengan penuh keikhlasan membesarkan, mendoakan, membiayai dan mendidik penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari dan seluruh keluarga yang selalu membantu dan mendukung selama penyelesaian skripsi.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan., M.Ag. selaku wakil rektor 1, Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum. selaku Wakil rektor 2, Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku wakil rektor 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muh Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku wakil dekan 1, Ibu Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si. selaku wakil dekan 2 serta Bapak Dr. Muh Anshar, S.Pt., M.Si. selaku wakil dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Bapak Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
5. Ibu drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rasyidah Mappangaro, S.Pt., M.Si. selaku dosen pembimbing II, atas bimbingannya selama ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajarkan penulis mulai dari awal penyusunan proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku penguji I dan Dr. Sohra, M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih tak terhingga kepada ibu Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si. selaku Penasehat Akademik saya, yang telah mendidik dan memberikan nasehat dari awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik secara langsung (tatap muka) maupun arahan di luar perkuliahan.
9. Ibu Andi Afriana, S.E. selaku Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari awal hingga sekarang ini.
10. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membantu saya dalam pengurusan berkas.
11. Terima kasih kepada teman-teman Jurusan Ilmu Peternakan 2016 (16uana) atas kebersamaan dan pengalaman yang diberikan selama kurang lebih 4 tahun ini.
12. Terima kasih kepada seluruh Staf Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (UPT-PIBPS) yang telah membantu dalam kelancaran di lokasi selama dilakukannya penelitian.
13. Terima kasih kepada suami saya yang telah membantu mensupport dan memberikan semangat.
14. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Atas segala bantuan, kerja sama, dan budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya bisa berdoa dan mengembalikan kepada Allah swt., semoga mendapat balasan yang setimpal, karena hanya kepada-Nyalah sebaik baik tempat kembali.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, olehnya itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang peternakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Waharakaluh...

Samata, Januari 2021

Penulis



Ismayanti

NIM. 60700116061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Al-Quran Tentang Ternak Dan Produksi Semen.....	5
B. Sapi Bali.....	8
C. Reproduksi Sapi Bali Pejantan.....	11
D. Spermatogenesis Sapi.....	12

E. Semen Sapi Bali.....	15
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Semen.....	21
G. Evaluasi Semen.....	26
H. Penelitian Terdahulu.....	34
I. Kerangka pikir.....	36
J. Gambaran Umum.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	42
B. Alat dan Bahan.....	42
C. Prosedur Penelitian.....	43
D. Rancangan Penelitian.....	44
E. Parameter Yang Diamati.....	45
F. Analisis Data.....	46
G. Hipotesis.....	46
H. Definisi Operasional.....	47
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Evaluasi Volume Semen Segar.....	48
B. Konsentrasi Semen.....	50
C. Produksi Semen Beku.....	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Komposisi Kimia Semen Sapi Bali.....	17
2. Data Volume, Konsentrasi, Motilitas Dan Jumlah Spermatozoa.....	22
3. Data Sumber Daya Pegawai UPT-PIBPS.....	41
4. Data Sarana Dan Prasarana.....	12
5. Jenis-Jenis Pejantan.....	25
6. Rata-Rata Volume Semen Segar Pada Umur Yang Berbeda.....	48
7. Rataan Konsentrasi Pada Umur Yang Berbeda.....	50



DAFTAR GAMBAR

NO	Halaman
1. Anatomi Reproduksi Sapi Bali Pejantan.....	11
2. Proses Spermatogenesis.....	16
3. Alur Pikir.....	37
4. Struktur Organisasi.....	40



ABSTRAK

Nama : Ismayanti
Nim : 60700116061
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Kualitas Semen Segar dan Produksi Semen Beku Sapi Bali (*Bos Javanicus*) Pada Umur yang Berbeda**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas semen segar dan produksi semen beku sapi bali (*Bos Javanicus*) pada umur yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan cara *Purposive sampling* (secara sengaja). Penampungan dilakukan 2 kali dalam seminggu menggunakan vagina buatan. Sebelum melakukan pengambilan catatan kualitas semen segar dan produksi semen beku hal yang akan dilakukan adalah penampungan semen, pemberian pakan, pemeriksaan semen segar dan pemeriksaan semen beku. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji General Linear Model dengan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$) pada volume semen dan produksi semen beku sedangkan konsentrasi tidak memberikan perbedaan nyata ($P > 0,05$). Perlakuan yang memiliki kualitas semen segar dan produksi semen beku yang baik terdapat pada P2 (umur 5-6 tahun).

Kata Kunci: Sapi bali, Kualitas semen, produksi semen dan Kelompok umur.

ABSTRACT

Nama : Ismayanti
Nim : 60700116061
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : *Quality of Fresh Semen and Frozen Semen Production for Bali Cows (*Bos Javanicus*) at different ages*

*This study aims to determine the quality of fresh semen and frozen semen production of Bali cattle (*Bos Javanicus*) at different ages. This research was conducted in the UPT Artificial Insemination and Semen Production Services, Department of Animal Husbandry and Animal Health, South Sulawesi Province. The type of research used is quantitative research by means of purposive sampling (intentionally). Semen is carried out 2 times a week using an artificial vagina. Before taking notes on the quality of fresh semen and production of frozen semen, things that will be done are storing semen, providing feed, checking for fresh semen and checking for frozen semen. The data obtained were analyzed by using the General Linear Model test with further tests using the Least Significant Difference (LSD) test. The results showed that there was a very significant difference ($P < 0.01$) on the volume of fresh semen and frozen semen production, while the concentration did not give a significant difference ($P > 0.05$). Treatment that has good quality fresh semen and frozen semen production is found in P2 (aged 5-6 years).*

Keywords: Bali cattle, semen quality, semen production and age group.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sapi bali adalah sapi lokal yang terdapat di Indonesia dan mempunyai keunggulan mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis sehingga dapat berkembang biak dengan baik serta mempunyai kualitas karkas yang baik, adapun upaya yang dilakukan untuk menunjang keunggulan sapi bali adalah meningkatkan kualitas genetik pada aspek produktivitas, salah satunya yaitu menggunakan teknologi reproduksi untuk penyebaran genetik dari pejantan unggul yang terseleksi.

Salah satu teknologi reproduksi yang telah berhasil dan banyak digunakan untuk penyebaran genetik pejantan adalah Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi Buatan merupakan teknologi reproduksi yang meliputi koleksi atau penampungan semen, proses pengolahan seperti pengenceran, ekuilibrasi atau penyesuaian suhu, dan pembekuan mempengaruhi kualitas semen beku yang akan diaplikasikan pada ternak (Prastowo, 2017). Kemampuan reproduksi sapi merupakan faktor yang sangat menentukan perkembangan populasi ternak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi adalah melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) yang diterapkan pada peternakan rakyat (Mappanganro, 2020).

Inseminasi buatan merupakan teknik perkawinan dengan memasukkan semen segar ke dalam saluran kelamin sapi betina dengan menggunakan suatu alat yang dibuat oleh manusia. Hal ini bertujuan untuk perbaikan mutu genetika

ternak, menghindari penyebaran penyakit kelamin, meningkatkan jumlah keturunan dari pejantan unggul dengan inseminasi ke banyak betina dan meningkatkan kesejahteraan peternak (Hafez, 2000). Berhasilnya suatu program kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak tergantung pada kualitas dan kuantitas semen yang diejakulasikan seekor pejantan, kesanggupan untuk mempertahankan kualitas, dan memperbanyak volume semen tersebut untuk beberapa saat lebih lama setelah ejakulasi sehingga lebih banyak betina akseptor yang akan diinseminasi. IB adalah suatu cara untuk memasukkan semen (sperma) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun (Solihati, 2009).

Pembekuan semen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi semen beku karena dalam proses pembekuan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan. Untuk dapat didistribusikan dan diinseminasikan persentase spermatozoa motil *post thawing* minimal harus sebesar 40%. Nilai *recovery rate* ini bergantung pada motilitas individu semen segar selain itu faktor genetik seperti bangsa sapi juga turut berpengaruh. Bangsa sapi lokal seperti sapi Bali memiliki kualitas semen segar yang baik dan tahan terhadap proses pembekuan (BSN, 2008). Chenoweth (2005) menyatakan bahwa faktor genetik, umur, bangsa ternak serta variasi individu dapat mempengaruhi ketahanan sel sperma terhadap cekaman suhu (*thermal shock*) pada saat proses *thawing* berlangsung. Kualitas sperma yang dihasilkan oleh setiap rumpun dan individu berbeda-beda sehingga berpengaruh terhadap kualitas sperma beku yang dihasilkan.

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas semen yang dihasilkan seekor pejantan (Bhakat, 2011). Seiring dengan bertambahnya umur, pejantan akan menghasilkan semen dengan volume yang cenderung meningkat (Dewi, 2012). Pejantan yang berumur 2-7 tahun dapat menghasilkan semen terbaik dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini dibanding dengan pejantan umur di luar interval tersebut (Susilawati, 2013). Kualitas semen dari seekor pejantan berhubungan erat dengan fertilitas dan memiliki arti ekonomis yang tinggi pada program produksi ternak (Han, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas semen segar dan produksi semen beku sapi bali pada umur yang berbeda yang ada di UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (UPT PIBPS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kualitas semen segar sapi bali pada umur yang berbeda ?
2. Bagaimana produksi semen beku sapi bali pada umur yang berbeda ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kualitas semen segar sapi bali pada umur yang berbeda pada UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen.
2. Untuk mengetahui produksi semen beku sapi bali pada umur yang berbeda pada UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai kualitas semen segar dan produksi semen beku sapi bali pada kelompok umur yang berbeda pada UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen.
2. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan acuan bagi peneliti dibidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan *Al-Qur'an* Tentang Ternak dan Produksi Semen

Ditinjau dari manfaat dan kegunaannya, sapi merupakan hewan ternak yang dapat memberikan kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Secara turun temurun hewan ternak ini dipelihara oleh manusia sehingga diambil manfaatnya baik berupa daging, susu dan kulit maupun hasil ikutan lainnya atau dimanfaatkan tenaganya untuk dikendarai maupun membajak sawah semuanya hanya untuk kemaslahatan manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-An'am/6:142.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”(Kementerian Agama, 2019).

Dalam “Tafsir Al-Mishbah” ayat diatas menjelaskan tentang hewan ternak, yaitu unta, sapi, domba dan kambing yang sangat banyak buat kamu antara lain, sebagai alat pengangkutan barang-barang berat kamu dan ada juga yang kamu manfaatkan bulu dan rambutnya sebagai alas. Makanlah sebagai rezeki yang halal yang telah dianugerah kan Allah kepada kamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-lagkah syaitan dalam segala hal termasuk menghalalkan yang

haram atau sebaliknya. Sesungguhnya ia terhadap kamu adalah musuh yang nyata permusuhannya (Shihab, 2002).

Dengan demikian, ayat diatas membagi binatang tersebut kedalam dua bagian. Pertama, binatang yang besar sehingga dapat dijadikan pengangkutan barang-barang berat, dan kedua yang hanya dapat dijadikan tunggangan. Ada pendapat lain untuk kata ini yaitu, unta yang kecil, atau semua yang kecil dari jenis binatang ternak. Menurut mereka, ternak-ternak yang kecil itu dinamai farsy alas karena hampir-hampir saja tubuhnya menyentuh tanah yang hampar sebagai alas dibumi. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang disembelih, dalam hal ini adalah kambing, domba dan sapi (Shihab, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya pada penciptaan binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang sangat penting bagi manusia yang dapat diambil manfaatnya berupa daging, susu, kulit dan hasil ikutan lainnya. Di samping pemanfaatannya untuk manusia sebagai nikmat pemberian Allah Swt, binatang ternak dapat dijadikan sebagai bahan riset pembelajaran ilmu pengetahuan, dalam ilmu nutrisi peternakan dapat dikaji mengenai rumput yang dimakan atau dikonsumsi oleh binatang ternak, setelah dikunyah akan didorong masuk ke dalam perut, kemudian akan bercampur dengan darah dan berbagai mikroba lainnya, lewat kekuasaan Allah Swt maka makanan yang dimakan berupa rumput akan berubah menjadi daging, kemudian atas kekuasaan-Nya dapat memberikan minum untuk manusia dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu yang bersih sudah dipisahkan dari benda bernajis diantara darah dan feses.

Semen adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi (Partodihardjo, 1992). Ditambahkan Toelihere, (1993) semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al- Insan/76:2.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat” (Kementerian Agama, 2019).

Dalam ”tafsir al-Jalalain’(Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia) artinya, jenis manusia (dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan (yang kami hendak mengujinya) dengan membebaskan kewajiban-kewajiban kepadanya; atau dianggap sebagai hal dari lafal yang diperkirakan. Yaitu kami hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya (karena itu kami jadikan dia). Kami jadikan dia dapat (mendengar dan melihat), (As-Shuthi, 2019).

Kalimat *Nuthfatin amsyaj* berarti semen. Cairan ini tersusun dari campuran berbagai cairan yang berlainan. Cairan-cairan ini mempunyai fungsi-fungsi semisal mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan spermatozoa.

Adapun firman Allah SWT tentang penjelasan untuk integrasi keilmuan dalam Q.S Ar-Rad/13:11.

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ

Terjemahnya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia” (Kementerian Agama, 2019).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ternyata perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan adalah manusia tetapi apapun ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia, tidak ada yang mampu menandingi kehendak Allah SWT. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut hubungannya dengan IB adalah bagaimanapun tingginya pengetahuan manusia tentang teknologi IB, jika Allah SWT tidak memberikan kehidupan didalam rahim ternak, maka proses IB tidak akan berhasil.

B. Sapi Bali (*Bos Javanicus*)

Sapi merupakan salah satu hewan mamalia, yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Reproduksi mamalia sama seperti reproduksi pada manusia, terjadi secara seksual melalui proses fertilisasi. Banyak jenis sapi yang ada di Indonesia baik sapi lokal maupun sapi keturunan dari luar dan sapi-sapi hasil

persilangan. Sapi yang banyak tersebar di Indonesia adalah jenis sapi Bali. Sejak adanya program pemerintah yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai tahun 1969, maka bidang peternakan pun ikut dibangun. Tersedianya dana dan fasilitas Pemerintah akan sangat menunjang perkembangan peternakan di Indonesia, termasuk program IB (Najman, 2003).

Sapi Bali telah menyebar luas di seluruh pelosok tanah air yang ada di Indonesia. Meskipun masih tetap terkonsentrasi di pulau Bali sampai saat ini kemurnian genetik sapi Bali masih terjaga karena ada undang-undang yang mengatur pembatasan masuknya jenis sapi lain ke pulau Bali. Sapi Bali merupakan sapi lokal dengan kemampuan produksi yang cukup tinggi. Upaya peningkatan produktivitas sapi Bali tidak dapat dilepaskan dari upaya pengaturan dinamika populasi seperti tingkat kelahiran, pemotongan dan penekanan kematian. Hal ini mempunyai kaitan yang kuat dengan sistem pengelolaan usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak (Thalib, 2002).

Asal usul sapi Bali adalah banteng (*Bos Bibos*) yang telah mengalami domestikasi sebelum 3.500 SM di wilayah pulau Jawa, Bali dan Lombok. Kemampuan reproduksi sapi Bali merupakan yang terbaik diantara sapi-sapi lokal. Hal ini disebabkan karena sapi Bali mampu beranak setiap tahun. Pemberian pakan untuk sapi Bali tidak sulit, sapi Bali mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga sering disebut ternak perintis. Penggolongan sapi ke dalam suatu bangsa (*breed*) sapi, didasarkan atas sekumpulan persamaan karakteristik tersebut yang sama. Atas dasar karakteristik tersebut, mereka dapat dibedakan dari ternak lainnya meskipun masih dalam spesies yang sama.

Karakteristik yang dimiliki tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya (Najman, 2003).

Menurut Blakely dan Bade (1992) bangsa sapi mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut :

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mamalia

Sub class : Theria Infra

Class : Eutheria

Ordo : Artiodactyla

Sub Ordo : Ruminantia

Infra Ordo : Pecora

Family : Bovidae


Genus : *Bos (cattle)*

Spesies : *Bos Javanicus (banteng/sapi Bali)*

Ciri-ciri sapi Bali menyerupai banteng tetapi tubuhnya berukuran lebih kecil akibat proses domestikasi dada dalam, badan padat tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir, bertanduk agak pendek, mempunyai kaki berwarna putih tinggi sapi dewasa 130 cm, berat rata-rata sapi jantan 450 kg, sedangkan betina 300-400 kg . Sapi jantan tumbuh lebih cepat dan karkasnya lebih tinggi dari pada sapi betina, sehingga meningkatnya jumlah anak jantan dapat berarti memperbaiki penampilan pertumbuhan dan meningkatkan berat potong (Sudarmono dan Bambang, 2008).

C. Reproduksi Sapi Bali Jantan

Testis menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan suatu zat yaitu hormon. Hormon yang dihasilkannya berperan untuk mengatur spermatogenesis dan perkembangan alat-alat kelamin aksesoris agar spermatozoa yang dihasilkannya dapat ditranspor sebagaimana mestinya (Toelihere, 1985). Spermatogenesis adalah sebuah proses yang teratur, terarah dengan kepastian yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa yang dewasa yang berasal dari sel-sel yang lebih muda yang terjadi di dalam tubulus seminiferus (Feradis, 2010). Untuk anatomi reproduksi sapi jantan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Anatomi Reproduksi Sapi Jantan (Feradies, 2010)

Bentuk testis bulat panjang, dengan sumbu memanjangnya ke arah vertikal. Pada sapi dewasa panjang testis 12 sampai 15 cm dan diameter berkisar dari 6 sampai 8 cm, berat sebuah testis termasuk *tunica albugenia* dan epididimis berkisar antara 300 sampai 500 gram, tergantung pada umur, jenis sapi dan kondisi makanan. Testis mempunyai dua fungsi penting untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon-hormon jantan androgen (Partodihardjo, 1992).

Spermatozoa dihasilkan dalam testis yaitu di dalam *tubulus seminiferus* melalui proses spermatogonium yang terdiri dari dua fase utama yaitu :

(a) Fase perkembangan awal sel spermatogonia secara pembelahan mitosis dari jumlah sel menjadi dua kali (fase spermatocytogenesis).

(b) Fase spermatogenesis

yaitu spermatid mengalami metamorphosis dan berubah bentuknya dan menghasilkan spermatozoa sempurna (Van Demark, 1985).

Feradis (2010) menyatakan bahwa sapi jantan normal menghasilkan 12 sampai 17 juta spermatozoa per gram testis per hari produksi untuk seekor sapi jantan dengan satu testis seberat 400 gram. Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak dan sangat khas yang tidak tumbuh dan membagi diri. Spermatozoa terdiri dari kepala yang membawa materi hereditas paternal dan ekor mengandung sarana penggerak.

Kualitas dan kuantitas semen yang rendah akan menurunkan angka kebuntingan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah frekuensi ejakulasi. Perlu dilakukan pembatasan pemakaian seekor pejantan dalam satuan waktu tertentu karena frekuensi ejakulasi yang terlampau sering dan kontinyu akan menurunkan kuantitas dan kualitas semen yang dihasilkan (Toelihere, 1985).

D. Spermatogenesis Sapi Bali

Menurut Isnaeni (2006), spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma (gamet jantan) yang terjadi dalam testis, tepatnya pada Tubulus seminiferus. Testis mamalia tersusun atas ratusan Tubulus seminiferus, yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan sperma. Bagian yang

terdekat dengan dinding Tubulus seminiferus, terdapat spermatogonia, yang merupakan sel diploid pembentuk sperma, yang belum terdiferensiasi. Tahapan pembentukan sperma (spermatogenesis) diawali dari pembentukan spermatogonium tipe A, spermatogonium 1n, spermatogonium tipe B, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan yang terakhir adalah spermatozoa.

Spermatozoa dibentuk di dalam testis melalui proses yang disebut spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di dalam epididimis dimana sperma disimpan sampai ejakulasi. Spermatozoa terbentuk di dalam tubuli seminiferi dari sel-sel induk spermatozoa yang diploid, terletak pada membran basalis. Spermatogenesis merupakan suatu proses kompleks yang meliputi pembelahan dan diferensiasi sel (Feradis, 2010).

Spermatozoa yang normal memiliki kepala, leher, badan dan ekor. Bagian depan dinding kepala (yang mengandung asam *Deoxyribonucleic*, di dalam Kromosom), tampak sekitar 2/3 bagian tertutup Acrosom. Tempat sambungan dasar Acrosom dan kepala disebut cincin Nucleus. Diantara kepala dan badan terdapat sambungan pendek, yaitu leher yang berisi Centriole proximal, yang kadang-kadang dinyatakan sebagai pusat genetik aktivitas spermatozoa. Bagian badan dimulai dari leher dan berlanjut ke cincin Centriole. Bagian badan dan ekor mampu bergerak bebas, meskipun tanpa kepala. Ekor berupa cambuk, membantu mendorong Spermatozoa untuk bergerak maju (Salisbury, 1985).


Sel mani diproduksi oleh Tubulus seminiferus dari testis. Sel mani berkembang dari sel spermatogonia pada epitel germinatif dari Tubulus seminiferus dengan jalan pembelahan. Proses spermatogenesis pada hewan

mamalia dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap proliferasi, tahap ini dimulai pada testis hewan sejak belum lahir sampai beberapa waktu setelah lahir. Bakat sel kelamin yang ada pada lapisan basal dari Tubulus seminiferus melepaskan diri dan membelah secara mitosis sampai dihasilkan banyak sel spermatogonia Hardjopranto (1995).

Semua proses spermatogenesis dikontrol oleh sistem Endokrin yaitu hormon Gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar Hipofisis anterior, misalnya FSH (*Follicle stimulating hormone*) mendorong proses spermatogenesis pada hewan jantan. Hormon ICSH (*Interstitial cell stimulating hormone*) atau LH (*Luteinizing hormone*) dari kelenjar Hipofisis anterior mempengaruhi produksi hormon Testosteron oleh sel-sel Leydig dari testis. Hormon Testosteron mempunyai fungsi mengatur kelakuan birahi hewan jantan, dan secara tidak langsung mendorong proses spermatogenesis bersama-sama dengan FSH. Hormon jantan juga mempengaruhi fungsi terhadap epididimis, Ductus deferens, dan produksi kelenjar aksesori (Hardjopranto, 1995).

Menurut Isnaeni (2006), pengeluaran FSH dirangsang oleh GnRH (*Gonadotropin Releasing Hormone*), yaitu hormon pelepas Gonadotropin dan Hipotalamus. Gonadotropin meliputi FSH dan LH. FSH merangsang sel spermatogenik untuk membelah secara mitosis beberapa kali, dan diakhiri dengan pembelahan meiosis sehingga dihasilkan spermatid yang bersifat haploid. FSH juga merangsang sel sertoli untuk melepaskan zat tertentu yang dapat merangsang dimulainya. Spermatogenesis (diferensiasi spermatid menjadi sperma). Sel sertoli

juga dirangsang oleh Testosteron atau Androgen (hormon yang dikeluarkan oleh sel *leydig*). Testosteron merupakan hormon yang juga penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi serta ciri seks sekunder pada hewan jantan. Pelepasan testosteron dikendalikan oleh hormon pituitari anterior yang lain, yaitu LH (*Luteinizing hormone*), yang pengeluarannya juga dikendalikan oleh GnRH. Proses spermatogenesis dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 2. Proses spermatogenesis (Junqueira, 2007)

E. Semen Sapi Bali

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan kedalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung untuk keperluan IB. Semen terdiri dari spermatozoa dan plasma. Spermatozoa adalah sel-sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testes sedangkan plasma semen yaitu campuran sekresi yang diproduksi oleh epididimis kelenjar vesikularis dan prostat (Toelihere, 1993).

Semen segar merupakan sekresi organ reproduksi jantan yang diejakulasikan dan dapat dikoleksi kemudian dibekukan untuk keperluan IB

(Suzanna, 2008). Sebelum dibekukan kualitas semen segar harus dievaluasi terlebih dahulu.

Semen adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi. Semen terdiri dari bagian yang ber-sel dan bagian yang tidak bersel. Sel-sel hidup yang bergerak disebut spermatozoa dan yang cair tempat sel bergerak dan berenang disebut seminal plasma (Yendraliza, 2008).

Semen segar merupakan sekresi organ reproduksi jantan yang diejakulasikan dan dapat dikoleksi kemudian dibekukan untuk keperluan IB (Suzanna, 2008). Sebelum dibekukan kualitas semen segar harus dievaluasi terlebih dahulu.

Pada semen terdapat plasma dan spermatozoa. Fungsi utama plasma semen adalah sebagai medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina. Fungsi ini dapat dijalankan dengan baik karena pada banyak spesies plasma semen mengandung bahan-bahan penyangga dan makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa baik yang dapat dipergunakan secara langsung (misalnya fruktosa dan sorbitol) maupun secara tidak langsung misalnya Gliseril Fosforil Kolin (GPC) (Toelihere, 1993).

Komposisi kimiawi semen sapi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi kimiawi semen sapi

Komposisi Semen	Satuan (mg/100 ml)
Ph	6,9 (6,4-7,8)
Air, g/100 ml	90 (87-95)
Natrium	230 (240-280)
Kalium	140 (80-210)
Magnesium	44 (35-60)
Klorida	9 (7-12)
Fruktosa	180 (110-290)
Sorbitol	530 (150-900)
Asam sitrat	(10-140)
Inositol	720 (340-1150)
Inositol	35 (25-46)
Glyceryl Phosphoryl Choline (GPC)	350 (100-500)
Protein, g/100 ml	6,8
Plasmalogen	(30-90)

Sumber: Fitri (2009)

1. Semen Beku Sapi bali

Semen beku adalah semen yang telah diencerkan menurut prosedur dengan tujuan selain untuk menyediakan makanan bagi spermatozoa juga untuk meningkatkan volume dengan menurunkan konsentrasi semen sehingga didapat 25 juta sel spermatozoa dalam satu straw yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan saat semen segar. Kemudian dibekukan jauh dari titik 0°C tergantung pada zat yang dipakai untuk membekukan semen tersebut. Pembekuan bisa menggunakan es kering, cairan udara, O₂ cair, dan N₂ cair. N₂ cair yang paling populer digunakan sebab dapat membekukan pada suhu yang paling rendah dan dapat menyimpan semen dalam waktu yang lama. Kombinasi es kering dan kristal

CO₂ dapat mencapai titik -70°C, cairan N₂ suhunya -196°C, sedangkan CO₂ cair dan udara cair suhunya -190°C (Partodiharjo, 1992).

Model pengemasan semen beku yang biasa digunakan menurut Hafez (1993) yaitu:

1. *Straw* yang terbuat dari polivinil klorida.
2. Ampul gelas berisi 0,5-1 ml semen.
3. Pellet berisi 0,1-0,2 ml semen.

Umur dan daya guna semen yang dibekukan akan bertahan lama karena pembekuan adalah menghentikan sementara kegiatan hidup dari sel (metabolisme sel) tanpa mematikan fungsi sel dimana proses hidup dapat terus berlanjut setelah pembekuan dihentikan. Jadi, pada prinsipnya menggunakan faktor penurunan temperatur untuk mempertahankan daya hidup dan kemampuan fertilisasi spermatozoa. (Partodiharjo, 1992).

2. Penampungan Semen

Beberapa cara penampungan semen sapi untuk tujuan IB telah berkembang, diantaranya dengan vagina buatan dan electro-ejakulator. Penggunaan vagina buatan untuk menampung semen sapi telah dipakai secara luas. Pejantan akan menaiki sapi betina pemancing dan akan berejakulasi pada waktu penis dimasukkan ke dalam vagina buatan. Vagina buatan terdiri dari silinder karet tebal dan keras, di dalamnya dilapisi silinder karet tipis dan merupakan kantung yang dapat diisi air panas. Salah satu ujung vagina buatan dipasang karet berbentuk corong untuk menampung semen. Vagina buatan yang

telah diisi air panas dan di bagian dalam diberi pelicin, akan berfungsi untuk menampung semen (Salisbury dan Van Demark, 1985).

Sterilisasi dalam pelaksanaan penampungan semen sangat diperlukan demi menjaga kebersihan semen. Perlakuan yang baik dan hati-hati terhadap pejantan diperlukan untuk memberikan rangsangan sebagai persiapan sebelumnya karena rangsangan ini akan dapat menaikkan kuantitas dan kualitas semen yang ditampung. Bila hewan pemancing tidak menimbulkan nafsu kawin bagi pejantan, maka hewan pemancing dan suasana lingkungan perlu diganti. Fasilitas yang cukup untuk menguasai pejantan dan hewan pemancing harus dilakukan supaya bahaya kecelakaan bagi penampung maupun bagi hewan itu sendiri dapat dihindari (Toelihere, 1985).

3. Pembekuan semen

Pembekuan merupakan proses pengeringan fisik, jika suatu larutan dibekukan maka air sebagai pelarut membeku menjadi kristal es, sedangkan bahan terlarut tidak berbentuk kristal es, tetapi terkumpul dalam larutan yang masih ada dan bertambah pekat karena molekul air bergabung dengan kristal es (Toelihere, 1985).

Tujuan pembekuan adalah agar semen dapat disimpan lama, sehingga semen dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan melalui Inseminasi Buatan (IB). Di samping itu, keuntungan menggunakan semen beku ialah dapat mengatasi hambatan waktu dan jarak, sehingga dapat disediakan kapan dan di mana saja. Namun, rendahnya kualitas semen dan tidak optimalnya teknik penanganan semen beku yang digunakan, kondisi reproduksi sapi betina, serta manajemen ternak dan

keterampilan inseminator merupakan faktor yang menghambat keberhasilan IB (Herdis, 1998).

Proses pembekuan semen meliputi *cooling* (pendinginan), *pre freezing* (pembekuan awal), dan *freezing* (pembekuan).

a. *Cooling* (Pendinginan)

Cooling adalah proses pendinginan semen setelah proses pengenceran, dimasukkan dalam gelas ukur tertutup dan ditempatkan pada beaker glass berisi air. *Cooling* sampai 5°C dapat dilakukan dengan memasukkan tabung-tabung yang berisi semen yang telah diencerkan dalam bak yang berisi air. Bak tersebut kemudian dimasukkan dalam refrigerator. Suhu air yang dipergunakan dalam *cooling* sesuai dengan suhu inkubasi semen segar yakni 37°C dan suhu 30°C (Lindsay, 1982).

b. *Pre freezing* (Pembekuan awal)

Straw yang berisi semen diatur pada rak straw dan ditempatkan dalam uap N₂ cair sekitar 4,5 cm diatas permukaan nitrogen cair. Pembekuan ini berlangsung sekitar 10 menit, kemudian dimasukkan langsung ke dalam nitrogen cair (Toelihere, 1985).

c. *Freezing* (Pembekuan)

Freezing merupakan proses penghentian sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel dan proses hidup dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan. Sedangkan semen beku adalah semen yang telah diencerkan menurut prosedur lalu dibekukan dibawah suhu 0°C atau titik beku air (Partodiharjo, 1992).

Menurut Toelihere (1993), pembekuan dapat menggunakan CO₂ padat, udara basah, O₂ cair dan nitrogen cair. Pembekuan dengan N₂ cair lebih sering digunakan karena suhunya yang sangat rendah dapat menyimpan semen dalam jangka waktu yang lama. Pada proses ini *straw* direndam dengan suhu -196°C. Volume N₂ cair harus dikontrol secara periodik, karena jika kehabisan akan menaikkan suhu sehingga akan mematikan spermatozoa. Untuk menjamin kelangsungan hidup spermatozoa yang terkandung di dalam *straw* maka N₂ cair di dalam kontainer tidak boleh kurang dari ukuran minimal yang ditentukan yaitu setinggi 3 inci. Seandainya tinggal 3 inci, maka penambahan N₂ cair harus dilakukan segera dalam waktu 12 jam.

E. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Produksi Semen

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen diantaranya adalah umur, bangsa ternak, genetik, lingkungan, pakan dan jenis pengencer yang digunakan.

1. Umur

Faktor yang mempengaruhi produksi semen salah satunya adalah umur pejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis pada sapi berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan (Nuryadi, 2000).

Hafez (2000) menyatakan bahwa produksi semen dapat meningkat sampai umur tujuh tahun. Pada saat pubertas, spermatozoa masih banyak yang abnormal

karena masih muda sehingga banyak mengalami kegagalan pada waktu dikawinkan. Menurut Mathevon (1998) bahwa volume, konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi jantan dewasa lebih banyak daripada sapi jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa motil per ejakulat cenderung meningkat dengan bertambahnya umur pejantan mencapai 5 tahun.

Tabel 2. Volume, Konsentrasi, Motilitas, Jumlah Total Spermatozoa dan Jumlah Total Spermatozoa Motil pada Ejakulat Sapi Jantan Muda dan Sapi Jantan Dewasa.

Kualitas	Sapi jantan muda (umur sampai dengan 30 bulan)	Sapi jantan dewasa (umur 4 sampai 6 tahun)
Volume (ml)	5,48±1,83	6,73±1,99
Konsentrasi (10 ⁶ /ml)	1296±437	1380±444
Motilitas	51±17	57±14
Total Spermatozoa (10 ⁶ /ml)	7090±3287	9310±4138

Sumber: Mathevon, *et al.* (1998).

Pejantan yang terlalu muda (umur kurang dari 1 tahun) atau terlalu tua menghasilkan semen yang lebih sedikit. Susilawati dkk. (1993) menyatakan bahwa pejantan yang berumur 2 sampai 7 tahun dapat menghasilkan semen terbaik dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini dibandingkan dengan pejantan yang berumur diluar interval tersebut. Umur sangat berpengaruh pada sapi jantan muda saat penampungan, karena perubahan fisiologis yang terjadi seperti dewasa kelamin. Volume dan konsentrasi dari satu ejakulat meningkat sampai umur 11 tahun (Siratskii, 1990).

2. Bangsa

Bangsa sapi *Bos Taurus* mengalami dewasa kelamin lebih cepat bila dibandingkan dengan sapi *Bos Indicus*. Persilangan dari dua bangsa sapi tersebut akan mencapai pubertas pada umur yang sama dengan induknya (Sprott, 1998).

Bangsa sapi perah mempunyai libido lebih tinggi dan menghasilkan spermatozoa yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi potong (Hafez, 2000). Coulter (1997) dan Sprott (1998) menyatakan bahwa bangsa juga berpengaruh terhadap lingkaran skrotum yang berkorelasi positif dengan produksi dan kualitas spermatozoa. Chandolia (1999) menyatakan bahwa pengaruh heat shock pada persentase spermatozoa yang motil pada Sapi Holstein lebih rendah dibandingkan bangsa sapi yang lain.

3. Genetik

Coulter (1997) dan Sprott (1998) menyatakan bahwa produksi spermatozoa berkorelasi positif dengan ukuran testis yang dapat diestimasi dengan panjang, berat dan lingkaran skrotum. Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa ukuran testis dipengaruhi oleh genetik, umur, bangsa ternak dan individu. Chandolia (1999) menyebutkan bahwa genetik juga mempengaruhi ketahanan sel spermatozoa terhadap *heat shock* pada saat *thawing*.

4. Lingkungan

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini menyebabkan fungsi thermoregulatoris skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan pembentukan spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. Pejantan yang ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena memburuknya kualitas semen dan didapatkan 10% spermatozoa yang abnormal (Susilawati, 1993).

Pond (1999) menyatakan jika suhu lingkungan terlalu panas spermatozoa yang diproduksi tidak dapat bertahan hidup dan menyebabkan sterilitas sapi jantan, sehingga manajemen saat stress perlu dilakukan untuk menjaga fertilitas spermatozoa. Suhu normal di daerah testis berkisar 3-7°C di bawah suhu tubuh.

Musim dapat mempengaruhi kualitas semen pada ternak-ternak yang berada di daerah subtropis. Di Indonesia, musim kurang berpengaruh karena perbedaan lama penyinaran hampir tidak ada (Susilawati, 1993). Perubahan musim karena perbedaan lamanya siang hari atau lamanya penyinaran dapat menghambat produksi FSH yang dapat menghambat produksi spermatozoa oleh testis (Hafez, 2000). Hasil penelitian Mathevon (1998) menyatakan bahwa konsentrasi, jumlah semen dan motilitas per ejakulat pada pejantan Holstein lebih baik pada musim dingin dan semi dibandingkan pada musim gugur. Musim saat penampungan dilaksanakan tidak mempengaruhi persentase spermatozoa motil pada sapi jantan dewasa.

5. Pakan

Nutrisi sangat penting selama perkembangan sistem reproduksi sapi jantan muda. Meningkatkan jumlah nutrisi akan mempercepat pubertas dan pertumbuhan tubuh (Sprat, 1998). Makanan berpengaruh terhadap ukuran testis pada ternak jantan. Makanan yang diberikan terlalu sedikit terutama pada periode sebelum masa pubertas dicapai dapat menyebabkan perkembangan testis dan kelenjar-kelenjar asesoris terhambat dan dapat memperlambat dewasa kelamin. Pada ternak dewasa, kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi

fisiologis, baik pada testis maupun pada kelenjar aksesorisnya dan dapat menurunkan libido sehingga produksi semen turun (Susilawati, 1993).

Coulter (1998) menyatakan bahwa pemberian 100% hijauan pada Sapi Angus, Hereford dan Simental setelah disapih mempunyai lingkaran skrotum, produksi semen harian dan spermatozoa motil progresif lebih besar dari pada pakan dengan energi tinggi (80% konsentrat dan 20% hijauan).

6. Jenis Pengencer

Beberapa masalah yang sering terjadi pada pengenceran semen yaitu penurunan daya hidup dan motilitas spermatozoa, yang disebabkan oleh adanya radikal bebas yang dapat merusak sel spermatozoa. Antioksidan dapat menetralkan radikal bebas, dan antioksidan yang sering digunakan adalah glutathione. *Glutathione* adalah antioksidan *sulphydryl* (-SH), antitoksin dan kofaktor enzim, berdasarkan sifat antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas. Glutathione adalah antioksidan primer yang bekerja dengan cara menetralkan pembentukan radikal bebas. Antioksidan ini mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang kurang mempunyai dampak negatif. Bahan pengencer spermatozoa yang paling umum digunakan yaitu kuning telur. Manfaat kuning telur terletak pada lipoprotein dan lesitin yang terkandung didalamnya yang bekerja mempertahankan dan melindungi integritas selubung lipoprotein dari sel spermatozoa (Toelihere, 1993).

F. Evaluasi Semen

Semen yang telah ditampung sebelum diproses lebih lanjut dievaluasi dalam kondisi segar. Menurut Susilawati (1993) tujuan evaluasi semen segar adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas semen.
2. Untuk mengetahui bahan pengencer yang dibutuhkan.
3. Untuk mengetahui jumlah *straw* yang dapat dihasilkan dalam proses pembekuan semen.

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung untuk keperluan IB.

Semen terdiri dari :

1. Spermatozoa yaitu sel-sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testes.
2. Plasma semen yaitu campuran sekresi yang diproduksi oleh epididimis, kelenjar vesikularis dan kelenjar prostat.

Spermatozoa terdiri dari :

1. Kepala, yang membawa materi hereditas paternal.
2. Ekor, yang mengandung sarana penggerak.

Semen dari suatu spesies hewan mempunyai perbedaan dalam sifat-sifatnya dengan spesies yang lain. Perbedaan itu terletak pada volume, kekentalan, pH, konsentrasi, warna dan baunya.

Semen beku adalah semen yang diencerkan menurut prosedur tertentu, lalu dibekukan jauh di bawah titik beku air (Sayoko, 2007). Proses pengenceran semen

dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan dan menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Bahan pengencer mengandung zat-zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi dan tidak bersifat racun bagi spermatozoa, dapat melindungi spermatozoa dari kejut dingin (cold shock), menghambat pertumbuhan mikroba serta bersifat sebagai penyangga (Djanuar, 1985).

a. Evaluasi Makroskopis

Evaluasi makroskopis menurut Feradis (2010) yaitu :

1. Volume

Volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung penampung semen yang berskala. Semen sapi dan domba mempunyai volume rendah tetapi konsentrasi sperma tinggi sehingga memperlihatkan warna krem atau warna susu. Volume semen per ejakulat berbeda menurut bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan makanan, frekuensi penampungan dan berbagai faktor lain. Pada umumnya, hewan muda yang berukuran kecil dalam satu spesies menghasilkan volume semen yang rendah. Ejakulasi yang sering menyebabkan penurunan volume dan apabila dua ejakulat diperoleh berturut-turut dalam waktu singkat maka umumnya ejakulat yang kedua mempunyai volume yang lebih rendah.

Volume semen sapi antara 3-8 ml, domba 0,8-1,2 ml, babi 150-200 ml, dan kuda 60-100 ml. Volume rendah tidak merugikan tetapi apabila disertai dengan yang rendah akan membatasi jumlah spermatozoa yang tersedia.

2. Warna

Semen sapi normal berwarna seperti susu atau krem keputih-putihan dan keruh. Kira-kira 10% sapi menghasilkan semen yang normal dengan warna kekuning-kuningan, yang disebabkan oleh riboflavin yang dibawa oleh satu gen autosom resesif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap fertilitas.

Adanya kuman-kuman *Pseudomonas Aeruginosa* di dalam semen sapi dapat menyebabkan warna hijau kekuning-kuningan apabila semen dibiarkan di suhu kamar. Gumpalan-gumpalan, bekuan dan kepingan-kepingan di dalam semen menunjukkan adanya nanah yang umumnya berasal dari kelenjar-kelenjar pelengkap dari ampula. Semen yang berwarna gelap sampai merah muda menandakan adanya darah segar dalam jumlah berbeda dan berasal dari saluran kelamin urethra atau penis. Warna kecoklatan menunjukkan adanya darah yang telah mengalami dekomposisi. Warna coklat muda atau warna kehijau-hijauan menunjukkan kemungkinan kontaminasi dengan feses.

3. pH

Pada umumnya, sperma sangat aktif dan tahan hidup lama pada pH sekitar 7,0. Motilitas partial dapat dipertahankan pada pH antara 5 sampai 10. Walaupun sperma segera dimobiliser oleh kondisi-kondisi asam, pada beberapa spesies dapat dipulihkan kembali apabila pH dikembalikan ke netral dalam waktu satu jam. Sperma sapi dan domba yang menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang tinggi dan metabolisme fruktosa plasma seminalis, sehingga penting untuk memberikan unsur penyangga seperti garam phospat, sitrat bikarbonat di dalam medium (Toelihere, 1985).

b. Evaluasi Mikroskopis

1) Konsentrasi

Konsentrasi digabung dengan volume dan persentase spermatozoa motil memberikan jumlah spermatozoa motil per ejakulasi, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang dapat diinseminasi dengan ejakulasi (Feradis, 2010).

Metode perhitungan konsentrasi spermatozoa, yaitu:

1. Menghitung jarak antar kepala sperma

Menurut Feradis (2010) cara ini adalah yang paling praktis dan sederhana untuk pemeriksaan rutin di lapangan yang dilakukan tanpa alat selain mikroskop dengan memperkirakan jarak antara dua kepala spermatozoa di bawah mikroskop dengan pembesaran 45x10 dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Densum (D) atau padat, jika jarak antara dua kepala spermatozoa kurang dari panjang satu kepala; konsentrasi ditaksir lebih kurang 1000 juta sampai 2000 juta sel per ml semen.
- b. Semi Densum (SD) atau sedang, jika jarak antara dua kepala spermatozoa sama dengan panjang satu sampai 1,5 kepala; konsentrasi ditaksir lebih kurang 500 juta sampai 1000 juta sel per ml semen.
- c. Rarum (R) atau jarang, jika jarak antara dua kepala spermatozoa melebihi panjang satu kepala atau sama dengan panjang seluruh spermatozoa; konsentrasi ditaksir lebih kurang 200 juta sampai 500 juta sel per ml semen.

- d. Oligospermia (OS) atau sedikit spermatozoa, jika jarak antara dua kepala spermatozoa melebihi panjang seluruh spermatozoa; konsentrasi ditaksir kurang 200 juta sel per ml semen.
- e. Aspermia (A) atau tidak ada spermatozoa, bila sama sekali tidak terdapat spermatozoa di dalam semen.

2. Perhitungan dengan *Hemocytometer*

Menurut Feradis (2010), metode perhitungan secara langsung dilakukan memakai alat penghitung sel-sel darah merah atau *hemocytometer*. Pipet erythrocyt diisi dengan semen yang belum diencerkan sampai tanda 0,5. Suatu larutan 3% NaCl dihisap sampai tanda 101 pada pipet; larutan tersebut mengencerkan sekaligus mematikan spermatozoa. Larutan ini dikocok hati-hati tetapi cukup cepat menurut angka 8 selama 2 sampai 3 menit. Beberapa tetes dibuang dan dikocok lagi. Beberapa tetes lagi dibuang, kemudian satu tetes ditempatkan di bawah gelas penutup pada kamar hitung sel darah merah menurut Neubauer. Sel-sel spermatozoa di dalam 5 kamar dihitung menurut arah diagonal. Karena setiap kamar mempunyai 16 ruangan kecil, maka di dalam 5 kamar terdapat 80 ruangan kecil. Dengan volume setiap ruangan kecil adalah 0,1 mm³ dan pengenceran 200 kali, dan apabila di dalam 5 kamar atau 80 ruangan kecil terdapat X spermatozoa, maka konsentrasi spermatozoa yang diperiksa adalah:

$$X \times \frac{400}{80} \times 10 \times 20 = 10.000 = X \times 0,01 \text{ juta sperma per mm}^3$$

Atau $X \times 10$ juta sperma per ml.

Prosedur ini memberi suatu indikasi yang akurat tentang konsentrasi spermatozoa di dalam contoh semen apabila pencampuran larutan dilakukan sempurna. Selain dengan hemocytometer, penentuan konsentrasi spermatozoa juga dapat dilakukan dengan spectrophotometer dan SDM 5 photometer. Keunggulan SDM 5 photometer adalah dapat menentukan jumlah bahan pengencer yang harus ditambahkan dan jumlah dosis semen beku yang dihasilkan pada setiap penampungan secara otomatis. Hasil perhitungan dapat terbaca dengan mudah pada hasil print out (Feradis, 2010).

2) Motilitas

1. Gerakan massa

Menurut Vandenmark (1985) sesuai dengan bentuk morfologi spermatozoa dan pola metabolisme yang khusus dengan dasar produksi energi spermatozoa hidup dapat mendorong dirinya sendiri maju ke depan di dalam lingkungan zat cair. Motilitas telah sejak lama dikenal sebagai alat untuk memindahkan spermatozoa melalui saluran reproduksi hewan betina. Transport kilat spermatozoa dari serviks ke infundibulum terjadi secara otomatis (meski pada spermatozoa tidak motil) karena rangsangan oxytocin, terhadap konsentrasi saluran reproduksi. Motilitas spermatozoa di dalam infundibulum bertugas sebagai alat penyebaran spermatozoa secara acak ke seluruh daerah saluran kelamin betina, dimana terdapat ovum yang mampu dibuahi, jadi menjamin kepastian secara statik pertemuan spermatozoa dengan ovum. Faktor-faktor yang mempengaruhi motilitas spermatozoa adalah umur sperma, maturasi (pematangan) sperma, penyimpanan energi ATP (Adenosin Triphosfat), agen

aktif, biofisik dan fisiologi, cairan suspensi dan adanya rangsangan hambatan (Hafez, 2000).

Menurut Feradis (2010) menyatakan bahwa sperma dalam suatu kelompok mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-sama ke satu arah yang menyerupai gelombang yang tebal dan tipis, bergerak cepat dan lambat tergantung dari spermatozoa hidup di dalamnya. Gerakan massa spermatozoa dapat dilihat jelas bawah mikroskop dengan perbesaran (10x10) dan cahaya yang kurang. Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif bagaikan gumpalan awan hitam saat akan turun hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat.
- b. Baik (++), bila dilihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lambat.
- c. Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan gerakan individual aktif progresif.
- d. Buruk (N, necrospermia atau 0), bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan gerakan individual.

2. Gerakan Individual

Di bawah pembesaran pandangan mikroskop (45x10) pada selapis tipis semen di atas gelas objek yang ditutupi glas penutup akan terlihat gerakan-gerakan individu spermatozoa. Pada umumnya yang terbaik adalah pergerakan progresif atau gerakan aktif maju kedepan. Gerakan maju dan mundur merupakan

tanda cold shock atau media yang tidak isotonik dengan semen. Gerakan berayun atau berputar di tempat biasanya terjadi pada semen yang tua, jika semen tidak bergerak maka dianggap mati (Feradis, 2010).

3. Penilaian

Penilaian dinyatakan dalam persentase sel spermatozoa yang gerak maju (motil progresif) terhadap keseluruhan jumlah sel spermatozoa serta gerak individu sperma sebagaimana ditetapkan dalam standar mutu semen beku sapi.

Kualitas semen ditentukan dengan nilai 0 sampai 5 sebagai berikut:

- 0 : spermatozoa immotile atau tidak bergerak;
- 1 : gerakan berputar di tempat;
- 2 : gerakan berayun atau melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif dan tidak ada gelombang;
- 3 : antara 50% sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa;
- 4 : pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma motil;
- 5 : gerakan yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat, menunjukkan 100% motil aktif.

Skala persentase pergerakan dari 0-100 atau 0-10 merupakan alat untuk mencapai tujuan yang sama. Motilitas spermatozoa di bawah 40% menunjukkan nilai semen yang kurang baik karena kebanyakan persentase yang fertil itu 50-80% spermatozoa yang motil aktif progresif (Feradis, 2010).

4. Persentase hidup

Sperma yang hidup dapat diketahui dengan pengecatan atau pewarnaan dengan menggunakan eosin. Eosin dapat dibuat dari serbuk eosin yang dilarutkan dalam aquadest dengan konsentrasi 1 : 9. Kemudian sperma ditetesi dengan larutan eosin dan diratakan, kemudian di angin-anginkan atau difiksasi dengan menggunakan spiritus, setelah itu dilihat di bawah mikroskop. Sperma yang tercat atau berwarna merah berarti sperma itu mati, sedangkan yang tidak terwarnai atau tidak tercat berarti sperma itu hidup (Mulyono, 1998).

Perbedaan afinitas zat warna antara sel-sel sperma yang mati dan yang hidup digunakan untuk melindungi jumlah sperma hidup secara objektif pada waktu semen segar dicampur dengan zat warna (eosin 2%). Sel-sel sperma yang hidup tidak atau sedikit sekali menghisap warna sedangkan yang mati akan mengambil warna karena permeabilitas dinding meningkat sewaktu mati. Tujuan pewarnaan diferensial adalah untuk mengetahui persentase sel-sel sperma yang mati dan yang hidup (Hafez, 1987).

H. Penelitian Terdahulu

1. Prastowo (2017) “Kualitas Semen Segar Sapi Bali (*Bos Javanicus*) pada Kelompok Umur Yang Berbeda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok umur 4 dan 7 tahun masing-masing diperoleh volume $4,55 \pm 0,91$ ml dan $5,18 \pm 1,58$ ml, pH $6,51 \pm 0,06$ dan $6,52 \pm 0,01$, konsentrasi $962,30 \pm 390,50 \times 10^6/\text{ml}$ dan $1079,00 \pm 90,56 \times 10^6/\text{ml}$, L/D $71,88 \pm 2,58\%$ dan $72,02 \pm 1,35\%$, motilitas $68 \pm 3,11\%$ dan $66,04 \pm 6,30\%$, abnormalitas primer $1,054 \pm 0,20\%$ dan $0,93 \pm 0,14\%$ serta abnormalitas sekunder $3,54 \pm 0,48\%$ dan $4,24 \pm 0,31\%$. Pada penelitian ini,

umur pejantan berpengaruh secara nyata ($P < 0,05$) pada volume dan abnormalitas sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pejantan sapi Bali umur 7 tahun menghasilkan volume semen dan abnormalitas sekunder lebih tinggi dibandingkan umur 4 tahun.

2. Nurul Isnaini (2015) "Kualitas Semen Segar dan Produksi Semen Beku Sapi Simental pada Umur yang Berbeda". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas semen segar pada 4 kelompok umur 3, 4, 7 dan 8 tahun secara berturut-turut adalah volume: $6,9 \pm 1,7$; $7,3 \pm 0,5$; $7,8 \pm 0,3$ dan $9,2 \pm 1,6$ ml, pH: $6,4 \pm 0,1$; $6,5 \pm 0,1$; $6,5 \pm 0,1$ dan $6,5 \pm 0,1$, motilitas massa: $2 \pm 0,04$; 2 ± 0 ; $2 \pm 0,05$ dan $1,8 \pm 0,22$ (+), persentase motilitas individu: $72,1 \pm 1,2$; $71,3 \pm 0,8$; $70,3 \pm 0,5$ dan $66,3 \pm 5\%$, konsentrasi spermatozoa: $1.703,3 \pm 167,2$; $1.612,2 \pm 172,2$; $1.450,7 \pm 172,2$ dan $1.254,6 \pm 113,6$ (juta/ml), total spermatozoa: $11.586,5 \pm 1945,6$; $10.468,1 \pm 1148,8$; $12.593,6 \pm 947,8$ dan $11.570,2 \pm 2642,2$ juta sel, total spermatozoa motil: $8.341,8 \pm 1.282,5$; $7.471,7 \pm 845,6$; $8.857,6 \pm 662,7$ dan $7.820,3 \pm 2.229,4$ juta sel, jumlah *straw* semen beku: $300 \pm 38,2$; $263,6 \pm 57,8$ dan $236,6 \pm 180,1$ buah *straw*.

3. Mita Ayu Rahmawati (2015) "Kualitas Semen dan Produksi Semen Beku pada Bangsa Sapi dan Bulan Penampungan yang Berbeda". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan sapi potong memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume semen ($P < 0,01$), mortalitas spermatozoa ($P < 0,01$), konsentrasi spermatozoa ($P < 0,01$), jumlah spermatozoa ($P < 0,01$), jumlah motil spermatozoa ($P < 0,01$) dan pH ($P > 0,05$). Pengumpulan bulan yang berbeda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume semen ($P < 0,01$), pH ($P < 0,05$), motilitas spermatozoa ($P < 0,01$), konsentrasi spermatozoa ($P < 0,01$),


jumlah spermatozoa ($P < 0,01$), jumlah spermatozoa motil ($P < 0,01$). Interaksi antara pengembangbiakan sapi potong dan bulan pengumpulan berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume semen ($P < 0,01$), motilitas spermatozoa ($P < 0,01$), konsentrasi spermatozoa ($P < 0,05$) dan jumlah spermatozoa motil ($P < 0,01$).

Ketiga hasil penelitian diatas menjadi dasar bagi calon peneliti untuk melakukan kajian tentang kualitas semen segar dan produksi semen beku sapi bali pada umur yang berbeda.

I. Kerangka Pikir

Sapi bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi dan persentase karkas yang tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas sapi bali pejantan melalui reproduksi dilakukan seleksi semen sapi bali dengan perbandingan umur yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 3 ekor sapi bali pejantan yang berumur 3-4 tahun, 5-6 tahun dan 7-8 tahun. Untuk mengetahui kualitas semen segar maka dilakukan uji makroskopis dan mikroskopis, yang meliputi volume semen dan konsentrasi, sedangkan pada produksi semen beku dapat dilihat dari produksi *straw* yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas sapi bali pejantan dapat dipengaruhi oleh umur yang berbeda, jika produksi semen segar memenuhi standar kualitas semen



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

J. Gambaran Umum UPT-PIBPS

1. Profil Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (UPT-PIBPS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit pelayanan teknis inseminasi buatan adalah salah satu UPT yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Desa Pucak, kecamatan Tompobulu kabupaten Maros. Ditetapkan pada tahun 2001 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.132 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001. Hal tersebut dimaksudkan untuk menindak lanjut kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Desentralisasi IB. Serta upaya pemerintah dalam meningkatkan populasi dan produksi peternakan terutama ternak ruminansia melalui upaya perbaikan mutu genetik ternak sapi dan kambing berupa penerapan teknologi Inseminasi Buatan(Kawin Suntik) dan Embrio Transfer (TE). Dengan berlakunya otonomi daerah sesuai UU No.22 Tahun 1999 yang dipengaruhi dengan UU No.32 Tahun 2003 dan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewarganegaraan pusat dan daerah, maka ditempuh kebijaksanaan desentralisasi inseminasi buatan (IB).

Adapun tujuan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (PT-PIBPS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan :

- a. Tersedianya kebutuhan semen yang berkualitas secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.
- b. Meningkatkan produktifitas dan mutu genetik ternak potong.

- c. Menciptakan lapangan kerja dibidang agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya peternakan secara optimal.
- d. Secara langsung meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (PT-PIBPS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Visi

- 1) Menjadi produsen semen beku yang berkualitas di Sulawesi Selatan

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan ternak lokal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- 3) Mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja mandiri melalui pemanfaatan teknologi inseminasi buatan (IB) guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peternak.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen (PT-PIBPS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 42 Tanggal 19 Januari Tahun 2018.




Diagram Alur 2. Struktur Organisasi

Tabel 1. Data Sumber Daya Pegawai pada UPT-PIBPS Pucak Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala UPTD-PIBPS	1 Orang
2	Eselon IV	3 Orang
3	Staf TU	4 Orang
4	Koordinator Lapangan	1 Orang
5	Staf Pelayanan IB	3 Orang
6	Staf Pemeliharaan Ternak	3 Orang
7	Medik Veteriner	2 Orang
8	Bull Master	2 Orang
9	Laboran	3 Orang
10	Petugas KBR	3 Orang
11	Tenaga Fungsional	3 Orang
12	Sopir	1 Orang

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2020

Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana pada UPT-PIBPS Pucak Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Gedung Laboratorium	1 Unit
3	Kandang Pemeliharaan	5 Unit
4	Kandang Kawin	2 Unit
5	Line Bull	4 Unit
6	Gudang Pakan	1 Unit
7	Klinik Hewan	1 Unit
8	Gudang Kontainer	1 Unit
9	Kebun Rumput	1,5 Ha
10	Peralatan Pengolahan Pakan	1 Paket
11	Peralatan Laboratorium Canggih	1 Paket

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2020.

Tabel 3. Jenis-jenis Pejantan di UPT-PIBPS Pucak Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Jenis-jenis Pejantan	Jumlah
1	Sapi Simental	2 Ekor
2	Sapi Limosin	1 Ekor
3	Sapi Brahman	1 Ekor
4	Sapi Belgian Blue	1 Ekor
5	Sapi Bali	20 Ekor
6	Kerbau Belang	3 Ekor
7	Kambing Boer	2 Ekor

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2020, bertempat di UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel.

B. Bahan dan Alat

1. Alat dan bahan

a. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah vagina buatan, mikroskop, objek glass, cover glass, *container*, gegep, *beaker glass*, labu *Erlenmeyer*, printer straw, pipet mikron, *stick glass*, plastik gove.

b. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi bali umur (3-4), (5-6), (7-8), andromed, aquabidest, air hangat, semen segar dan straw semen beku, tissue, vaseline

2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen segar dan semen beku sapi bali dari 3 ekor sapi pada umur yang berbeda yang dipelihara di UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel.

C. Prosedur Penelitian

Catatan produksi semen segar diambil dari 3 ekor sapi bali pejantan yang berumur 3-4 tahun, 5-6 tahun, 7-8 tahun kemudian mengambil 12 sampel dengan 4 kali ulangan dari hasil pencatatan kualitas semen segar dan produksi semen beku. Sebelum melakukan pengambilan catatan kualitas semen segar dan produksi semen beku hal yang akan dilakukan yaitu :

1. Penampungan Semen

Produksi semen beku adalah proses pembuatan semen beku, mulai dari penampungan semen segar sampai dengan semen beku siap digunakan untuk pelayanan IB. urutan pembuatan semen beku meliputi : penampungan semen, pemeriksaan semen segar, pengenceran, pengisian *straw* dan pembekuan.

Pengambilan semen dilakukan pada pagi hari. Pejantan dibawa ke kandang jepit dan dipertemukan dengan betina pemancing untuk memberi rangsangan libido pada pejantan yang akan ditampung semennya. Vagina buatan yang telah disiapkan diberi pelicin, apabila terdapat tanda-tanda pejantan akan menaiki pejantan atau betina pemancing, maka vagina buatan dipasang pada penis untuk menampung semen, setelah itu dilakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis.

2. Pemberian Pakan

Pemberian pakan pada sapi bali pejantan dilakukan 2 kali sehari, pada pagi hari pakan yang diberikan adalah toge 1kg, crumble masing-masing 1 kg dan hijauan sebanyak 2 kg untuk satu ekor sapi pejantan. Kemudian untuk pemberian

pakan pada sore hari hanya diberikan hijauan sebanyak 2 kg untuk satu ekor sapi pejantan dengan umur yang berbeda.

3. Pemeriksaan Semen Segar

Pemeriksaan semen dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Penilaian semen segar secara makroskopis meliputi volume semen. Sedangkan secara mikroskopis meliputi , konsentrasi.

4. Pengenceran Semen Beku

Selain pengencer semen yang dibuat berdasarkan resep, terdapat berbagai pengencer kemasan yang telah beredar dan dapat diperoleh di pasaran seperti *Biochiphos* dan *Bioexcel* (IMV, Perancis) juga *triladyl*, *biladyl* dan pengencer *Andromed* (Minitub Jerman) yang menggunakan lesitin dari kacang kedelai (KK) (Arifiantini dan Yusuf, 2004).

Andromed merupakan salah satu pengencer komersial berbahan dasar Tris yang tidak menggunakan sumber protein asal hewan yang menjadi andalan untuk pengencer semen beku sapi (Minitub, 2001). Dengan adanya medium komersial ini diharapkan dapat mempermudah penyiapan medium untuk pengenceran dan penyimpanan semen dalam jangka waktu panjang. *Andromed* terdiri dari *phospholipid*, tris (*hydroxymethyl aminomethane*), asam sitrat, fruktosa, gliserol, *lesitin*, *tylosine tartrat*, *gentamycin sulfat*, *spectinomycin* dan *lincomycin* yang biasa digunakan untuk pembuatan semen beku sapi (Minitub, 2001). Tatacara penggunaan dilakukan hanya dengan penambahan aquades steril (milli-Q-water) dengan perbandingan *Andromax* : aquades steril = 1 : 4.

Metode koleksi semen segar sapi bali pejantan dilakukan 1-2 kali dalam sepekan, selanjutnya semen segar di uji secara makroskopis dan mikroskopis lalu disimpan dalam bentuk semen beku.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang diambil adalah dari catatan kualitas semen segar dan produksi semen beku sapi bali di UPT Pelayanan Inseminasi Buatan dan Produksi Semen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* (secara sengaja).

E. Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Produksi Semen Segar

- 1) Volume : semen per ejakulasi
- 2) Konsentrasi : penilaian konsentrasi digunakan untuk menentukan jumlah pengencer yang akan digunakan. Metode perhitungan konsentrasi spermatozoa, yaitu menghitung jarak antar kepala sperma.

Menurut Feradis (2010) cara ini adalah yang paling praktis dan sederhana untuk pemeriksaan rutin di lapangan yang dilakukan tanpa alat selain mikroskop dengan memperkirakan jarak antara dua kepala spermatozoa di bawah mikroskop dengan pembesaran 45x10.

$$\frac{10^6/\text{ml} = 1000.000/\text{ml}}{3,5 - 0,9 \% \times 10^6}$$

$$60\%$$

Keterangan :

- $10^6 = 1000.000$ juta sperma/ ml
- 3,5 adalah volume
- 0,9 adalah Nacl
- 60% motilitas

b. Produksi semen beku

Produksi *straw* adalah jumlah dosis atau total semen yang dapat diproduksi pada prosesing semen dan memenuhi syarat SNI semen beku. Pada *straw* 0,25 ml dengan jumlah sel spermatozoa 25 juta.

F. Analisis Data

Data kualitas semen segar dan produksi semen beku pada umur yang berbeda dibandingkan secara statistik dengan menggunakan analisis General Linear Model (Steel dan Torrie, 1993). General linear model (GLM) memiliki fungsi untuk membandingkan tiga ataupun lebih sampel penelitian, apabila menunjukkan hasil yang berpengaruh nyata yaitu pada taraf $P < 0,01$ maka dilanjutkan dengan uji BNT atau nilai (LSD) untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji Analisis Ragam dilakukan. Rumus matematikanya sebagai beriku

$$Qh = \frac{|\bar{Y}_a - \bar{Y}_b|}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$$

Keterangan :

\underline{Ya} = rerata skor kelompok eksperimen

\underline{Yb} = rerata skor kelompok kontrol

s^2 = varians gabungan (kelompok eksperimen + kontrol)

n = banyaknya sampel dalam satu kelompok

G. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah kualitas semen segar dan jumlah *straw* beku sapi bali dipengaruhi oleh umur yang berbeda.

H. Definisi Operasional

1. Semen Segar


Semen segar adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi. Semen terdiri dari bagian yang ber-sel dan bagian yang tidak bersel. Sel-sel hidup yang bergerak disebut spermatozoa dan yang cair tempat sel bergerak dan berenang di sebut seminal plasma.

2. Semen Beku

Semen beku adalah semen yang telah diencerkan menurut prosedur dengan tujuan selain untuk menyediakan makanan bagi spermatozoa juga untuk meningkatkan volume dengan menurunkan konsentrasi semen sehingga didapat 25 juta sel spermatozoa dalam satu *straw* yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan saat semen masih segar.

3. Sapi Bali Pejantan

Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi dan persentase karkas yang tinggi. Sapi Bali mempunyai ciri badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang, kepala agak tegak dengan dahi datar, badan padat dengan dada yang dalam, tidak berpunuk dan seolah tidak bergelambir, sapi Bali berkaki ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau. Hidung, kuku dan bulu ujung ekor hitam, tanduk pada sapi jantan tumbuh agak keluar kepala.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Volume Semen Segar

Semen segar sapi bali adalah dasar untuk menentukan kelayakan kualitas semen segar untuk diproses lebih lanjut. Penilaian kualitas semen segar terbagi dua yaitu penilaian secara makroskopis meliputi volume sedangkan penilaian secara mikroskopis meliputi konsentrasi.

Dapat dilihat bahwa karakteristik makroskopis semen segar sapi Bali yang digunakan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan makroskopis pada P1 (umur 3-4 tahun) memiliki rata-rata volume 2-3 ml sehingga total keseluruhan volume yang dihasilkan sebanyak 15.9 ml, P2 (umur 5-6 tahun) memiliki rata-rata volume 3-6 ml dengan total volume 18.5 ml dan P3 (umur 7-8 tahun) memiliki rata-rata volume 2-4 ml dengan total keseluruhan volume 12.6 ml dalam 4 kali penampungan.

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rata-rata volume semen segar pada umur yang berbeda

Umur (tahun)	Rata- rata volume semen \pm (ml)
P1 (3-4)	2.87 \pm 0.47 ^b
P2 (5-6)	4.65 \pm 1.07 ^a
P3 (7-8)	2.90 \pm 0.45 ^b

Ket: Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata ($P > 0,05$).

Ket: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata ($P < 0,01$).

Pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil rata-rata volume semen pada P1 (umur 3-4 tahun) yaitu 2.87 ± 0.47 ml, P2 (umur 5-6 tahun) rata-rata volume semen 4.65 ± 1.07 ml dan P3 (umur 7-8 tahun) rata-rata volume semen 2.90 ± 0.45 ml dengan 4 kali penampungan. Hasil analisis statistik dengan menggunakan General Linear Model (GLM) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$) yaitu pada P1 dan P2, tetapi pada P1 dan P3 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata ($P > 0,05$) sedangkan P2 dan P3 menunjukkan hasil yang sangat nyata ($P < 0,01$). Hal ini sesuai dengan penelitian Fuerst-waltl *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa umur memberikan pengaruh yang sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap volume semen sapi bali (*Bos Javanicus*), serta dikuatkan oleh hasil penelitian Dewi, Ondho dan Kurnianto (2012) yang menyatakan umur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume sapi bali. Selain itu, menurut Perumal (2014) pengaruh umur dengan volume disebabkan oleh ukuran testis, terutama pada lingkaran skrotum dan kapasitas produksi spermatozoa harian.

Volume semen terdiri atas dua komponen yakni spermatozoa dan plasma semen Perumal (2014). Spermatozoa merupakan sel pembawa genetik yang diproduksi oleh testis dan dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin serta androgen, Rizal dan Herdis (2008). Plasma semen merupakan sumber nutrisi bagi spermatozoa untuk hidup yang dihasilkan oleh kelenjar vesikularis (Akther *at al*, 2013).

Volume semen segar dilakukan dengan membaca angka pada tabung penampungan semen. Volume dapat juga digunakan dalam menentukan jumlah sperma per ejakulasi bila dikalikan dengan konsentrasi. (Lestari, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa volume semen segar sapi bali pada P1 (umur 3-4 tahun) memiliki rata-rata volume 2.87 ml, P2 (umur 5-6 tahun) memiliki rata-rata volume 4.65 ml dan P3 (umur 7-8 tahun) memiliki rata-rata volume 2.90 ml, volume ini menunjukkan kisaran yang normal.

B. Konsentrasi Semen

Pemeriksaan mikroskopis semen segar sapi meliputi pemeriksaan konsentrasi pada P1 (umur 3-4 tahun) memiliki total keseluruhan konsentrasi 5.165×10^6 /ml P2 (umur 5-6 tahun) memiliki total keseluruhan konsentrasi $1.004.901 \times 10^6$ /ml dan P3 (umur 7-8 tahun) memiliki total keseluruhan konsentrasi 5.43×10^6 /ml dalam 4 kali penampungan.

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Rataan konsentrasi pada umur yang berbeda

Umur (Tahun)	Konsentrasi (10^6 /ml)
P1 (3-4)	1.291 ± 0.217^a
P2 (5-6)	1.475 ± 0.324^a
P3 (7-8)	1.377 ± 0.164^a

Ket : Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata.

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat hasil analisis statistik dari konsentrasi spermatozoa pada P1 dan P2 menunjukkan pengaruh yang tidak nyata ($P > 0,05$), P1 dan P3 menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) sedangkan pada P2 dan P3 menunjukkan hasil yang sama yaitu ($P > 0,05$). Rataan konsentrasi spermatozoa pada P1 (umur 3-4 tahun), P2 (umur 5-6 tahun) dan P3 (umur 7-8 tahun) tidak terdapat perbedaan yang nyata ($P > 0,05$). Ketiganya tidak memiliki perbedaan yang nyata ($P > 0,05$). Konsentrasi spermatozoa terbanyak ada pada P2

(umur 5-6 tahun) dengan nilai rata-rata konsentrasi sebanyak $1.291 \pm 0.217 \times 10^6/\text{ml}$ sedangkan yang paling rendah pada P2 (umur 3-4 tahun) dengan nilai rata-rata konsentrasi sebesar $1.475 \pm 0.324 \times 10^6/\text{ml}$. Hal ini sesuai dengan penelitian Sumeidiana *et al.*, (2007) dimana rata-rata konsentrasi spermatozoa pada sapi dengan umur yang berbeda tidak berbeda nyata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas semen segar antara lain sebagai berikut, faktor yang pertama, bangsa ternak contohnya pada sapi *Bos Taurus* mengalami dewasa kelamin lebih cepat dibandingkan dengan sapi *Bos Javanicus*, persilangan dari dua bangsa sapi tersebut akan mencapai pubertas pada umur yang sama dengan induknya (Lestari, 2013). Faktor kedua, genetik menurut Akther *at al* (2013) menyatakan bahwa produksi spermatozoa berkorelasi positif dengan ukuran testis yang dapat diestimasi dengan panjang, berat dan lingkaran skrotum, serta dikuatkan oleh hasil penelitian wahyuningsih (2013) yang menyatakan bahwa ukuran testis dipengaruhi oleh genetik, bangsa ternak dan individu. Faktor yang ketiga, umur menurut Susilawati (2013) yang mempengaruhi produksi semen salah satunya adalah umur pejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur, proses spermatogenesis pada sapi berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan. Faktor yang keempat, lingkungan menurut Susilawati (2011) menyatakan bahwa pejantan yang ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah. Faktor yang kelima, pakan makanan yang diberikan terlalu sedikit terutama pada periode sebelum masa pubertas dicapai dapat menyebabkan

perkembangan testis dan kelenjar-kelenjar asesoris terhambat dan dapat memperlambat dewasa kelamin. Pada ternak dewasa, kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis, baik pada testis maupun pada kelenjar aksesorisnya dan dapat menurunkan libido sehingga produksi semen turun (Susilawati, 2013).

C. Produksi Semen Beku

Data yang diperoleh pada penelitian ini selama 4 kali penampungan yaitu pada P1 (umur 3-4 tahun) jumlah straw sebanyak 312 straw, P2 (umur 5-6 tahun) jumlah straw sebanyak 677 straw dan P3 (umur 7-8 tahun) jumlah straw keseluruhan sebanyak 300 straw. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan Rataan Produksi Semen Beku (Straw) pada sapi umur yang berbeda.

Umur (Tahun)	Produksi Semen Beku (Straw)
P1 (3-4)	78.00±22.46 ^b
P2 (5-6)	169.50±61.02 ^a
P3 (7-8)	75.00±21.463 ^b

Ket : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan sangat ($P < 0,01$).

Ket: Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata ($P > 0,05$).

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat hasil analisis statistik menunjukkan perbedaan rata-rata produksi semen beku (straw) sapi pejantan pada umur yang berbeda. Terdapat perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$) dengan nilai $P = 0,01$ antara P1 (umur 3-4 tahun) dengan P2 (umur 5-6 tahun) tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata ($P < 0,05$) dengan nilai $P = 0,58$ antara P1 (umur 3-4 tahun) dengan P3 (umur 7-8 tahun) sedangkan pada P2 (umur 5-6 tahun) dengan P3

(umur 7-8 tahun) menunjukkan pengaruh yang sangat nyata ($P < 0,01$) dengan nilai $P = 0,01$.

Produksi semen beku (straw) yang terbanyak dihasilkan oleh P2 (umur 5-6 tahun) yaitu 169.50 straw dan yang paling sedikit adalah P3 (umur 7-8 tahun) dengan jumlah straw yang dihasilkan adalah 75.00 straw sedangkan P1 (umur 3-4 tahun) memiliki rata-rata produksi semen beku sebanyak 78.00 straw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi semen beku antara umur yang berbeda sangat berpengaruh nyata ($P < 0,01$), semen beku yang dihasilkan dari setiap umur yang berbeda tidak sama. Rata-rata produksi semen beku yang dihasilkan dari volume semen segar sebanyak 3-8 ml dan jumlah straw yang dihasilkan sebanyak 66-300 straw dalam satu kali ejakulasi. Prastowo (2017) menyatakan bahwa faktor umur sangat mempengaruhi produksi semen yang dihasilkan oleh pejantan, rata-rata umur sapi yang digunakan untuk penelitian kisaran 4-5 tahun yang telah mencapai umur dewasa.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik General Linear Model (GLM) diketahui bahwa kualitas berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap produksi semen beku. Produksi semen beku yang dihasilkan oleh setiap umur yang berbeda tidak dipengaruhi oleh produksi semen segar yang tinggi. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh proses pembekuan yang melalui beberapa tahap, seperti pernyataan Ismaya (2014) bahwa konsentrasi mempengaruhi jumlah spermatozoa yang hidup. Konsentrasi spermatozoa, yaitu kental atau warna krem 1.000 sampai 2.000 juta spermatozoa/ml, encer atau keruh 500 sampai 900 juta spermatozoa/ml, cair atau agak keruh 100-400 juta spermatozoa/ml dan jernih kurang dari 100 juta

spermatozoa/ml. Adapun faktor yang lain menurut Wahyu (2008) disebabkan oleh pemeriksaan terhadap kualitas semen segar antara lain: (a) secara makroskopis, meliputi volume semen (rata-rata 5 ml), warna semen (susu, krem dan kuning), kekentalan semen (encer, sedang dan kental) dan pH (6,2 – 6,8) atau rata-rata pH = 7. (b) Secara mikroskopis, meliputi gerakan massa, gerak individu, motilitas (minimal 70%) dan selanjutnya, pemeriksaan konsentrasi semen dengan menggunakan spektrofotometer. Semen beku yang diproduksi telah memenuhi syarat SNI 4869.1:2008 yaitu semen beku sapi dikemas dalam bentuk straw dengan ukuran mini straw volume 0,25 ml dengan jumlah sel spermatozoa minimal 25 juta (BSN, 2008).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas semen segar terbaik (volume dan konsentrasi terdapat pada P2 (umur 5-6 tahun).
2. Produksi semen beku yang terbanyak terdapat pada P2 (umur 5-6 tahun) dan memenuhi syarat SNI dengan jumlah sel spermatozoa minimal 25 juta/ml.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk melakukan Inseminasi Buatan sebaiknya menggunakan semen dari sapi bali (umur 5-6) tahun karena memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan (umur 3-4 tahun) dan (umur 7-8 tahun).



DAFTAR PUSTAKA

- Arifiantini, R.I dan Yusuf, T.L. 2004. *Keberhasilan Penggunaan Tiga Pengencer Dalam Dua Jenis Kemasan Pada Proses Pembekuan Semen Sapi Frisien Holstein*. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Akhter, S.,A.K Azad, Z. Rahman dan A. Ashraf. 2013. Study On The Quality Of Semen Of Different Genetic Groups Of Bull From Khulna Region Of Bangladesh. *International Journal Of Pharmaceutical and Madical Research*. 1(1) : 19-23.
- Bhakat M., Mohanty, T. K., Raina, V. S., Gupta, A. K., Khan, H. M., Mahaptra, R. K dan Sarkar, M. 2011. Effect Of Age and Season On Semen Quality Parameters In Sahiwal Bulls. *Tropical Animal Health And Production*.
- Blakely, J dan Bade, D. H. 1992. *Ilmu Peternakan*. Edisi keempat. Gajah Mada University. Press, Yogyakarta.
- BSN. 2008. *Hak Cipta Standarisasi Nasional*. SNI, Republik Indonesia.
- Brearden, H. J dan Fuquay, J. W. 1984. *Applied Animal Reproduction*. 2nd Edition. Reston Publishing Company, Inc. Virginia.
- Chandolia, R. E. 1999. *Lack Of Breed Differences In Responses Of Bovine Spermatozoa To Heat Shock*. Www.Dps.Ulf.Edu. Diakses Pada Tanggal 27 November 2019.
- Chenoweth, P. Z., Goolsby, H.A Dan Prien, S.D. 2005. Preliminary Evaluation Of A Unique Freezing Tecnology For Bovine Sperm Cryopreservation. *Reprod Dom Animal*. 40: 98-99.
- Coulter, G.H., Cook, R.B Dan Kastelic, J.P. 1997. *Effects Of Dietary Energy On Scrotal Surface Temperature, Simental Quality And Sperm Production In Young Beef Bulls*. *J. Animal Science* 75 (6) : 1048-1052.
- Dewi, A.S., Ondho, Y.S Dan Kurnianto, E. 2012. Kualitas Semen Berdasarkan Umur Pada Sapi Jantan Jawa. *Animal Agriculture Journal*, 1 (2), 126-133.
- Djanuar. 1985. *Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan Pada Sapi*. Gadah Mada Univercity Press, Yogyakarta.
- Feradis. 2010. *Boiteknologi Reproduksi Pada Ternak*. Alfabeta, Bandung. 18, 53, 74-75, 84-85.

- Fitri, Z. 2009. Penggunaan Air Kelapa Sebagai Penyeimbang Fruktosa Dalam Pengencer Terhadap Kualitas Sperma Sapi Simental. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hafez, E.S.E. 1987. *Reproduction In Farm, 4th Edition*. Lea and Fibiger. Philadelphia, USA
- Hafez, E.S.E. 2000. *Semen Evaluation In Reproduction In Farm Animals. 7th Edition*. Lippincott Williams and Wilkins. Maryland, USA
- Hardjopranjoto, S. 1995. *Ilmu Kemajiran Pada Ternak*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Herdis. 1998. Metode Pemberian Gliserol dan Lama Ekuilibrasi Pada Proses Pembekuan Semen Kerbau Lumpur. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Ismaya. 2014. *Bioteknologi Inseminasi Buatan pada Sapi dan Kerbau*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta..
- Isnaeni. 2006. *Fisiologi Hewan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Junqueira, L., Jose Carneiro, C. Robert, O.K. 2007. *Histologi Dasar Edisi Ke-8*. Jakarta. Hal: 419-432.
- Kementerian Agama. 2019. *Terjemahan Al-Qur'an. Edisi Penyempurnaan*. Republik Indonesia.
- Lestari, S., Saleh, D.M., dan Maidaswar. 2013. Profil Kualitas Semen Segar Sapi Pejantan Limousin Dengan Umur Yang Berbeda Di Balai Inseminasi Buatan Lembang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Peternakan*, 1 (3): 1165-1172.
- Mappanganro, R. 2020. Produksi Semen Segar (Volume Dan Konsentrasi) dan Beku Sapi Bali Pejantan dan Skor Kondisi Tubuh (SKT) Yang Berbeda. *Jurnal*. Universitas Islam Negeri Makassar, Makassar.
- Mathoven, M., Buhr, M., Dekkers, J.C.M. 1998. Environmental, Management and Genetic Factors Affecting Semen Production In Holstein Bulls. *Journal Dairy Science*, 81 : 3321-3330.
- Minitub. 2001. *Certifisate Andromed*. Minitub Abfullund Labortechnik Gmbh and Co Kg: Germany.
- Mulyono, S. 1998. *Teknik Pembibitan Kambing dan Domba*. Penebar Swadaya: Jakarta .

- Najman, J.M., Quinn, P.J., Callaghan, M.O., Williams, G.M., Andersen, M.J., dan Bor, W. 2003. The Effect Of Breastfeeding On Child Development At 5 Years: A Cohort Study. *Journal Of Paediatrics and Child Health*, 37 (5) : 465-469.
- Nurcholidah, S dan Petrus, K. 2009. *Pengaruh Jenis Pengencer Terhadap Motilitas dan Daya Tahan Hidup Spermatozoa Semen Cair Sapi Simental*. Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung.
- Nuryadi. 2000. *Dasar-Dasar Reproduksi Ternak*. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.
- Partodiharjo, S. 1992. *Ilmu Reproduksi Hewan*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Pond, K. D. 1999. *Introduction To Animal Science*. USA: John Willey dan Sons, Inc.
- Prastowo, S.,Widu, T dan Widyas, N. 2017. Preliminary Analysis On Hybrid Vigor In Indonesian Indigenous and Crossbred Cattle Population Using Data From Published Studies. *Iop Conference Series*, (Hal. 193 (1)). Materials Science And Enginerering.
- Salisbury, G. D. 1985. *Fisiologi dan Inseminasi Buatan Pada Sapi (Physiologi and Artificial Insemination Of Cattle)*. Gajah Mada Unuversity Press, Yogyakarta.
- Sayako, Y.,Hartono, M dan Silotonga, P.E. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persentase Spermatozoa Hidup Semen Beku Sapi Bali Berbagai Inseminator di Lampung Tengah. *Kumpulan Abstrak Skripsi Jurusan Produksi Ternak*. Fakulyas Pertanian, Universitas Lampung, Lampung.
- Shibab, M.Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbab, Lantera Hati*. Jakarta.
- Siratskii, I.Z. (1990). Inheritante Of Reproductive Ability Of Bulls. *Tsitol. Genet*: 24: 2834.
- SNI, 2008. Semen Beku- Bagian 1: Sapi (Standar Nasional Indonesia, 4869.1: 2008). BSN (Badan Standarisasi Nasional), Jakarta.
- Spott, L.R.,Thrift, T.A dan Carpenter, B.B. 1998. Reeding Soundness Of Bulls. *Agricultural Communication*. The Texas A dan M University System: [Www.Jas.Fass.Org](http://www.Jas.Fass.Org). Diakses Pada Tanggal 27 November 2019.

- Steel, R.G.D Dan Torrie, J. H. 1993. *Prinsip dan Prsedur Statistika*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sudarmono, A.S dan Bambang, Y.S. 2008. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sumaeidina, I.,Wuwuh, S dan Mawarti, E. 2007. *Volume Semen dan Konsentrasi Sperma Sapi Simental, Limousin dan Simental Dibalai Inseminasi Buatan Ungaran*. Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Susanna, E. 2008. Kaji Banding Kualitas Semen Beku Sapi Potong Yang Telah Didistribusikan Kelapangan. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Susilawati, T. 2013. *Pedoman Inseminasi Buatan Pada Ternak*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Susilawati, T. N. 1993. Kualitas Semen Sapi Fries Holland dan Sapi Bali Pada Berbagai Umur dan Berat Badan. *Skripsi*. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.
- Taylor, R.E and Bogart, R. 1988. *Scientic Farm Animal Production. 3rded*. Macmillan Publishing Company, New York.
- Thalib, C.,Chalijah dan Siregar, A.R. 2002. *Progesterone Pattern Of Bali Cattle At Gowa*. South Sulawesi, Inpress.
- Toelihere, J. 1993. *Inseminasi Buatan Pada Ternak*. Angkasa, Bandung.
- Toelihere, M. 1985. *Fisiologi Reproduksi Ternak*. Angkasa, Bandung.
- Wahyu, J. 2008. Manajemen Mutu Semen Beku Sapi Dibalai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Bandung (Semen Beku Sapi Ongole dan Frisian Holstein). *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yendraliza. 2008. *Inseminasi Buatan Pada Ternak*. SUSKA Press, Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1: Dokumentasi Evaluasi Semen Segar Secara Makroskopis



Gambar 1: Kekentalan, Bau, dan Warna Semen Segar



Gambar 2. Evaluasi Volume Semen Segar

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 2: Dokumentasi Evaluasi Semen Segar Secara Mikroskopis



Gambar 3. Evaluasi Konsentrasi Semen Segar




Gambar 4: Evaluasi Motilitas Semen Segar

Lampiran 3. Dokumentasi Pengenceran, Printing *Straw*, Pembekuan semen



Gambar 5: Pengenceran Semen



Gambar 6: Printing Straw



Gambar : pembekuan semen

Lampiran 4: Hasil Uji General Linear Model (Volume, Konsentrasi Dan Produksi Semen Beku)

Between-Subjects Factors

	Value Label	N
UMUR 1.00	SAPI 1	4
2.00	SAPI 2	4
3.00	SAPI 3	4

Descriptive Statistics

	UMUR	Mean	Std. Deviation	N
VOLUME	SAPI 1	2.8750	.47871	4
	SAPI 2	4.6500	1.07548	4
	SAPI 3	2.9000	.45461	4
	Total	3.4750	1.08972	12
KONSENTRASI	SAPI 1	1.29125	.217184	4
	SAPI 2	1.47525	.324296	4
	SAPI 3	1.36500	.164093	4
	Total	1.37717	.234790	12
Produksi Semen	SAPI 1	78.00	22.465	4
	SAPI 2	169.50	61.022	4
	SAPI 3	75.00	21.463	4
	Total	107.50	58.114	12

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	VOLUME	8.285 ^a	2	4.142	7.804	.011
	KONSENTRASI	.069 ^b	2	.034	.574	.583
	Produksi Semen	23082.000 ^c	2	11541.000	7.384	.013
Intercept	VOLUME	144.907	1	144.907	272.981	.000
	KONSENTRASI	22.759	1	22.759	380.877	.000
	Produksi Semen	138675.000	1	138675.000	88.724	.000
UMUR	VOLUME	8.285	2	4.143	7.804	.011
	KONSENTRASI	.069	2	.034	.574	.583
	Produksi Semen	23082.000	2	11541.000	7.384	.013
Error	VOLUME	4.778	9	.531		
	KONSENTRASI	.538	9	.060		
	Produksi Semen	14067.000	9	1563.000		
Total	VOLUME	157.970	12			
	KONSENTRASI	23.365	12			
	Produksi Semen	175824.000	12			
Corrected Total	VOLUME	13.062	11			
	KONSENTRASI	.606	11			
	Produksi Semen	37149.000	11			

a. R Squared = .634 (Adjusted R Squared = .553)

b. R Squared = .113 (Adjusted R Squared = -.084)

c. R Squared = .621 (Adjusted R Squared = .537)

Lampiran 5: Hasil Uji BNT (LSD) Volume, Konsentrasi dan Produksi Semen Beku

Multiple Comparisons

LSD

Dependent Variable	(I) UMUR	(J) UMUR	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Volume	SAPI I	SAPI 2	-1.7750*	.51519	.007	-2.9404	-.6096
		SAPI 3	-.0250	.51519	.962	-1.1904	1.1404
	SAPI 2	SAPI I	1.7750*	.51519	.007	.6096	2.9404
		SAPI 3	1.7500*	.51519	.008	.5846	2.9154
	SAPI 3	SAPI I	.0250	.51519	.962	-1.1404	1.1904
		SAPI 2	-1.7500*	.51519	.008	-2.9154	-.5846
Konsentrasi	SAPI I	SAPI 2	-.18400	.172850	.315	-.57501	.20701
		SAPI 3	-.07375	.172850	.680	-.46476	.31726
	SAPI 2	SAPI I	.18400	.172850	.315	-.20701	.57501
		SAPI 3	.11025	.172850	.539	-.28076	.50126
	SAPI 3	SAPI I	.07375	.172850	.680	-.31726	.46476
		SAPI 2	-.11025	.172850	.539	-.50126	.28076
Produksi Semen	SAPI I	SAPI 2	-91.50*	27.955	.010	-154.74	-28.26
		SAPI 3	3.00	27.955	.917	-60.24	66.24
	SAPI 2	SAPI I	91.50*	27.955	.010	28.26	154.74
		SAPI 3	94.50*	27.955	.008	31.26	157.74
	SAPI 3	SAPI I	-3.00	27.955	.917	-66.24	60.24
		SAPI 2	-94.50*	27.955	.008	-157.74	-31.26

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 1563.000.

*. The mean difference is significant at the

MAKASSAR