

**PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK JAGUNG PADA KOMPOSISI  
MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN MISELIUM BIBIT  
F1 JAMUR TIRAM (*PLEUROTUS OSTREATUS*) STUDI  
PENUNJANG MATA KULIAH BIOLOGI TERAPAN**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Jurusan Pendidikan Biologi  
Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUHAEMING**  
**NIM.20500116028**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**

MAKASSAR  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhaeming  
Nim : 20500116028  
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 08 Desember 1998  
  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Biologi  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Alamat : Perum. Pelita Indah Permai Blok B No.06, Pallangga Kab.  
Gowa  
Judul : Pengaruh Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi  
Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Miselium Bibit F1  
Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Studi Penunjang Mata  
Kuliah Biologi Terapan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 20 Agustus 2020

Penyusun,



**Muhaeming**  
**NIM: 20500116028**




## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, "Pengaruh Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi Media Tanam terhadap Pertumbuhan Miselium Bibit F1 Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Studi Penunjang Mata Kuliah Biologi Terapan", yang disusun oleh Muhaeming, NIM: 20500116028, mahasiswa Jurusan/Prodi Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 6 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Biologi dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 25 Agustus 2020 M.  
6 Muharram 1442 H

### DEWAN PENGUJI:

Nomor SK 2077

Ketua	: Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd.	
Sekretaris	: Ainul Uyuni Taufiq, SP. S.Pd., M.Pd.	
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	
Munaqisy II	: Wahyuni Ismail, S.Ag., M.Si., Ph.D.	
Pembimbing I	: Dr. Jamilah, M.Si.	
Pembimbing II	: Zulkarnaim S.Si., M. Kes.	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. I.E. Marjuni, M.Pd.I.

NIM 197810112005011006

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puji bagi ALLAH SWT. Tuhan semesta alam, Sang Maha Arsitek sejati yang menegakkan langit tanpa tiang, yang melimpahkan kebutuhan mengabulkan keinginan, karena dengan izin-Nya jualah maka skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih-Nya, Baginda Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mencari ridho-Nya hingga di akhir zaman. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi Media Tanam terhadap Pertumbuhan Miselium Bibit F1 Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Studi Penunjang Mata Kuliah Biologi Terapan” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai selesainya skripsi ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khalik untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diwujudkan.

Ayahanda terhormat **Abdul Haris Dg. Limpo** dan Ibunda tercinta **Rosmini Dg. Nurung** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan memotivasi

penulis untuk berbuat dan menambah ilmu, juga memberikan dorongan moral maupun material serta atas doanya yang tulus buat Ananda. Demikian pula untuk kakak saya Ihwani dan Joko Wahono serta adik-adikku tercinta Muhammad Farras Haidariu Al-Awwad dan Muhammad Raihan Abid Aqila Rajendra, sesungguhnya tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar, yang selama ini berusaha memajukan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Shabir U, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Rusdi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dan Dr. H. Ilyas, M.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
3. Dr. H. Muh. Rapi M.Pd. dan Ainul Uyuni Taufik S.P., S.Pd., M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi beserta para staf atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Ibunda Dr. Jamilah M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Zulkarnaim S.Si., M.Kes selaku pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd. selaku munaqisy I dan Wahyuni Ismail S. Ag., M.Si., Ph.D, selaku munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai pedoman bagi penulis untuk penulisan skripsi ini.
8. Ibu Syahriani S.Pd, M.Pd. Selaku kepala Laboratorium beserta Kakanda Sofyan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian.
9. Para tim sukses penetian , Imamatus Sholihah, Yuta, Meli, Nining, Eka, yang telah banyak membantu pada proses penelitian yang telah dilakukan.
10. Keluarga Besar NAKS-NAKS, Ima, Ilma, Eka, Iman, Asrijal, Wahyu, Ika, Nining, Firtria Usdar, Ilma sebagai tempat mencurahkan keluhan, pergosipan dan segala keletihan dari aktivitas kampus.
11. Rekan seperjuangan Keluarga Besar AMFIBI (Pendidikan Biologi UIN Alaudin 2016)
12. Keluarga Besar BIO 1.2 yang telah banyak memberikan warna yang indah kepada saya selama memimpin kelas tersebut.

13. Saudara Amfibi Jantan yakni Jaslan, Jusman, Iman, Asrijal, Wahyu, Masud, Ari, Sarul, Fadil, Rahmat dan Aswar
14. Keluarga Besar Posko 1 KKN UIN Alauddin Makassar Kelurahan Malakaji , Romy, Fahri, Nyomank, Eda, Jiah, Uly, Riri, Fuda dan Dea.
15. Keluarga Besar XII IPA 1 (Ekspose) Man 2 Model Makassar
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar
17. Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapka terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah Swt., karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakkaatuh...

Gowa, 19 Agustus 2020

  
**Muhaeming**  
**NIM: 2050011602**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka/Kajian Terdahulu .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>11-29</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Jamur .....	11
B. Jamur Tiram Putih .....	14
C. Serbuk Jagung.....	29
D. Kerangka Pikir .....	29

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31-37</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Desain Penelitian .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Prosedur Kerja .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39-44</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51-52</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Implikasi .....	51
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Perbandingan konsentrasi serbuk jagung .....	35
<b>Tabel 4.1</b> Persentase pertumbuhan miselium minggu pertama .....	39
<b>Tabel 4.2</b> Persentase pertumbuhan miselium minggu kedua .....	40
<b>Tabel 4.3</b> Persentase pertumbuhan miselium minggu ketiga .....	42
<b>Tabel 4.4</b> Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) .....	43

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Denah lapangan Rancangan Acak leng kap (RAL) .....	36
<b>Gambar 4.1</b> Perbandingan persentase pertumbuhan miselium minggu pertama	40
<b>Gambar 4.2</b> Perbandingan persentase pertumbuhan miselium minggu kedua ....	41
<b>Gambar 4.3</b> Perbandingan persentase pertumbuhan miselium minggu ketiga ...	42
<b>Gambar 4.4</b> Perbandingan waktu penyebaran miselium .....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran A Hasil Pengamatan.....</b>	<b>56</b>
A. Pengukuran persentase pertumbuhan miselium .....	56
B. Pengukuran waktu penyebaran miselium .....	57
<b>Lampiran B Hasil Uji Homogenitas.....</b>	<b>58</b>
A. Uji homogenitas persentase pertumbuhan miselium .....	58
B. Uji homogenitas waktu penyebaran miselium .....	59
<b>Lampiran C Hasil Uji Anova.....</b>	<b>60</b>
A. Uji Anova persentase pertumbuhan miselium .....	60
B. Uji Anova waktu penyebaran miselium.....	61
<b>Lampiran D Tabel F taraf 5% .....</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran E Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.....</b>	<b>63</b>
A. Uji BNT persentase pertumbuhan miselium .....	63
B. Uji BNT waktu penyebaran miselium .....	65
<b>Lampiran F Skema Penelitian.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

**Nama : Muhaeming**

**NIM : 20500116028**

**Judul : Pengaruh Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi Media Tanam terhadap Pertumbuhan Miselium Bibit F1 Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Studi Penunjang Mata Kuliah Biologi Terapan**

---

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah ada pengaruh penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*), (2) Pada konsentrasi berapa penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam paling baik digunakan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen murni dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 3 ulangan sehingga diperoleh 12 satuan percobaan. Perlakuan P0 (perlakuan kontrol), Perlakuan P1 (25%), Perlakuan P2 (50%), dan Perlakuan P3 (100%). Variabel yang diukur adalah Persentase pertumbuhan miselium yang diamati pada hari ke-6, 12 dan 18 dan waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI). Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis of varians (ANOVA) dengan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pada pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dengan penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam. Selain itu, konsentrasi serbuk jagung yang memberikan hasil yang paling efektif terhadap pertumbuhan miselium adalah P2 dengan konsentrasi 50% .

Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Serbuk jagung dapat dimanfaatkan /digunakan sebagai bahan tambahan pada komposisi media bibit F1 jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). 2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kombinasi serbuk jagung dengan media lain untuk pertumbuhan jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) guna mendapatkan komposisi yang ideal yang tahan terhadap kontaminan. 3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan jumlah ulangan guna mendapatkan tingkat keterandalan penelitian yang lebih baik.

**Kata kunci:** Serbuk jagung, miselium F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*)

### Abstract

This study aimed to (1) determine whether there was an effect of adding corn powder on the planting medium composition on the mycelium growth of the oyster mushroom F1 seeds (*Pleurotus ostreatus*), (2) understand the effect of adding corn powder on the composition of the planting medium on the growth of mycelium seeds F1 oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*).

This research was an experimental study using a completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 repetitions in order to obtain 12 experimental units. Treatment P0 (control treatment), treatment P1 (25%), treatment P2 (50%), and treatment P3 (100%). The variables measured were the mycelium growth percentage that was observed on days 6, 12 and 18 and the time of mycelium spread the day after inoculation (HSI). The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with further tests using the Least Significant Difference (LSD) test.

The results showed that the addition of corn powder to the composition of the growing media had any result in the effect on the mycelium growth of the oyster mushroom F1 seeds (*Pleurotus ostreatus*). In addition, high concentration of corn powder gave high yields on mycelium growth. It was P2 with a concentration of 50%.

The implications of this study are: 1) Corn powder can be used as an additional ingredient in the composition of the F1 seedling medium of white oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). 2) It is necessary to carry out further research on the combination of corn powder with other media for the growth of oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) in order to obtain an ideal compost that is resistant to contaminants. 3) It is necessary to do further research by increasing the number of repetitions in order to get a better level of research reliability.

**Keywords:** Corn powder, Oyster mushroom F1 mycelium (*Pleurotus ostreatus*)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A . Latar Belakang Masalah*

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu jamur yang hidup pada kayu lapuk dan termasuk sumber hayati dan protein yang digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, jamur ini banyak dilirik untuk dibudidayakan.<sup>1</sup> Dalam pemanfaatannya, jamur ini menempati urutan ke-2 di dunia untuk jamur yang paling banyak dibudidayakan setelah *Agaricus bisporus*. Hal yang membuat jamur ini bernilai ekonomis dan banyak diminati oleh masyarakat adalah dari segi kandungan jamur tiram yang berupa protein 16 gram, lemak 0,9 gram, karbohidrat 64,6 mg, kalsium 51 mg, zat besi 6,7 mg, 128 kalori dan vitamin B 0,1 mg.<sup>2</sup>

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dari segi pembudidayaanya banyak dilirik oleh masyarakat karena jamur ini tidak membutuhkan lahan yang luas yang biasanya menjadi hambatan bagi para pembudidaya serta memiliki rentan waktu tumbuh yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan jenis jamur lainnya.<sup>3</sup> Untuk menghasilkan jamur yang berkualitas, maka dibutuhkan bibit sebar F1 yang

---

<sup>1</sup> Umniyatie, dkk, “Budidaya Jamur Tiram sebagai Alternatif Usaha bagi Masyarakat Korban Erupsi Merapi di Dusun Pandan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman DIY” *Jurnal Inotek*, vol. 17 no. 2 (Agustus 2013 ), h. 162-175. <https://journal.uny.ac.id/index.php/inotek/article/view/3357>. (Diakses 22 November 2019).

<sup>2</sup> Hanum Kusuma Astuti dan Nengah Dwianita Kuswytasari, “Efektifitas Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan Variasi Media Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan Sabut Kelapa (*Cocos nucifera*)”. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, vol. 2 no. 2 (2013), h.5. <https://media.neliti.com/media/publications/16040-ID-efektifitas-pertumbuhan-jamur-tiram-putih-pleurotus-ostreatus-dengan-variasi-med.pdf>. (Diakses 14 November 2019).

<sup>3</sup> Putra Utama dkk, “Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)”. *Jurnal Agroekoteknologi*, vol 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Agustus 2019).

berkualitas yang merupakan perbanyakkan indukan dari F0. Bibit F1 yang berkualitas diperoleh dari berbagai tahapan diantaranya adalah tahap pembuatan media tanam, sterilisasi media, inokulasi media tanam, inkubasi dan pemeliharaan. Keseluruhan tahapan tersebut harus dikerjakan dengan cermat guna menghasilkan jamur yang berkualitas.<sup>4</sup>

Salah satu tahapan yang mempengaruhi pertumbuhan miselium pada bibit F1 adalah tahap pembuatan media tanam. Komposisi media tanam yang tidak tepat akan menghasilkan pertumbuhan miselium yang relatif lambat sehingga dapat menjadi masalah bagi pembudidaya jamur tiram dalam menjaga laju produksi. Hal tersebut cukup beralasan karena faktor kecepatan tumbuh bibit jamur tiram yang lambat dapat mengganggu stabilitas harga pada pangsa pasar jamur tiram sehingga diperlukan inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, untuk membuat media tanam yang tepat, komposisi media tanam haruslah memiliki kriteria tertentu dari segi kandungan diantaranya substrat harus mengandung karbohidrat dan cukup mengandung protein sebagai nutrisi untuk pertumbuhan miselium bibit jamur tiram.<sup>5</sup>

Formulasi komposisi media tanam bermacam-macam. Setiap pembudidaya jamur tiram memiliki komposisi media yang khas dari hasil penelitian pribadi,

---

<sup>4</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).

<sup>5</sup> Sutarman, "Keragaan dan produksi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media serbuk gergaji dan ampas tebu bersuplemen dedak dan tepung jagung." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, vol. 12 no.3 (2012), h. 48. <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/212>. (Diakses 20 Agustus 2019).

misalnya rahasia bahan dasar, bahan tambahan serta ketepatan campurannya.<sup>6</sup> Biji jagung kuning biasanya digunakan sebagai media tanam dasar dalam pembuatan bibit F1 jamur tiram. Jagung dipilih sebagai media karena berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi miselium. Biji jagung dapat digunakan sebagai media tanam dasar F1 jamur tiram karena mempunyai komposisi kimia antara lain karbohidrat (68,0%), protein (10%), lemak (5,0%), serat (2,0%), kandungan lain (11%).<sup>7</sup> Meski begitu, jamur yang masuk dalam kelompok pelapuk ini memerlukan sumber karbon tambahan dalam mendegradasi substrat tempat ia tumbuh serta memerlukan nutrisi yang lebih mudah diserap oleh miselium untuk memenuhi kebutuhan aktifitas metabolisme selnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba suplementasi atau pemberian nutrisi tambahan pada media tanam dasar untuk mempercepat proses aktifitas metabolisme miselium.<sup>8</sup> Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan adalah serbuk jagung.

Serbuk jagung merupakan serbuk hasil gilingan biji jagung dengan struktur yang lebih kecil atau sederhana. Serbuk jagung memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam komposisi media karena kandungannya dapat digunakan oleh miselium sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Penambahan serbuk jagung sebagai suplemen bertujuan untuk mempercepat proses penyerapan nutrisi ke dalam dinding sel miselium. Hal ini dikarenakan struktur serbuk jagung yang lebih sederhana sehingga

---

<sup>6</sup> Warisno dan Kres Dahana, SP. *Menabur Jamur Menuai Rupiah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 12.

<sup>7</sup> Nurmala Tati. *Serealia Sumber Karbohidrat Utama* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 93.

<sup>8</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).

molekul-molekul serbuk jagung lebih mudah diserap oleh enzim ekstraseluler miselium.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencoba serbuk jagung sebagai bahan tambahan pada pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram. Dimana dalam penelitian ini bisa saja menjadi alternatif nutrisi tambahan bagi pembudidaya jamur tiram sehingga didapatkan bibit F1 yang memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif singkat serta berkualitas. Selain itu informasi mengenai penambahan serbuk jagung pada media pertumbuhan bibit F1 jamur tiram perlu disosialisasikan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah menjadikan penelitian ini sebagai studi penunjang mahasiswa pada mata kuliah Biologi Terapan yang menekankan pada produk-produk olahan berbasis keilmuan biologi yang merupakan sumber pangan masyarakat yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “***Pengaruh Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Miselium Bibit F1 Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Studi Penunjang Mata Kuliah Biologi Terapan***”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*)?

---

<sup>9</sup> Darnetty, *Pengantar Mikologi* (Padang: Andalas Universitas Press, 2006). h.45.

2. Pada konsentrasi berapa penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam paling baik digunakan ?

### **C. Hipotesis**

Hipotesis dikenal sebagai dugaan sementara atau jawaban sementara atas suatu permasalahan. Dikatakan sifatnya sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru sebatas dugaan berdasarkan berbagai sumber teori yang telah didapatkan, belum melalui jalur validasi fakta di lapangan dan belum ada data yang bisa dijelaskan. Maka dari itu, hipotesis dapat kita katakan sebagai teori terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>10</sup> Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan pada rumusan masalah yang memiliki tingkat akurasi kebenaran paling tinggi dibanding yang lain karena dikaji terlebih dahulu dari sumber-sumber yang relevan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka saya mengajukan hipotesis yaitu: “Ada pengaruh pada pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dengan penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam.

### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

##### **a. Penambahan Serbuk Jagung pada Komposisi Media Tanam**

Penambahan serbuk jagung yang dimaksud adalah membuat media tanam bibit F1 jamur tiram dengan menambahkan serbuk jagung pada komposisi media

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Cet. 23; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 96.

<sup>11</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 67-68.

utama biji jagung yang dimana penambahan serbuk jagung ini dibagi menjadi 4 konsentrasi yaitu: 0%, 25 %, 50 % dan 100 %.

**b. Pertumbuhan Miselium bibit F1 Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*)**

Pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram yang dimaksud adalah bertambahnya jumlah ukuran sel yang diukur melalui persentase pertumbuhan miselium setiap minggunya dan menghitung waktu penyebaran miselium dalam satuan Hari Setelah Inokulasi (HSI) sampai miselium memenuhi botol media.

**2. Ruang Lingkup Penelitian**

Bibit F0 jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) diperoleh dari pembibitan jamur tiram di daerah Antang Kota Makassar. Bibit F0 ini kemudian diinokulasi pada media tumbuh F1 jamur tiram di dalam laboratorium. Penelitian dilakukan di Laboratorium Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini hal yang diteliti yaitu persentase pertumbuhan miselium (%) dan waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI).

***E. Kajian Pustaka/Kajian Terdahulu***

Penelitian mengenai pertumbuhan miselium bibit F1 pada jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dengan menggunakan media biji jagung sudah dilakukan sebelumnya dimana hasilnya dapat merangsang pertumbuhan miselium. Biji jagung mengandung zat yang dibutuhkan oleh miselium untuk tumbuh. Selain biji jagung, Dengan mengolah bahan-bahan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur, maka bahan olahan tersebut dapat pula mempercepat pertumbuhan

miselium.<sup>12</sup> Budidaya jamur yang dalam hal ini pembuatan bibit F1, dibutuhkan kondisi media yang persis sama dengan kondisi yang ada di alam. Dan yang menentukan keberhasilan pembibitan adalah komposisi media yang akan digunakan. Komposisi media dengan kualitas baik membuat kemampuan miselium menyerap nutrisi akan semakin baik sehingga pertumbuhan miseliumnya lebih cepat serta tebal.<sup>13</sup> Di bawah ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adapun hasil penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian pertama, mengenai Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*), dilakukan oleh Putra utama dkk. yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai komposisi media dalam membuat bibit jamur tiram. Penelitian dilakukan di Fakultas Pertanian Agroekoteknologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Provinsi Banten. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Kontrol dengan tujuh perlakuan (A: jagung, B: kacang hijau, C: biji-bijian, D: millet, E: serbuk gergaji albasiah, F: serbuk kayu mahoni, G: kecap serbuk gergaji) dan lima ulangan. Hasil diperoleh dari penelitian penggunaan berbagai substrat pertumbuhan menempatkan media biji jagung dan serbuk gergaji kayu albasiah putih memiliki pengaruh yang sama terhadap persentase pertumbuhan miselium dan kecepatan

---

<sup>12</sup> Rizky Maulidina dkk., "The Effect of Seedling Ages and Media Composition on Growth and Yield of White Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*)" *Jurnal Produksi Tanaman*, vol. 3, no. 8 (Desember 2015), h. 649 – 657. [protan.studentjournal.ub.ac.id](http://protan.studentjournal.ub.ac.id). (Diakses 19 Agustus 2020).

<sup>13</sup> Titik Suryani dan Hilda Carolina, "Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih Pada beberapa media Pembibitan" *Jurnal Bioeksperimen*, vol. 3, no. 3 (2017). h. 22. <http://journals.ums.ac.id/index.php/bioeksperimen/article/view/3674>. (Diakses 29 Agustus 2019).

pertumbuhan miselium.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka relevansi penelitian terletak pada variabel terikat yang diamati yakni miselium bibit jamur tiram dan perbedaan terletak pada jenis perlakuan yang diberikan serta rancangan penelitian yang digunakan.

Penelitian kedua, mengenai Pengaruh Komposisi Dedak dan Tepung Jagung pada Bahan Media Serbuk Gergaji terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram, dilakukan oleh Muh. Syawal dkk. dimana tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dosis dedak dan tepung jagung pada media serbuk gergaji untuk pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi ilmiah dasar yang memberikan informasi pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih dengan dosis dedak dan tepung jagung sebagai sumbernya. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi untuk masa depan peneliti tentang jamur tiram putih. Desain Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan sebagai berikut: D0 = media serbuk gergaji (100%), sebagai kontrol, D1 = serbuk gergaji (80%), dan dedak (20%), D2 = campuran serbuk gergaji media (75%), dan dedak (25%), D3 = campuran serbuk gergaji (70%), dan dedak (30%), D4 = campuran serbuk gergaji (80%), dan tepung jagung (20%), D5 = campuran media serbuk gergaji (75%) dan tepung jagung (25%), D6 = serbuk gergaji campuran (70%), dan tenaga jagung (30%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penambahan dosis dedak dan tepung jagung pada setiap perlakuan media serbuk gergaji memiliki pengaruh yang sangat tinggi berpengaruh signifikan terhadap parameter pengamatan yaitu pada parameter pengamatan

---

<sup>14</sup> Putra Utama dkk, "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". *Jurnal Agroekoteknologi*, vol. 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Agustus 2019).

pertumbuhan miselium. Perlakuan dengan dosis dedak 30% memberikan hasil yang terbaik dari semua parameter pengamatan kecuali pada parameter pengamatan diameter jamur tiram putih. Di parameter rata-rata diameter buah jamur tiram putih perlakuan terbaik adalah perlakuan (D1) dengan dosis 20% dedak.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka relevansi penelitian terletak pada variabel terikat yang diamati yakni miselium bibit jamur tiram serta karakteristik media yang digunakan yakni kombinasi antara serbuk dengan biji-bijian kemudian perbedaannya terletak pada jenis perlakuan media yang diberikan serta rancangan penelitian yang digunakan.

Penelitian ketiga, mengenai Pengaruh Komposisi Media Pembibitan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Jenis Jamur Tiram (*Pleurotus spp.*), dilakukan oleh Jessica dan Damahuri, dimana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-September 2018 di Lab. Pengembangan Jamur Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan CV. Damarayu, Sonotengah, Kebonagung, Malang. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama berupa jenis jamur tiram yang terdiri dari 5 jenis: jamur tiram putih strain boston (J1), jamur tiram putih strain florida (J2), jamur tiram putih strain thailand (J3), jamur tiram merah muda (J4) dan jamur tiram kuning (J5). Faktor kedua adalah komposisi media pembibitan, terdiri dari 4 taraf: 70% serbuk kayu+30% biji jagung (M1), 100% biji jagung (M2), 70% serbuk kayu+30% biji Sorgum (M3) dan 100% biji sorgum (M4). Hasil penelitian menunjukkan media 100% biji sorgum pada jenis jamur tiram putih strain florida, boston, thailand, dan jamur tiram merah muda, serta

---

<sup>15</sup> Muh. Syawal dkk., "Pengaruh Komposisi Dedak dan Tepung Jagung pada Bahan Media Serbuk Gergaji terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Agrotekbis*, vol. 6, no.3 (2018), h. 321-328. [http://rndjournals.com/uploads/documents/file\\_186\\_57.pdf](http://rndjournals.com/uploads/documents/file_186_57.pdf). (Diakses 2 September 2019).

media 100% biji jagung pada jamur tiram putih strain florida, thailand, dan jamur tiram merah muda, menunjukkan pertumbuhan lebih cepat saat pembibitan di botol begitu juga setelah bibit diinokulasikan ke baglog. Perlakuan jenis jamur tiram putih strain thailand dengan media pembibitan 100% biji sorgum menunjukkan waktu panen pertama yang lebih cepat dan jumlah tubuh buah perbaglog lebih banyak. Jenis jamur tiram putih strain florida, boston, thailand menunjukkan rata-rata diameter, interval panen dan frekuensi panen lebih tinggi.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka relevansi penelitian terletak pada variabel terikat yang diamati yakni miselium bibit jamur tiram serta karakteristik media yang digunakan yakni terdiri dari media biji-bijian dan media yang dengan bentuk lebih seerhana kemudian perbedaannya terletak pada jenis perlakuan media yang diberikan serta rancangan penelitian yang digunakan.

Penelitian keempat, mengenai Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram pada Berbagai Komposisi Media Tanam, yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tiram jamur pada berbagai komposisi media tanam, dan mendapatkan komposisi tumbuh terbaik media. Penelitian dilakukan di Desa Banjang Kecamatan Banjang HSU dan dimulai dari Maret 2012 hingga Juni 2012, menggunakan salah satu faktor Rancangan Acak Lengkap (CRD). Faktor yang diuji adalah komposisi media tanam (serbuk gergaji: dedak padi: batugamping: gipsum), yaitu k1 = 90%: 7,5%: 2%: 0,5%,

---

<sup>16</sup> Jessica Claudia Da Costa dan Damanhuri, "Pengaruh Komposisi Media Pembibitan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Jenis Jamur Tiram (*Pleurotus spp.*)" Jurnal Produksi Tanaman, vol. 7, no. 10 (Oktober 2019), h.18. <http://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/1251/1268>. (Diakses 20 Desember 2019).

k2 = 80%: 15%: 4%: 1%, k3 = 70%: 22,5%: 6%: 1,5%, k4 = 60%: 30%: 8%: 2% dan k5 = 50%: 37,5%: 10%: 2,5%. Hasil penelitian menunjukkan komposisi media tanam menentukan pertumbuhan dan hasil jamur tiram serta komposisi media tanam yang ditampilkan pertumbuhan dan hasil terbaik adalah k3.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka relevansi penelitian terletak pada variabel terikat yang diamati yakni miselium bibit jamur tiram serta karakteristik media yang digunakan kemudian perbedaannya terletak pada jenis perlakuan media serta banyaknya kombinasi yang diberikan serta rancangan penelitian yang digunakan.

Pada penelitian di atas, pemberian berbagai macam bahan tambahan pada komposisi media dasar telah banyak dilakukan dengan berbagai macam metode. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan formula nutrisi yang dapat mempercepat pertumbuhan miselium. Maka dari itu, pada penelitian ini serbuk jagung digunakan sebagai bahan tambahan untuk merangsang pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).

#### ***F. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).

---

<sup>17</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).

### **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang kita dapat peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau studi penunjang guna menambah wawasan mahasiswa terkait mata kuliah Biologi Terapan yang menekankan pada produk-produk olahan berbasis keilmuan biologi yang merupakan sumber pangan masyarakat yang sehat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram yang tentunya akan berdampak positif untuk kesejahteraan pembudidaya jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).
3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dan tentunya jika berhasil akan menjadi alternatif nutrisi tambahan yang baik untuk pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*)

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Tinjauan Umum Mengenai Jamur*

Fungi merupakan salah satu organisme yang umumnya ditemukan tidak motil. Fungi ini termasuk organisme eukariotik yang memiliki dinding sel. Fungi memiliki kesamaan dari segi karakteristik dengan tumbuhan tapi hal yang mendasar yang menjadi titik perbedaan antara tumbuhan dan jamur adalah dimana jamur tidak memiliki klorofil. Perbedaan ini menjadi ciri khas pengklasifikasian antara jamur dengan tumbuhan. Klorofil merupakan zat yang ada pada tumbuhan sebagai salah satu dalam komponen yang harus dimiliki oleh organisme agar dapat berfotosintesis. Dengan dasar tersebut, fungi tidak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga digolongkan ke dalam organisme heterotrof.<sup>18</sup> Salah satu komponen penyusun dari fungi adalah kitin, dimana kitin merupakan polisakarida yang bukan hanya terdapat pada jamur saja tetapi polisakarida ini juga terdapat pada cangkang udang. Jamur ialah organisme eukariotik yang tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Pada berbagai jenis jamur, terdapat beberapa spesies jamur yang memiliki zat warna yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Pada umumnya jamur merupakan organisme multiseluler yang sel-selnya memanjang yang memiliki bentuk seperti benang-benang. Benang-benang tersebut merupakan struktur morfologi jamur yang biasa disebut dengan benang-benang hifa. Septa merupakan bagian sekat yang

---

<sup>18</sup> Hafsan, *Mikrobiologi Umum* (Makassar: Alauddin Universty Press, 2011), h. 22.

ada pada benang-benang (hifa) tersebut. Pada bagian hifa yang memiliki septa itu merupakan bagian 1 sel utuh yang di dalamnya terdapat inti.<sup>19</sup>

Kelompok fungi *Basidiomycota* sering disebut jamur oleh orang awam karena memiliki banyak jenis yang karpusnya (tubuh buahnya) besar dapat dilihat dengan kasat mata. Fungi (*mushroom*) sudah dimanfaatkan manusia misalnya *Agaricus bisporus*, *Pleurotus flabellatus* dan *Flamulina velutipes*. Akan tetapi, banyak juga yang bersifat racun, bahkan racun yang mematikan diantaranya *Amanita sp* dan *Coprinus cinereus*. Dalam bahasa Inggris perbedaan cendawan antara yang beracun dan yang tidak cukup jelas, yaitu yang tidak beracun disebut *mushroom* sedangkan yang bersifat racun disebut *toadstool*.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut maka fungi tidak dapat dikatakan sebagai tumbuhan maupun hewan melainkan digolongkan dalam kingdom tersendiri yakni kingdom fungi yang memiliki karakteristik tersendiri.

### 1. Struktur Jamur

Secara umum, jamur dapat didefinisikan sebagai organisme eukariotik yang mempunyai inti dan organel. Jamur tersusun dari hifa yang merupakan benang-benang sel tunggal panjang, sedangkan kumpulan hifa disebut dengan miselium. Miselium merupakan massa benang yang cukup besar dibentuk dari hifa yang saling membelit pada saat jamur tumbuh. Jamur mudah dikenal dengan melihat warna miseliumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nadyah, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 9.

<sup>20</sup> Gandjar I dkk. *Mikologi Dasar Dan Terapan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 24.

<sup>21</sup> Volk, W.A and M.F. Wheeler, *Mikrobiologi Dasar*. Edisi Kelima. Jilid 1 (Penerbit Erlangga. Jakarta, 1993.), h.44.

Bagian penting tubuh jamur adalah suatu struktur berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang, ada yang tidak bersekat dan ada yang bersekat. Hifa dapat tumbuh bercabang-cabang sehingga membentuk jaring-jaring, bentuk ini dinamakan miselium. Pada satu koloni jamur ada hifa yang menjalar dan ada hifa yang menegak. Biasanya hifa yang menegak ini menghasilkan alat-alat pembiak yang disebut spora, sedangkan hifa yang menjalar berfungsi untuk menyerap nutrisi dari substrat dan menyangga alat-alat reproduksi. Hifa yang menjalar disebut hifa vegetatif dan hifa yang tegak disebut hifa fertil. Pertumbuhan hifa berlangsung terus-menerus di bagian apikal, sehingga panjangnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Diameter hifa umumnya berkisar 3-30  $\mu\text{m}$ . Jenis jamur yang berbeda memiliki diameter hifa yang berbeda pula dan ukuran diameter itu dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.<sup>22</sup>

Hifa adalah benang halus yang merupakan bagian dari dinding tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma. Jamur sederhana berupa sel tunggal atau benang-benang hifa saja. Jamur tingkat tinggi terdiri dari anyaman hifa yang disebut prosenkim atau pseudoparenkim. Prosenkim adalah jalinan hifa yang kendor dan pseudoparenkim adalah anyaman hifa yang lebih padat dan seragam. Sering terdapat anyaman hifa yang padat dan berguna untuk mengatasi kondisi buruk yaitu rhizomorf atau sklerotium. Ada pula yang disebut stroma yaitu jalinan hifa yang padat dan berfungsi sebagai bantalan tempat tumbuhnya bermacam-macam bagian lainnya.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka struktur utama jamur berupa hifa yang akan membentuk miselium yang akan menyerap nutrisi.

---

<sup>22</sup> Carlile dkk, *The Fungi* (Academic Press, London, 1994), h.69.

<sup>23</sup> Sasmitamihardja, D, *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* (Bandung: ITB, 1990, h.22).

## 2. Klasifikasi Jamur

Jamur terdiri dari empat kelas utama yaitu :

### a. *Chitridiomycetes*

Sebagian besar *Chitridiomycetes* adalah organisme akuatik. *Chitridiomycetes* merupakan jamur yang berflagel. Cara penyerapan makanannya dengan cara absorpsi, dinding selnya terbuat dari kitin. Sebagian besar *Chitridiomycetes* membentuk hifa senositik dan spora berflagel tunggal atau disebut *zoospore*.<sup>24</sup>

### b. *Zygomycetes*

Anggota *Zygomycetes* memiliki hifa yang tidak bersekat dan memiliki banyak inti disebut hifa senositik. Kebanyakan kelompok ini saprofit. Berkembang biak secara aseksual dengan spora, dan secara seksual dengan zigospora. Ketika sporangium pecah, sporangiospora tersebar, dan jika jatuh pada medium yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Hifa yang senositik akan berkonjugasi dengan hifa lain membentuk zigospora.<sup>25</sup>

### c. *Ascomycetes*

Golongan jamur ini memiliki ciri dengan spora yang terdapat di dalam kantung yang disebut askus. Askus adalah sel yang membesar yang didalamnya terdapat spora yang disebut askospora. Setiap askus biasanya memiliki 2-8 askospora. Kelompok ini memiliki 2 stadium perkembangbiakan yaitu stadium konidium (aseksual) dan stadium askus (seksual). Sebagian besar *Ascomycetes*

---

<sup>24</sup> Campbell dkk. "Biologi" Jilid 2. Edisi Kelima. (Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003). h.126.

<sup>25</sup> Moore and Landecker "Fundamental of fungi" (Prentice Hall of Company. New York, USA, 1982). H.155

bersifat mikroskopis dan hanya sebagian kecil bersifat makroskopis yang memiliki tubuh buah.<sup>26</sup>

*d. Basidiomycetes*

Kebanyakan anggota Basidiomycetes adalah jamur payung dan cendawan. Basidiomycetes mempunyai hifa yang bersekat, fase seksualnya dengan pembentukan basidiospora yang terbentuk pada basidium sedangkan fase aseksualnya ditandai dengan pembentukan konidium. Konidium maupun basidiospora pada kondisi yang sesuai dapat tumbuh dengan membentuk hifa bersekat melintang yang berinti satu (monokariotik). Selanjutnya, hifa akan tumbuh membentuk miselium.<sup>27</sup>

Untuk jamur yang belum diketahui cara perkembangbiakan secara generatifnya dikelompokkan ke dalam kelas khusus Deuteromycetes. Deuteromycetes merupakan jamur yang hifanya bersekat dan menghasilkan konidia, namun jamur ini belum diketahui cara perkembangbiakan secara generatifnya. Deuteromycetes disebut juga jamur imperfecti (jamur tidak sempurna). Penamaan atau pengelompokan ini bersifat sementara karena apabila telah diketahui cara reproduksi generatifnya (pembentukan askus) maka dikelompokkan ke dalam kelas Ascomycetes. Deuteromycetes secara filogenetik bukan merupakan suatu kelompok taksonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moore and Landecker “*Fundamental of fungi*” (Prentice Hall of Company. New York, USA, 1982). H.155

<sup>27</sup> Campbell dkk. “*Biologi*” Jilid 2. Edisi Kelima. (Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003). h.126.

<sup>28</sup> Gandjar I dkk. *Mikologi, Dasar Dan Terapan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 24.

### 3. Sifat-sifat jamur

Sifat-sifat Jamur pada dasarnya bersifat heterotrof yaitu organisme yang dapat menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miselium untuk memperoleh makanannya, dan kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Semua zat seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya diperoleh dari lingkungannya. Jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit.<sup>29</sup>

### 4. Metabolisme Jamur

#### a. Metabolisme Karbon

Berdasarkan kemampuannya dalam mengambil energi maka organisme dapat dibedakan menjadi 2 yaitu organisme heterotrof dan juga organisme autotrof. Ciri utama dari organisme autotrof yaitu kemampuannya dalam mengasimilasi karbon anorganik menjadi senyawa organik. Pada organisme heterotrof, kemampuan yang dimilikinya adalah dapat mengasimilasi dari karbon organik menjadi karbon organik lain. Fungi tidak memiliki kemampuan dalam mengoksidasi senyawa karbon anorganik sehingga digolongkan ke dalam organisme heterotrof.<sup>30</sup>

#### b. Metabolisme Karbohidrat

Alam menyediakan berbagai macam sumber kehidupan, salah satunya karbohidrat. Karbohidrat yang ada di alam merupakan karbohidrat dalam bentuk polisakarida, yang pada umumnya merupakan komponen cadangan dalam tubuh tumbuhan. Karbohidrat merupakan senyawa yang menjadi sumber nutrisi bagi fungi

---

<sup>29</sup> Deacon and Terrence, *The Symbolic Species* (London: Penguin Press, 1997), h.59.

<sup>30</sup> Gandjar I dkk., *Mikologi Dasar Dan Terapan*. h. 27

dimana nutrisi tersebut akan diuraikan oleh enzim ekstraseluler terlebih dahulu setelah akan diserap oleh fungi yang menjadi makanannya kemudian akan di asimilasi. Metabolisme yang terjadi pada fungi diawali dengan tahap transpor, kecuali untuk di atau trisakarida yang membutuhkan proses hidrolisis terlebih dahulu di luar sel. Kebanyakan fungi dapat memanfaatkan monosakarida tetapi dalam prosesnya pemanfaatan disakarida dan polisakarida hanya sedikit. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan untuk menghidrolisis molekul-molekul besar tersebut.<sup>31</sup>

#### **c. Metabolisme Protein**

Sumber karbon dan sumber senyawa nitrogen organik yang paling baik untuk jamur adalah glukosa. Jamur memiliki berbagai macam spesies yang tentunya memiliki karakteristik nutrisi yang berbeda-beda. Salah satu unsur lain yang dibutuhkan oleh jamur antara lain protein. Untuk mengolah protein ini, jamur harus memiliki kemampuan dalam menguraikan protein tersebut dimana kemampuan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas enzim protease. Enzim ini disekresikan oleh jamur ke lingkungan yang memiliki peran dalam hal menguraikan protein menjadi asam amino. Setelah proses tersebut, maka hasil penguraiannya akan diangkut ke dalam sel dengan cara transpor sel. Perlu diketahui bahwa pati merupakan cadangan makanan yang ada di dalam tumbuhan. Pati tersusun dari amilopektin dan amilosa.<sup>32</sup>

#### **d. Metabolisme Lipid**

Pada berbagai jenis fungi, dapat diketahui bahwa fungi dapat menggunakan lipid dengan bantuan dari enzim lipase. Enzim lipase yang disekresikan oleh fungi ke

---

<sup>31</sup> Gandjar I dkk. *Mikologi, Dasar Dan Terapan*, h. 27

<sup>32</sup> Gandjar I dkk. *Mikologi, Dasar Dan Terapan*, h. 27

lingkungan ini akan mendegradasi lipid sebelum diangkut ke dalam sel. Pada prinsipnya fungi dapat menggunakan lipid sebagai sumber karbonnya. Pada tahap ini, enzim lipase sangat dibutuhkan karena berperan dalam menhidrolisis karbon.<sup>33</sup>

### 5. Pertumbuhan dan Reproduksi Jamur

Faktor-faktor pertumbuhan jamur meliputi kelembaban yang tinggi, persediaan oksigen, dan persediaan bahan organik. Jamur merupakan saprofit dan dapat hidup dari bahan organik yang telah mati atau yang mengalami pembusukan.<sup>34</sup> Jamur dapat melakukan reproduksi secara seksual (generatif) maupun aseksual (vegetatif). Jamur memperbanyak diri dengan cara memproduksi sejumlah besar spora aseksual jika kondisi habitat sesuai. Untuk mendapatkan kebutuhan energinya, jamur akan mencari dan mengabsorpsi molekul-molekul organik. Melewati dinding selnya, jamur dapat mengabsorpsi molekul-molekul kecil yang kemudian diabsorpsi dan digunakan secara langsung atau disusun menjadi molekul organik dalam sel.<sup>35</sup>

Spora jamur memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan dapat dihasilkan secara seksual maupun aseksual. Pada umumnya spora adalah organisme uniseluler, tetapi ada juga spora multiseluler. Spora dihasilkan di dalam atau dari struktur hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan yang cepat, jamur memperbanyak diri dengan menghasilkan banyak spora secara aseksual.

---

<sup>33</sup>Nadyah, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 22.

<sup>34</sup> Pelczar dkk., *Dasar-Dasar Mikrobiologi, Universitas Indonesia*, (UI-Press, Jakarta, 1986). h. 190-191

<sup>35</sup> Campbell dkk., *Biologi Jilid 2. Edisi Kelima* (Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003). h.126.

Terbawa oleh angin atau air, spora-spora tersebut berkecambah jika berada pada tempat yang lembab pada permukaan yang sesuai.<sup>36</sup>

Spora seksual dihasilkan dari peleburan dua nukleus. Ada beberapa spora seksual yaitu:

- a. Askospora yang merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam pundi atau kantung yang dinamakan askus. Biasanya terdapat delapan askospora di dalam setiap askus.
- b. Basidiospora yang merupakan spora bersel satu yang terbentuk di atas struktur berbentuk gada yang dinamakan basidium.
- c. Zigospora yang merupakan spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi, disebut juga gametangia.
- d. Oospora merupakan spora yang terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut oogonium, pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan yang terbentuk di dalam anteridium menghasilkan oospora.<sup>37</sup>

#### **B. Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)**

Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu spesies jamur yang tergolong ke dalam *Basidiomycetes*. Jamur tiram merupakan jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan biasa dijumpai pada kayu lapuk . Jamur ini merupakan salah satu sumber protein dan hayati yang diminati oleh masyarakat setelah kacang-kacangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Campbell dkk. "Biologi" Jilid 2. Edisi Kelima, h.126.

<sup>37</sup> Pelczar dkk. *Dasar-Dasar Mikrobiologi, Universitas Indonesia*, h. 190-191.

<sup>38</sup>Maulana, Erie. *Panen Jamur Tiap Musim*. (Lampung: Lily Publisher, 2012) h. 3.

Kasifikasi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) menurut Wijaya adalah sebagai berikut:

Regnum	: Fungi
Devisio	: Basidiomycota
Classis	: Homobasidiomycetes
Ordo	: Agaricales
Familia	: Tricholomataceae
Genus	: <i>Pleurotus</i>
Species	: <i>Pleurotus ostreatus</i> . <sup>39</sup>

### 1. Morfologi Jamur Tiram

Jamur tiram putih memiliki tudung (*pileus*) mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung dan berwarna putih hingga krem. Permukaan tudung licin, agak berminyak saat lembab dan tepiannya bergelombang, diameternya mencapai 3-20 cm, spora berbentuk batang berukuran (8-11) x (3-4) um, miselium berwarna putih dan biasa tumbuh dengan cepat. *Pileus* berbentuk mirip cangkang tiram yang berukuran 5-15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Tangkainya dapat pendek atau panjang (2-6 cm) tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim yang mempengaruhi pertumbuhannya. Tangkai ini menyangga tudung agak lateral (di bagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah). Jamur memiliki spora, inti, dan sel-selnya saling bersambungan sehingga membentuk benang-benang

---

<sup>39</sup> Wijaya, Sheila. *The Secret of Jamur*. (Yogyakarta : FlashBooks, 2014) h.44.

yang disebut dengan hifa. Kumpulan daripada hifa ini membentuk sebuah gumpalan yang lebih berisi yang disebut dengan miselium.<sup>40</sup>

## **2. Fisiologi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)**

Jamur tiram putih ketika sudah dewasa, memiliki banyak bilah-bilah atau sekat-sekat yang jumlahnya banyak. Pada bagian dalam yakni pada sekat-sekat tersebut terdapat yang namanya basidia. Pada ujung basidia tersebut terdapat kantong yang di dalamnya terdapat banyak spora atau biasa disebut dengan basidiospora. Spora memiliki peranan penting, hal ini dikarenakan spora berperan penting dalam proses perkembangbiakan jamur tiram putih. Gabungan dari sel-sel spora yang saling bersambung akan membentuk benang-benang hifa atau miselium. Pertemuan 2 titik percabangan miselium disebut dengan pin head atau calon tumbuh buah jamur yang selanjutnya berkembang menjadi tubuh jamur dewasa.<sup>41</sup>

Jika kita menelisik lebih jauh, kumpulan daripada hifa ini membentuk sebuah gumpalan yang lebih berisi yang disebut dengan miselium. Miselium ini bercabang-cabang dan dapat melakukan penetrasi pada dinding sel kayu. Dalam melakukan penetrasi ini, miselium dibantu oleh enzim selulosa, hemiselulosa dan juga lignin yang dihasilkan sendiri pada ujung-ujung miselium tersebut. Dalam proses kerjanya, enzim-enzim ini mencerna senyawa pada kayu kemudian mengubahnya menjadi sumber energi.<sup>42</sup>

## **3. Siklus Hidup Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)**

Jamur bereproduksi dengan cara melepaskan spora yang dihasilkan secara

---

<sup>40</sup> Djarijah dkk., *Jamur Tiram*. (Yogyakarta. Penerbit Kanisius, 2001), h.12.

<sup>41</sup> Wardani, Isnaini, *Budidaya Jamur Konsumsi*. (Yogyakarta : Andi Ofset, 2010). h.55.

<sup>42</sup> Meina, Iin, *Budidaya Jamur Tiram*. (Jakarta: Azka Pressh, 2007.), h. 89.

seksual dan aseksual. Reproduksi seksual hanya dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan yang kurang sesuai dengan jamur. Reproduksi seksual ini menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetik yang lebih besar. Variasi individu pada keturunan ini dapat membantu mereka beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan. Sedangkan reproduksi aseksual pada jamur menggunakan spora yang dihasilkan oleh hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan jamur memungkinkan, pertumbuhannya akan cepat, jamur mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak spora secara aseksual. Spora ini akan terbawa oleh angin dan berkecambah jika mendarat ditempat yang lembab dan permukaan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora akan berkecambah membentuk benang-benang halus yang merupakan bagian dari dinding tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk suatu hamparan anyaman yang disebut miselium. Miselium merupakan jaringan “makan” dari jamur.<sup>43</sup>

Menurut Suriwiria, tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram sebagai berikut :

1. Spora (*Basidiospora*). Apabila spora berada di tempat lembab dan sudah dewasa, selanjutnya akan tumbuh dan berkecambah membentuk serat-serat halus yang menyerupai serat-serat kapas. Penampakan seperti ini disebut dengan miselium.
2. Apabila faktor-faktor atau keadaan lingkungan baik dan mendukung tempat tumbuhnya miselia misalnya temperatur, kelembaban, kandungan substrak

---

<sup>43</sup> Eka Ely Narwanti, *Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan Efficiency Biology Rate*. IKIP PGRI (Semarang: Semarang, 2013), h. 21.

pertumbuhan maka kumpulan dari masing-masing miselia tersebut membentuk primordial (bakal tumbuh jamur).

3. Bakal tubuh buah jamur tersebut kemudian akan membesar, dan pada akhirnya membentuk tubuh buah atau bentuk jamur yang kemudian dipanen.
4. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora. Spora ini tumbuh di bagian ujung basidium, sehingga disebut basidiospora. Jika sudah matang atau dewasa, spora akan jatuh dari tubuh buah jamur.

Jika kita melihat fase perkembangan jamur di atas, dikenal ada 3 macam miselia ketiga miselia tersebut yaitu: fase miselia primer, fase miselia sekunder, dan fase miselia tersier. Dikatakan miselia primer dikarenakan miselium ini berasal dari 1 spora dan juga disebut miselium monokarion. Miselium sekunder terbentuk dari hasil peleburan miselium primer atau disebut miselium dikarion. Miselium dikarion melakukan penggabungan membentuk primordial kemudian diakhiri dengan pembentukan badan buah. Ujung-ujung miselium dikarion tersebut terus bergerak dan bermuara pada tudung badan buah jamur.<sup>44</sup>

Beberapa jenis jamur yang telah dikenal dan dibudidayakan secara luas di Indonesia antara lain jamur merang (*Volvariella volvaceae*), jamur kuping (*Auricularia aricula*), jamur shitake (*Lentinula edodes*) dan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*). Salah satu aspek yang sangat menonjol adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan salah satu indikatornya adalah perubahan pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan gizi dan pangan. Seperti kehidupan masyarakat yang sudah maju di daerah lain (Pulau Jawa dan Sumatera) pada umumnya, masyarakat di Papua mulai memperhatikan variasi dan mutu pada

---

<sup>44</sup> Hendritomo, Henky, *Jamur Konsumsi Berkhasiat Obat*. (Yogyakarta: Andi, 2010) , h.3.

berbagai jenis makanan. Pola tersebut berdampak pada permintaan terhadap jamur yang terus meningkat. Jamur menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati selain berbagai jenis ikan laut. Ketersediaan jamur dipasaran khususnya di Papua sangat terbatas yaitu hanya dijual di toko modern (swalayan). Kondisi ini menyebabkan harga jamur di Papua khususnya di Jayapura lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jamur di daerah lain (pulau Jawa). Umumnya berbagai jenis jamur pangan yang dijual di Papua didatangkan dari luar Papua, yaitu dari Makassar atau Surabaya. Keterbatasan keterampilan dalam membudidayakan jamur menjadi salah satu penyebab terbatasnya persediaan jamur dipasar.<sup>45</sup>

Kegiatan budidaya spesies jamur ini sebagai bahan pangan mulai diminati oleh masyarakat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam budidaya yaitu ketersediaan media tumbuh. Pada umumnya substrat yang digunakan dalam budidaya jamur tiram adalah serbuk gergaji. Sehingga akan timbul masalah apabila serbuk gergaji sukar diperoleh. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dicari substrat alternatif.<sup>46</sup>

Dalam pertumbuhannya, jamur memiliki cara tumbuh berkoloni atau berkelompok yang dapat dijumpai pada berbagai media tumbuh dan dapat ditemui di alam yang terdapat pada kayu, jerami, padi, alang-alang dan berbagai jenis tempat lain yang dapat memungkinkan untuk tumbuh. Pada pembuatan media, serbuk kayu

---

<sup>45</sup> Verena Agustini dkk., "Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) Sebagai Percontohan Dan Unit Usaha Budidaya Jamur (Uubj) di Universitas Cenderawasih". *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, vol. 2, no. 1 (2018), h. 28-29. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpmmp/article/view/16160/pdf>. (Diakses 22 November 2019).

<sup>46</sup> Nurul Hariadi dkk., "Studi Pertumbuhan dan Hasil Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Media Tumbuh Jerami Padi dan Serbuk Gergaji". *Jurnal Produksi Tanaman* vol. 1, no.1 (2013) h. 47. <http://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/6>. (Diakses 22 November 2019).

masih memerlukan unsur atau komponen lain dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pertumbuhan jamur itu sendiri.<sup>47</sup>

Dalam hal melanjutkan keturunannya, jamur sendiri memiliki cara reproduksi yaitu dengan melepaskan spora yang dihasilkan melalui reproduksi seksual dan aseksual. Keanekaragaman genetik yang besar dapat diperoleh pada reproduksi seksual. Variasi individu yang terjadi inilah yang menjadi sebuah keuntungan, hal ini dikarenakan jamur dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dan pada reproduksi aseksual, hifa menghasilkan spora pada jamur yang nantinya akan terspesialisasi.<sup>48</sup>

Jamur tiram putih merupakan jamur yang memiliki banyak nilai guna dalam sektor perekonomian. Biasanya jamur ini dikonsumsi dalam bentuk masakan dan digoreng kemudian dikemas namun jamur ini juga dapat dikonsumsi secara langsung atau mentah menjadi lalapan. Dalam hal pengolahannya, jamur ini biasa dijumpai dalam bentuk jamur krispi atau direbus bersama jenis sayur lainnya. Negara-negara di eropa, amerika mengonsumsi jamur ini dengan tidak memasaknya terlebih dahulu melainkan mengonsumsinya secara langsung atau biasa dikenal dengan sebutan salad. Makanan ini biasa disajikan di hotel-hotel berbintang yang ada di eropa karena kelezatannya. Sedangkan di Indonesia, masakan ini juga sudah disajikan di hotel-hotel misalnya di Jakarta. Di Jakarta sendiri jamur tiram putih ini diolah juga menjadi salad dan juga gado-gado. Dibandingkan dengan jenis sayuran lain yang biasanya digunakan untuk membuat lalapan, menurut survey, jamur tiram ini memiliki rasa

---

<sup>47</sup> Soenanto, H. *Jamur Tiram* (Aneka Ilmu. Semarang,, 2000). h. 8.

<sup>48</sup> Narwanti EE. “*Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan 52 Efficiency Biology Rate*”. Skripsi. (Semarang : Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013). h. 8.

yang jauh lebih lezat dibanding dengan jenis sayuran yang biasanya digunakan untuk membuat lalapan dan gado-gado. Dengan banyaknya yang menggemari olahan makanan dari jamur tiram ini membuat peluang usaha dalam bisnis makanan jamur tiram ini banyak digemari pula oleh kalangan pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner.<sup>49</sup>

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris sebenarnya telah lama membudidayakan aneka jenis jamur konsumsi, bahkan sejak perang dunia kedua. Dari sekian banyak jenis jamur, jamur tiram merupakan jenis jamur yang paling banyak dibudidayakan. Seiring dengan berkembangnya zaman, orang mulai mengetahui khasiat dan manfaat dari jamur tiram, sehingga timbul dorongan untuk mulai membudidayakannya secara mandiri.<sup>50</sup>

Jamur tiram biasanya diolah menjadi aneka makanan lezat. Secara sosial budaya, jamur tiram merupakan bahan pangan bergizi, berkhasiat obat yang lebih murah dibandingkan obat modern. Secara ekonomis merupakan komoditas yang tinggi harganya dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Adanya diversifikasi produk olahan jamur tiram diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah. Hal ini dikarenakan umur jamur tiram yang tidak tahan lama, maka salah satu bentuk diversifikasi yang mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan adalah mengolah jamur tiram sebagai sosis jamur tiram. Sosis secara umum adalah daging yang digiling sampai halus, diberi bumbu, berada dalam selongsong, dimasak dan kadang-kadang dengan pengasapan serta selalu disajikan dalam keadaan dingin. Jamur tiram dapat digunakan menjadi alternatif bahan pangan bagi para vegetarian

---

<sup>49</sup> Suriawiria, *Budidaya Jamur Tiram* (Yogyakarta: Kanisius 2002), h.12

<sup>50</sup> Priyadi Triono Untung, *Bisnis Jamur Tiram* (Jakarta : Agromedia Pustaka, 2013). h. 9.

yang ingin menikmati olahan pangan dalam bentuk sosis, dikarenakan jamur tiram dapat diolah menjadi sosis, dan dapat menjadikan solusi bagi para vegetarian sebagai pengganti daging.<sup>51</sup>

Jamur tiram dalam bahasa latin disebut *Pleurotus ostreatus* merupakan jenis jamur yang termasuk dalam kelas *Basidiomycetes*. Spesies jamur tiram, *Pleurotus ostreatus* dikenal oleh para pembudidaya jamur dengan sebutan jamur tiram putih karena bentuk tudungnya yang menyerupai cangkang tiram (cangkang kerang) dan jamur tiram berwarna putih. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu. Jamur tiram biasa disebut dengan jamur kayu karena banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk. Jamur ini disebut dengan jamur tiram karena memiliki bentuk tudung yang agak membulat, lonjong, dan melengkung hampir seperti cangkang tiram. Batang atau tangkai jamur ini tidak tepat berada pada tengah tudung, tetapi agak ke tepi.<sup>52</sup>

Jamur tiram disukai karena rasanya yang enak dan kandungan gizi yang tinggi, namun tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Ada beberapa jenis jamur yang mengandung racun dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jamur beracun diberi istilah *toadstool*, sedangkan jamur konsumsi istilahnya *mushroom*. Tidak perlu khawatir, dua jenis jamur ini dapat dibedakan dari ciri-ciri fisiknya. Umumnya penampilan jamur beracun sangat menarik karena warnanya yang mencolok seperti orange, kuning terang, biru, merah darah dan tumbuh ditempat yang kotor. Ada juga

---

<sup>51</sup> Wignyanto dkk., "Analisis Kelayakan Teknis Dan Finansial Produksi Sosis Jamur Tiram Pada Skala Industri Kecil (Studi Kasus Di Budidaya Jamur Tiram 'Wahyu' Kota Mojokerto)", Jurnal Industria vol 1, no. 2 (2012), h. 105-114. <http://www.industrdia.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/108/303>. (Diakses 28 Agustus 2019).

<sup>52</sup> Susi Steivani. *Pengaruh Penambahan Molase Dalam Berbagai Media Pada Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2011).h. 18.

jamur beracun yang warnanya hampir menyerupai jamur pangan, untuk membedakannya pada jamur beracun jika bagian batang dipotong akan tercium bau menyengat seperti telur busuk atau *amoniak*, bagian yang dipotong juga berubah warna menjadi lebih gelap seperti hitam atau biru. Bahkan ada beberapa jamur beracun mengeluarkan getah berwarna putih kental jika batangnya dipotong. Jamur beracun memiliki cincin atau cawan pada pangkal batang, meskipun jamur merang juga memiliki cawan pada batangnya tapi jamur ini aman dikonsumsi.<sup>53</sup>

Permintaan terhadap jamur dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Permintaan jamur tidak hanya sebatas pasar dalam negeri, tetapi juga merambat hingga ke pasar internasional. Sayangnya, hingga saat ini jumlah produksi jamur yang ada belum bisa memenuhi angka permintaan. Padahal, kebutuhan jamur tidak hanya terbatas pada permintaan jamur segar, masih ada peluang besar pada beberapa segmen usaha yang berkaitan erat dengan bisnis jamur. Misalnya, bisnis bibit jamur (inokulan), bisnis penjualan media jamur (baglog), bisnis olahan jamur, bisnis jasa dan pelatihan budidaya jamur, serta bisnis bidang agrowisata jamur.<sup>54</sup>

Jamur tiram merupakan kelompok *Thallophyta*. Meskipun tergolong tumbuhan yang rendah karena perkembangannya kurang sempurna, namun sejak 3000 tahun silam, jamur tiram sudah mulai dinikmati di negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea dan Mesir. Sebagian besar mereka meyakini bahwa mengonsumsi jamur ini dapat meningkatkan kekebalan (berumur panjang). Beberapa negara seperti Rusia,

---

<sup>53</sup> Ica Meinanda, *Panen Cepat Budidaya Jamur* (Bandung : Penerbit Padi. 2013). h. 157.

<sup>54</sup> Mahdi Fauzi dkk., “Pengaruh Tiga Media Tanam Serbuk Kayu dan Pemberian Pupuk Pada Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) *Jurnal Agroekoteknologi* , vol. 1 no. 2 (Maret 2013), h. 2337-6997. <https://www.neliti.com/id/publications/94461/pengaruh-tiga-media-tanam-serbuk-kayu-dan-pemberian-dan-pemberian-pupuk-pada-pro>. (Diakses 12 Agustus 2019).

Yunani, dan Meksiko sangat percaya bahwa memakan jamur tiram dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jamur ini sangat populer saat ini. Teksturnya lembut, penampilannya menarik, dan cita rasanya relatif netral sehingga mudah dipadukan dengan berbagai masakan. Budidayanya juga relatif mudah dan murah hingga sangat potensial dikomersilkan.<sup>55</sup>

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan sebagai diversifikasi bahan pangan karena kandungan gizinya setara dengan daging dan ikan. Jamur tiram putih dilihat dari segi ekonomi dapat memberikan keuntungan karena harganya cukup tinggi, per kilogram bisa mencapai sepuluh ribu rupiah bahkan bisa lebih. Permintaan pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, waktu panennya singkat sekitar 1-3 bulan, bahan baku mudah didapat, dan tidak membutuhkan lahan yang luas, oleh karena itu jenis jamur ini mulai banyak dibudidayakan.<sup>56</sup>

Jamur tiram putih mempunyai kemampuan meningkatkan metabolisme dan menurunkan kolesterol. Selain itu, manfaat lain yang dimiliki jamur tiram adalah sebagai anti-bakterial dan anti-tumor sehingga jamur tiram juga banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit mulai dari diabetes, lever, dan lainnya. Jamur tiram juga sangat baik dikonsumsi terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan karena memiliki kandungan serat pangan yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. Selain serat, setiap 100 gram jamur kering juga mengandung protein 10,5% - 30,4%, lemak 1,7% - 2,2%, karbohidrat 56,6%,

---

<sup>55</sup>Wijaya, Sheila, *The Secret of Jamur* (Yogyakarta: Flash Books 2014). h. 180.

<sup>56</sup>Darlina Ina. *Pengaruh Penambahan Bekatul Dan Limbah Cair Tahu Untuk Media Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. (Universitas Bandung Raya : Bandung 2013) h. 45.

tiamin 0,2 mg, riboflavin 4,7 – 4,9 mg, niasin 77,2 mg, kalsium 314 mg, dan kalori 367.<sup>57</sup>

Jamur tiram putih mempunyai khasiat untuk kesehatan yaitu dapat menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes melitus, menyempit pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit tumor atau kanker, kelenjar gondok, influenza, serta memperlancar buang air besar.<sup>58</sup>

Jamur tiram putih mempunyai aroma yang khas karena mengandung muskorin, dan penting bagi kesehatan. Jamur tiram mempunyai kandungan protein sebanyak 5,4%, karbohidrat 59%, serat 1,56%, lemak 0,17%, selain itu setiap 100 g jamur tiram mengandung kalsium 8,9 mg, besi 1,9 mg, fosfor 17,0 mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin B2 0,75 mg, vitamin C 12,40 mg dan menghasilkan 45,65 kalori.<sup>59</sup>

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan sebagai diversifikasi bahan pangan serta kandungan gizinya setara dengan daging dan ikan. Jamur tiram putih dilihat dari segi bisnis menguntungkan karena harganya cukup tinggi, per kilogram bisa mencapai sepuluh ribu bahkan bisa lebih. Permintaan pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, waktu panennya singkat sekitar 1-3 bulan, bahan baku mudah didapat,

---

<sup>57</sup> Suwito, M. "Resep Masakan Jamur dari Chef Ternama". (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka Oktober, 2006). h. 77.

<sup>58</sup> Ummu Kalsum dkk., "Efektivitas Pemberian Air Leri Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*)" *Jurnal Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura* : Madura, vol.4 no.2 (September 2011), h. 212. <https://journal.al.trunojoyo.ac.id/agrovigor/article/view/297>. (Diakses 3 Desember 2019).

<sup>59</sup> Afina Shifriyah dkk., "Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Penambahan Dua Sumber Nutrisi". *Jurnal Agrovigor*, vol. 5 no.1 (Maret 2012), h. 8. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor/article/view/303/278>. (Diakses 15 Desember 2019).

dan tidak membutuhkan bahan baku yang luas, oleh karena itu jamur tiram putih mulai dibudidayakan.<sup>60</sup>

Berdasarkan morfologi warna dari jamur tiram, jamur ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu jamur tiram merah (*P. flatellatus*), jamur tiram coklat (*P. cycstidiosus*) dan jamur tiram putih (*P. ostreotus*). Dari ketiga jenis jamur tersebut, jamur yang paling sering dibudidayakan terutama di Indonesia adalah jenis jamur tiram putih. Hal ini dikarenakan jamur ini memiliki peluang bisnis yang besar yang ditandai dengan meningkatnya permintaan 10 tahun terakhir.<sup>61</sup>

Dari segi kandungan gizi, jamur tiram putih memiliki kandungan gizi yang lengkap untuk menunjang kebutuhan pangan manusia. Sekitar (10-30 %) protein nabati yang cukup tinggi dikandung oleh jamur tiram ini. Jamur ini juga mengandung asam amino esensial yang tinggi dibanding dengan jenis sayuran lainnya. Jamur tiram putih mengandung air 73,7-90,8 %, protein 10,5-30,4 %, karbohidrat 57,6-81,8 %, lemak 1,6-2,2 %. Selain itu, jamur tiram putih juga mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti zat besi (Fe), fosfor (P), kalium (K), zinc (Zn), natrium (Na) dan kalsium (Ca).<sup>62</sup>

#### **4. Syarat Tumbuh Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*)**

Jamur dapat tumbuh optimal pada lingkungan dataran tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelembaban yang tinggi yang tak lain menjadi lingkungan alami jamur itu sendiri sehingga pertumbuhan miselium dapat berjalan dengan

---

<sup>60</sup> Mufarrihah, Lailaatul. “Pengaruh Penambahan Bekatul dan Ampas Tahu Pada Media Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)”. Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) : Malang, (Oktober, 2010).

<sup>61</sup> Chazali, S. dan P.S. Pratiwi. *Usaha Jamur Tiram Skala Rumah Tangga* (Jakarta: Penebar Swadaya 2009) h.8.

<sup>62</sup> Priyadi, Triono Untung. *Bisnis Jamur Tiram*. (Jakarta: AgroMedia Pustaka 2013) h. 9.

optimal. Walaupun demikian, budidaya jamur tiram biasa juga dilakukan di dataran rendah dengan catatan tempat pemeliharaannya hampir mirip dengan habitat aslinya dan juga dari segi perawatan harus lebih optimal. Perawatan yang ekstra harus dilakukan agar faktor-faktor penghambat lainnya dapat diminimalisir dan juga harus steril.<sup>63</sup>

Agar jamur dapat tumbuh secara optimal syarat utamanya meliputi beberapa parameter contohnya: temperatur, waktu, kelembaban relatif, kandungan CO<sub>2</sub>, serta cahaya. Beberapa faktor lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap proses tumbuh jamur tiram putih, contohnya:

1. Saat pertumbuhan miselia pada substrak tanaman
2. Terhadap pembentukan bakal kuncup jamur
3. Terhadap pembentukan tubuh buah
4. Terhadap siklus panen.<sup>64</sup>

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur Tiram**

### **a. Temperatur**

Jamur dapat tumbuh pada kisaran temperatur yang lebih luas. Kebanyakan jamur tumbuh antara temperatur 0-35°C dengan suhu optimum untuk spesies saprofit 22-30°C. Diupayakan temperatur lingkungan sekitar tumbuh jamur selalu dalam keadaan stabil, supaya pertumbuhan dan perkembangan tidak terganggu. Untuk menjaga suhu agar tetap stabil jika suhu kumbung mulai panas, maka dapat dilakukan penyemprotan menggunakan air bersih hingga suhu kumbung menjadi

---

<sup>63</sup> Chazali, S. dan P.S. Pratiwi. 2009. *Usaha Jamur Tiram Skala Rumah Tangga*. Penebar Swadaya, Jakarta. h.6.

<sup>64</sup> Suriawiria, U. *Budidaya Jamur Tiram* (Yogyakarta: Kanisius 2002) h.17.

sejuk kembali.

**b. Kelembaban**

Kelembapan udara berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram cepat atau lambat, sehat atau tidak sehatnya pertumbuhannya. Kelembaban yang bagus yaitu: berkisar 21-28°C. Kelembaban memegang peranan penting sehingga perlu diperhatikan kelembaban yang kurang memenuhi syarat dapat diperbaiki dengan menggunakan cara lain seperti untuk daerah panas ditempatkan pada lingkungan pepohonan besar, log, atau polibag selalu disiram.

**c. Derajat Keasaman (pH)**

Media yang terlalu asam atau basa dapat menyebabkan pertumbuhan miselium dan tubuh buah terhambat. Pertumbuhan miselium dan tumbuh buah jamur yang ideal pada pH maksimum 4 sampai 6. Bila pH di atas 6,0 pertumbuhannya kurang baik.

**d. Cahaya**

Jamur tidak membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, namun demikian cahaya penting untuk merangsang sporulasi dan juga berguna dalam pemencaran spora karena organ-organ yang menghasilkan spora bersifat fototrofik dan memencarkan sporanya ke arah cahaya.

**e. Kadar air**

Kandungan air dalam media pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium maupun perkembangan tubuh buah. Jamur tiram memerlukan kandungan air tidak lebih dari 70%

#### **f. Kebutuhan nutrisi jamur**

Seperti halnya tumbuhan lain jamur tiram juga memerlukan nutrisi dalam bentuk unsur hara seperti karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Besi(Fe) dan Seng (Zn). Dalam media tanam, unsur tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tersebut. Jamur tidak dapat menggunakan energi matahari seperti tanaman berklorofil untuk proses biologi tetapi menghasilkan sejumlah enzim ekstra yang dapat mendegradasi senyawa yang dapat larut dan kemudian diserap oleh jamur. Untuk nutrisi, unsur utama yang digunakan untuk budidaya adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. Ukuran molekul nutrien bagi jamur harus cukup kecil sehingga mampu untuk melewati dinding sel dan membran. Oleh karena itu jamur harus terlebih dahulu merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil untuk dapat diabsorpsi. Perombakan molekul ini dilakukan dengan mengeluarkan enzim ekstraseluler. Pada umumnya jamur mensekresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan untuk mengurai substrat yang kompleks agar memperoleh nutrien-nutrien yang diperlukannya. Transportasi nutrien ke dalam sel jamur dapat berlangsung melalui beberapa cara, antara lain melalui transportasi aktif. Adanya pertumbuhan oleh jamur pada suatu substrat dapat diketahui karena proses metabolisme jamur menyebabkan perubahan pada substrat antara lain timbulnya perubahan warna pada substrat.

#### **g. Media Tumbuh Jamur Tiram Putih**

Ketepatan dalam membuat suatu komposisi media tanam jamur tiram merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh jamur, dengan komposisi yang tepat akan diperoleh produksi yang maksimal. Media jamur

tiram yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang, seluruh kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi di dalam media, sehingga diperlukan suatu komposisi media yang tepat untuk mendapatkan suatu pertumbuhan jamur tiram yang optimal. Supaya dapat menghasilkan pertumbuhan miselium yang baik, media tumbuh harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Diantara yang harus dipenuhi adalah media tumbuh harus mengandung di dalamnya unsur C (Karbon) dalam bentuk karbohidrat dalam jumlah atau kadar yang tinggi, N (nitrogen) dalam bentuk ammonium N-organik. Semua unsur tersebut akan diubah menjadi protein. Ca dibutuhkan pada media tumbuh dalam hal menetralkan asam oxalat yang dikeluarkan oleh miselium agar tidak menjadi penghambat pertumbuhan miselium.<sup>65</sup>

#### **h. Bibit Jamur Tiram Putih**

Bibit merupakan salah satu penentu keberhasilan budidaya jamur tiram putih. Budidaya jamur tiram putih sebenarnya telah dimulai sejak memilih bibit jamur yang baik, karena bibit merupakan obyek utama yang akan dikembangkan dalam proses budidaya selanjutnya. Selain itu, bibit juga merupakan pembawa gen dari induknya yang menentukan sifat tanaman setelah berproduksi. Oleh karena itu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat tertentu dapat diperoleh dengan memilih bibit yang berasal dari induk yang memiliki sifat tersebut.<sup>66</sup> Untuk mendapatkan hasil jamur yang baik dan menguntungkan maka faktor penentu utama

---

<sup>65</sup> Siti Zubaidah dkk., “ Peningkatan Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) melalui variasi komposisi media tanam” Jurnal Agripeat, vol.14 no.2, (September 2013), h. 95-102. [https://www.researchgate.net/publication/325263208\\_PENINGKATAN\\_PERTUMBUHAN\\_DAN\\_HASIL\\_JAMUR\\_TIRAM\\_Pleurotus\\_Ostreatus\\_MELALUI\\_VARIASI\\_KOMPOSISI\\_MEDIA\\_TANAM\\_Increase\\_Growth\\_and\\_Yield\\_Oyster\\_Mushroom\\_Pleurotus\\_ostreatus\\_with\\_Various\\_Composition\\_of\\_Growing\\_](https://www.researchgate.net/publication/325263208_PENINGKATAN_PERTUMBUHAN_DAN_HASIL_JAMUR_TIRAM_Pleurotus_Ostreatus_MELALUI_VARIASI_KOMPOSISI_MEDIA_TANAM_Increase_Growth_and_Yield_Oyster_Mushroom_Pleurotus_ostreatus_with_Various_Composition_of_Growing_). (Diakses 22 Desember 2019).

<sup>66</sup> Setiawan, A.I., *Kiat Memilih Bibit Tanaman Buah* (Penebar Swadaya. Jakarta, 1999) h.68.

adalah bibit. Mengingat hal tersebut maka pembuatan bibit jamur tiram, baik bibit induk maupun bibit siap tanam, selama ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman. Kualitas bibit jamur dipengaruhi oleh sejumlah faktor di antaranya media bibit, umur bibit, dan penyimpanan bibit. Media bibit sangat berpengaruh pada kualitas bibit, karena di dalam media tersedia nutrisi untuk pertumbuhan miselium jamur. Kualitas bibit merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya jamur tiram putih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jamur tiram putih adalah : bibit berasal dari strain atau varietas unggul, umur bibit optimal 45 - 60 hari, warna bibit merata, bibit tidak terkontaminasi, dan tubuh buah jamur belum tumbuh.<sup>67</sup>

Tahapan pembuatan bibit jamur pada umumnya dikenal dengan pembuatan biakan mumi (F0), yaitu hasil isolasi tubuh buah jamur yang diinokulasikan pada medium padat (agar) dengan nutrisi sintetis maupun semi-sintetis. Miselium tersebut kemudian dikembangkan ke tahap selanjutnya yaitu menjadi (F1) dengan memindahkan miselium jamur dari medium padat ke medium alami (umumnya sereal) yang kaya nutrisi dan digunakan sebagai bibit induk. Pembibitan jamur tiram terdiri dari tiga tahapan yang berurutan, biakan murni (F0), bibit induk atau bibit starter (F1), dan bibit semai (F2). Bibit jamur tiram dan jamur merang diambil dari miselium yang berasal dari biakan murni atau F0 media PDA yang akan diinokulasikan pada media bibit F1. Bibit jamur tiram yang paling bagus untuk dibuatkan ke baglog adalah F1, karena miseliumnya masih sangat kuat sekali,

---

<sup>67</sup> Putra Utama dkk, "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". *Jurnal Agroekoteknologi*, vol. 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Agustus 2019).

sehingga nantinya jamur tiram yang tumbuh pada baglog bisa lebih banyak, akan tetapi jika membuat baglog menggunakan bibit jamur tiram F1, maka ongkos produksinya terhitung jauh lebih besar bila memakai F2 atau F3, namun hasil dari bibit F1 akan lebih bagus baik dari segi kuantitas dan kualitas. Bibit mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pendapatan petani jamur tiram putih sebesar 8,42% yang berarti bibit mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan dalam budidaya jamur tiram putih. Bibit jamur yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya jamur. Bila bibit yang digunakan telah kadaluwarsa atau bibit jenis yang tidak baik, maka dapat dipastikan hasilnya tidak akan maksimal.<sup>68</sup>

### **C. Serbuk Jagung**

Jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Hal itu karena tanaman ini memiliki nilai gizi yang tinggi yang merupakan sumber karbohidrat dan protein. Hal tersebut mengakibatkan jagung biasanya digunakan sebagai pengganti nasi sebagai makanan pokok.<sup>69</sup>

Kedudukan taksonomi jagung adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)

Class : Angiosperm

Ordo : Graminales

Famili : Gramineae

<sup>68</sup> Piryadi, Triyono Untung. *Bisnis Jamur Tiram* (Jakarta: AgroMedia Pustaka 2013), h.26.

<sup>69</sup> Lana E dkk. Chemical and Nutritional Composition of Local Corn Var, Manado Kuning\* as Rice Substitute )” *Jurnal Teknologi Pertanian*. vol. 8 no. 1 (2017), h.14.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/teta/article/view/16351>. (Diakses 26 Desember 2019).

Genus : Zea L.

Spesies : Zea mays L.<sup>70</sup>

Secara struktural, biji jagung yang telah matang terdiri atas empat bagian utama, yaitu perikarp, lembaga, endosperm, dan tip kap. Perikarp merupakan lapisan pembungkus biji yang berubah cepat selama proses pembentukan biji. Pada waktu kariopsis masih muda, sel-selnya kecil dan tipis, tetapi sel-sel itu berkembang seiring dengan bertambahnya umur biji. Pada taraf tertentu lapisan ini membentuk membran yang dikenal sebagai kulit biji atau testa/aleuron yang secara morfologi adalah bagian endosperm. Bobot lapisan aleuron sekitar 3% dari keseluruhan biji.<sup>71</sup>

Pembudidayaan jamur tiram memerlukan adanya media tumbuh sebagai wadah jamur yang erat kaitannya dengan aktifitas hidup dan sebagai sumber nutrisi bagi jamur. Nurmala mengatakan bahwa, jagung ini bisa digunakan pada media tumbuh F1 jamur tiram karena memiliki kandungan berupa karbohidrat (68,0%), protein (10%), lemak (5,0%), serat (2,0%), kandungan lain (11%). Komponen karbohidrat lain adalah gula sederhana, yaitu glukosa, sukrosa dan fruktosa, 1-3% dari bobot biji. Serbuk jagung mengandung gula yang akan menjadi sumber karbon bagi jamur. Dengan kandungan tersebut menjadikan serbuk jagung dapat dijadikan sebagai media tumbuh yang ideal untuk F1 jamur tiram.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Astawan, M. *Tetap Sehat Dengan Prodk Mkanan Olahan*. (Solo: Tiga serangkai 2004) h.15.

<sup>71</sup> Inglett, G. E. Kernel, Structure, *Composition and Quality*. Ed. *Corn: Culture. Processing and Products*. (Avi Publishing Company, Westport, 1987) h.12.

<sup>72</sup> Nurmala, Tati. *Serealia Sumber Karbohidrat Utama*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998)., h. 93.

#### **D. Kerangka Pikir**

Jamur tiram hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan yang dihasilkan oleh organisme lain. Oleh karena itu media tanam jamur bukanlah tanah. Dalam pertumbuhannya, jamur memerlukan selulosa, glukosa, lignin, protein dan senyawa pati. Selain unsur tersebut jamur juga memerlukan elemen non logam seperti karbon, nitrogen, hidrogen dan oksigen yang digunakan untuk membentuk dinding sel jamur, dan semua elemen tersebut memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan metabolisme di protoplasma. Media tanam dasar yang sering digunakan untuk jamur tiram adalah biji jagung. Di tempat seperti itulah terkandung selulosa, glukosa, lignin, protein dan senyawa pati yang merupakan bahan makanan bagi jamur. Namun penggunaan biji jagung masih dikatakan kurang efektif dalam hal kecepatan pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*). Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dalam pembuatan bibit F1 dapat menggunakan serbuk jagung dengan menambahkannya pada media tanam utama biji jagung agar proses pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram semakin meningkat.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dirancang melalui suatu proses percobaan yang tujuannya untuk mengumpulkan data yang akan dibutuhkan dalam hal menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.<sup>73</sup> Pengaplikasian metode ini dapat diartikan bahwa metode ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen murni yang bertujuan untuk membuktikan respons subjek yang diteliti dari pengaruh perlakuan yang telah diberikan yang dalam hal ini peneliti ingin membuktikan respon pertumbuhan miselium F1 jamur dengan adanya perlakuan berupa serbuk jagung yang ditambahkan pada media tanam dengan berbagai konsentrasi.

Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Alauddin Makassar tepatnya di Laboratorium Basah Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

---

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Cet. 23; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 14.

<sup>74</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. 8; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.110.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang bersifat *pre-determined*, analisis data statistik serta interpretasi data statistik. Pendekatan ini akan menuntun peneliti untuk menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut.<sup>75</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah diajukan kemudian dianalisis secara statistik serta diinterpretasi pula secara statistik yang dalam hal ini untuk menguji pengaruh penambahan serbuk jagung terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram.

### ***C. Desain Penelitian***

Desain penelitian eksperimen sungguhan adalah desain yang digunakan dalam penelitian ini. Desain ini memiliki karakter berupa upaya untuk mengungkap hubungan sebab akibat antar variabel dengan melibatkan variabel kontrol sebagai pembanding disamping kelompok yang akan dieksperimenkan. Dalam pemilihan kedua kelompok tersebut, peneliti memilihnya dengan menggunakan teknik acak. Pada rancangan ini, kita memperoleh keragaman data yang diamati hanya melalui perlakuan dan galat. Untuk kondisi lingkungan, media, alat dan bahan yang homogen dapat dicapai dengan memakai ruang-ruang yang dapat dikontrol misalnya dalam

---

<sup>75</sup> Creswell, J. W. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010) h.66.

laboratorium maupun pada unit-unit percobaan lainnya. Dengan kondisi tersebut maka rancangan yang cocok digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).<sup>76</sup>

Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh 12 unit botol percobaan. Perlakuan yang diberikan dengan berbagai konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Perlakuan media tanam dengan berbagai macam konsentrasi

No	Kode	Perlakuan	Konsentrasi
1	P0	Kontrol	0%
2	P1	Serbuk Jagung	25%
3	P2	Serbuk Jagung	50%
4	P3	Serbuk Jagung	100%

Tabel 3.1 menunjukkan konsentrasi berbagai perlakuan serbuk jagung yang akan ditambahkan pada komposisi media tanam dasar F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam penggunaannya memiliki beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah pengacakan. Pengacakan adalah suatu proses yang membuat hukum-hukum peluang dapat diterapkan sehingga analisis data menjadi sah. Melalui pengacakan setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima suatu perlakuan. Pengacakan dapat dikerjakan dengan cara undian (lotere), software maupun menggunakan tabel angka acak.<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Muh. Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 88.

<sup>77</sup> Vincent Gaspersz, *Metode Perancangan Percobaan*, (Bandung: CV. Armico, 1991), h.33.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan pengacakan untuk menghindarkan dari subyektivitas, karena dalam penelitian ilmiah diperlukan logika dan obyektivitas.

Melalui prosedur pengacakan maka dapat dilihat denah lapangan dari rancangan acak lengkap pada gambar 3.1

1 P <sub>3</sub>	2 P <sub>0</sub>	3 P <sub>0</sub>	4 P <sub>2</sub>
5 P <sub>1</sub>	6 P <sub>3</sub>	7 P <sub>2</sub>	8 P <sub>2</sub>
9 P <sub>3</sub>	10 P <sub>0</sub>	11 P <sub>1</sub>	12 P <sub>1</sub>

**Gambar 3.1:** Denah lapangan Rancangan Acak Lengkap (RAL) penelitian: P (Kode perlakuan); Angka (Nomor deret)

### C. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan. Parameter pengamatan meliputi:

1. Persentase pertumbuhan miselium (%)

Pencatatan hasil pengamatan dilakukan pada minggu minggu pertama (hari ke-6), minggu kedua (hari ke-12) dan minggu ketiga (hari ke-18) dengan rumus: Persentase pertumbuhan miselium =  $\frac{\text{Tinggi miselium yang tumbuh (cm)}}{\text{Tinggi media tumbuh (cm)}} \times 100 \%$

2. Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)

Pencatatan hasil pengamatan dilakukan setelah miselium memenuhi media tanam/*full colony* dengan menghitung lama pertumbuhan dalam satuan Hari Setelah Inokulasi (HSI).

#### ***D. Instrumen Penelitian***

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spatula, botol media, timbangan, lampu spirtus, autoklaf, inkubator, mistar, sprayer, karet pengikat, kapas, kertas penutup botol dan kompor.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit F0 Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), biji jagung kuning, serbuk jagung, air dan alkohol konsentrasi 70 %.

#### ***E. Prosedur Kerja***

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan untuk masing-masing media tanam, sehingga terdapat 12 botol perlakuan, sebagai berikut:

P0 = Biji jagung 100 % + serbuk jagung 0 % (Kontrol)

P1 = Biji jagung 75 % + serbuk jagung 25%

P2 = Biji jagung 50 % + serbuk jagung 50 %

P3 = Biji jagung 0 % + serbuk jagung 100 %

1. Biji jagung kuning sebagai media utama direndam di dalam air dan dibuang kotoran dan biji yang mengapung kemudian ditambahkan kapur 2% pada air rendaman lalu direndam selama 24 jam. Untuk suplemen serbuk jagung juga dilakukan perendaman selama 24 jam.

2. Biji jagung dan suplemen serbuk jagung ditiriskan lalu dimasak dengan air sampai biji merekah pada satu titik (direbus  $\frac{1}{2}$  matang). Biji yang sudah dimasak ditiriskan. Untuk serbuk jagung hanya dimasak beberapa menit saja karena struktur serbuk jagung yang sudah lunak. Selanjutnya ditiriskan dan didiamkan selama 24 jam.
3. Media dicampur sesuai dengan perlakuan yang ditentukan.
4. Media bibit yang telah tercampur dimasukkan dalam botol media sesuai dengan denah pengacakan dengan tinggi media 13 cm. Botol ditutup dengan kapas dan ditutupi lagi dengan kertas lalu diikat dengan karet.
5. Media disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat dalam waktu 60 menit. Media didinginkan selama 12 jam dengan posisi botol dibalik. Alasannya botol dibalik adalah agar air dalam botol keluar dan diserap oleh kapas penutup sehingga media tidak terlalu basah saat setelah dilakukan sterilisasi. Media yang kadar airnya tinggi memungkinkan tumbuhnya organisme lain atau jamur kompetitor yang tidak diinginkan.
6. Alat inokulasi (*Spatula*) disterilkan dengan menggunakan alkohol dan dilakukan pembakaran dengan lampu spiritus.
7. F0 diambil dengan alat inokulasi (*Spatula*) dan dimasukkan ke dalam media bibit.
8. Media bibit dalam botol ditutup rapat dengan kapas dan diikat dengan karet.
9. Media bibit diinkubasikan pada suhu  $\pm 28$  derajat sampai seluruh media penuh dengan miselium.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Tahap ini merupakan tahap untuk mengolah hasil pengumpulan data pada percobaan yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan software statistik SPSS 17.0 dengan Uji Oneway ANOVA taraf kepercayaan 5% dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% untuk mengetahui perbandingan pengaruh penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh pada pengamatan ini merupakan hasil pengukuran persentase pertumbuhan dan waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*). Adapun hasil pengukurannya, sebagai berikut:

##### 1. Persentase pertumbuhan miselium

###### a. Rerata persentase pertumbuhan miselium

Hasil pengukuran persentase pertumbuhan miselium dapat dilihat pada tabel berikut:

###### 1. Persentase pertumbuhan miselium minggu pertama (hari ke-6)

**Tabel 4.1.** Rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu pertama (hari ke-6).


Perlakuan (P)	Ulangan			Rerata Persentase (%)	NP BNT 0,05
	I	II	III		
	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)		
P0	23,84	25,38	24,61	24,61 <sup>a</sup>	1,1837
P1	26,15	25,38	26,15	25,89 <sup>bc</sup>	
P2	26,92	26,15	26,92	26,66 <sup>c</sup>	
P3	26,15	24,61	25,38	25,38 <sup>ab</sup>	
F Tabel (5%) = 4,07					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 0,05 uji BNT.

Tabel 4.1 menunjukkan rerata persentase pertumbuhan miselium setiap perlakuan dimana dapat dilihat rerata pertumbuhan tertinggi terdapat pada P2 dengan

rata-rata 26,66% dan perlakuan paling rendah terdapat pada P0 dengan rata-rata 24,61%. Dari hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung  $5,667 > F$  Tabel dengan signifikansi  $0,022 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf kepercayaan 5%.

Perbandingan persentase pertumbuhan miselium minggu pertama (hari ke-6) dapat dilihat pada gambar 4.1



**Gambar 4.1.** Rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu pertama (hari ke-6): P0 (Serbuk jagung 0%); P1 (Serbuk jagung 25%); P2 (Serbuk jagung 50%); P3 (Serbuk jagung 100%)

Gambar di atas merupakan hasil analisis data yang menunjukkan perbandingan rerata persentase antar perlakuan penambahan serbuk jagung dengan berbagai konsentrasi.

2. Persentase pertumbuhan miselium minggu kedua (hari ke-12)


**Tabel 4.2.** Rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu kedua

Perlakuan (P)	Ulangan			Rerata Persentase (%)	NP BNT 0,05
	I	II	III		
	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)		
P0	61,53	60,76	74,61	65,63 <sup>b</sup>	10,9620
P1	67,69	73,84	80	73,84 <sup>b</sup>	
P2	70,76	71,53	78,46	73,58 <sup>b</sup>	
P3	57,69	49,23	51,53	52,81 <sup>a</sup>	
F Tabel 5% = 4,07					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 0,05 uji BNT.

Tabel 4.2 merupakan rerata persentase pertumbuhan miselium setiap perlakuan dimana dapat dilihat rerata pertumbuhan tertinggi terdapat pada P1 dengan rata-rata 73,84% dan perlakuan paling rendah terdapat pada P3 dengan rata-rata 52,81%. Dari hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung  $13,149 > F$  Tabel dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf kepercayaan 5%.

Perbandingan rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu kedua (hari ke-12) dapat dilihat pada gambar 4.2



**Gambar 4.2.** Perbandingan Rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu kedua (hari ke-12): P0 (Serbuk jagung 0%); P1 (Serbuk jagung 25%); P2 (Serbuk jagung 50%); P3 (Serbuk jagung 100%)

Gambar di atas merupakan hasil analisis data yang menunjukkan perbandingan rerata persentase antar perlakuan penambahan serbuk jagung dengan berbagai konsentrasi.

### 3. Persentase pertumbuhan miselium minggu ketiga (hari ke-18)


**Tabel 4.3.** Rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu ketiga (hari ke-18).

Perlakuan (P)	Ulangan			Rerata Persentase (%)	NP BNT 0,05
	I	II	III		
	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)		
P0	80,76	88,46	86,15	85,12 <sup>b</sup>	5,7193
P1	94,61	96,15	96,92	95,89 <sup>c</sup>	
P2	100	98,46	100	99,48 <sup>c</sup>	
P3	81,53	73,07	75,38	76,66 <sup>a</sup>	
F Tabel (5%) : 4,07					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 0,05 uji BNT.

Tabel 4.3 merupakan rerata persentase pertumbuhan miselium setiap perlakuan dimana dapat dilihat rerata pertumbuhan tertinggi terdapat pada P2 dengan rata-rata 99,48% dan perlakuan paling rendah terdapat pada P3 dengan rata-rata 76,8%. Dari hasil uji Anova menunjukkan nilai F hitung  $35.238 > F$  Tabel dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf kepercayaan 5%

Perbandingan persentase pertumbuhan minggu ketiga (hari ke-18) dapat dilihat pada gambar 4.3



**Gambar 4.3.** Perbandingan rerata persentase pertumbuhan miselium pada minggu ketiga (hari ke-18): P0 (Serbuk jagung 0%); P1 (Serbuk jagung 25%); P2 (Serbuk jagung 50%); P3 (Serbuk jagung 100%).

Gambar di atas merupakan hasil analisis data yang menunjukkan perbandingan rerata persentase antar perlakuan penambahan serbuk jagung dengan berbagai konsentrasi.

## 2. Waktu penyebaran miselium pada media tanam/*full colony*

Hasil pengamatan waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 4.4.** Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)

Perlakuan (P)	Ulangan			Rerata HSI	NP BNT 0,05
	I	II	III		
	HSI	HSI	HSI		
P0	20	20	21	20,33 <sup>b</sup>	1,6305
P1	19	19	20	19,33 <sup>b</sup>	
P2	18	17	16	17,00 <sup>a</sup>	
P3	23	25	25	24,33 <sup>c</sup>	
F Tabel (5%) = 4,07					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 0,05 uji BNT.

Tabel 4.10 merupakan rerata waktu penyebaran miselium setiap perlakuan dimana dapat dilihat rerata waktu penyebaran tercepat terdapat pada P2 dengan rata-rata 17.00 dan perlakuan paling lambat terdapat pada P3 dengan rata-rata 24,33. Dari hasil uji Anova menunjukkan nilai F hitung  $37,444 > F$  Tabel dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf kepercayaan 5%.

Perbandingan waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dapat dilihat pada gambar 4.5



**Gambar 4.5.** Perbandingan waktu penyebaran miselium pada media tanam/*full colony* F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*): P0 (Serbuk jagung 0%); P1 (Serbuk jagung 25%); P2 (Serbuk jagung 50%); P3 (Serbuk jagung 100%).

Gambar di atas merupakan hasil analisis data yang menunjukkan perbandingan rerata waktu penyebaran miselium antar perlakuan penambahan serbuk jagung dengan berbagai konsentrasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Persentase pertumbuhan miselium**

Tingkat persentase pertumbuhan miselium pada minggu ke-1 yang diperoleh dari perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 25 persen menghasilkan rata-rata 25,89 persen, lebih rendah dari hasil rata-rata persentase yang dihasilkan pada penambahan serbuk jagung konsentrasi 50 persen yakni sebesar 26,66 persen. Demikian juga halnya dengan perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 100 persen yang menghasilkan rata-rata persentase pertumbuhan 25,38 persen yang hasilnya lebih rendah dari pemberian perlakuan penambahan serbuk jagung pada

konsentrasi 25 persen dan juga 50 persen. Perlakuan dengan konsentrasi 50 persen memberikan nilai persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain dan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan adanya penambahan atau suplementasi pada komposisi media tanam yang berpengaruh pada pertumbuhan miselium. Muh Syawal dkk menjelaskan bahwa suplementasi substrat sangat penting dalam rangka meningkatkan produksi jamur tiram putih dan mendapatkan hasil yang lebih baik.<sup>78</sup> Serbuk jagung yang ditambahkan pada media tanam memiliki pengaruh pada proses penyerapan nutrisi yang lebih cepat mengingat struktur serbuk jagung yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh miselium yang dapat membantu kinerja enzim ekstraseluler dalam perombakan bahan organik yang akan diserap ke dalam dinding sel miselium. Darnetty menjelaskan bahwa ukuran molekul makanan harus lebih kecil sehingga makanan mampu melewati dinding sel dan membran sel dimana miselium harus merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil menggunakan enzim ekstraseluler untuk dapat diabsorpsi.<sup>79</sup> Secara umum, semua bahan yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh bibit jamur untuk pertumbuhan, tetapi memerlukan waktu yang berbeda. Bahan yang berbentuk serbuk paling cepat digunakan karena ukuran bahan yang lebih kecil dan teksturnya yang lebih sederhana sehingga miselium lebih mudah menyerap nutrient dan lebih cepat tumbuh.<sup>80</sup> Untuk

---

<sup>78</sup> Muh. Syawal dkk., “Pengaruh Komposisi Dedak dan Tepung Jagung pada Bahan Media Serbuk Gergaji terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Agrotekbis*, vol. 6, no.3 (2018), h. 321-328. [http://rndjournals.com/uploads/documents/file\\_186\\_57.pdf](http://rndjournals.com/uploads/documents/file_186_57.pdf). (Diakses 2 September 2019).

<sup>79</sup> Darnetty, *Pengantar Mikologi* (Padang: Andalas Universitas Press, 2006). h.45

<sup>80</sup> Ika dkk. “Seed Production Media Formulations F2 White Oyster Mushroom” *Jurnal Biosite*, vol. 3 no. 1 (Mei 2016), h. 12 – 18. 4412-Article%20Text-8847-1-10-20180112%20(3).pdf. (Diakses 22 Juni 2020).

pertumbuhan tercepat kedua yakni ada pada perlakuan konsentrasi 25 persen. Hal ini karena senyawa yang ada pada media lebih sulit didegradasi dibanding perlakuan konsentrasi 50 persen. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sutarman bahwasanya kulit biji jagung mengandung selulosa kompleks sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dapat digunakan oleh bibit jamur.<sup>81</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Estrada dkk juga menjelaskan bahwa suplementasi substrat sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan produksi jamur tiram.<sup>82</sup> Namun, berbeda dengan perlakuan penambahan serbuk jagung pada konsentrasi 100 persen yang justru memberikan hasil rata-rata pertumbuhan yang paling rendah jika dibandingkan dengan konsentrasi 25 persen, 50 persen dan perlakuan kontrol. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat kepadatan media yang tinggi yang justru menghambat perambatan miselium. Tingkat kepadatan media sangat berpengaruh pada pertumbuhan miselium, tanpa tersedianya ruang-ruang perputaran oksigen maka akan tetap menghambat perambatan miselium. Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah menjelaskan bahwa kepadatan media mengakibatkan aerasi yang ada pada media menjadi buruk, sehingga pertumbuhan miselium terhambat. Oksigen dan karbon dioksida sangat diperlukan sebagai senyawa pada pertumbuhannya.<sup>83</sup> Selain itu, menurut Fanadzo dkk.

---

<sup>81</sup> Sutarman. "Kergaman dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) pada Media Serbuk Ger gaji dan Ampas Tebu Bersuplemen Dedak dan Tepung Jagung" *Jurnal PenelitianPertanian Terapan*, vol. 12 no.3 (2012) h. 13.<https://jurnal.Polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/21rf2>. (Diakses 22 Juni 2020).

<sup>82</sup> Carvalho dkk. "Mushrooms of the *Pleurotus* Genus: A review of cultivation techniques". *Journal Interciencia*, vol. 35 no. 3 (2010), <https://www.redalyc.org/pdf/339/33913157005.pdf>. (Diakses 22 September 2020).

<sup>83</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).

penambahan suplemen diperlukan dalam jumlah yang sedang untuk menghindari turunnya kualitas maupun kuantitas pertumbuhan jamur tiram.<sup>84</sup> Berdasarkan hal tersebut, penambahan serbuk jagung pada tingkat konsentrasi tertentu dapat mensuplai nutrient dengan efektif namun penggunaan serbuk jagung dengan konsentrasi 100 persen justru akan menghambat perambatan miselium karena berdampak buruk pada aerasi media yang digunakan.

Persentase pertumbuhan miselium pada minggu ke-2 yang dihasilkan pada perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 25 persen menghasilkan rata-rata 73,84 persen, lebih tinggi dari hasil rata-rata persentase yang dihasilkan pada penambahan serbuk jagung konsentrasi 50 persen sebesar 73,58 persen. Demikian juga halnya dengan perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 100 persen yang menghasilkan rata-rata 52,81 persen yang hasilnya lebih rendah dari konsentrasi 25 persen, 50 persen dan juga kontrol. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa ukuran molekul makanan harus lebih kecil sehingga makanan mampu melewati dinding sel dan membran sel dimana miselium harus merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil menggunakan enzim ekstraseluler untuk dapat diabsorpsi sehingga penambahan serbuk jagung pada berbagai konsentrasi memberikan efek pada pertumbuhan miselium. R. Naraian dkk menjelaskan bahwa suplementasi atau penambahan dilakukan pada media tanam bertujuan untuk efisiensi pertumbuhan

---

<sup>84</sup> M. Fanadzo dkk, "Evaluation of various substrates and supplements for biological efficiency of *Pleurotus sajor-caju* and *Pleurotus ostreatus*" *African Journal of Biotechnology* vol. 9 no. 19 ( mei 2010) h. 2756-2761. <http://www.academicjournals.org/AJB>. (Diakses 22 Agustus 2020).

miselium agar semakin cepat dalam proses metabolisme miselium.<sup>85</sup> Kadiri dan Fasidi menambahkan bahwa dengan melakukan suplementasi, maka dapat meningkatkan produksi jamur tiram.<sup>86</sup> Hasil yang diperoleh pada pengamatan minggu ke-2 ini juga menempatkan perlakuan 100 persen sebagai perlakuan yang memberikan nilai persentase paling rendah diantara semua perlakuan yang mempertegas penjelasan sebelumnya bahwa kepadatan media menjadi faktor kunci dalam perambatan miselium. Putra utama dkk menjelaskan bahwa porositas berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen untuk pertumbuhan jamur. Porositas media dipengaruhi oleh sifat bahan yang digunakan.<sup>87</sup> Selain itu, suplementasi yang terlalu tinggi dapat memperbesar peluang kontaminasi karena terlalu kaya akan nutrisi.<sup>88</sup>

Tingkat persentase pertumbuhan miselium yang dihasilkan minggu ke-3 pada perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 25 persen menghasilkan rata-rata 95,89 persen, lebih rendah dari hasil rata-rata persentase yang dihasilkan pada penambahan serbuk jagung konsentrasi 50 persen yakni sebesar 99,48 persen.

---

<sup>85</sup> R. Naraian dkk. "Influence of different nitrogen rich supplements during cultivation of *Pleurotus florida* on corn cob substrate." *Jurnal Environmentalist* Vol. 29, 2009 h. 1–7. <https://scihub.se/https://doi.org/10.1007/S10669-008-9174-4>. (Diakses 18 Agustus 2020).

<sup>86</sup> Isola Fasidi, O and Mukaila Kadi., "Use of agricultural wastes for the cultivation of in Nigeria" *Lentinus submidus* *Revista de Biologia Tropical*, vol, 41 no. 3 (1993), h. 411-415 [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_nlinks&pid=S01012061201600040059800017&lng=en](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S01012061201600040059800017&lng=en), (Diakses 22 Agustus 2020).

<sup>87</sup> Putra Utama dkk, "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". *Jurnal Agroekoteknologi*, vol. 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Juli 2020).

<sup>88</sup> S. Yildiz dkk. "Some lignocellulosic wastes used as raw material in cultivation of the *Pleurotus ostreatus* culture mushroom." *Journal Process Biochemistry*, vol. 38 no. 3 (2002), h. 301-106. [http://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592\(02\)00040-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592(02)00040-7). (Diakses 22 Agustus 2020).

Sementara pada perlakuan dengan konsentrasi 100 persen yang menghasilkan rata-rata 76,66 yang hasilnya lebih rendah dari perlakuan penambahan serbuk jagung pada konsentrasi 25 persen, 50 persen dan kontrol. Perlakuan dengan 50 persen memberikan nilai persentase yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Serbuk jagung mempunyai struktur yang sederhana sehingga lebih mudah didegradasi oleh enzim yang dihasilkan oleh jamur. Seperti penjelasan Darnetty sebelumnya bahwa ukuran molekul makanan harus lebih kecil sehingga makanan mampu melewati dinding sel dan membran sel dimana miselium harus merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil menggunakan enzim ekstraseluler untuk dapat diabsorpsi sehingga penambahan serbuk jagung pada berbagai konsentrasi memberikan efek pada pertumbuhan miselium.<sup>89</sup> Selain itu, ukuran media tambahan akan mempengaruhi aktifitas enzimatik, hal ini karena sebagian besar bahan yang dibutuhkan oleh miselium berada pada bagian dalam substrat sehingga ukuran yang lebih sederhana akan memudahkan enzim untuk mendegradasi nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur.<sup>90</sup> Kemudian untuk pertumbuhan tercepat kedua yakni ada pada perlakuan konsentrasi 25 persen. Hal ini karena senyawa yang ada pada media lebih sulit didegradasi dibanding perlakuan konsentrasi 50 persen. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sutarman bahwa kulit biji jagung mengandung selulosa kompleks sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dapat

---

<sup>89</sup> Darnetty. *Pengantar Mikologi*. (Padang: Andalas Universitas Press, 2006). h.45

<sup>90</sup> Isabel dkk. "Effect of substrate particle size and additional nitrogen source on production of lignocellulolytic enzymes by *Pleurotus ostreatus* strains" *Journal Bioresource Technology*. vol. 99 no. 16 (November 2016) h. 7846. <http://www.elsevier.com/copyright>. (Diakses 22 Agustus 2020).

digunakan oleh bibit jamur.<sup>91</sup> Perlakuan 100 persen sebagai perlakuan yang memberikan nilai persentase paling rendah diantara semua perlakuan yang mempertegas penjelasan sebelumnya bahwa kepadatan media menjadi faktor kunci dalam perambatan miselium. Hal ini dijelaskan oleh Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah bahwa tingkat kepadatan media sangat berpengaruh pada pertumbuhan miselium, tanpa tersedianya ruang-ruang perputaran oksigen maka akan tetap menghambat perambatan miselium. Kepadatan media mengakibatkan aerasi yang ada pada media menjadi buruk, sehingga pertumbuhan miselium terhambat. Oksigen dan karbon dioksida sangat diperlukan sebagai senyawa pada pertumbuhannya.<sup>92</sup> Selain itu, perlu diketahui bahwa kepadatan media dapat menaikkan suhu media yang justru akan berpeluang menghambat pertumbuhan miselium.<sup>93</sup> Berdasarkan hal tersebut, penambahan serbuk jagung pada tingkat konsentrasi tertentu dapat mensuplai nutrisi dengan efektif namun penggunaan serbuk jagung dengan konsentrasi 100 persen justru akan menghambat perambatan miselium karena berdampak buruk pada aerasi media yang digunakan. Dengan berbagai perbedaan rata-rata hasil persentase antar perlakuan dan setelah dianalisis statistik dengan uji anova, menunjukkan bahwa

---

<sup>91</sup> Sutarman, "Kergaman dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) pada Media Serbuk Ger gaji dan Ampas Tebu Bersuplemen Dedak dan Tepung Jagung" *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, vol. 12 no.3 (2012) h. 13. <https://jurnal.Polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/21rf2>. (Diakses 22 Juni 2020).

<sup>92</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).

<sup>93</sup> M. Fanadzo dkk, "Evaluation of various substrates and supplements for biological efficiency of *Pleurotus sajor-caju* and *Pleurotus ostreatus*" *African Journal of Biotechnology* vol. 9 no. 19 ( mei 2010) h. 2756-2761. <http://www.academicjournals.org/AJB>. (Diakses 22 Agustus 2020).

perbedaan tersebut signifikan ( $p = 0,002$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pada pertumbuhan miselium dengan penambahan serbuk jagung. Untuk melihat perbandingan perbedaan rata-rata antar perlakuan pada pertumbuhan miselium sekaligus mengetahui perlakuan mana yang lebih efektif, maka untuk hal tersebut penelitian ini dibuktikan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) minggu ke-1 setelah inokulasi terlihat pada tabel 4.1 rerata tertinggi untuk kecepatan pertumbuhan miselium pada P2 (26,66%) tetapi berbeda tidak nyata dengan P1 (25,89%) lalu berbeda nyata dengan P0 (24,61%) dan P3 (25,38%) kemudian pada minggu ke-2 terlihat pada tabel 4.2 rerata kecepatan tertinggi terdapat pada P1 (73,84%) tetapi berbeda tidak nyata dengan P0 (65,63%) dan P2 (73,58) lalu berbeda nyata dengan P3 (52,81%) dan pada minggu ke-3 terlihat pada tabel 4.3 rerata kecepatan pertumbuhan tertinggi terdapat pada P2 (99,48%) tetapi berbeda tidak nyata dengan P1 (95,89%) lalu berbeda nyata pada P0 (85,12%) dan P3 (76,66%). Berdasarkan hal tersebut, perlakuan penambahan serbuk jagung terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) yang memberikan nilai persentase pertumbuhan paling tinggi adalah perlakuan P2 (50%) dan perlakuan P3 (100%) memberikan nilai persentase pertumbuhan paling rendah. Putra Utama dkk menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan nutrisi dan tingkat porositas media yang berperan dalam proses pertumbuhan miselium. Porositas berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen untuk pertumbuhan

jamur. Porositas media dipengaruhi oleh sifat bahan yang digunakan.<sup>94</sup> Sejalan dengan itu, Ernest dkk menjelaskan bahwa proses metabolisme pada jamur menghasilkan gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), dimana aerasi dibutuhkan pada media agar gas karbon dioksida tidak terakumulasi. Aerasi dapat berlangsung dengan baik jika media tanam memiliki struktur yang lebih berongga.<sup>95</sup>

## 2. Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)

Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) diperoleh dari perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 25 persen menghasilkan rata-rata 19 hari, lebih lambat dari hasil rata-rata waktu yang dihasilkan pada penambahan serbuk jagung konsentrasi 50 persen yakni 17 hari. Demikian juga halnya dengan perlakuan penambahan serbuk jagung konsentrasi 100 persen yang menghasilkan rata-rata waktu pertumbuhan 24 hari yang hasilnya lebih lambat dari pemberian perlakuan penambahan serbuk jagung pada konsentrasi 25 persen dan juga 50 persen. Perlakuan dengan konsentrasi dan 50 persen memberikan waktu penyebaran miselium yang lebih cepat dibandingkan dengan dengan perlakuan kontrol. Perlakuan dengan konsentrasi 50 persen menjadi perlakuan dengan waktu pertumbuhan paling cepat jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan serbuk jagung yang ditambahkan pada komposisi media memiliki

---

<sup>94</sup> Putra Utama dkk, "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". *Jurnal Agroekoteknologi*, vol. 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Juli 2020).

<sup>95</sup> Ernest dkk. "Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) pada Media Campuran Serbuk Tongkol Jagung dan Ampas Tebu" *Jurnal LenteraBio* vol. 3 no. 3, (September 2014), h. 255–260. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio>. (Diakses 20 Juli 2020).

pengaruh pada proses penyerapan nutrisi yang lebih cepat mengingat struktur serbuk jagung yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh miselium yang dapat membantu kinerja enzim ekstraseluler dalam perombakan bahan organik yang akan diserap ke dalam dinding sel miselium. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya oleh Darnetty bahwa ukuran molekul makanan harus lebih kecil sehingga makanan mampu melewati dinding sel dan membran sel dimana miselium harus merombak molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil menggunakan enzim ekstraseluler untuk dapat diabsorpsi.<sup>96</sup> Demikian pula dengan Karem dan Hadar yang menyatakan bahwa miselium jamur tiram memecah selulosa menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang kemudian digunakan sebagai nutrient bagi pertumbuhan miselium jamur tiram.<sup>97</sup> Kemudian untuk pertumbuhan tercepat kedua yakni ada pada perlakuan konsentrasi 25 persen. Hal ini karena senyawa yang ada pada media lebih sulit didegradasi dibanding perlakuan konsentrasi 20 persen. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sutarman bahwa kulit biji jagung mengandung selulosa kompleks sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dapat digunakan oleh bibit jamur.<sup>98</sup> Namun, berbeda dengan perlakuan penambahan serbuk jagung pada konsentrasi 100 persen yang memberikan hasil rata-rata waktu pertumbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan konsentrasi 25 persen, 50 persen dan kontrol. Perbedaan

---

<sup>96</sup> Darnetty. *Pengantar Mikologi*. (Padang: Andalas Universitas Press, 2006). h.45

<sup>97</sup> Zohar Kerem dkk. *Lignin degrading fungi, Mechanism and utilization*. (New York: Marcel Dekker, Inc, 2014). h. 15.

<sup>98</sup> Sutarman. "Kergaman dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) pada Media Serbuk Ger gaji dan Ampas Tebu Bersuplemen Dedak dan Tepung Jagung" *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, vol. 12 no.3 (2012) h. 13. <https://jurnal. Polinela .ac.id/in dex.php/JPPT/article/view/21rf2>. (Diakses 22 Juni 2020).

tersebut disebabkan oleh tingkat kepadatan media yang tinggi sehingga menghambat perambatan miselium. Hal tersebut diakibatkan oleh tingkat kepadatan media sangat berpengaruh pada pertumbuhan miselium, tanpa tersedianya ruang-ruang perputaran oksigen maka akan tetap menghambat perambatan miselium. Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah mengatakan bahwa kepadatan media mengakibatkan aerasi yang ada pada media menjadi buruk, sehingga pertumbuhan miselium terhambat. Oksigen dan karbon dioksida sangat diperlukan sebagai senyawa pada pertumbuhannya.<sup>99</sup> Fredrick dkk menambahkan bahwa kepadatan media juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur dikarenakan sulitnya terhambatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam media. Kelembaban serta kadar air dalam media juga mempengaruhi pertumbuhan jamur.<sup>100</sup> Berdasarkan hal tersebut, penambahan serbuk jagung pada tingkat konsentrasi tertentu dapat mensuplai nutrient dengan efektif namun penggunaan serbuk jagung dengan konsentrasi 100 persen justru akan menghambat perambatan miselium karena berdampak buruk pada aerasi media yang digunakan. Dengan berbagai perbedaan rata-rata hasil persentase antar perlakuan dan setelah dianalisis statistik dengan uji anova, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut

---

<sup>99</sup> Nurul Istiqomah dan Siti Fatimah, "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014), h. 95-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Juli 2020).

<sup>100</sup> Frederick dkk "Pengaruh Intensitas Cahaya dan Kadar Sukrosa terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram di Tangerang" *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, vol. 13 no. 2 (Juli 2018) h.77. *Jurna l.untirta. a c.id*. (Diakses 22 Agustus 2020).

signifikan ( $p = 0,000$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pada pertumbuhan miselium dengan penambahan serbuk jagung. Untuk melihat perbandingan perbedaan rata-rata antar perlakuan pada pertumbuhan miselium sekaligus mengetahui perlakuan mana yang lebih efektif, maka untuk hal tersebut penelitian ini dibuktikan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI) terlihat pada tabel 4.2 rerata waktu penyebaran miselium tercepat Hari Setelah Inokulasi (HSI) terdapat pada perlakuan P2 (17 HSI) berbeda nyata dengan P0 (20 HSI), P1 (19 HSI) dan P3 (24 HSI). Berdasarkan hal tersebut, perlakuan penambahan serbuk jagung terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) yang memberikan waktu pertumbuhan paling cepat adalah perlakuan P2 (50%) dan perlakuan P3 (100%) memberikan nilai persentase pertumbuhan paling rendah. Hal ini karena tingkat kebutuhan nutrisi dan tingkat porositas media yang berperan dalam proses pertumbuhan miselium. Hal ini kembali dipertegas oleh Putra Utama bahwasanya porositas berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen untuk pertumbuhan jamur. Porositas media dipengaruhi oleh sifat bahan yang digunakan.<sup>101</sup> Selain itu, suplementasi yang terlalu tinggi justru akan

---

<sup>101</sup> Putra Utama dkk, "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". *Jurnal Agroekoteknologi*, vol. 5 no.1 (Juli 2013), h. 45 – 53. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Juli 2020).

menurunkan produksi jamur tiram sehingga hanya diperlukan dalam jumlah yang sedang.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> M. Fanadzo dkk, "Evaluation of various substrates and supplements for biological efficiency of *Pleurotus sajor-caju* and *Pleurotus ostreatus*" *African Journal of Biotechnology* vol. 9 no. 19 ( mei 2010) h. 2756-2761. <http://www.academicjournals.org/AJB>. (Diakses 22 Agustus 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pengaruh penambahan serbuk jagung terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok seperti berikut:

1. Ada pengaruh pada pertumbuhan miselium dengan penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam.
2. Konsentrasi penambahan serbuk jagung pada komposisi media tanam yang paling baik digunakan untuk pertumbuhan miselium adalah konsentrasi 50%.

#### B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Serbuk jagung dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai bahan tambahan pada komposisi media bibit F1 jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kombinasi serbuk jagung dengan media lain untuk pertumbuhan jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) guna mendapatkan komposisi yang ideal yang tahan terhadap kontaminan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan jumlah ulangan guna mendapatkan tingkat keterandalan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini Verena dkk. “Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) Sebagai Percontohan Dan Unit Usaha Budidaya Jamur (Uubj) di Universitas Cende rawasih”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, vol. 2, no. 1 (2018), <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpmmp/article/view/16160/pdf>. (Diakses 22 November 2019).
- Astawan, M. *Tetap Sehat Dengan Prodk Mkanan Olahlan*. Solo: Tiga serangkai 2004.
- Astuti, Hanum Kusuma dan Kuswytasari, Nengah Dwianita. “Efektifitas Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dengan Variasi Media Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan Sabut Kelapa (*Cocos nucifera*).” *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, vol. 2 no. 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/16040-ID-efektifitaspertumbuhan-jamur-tiram-putih-pleurotus-ostreatus-dengan-variasi-med.pdf>. (Diakses 14 November 2019).
- Campbell dkk. “Biologi” Jilid 2. Edisi Kelima. (Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Carlile dkk. *The Fungi*. Academic Press, London, 1994.
- Carvalho dkk. “Mushrooms of the *Pleurotus* Genus: A review of cultivation techniques”. *Journal Interiencia*, vol. 35 no. 3 (2010), <https://www.redalyc.org/pdf/339/33913157005.pdf>. (Diakses 22 September 2020).
- Claudia, Jessica dan Damanhuri. “Pengaruh Komposisi Media Pembibitan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Jenis Jamur Tiram (*Pleurotus spp.*)” . *Jurnal Produksi Tanaman* , vol. 7, no. 10 (Oktober2019).[http:// protan. Studentjour nal .ub.ac.id/ index.php/protan/article/view/1251/1268](http://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/1251/1268). (Diakses 20 Desember 2019).
- Creswell, J. W. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- D, Sasmitamihardja. *Dasar- dasar Fisiologi Tumbuhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. Bandung: ITB, 1990.
- Darnetty. *Pengantar Mikologi*. Padang: Andalas Universitas Press, 2006.
- Deacon and Terrence. *The Symbolic Species*. London: Penguin Press, 1997.
- Djarajah dkk. *Jamur Tiram*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius, 2001.
- E, Lana dkk. Chemical and Nutritional Composition of Local Corn Var,Manado Kuning“ as Rice Substitute )” *Jurnal Teknologi Pertanian*. vol. 8 no. 1 (2017). [https://ejournal.unsrat.ac.id /index.php/teta/article/view/16351](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/teta/article/view/16351). (Diakses 26 Desember 2019).

- E, Narwanti. “Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan 52 Efficiency Biology Rate”. Skripsi. (Semarang : Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013
- Erie, Maulana. *Panen Jamur Tiap Musim*. Lampung: Lily Publisher, 2012.
- Fauzi, Mahdi dkk. “Pengaruh Tiga Media Tanam Serbuk Kayu dan Pemberian Pupuk Pada Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) *Jurnal Agroeko teknologi*, vol. 1 no. 2 (Maret 2013). <https://www.neliti.com/id/publications/94461/pengaruh-tiga-media-tanam-serbuk-kayu-dan-pemberian-dan-pemberian-pupuk-pada-pro>. (Diakses 12 Agustus 2019).
- Fanadzo M dkk, “Evaluation of various substrates and supplements for biological efficiency of *Pleurotus sajor-caju* and *Pleurotus ostreatus*” *African Journal of Biotechnology* vol. 9 no. 19 ( Mei 2010) <http://www.academicians.org/AJB>. (Diakses 22 Agustus 2020).
- Frederick dkk. “Pengaruh Intensitas Cahaya dan Kadar Sukrosa terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram di Tangerang” *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, vol. 13 no. 2 (Juli 2018). *Jurnal untirta. a.c.id*. (Diakses 22 Agustus 2020).
- Fasidi1, Isola and Mukaila Kadi. “Use of agricultural wastes for the cultivation of in Nigeria” *Lentinus submidus* *Revista de Biologia Tropical*, vol, 41 no. 3 (1993). [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_nlinks&pid=S01012061201600040059800017&lng=en](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S01012061201600040059800017&lng=en), (Diakses 22 Agustus 2020).
- Gaspersz, Vincent. *Metode Perancangan Percobaan*. Bandung: CV. Armico, 1991.
- Hafsan. *Mikrobiologi Umum*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2011.
- Hariadi, Nurul dkk. “Studi Pertumbuhan dan Hasil Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Media Tumbuh Jerami Padi dan Serbuk Gergaji”. *Jurnal Produksi Tanaman* vol. 1, no.1 (2013). <http://protan.studentjournal.lub.ac.id/in dex.php/protan/article/view/6>. (Diakses 22 November 2019).
- Hendritomo, Henky. *Jamur Konsumsi Berkhasiat Obat*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- I, Gandjar dkk. *Mikologi Dasar Dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Isabel dkk. “Effect of substrate particle size and additional nitrogen source on production of lignocellulolytic enzymes by *Pleurotus ostreatus* strains” *Journal Bio esource Technology*. vol. 99 no. 16 (November 2016). <http://www.elsevier.com/copyright>. (Diakses 22 Agustus 2020).
- Iin, Meina. *Budidaya Jamur Tiram*. Jakarta: Azka Pressh, 2007.

- Ika dkk. "Seed Production Media Formulations F2 White Oyster Mushroom" *Jurnal Bio-site*, vol. 3 no. 1 (Mei 2016). Article%20Text-8847-1-10-20180112%20(3).pdf. (Diakses 22 Juni 2020).
- Ina, Darliana. *Pengaruh Penambahan Bekatul Dan Limbah Cair Tahu Untuk Media Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)*. Universitas Bandung Raya : Bandung 2013.
- Inglett, G. E. Kernel. *Structure, Composition and Quality. Ed. Corn: Culture. Processing and Products*. Avi Publishing Company, Westport, 1987.
- Isnaini, Wardani. *Budidaya Jamur Konsumsi*. Yogyakarta : Andi Ofset, 2010.
- Istiqomah Nurul dan Siti Fatimah. "Growth and Yield of Oyster Mushrooms In Various Composition of Planting Media" *Jurnal ZIRAA'AH*, vol. 39 no. 3 (Oktober 2014). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/71>. (Diakses 20 Agustus 2019).
- Kerem Zohar dkk. *Lignin degrading fungi, Mechanism and utilization*. (New York: Marcel Dekker, Inc, 2014).
- Kalsum, Ummu dkk. "Efektivitas Pemberian Air Leri Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*)" *Jurnal Agroekoteknologi Faku tas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura* : Madura, vol.4 no.2 (September 2011 ). <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor/article/view/297>. (Diakses 3 Desember 20 19).
- M, Suwito. "Resep Masakan Jamur dari Chef Ternama". Jakarta: PT. Agromedia Pustaka Oktober, 2006.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Maulidina, Rizky dkk. "The Effect of Seedling Ages and Media Composition on Groeth and Yield of White Osyter Mushroom (*Pleurotus ostreatus*)" *Jurnal Produksi Tanaman*, vol. 3, no. 8 (Desember 2015). [protan.studentjournal.ub.ac.id](http://protan.studentjournal.ub.ac.id). (Diakses 19 Agustus 2020).
- Meinanda, Ica. *Panen Cepat Budidaya Jamur*. Bandung : Penerbit Padi. 2013.
- Moore and Landecker. "Fundamental of fungi". Pretince Hall of Company. New York, USA, 1982.
- Mufarrihah, Lailaatul. "Pengaruh Penambahan Bekatul dan Ampas Tahu Pada Media Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)". Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) : Malang, (Oktober, 2010).
- Mustami, Muh. Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015.
- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2011.

- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2011.
- Naraian, R. dkk. "Influence of different nitrogen rich supplements during cultivation of *Pleurotus florida* on corn cob substrate." *Jurnal Environmentalist* Vol. 29, 2009. <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1007/S10669-008-9174-4>. (Diakses 18 Agustus 2020).
- Narwanti, Eka Ely. *Perbedaan Pengaruh Media Sekam Padi dan Serbuk Gergaji Sengon Terhadap Berat Basah, Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih dan Efficiency Biology Rate*. IKIP PGRI. Semarang: Semarang, 2013.
- Pelczar dkk. *Dasar-Dasar Mikrobiologi, Universitas Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Priyadi, Triono Untung. *Bisnis Jamur Tiram*. Jakarta: AgroMedia Pustaka 2013.
- S., Chazali dan P.S. Pratiwi. *Usaha Jamur Tiram Skala Rumah Tangga*. Jakarta: Penebar Swadaya 2009.
- Setiawan, A.I., *Kiat Memilih Bibit Tanaman Buah*. Penebar Swadaya. Jakarta, 1999.
- Sheila, Wijaya. *The Secret of Jamur*. Yogyakarta : FlashBooks, 2014.
- Shifriyah, Afina dkk. "Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Penambahan Dua Sumber Nutrisi". *Jurnal Agrovigor*, vol. 5 no.1 (Maret 2012). <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor/article/view/303/278>. (Diakses 15 Desember 2019).
- Soenanto, H. *Jamur Tiram*. Semarang: Aneka Ilmu 2000.
- Steivani, Susi. *Pengaruh Penambahan Molase Dalam Berbagai Media Pada Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus**. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suriawiria, U. *Budidaya Jamur Tiram*. Yoyakarta: Kanisius 2002.
- Suriawiria. *Budidaya Jamur Tiram* (Yoyakarta: Kanisius 2002
- Suryani Titik dan Hilda Carolina. "Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih Pada beberapa media Pembibitan" *Jurnal Bioeksperimen*, vol. 3, no. 3 (2017). <http://journals.ums.ac.id/index.php/bioeksperimen/article/view/3674>. (Diakses 29 Agustus 2019).
- Sutarman. "Keragaan dan produksi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media serbuk gergaji dan ampas tebu bersuplemen dedak dan tepung jagung." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, vol. 12 no.3 (2012). <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/212>. (Diakses 20 Agustus 2019).

- Syawal, Muh. dkk. "Pengaruh Komposisi Dedak dan Tepung Jagung pada Bahan Media Serbuk Gergaji terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Agrotekbis*, vol. 6, no.3 (2018). [http://rndjournals.com/uploads/documents/file\\_186\\_57.pdf](http://rndjournals.com/uploads/documents/file_186_57.pdf). (Diakses 2 September 2019).
- Tati Nurmala. *Serealia Sumber Karbohidrat Utama*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Umniyatie, dkk. "Budidaya Jamur Tiram sebagai Alternatif Usaha bagi Masyarakat Korban Erupsi Merapi di Dusun Pandan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman DIY." *Jurnal Inotek*, vol. 17 no. 2 (Agustus 2013 ). <https://journal.uny.ac.id/index.php/inotek/article/view/3357>. (Diakses 22 November 2019).
- Untung, Priyadi Triono. *Bisnis Jamur Tiram*. Jakarta : Agromedia Pustaka, 2013.
- Utama Putra dkk. "Penggunaan Berbagai Macam Media Tumbuh Dalam Pembuatan Bibit Induk Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)." *Jurnal Agroekoteknologi*, vol 5 no.1 (Juli 2013). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/548>. (Diakses 20 Agustus 2019).
- W.A, Volk and M.F. Wheeler. *Mikrobiologi Dasar*. Edisi Kelima. Jilid 1 Penerbit Erlangga. Jakarta, 1993.
- Warisno dan Kres Dahana, SP. *Menabur Jamur Menuai Rupiah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wignyanto dkk. "Analisis Kelayakan Teknis Dan Finansial Produksi Sosis Jamur Tiram Pada Skala Industri Kecil (Studi Kasus Di Budidaya Jamur Tiram 'Wahyu' Kota Mojokerto)", *Jurnal Industria* vol 1, no. 2 (2012). <http://industrdi.aub.ac.id/index.php/industri/article/view/108/303>. (Diakses 28 Agustus 2019).
- Wijaya, Sheila, *The Secret of Jamur*. Yogyakarta: Flash Books 2014.
- Yildiz S. dkk. "Some lignocellulosic wastes used as raw material in cultivation of the *Pleurotus ostreatus* culture mushroom." *Journal Process Biochemistry*, vol. 38 no. 3 (2002), [http://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592\(02\)00040-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592(02)00040-7). (Diakses 22 Agustus 2020).
- Zubaidah, Siti dkk. "Peningkatan Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) melalui variasi komposisi media tanam" *Jurnal Agripeat*, vol.14 no .2, (September 2013). *Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus with Various Composition of Growing*. (Diakses 22 Desember 2019).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN A

#### HASIL PENGAMATAN

**A. Pengukuran persentase pertumbuhan miselium F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) mulai minggu pertama (hari ke-6) sampai minggu ketiga (hari ke-18)**

Pengukuran parameter persentase pertumbuhan miselium hasil konversi pertumbuhan panjang (cm) diperoleh yang diperoleh data sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran persentase panjang miselium minggu pertama (hari ke-6)

Perlakuan	Ulangan			Total	Rerata
	I	II	III		
	(%)	(%)	(%)		
P0	23,84	25,38	24,61	73,83	24,61
P1	26,15	25,38	26,15	77,68	25,89
P2	26,92	26,15	26,920	79,99	26,66
P3	26,150	24,610	25,380	76,14	25,38
Total				307,64	25,63

2. Hasil pengukuran persentase panjang miselium minggu kedua (hari ke-12)

Perlakuan	Ulangan			Total	Rerata
	I	II	III		
	(%)	(%)	(%)		
P0	61,53	60,76	74,61	196,9	65,63
P1	67,69	73,84	80	221,53	73,84
P2	70,76	71,53	78,460	220,75	73,58
P3	57,690	49,230	51,530	158,45	52,81
Total				797,63	66,46

3. Hasil pengukuran persentase panjang miselium minggu ketiga (hari ke-18)

Perlakuan	Ulangan			Total	Rerata
	I	II	III		
	(%)	(%)	(%)		
P0	80,76	88,46	86,15	255,37	85,12
P1	94,61	96,15	96,92	287,68	95,89
P2	100	98,46	100	298,46	99,48
P3	81,530	73,07	75,38	229,98	76,66
Total				1071,49	89,29

**B. Pengukuran waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)**

Pengukuran waktu penyebaran miselium dilakukan setelah miselium memenuhi media secara keseluruhan dan diperoleh data sebagai berikut:

Perlakuan	Ulangan			Total	Rerata Hari
	I	II	III		
	HSI	HSI	HSI		
P0	20	20	21	61	20,33
P1	19	19	20	58	19,33
P2	18	17	16	51	17,00
P3	23	25	25	73	24,33
Total				243	20,25

## LAMPIRAN B

### UJI HOMOGENITAS DATA

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah perlakuan kita berasal dari varian yang sama, mengingat untuk melakukan uji ini asumsi kehomogenan harus terpenuhi yaitu semua populasi atau perlakuan yang dicobakan harus mempunyai varian yang sama. Hipotesis yang diajukan dari uji ini adalah:

Ho : semua populasi mempunyai varian yang sama

H1 : semua populasi mempunyai varian yang tidak sama.

Sementara itu dasar pengambilan keputusan adalah: Jika probabilitasnya  $> 0.05$  maka Ho diterima Jika probabilitasnya  $< 0.05$  maka Ho ditolak.

#### A. Uji homogenitas persentase pertumbuhan miselium F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) mulai minggu pertama (hari ke-6) sampai minggu ketiga (hari ke-18)

1. Hasil uji homogenitas data panjang miselium minggu pertama (hari ke-6)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.267	3	8	.848

2. Hasil uji homogenitas data panjang miselium minggu kedua (hari ke-12)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.801	3	8	.527

3. Hasil uji homogenitas data panjang miselium minggu ketiga (hari ke-18)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.269	3	8	.880

- B. Uji homogenitas waktu penyebaran hari setelah inokulasi (HSI) miselium F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*)**

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.978	3	8	.450

Berdasarkan uji homogenitas (Test of homogeneity of variances) terhadap pengukuran presentase pertumbuhan dan waktu penyebaran miselium diperoleh nilai sig > 0.05 (probailitasnya > 0.05) sehingga dapat diketahui bahwa semua populasi memiliki varian yang sama sehingga uji Analisis of Varian (ANOVA) dapat dilanjutkan.

## LAMPIRAN

### UJI ANOVA

Uji ANOVA taraf 5% dilakukan menggunakan aplikasi SPSS V.17.0 untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan serbuk jagung terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

#### A. Persentase pertumbuhan miselium

1. Hasil uji ANOVA pertumbuhan miselium pada minggu pertama (hari ke-6)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.720	3	2.240	5.667	.022
Within Groups	3.162	8	.395		
Total	9.882	11			

**F Tabel (5%) = 4,07**

**Koefisien Determinasi = 14,4%**

**Koefisien Keragaman = 2,43 %**

2. Hasil uji ANOVA pertumbuhan miselium pada minggu kedua (hari ke-12)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	876.237	3	292.079	8.617	.007
Within Groups	271.174	8	33.897		
Total	1147.411	11			

**F Tabel (5%) = 4,07**

**Koefisien Determinasi = 19%**

**Koefisien Keragaman = 8,75 %**

3. hasil uji ANOVA pertumbuhan miselium pada minggu ketiga (hari ke-18).

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	973.362	3	324.454	35.163	.000
Within Groups	73.817	8	9.227		
Total	1047.179	11			

**F Tabel (5%) = 4,07**

**Koefisien Determinasi = 6%**

**Koefisien Keragaman = 3,4 %**

**B. Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	84.250	3	28.083	37.444	.000
Within Groups	6.000	8	.750		
Total	90.250	11			

**F Tabel (5%) = 4,07**

**Koefisien Determinasi = 15,5%**

**Koefisien Keragaman = 4,27 %**

LAMPIRAN D

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN E

### UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT)

Konsentrasi yang paling efektif terhadap persentase pertumbuhan miselium dapat diketahui melalui tabel uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf kepercayaan 5% sebagai berikut:

#### A. Persentase pertumbuhan miselium

1. Hasil uji Duncan pertumbuhan miselium pada minggu kedua (hari ke-6)

(I) PERLAK UAN	(J) PERLAK UAN	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
P0	P1	-1.28333*	.51333	.037	-2.4671	-.0996
	P2	-2.05333*	.51333	.004	-3.2371	-.8696
	P3	-.77000	.51333	.172	-1.9537	.4137
P1	P0	1.28333*	.51333	.037	.0996	2.4671
	P2	-.77000	.51333	.172	-1.9537	.4137
	P3	.51333	.51333	.347	-.6704	1.6971
P2	P0	2.05333*	.51333	.004	.8696	3.2371
	P1	.77000	.51333	.172	-.4137	1.9537
	P3	1.28333*	.51333	.037	.0996	2.4671
P3	P0	.77000	.51333	.172	-.4137	1.9537
	P1	-.51333	.51333	.347	-1.6971	.6704
	P2	-1.28333*	.51333	.037	-2.4671	-.0996

M A K A S S A R

2. Hasil uji Duncan pertumbuhan miselium pada minggu kedua (hari ke-12)

(I) PERLA KUAN	(J) PERLA KUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
P0	P1	-8.21000	4.75371	.122	-19.1721	2.7521
	P2	-7.95000	4.75371	.133	-18.9121	3.0121
	P3	12.81667*	4.75371	.027	1.8546	23.7788
P1	P0	8.21000	4.75371	.122	-2.7521	19.1721
	P2	.26000	4.75371	.958	-10.7021	11.2221
	P3	21.02667*	4.75371	.002	10.0646	31.9888
P2	P0	7.95000	4.75371	.133	-3.0121	18.9121
	P1	-.26000	4.75371	.958	-11.2221	10.7021
	P3	20.76667*	4.75371	.002	9.8046	31.7288
P3	P0	-12.81667*	4.75371	.027	-23.7788	-1.8546
	P1	-21.02667*	4.75371	.002	-31.9888	-10.0646
	P2	-20.76667*	4.75371	.002	-31.7288	-9.8046

3. Hasil uji Duncan pertumbuhan miselium pada minggu ketiga (hari ke-18)

LSD	(I) PERLA KUAN	(J) PERLA KUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
	P0	P1	-10.77000*	2.48021	.002	-16.4894	-5.0506
		P2	-14.36333*	2.48021	.000	-20.0827	-8.6440
		P3	8.46333*	2.48021	.009	2.7440	14.1827
	P1	P0	10.77000*	2.48021	.002	5.0506	16.4894
		P2	-3.59333	2.48021	.185	-9.3127	2.1260
		P3	19.23333*	2.48021	.000	13.5140	24.9527
	P2	P0	14.36333*	2.48021	.000	8.6440	20.0827
		P1	3.59333	2.48021	.185	-2.1260	9.3127
		P3	22.82667*	2.48021	.000	17.1073	28.5460
P3	P0	-8.46333*	2.48021	.009	-14.1827	-2.7440	
	P1	-19.23333*	2.48021	.000	-24.9527	-13.5140	
	P2	-22.82667*	2.48021	.000	-28.5460	-17.1073	


**B. Waktu penyebaran miselium Hari Setelah Inokulasi (HSI)**

	(I) PERLA KUAN	(J) PERLA KUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P0	P1	1.00000	.70711	.195	-.6306	2.6306
		P2	3.33333*	.70711	.002	1.7027	4.9639
		P3	-4.00000*	.70711	.000	-5.6306	-2.3694
	P1	P0	-1.00000	.70711	.195	-2.6306	.6306
		P2	2.33333*	.70711	.011	.7027	3.9639
		P3	-5.00000*	.70711	.000	-6.6306	-3.3694
	P2	P0	-3.33333*	.70711	.002	-4.9639	-1.7027
		P1	-2.33333*	.70711	.011	-3.9639	-.7027
		P3	-7.33333*	.70711	.000	-8.9639	-5.7027
	P3	P0	4.00000*	.70711	.000	2.3694	5.6306
		P1	5.00000*	.70711	.000	3.3694	6.6306
		P2	7.33333*	.70711	.000	5.7027	8.9639



## LAMPIRAN F

### SKEMA PENELITIAN



# DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

## 1. Alat dan Bahan

### a. Alat



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)



(n)



(o)

Ket: (a) Stopwatch

(b) Mixer

(c) Panci

(d) Botol Media

(e) Autoklaf

(f) Timbangan Analitik

(g) Mistar

(h) Inkubator

(i) Kapas

(j) Spatula

(k) Hand Sprayer Alkohol 70%

(l) Kompor

(m) Lampu Spirtus

(n) Karet Pengikat

(o) Engkas

## b. Bahan



(a)



(b)



(c)

Ket: (a) Jagung Kuning

(b) Bibit F0 Jamur Tiram (*pleurotus ostreatus*)

(c) Alkohol 70%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

### c. Prosedur Kerja

#### 1. Pembuatan Media Tanam



(a)



(b)



(c)



(d)

Ket: (a) Proses perendaman biji jagung dan serbuk jagung

(b) Proses perebusan biji jagung selama 70 menit

(c) Proses pengadukan agar biji menjadi lunak merata di seluruh wadah panci

(d) Proses meniriskan media untuk mengurangi kadar air setelah perebusan

#### 2. Pencampuran komposisi media



(a)



(b)

Ket: (a) Proses perhitungan konsentrasi komposisi media

(b) Prose pencampuran komposisi media tanam biji jagung dan serbuk jagung

### 3. Sterilisasi media tanam



(a)



(b)

Ket: (a) Proses penyiapan komponen autoklaf sebelum digunakan

(b) Proses memasukkan botol media ke dalam autoklaf untuk disterilisasi

### 4. Inokulasi



(a)



(b)

Ket: (a) Penyiapan alat dan bahan proses inokulasi

(b) Proses inokulasi yang dilakukan di dalam engkas

## 2. Pengamatan setelah inokulasi

### a. pengamatan miselium minggu pertama (hari ke-6)



P0(1)

P0(2)

P0(3)



P1(1)

P1(2)

P1(3)



P2(1)

P2(2)

P2(3)



**P3(1)**

**P3(2)**

**P3(3)**

**b. Pengamatan miselium minggu kedua (hari ke-12)**



**P0(1)**

**P0(2)**

**P0(3)**



**P1(1)**

**P1(2)**

**P1(3)**



P2(1)

P2(2)

P2(3)



P3(1)

P3(2)

P3(3)

**c. Pengamatan miselium minggu ketiga (hari ke-18)**



**P0(1)**

**P0(2)**

**P0(3)**



**P1(1)**

**P1(2)**

**P1(3)**



**P2(1)**

**P2(2)**

**P2(3)**



**P3(1)**

**P3(2)**

**P3(3)**

Ket: (P0) Perlakuan konsentrasi serbuk jagung 0%

(P1) Perlakuan konsentrasi serbuk jagung 25%

(P2) Perlakuan konsentrasi serbuk jagung 50%

(P3) Perlakuan konsentrasi serbuk jagung 100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



Muhaeming, dilahirkan di Takalar pada tanggal 08 Desember 1998. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Abd. Haris dan Rosmini. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Inpres Bulukunyi, Kecamatan Pol-Sel, Kabupaten Takalar tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Mts Negeri 1 Takalar, Kecamatan Pol-Sel, Kabupaten Takalar dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri 2

Model Makassar Dan selesai tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada program studi Pendidikan Biologi. Selama menempuh bangku perkuliahan, peneliti dipercaya memegang amanah jabatan diantaranya sebagai Ketua Tingkat Pend. Biologi 1,2, Ketua Angkatan Pendidikan Biologi 2016, Pengurus DEMA Fakultas Tarbiyah & Keguruan Periode 2018, Pengurus Wilayah IKAHIMBI Wilayah Kerja 8 Sulawesi, Ketua Umum Simbiosis Periode 2018 dan Ketua Umum HMJ Pend. Biologi Periode 2019. Selain itu, peneliti pernah dipercaya menjadi Asisten Laboratorium Praktikum Biologi Umum.

