


**PEMBUATAN SAMPO ANTI KUTU RAMBUT DARI EKSTRAK DAUN
JERUK PURUT (*Citrus hystrix* DC)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan
Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

GEBRIELLA
60500116021

FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gebriella
Nim : 60500116021
Tempat/Tanggal Lahir : Salukaluku/ 05 November 1998
Jurusan : Kimia
Judul : Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hal terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibaut oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Januari 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A

Penyusun

Gabriella

NIM. 60500116021


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian Saudari, Gebriella, Nim: 60500116021, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul “Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*)” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Oktober 2020

Pembimbing I



Sjamriah, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP: 19680722 199802 2 001

Pembimbing II



Rahmiani Gani, S.Pd., M.Sc
NIP: 19890306 201903 2 013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa terlimpahkan atas kehadiran Allah swt yang atas izinya melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut Dari Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menemui beberapa kendala. Namun dengan dorongan dan bimbingan dari semua pihak penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua dan saudara-saudara yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Hamdan Juhani M. A., Ph. D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M. Si dan Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S. Si., M. Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Sjamsiah S. Si., M. Si., Ph. D selaku Pembimbing I dan ibu Rahmiani Gani S.Pd., M. Sc selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
5. Ibu Dra. Sitti Chadijah selaku Penguji I dan ibu Dr. Hj. Rahmi Damis M. Ag selaku Penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Jurusan Kimia dan Staf Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Segenap Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
8. Teman partner penelitian yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi.
9. Saudara Ahmad Dahlan (Madun) yang telah banyak memberikan support selama penelitian.
10. Teman-teman LIGAN yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang banyak membantu baik dalam penulisan skripsi maupun proses penelitian.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Aamiin. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, Januari 2021

Penulis,

Gabriella

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-21
A. Kutu Kepala (<i>Pediculus humanus capitis</i>)	5
B. Daun Jeruk Purut (<i>Citrus hystrix</i> DC)	7
C. Sampo.....	9
D. Senyawa Metabolit Sekunder	12
E. Ekstraksi	15
F. Viskometer Brookfield.....	17
G. pH Meter.....	18
H. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR).....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	23-27
A. Waktu dan Tempat Penelitian.	23
B. Alat dan bahan.....	23
C. Prosedur penelitian.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28-40
A. Hasil Penelitian	28
1). Hasil Skrining Fitokimia.....	28
2). Hasil Identifikasi Gugus Fungsi Menggunakan FTIR.....	28
3). Karakteristik Sediaan Sampo.....	29
4). Efektivitas Anti Kutu	29
B. Pembahasan	30
1). Ekstrak Daun Jeruk Purut (<i>Citrus hystrix</i> DC)	30
2). Senyawa Metabolit Sekunder Daun Jeruk Purut	31
3). Hasil Uji FTIR	32
4). Sampo Ekstrak Daun Jeruk Purut	33
5). Karakterisasi Sampo	35
6). Efektivitas Anti Kutu	38
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43-49
LAMPIRAN.....	50
RIWAYAT HIDUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daerah Serapan FTIR Sitronella.....	21
Tabel 3.1 Formulasi Sampo Ekstrak Daun Jeruk Purut	26
Tabel 4.1 Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Jeruk	28
Tabel 4.2 Daerah Serapan FTIR Ekstrak Daun Jeruk Purut.....	28
Tabel 4.3 Karakteristik Sediaan Sampo.....	29
Tabel 4.4 Efektivitas Sampo Anti Kutu Rambut.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kutu Kepala (<i>Pediculus humans capitis</i>).....	5
Gambar 2.2 Daun Jeruk Purut (<i>Citrus hystrix</i> DC).....	7
Gambar 2.3 Struktur Sitronellal	8
Gambar 2.4 Struktur Flavonoid	13
Gambar 2.5 Struktur Alkaloid	14
Gambar 2.6 Struktur Tanin	14
Gambar 2.7 Struktur Steroid	15
Gambar 2.8 Viskometer Brookfield.....	18
Gambar 2.9 pH Meter	19
Gambar 2.10 <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR)	21
Gambar 4.1 Spektrum FTIR Ekstrak Daun Jeruk Purut	33

ABSTRAK

Nama : Gebriella
Nim : 60500116021
Judul : Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut Dari Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Pediculus humanus capitis merupakan salah satu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan kulit kepala manusia. Salah satu alternatif untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan dari *Pediculus humanus capitis* adalah dengan membuat sampo anti kutu rambut dari daun jeruk purut dengan konsentrasi 0%, 3%, 5%, 7% dan 9%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi konsentrasi ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) dan mengetahui konsentrasi optimum ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) pada sampo anti kutu rambut terhadap mortalitas kutu rambut. Berdasarkan hasil penelitian untuk skrining fitokimia menunjukkan ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) mengandung senyawa flavonoid, saponin, terpenoid dan tanin. Karakteristik sediaan sampo didapatkan warna sampo dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) bewarna hijau kehitaman, memiliki aroma khas daun jeruk purut dan wujud kental. Selain itu, pada sampo dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) didapatkan pH normal 5-7, viskositas 100-6000 cP, tinggi busa 4-6 cm. Konsentrasi optimum yang dapat membunuh kutu rambut terhadap mortalitas kutu adalah sampo dengan konsentrasi 9% dan sampo yang efektif serta memenuhi syarat SNI No. 92692-1192 sebagai sampo yang baik untuk digunakan adalah sampo dengan konsentrasi 5%.

Kata kunci: Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC), Ekstrak, Konsentrasi, *Pediculus humanus capitis*, Sampo Anti Kutu.

ABSTRACT

Name : *Gabriella*
Nim : *60500116021*
Title : *Making Anti-Head Lice Shampoo From Lime Leaf Extract (Citrus hystrix DC)*

Pediculus humanus capitis is a disease that can interfere with the health of the human scalp. One alternative to overcome the problems caused by *Pediculus humanus capitis* is to make anti-lice shampoo from kaffir lime leaves with a concentration of 0%, 3%, 5%, 7% and 9%. The purpose of this study was to determine the characteristics of anti-head lice shampoo from various concentrations of kaffir lime leaf extract (*Citrus hystrix DC*) and to determine the optimum concentration of kaffir lime leaf extract (*Citrus hystrix DC*) in anti-head lice shampoo on head lice mortality. Based on the results of research for phytochemical screening, it shows that the leaf extract of kaffir lime (*Citrus hystrix DC*) contains flavonoids, saponins, terpenoids and tannins. The characteristics of the shampoo preparation obtained the color of the shampoo from the leaf extract of kaffir lime (*Citrus hystrix DC*), which are green-black, have a distinctive aroma of kaffir lime leaves and are thick in shape. In addition, the shampoo from kaffir lime leaf extract (*Citrus hystrix DC*) obtained normal pH of 5-7, viscosity of 100-6000 cP, high foam 4-6 cm. The optimum concentration that can kill head lice against lice mortality is shampoo with a concentration of 9% and shampoo that is effective and meets the requirements of SNI No. 92692-1192 as a good shampoo to use is shampoo with a concentration of 5%.

Key word: *Kaffir lime leaves (Citrus hystrix DC), Extract, Concentration, Shampoo, Pediculus humanus capitis*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penampilan bagi sebagian masyarakat termasuk hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut mendorong untuk meningkatkan penampilan secara visual baik pria maupun wanita. Salah satu hal yang dapat menunjang penampilan visual baik pria maupun wanita yaitu rambut yang sehat dan berkilau (Angelia, dkk., 2014). Tranggono (2007), menyatakan bahwa rambut yang sehat adalah rambut yang tidak kurus, tidak kusut dan mudah disisir serta ditata. Selain itu, rambut memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu peranan rambut bagi manusia yaitu sebagai pelindung bagi kulit kepala manusia dan memiliki pengaruh dari segi estetika, sehingga perlu dijaga kebersihan dan kesehatannya agar tidak timbul masalah rambut seperti tumbuhnya parasit (Ridla, dkk., 2013).

Parasit kecil yang dikenal dengan nama kutu atau tuma (*Pediculus humanus capitis*) banyak tumbuh pada rambut dan kulit kepala manusia. Umumnya kutu kepala banyak tumbuh pada anak sekolah dasar pada usia 8 sampai 10 tahun. Penelitian Rassami dan Soonwera (2011), menyatakan bahwa rasio investasi kutu kepala anak sekolah berkisar 12,26%-29,76%. Hardiyanti (2016), menyatakan anak dengan usia 8 tahun rasionya meningkat menjadi 55,89%. Penderita kutu pada kulit kepala anak-anak usia tersebut dikarenakan kurang mampu menjaga kebersihan dan masih belum mengetahui bahaya yang ditimbulkan pada kutu rambut (Fadila, 2015).

Kutu yang terdapat pada kulit kepala dapat menimbulkan rasa gatal apabila digaruk dan menimbulkan infeksi sekunder (Indawati, dkk., 2017). Kutu kepala hidup

dengan cara menghisap darah pada bagian kepala manusia (Ansyah, 2013). Selain itu, dapat mengakibatkan penyakit *relapsing fever*, yang disebabkan karena adanya infeksi pada kulit kepala penderita. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari kutu kepala dapat dilakukan dengan membuat sampo.

Pembuatan sampo pada umumnya terbuat dari bahan kimia seperti *fatty acid*, *anionic surfactant*, *amphotenic surfactant* serta bahan kimia lainnya yang umum digunakan dalam pembuatan sampo (Iwata, 2013). Sampo yang terbuat dari bahan kimia dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan kulit kepala dan rambut. Penelitian Anam (2017), melaporkan bahwa penggunaan sampo dari bahan kimia dapat menimbulkan iritasi pada kulit kepala serta dapat menyebabkan karsinogenik. Megatasi hal tersebut diperlukan sampo herbal sebagai alternatif agar dapat mencegah permasalahan yang ditimbulkan sampo dengan bahan kimia. Salah satu tanaman herbal yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembuatan sampo adalah tanaman daun jeruk purut, karena memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang tinggi sehingga memiliki potensi dalam mortalitas kutu. Penelitian Dewi (2010), melaporkan bahwa kandungan senyawa metabolit sekunder dalam daun jeruk dapat berpotensi sebagai insektisida alami.

Kandungan dari daun jeruk purut yaitu senyawa metabolit sekunder seperti tanin 1,8%, steroid, triterpenoid dan minyak atsiri 1-1,5% v/v (Dalimarta, 2009). Selain itu, penelitian Adrianto (2014), menyatakan bahwa ekstrak dari daun jeruk purut memiliki potensi sebagai bioinsektisida pada serangga sehingga dapat digunakan membunuh kutu kepala. Peneliti lain, Martini (2002), melaporkan bahwa

tanaman yang mengandung minyak atsiri dapat dijadikan sebagai obat penolak serangga.

Manfaat tanaman untuk kepentingan umat manusia sudah dijelaskan dalam al-qur'an maupun secara umum, seperti yang dipahami dalam QS an-Nahl/ 16: 11. sebagai berikut.

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengannya tanaman-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan dari segala buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar ada tanda bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. menumbuhkan tanaman dimuka bumi agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanaman tersebut Allah swt. tumbuhkan dengan air hujan dari tanaman yang layu hingga tanaman yang dapat hidup dengan waktu yang lama, seperti tanaman zaitun dan kurma yang memiliki kandungan gizi dan kalori yang tinggi. Sesungguhnya demikian itu benar-benar menunjukkan tanda kekuasaan Allah (Shihab, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk membuat sampo anti kutu dari ekstrak daun jeruk purut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sampo anti kutu rambut dan mengetahui konsentrasi optimum sampo terhadap mortalitas kutu rambut. Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara membuat sampo anti kutu dari ekstrak daun jeruk purut dengan konsentrasi 0%, 3%, 5%, 7% dan 9%. Selanjutnya dilakukan skrining fitokimia, pengujian menggunakan instrument FTIR serta dilakukan uji karakterisasi pada sediaan sampo dan uji efektivitas anti kutu.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi konsentrasi ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC)?
2. Berapa konsentrasi optimum sampo dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) dalam efektivitas mortalitas kutu rambut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi konsentrasi ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC).
2. Untuk mengetahui konsentrasi optimum sampo dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) dalam efektivitas mortalitas kutu rambut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) yang dapat dijadikan sebagai sampo anti kutu rambut.
2. Menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kutu Kepala (Pediculus humanus capitis)*

Kutu kepala merupakan penyakit yang disebabkan oleh investasi parasit dari tuma yang menyerang kulit atau rambut kepala (Maryanti, dkk., 2018). Kutu kepala termasuk ektoparasit yang tersebar diseluruh dunia dan menyerang anak usia sekolah (Virgianti dan Rahmah, 2016). Kutu kepala yang terdapat pada kulit kepala manusia memiliki bentuk tubuh yang pipih, tipe mulut tusuk, badan yang bersegmen, memiliki tiga pasang kaki dan berwarna kuning kecoklatan atau putih keabu-abuan dan tidak memiliki sayap seperti pada Gambar 2.1 berikut (Hardiyanti, 2016).



Gambar 2.1 Kutu Kepala (*Pediculus humanus capitis*)

Kulit kepala yang terinfeksi kutu kepala akan menimbulkan rasa gatal yang berlebih jika digaruk (Indawati, dkk., 2017). Siklus hidup kutu yang terdapat di kulit kepala manusia memiliki siklus hidup dengan diawali peletakan telur yang ditempelkan pada rambut kepala, kemudian setelah 3-4 hari telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hasil penetasan telur selanjutnya akan mengalami pengupasan kulit dan akan menjadi kutu dewasa (Rumampuk, 2014). Lama hidup kutu kepala dapat mencapai 30 hari dan hidup dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan

bila tanpa dengan menghisap darah kutu kepala dapat hidup selama 15-20 jam (Indawati, dkk., 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kutu kepala yang terdapat di kulit kepala manusia sebagai berikut:

1. Usia

Usia dapat menjadi pemicu tumbuhnya kutu kepala pada manusia utamanya kalangan anak-anak. Anak-anak umumnya lebih sering terkena penyakit kutu kepala pada usia 3-11 tahun (Meinking dan Burchat, 2008).

2. Penggunaan tempat tidur dan bantal bersama

Kutu kepala dewasa dapat hidup diluar kulit kepala selama 1-2 hari, sedangkan telurnya dapat bertahan sampai satu minggu. Orang yang terkena investasi kutu kepala apabila meletakkan kepala disuatu tempat kemungkinan besar ada tungau dewasa serta telur yang terjatuh (Stone, dkk., 2012).

3. Penggunaan sisir dan aksesoris rambut bersama

Sisir termasuk salah satu tempat tertularnya kutu kepala manusia. Apabila seseorang menggunakan sisir yang terdapat tungau atau telur yang hidup pada sisir tersebut, maka akan tertular begitu juga dengan aksesoris rambut, kerudung, bando dan pita (Natadistara dan Ridad, 2009).

4. Panjang rambut

Orang yang memiliki rambut lebih panjang sering terkena investasi kutu kepala. Hal ini disebabkan lebih susah membersihkan rambut dan kulit kepala panjang dibandingkan dengan rambut pendek (Meinking dan Buchart, 2008).

5. Frekuensi cuci rambut

Sering mencuci rambut berhubungan dengan tingkat kebersihan rambut dan kulit kepala. Kebiasaan mencuci rambut secara rutin orang yang terinfeksi kutu kepala lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang jarang membersihkan rambut (Barbara, dkk., 2002).

B. Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Tanaman jeruk purut merupakan salah satu tanaman perdu banyak digunakan salah satunya sebagai obat (Copriady, dkk., 2005). Kegunaan lain dari daun jeruk purut adalah sebagai flavor alami pada makanan. Kandungan flavor yang dimiliki daun jeruk purut adalah minyak atsiri yang terdapat pada bagian daun jeruk purut (Mayasari, dkk., 2013). Daun jeruk purut memiliki ciri khas berupa warna hijau tua, apabila sudah matang akan mengalami perubahan warna menjadi kuning (Hakim, dkk., 2019). Warna lain dari jeruk purut adalah memiliki warna yang mengkilap dan memiliki aroma yang harum jika diremas (Tuasamu, 2018). Bentuk dari daun jeruk purut adalah memiliki bentuk bulat hingga lonjong, pangkal membulat atau tumpul dan umumnya memiliki panjang 8-15 cm dan tulang daun memiliki sirip yang beraturan (Putri, 2012) seperti pada Gambar 2.2 berikut.




Gambar 2.2 Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Penelitian Rukmana (2003), melaporkan bahwa taksonomi daun jeruk purut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
 Divisi : *Spermathopyta*
 Sub Divisi : *Angiospermae*
 Kelas : *Dicotyledonae*
 Famili : *Rutaceae*
 Marga : *Citrus*

Kandungan utama dari daun jeruk purut adalah sitronellal sebanyak 81, 49% (Munaroh dan Handayani, 2010). Selain sitronellal, daun jeruk purut juga mengandung flavonoid, kalamondin dan limonoid (Muhammat, dkk., 2012). Penelitian Singgih (2006), melaporkan bahwa sitronellal memiliki fungsi sebagai racun *desiscant*. Racun akan membuat tubuh serangga kehilangan cairan terus menerus, sehingga mati kekeringan. Hal tersebut disebabkan karena tidak teratasinya penguapan air dalam tubuh serangga oleh zat sitronellal. Adapun struktur sitronellal ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Struktur Sitronellal

Daun jeruk purut dapat digunakan pada bidang industri, misalnya pada industri kosmetik seperti parfum. Penelitian Hidayat (1999), menyatakan bahwa kandungan minyak pada daun jeruk purut seperti sitronellal yang tinggi dapat dimanfaatkan zat

pewangi, sabun, parfum yang bernilai tinggi, obat gosok, pasta gigi dan obat pencuci mulut. Selain itu, kandungan stironellal yang terkandung dalam jeruk purut berfungsi sebagai aktivitas antioksidan dan aktivitas antibakteri sehingga berpotensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan membunuh hama (Auyusuk, dkk., 2009). Kandungan lainnya yang terkandung dalam daun jeruk purut yang dapat berpengaruh dalam mortalitas kutu adalah senyawa metaboli sekunder. Penelitian Amin dkk (2016), melaporkan bahwa senyawa metabolit sekunder dalam daun jeruk purut memiliki fungsi sebagai anti serangga.

C. Sampo

Sampo merupakan salah satu produk yang mengandung surfaktan. Sampo umumnya memiliki bentuk berupa cairan, padatan ataupun serbuk dapat menghilangkan minyak pada permukaan kepala, kotoran kulit dari batang rambut dan juga kuit kepala (Polutri, dkk., 2013). Sampo dapat juga diartikan sebagai sediaan kosmetik dalam bentuk cair, gel, emulsi ataupun aerosol yang mengandung surfaktan. Kandungan surfaktan yang terdapat dalam sampo dapat menyebabkan sampo sifat detergensi, humektan dan menghasilkan busa (Fonseca, 2005).

Sampo memiliki manfaat untuk menghilangkan kotoran dan dapat membuat rambut tetap berkilau dan mudah untuk diatur (Young, 1972). Syarat-syarat sampo yang baik adalah memiliki kemampuan membersihkan yang baik, menghasilkan busa yang banyak dan tahan lama, melindungi rambut dari gesekan selama pencucian atau keramas dan aman bagi kulit kepala, rambut dan mata (Mitsui, 1997). Winarti (2007), menyatakan bahwa karakteristik sampo yang baik meliputi nilai pH, viskositas, kadar air, alkali bebas dan stabilitas emulsi.

1. Nilai pH

Nilai pH dapat memberikan pengaruh pada kualitas sampo. Semakin tinggi konsentrasi penambahan suatu ekstrak maka nilai pH sampo yang dihasilkan cenderung mengalami penurunan.

2. Viskositas

Nilai viskositas dari formula sampo menyatakan penambahan ekstrak dalam formulasi sampo mengakibatkan semakin bertambahnya nilai padatan terlarut dalam sampo sehingga menaikkan nilai viskoistas.

3. Alkali bebas

Kandungan alkali bebas mempengaruhi mutu sampo sehingga konsentrasi harus diperhatikan. Sampo dengan alkali bebas yang tinggi akan menyebabkan pH sampo menjadi basa dan akan menyebabkan iritasi kulit kepala, rambut kering dan mudah rusak.

4. Kadar air

Menurut standa SNI (1992), kadar air sampo sebesar 95,5%. Semakin tinggi konsentrasi suatu ekstrak, kadar air semakin rendah. Penambahan ekstrak dalam formula sampo mengakibatkan bertambahnya nilai padatan terlarut. Penurunan kadar air juga dipengaruhi pula oleh pengurangan konsentrasi air deionisasi sebagai pelarut.

5. Stabilitas emulsi

Kenaikan nilai stabilitas emulsi sehubungan dengan kenaikan konsentrasi suatu ekstrak. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan kadar airnya makin kecil dan sebaliknya. Meningkatnya kadar air dengan semakin kecilnya konsentrasi, menyebabkan semakin cepatnya pemisahan fase terdispersi dan fase

pendispersi. Semakin cepat pemisahan fase, maka tingkat kestabilan emulsi semakin rendah (Suryani, dkk., 2002).

Adila (2016), menyatakan bahwa formulasi sediaan sampo sebagai berikut:

1. *PEG 80 glyceryl cocate*

PEG 80 glyceryl cocate merupakan surfaktan nonionik yang bersumber dari minyak kelapa. *PEG 80 glyceryl cocate* banyak digunakan pada sediaan cair, efek terhadap iritasi rendah dan merupakan agen pembersih utama serta sebagai solubilizier. *PEG 80 glyceryl cocate* biasa terdapat pada sampo bayi dan produk kebersihan bahan lainnya.

2. *Sodium laureth sulfate*

Sodium laureth sulfate merupakan agen pengemulsi yang dapat menghilangkan minyak dan kotoran pada rambut dan kulit. Bahan ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit dengan dosis yang tinggi. Namun, bahan tersebut tidak menimbulkan bahaya pada bahan beracun.

3. *Sodium Lauryl Sulfate*

Sodium lauryl sulfate merupakan surfaktan primer. Surfaktan primer banyak digunakan sebagai pasta gigi dan sampo pada kondisi konsentrasi rendah. *Sodium lauryl sulfate* tidak bersifat karsinogenik, namun biasanya menimbulkan iritasi pada kulit.

4. *Cocamidopopyl betaine*

Cocamidopopyl betaine merupakan surfaktan sintesis yang berasal dari minyak kelapa dan *methylaminopropylamine*. Senyawa ini merupakan senyawa kimia dengan cairan kental transparan berwarna kuning pucat yang digunakan sebagai surfaktan pada produk mandi seperti sampo, sabun cuci tangan dan pada kosmetik

digunakan sebagai pengemulsi dan pengental yang dapat mengurangi iritasi yang disebabkan oleh ionik murni.

5. *Cocoamide MEA*


Cocoamide MEA merupakan nonionik surfaktan yang digunakan sebagai agen pembersih. *Cocoamide MEA* biasanya dikombinasikan dengan surfaktan yang lain untuk menghasilkan produk sampo dengan kualitas yang baik.

D. *Senyawa Metabolit Sekunder*

Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang banyak mengandung senyawa metabolit sekunder adalah akar, batang, daun, bunga, buah dan biji tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia (Widiyati, 2006). Senyawa metabolit yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai antioksidan, zat pewarna, penambah aroma makanan, parfum, insektisida dan dapat berfungsi sebagai obat (Yuhernita dan Januarti, 2011). Penelitian Hikmah (2015), menyatakan bahwa kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu tanaman berpotensi dijadikan sebagai antioksidan dan antifeedant pada suatu tanaman.


Senyawa triterpenoid merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat aromatik dan banyak ditemukan dalam minyak atsiri (Suryelita, 2017). Rantai karbon senyawa triterpenoid terdiri atas enam satuan isoprena (Widiyati, 2006). Setiap rantai isoprena tersusun atas kepala dan ekor. Hasil positif dari triterpenoid ditandai dengan perubahan warna merah atau coklat pada sampel (Lantah, dkk., 2017).

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang banyak ditemukan di alam dan banyak terdapat pada bagian tumbuhan seperti daun, akar, kulit, bunga, buah dan biji (Marhakam, 1998). Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat insektisida (Ahdiyah dan Purwarni, 2015). Flavonoid termasuk turunan dari senyawa flavon (Cahyaningsih, dkk., 2009). Selain itu senyawa flavonoid yang memiliki fungsi lain yaitu dapat berfungsi sebagai antibakteri, antivirus, antialergi dan antikanker (Miller, 1996). Flavonoid memiliki kerangka karbon yang tersusun dari dua cincin benzena tersubstitusi yang terhubung oleh rantai alifatik tiga karbon seperti pada Gambar 2.4 berikut (Wahyulianingsih, dkk., 2015).



Gambar 2.4 Struktur Flavonoid

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada berbagai bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, akar dan kulit batang (Ningrum, dkk., 2016). Alkaloid memiliki banyak manfaat seperti pada farmakologi yaitu sebagai antiinflamasi, antimikroba, hepatoprotektor, antikanker dan meningkatkan efek antioksidan sel (Untoro, dkk., 2016). Alkaloid termasuk senyawa metabolit sekunder yang sebagian besar bersumber dari tumbuh-tumbuhan terutama angiosperm (Wink, 2008). Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen seperti pada Gambar 2.5 berikut (Mangunwardoyo, dkk., 2009).



Gambar 2.5 Struktur Alkaloid


Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang berasal dari biointesa flavonoid (Marhakam, 1998). Senyawa tanin banyak dijumpai tumbuhan hijau di Indonesia baik pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Tanin termasuk senyawa polifenol alami yang mengandung gugus hidroksil fenolik dan karboksil dengan bobot molekul 300-5000 Dalton (Mangunwardoyo, dkk., 2009). Sifat utama tanin dapat berinteraksi dengan protein membentuk ikatan yang kuat. Tanin yang terdapat pada tumbuhan dapat berfungsi sebagai pertahanan tanaman terhadap serangga (Indawati, dkk., 2017). Tanin merupakan senyawa polifenol yang dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi seperti pada Gambar 2.6 berikut (Soenardjo dan Supriyanti, 2017).



Gambar 2.6 Struktur Tanin

Steroid merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang memiliki empat cincin kerangka dasar karbon yang menyatu (Nasruddin, dkk., 2017). Steroid memiliki aktivitas bioinsektisida, antibakteri, antifungi dan antidiabetes (Wiarsih, dkk., 2017). Steroid dalam tubuh berperan penting dalam menjaga kesetimbangan garam, mengendalikan metabolisme dan dapat meningkatkan fungsi organ seksual

(Nasrudin, dkk., 2017). Tubuh manusia memproduksi steroid secara alami yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme, seperti steroid dari garam deoksikolik, asam kholik dan glisin serta konjugat yang dapat berfungsi memperlancar proses pencernaan. Adapun struktur steroid seperti pada Gambar 2.7 berikut (Bhawani, dkk., 2011).



Gambar 2.7 Struktur Steroid

Senyawa saponin merupakan golongan metabolit sekunder yang terdapat di alam yang memiliki gugus aglikon atau sapogenin (Mardiana, 2012). Glikosida pada saponin terdiri dari senyawa hasil kondensasi suatu gula dengan senyawa hidroksil organik yang apabila dihidrolisis menghasilkan glikon dan aglikon. Struktur saponin memiliki sifat seperti sabun sehingga disebut sebagai surfaktan alami (Calabria, 2008). Saponin pada tumbuhan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi.

E. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan salah satu proses pemisahan yang umumnya digunakan untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu pelarut. Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi berfungsi untuk mengekstraksi substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya (Sulihono, dkk., 2012). Larutnya zat aktif menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dan pelarut organik yang terdapat pada bagian luar sel. Perbedaan tersebut akan menyebabkan larutan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang hingga terjadi keseimbangan

antara konsentrasi zat aktif dalam dan di luar sel (Rusmiati, 2010). Proses ekstraksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tipe persiapan sampel, waktu ekstraksi, kuantitas pelarut suhu pelarut dan tipe pelarut.

Mukhriani (2014), bahwa secara umum terdapat berbagai jenis ekstraksi. Jenis-jenis tersebut sebagai berikut.

1. Maserasi

Maserasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam melakukan ekstraksi. Metode ini menggunakan suhu kamar dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut ke dalam wadah inert dan tertutup rapat. Ketika terjadi keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman maka proses ekstraksi dapat dihentikan. Selanjutnya melakukan proses penyaringan untuk memisahkan sampel dari pelarut. Kekurangan dari metode maserasi adalah memerlukan waktu yang lama dan kemungkinan besar senyawa hilang.

2. Perkolasi

Metode ini dilakukan dengan serbuk sampel yang telah dibasahi dimasukkan ke dalam perkolator secara perlahan. Kemudian menambahkan pelarut dari atas dan dibiarkan menetes secara perlahan hingga pada bagian bawah. Kelebihan dari metode perkolasi adalah mengalir sampel dengan pelarut baru, sedangkan kekurangan dari metode ini adalah jika sampel dalam perkolator tidak dalam keadaan homogen maka pelarut akan sulit menjangkau selalu area. Kekurangan lain dari metode ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan pelarut yang cukup banyak.

3. Soxhlet

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk sampel dalam selulosa dengan menggunakan kertas saring dalam slonsong yang ditempatkan diatas labu dibawah kondensor. Memasukkan pelarut yang sesuai ke dalam labu dan suhu penangas diatur dibawah suhu reflux. Keuntungan dari metode reflux adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kekurangan dari metode ini adalah dapat terjadi proses degradasi pada senyawa yang bersifat termolabil karena ekstrak yang dipeoleh terus-menerus berada pada titik didih.

4. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama yang biasa digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial. Proses pemanasan, uap erkondensasi dan destilat terpisah sebagai dua bagian yang tidak saling bercampur ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kekurangan dari metode ini adalah dapat terjadi proses degradasi pada senyawa yang bersifat termolabil.

F. *Viskometer Brookfield*

Viskometer Brookfield merupakan salah satu jenis alat viskometer yang yang terbuat dari tabung kapiler yang digunakan dalam pengukuran viskositas suatu zat (Apriyanti dan Fithiriyah, 2013: 8). Viskometer Brookfield merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran viskositas dengan menggunakan kumparan atau gasing. Gasing atau kumparan tersebut dicelupkan ke dalam zat yang akan diuji. Selain itu, viskometer Brookfield dapat pula mengukur tahanan gerak dari bagian yang berputar seperti pada Gambar 2.8 berikut.



Gambar 2.8 Viskometer Brookfield

Viskometer Brookfield mempunyai prinsip kerja tergantung dari viskositas zat yang akan diuji. Semakin tinggi viskositas zat maka semakin kuat putaran dan semakin tinggi pula hambatan dari zat yang diuji (Setiawan, 2020: 71). Apriyanti dan Fithriyah (2013), menyatakan bahwa pengukuran viskometer Brookfield dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Memasang spindle pada gantungan spindle
2. Turunkan spindle sedemikian rupa sehingga batas tercelup ke dalam cairan sampel yang akan diukur
3. Pasang stop kontak
4. Dinyalakan rotor sambil menekan tombol
5. Biarkan spindle berputar sekitar 60 detik
6. Setelah berhenti berputar catat hasil viskositas tersebut sesuai dengan identitas variabel tersebut.

Penelitian Nurrachman (2015), menyatakan bahwa nilai pengukuran dengan menggunakan visometer Brookfield nilai viskositasnya diperoleh dengan mengukur gaya punter sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam sampel. Teknik pengukuran viskometer Brookfield menggunakan teknik viskometri, yang dapat

mengukur kekentalan melalui kondisi aliran sampel. Untuk mengukur viskositas sampel dengan viskometer Brookfield bahan harus diam didalam wadah sementara poros bergerak dalam cairan.

G. pH Meter

pH meter merupakan alat yang biasa digunakan dalam menentukan derajat keasaman suatu larutan. Sistem pengukuran yang digunakan dalam pH meter adalah menggunakan sistem potensiometri. pH meter terdapat elektroda kerja yang terhubung ke alat elektronik sehingga dapat menampilkan nilai pH seperti pada Gambar 2.9 berikut (Ngafifuddin dan Sunarso, 2017: 67).



Gambar 2.9 pH meter

Prinsip kerja dari pH meter adalah mengukur jumlah ion H_3O^+ dalam larutan yang terletak pada elektroda kaca (Azmi, dkk., 2019: 63). pH meter juga terdapat elektroda referensi yang kedua elektroda tersebut terendam ke dalam media ukur yang sama. Elektroda referensi berfungsi untuk memberikan rangkain listrik pH meter. pH meter mempunyai prinsip utama pengukuran arus listrik yang tercatat pada sensor pH akibat suasana ionik dalam larutan. Adapun keuntungan menggunakan pH meter adalah pemakaiannya bisa berulang-berulang dan nilai pH relatif cukup akurat.

H. *Fourier Transform Infra-Red (FTIR)*

FTIR merupakan instrumen yang dapat menentukan karakteristik gugus fungsi (Heryanto, dkk., 2015). Cara kerja dari FTIR adalah melakukan identifikasi pada zat yang akan diukur. Zat yang akan diukur akan berbentuk atom atau molekul. Sinar merah yang berperan sebagai sumber sinar dibagi menjadi dua berkas satu dilewatkan melalui sampel dan yang lain melalui pembanding. Setelah melalui prisma atau *grating*, berkas akan jatuh pada detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian direkam oleh detektor (Farid, dkk., 2017). Prinsip kerja dari FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi infra merah terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan dikuantifikasikan (Sankari, 2010).

FTIR (Gambar 2.10) umumnya banyak dimanfaatkan dalam analisa berbagai produk pangan karena mempunyai daya analisa yang relatif cepat dan hasil pengukuran yang akurat (Hashim, dkk., 2010). Selain itu, FTIR mampu membedakan spektrum dari dua sampel yang berbeda berdasarkan karakteristik struktur intramolekulnya yang mempunyai kemampuan menyerap cahaya. Cahaya yang diserap dari suatu senyawa akan berbeda bergantung pada sifat fisikokimia, ikatan antar atom dalam senyawa dan karakteristik gugus fungsinya (Kumosinski dan Farell, 1993).



Gambar 2.10 *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

Adapun salah satu hasil pengujian FTIR ditunjukkan pada Tabel 2.1, yang merupakan daerah serapan IR sitronellal (Navitania dan Hanifah, 2019).

Tabel 2.1 Daerah Serapan IR Sitronellal

Gugus fungsi	Nilai serapan (cm^{-1})
OH	3433.38
CH-Alifatik	2961.30
CH-Aldehid	2712.41
C=O karbonil	1724.23
C=C Aromatik	1627.38
CH ₂	1456.03
CH ₃	1377.12

(Navitania Hanifah, dkk. 2019)

Teknik spektrofotometri IR dapat digunakan dalam dua varian yaitu transmisi dan reflektansi. Sulistyani dan Nuril (2018), menyatakan bahwa transmisi digunakan dalam pengukuran radiasi IR volume sampel dalam bentuk padat, cair dan gas dengan prosedur yang tepat. Gas dan cairan ditempatkan dalam kuvet khusus dengan jendela, terbuat dari bahan tranparan untuk radiasi IR. Spektrum padatan diukur dengan menggunakan KBr, NaCl. Varian reflektansi merupakan varian pengembangan dari pembacaan FTIR yang disebut dengan *attenuated total reflectance* yang digunakan dalam menguji berbagai jenis sampel. *Attenuated total reflectance* menggunakan fenomena refleksi radiasi IR dari optik dilewatkan pada tengah prisma tipis. Sampel

ditempatkan pada permukaan prisma IR transparan dengan indeks bias yang lebih tinggi dari sampel.

Spektroskopi inframerah terdiri dari susunan perangkat optik yang berfungsi untuk menghasilkan spektrum. Spektrum tersebut dapat menunjukkan kandungan kimiawi. Rangkaian elektronika mendukung sistem peralatan berjalan secara otomatis. Mengirim data ke komputer untuk diproses lebih lanjut yang hasil dapat ditampilkan. Bagian softwar dapat membantu kerja dari *hardware* agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk proses identifikasi (Sofjan dan Suseno, 2008).

Rangkaian elektronika terdiri dari beberapa bagian utama yaitu *power supply* sebagai penyedia tegangang pada semua perangkat elektronik, penguat tegangang pada detektor IR, ADC (*analog to digital coverter*) yang dapat mengubah data analog dari detektor menjadi data digital. Bagian optik dari spektroskopi infra merah terdiri dari beberapa bagian yaitu interferometer yang dapat mengubah cahaya inframerah yang polikromatik menghasilkan beberapa berkas cahaya membentuk sinyal interferogram (Sofjan dan Suseno, 2008).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2020 di Laboratorium Fitokimia Akademik Farmasi Yamasi Makassar, Laboratorium Biofarmaka Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Laboratorium Farmasetika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Kimia Fisika, Labortorium Kimia Organik dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Spektrofotometer Infra Red (FTIR) Thermo Fisher Scientific IS50*, *rotary evaporator* merk RE 100-Pro D-Lab, neraca analitik merk Kern ABJ, viskometer Brookfield tipe RVT (VM-BF-RV-01), pH meter merk Lutron, *hotplate*, blender merk Kirin, gelas ukur 10 mL, gelas kimia (50 mL, 100 mL, 250 mL dan 450 mL) Erlenmeyer 50 mL, tabung reaksi, plat tetes, kaca arloji, cawan petri, mortal dan lumpang, wadah maserasi, wadah ekstrak, pipet tetes dan gegep.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aquades (H_2O), asam klorida (HCl) p.a 2 N, besi (III) klorida ($FeCl_3$) 5%, daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC), etanol (C_2H_5OH) 96%, *Hydroxyprophyl methylcellulose* ($CH_3CH(OH)CH_2$), kertas saring, *methyl paraben* ($C_8H_8O_3$), natrium lauril sulfat,

pereaksi Dragendorff, pereaksi Mayer, pereaksi Liebermann-Burchard dan pereaksi Wagner.

C. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Persiapan sampel dilakukan dengan mengambil sampel daun jeruk purut di Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Setelah itu, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan suhu ruang. Selanjutnya, dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah itu, ditimbang sebanyak 1 kilogram dan dimasukkan kedalam wadah maserasi. Kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sampai terendam dalam wadah tertutup selama 24 jam. Selanjutnya filtrat disaring dengan kain kasa dan ampas direndam kembali dengan pelarut etanol 96% yang baru. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat dikumpulkan dan diuapkan pada rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental (Prijadi, 2014).

2. Skrining fitokimia

Skrining fitokimia berfungsi untuk mengetahui kandungan-kandungan metabolit sekunder pada sampel (Sukma, dkk., 2019). Cara ujinya adalah sebagai berikut:

- a. Uji flavonoid dilakukan dengan diambil ekstrak daun jeruk purut sebanyak 3 tetes. Kemudian dimasukkan dalam plat tetes dan ditambahkan FeCl_3 5%. Diamati perubahan warnanya.
- b. Uji Saponin dilakukan dengan cara diambil ekstrak daun jeruk purut sebanyak 2 mL. Kemudian ditambahkan air sebanyak 10 mL, lalu dikocok dengan kuat. Jika busa atau buih bertahan dalam 10 menit maka menandakan adanya saponin.

- c. Uji Tanin dilakukan dengan diambil ekstrak daun jeruk purut sebanyak 3 tetes. Kemudian dimasukkan ke dalam plat tetes. Setelah itu menambahkan 2 tetes larutan besi (III) klorida (FeCl_3) 1%, lalu diamati perubahan warna. Apabila larutan berubah warna menjadi biru/hijau kehitaman maka senyawa tanin terdapat dalam sampel.
- d. Uji Alkaloid dilakukan dengan diambil ekstrak daun jeruk purut sebanyak 3 tetes. Kemudian dimasukkan kedalam plat tetes lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer, pereaksi Wagner dan pereaksi Dragendroff dan diamati perubahan warna
- e. Uji terpenoid dilakukan dengan dimasukkan 3 tetes ekstrak daun jeruk purut ke dalam plat tetes. Kemudian ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard. Diamati perubahan warnanya.

3. Pengujian menggunakan FTIR

Ekstrak daun jeruk purut diambil sebanyak ± 10 mg. Kemudian ditambahkan KBr ± 100 mg. Setelah itu, digerus dalam lumpang. Selanjutnya, sampel dibentuk pellet dengan menggunakan cetakan. Kemudian pellet ditempatkan pada spektrofotometer FTIR dan dianalisis dengan panjang gelombang $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$. Setelah itu, hasil analisis diidentifikasi senyawa sitronellal berdasarkan bilangan gelombang dan gugus fungsinya (Timung, dkk., 2016).

4. Formulasi Pembuatan Sampo

Pembuatan sampo anti kutu dilakukan dengan cara ditimbang metil paraben 0,075 gram, *hidroksi propil methyl cellulose* (HPMC) ditimbang sebanyak 0,5 gram dan natrium lauril sulfat sebanyak 2 gram. Kemudian dipanaskan akuades sebanyak 40 mL hingga mendidih. Selanjutnya dimasukkan natrium lauril sulfat ke dalam air

yang telah dipanaskan hingga larut dan dimasukkan *hidroksi propil methyl cellulose* (HPMC) dan digerus hingga larut (formula 1). Dilarutkan metil paraben dengan etanol dalam jumlah yang sedikit hingga larut (formula 2). Dicampuran formula 1 dan 2 dan dihomogenkan (formula 3). Dimasukkan ekstrak etanol daun jeruk purut ke dalam formula 3 lalu diaduk sampai homogen dan didinginkan. Dimasukkan formula 3 ke dalam gelas kimia lalu dihimpitkan menjadi 50 mL. Adapun formula pembuatan sampo ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Formula Sampo Anti Kutu

No	Bahan	Formulasi (% b/v)					Khasiat
		F0	F1	F2	F3	F4	
1.	Ekstrak daun jeruk purut	0	3	5	7	9	Zat aktif
2.	Natrium lauril sulfat	4	4	4	4	4	Surfaktan
3.	HPMC	1	1	1	1	1	Basis
4.	Metil Paraben	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	Pengawet
5.	Akuades sampai	50	50	50	50	50	Pelarut

Keterangan:

F0: Formulasi 0% ekstrak daun jeruk purut

F1: Formulasi 3% ekstrak daun jeruk purut

F2: Formulasi 5% ekstrak daun jeruk purut

F3: Formulasi 7% ekstrak daun jeruk purut

F4: Formulasi 9% ekstrak daun jeruk purut

5. Uji Karakteristik Sediaan Sampo

Uji karakteristik pada sediaan sampo (Fauziah dan Yamaesa, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Uji organoleptik berupa identifikasi sediaan sampo dengan melihat wujud, warna, dan aroma.

- b. Uji homogenitas dilakukan dengan dikocok sediaan sampo sedemikian rupa lalu diamati homogen atau tidaknya sediaan sampo yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan (Sitompul, dkk., 2016).
- c. Uji kestabilan pH dilakukan dengan ditimbang ekstrak sampel sebanyak 1,00 gram. Kemudian dilarutkan dalam 10 mL aquades lalu dilakukan pengukuran dengan pH meter digital yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan.
- d. Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brookfield dengan *spindle* nomor 6 menggunakan 50 rpm dalam 100 mL.
- e. Uji tinggi busa dilakukan dengan menggunakan tabung reaksi, lalu dimasukkan sampo ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,1 gram. Kemudian ditambahkan aquades sebanyak 10 mL dan digocok tabung reaksi selama 20 detik.

6. Uji Efektivitas Anti kutu

Pengujian efektivitas anti kutu dilakukan dengan disiapkan kertas saring seukuran cawan petri. Kemudian ditetesi dengan 0,5 mL sampo secara merata. Setelah itu, dimasukkan 5 ekor kutu kepala kedalam cawan petri lalu ditutup dan diamati setiap 5 menit selama 2 jam sebanyak 3 kali (Sayekti, dkk., 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Pembuatan sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu ekstraksi sampel, skrining fitokimia, analisis menggunakan FTIR, uji karakteristik sampo dan uji efektivitas kutu. Adapun hasil penelitian diperoleh sebagai berikut.

1. Skrining Fitokimia

Tabel 4.1 Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Pemeriksaan Komponen	Reagen	Hasil Pengamatan	Keterangan
Flavonoid	FeCl ₃ 5%	Coklat kehitaman	Positif
Saponin	Akuades	Terdapat buih	Positif
Terpenoid	Liebermann-Burchard	Cincin hijau kebiruan	Positif
Tanin	FeCl ₃ 1%	Biru Kehitaman	Positif

2. Hasil Identifikasi Gugus Fungsi Menggunakan FTIR

Tabel 4.2 Daerah Serapan FTIR Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Pemeriksaan Komponen	Daerah Serapan (cm ⁻¹)	Referensi	Ikatan dan Jenis Gugus Fungsi
	2926.30	2914.10	-CH- Alifatik
	2854.75	2857.89	-CH- Aldehid
Sitronellal	1732.65	1724.23	-C=O Karbonil
	1627.38	1632.98	-C=C Aromatik
	1456.03	1548.1	-CH ₂
	1379.01	1377.24	-CH ₃

(Navitania Hanifah, dkk., 2019).

3. Karakteristik Sediaan Sampo

Tabel 4.3 Karakteristik sediaan sampo Anti Kutu Rambut

No.	Karakteristik	Sampo Anti Kutu Rambut				
		0	3	5	7	9
1	Organoleptik:					
	-Warna	Bening	Hijau Kehitaman	Hijau Kehitaman	Hijau Kehitaman	Hijau Kehitaman
	-Wujud	Cairan Kental	Cairan Kental	Cairan Kental	Cairan Kental	Cairan Kental
	-Bau	Tidak Berbau	Khas Daun Jeruk Purut	Khas Daun Jeruk Purut	Khas Daun Jeruk Purut	Khas Daun Jeruk Purut
2.	Homogenitas	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
3.	Tinggi busa	4 ± 0	4,8 ± 0,5	5,2 ± 0,2	5,5 ± 0,4	6,7 ± 0,3
4.	pH	7,1 ± 0,14	5,85 ± 0,03	5,81 ± 0,01	5,74 ± 0,015	5,70 ± 0,015
5.	Viskositas	100 cP	300 cP	3200	4600cp	6000cP

4. Efektivitas Anti Kutu

Tabel 4.4 Efektivitas Sampo Anti Kutu Rambut

Sampo	Jumlah Kutu	Waktu Mati (Menit)						Jumlah Kutu yang Mati
		5	10	15	20	25	30	
F0	5	-	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1	1
F1	5	1	1	1	1	1	-	5
		1	1	1	1	1	-	5
		1	1	-	3	-	-	5
F2	5	1	3	1	-	-	-	5
		1	3	1	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
F3	5	4	1	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
F4	5	5	-	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
		-	-	-	-	-	-	-
Aquades	5	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	1	1	1	5
Peditox	5	2	3	-	-	-	-	5
		1	1	1	2	-	-	5
		-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

F0 Formulasi 0% ekstrak daun jeruk purut

F1 Formulasi 3% ekstrak daun jeruk purut

F2 Formulasi 5% ekstrak daun jeruk purut

F3 Formulasi 7% ekstrak daun jeruk purut

F4 Formulasi 9% ekstrak daun jeruk purut

B. Pembahasan

1. Ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC)

Penelitian ini diawali dengan tahap preparasi sampel daun jeruk purut. Tahap preparasi bertujuan untuk menyiapkan simplisia yang akan digunakan yang kemudian akan disortasi. Tahap sortasi berfungsi untuk memisahkan simplisia yang layak untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Sortasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sortasi basah yang dapat memisahkan simplisia dari zat lain. Melakukan tahap pencucian pada sampel berfungsi untuk memisahkan simplisia dari pengotor. Proses pengeringan berfungsi menghilangkan kadar air yang terkandung dalam sampel sehingga mudah digunakan dalam proses ekstraksi dan dapat mengurangi terjadinya reaksi enzimatis yang dapat menjaga kualitas simplisia. Menghaluskan daun jeruk purut berfungsi untuk memudahkan pelarut untuk masuk ke dalam sel agar dapat menarik zat aktif yang terkandung dalam simplisia yang selanjutnya akan melalui tahap maserasi (Bintoro, dkk., 2017).

Prinsip kerja dari maserasi adalah merendam serbuk daun jeruk purut dengan pelarut etanol 96%. Etanol merupakan pelarut organik yang memiliki sifat semi polar. Etanol digunakan dalam proses perendaman karena dapat mengekstraksi senyawa polar maupun non polar. Selain itu, keberadaan dua gugus dari etanol, gugus hidroksil dan gugus alkil menyebabkan etanol memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Gugus

hidroksil memiliki sifat polar, gugus alkil memiliki sifat non polar. Adanya dua gugus tersebut menyebabkan etanol dapat digunakan untuk mengekstrak senyawa yang berbeda tingkat kepolarannya (Kristiani dan Halim, 2014).

Selain itu, pada proses perendaman pelarut akan menembus dinding sel simplisia yang dapat menyebabkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam daun jeruk purut akan terdesak keluar. Hal ini, karena perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Larutan dengan konsentrasi yang tinggi digantikan oleh cairan penyari hingga kedua larutan mencapai konsentrasi yang seimbang dan menghasilkan ekstrak pekat. Ekstrak pekat hasil dari proses maserasi selanjutnya akan dimasukkan dalam rotavapor untuk menghasilkan ekstrak kental. Prinsip kerja dari rotavapor adalah menguapkan pelarut ekstraksi dan memisahkan uap air yang terlarut dalam cairan sehingga akan menghasilkan ekstrak kental (Reo, dkk., 2017).

2. Senyawa Metabolit Sekunder Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak daun jeruk. Pengujian dilakukan dengan mengambil 2 mL ekstrak yang diencerkan dengan pelarut etanol 96%. Hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan flavonoid pada ekstrak. Ekstrak yang direaksikan dengan larutan FeCl_3 5% (besi III klorida) ditandai dengan perubahan warna pada ekstrak menjadi warna hitam kecoklatan (Nugrahaningtyas, dkk., 2005).


Pengujian senyawa saponin dengan pelarut akuades ditemukan adanya buih pada ekstrak daun jeruk purut. Buih yang terdapat pada saponin menunjukkan bahwa saponin merupakan senyawa yang disebut sebagai surfaktan alami, sehingga sifatnya mirip dengan detergen. Saponin merupakan pelarut polar sehingga dapat larut dalam

pelarut air. Selain memiliki sifat polar, saponin juga memiliki sifat non polar, karena memiliki gugus hidrofob yaitu saponin (Agusitna, dkk., 2017). Pengujian senyawa terpenoid dilakukan dengan menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard yang ditandai dengan terbentuknya cincin hijau kebiruan pada ekstrak. Pengujian senyawa tanin dilakukan dengan menggunakan pereaksi besi (III) klorida 1% yang ditandai dengan perubahan warna kehitaman pada ekstrak etanol daun jeruk purut yang menandakan bahwa pada ekstrak terdapat senyawa tanin. Penelitian Agus dkk (2104), melaporkan bahwa ekstrak daun jeruk purut mengandung senyawa flavonoid, terpenoid, saponin dan tanin.

3. Hasil uji FTIR

Fourier transform infra red merupakan instrumen yang dapat mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi infra merah yang dilakukan terhadap suatu senyawa. Dilakukan pengujian FTIR terhadap ekstrak daun jeruk purut untuk mengetahui informasi terkait gugus fungsi yang terkandung dalam ekstrak daun jeruk purut. Adapun hasil analisis pengujian FTIR ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 4.1 Spektrum FTIR Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC)

Berdasarkan hasil analisis ekstrak daun jeruk purut dengan menggunakan FTIR, menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder (sitronellal) yang memiliki potensi terhadap mortalitas kutu. Gugus fungsi citronellal pada hasil pembacaan FTIR, diantaranya gugus CH-alifatik pada panjang gelombang 2926.30 cm⁻¹ gugus CH-aldehid pada panjang gelombang 2854.75 cm⁻¹, gugus C=O karbonil dengan panjang gelombang 1732.65 cm⁻¹, gugus C=C aromatik pada panjang gelombang 1627.38 cm⁻¹, gugus CH₂ pada panjang gelombang 1456.03 cm⁻¹ dan gugus CH₃ pada panjang gelombang 1379.01.63 cm⁻¹ (Navitania, dkk., 2019).

4. Sampo ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC)

Pembuatan sampo pada penelitian ini menggunakan ekstrak daun jeruk purut. Ekstrak daun jeruk purut berfungsi sebagai bahan aktif yang akan memberikan pengaruh pada mortalitas kutu. Selain itu, bahan lain yang digunakan dalam

pembuatan sampo anti kutu rambut ekstrak daun jeruk purut adalah HPMC yang memiliki fungsi dalam memberikan aliran pseudoplastis dengan viskositas tinggi, namun mudah dituang serta jernih. Penelitian Faizatun (2008), melaporkan bahwa HPMC dapat berfungsi sebagai pengental dengan memperkuat dinding sehingga memperlambat kecepatan dalam mengalir. HPMC memiliki struktur yang dapat mengentalkan sediaan sampo sehingga memperlambat kemampuan mengalir sampo. Selain HPMC bahan lain yang digunakan dalam pembuatan sampo adalah natrium lauril sulfat dan metil paraben.

Natrium lauril sulfat pada sediaan sampo anti kutu rambut ekstrak daun jeruk purut berfungsi sebagai surfaktan yang dapat menghasilkan busa. Penelitian Ramadany (2002), menyatakan bahwa natrium lauril sulfat dapat membentuk busa karena adanya mikro emulsi, membuat minyak larut mampu membuat tegangan permukaan menjadi turun. Selain itu, natrium lauril sulfat dapat menstabilkan bentuk gel dari sampo, karena memiliki fungsi sebagai pengemulsi. Berfungsi juga meningkatkan pH menjadi netral karena memiliki sifat sebagai basa kuat (Budiman, dkk., 2015). Penelitian Showell (2006), melaporkan bahwa keunggulan natrium lauril sulfat adalah dapat membersihkan, mempunyai kestabilan kimia dan harga yang ekonomis sehingga digunakan dalam pembuatan sampo. Mekanisme kerja natrium lauril sulfat dalam mengikat kotoran adalah dengan menurunkan tegangan antarmuka kemudian membentuk kompleks kotoran surfaktan yang akan ditransfortasikan keluar dari permukaan.

Penggunaan metil paraben berfungsi sebagai pengawet. Hal tersebut berfungsi untuk mencegah dan menghambat pertumbuhan mikroorganismenya karena cara penggunaannya bersentuhan langsung dengan kulit manusia. Keberadaan

mikroorganisme pada kulit kepala dapat membuat iritasi pada kulit kepala. Penelitian Suryati dan Saptarini (2016), menyatakan bahwa penggunaan metil paraben dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur.

5. Karakteristik sediaan sampo

Uji karakteristik sediaan sampo meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji kestabilan pH, uji viskositas dan uji tinggi busa. Dilakukan pengujian karakteristik pada sediaan sampo untuk mengetahui apakah sampo yang dihasilkan sesuai dengan aturan SNI tentang syarat-syarat sampo yang baik. Mitsui (1997), melaporkan bahwa syarat sampo yang baik adalah sampo yang memiliki kemampuan membersihkan yang baik, menghasilkan busa yang banyak dan tahan lama, melindungi rambut dari gesekan selama pencucian atau keramas dan aman bagi kulit kepala, rambut dan mata.

Pengujian organoleptik merupakan salah satu parameter fisik untuk mengetahui kestabilan sampo. Analisis organoleptik dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, bau dan warna dari sampo, karena warna yang menarik dan bau yang tidak tengik berkaitan dengan kenyamanan konsumen saat penggunaan sampo. Adapun hasil penelitian untuk analisis organoleptik sampo dari ekstrak daun jeruk purut dengan konsentrasi 0% didapatkan sampo memiliki warna bening, tidak memiliki aroma dan memiliki wujud kental. Sampo dengan konsentrasi 3% 5% 7% dan 9% menunjukkan warna sampo hijau kehitaman, cairan kental dan berbau ciri khas daun jeruk purut. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak pada sampo daun jeruk purut menunjukkan semakin pekat warna sampo yang dihasilkan. Disamping itu, semakin kental wujud sampo serta semakin khas aroma daun jeruk purut yang dihasilkan. Penelitian Citraningtyas (2017), menyatakan bahwa semakin tinggi zat

aktif yang ditambahkan dalam sediaan sampo maka semakin kuat aroma dan semakin pekat warna yang dihasilkan pada sampo.

Uji homogenitas sampo bertujuan untuk mengetahui keseragaman dan susunan yang homogen dalam sediaan sampo. Sediaan sampo yang baik yaitu tercampurnya atau terdispersinya semua bahan secara sempurna. Tujuan lain dilakukan pengujian homogenitas adalah untuk melihat apakah dalam sediaan sampo terdapat partikel kasar dan apakah komponen yang digunakan tercampur dengan merata. Adapun hasil penelitian menunjukkan sampo ekstrak daun jeruk purut pada konsentrasi 0%: 3%: 5%: 7% dan 9% memiliki homogenitas yang baik. Hal tersebut ditandai dengan tidak ditemukannya butiran-butiran kasar pada tiap konsentrasi sampo. Hasil yang diperoleh sampo sesuai dengan ketentuan SNI 06-2692-1992, yang menyatakan bahwa sampo yang baik adalah sampo yang memiliki bentuk cair atau tidak ada yang mengendap.

Uji pH pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat keasaman pada sampo ekstrak daun jeruk purut. Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH digital. Dilakukan pengujian pH untuk mengetahui keamanan sediaan saat digunakan agar tidak menimbulkan iritasi kepala, karena penggunaanya kontak langsung dengan kulit kepala. Adapun hasil penelitian menunjukkan sampo ekstrak daun jeruk purut pada konsentrasi 0%, 3% 5% 7% dan 9% menghasilkan pH berturut-turut $7,1 \pm 0,14$; $5,85 \pm 0,03$; $5,81 \pm 0,01$; $5,74 \pm 0,015$ dan $5,70 \pm 0,015$. Semakin tinggi konsentrasi sampo ekstrak daun jeruk purut maka pH yang dihasilkan semakin asam. Penelitian Mondala, dkk (2017), melaporkan bahwa penurunan pH pada penambahan konsentrasi ekstrak disebabkan oleh zat aktif yang terkandung semakin besar sehingga nilai pH semakin asam. Meskipun pH sampo ekstrak daun

jeruk purut mengalami penurunan pH namun masih memenuhi SNI sampo No.06-2692-1992 yaitu harus dalam rentang pH 5,0-9,0.

Uji tinggi busa pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sampo ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) menghasilkan busa. Busa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan sampo. Hal ini dikarenakan busa dapat mempertahankan keberadaan sampo pada rambut, membuat rambut mudah dicuci dan mencegah batangan-batangan rambut menyatu yang dapat mengakibatkan kusut (Malonda, dkk., 2017).

Adapun hasil penelitian menunjukkan tinggi busa pada konsentrasi 0%: 3%: 5%: 7% dan 9% berturut-turut 4 ± 0 : $4,8 \pm 0,5$: $5,2 \pm 0,2$: $5,5 \pm 0,4$ dan $6,70 \pm 0,3$. Munculnya busa pada tiap konsentrasi sampo dikarenakan terdapatnya kandungan saponin pada sampel (Sitompul, 2016). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak sampo maka tinggi busa yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh surfaktan, yang merupakan bahan aktif dalam sampo yang memiliki fungsi sebagai penghasil busa. Selain itu, busa memiliki sifat yang mudah larut dalam air sehingga pada saat pengocokan busa akan muncul. Tinggi busa yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai penelitian Willkison dan More (1982), menyatakan tinggi busa yaitu 1,3-22cm.

Viskositas adalah tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Viskositas yang tinggi menandakan tahanan cairan yang diujikan semakin tinggi. Pengujian viskositas dilakukan untuk melihat kekentalan dalam sampo ekstrak daun jeruk purut. Pengukuran viskositas pada sampo ekstrak daun jeruk purut menggunakan spindle 6 dengan kecepatan 50 rpm. Sediaan sampo diletakkan dibawah spindle kemudian diturunkan sedikit demi sedikit hingga batas bawah sediaan. Adapun hasil pengujian

viskositas pada sediaan sampo pada konsentrasi 0%, 3%, 5%, 7%, 9% diperoleh berturut-turut 100 cP: 300 cP: 3200 cP: 4600 cP dan 6000 cP.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi pada sampo ekstrak daun jeruk purut memiliki pengaruh terhadap viskositas. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin sedikit air dalam sampo dan bobot jenis semakin tinggi sehingga viskositas sampo semakin tinggi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat disimpulkan viskositas sampo yang baik terdapat pada sampo ekstrak daun jeruk purut pada konsentrasi 5%. Hasil ini sesuai dengan aturan SNI yang menyatakan bahwa viskositas sampo yang baik memiliki nilai dengan rentang 400-4000 cP (centipoise) dan memenuhi spesifikasi yang mudah dituang ke telapak tangan dan mudah ditumpah.

6. Uji Efektivitas Anti Kutu

Pengujian efektivitas anti kutu dari sediaan sampo ekstrak daun jeruk purut dilakukan dengan menggunakan kertas saring yang diletakkan dalam cawan petri. Setiap pengujian konsentrasi dilakukan dengan menggunakan 5 ekor kutu. Hasil penelitian menunjukkan untuk kontrol positif peditox dengan kandungan permethrin 1% menghasilkan kematian 100% pada kutu. Kontrol negatif sampo dengan akuades didapatkan tidak terjadi kematian pada kutu.

Hasil penelitian menunjukkan sampo dengan konsentrasi 0% ekstrak hanya dapat memberikan kematian pada 1 ekor kutu. Berbeda dengan sampo pada konsentrasi 3%, 5%, 7% dan 9% dapat menghasilkan kematian total kutu. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka efektivitas kutu akan semakin baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh zat ekstraktif atau kandungan senyawa

metabolik sekunder semakin banyak yang terkandung dalam sediaan sampo ekstrak daun jeruk purut.

Kandungan utama dalam ekstrak daun jeruk purut yang dapat mematikan kutu adalah sitronellal. Penelitian Singgih (2016), melaporkan bahwa sitronellal memiliki fungsi sebagai racun *desiccant*. Racun akan membuat tubuh serangga kehilangan cairan terus menerus sehingga mati kekeringan. Seanong (2006), menyatakan bahwa kekurangan cairan pada serangga dapat membuat kematian pada serangga. Racun akan masuk melalui kontak dengan kulit ke dalam badan serangga dengan perantara jari-jari dipermukaan yang mengandung residu insektisida.

Kandungan lainnya yang dapat berpengaruh terhadap mortalitas kutu adalah adanya kandungan senyawa metabolit sekunder pada ekstrak daun jeruk purut. Penelitian Unzilla Rahmi dkk (2013), melaporkan bahwa ekstrak daun jeruk purut memiliki efek farmakologis sebagai antiseptik dan sangat aktif bertindak sebagai antioksidan dan antibakteri. Penelitian Amin dkk (2016), menyatakan bahwa daun jeruk purut mengandung senyawa metabolit sekunder dapat digunakan sebagai anti serangga. Sastrodihardjo (1999), melaporkan bahwa kandungan zat ekstraktif senyawa metabolit sekunder dapat memiliki peran dalam kematian kutu karena dapat menghambat sintesis protein. Penelitian Syafii (2000), menyatakan bahwa senyawa bioaktif dapat mematikan protozoa yang ditemukan dalam bagian perut serangga. Protozoa dapat menghancurkan selulosa yang tidak dapat dihancurkan oleh enzim, sehingga dengan kematian dari protozoa dapat pula menyebabkan kematian pada serangga. Penelitian Noverita dkk (2014), menyatakan bahwa kandungan senyawa metabolit sekunder dari daun jeruk purut dapat mematikan kutu disebabkan karena adanya aroma khas pada daun jeruk purut. Kandungan lain dalam jeruk purut yang

dapat mematikan kutu adalah limonoid. Limonoid dapat mematikan kutu dengan cara masuk ke dalam tubuh kutu rambut dengan melalui kulit dan menjadi racun yang dapat merusak sistem pencernaan yang masuk melalui sistem pernapasan (Kristinawati, 2018).



BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) berdasarkan hasil uji organoleptik dapat memenuhi aturan SNI. Hasil organoleptik untuk aroma didapatkan bau khas jeruk purut, wujud kental dan memiliki warna kehitaman, memiliki homogenitas yang baik, pH 5-7, tinggi busa 4-6 serta memiliki viskositas 100-6000 cP.
2. Konsentrasi optimum sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) terhadap efektivitas mortalitas kutu rambut adalah sampo konsentrasi 9% dan sampo yang memenuhi syarat sebagai sampo yang baik digunakan adalah sampo dengan konsentrasi 5%.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan uji daya hambat jamur pada sediaan sampo agar dapat mengetahui lama waktu simpan sampo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Al-karim dan Terjemah-Nya.
- Adrianto, dkk. "Efektivitas Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*), Jeruk Limau (*Citrus amblycarpa*) dan Jerk Bali (*Citrus maxima*) Terhadap Larva *Aedes aegypti*". *Aspirator* 6, no. 1 (2014): h. 1-6.
- Agustina Wulan, dkk. "Skrining Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Beberapa Fraksi Dari Kulit Batang Jarak (*Ricinus communis* L)". *Pendidikan dan Ilmu Kimia*, 1 no. 2 (2017): h. 117-122.
- Ahdiyah Ifah dan Puwarni Kristianti Indah. "Pengaruh Ekstrak Daun Mangkogan (*Nothopanax scutellarium*) Sebagai Larvasida Nyamuk *Culex* sp". *Sains dan Seni ITS*, 4 no. 2 (2015): h. 32-36.
- Amin, Ika Dina, Retno Hestiningasih, and Sri Yuliawati. "Pengujian Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) Sebagai Zat Penolak Alami Bagi Kecoa Jerman (*Blatella germanica*) Dewasa Di Laboratorium". *Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2016): h. 123-127.
- Anam Bahrul dan Putri Mezayu Adilla. "Inovasi Pembuatan Sahmpo Dari Ekstrak Seledri Dengan Metode *Ultrasonic Extraction-Microwave Distillation*". Program Studi Kimia Departemen Teknik Kimia Industri ITB, 2017.
- Angelia, dkk. "Formulasi Shampo Anti Ketombe yang Mengandung *Tea Tree Oil* dan Pengujian Aktivitas Sediaan Terhadap *Malasserzia furfur*". *Acta Pharmaceutica Indonesia* 39 no. 2 (2014): h. 7-14.
- Ansyah, A. "Hubungan Personal *Hygiene* dengan Angka Kejadian *Pediculosis capitis* Pada Santri Putri Pondok Pesantren Modern Islam Assalam". *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Apriyanti Diana dan Fitriyah Nurul Hidayati. "Pengaruh Suhu Aplikasi Terhadap Viskositas Lem Rokok Dari Tepung Kentang". *Konversi*, 2 no. 2 (2013): h. 23-33.
- Atmojo, dkk. Rancang Bangun Pendeteksian Asam dan Basa Berbasis Arduino Uno". *Teknik* 6 no. 2 (2017): h. 54-61.
- Auyusuk S, dkk. "Effect Of Heat Treatment on Antioxidant Properties of Tom-Kha Paste and Herbs/Spices Used In Tom-Kha Paste". *Kasetsart J (Nat. Sci)*, 43 (2009): h. 305-312.
- Azmi, dkk. "Sistem Penghitung pH Air Pada Tambak Ikan Berbasis Mikrokontroller". *Ilmiah Saintikom* 15, no. 2 (2016): h. 101-108.
- Barbara, dkk. "Committee On School Health and Committee On Infectious Diseases". *Head Lise Pediatrics*, 2002.
- Bhawani, dkk. "Thinlayer Chromatographic Analysis of Steroid". *Trop J Pharm Res* 1, no. 9 (2011): h. 301-313.

- Bintoro, dkk. "Analisis dan Identifikasi Senyawa Saponin Dari Daun Bidara (*Zhizipus mauritania* L)". *ITEKIMIA* 2, no. 1 (2017): h. 84-94.
- Bruno. "Sampling Accessories for Infrared Spectrometry". *Applied Spectroscopy* 3, no. 4 (1999): h. 91-120.
- Budiman, dkk. "Uji Aktiitas Sediaan Gel Sampo Minyak Atsiri Buah Lemon (*Citrus limon* Burm)". *IJPST*, 2 no. 2 (2015): hal. 68-74.
- Copryadi dan Hidayati. "Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Kumarin Dari Kulit Buah Jeruk Purut (*Citrus hytrix* DC)". *Biogenesis* 2, no. 1 (2005): h. 13-15.
- Dalimarta. "Tanaman Obat Indonesia". *Trubus Agiwijaya*, (2007): h. 85-95.
- Dewi Pratiwi. "Potensi Ekstrak Etanolik Kulit Buah Jeruk Nipis *Citrus aurantifolia* L Sebagai Agen Khemopreventif Melalui Penekanan Ekspresi c-Myc dan Penghambatan Proliferasi pada Sel Payudara Tikus Galur Sparague Dawley Terinduksi 7,12-Dimetilbenzena". *Majalah Obat Tradisional*, 15 no. 1 (2010): h. 8-15.
- Ergina, dkk. "Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder Pada Daun Palado (*Agave angustifolia*) yang Diekstraksi Dengan Pelarut Air dan Etanol". *J. Akad Kim* 3 no. 3 (2014): h. 165-172.
- Fadillah, H. "Perbedaan Metode Ceramah dan Leaflet Kapitis Di Pondok Pesantren Al-Mimbar Sambong Dukuh Jombang. *Skripsi*, Universitas Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta: 2015.
- Faizatun, dkk. "Formulasi Sediaan Sampo Ekstrak Bunga *Chamomile* dengan Hidroksi Propil Metil Selulosa Sebagai Pengental". *Kimia Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 6, no.1 (2008): hal. 15-22.
- Farid, dkk. "Analisis Morfologi dan Spektroskopi Infra Merah Serat Bambu Betung (*Dendrocalamus asper*) Hasil Proses Alkalisasi Sebagai Penguat Komposit Absrbsi Udara". *Teknik ITS* 6, no. 2 (2017): h. 441-444.
- Fauziah, Dewi Winni dan Galuh Karnia Yamaesa. "Formulasi Sampo Ekstrak Daun Mangga (*Mangifera indica* L)". *Ilmiah Farmacy* 6, no. 1 (2019): h. 158-174.
- Fonseca Simonne C. "Basic of Compobounding Hair CairMedicated Sampo". *International Journal of Pharmaceutical Compobounding* 9, no. 2 (2005): h. 1-14.
- Gad Haidy A, dkk. "Application of Chemometrics in Authentication Of Herbal Medicines". *Phytochem Anal* 1, no. 18 (2012): h. 1-24.
- Hakim Rusnia Junita, dkk. "Pemilihan Bagian Tanaman Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC) Potensial Sebagai Minyak Essensial Aromaterapi Hasil Proses Maserasi Dengan Metode *Analitycal Hierarki Proses (AHP)*". *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, ISSN: 2460-8416, 2019.
- Hardiyanti, dkk. "Penatalaksanaan *Pediculus capitis*". *Majority* 4, no. 9 (2015): h. 47-51.

- Haiyee dan Winikitharoen. "Extraction of Volatile Oil from Kaffir Lime Leaves (*Citrus hystrix*)". *Food, Nutrition and Public Health*, 5 no. 2 (2012): h. 201-210.
- Hashim, dkk. "Potential Use of Forier Tranform Infrared Spectroscopy for Differentiation of Bovine and Porcine Gelatins". *Food Chem*, 1, no. 18 (2010): h. 856-860.
- Heryanto Rudy, dkk. "Karakterisasi Karbon Aktif Asal Tumbuhan dan Tulang Hewan Menggunakan FTIR dan Analisis Kemometrika". *Penelitian dan Pengembangan Ilmi Kimia* 1, no. 2 (2015): h. 103-116.
- Hidayah, Anitul. *Herbal Kecantikan*. Yogyakarta: Citra Media, 2011.
- Hikmah N. "Pengaruh Perasan Daun Sirsak (*Ammona muricata* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli*". *Skripsi*, Univerversitas Negeri Gorontalo, Gorontalo: 2015.
- Indawati, dkk. "Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn) Terhadap Mortalita Kutu Kepala". *Analisis Kesehatan Sains* 6, no. 2 (2017): h. 507-511.
- Iwata, Hirosi dan Kunio Shimada. "Formulas Ingradient and Production of Cosmetics". Tokyo, Springer: 2002.
- Jusnita, Nina dan Riska Arguar Syah. "Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Sampo Dari Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* Linn)". *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal* 2, (2017): h. 24-39.
- Kristiani V dan F. I Halim. "Pengaruh Konsentrasi Etanol dan Waktu Maserasi Terhadap Perolehan Fenolik, Falvonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rambut Jagung Teknik, 3 no. 1 (2014): h. 1-10.
- Kumosinski dan Farell. "Determination Of The Global Secondary Structure Of Proteins By Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy". *Trends in Food Sci dan Technol* 6, no. 4 (1993): h. 169-175.
- Lantah, dkk. "Kandungan Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Rumput Laut *Kappapphycus alvarezii*". *Media dan Teknologi Hasil Perikanan* 5, no. 3 (2017): h. 167-172.
- Liling, Ilmiati, dkk. "Uji Fitokimia Ekstrak Buah Dengan". *Dinamika* 8, no. 1 (2017): h. 1018-1027.
- Maesaroh, Imas. "Formulasi Sediaan Shampo Jelly Anti Ketombe dari Ekstrak Kankung (*Ipomea aquatic Forssk*)". *Ilmiah Kopertis Wilayah IV* 1, no. 1 (2016): h. 81-87.
- Mangunwardoyo, dkk. "Ekstraksi dan Identifikasi Senyawa Antimikroba Herba Meniran (*Phyllanthus niruri* L)". *Ilmu Kefarmasiaan Indonesia*, 7, no. 2 (2009): h. 57-63.
- Mardiana, Lina. *Daun Ajaib Tumpas Penyakit*. PT. Swadaya: Jakarta, 2012.

- Marhakam K, R. *Cara Mengidentifikasi Flavonoid*. Terj. Kosasih Padmawinata. ITB, Bandung: 1998.
- Martini I Santoso W Murni. “Efektivitas Repellent (Daya Tolak) dari Berbagai Jenis Daun Jeruk (*Citrus* sp) Terhadap Kontak Nyamuk *Aedes aegypti*. Laporan Akhir Penelitian DIK Rutin, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNiveritas Di Ponegoro, Semarang, 2002.
- Maryanti, ESY, dkk. “Hubungan Faktor Risiko dengan Investasi *Pediculus humanus capitis* pada Anak Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru”. *Kesehatan Melayu* 1, no. 2 (2018): h. 73-80.
- Mayasari, Dewi, dkk. “Pengaruh Variasi Waktu dan Ukuran Sampel Terhadap Komponen Minyak Atsiri Dari Daun Jeruk Purut (*Citrus hytrix* DC)”. *JKK* 2, no. 2 (2013): h. 74-77.
- Meinking dan Burchat. “Infestations”. *Dermatology Britain Mosby* 1, no. 1 (2008): h. 13-21.
- Miller, A. “Antioxidant Flavonoids Structure, Function and Clinical Usage”. *Alt Med* 1, no. 2 (1996).
- Mitsui, T. *New Cosmetic Science*, 406, *Elvesier, Netherlands*. 1997.
- Molanda, Tasya C. “Formulasi Sediaan Sampo Antiketombe Ekstrak Daun Pacar Air (*Impatiens balsamina* L) dan Uji Aktivitsnya Terhadap Jamur *Candida albicans* ATCC 10231 Secara In Vitro”. *Ilmiah Farmasi UNSRAT* 6, no. 4 (2017): h. 97-109.
- Montolalu Roike Iwan, dkk. “Ekstraksi Karaginan Rumput Laut Merah (*Kappaphycus alvarezii*) Dengan Perlakuan Perendaman Dalam Larutan Basa”. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, 6 no. 3 (2018): h. 65-70.
- Muhamat, dkk. “Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC) Sebagai Insektisida Larva Nyamuk *Aedes albopictus*”. *Riset Industri Hasil Hutan* 4, no. 1 (2012): h. 15-19.
- Munaroh dan Handayani. “Ekstraksi Minyak Daun Jeruk Purut (*Citrus hytrix* DC) dengan Pelarut Etanol dan N-Heksana”. *Kompotensi Teknik* 1, no. 2 (2010): h. 73-78.
- Mukhriani. “Ektraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif”. *Kesehatan VII*, no. 2 (2014): h. 361-367.
- Nasruddin, dkk. “Isolasi Senyawa Steroid Dari Kulit Akar Senggugu (*Clerodendrum serratum* L. Moon)”. *Ilmiah Pharmasi* 6, no. 3 (2017): h. 332-340.
- Natadistara D dan A Ridad. *Parasitologi Kedokteran*. Jakarta, EGC: 2009.
- Navitania, Hanifah, dkk. “Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut dan Serai Dapur Pada Kalor Premium”. *Teknik Kimia* 13, no. 2 (2019): h. 44-48.
- Ngafifuddin Muhammad dan Susilo dan Sunarso. “Penerapan Rancang Bangun pH Meter Berbasis Arduino Pada Mesin Pencuci Film Rdografi Sinar-X”. *J Sains Dasar*, 6 no. 1 (2017): h. 66-70.


- Ningrum, dkk. "Identifikasi Senyawa Alkaloid Dari Batang Karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*) Sebagai Bahan Ajar Biologi Untuk SMA Kelas X". *Pendidikan Biologi Indonesia* 2, no. 3 (2016); h. 231-236.
- Noverita, Afghani Jayuska, and Andi Hairil Alimuddin. "Uji Aktivitas Antirayap Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut (*Cytrus Hystric* DC) Terhadap Rayap Tanah (*Coptotermes* Sp)." *Kimia Khatulistiwa* 3.2 (2014).
- Nugrahaningtyas Khorina Dwi. "Isolation and and Identification of Compounds From *Curcuma rhizome* (*Curcuma aeruginosa* Roxb)". *Biofarmasi*, 3 no. 1 (2005): h. 32-38.
- Nurachman, dkk. "Laporan Praktikum Farmasi Fisika Viskositas Ostwald" 2015.
- Prethi, Jaya, dkk. "Review on Herbal Sampo and Its Evaluation". *Asian J Pharm* 3, no. 4 (2013): h. 153-156.
- Prijadi, Dio K. "Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dalam Menghambat Pertumbuhan Larva *Aedes* sp". *Biomedik* 2, no. 1 (2014): h. 1-10
- Potluri, dkk. "Formulation and Evaluation of Herbal Anti-Dandruff Shampo". *Pharmacy and Tecnology* 1, no. 6 (2013): h. 835-839.
- Putri. *Morfologi Daun Secara Umum*. Pustaka: Jakarta, 2012.
- Rahmi Unzilla, dkk. "Profil Fitokimia Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Tanaman Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC) dan Jeruk Bali (*Citrus maxima* *Burm F Merr*)". *J Kimia Unand*, (2013): h. 109-114.
- Reo, Albert R, dkk. "Metabolit Sekunder Gorgonia". *Ilmiah Platax*, 5 no. 1 (2017): h. 42-48.
- Ridhla, dkk. "Formulasi Shampo Anti Ketombe dan Anti Kutu Rambut Dari Berbagai Macam Tanaman Herbal". *Farmaka* 15, no. 1 (2013): h. 248-261.
- Rukmana. *Usaha Tani Jeruk Purut Dalam Pot dan DI Kebun*. Yogyakarta: 2003.
- Rumampuk. "Peranan Kebersihan Kulit Kepala dan Rambut dalam Penanggulangan Epidemiologi *Pediculus humanus capitis*". *Ners*, 9, no. 1 (2014): h. 35-42.
- Rusmiati. "Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Aktivitas Antimikroba Ekstrak Metanol Daun Mimba (*Azhadiracta indica juss*)". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaunddin Makassar, 2010.
- Sakka, La. "Identifikasi Senyawa Alkaloid, Flavonoid, Saponin dan Tanin pada Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) di Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru Menggunakan Mode Infusa. *Kesehatan Diagnosis* 12, no. 6 (2018): h. 670-674.
- Sankari, dkk. "Analysis of Serum Immunoglobulins Using Fourier Transform Infrared Spectral Measurements". *Biol Med* 2, no. 3 (2010): h. 42-48.

- Sastrohardiadjjo. "Arah Pengembangan dan Strategi Penggunaan Pestisida Nabati". *Forum Komunikasi Ilmiah*, 1999.
- Setiawan Yopi. "Analisis Fisikokimia Gula Aren Cair". *Agroscience*, 10, no.1 (2020): h. 1-10.
- Septiani dan Priangani. "Analisis Kualitatif Kandungan Boraks Pada Bahan Pangan Daging Olahan dan Identifikasi Sumber Boron Dengan FTIR-ATR". *Indonesian of Halal* (2010): h. 48-52.
- Showell Michael. "Introduction to Detergents". Handbook of Detergents Series Part D. *Formulation United States Of America*, 2006.
- SNI. Badan Standarisasi Nasional Indonesia SNI No.92692-1992, Jakarta: 1992.
- Soenardjo dan Supriyantini. "Analisis Kadar Tanin dalam Buah Mangrove *Avicennia marina* Dengan Perebusan dan Lama Perendaman Air Yang Berbeda". *Kelautan Tropis* 2, no. 2 (2017): h. 90-95.
- Stone, dkk. "Rocky E Bacelieri Scabies, Other Mites and Pediculosis". *Fitzpatrick's Dermatology In General Medicine* 2, no. 8 (2012): h. 25-73.
- Sukma, dkk. "Uji Efektivitas Serai Dapur (*Cymbopogon citratus* DC) Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans* Metode Mikrodilusi". *Riset Kesehatan* 11, no. 2 (2019): h. 267-273.
- Sulishono, dkk. "Pengaruh Waktu, Temperatur dan Jenis Pelarut Terhadap Ekstraksi Bahan Pektin Dari Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima*)". *Teknk Kimia* 4, no. 18 (2012): h. 1-7.
- Sulistiyani, Martin. "Spektroskopi Fourier Infra Red Dengan Metode Reflektansi (ATR-FTIR) Pada Optimasi Pengukuran Spektrum Vibrasi Vitamin C". 1, no. 2 (2018): h. 39-43.
- Sulistiyani dan Nuril. "Perbandingan dan Metode Transmisi dan Reflektansi pada Pengukuran Polistirena Menggunakan Instrumentasi Spektroskopi Fourier Transform Infrared". *Chemical Science* 7, no. 2 (2018): h. 195-198.
- Suryani, dkk. *Teknologi Emulsi*. Bogor, 2002.
- Suryelita, "Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Steroid dari Daun Cemara Natal (*Cupressus funerbis* End)". *Eksakta*, 18, no. 1 (2017): h. 86-94.
- Suseno dan Sofjan. "Rancang Bangun Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) untuk Penentuan Kualitas Susu Sapi". *Berkala Fisika* 11, no. 1 (2008): h. 23-28.
- Syafii. "Sifat Anti Rayap Zat Ekstraktif Beberapa Jenis Kayu Daun Lebar Tropis". *Bulletin Kehutanan* 42, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Setiawan Yopi. "Analisis Fisikokimia Gula Aren Cair". *Agroscience* 1 no. 1 (2020): h. 69-78.
- TafsirAl-Mishbah. "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an". Volume 7, 2002.

- Tee dan Badia. "Uji Efektivitas Shampo Anti Kutu Rambut Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* L) Secara In Vitro". *Warta Farmasi* (2019): h. 1-9.
- Timung, dkk. "Composition and anti-bacterial activity analysis of Citronellal Oil Obtained by hidrodistillation: Proses Optimation Study". *Industrial Crops and Product* 94, (2016): h. 178-188.
- Tranggono, Retno Iswari, dkk. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Tuasamu, Yati. "Karakterisasi Morfologi Daun dan Anatomi Stomata pada Beberapa Species Tanaman Jeruk (*Citrus Sp*)". *Agribisnis Perikanan* 11, no. 2 (2018): h. 85-90.
- Untoro, dkk. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata*)". *Kimia Sains dan Aplikasi* 19, no. 2 (2016): h. 58-62.
- Virgianti dan Rahmah. "Efektivitas Beberapa Merk Minyak Kayu Putih Terhadap Mortalitas *Pediculus humanus capitis* Secara In Vitro". *Kesehatan Bakti Tunas Husada* 15, no. 1 (2016): h. 10-18.
- Wahyulianingih, dkk. "Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L) Merr dan Perry)". *Fitofarmoka Indonesia* 3, no. 2 (2015): h. 188-193.
- Wiarsih Shelly, dkk. "Isolasi, Fabrikasi dan Penentuan Ukuran Nanopartikel Steroid (StrNPs) Ekstrak Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata* K. Schum) dengan Metoda *Dynamic Light Scattering*". *Kimia Sains dan Aplikasi*, 20, no.1 (2017): h. 48-52.
- Widiyati. "Penentuan Adanya Senyawa Triterpenoid dan Uji Aktivitas Biologis pada Beberapa Spesies Tanaman Obat Tradisional Masyarakat Pedesaan Bengkulu". *Gradien* 1, no. 2 (2006): h. 116-122.
- Winarti, dkk. "Formulasi dan Karakterisasi Shampo Anti Jamur dengan Penambahan Ekstrak Lengkuas Merah". *Pascapanen* 4, no. 2 (2007): 97-104.
- Winingsih, dkk. "Penggunaan FTIR-ATR ZnSe (*Fourier Transform Infra Red*) Untuk Penetapan Kadar Kuersin Dalam The Hitam (*Camelia sinensis* L.)". *Pharmaceutical Science and Technology* 1, no. 1 (2016): h. 47-53.
- Wink. *Ecological Roles of Alkaloids*. 2008.
- Young. *Practical Cosmetic Science* 95. Mills and Boon Limited, London: 1972.
- Yuhernita dan Juniarti. "Analisis Senyawa Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Metanol Daun Surian yang Berpotensi Sebagai Antioksidan". *MAKARA SAINS* 15, no. 1 (2011): h. 48-52.
- Yuliani, Ratna dkk. "Aktivitas Antibakteri Minyak Atsir Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escheria coli*". *Pharmacon*, 12, no. 2 (2011): h. 50-54.

LAMPIRAN

Lampiran I. Skema Alur Penelitian



Lampiran II. Data Hasil Pengamatan

1. Data hasil pengujian tinggi busa

Konsentrasi Sampo (%)	Pengujian			Rata-rata
	I	II	III	
0	4	4	4	4
3	4	5	5,5	4,8
5	4,9	5,3	5,5	5,2
7	4,9	5,7	6	5,5
9	6,2	6,8	7	6,7

2. Data hasil Pengujian pH menggunakan pH meter

Konsentrasi Sampo (%)	Pengujian			Rata-rata
	I	II	III	
0	6,95	6,97	7,4	7,1
3	5,8	5,85	5,9	5,85
5	5,81	5,80	5,83	5,81
7	5,73	5,74	5,77	5,74
9	5,69	5,70	5,73	5,70

Lampiran III. Analisis data

1. Analisis data viskositas sediaan sampo

Diketahui:

Spindle : 6
RPM : 50
Faktor koreksi : 200

a. Konsentrasi 0%

$$\begin{aligned}\text{Viskositas} &= \text{faktor koreksi} \times \text{hasil baca} \\ &= 200 \times 0,5 \\ &= 100\end{aligned}$$

b. Konsentrasi 3%

$$\begin{aligned}\text{Viskositas} &= \text{faktor koreksi} \times \text{hasil baca} \\ &= 200 \times 1,5 \\ &= 300\end{aligned}$$

c. Konsentrasi 5%

$$\begin{aligned}\text{Viskositas} &= \text{faktor koreksi} \times \text{hasil baca} \\ &= 200 \times 16 \\ &= 3,200\end{aligned}$$

d. Konsentrasi 7%

$$\begin{aligned}\text{Viskositas} &= \text{faktor koreksi} \times \text{hasil baca} \\ &= 200 \times 23 \\ &= 4,600\end{aligned}$$

e. Konsentrasi 9%

$$\begin{aligned}\text{Viskositas} &= \text{faktor koreksi} \times \text{hasil baca} \\ &= 200 \times 30 \\ &= 6000\end{aligned}$$

2. Analisis data persentase ekstrak

a. Konsentrasi 3% (%b/v)

$$\frac{3}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 1,5 \text{ gram}$$

Perhitungan konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 5%, 7%, 9% dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas.

3. Analisis data persentase HPMC, SLS dan metil paraben

a. HPMC 1% (%b/v)

$$\frac{1}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 0,5 \text{ gram}$$

b. SLS 4% (%b/v)

$$\frac{4}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 2 \text{ gram}$$

c. Metil paraben 0,15% (%b/v)

$$\frac{0,15}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 0,075 \text{ gram}$$

Lampiran IV. Dokumentasi penelitian

Daun Jeruk Purut



Ekstrak Daun Jeruk Purut



Pembuatan Sampo



Uji Viskositas



Uji pH



Sampo




Uji Tinggi Busa



Uji Efektivitas



Lampiran V. Spektrum FTIR Ekstrak Daun Jeruk purut (*Citrus hystrix* DC)



RIWAYAT HIDUP



Gabriella lahir di Salukaluku, 05 November 1998. Penulis adalah anak bungsu bersaudara dari pasangan Muis dan Dira. Penulis mengawali jenjang pendidikan di SDN 352 Tobemba pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS S.A Sampano

tahun yang sama. Tahun 2013 penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 13 Luwu dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat pada sekoah menengah atas, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan status sebagai mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis memiliki cita-cita sederhana yaitu ingin membahagiakan orang terkasihnya dan pastinya ingin melanjutkan setinggi mungkin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR