

Motivational Interviewing Dan Aktifitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pasien DM Tipe 2 Di Kota Makassar

by Ridwan Amiruddin

Submission date: 13-Oct-2020 04:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 1413247494

File name: 1._Draft_9_oktober_2020_-_perbaikan_referensi.pdf (571.18K)

Word count: 2602

Character count: 39702

Type of Article: Research Article

Title : **Motivational Interviewing Dan Aktifitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pasien DM Tipe 2 Di Kota Makassar**

RidwanAmiruddin¹, Nurhaedar Djafar², Jumriani Ansar³ UliadiBarrungLimbong⁴, Risnah⁵

^{1 3},DepartemenEpidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin,Makassar

²Departemen Nutrition , Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar

⁴Program Pascasarjana, DepartemenEpidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar

⁵Jurusan Keperawatan, Fak.Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar

*Corresponding author : Risnah

Address: Jl.Tidung IX No.109 A Perumnas Panakkukang Makassar

E-mail: risnah@uin-alauddin.ac.id

ID ORCID: 0000-0002-5078-8655

ABSTRACT

Objectives: Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh kombinasi program motivational interviewing dan aktifitas fisik terhadap kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 (DM tipe 2).



Edit dengan WPS Office

Methods: Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan rancangan Non Randomized Control Group Pretest Posttest Design. Populasinya semua pasien DM tipe 2 yang tercatat pada rekam medis Puskesmas. Teknik pengambilan sampel secara exhaustive sampling dengan besar sampel sebanyak 30 orang kelompok intervensi dan 30 orang kelompok kontrol. Mempergunakan analisis data bivariat uji beda dua mean dependen dan uji beda dua mean independen.

Results: Analisis statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai mean pada keempat domain kualitas hidup kelompok intervensi sebelum dan setelah pemberian perlakuan (nilai $p = 0,0001$ untuk setiap domain Kesehatan Fisik, Kondisi Psikologis, Hubungan Sosial dan Kondisi Lingkungan); ada perbedaan kualitas hidup pasien DM tipe 2 diantara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan persentase peningkatan kualitas hidup kategori baik pada kelompok intervensi setelah diberikan perlakuan sebesar 66,7% (p value = 0,0001).

Conclusion: Pemberian kombinasi program konseling dengan pendekatan motivational interviewing yang diikuti dengan senam efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien DM tipe 2.

Keywords: Motivational interviewing, DM tipe 2, Kualitas hidup, Senam

Introduction

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup seperti pola makan dan kebiasaan beraktifitas. Risiko ini akan semakin meningkat pada individu dengan hipertensi tidak terkontrol, kurang berolahraga/beraktifitas fisik dan tidak taat dengan diet serta memiliki pola hidup yang tidak sehat [1]. DM telah menjadi penyebab kematian terbesar ke-6 di dunia. Data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2017 menunjukkan peningkatan jumlah pasien DM berusia 20 – 79 tahun di dunia setiap tahunnya, misalnya saja tahun 2013 mencapai 382 juta jiwa, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 415 juta jiwa dan data terakhir tahun 2017 meningkat menjadi 425 juta jiwa.

WHO memperkirakan bahwa secara global, 422 juta orang dewasa berusia di atas 18 tahun menderita DM pada tahun 2014 dengan prevalensi tertinggi pada Kawasan Mediterania Timur sebesar 13,6% dan Asia Tenggara sebesar 8,6%. Jumlah penderita DM tersebut meningkat selama beberapa dekade terakhir karena pertumbuhan penduduk, kenaikan usia rata-rata populasi, dan kenaikan prevalensi DM pada setiap umur [2]. Hasil analisa World Economic Forum (WEF), dalam kurun waktu 2012-2030, Indonesia akan terbebani sebesar 2.800 triliun rupiah karena DM atau senilai dengan dua puluh kali anggaran kesehatan Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan [3].

DM tipe 2 merupakan suatu penyakit kronik yang tidak bisa disembuhkan secara total sehingga menyebabkan prevalensinya justru meningkat setiap tahunnya [4]. Pada studi Kaidaliri [5] ditemukan bahwa penderita DM umumnya memiliki kualitas hidup yang buruk dibandingkan dengan orang yang tanpa penyakit karena dapat menyebabkan terjadinya komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan DM yang tepat. Tujuan dari perawatan DM ini tidak untuk menyembuhkan tetapi untuk meningkatkan status fungsional pasien, meminimalkan gejala komplikasi, memperpanjang hidup melalui pencegahan sekunder dan meningkatkan kualitas hidup [4].

Kualitas hidup manusia menurut WHO meliputi 4 domain utama antara lain domain 1 yaitu



kesehatan fisik, domain 2 yaitu kondisi psikologis, domain 3 yaitu hubungan sosial dan domain 4 yaitu kondisi lingkungan. Kualitas hidup penting untuk diteliti karena dengan mengetahui kualitas hidup seseorang dapat membantu petugas kesehatan untuk mengetahui keadaan kesehatan seseorang sehingga dapat menjadi arah atau patokan dalam menentukan intervensi yang harus diberikan sesuai dengan keadaan pasien (Yudianto, 2008). Penelitian yang bertujuan untuk menilai kualitas hidup juga telah dilakukan pada beberapa penyakit lain misalnya pada pengobatan leukemia myeloid kronis [6].

PERKENI, 2011 [7] menyampaikan bahwa pengelolaan DM terdiri atas empat pilar utama yaitu mencakup edukasi, terapi gizi, aktifitas fisik, dan intervensi farmakologis. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim terutama dalam pencegahan DM melalui penerapan pola hidup yang sehat, dapat diintervensi dengan pemberian program edukasi. Salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk merubah perilaku penderita dengan memanfaatkan hubungan interpersonal adalah dengan pendekatan motivational interviewing (MI). Studi oleh Nugroho [8], menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok yang diberikan motivational interviewing dengan kelompok kontrol, dimana terdapat beda yang signifikan dengan $p < 0,05$ pada ukuran HbA1C, sehingga intervensi tersebut mampu mempengaruhi kualitas hidup pasien DM. Penelitian oleh Miller, et.al [9], pada wanita obesitas Afro-Amerika yang menderita DM Tipe 2 menunjukkan bahwa intervensi nutrisi medis dengan pendekatan motivational interviewing terbukti dapat meningkatkan kontrol glikemik dan kepercayaan diri responden.

Pengelolaan DM melalui aktifitas fisik dapat dilakukan melalui latihan jasmani. Latihan jasmani secara teratur dapat menurunkan kadar gula darah. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, berenang, dan senam [10]. Hasil studi Lara dan Atik [11], menunjukkan bahwa faktor kebiasaan olahraga berhubungan dengan kualitas hidup lansia penderita DM tipe 2. Selain itu, studi Cross Sectional oleh Halaweh et.al [12], menemukan bahwa nilai dalam semua Health Related Quality of Life (HRQoL) secara signifikan lebih tinggi ($p < 0,05$) pada kelompok yang beraktifitas fisik sedang dan tinggi dibandingkan dengan kelompok beraktifitas fisik rendah dan ada korelasi signifikan antara lima dimensi HRQoL dan tingkat aktifitas fisik ($p < 0,001$).

Banyaknya jumlah pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Pattingaloang, beratnya beban yang ditimbulkan oleh penyakit DM dan komplikasinya, bagaimana menilai kualitas hidup pasien DM, serta masih kurangnya studi/penelitian yang mengangkat tema tentang intervensi melalui konseling dengan pendekatan wawancara motivasi yang dikombinasikan dengan aktifitas fisik, menjadi alasan untuk meneliti tentang pengaruh Motivational Interviewing dan senam terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2 di wilayah tersebut

Materials and Methods

Penelitian ini dilaksanakan pada dua Puskesmas di Kota Makassar yaitu pada wilayah kerja Puskesmas Pattingaloang (kelompok intervensi) dan wilayah kerja Puskesmas Tabaringan (kelompok kontrol). Jenis penelitian menggunakan kuasi eksperimen (Eksperimen Semu) dengan rancangan Non Randomized Control Group Pretest Posttest Design.

Populasi penelitian yaitu seluruh pasien DM tipe 2 yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas Tabaringan, Kota Makassar. Menggunakan teknik exhaustive sampling, maka diperoleh besar sampel terdiri dari 30 responden pada kelompok intervensi dan



30 responden pada kelompok kontrol.

Pengumpulan data sekunder yakni data pasien DM tipe 2 yang tercatat pada rekam ¹medis Puskesmas Patingaloang dan Puskesmas Tabaringan tahun 2020. Kemudian pada saat pelaksanaan, data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 2 tahap yakni tahap pretest dan posttest menggunakan kuesioner Karakteristik Umum dan kuesioner kualitas hidup WHOQoL-BREF berbahasa Indonesia yang telah distandarisi oleh WHO. Pada tahap intervensi, kelompok intervensi mengikuti kegiatan senam yang dipimpin oleh instruktur terlatih dari Puskesmas kemudian dilanjutkan dengan sesi konseling motivational interviewing oleh konselor dari petugas Puskesmas terlatih. Pada kelompok kontrol dibagikan leaflet pedoman hidup sehat dan pengelolaan penyakit pada pasien DM.

Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran karakteristik responden yang disajikan dalam tabel dan grafik distribusi frekuensi. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat perbedaan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji beda T dengan nilai α 5%. Jenis penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan menggunakan dua jenis uji parametrik yaitu melihat perbandingan mean dua kelompok berpasangan menggunakan Uji t berpasangan dan melihat perbedaan mean antara dua kelompok sampel tidak berpasangan menggunakan uji t tidak berpasangan

Results

Karakteristik Responden

Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok umur, di kelompok intervensi mayoritas responden berada pada kelompok umur 46 – 55 tahun dan 56 – 65 tahun yaitu masing – masing sebanyak 11 responden (36,7%) dan pada kelompok kontrol sebanyak 10 responden (33,3%) pada interval usia yang sama. Responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, pada kelompok intervensi sebanyak 24 responden (80%) dan pada kelompok kontrol sebanyak 19 responden (63,3%) perempuan. Pendidikan terakhir responden pada kelompok intervensi mayoritas SD sebanyak 12 responden (40%), sedangkan kelompok kontrol mayoritas berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 12 responden (40%).

Menurut penggunaan obat diabetes diperoleh data bahwa semua responden pada kelompok intervensi (100 %) menggunakan obat secara oral dan pada kelompok kontrol terdapat 1 responden (3,3%) tidak menggunakan oral dan injeksi insulin. Jika melihat karakteristik pekerjaan responden, maka pada kelompok intervensi didominasi oleh PNS dan petani yang masing-masing sebanyak 4 responden (13,3) sedangkan pada kelompok kontrol didominasi oleh PNS sebanyak 10 responden (33,3%). Berdasarkan kebiasaan berolahraga, responden yang tidak pernah berolahraga pada kelompok intervensi hanya terdapat 2 responden (6,7%) sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 10 responden (33,3%).

Pada grafik 1 dan 2 memperlihatkan distribusi perbandingan nilai mean *pretest* dan *posttest* empat domain kualitas hidup penderita DM tipe 2 pada kelompok intervensi dan kontrol. Grafik 1 menunjukkan nilai mean domain 1 (kesehatan fisik) dan domain 2 (kondisi psikologis), untuk domain 1 terlihat bahwa pada kelompok intervensi mengalami peningkatan mean dari 20,97 saat pretest menjadi 26,73 saat posttest sedangkan kelompok kontrol menurun sedikit dari 22,8 saat pretest menjadi 22,43 saat



posttest. Begitupun untuk domain 2, nilai mean kelompok intervensi meningkat dari 17,2 saat pretest menjadi 20,37 saat posttest sedangkan kelompok kontrol menurun dari 19,60 saat pretest menjadi 18,07 saat posttest. Grafik 2 menunjukkan nilai mean domain 3 (Hubungan Sosial) dan domain 4 (Kondisi Lingkungan), untuk domain 3 nilai mean kelompok intervensi mengalami peningkatan mean dari 9,4 saat pretest menjadi 11,27 saat posttest sedangkan kelompok kontrol menurun dari 10,4 saat pretest menjadi 9,9 saat posttest. Begitupun untuk domain 4, nilai mean kelompok intervensi meningkat dari 26,6 saat pretest menjadi 31,23 saat posttest sedangkan kelompok kontrol meningkat sedikit dari 28,87 saat pretest menjadi 29,2 saat posttest.

Analisis Bivariat

Tabel 2 menunjukkan perbedaan nilai mean pretest dan posttest pada 4 (empat) domain kualitas hidup kelompok intervensi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai mean pada semua domain kualitas hidup yaitu masing – masing untuk domain kesehatan fisik besar selisih nilai mean pretest dan posttest sebanyak 5,76; pada domain kondisi psikologis sebanyak 3,17; domain hubungan sosial sebanyak 1,87 ; dan domain kondisi lingkungan sebanyak 4,63. Keempat domain kualitas hidup memiliki nilai $p = 0,0001$ ($p < 0,005$) yang berarti bahwa terdapat perbedaan mean pada keempat domain tersebut sebelum dan sesudah responden diberikan intervensi. Domain yang paling besar mengalami peningkatan nilai mean adalah domain 1 (kesehatan fisik).

Tabel 3 menunjukkan hasil tabulasi silang untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup diantara kedua kelompok penelitian. Nampak bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah responden dengan kualitas hidup kategori baik pada kelompok intervensi yakni dari 7 responden (23,3%) saat pretest meningkat menjadi 27 responden (90%) saat posttest dan menurunnya jumlah responden dengan kualitas hidup kategori buruk dari 22 responden (73,3%) saat pretest menjadi 3 responden (10%) saat posttest. Pada kelompok kontrol dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah responden dengan kualitas hidup kategori baik yaitu dari 19 responden (63,3%) saat pretest menjadi sisa 7 responden (23,3%) saat posttest. Hasil uji statistik memperlihatkan nilai $p = 0,0001$ ($p < 0,05$) yang berarti bahwa ada perbedaan kualitas hidup antara kelompok intervensi yang diberikan perlakuan berupa kombinasi program *motivational interviewing* dan senam dengan kelompok kontrol.

Discussion

a. Domain 1: Kesehatan Fisik

Hasil penelitian menunjukkan ¹ ada pengaruh kombinasi program *motivational interviewing* dan senam terhadap Domain 1 pasien DM tipe 2 pada kelompok intervensi. Peningkatan skor responden pada domain 1 yang terjadi setelah pemberian intervensi menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai karena responden dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam aspek kesehatan fisik mereka. Aspek yang dinilai atau dilihat adalah menyangkut energi atau tenaga yang dimiliki untuk beraktifitas dan bekerja, rasa sakit/nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan, kemampuan secara fisik untuk bergaul dengan orang lain serta pola tidur dan istirahat. Pemberian wawancara motivasi menyebabkan responden memiliki kesempatan yang



baik untuk berbagi keluh kesah dengan konselor terkait kesulitan mereka secara fisik karena penyakit yang dialami.

Dalam proses tersebut, konselor memberikan umpan balik berupa rasa empati disertai dorongan semangat serta pemahaman mengenai bagaimana responden memahami seluk – beluk penyakit yang mereka alami, mengarahkan mereka untuk dapat secara mandiri mengelola penyakitnya sehingga pada akhirnya responden dapat menerima kondisinya sebagai penderita DM. Konselor juga memberikan bimbingan kepada responden mengenai modifikasi gaya hidup, efek samping obat serta bagaimana pengaturan diet serta bagaimana perawatan kaki yang sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar.

Aktifitas fisik berupa senam yang dilakukan rutin 3 kali seminggu selama sebulan memberikan semangat dan energi positif bagi responden untuk tampil prima, lebih bugar dan terbukti meningkatkan vitalitas mereka. Kelompok konseling dan senam menjadi kelompok sosial dengan perasaan dan penderitaan yang sama sehingga mendorong responden untuk secara terbuka mengubah pola pikir mereka yang salah selama ini. Pada umumnya responden sangat merespon dengan baik kegiatan senam yang diberikan, bahkan melalui observasi di lapangan, mereka datang sangat pagi sebelum jadwal pelaksanaan senam dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat senang dan menikmati senam, dan tentunya hal ini merupakan hal positif yang dapat berpengaruh pada kualitas hidup responden.

Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Buchair [4], di Makassar yang menemukan bahwa ada pengaruh konseling dengan pendekatan *home care* terhadap domain 1 responden pada kelompok intervensi yaitu dengan nilai $p = 0,002$ ($p > 0,05$). Sama halnya dengan studi oleh Chlebowy, et.al [13], yang menemukan bahwa *motivational interviewing* secara signifikan meningkatkan peluang peserta mengikuti tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan (p value = 0,018). Studi kohort oleh Thiel [14], di Kanada juga menunjukkan bahwa ada hubungan tingginya skor *Health Related Quality of Life* (HRQL) pada pasien DM tipe 2 terkait dengan fungsi fisik penderita; peran secara fisik; nyeri tubuh; dan vitalitas, dengan nilai statistik semuanya sebesar $p = 0,001$ ($p < 0,05$) dengan aktifitas fisik secara rutin yang direkomendasikan oleh *Canadian Diabetes Association* (CDA). Penelitian oleh Thiel [14], di Kanada juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara aktifitas fisik dengan skor *Health Related Quality of Life* pada dimensi fungsi fisik, vitalitas dan kesehatan secara umum dari penderita DM tipe 2. Penelitian oleh Halaweh, et.al [12], pada pasien diabetes berusia lanjut di Palestina menyatakan bahwa nilai dalam semua dimensi *Health Related Quality of Life* (HRQoL) secara signifikan lebih tinggi ($p < 0,05$) pada kelompok yang beraktifitas fisik sedang dan tinggi dibandingkan dengan kelompok yang beraktifitas fisik rendah, dan juga ada korelasi signifikan antara lima dimensi dalam HRQoL dengan tingkat aktifitas fisik ($p < 0,001$).

b. Domain 2: Kondisi Psikologis

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh kombinasi program *motivational interviewing* dan senam terhadap Kondisi Psikologis pasien DM tipe 2 pada kelompok intervensi. Aspek yang dinilai meliputi penampilan, perasaan negatif, perasaan positif, konsep diri, daya ingat dan konsentrasi. Pada proses *motivational interviewing*, responden diarahkan oleh konselornya untuk memahami setiap permasalahan yang dihadapi karena penyakitnya dan dapat manajemen diri secara bijaksana dalam



menghadapi beban penyakit yang dialami sehingga mereka mampu untuk meminimalisir efek psikologis negatif yang muncul.

Perasaan cemas, stres dan tertekan karena konsep diri yang buruk secara perlahan mendapatkan respon dan bimbingan dari konselor agar responden dapat mengurangi efek psikologis yang ditanamkan dalam diri pasien selama ini misalnya kekhawatiran yang berlebihan dan kondisi tubuh yang dapat menjadi buruk sewaktu – waktu. Adanya nilai kebersamaan dalam kelompok konseling dan senam bersama dengan sesama pasien DM menimbulkan rasa kekeluargaan dan sharing pengalaman yang juga dapat meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan menerima kondisi diri mereka. Sehingga hal tersebut dapat meminimalkan timbulnya rasa diskriminasi dan stigma di masyarakat, sebagaimana hasil sebuah artikel yang telah dilakukan di Korea [15].

Motivational interviewing membuat responden lebih terbuka mengenai kondisi yang dialami sehari – hari, berani untuk membagi perasaan dan pemikiran serta kekhawatirannya sehingga dapat dibimbing untuk mengembangkan hal – hal positif pada diri mereka. Saat peneliti pertama kali melakukan pengambilan data pretest, melalui wawancara langsung banyak responden yang mengeluhkan tentang ketidakmampuan mereka menerima kondisi kesehatan dan penampilan, merasa tidak bisa menikmati hidup dengan baik seperti sebelum mereka sakit dan sering merasa putus asa. Namun saat pertemuan terakhir dalam posttest, pada umumnya responden sudah jarang mengeluhkan hal tersebut, hal ini nampak terpancar dari wajah mereka yang dapat dilihat secara langsung terutama dalam semangat yang mereka perlihatkan pada saat melakukan senam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi oleh Buchair [4], yang menemukan bahwa terjadi peningkatan nilai mean domain 2 pada kelompok intervensi setelah responden diberikan konseling dengan nilai $p = 0,000$ yang menunjukkan ada perbedaan signifikan rata – rata skor domain 2 antara kelompok intervensi dengan kontrol. Selanjutnya hasil studi oleh Tristiana [16], menemukan bahwa metode yang paling efektif untuk meningkatkan manajemen diri dan kontrol glikemik pada pasien DM tipe 2 adalah training *motivational interviewing* yang diberikan oleh perawat berfokus pada perubahan perilaku karena *motivational interviewing* termasuk dalam intervensi psikologis dengan keunggulan membantu pasien DM menerima penyakitnya, meningkatkan *self care* dan mengurangi distress psikologis.

Diabetes dapat menyebabkan peningkatan tingkat depresi, sehingga di masa depan, depresi harus diakui sebagai sebuah masalah sosial sehingga pasien harus dilengkapi dengan sistem yang secara aktif dapat mencegah depresi [17]. Studi oleh Thiel [14], juga menunjukkan bahwa rekomendasi *Canadian Diabetes Association* dalam hal aktifitas fisik secara moderate bagi pasien DM tipe 2 terbukti berhubungan dengan peran emosional dan kesehatan mental pasien DM tipe 2 dengan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Studi oleh Syatriani *et.al.* [18], pada penderita DM tipe 2 yang juga perokok dan alkoholik menunjukkan bahwa adanya tingkat stres memiliki signifikan korelasi dengan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan pada pasien DM tipe 2.

c. Domain 3: Hubungan Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh kombinasi program *motivational interviewing* dan senam terhadap Hubungan Sosial pasien DM tipe 2 pada kelompok intervensi. Aspek yang dinilai meliputi hubungan personal, dukungan sosial dan aktifitas



seksual. Peningkatan skor domain 3 menunjukkan adanya pengaruh positif pemberian kombinasi program *motivational interviewing* dan senam mendorong responden untuk hidup lebih produktif, lebih membuka diri untuk membagi permasalahan hidupnya terkait penyakit yang diderita dan meningkatkan kemauan interaksi sosial terutama karena adanya kebersamaan di dalam kelompok konseling dan senam. Saat konseling, responden dibimbing untuk memahami pentingnya bersosialisasi, menjalin komunikasi yang intens dan harmonis dengan anggota keluarga, pasangan dan tetangga. Dalam kelompok konseling dan senam, responden dapat berinteraksi dengan sesama penderita DM, berbagi pengalaman dalam menghadapi beban hidup karena penyakitnya dan seakan memperoleh keluarga baru dengan pengalaman dan penderitaan yang hampir sama sehingga hal ini menjadi beberapa penyebab meningkatnya perubahan positif yang terjadi pada responden.

Hal ini sesuai dengan studi oleh Huang, et.al [19], pada pasien DM tipe 2 di Taiwan yang menemukan bahwa kelompok eksperimen yang diberikan *motivational interviewing* melalui terapi peningkatan motivasi dan kognitif memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas hidup secara fisik dan mental setelah pemberian intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang sama sekali tidak ada perubahan sepanjang penelitian dilaksanakan. Selain itu, studi kuasi eksperimen oleh Buchair [4], pada pasien DM tipe 2 di Makassar mendapatkan hasil yang sama bahwa ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor domain 3 antara kelompok intervensi yang diberikan konseling dan kelompok kontrol yaitu sebesar 18,10 (nilai $p = 0,000 < 0,05$). Namun Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Hayashino, Tsujii dan Ishii [20] di Jepang, yang menyatakan bahwa tidak ada peningkatan skor yang signifikan pada domain 3 *Diabetes Therapy-Related Quality of Life* (DTR-QOL) pada pasien DM dengan nilai $p = 0,507$ ($p > 0,05$).

d. Domain 4: Kondisi Lingkungan

Hasil membuktikan bahwa ada pengaruh kombinasi program *motivational interviewing* dan senam terhadap kondisi lingkungan pasien DM tipe 2 pada kelompok intervensi. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan finansial, kebebasan, ketersediaan pelayanan kesehatan dan sosial, lingkungan rumah, lingkungan fisik dan transportasi. Signifikansi pada domain 4 menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan kombinasi program *motivational interviewing* dan senam secara langsung telah mengarahkan responden untuk membuat keputusan dalam hidup mereka dalam memaksimalkan kemampuan finansial yang dimiliki, berusaha yang terbaik bagi kesehatan dan pemulihannya, tergerak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin meskipun harus mengorbankan waktu mereka untuk mengantri di Puskesmas dan peduli dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Responden juga mengalami perubahan untuk lebih peduli dengan kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan di sekitarnya. Sebagian besar responden tidak mengeluhkan tentang transportasi yang digunakan setiap hari, mereka cenderung lebih menikmati rutinitas sehari-hari dan dukungan pendampingan dari keluarga membuat hidup mereka terasa lebih "hidup".

Studi oleh Buchair [4] di Makassar menemukan bahwa konseling memberikan pengaruh positif terhadap domain 4 kualitas hidup penderita DM tipe 2 dimana terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata skor domain 4 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebesar 9,55 dengan nilai $p = 0,008$ ($p < 0,05$). Hasil penelitian



Tristiana [16], juga menunjukkan bahwa Intervensi melalui *motivational interviewing* efektif dalam meningkatkan manajemen diri (diantaranya area aktifitas, diet dan pengobatan) dan kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus tipe 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata – rata skor (mean) pada setiap domain kualitas hidup saat pretest ke posttest kelompok intervensi setelah diberikan kombinasi program *motivational interviewing* dan senam dengan nilai signifikansi ($p < 0,05$). Hasil utama dari penelitian ini terkait adalah bahwa kombinasi program *motivational interviewing* dan senam terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup pasien DM tipe 2. Signifikansi yang terjadi di setiap domain kualitas hidup menjadi tolok ukur peningkatan kualitas hidup responden dan keberhasilan program yang diberikan. Kekuatan dalam konseling dengan pendekatan *motivational interviewing* yaitu sikap empati yang ditunjukkan oleh Konselor, dalam hal ini aktif mendengarkan pasien tanpa menghakimi atau menyalahkan perilaku pasien DM agar dapat lebih memahami situasi dan perspektif mereka. Sebagai konselor memahami bahwa pasien DM yang berada dalam tahap awal perubahan mungkin belum benar – benar siap untuk melepaskan perilaku awal, sehingga fokus utama adalah pada membangun hubungan dan mendukung mereka dalam memiliki kemampuan untuk berubah dalam berbagai cara. Pengembangan terkini dari program *motivational interviewing* kini telah mempergunakan ponsel dan platform digital dalam aplikasinya [21].

Aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam bentuk senam, memberikan dampak positif. Secara teori dipahami bahwa senam dapat memberikan banyak manfaat dalam penatalaksanaan DM yaitu terkontrolnya kadar glukosa darah, mengurangi risiko komplikasi, dapat menurunkan berat badan dan memeliharanya dalam jangka waktu yang lama, keuntungan psikologis karena dapat memperbaiki tingkat kesegaran jasmani sehingga pasien merasa fit, rasa cemas berkurang terhadap penyakitnya, timbul rasa senang dan rasa percaya diri serta pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien serta dapat mengurangi tingkat pemakaian obat oral dan insulin.

Kombinasi program *motivational interviewing* dan senam memberikan pengaruh dalam peningkatan kualitas hidup pasien DM tipe 2, hal ini dimungkinkan oleh karena tingginya antusias responden saat penelitian untuk ikut aktif dan berperan dalam intervensi yang diberikan. Nampak terlihat dari kehadiran mereka secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan bahkan mereka antusias untuk hadir lebih awal. Pada tahapan konseling, mereka memiliki wadah untuk bersikap terbuka, membagikan pengalaman dan perasaan mereka dengan leluasa, merasa memiliki tempat untuk didengarkan segala keluhannya dan mendapatkan bimbingan untuk perilaku hidup yang lebih sehat dan tidak dibatasi dengan efek karena penyakit yang diderita.

Pelaksanaan senam merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas hidup pasien DM tipe 2 dalam studi ini, yang menandakan bahwa ada korelasi positif antara pemberian senam secara rutin kepada kualitas hidup pasien DM tipe 2 baik yang menyangkut kesehatan fisik pasien, kondisi psikologis, hubungan sosial maupun kondisi lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena senam merupakan salah satu bentuk aktifitas fisik yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan dan melalui observasi dan wawancara langsung peneliti dengan responden di lapangan, terlihat dengan jelas bagaimana perbedaan perubahan yang terjadi pada responden dari awal



hingga selesainya penelitian dilaksanakan. Responden mengungkapkan perasaan lebih fit, bugar dan pada umumnya dari yang mengalami kesulitan saat tidur sudah dapat menikmati tidur yang lebih berkualitas. Hal ini nampak berbeda dengan pengamatan pada responden kelompok kontrol yang responnya hampir sama saja saat pertama dan terakhir kali pertemuan.

Beberapa studi yang mendukung hasil dalam penelitian ini seperti studi yang dilakukan oleh Miller, et.al [9], yang menemukan bahwa Intervensi Nutrisi Medis melalui pendekatan *Motivational Interviewing* terbukti dapat meningkatkan kontrol glikemik dan meningkatkan kepercayaan diri yang berhubungan dengan kepercayaan diri pada wanita Afro-Amerika yang mengalami obesitas dan menderita diabetes melitus tipe 2. Selain itu, Huang, et.al [19] melalui penelitiannya di Taiwan menemukan bahwa kelompok eksperimen menunjukkan penurunan yang signifikan pada hemoglobin glikosilasi, glukosa puasa dan gejala depresi, dan peningkatan yang signifikan dalam kualitas fisik dan kualitas mental kehidupan setelah pemberian intervensi melalui terapi perilaku *motivational interviewing*, sedangkan pasien dalam kelompok kontrol dengan perawatan biasa tidak menunjukkan perubahan seiring waktu penelitian.

Studi oleh Buchair [4], menjelaskan bahwa pelayanan konseling yang diberikan kepada pasien DM memberikan dampak positif seperti membuat pasien merasa nyaman dan gembira dikunjungi oleh petugas kesehatan dengan memberikan informasi yang diberikan oleh pasien untuk mengelola penyakitnya dengan lebih baik dan menyebabkan mereka merasa mendapat dukungan sehingga dapat menerima kondisi diri serta termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan akan meminimalkan terjadinya komplikasi. Konseling efektif sebagai terapi untuk meningkatkan kualitas hidup, namun konselor memegang peranan penting sebagai orang yang memberikan solusi yang dapat membantu pasien menghadapi masalah yang dialami.

Edukasi atau penyuluhan kesehatan yang selama ini diberikan kepada pasien diabetes oleh Puskesmas pada dasarnya sudah cukup baik untuk menyampaikan pesan – pesan dan informasi yang perlu mereka ketahui seputar penyakit diabetes termasuk hal yang harus dilakukan untuk perawatan diri, namun hal tersebut tidak cukup membuat pasien melakukan gerakan perubahan yang berarti bagi perbaikan perilaku mereka. Sebuah riset telah menunjukkan bahwa *Motivational interviewing* telah terbukti efektif dalam efektifitas pendidikan kesehatan anak [22].

Selain karena responden biasanya kesulitan untuk fokus mendengarkan, terkadang penyuluhan terkesan juga hanya sebagai informasi yang didengarkan sesaat dan setelah pulang ke rumah mereka sudah lupa. Sehingga perlu dikembangkan program pendidikan yang lebih spesifik dan individual serta fokus pada persepsi risiko setiap orang [23]. Walaupun dipahami bahwa memang sangat sulit untuk membangun infrastruktur pelayanan kesehatan dalam waktu yang singkat [24].

Konseling melalui pendekatan *motivational interviewing* menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk lebih dekat dengan penderita, mengabdikan empati untuk mendengar keluhan dan pengalaman penderita dalam kehidupan keseharian mereka dan secara perlahan membuat mereka bisa lebih jelas untuk memahami prinsip – prinsip perubahan hidup yang perlu mereka laksanakan. Selain itu, kombinasi dengan senam rutin berkelanjutan membuat pasien semakin bersemangat dan merasa memiliki komunitas pergaulan yang bermanfaat bagi vitalitas dan kebugaran mereka. Sehingga dapat dipertimbangkan jika melakukan program



pengembangan kelompok sasaran untuk meningkatkan fungsi harian dan kualitas hidup maka memerlukan perhatian profesi kesehatan yang lebih baik [25].

Penurunan yang cukup signifikan pada kualitas hidup responden kelompok kontrol dimungkinkan terjadi karena berdasarkan analisis karakteristik umum dan riwayat kesehatan responden diketahui bahwa responden pada kelompok kontrol cukup banyak yang berada pada kelompok usia lanjut >65 tahun. Adanya variasi dalam pengobatan menjadi indikasi mekanisme patofisiologi yang berbeda-beda ada setiap individu yang mengalami DM tipe 2. Namun ada pasien yang mengaku tidak mengkonsumsi obat. Sebuah penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara usia dengan kontrol glikemik yang buruk pada pasien DM tipe 2 sehingga mengalami komplikasi medis sekunder [26].

Dari aspek perilaku sehari – hari, jika dibandingkan dengan kelompok intervensi maka lebih banyak kelompok kontrol yang masih belum mengatur pola makan dengan baik, kurang berolahraga dan masih suka konsumsi makanan dan minuman manis serta banyak dari mereka yang tidak mengontrol gula darah secara rutin. Padahal perilaku kesehatan seperti kesehatan mental, kebiasaan makan, gaya hidup, dan aktivitas fisik memiliki hubungan yang signifikan dengan status kesehatan [27].

Melalui studi Amiruddin et.al [28], pada penderita DM *Gestasional* (DMG) di Kota Makassar, diketahui bahwa risiko prediabetes dan DMG meningkat dengan adanya sejarah konsumsi serat yang lebih sedikit (OR = 2,355, 95% CI: 1,12-4,94) dan lebih sedikit riwayat konsumsi kopi (OR = 2,406, 95% CI: 1,10- 5,25) dengan probabilitas 96%. Diet dengan kandungan serat tinggi dapat meningkatkan metabolisme karbohidrat. Dapat membantu mengendalikan dan mencegah peningkatan kadar gula darah. Faktor – faktor tersebut yang memungkinkan menjadi penyebab semakin menurunnya kualitas hidup pasien DM tipe 2 saat *posttest* pada kelompok kontrol yang terutama karena mereka sama sekali tidak mendapatkan intervensi selain pemberian *leaflet* perilaku sehat yang belum tentu mereka baca dan terapkan di dalam kehidupan sehari – hari.

Acknowledgments

Ucapan terima kasih; Kepada penyandang dana/sponsor, pimpinan dinkes dan kelompok posbindu Kota Makassar

Declarations

Funding: Kemendikbud tahun 2019-2020

Conflict of interest: No conflict interest

Ethical approval: 5248/UN4.14/KA.04.01/2018. tgl 30 juli 2018 an ketua komisi etik Prof Dr.Veni Hadju

References

- [1] S. Damayanti, "Diabetes Mellitus & Penatalaksanaan Keperawatan , Yogyakarta: Nuha Medika,," 2015.
- [2] W. H. Organization, "Global report on psoriasis. 2016," *WHO Library Catalog*



uing-in-Publication Data, vol. 2018. p. 48, 2016.

- [3] T. Larasati, "Perbaikan Gaya Hidup Sehat pada Pasien dengan Riwayat Keluarga Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas," *JK Unila*, vol. 1, no. 3, pp. 503–512, 2017.
- [4] N. H. Buchair, "Pengaruh Konseling Home Care Terhadap Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Talise Kota Palu (Tesis).Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.," (Tesis).*Makassar Pascasarj. Uni v. Hasanuddin.*, 2015.
- [5] A. Kaidaliri, N. Baharak, and M. MirmalekSani, "Quality of Life in People With Diabetes: a Systematic Review of Studies in Iran," *J. Diabetes Metab. Disord.*, vol. 12, no. 54, p. 2013, 2013.
- [6] ¹⁰ Z. Aziz, J. Iqbal, M. Aaqib, M. Akram, and A. Saeed, "Assessment of quality of life with imatinib mesylate as first-line treatment in chronic phase-chronic myeloid leukemia," *Leuk. Lymphoma*, vol. 52, no. 6, pp. 1017–1023, 2011.
- [7] S. A. Soelistijo *et al.*, *Konsensus Pengendalian dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia 2015*. 2015.
- [8] C. Nugroho, "Implementasi Motivasi Terhadap Penurunan HBA1C Pada Pasien Diabetes Mellitus (Literatur Riview)," *J. AKP*, vol. 12, no. 1, pp. 62–67, 2016.
- [9] M. S.T., O. V.J., B. M.A., S. A., G. T., and D. M. Jenkins, "Preliminary⁶ Efficacy of Group Medical Nutrition Therapy and Motivational Interviewing among Obese African American Women with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.," *J. Obes.*, vol. 2014, no. pagination, p. Arte Number: 345941. ate of Pubaton: 2014, 2014.
- [10] O. M. Utomo, M. Azam, and D. N. A, "Pengaruh Senam Terhadap Kadar Gula Darah Penderita Diabetes," *Unnes J. Public Heal.*, vol. 1, no. 1, pp. 36–40, 2012.
- [11] A. G. Lara and ⁴ A. C. Hidajah, "HUBUNGAN PENDIDIKAN, KEBIASAAN OLAHRAGA, DAN POLA MAKAN DENGAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI PUSKESMAS WONOKROMO SURABAYA," *J. PROMKES*, vol. 4, no. 1, p. 59, 2017.
- [12] H. Halaweh, C. Wilena., A. Grimby, and Ekman& Ulla Svantesson, "Physical Activity and Health – Related Quality of Life Among Community Dwelling Elderly," *J Clin Med Res*, vol. 7, no. 11, pp. 845 – 852, 2015.
- [13] ² D. O. Chlebowy, P. El-Mallakh, J. Myers, N. Kubiak, R. Cloud, and M. P. Wall, "Motivational Interviewing to Improve Diabetes Outcomes in African Americans Adults With Diabetes," *West. J. Nurs. Res.*, vol. 37, no. 5, pp. 566–580, 2015.



- [14] D. M. Thiel, "The Association of Physical Activity and Health-Related Quality of Life in Adults with Diabetes (Tesis).," *Kanada Univ. Alberta.*, 2016.
- [15] C. Cho, H. W., & Chu, "Discrimination and stigma. Osong public health and research perspectives, 6(3), 141.," 2015.
- [16] R. D. Tristiana, "Motivational Interviewing Program Untuk Meningkatkan Manajemen Diri dan Kontrol Glikemik Pada Pasien DM Tipe 2," *J. Ners Lentera*, vol. 4, no. 2, pp. 166 – 177, 2016.
- [17] C. Y. Park, S. Y. Kim, J. W. Gil, M. H. Park, J. H. Park, and Y. Kim, "Depression among Korean adults with type 2 diabetes mellitus: Ansan community-based epidemiological study," *Osong public Heal. Res. Perspect.*, vol. 6, no. 4, pp. 224–232, 2015.
- [18] S. Syatriani, A. Ridwan., N. Djaffar., and Ansariadi., "Assessment of the Family Support on the Improvement of Health-Related Quality of Life for Alcoholics and Smokers in Type 2 DM Patients in Makassar Municipality," *Int. J. Sci. Basic Appl. Res.*, vol. 32, no. 2, pp. 270–281, 2017.
- [19] C. Y. Huang *et al.*, "Effects of motivational enhancement therapy plus cognitive behaviour therapy on depressive symptoms and health-related quality of life in adults with type II diabetes mellitus: a randomised controlled trial," *Qual. Life Res.*, vol. 25, no. 5, pp. 1275–1283, 2016.
- [20] Y. Hayashino, S. Tsujii, and H. Ishii, "Association of diabetes therapy-related quality of life and physical activity levels in patients with type 2 diabetes receiving medication therapy: the Diabetes Distress and Care Registry at Tenri (DDCRT 17)," *Acta Diabetol.*, vol. 55, no. 2, pp. 165–173, 2018.
- [21] S. Arayasirikul, C. Turner, D. Trujillo, V. Le, T. Beltran, and E. C. Wilson, "Does the Use of Motivational Interviewing Skills Promote Change Talk Among Young People Living With HIV in a Digital HIV Care Navigation Text Messaging Intervention?," *Health Promot. Pract.*, vol. 21, no. 5, pp. 738–743, 2020.
- [22] X. Jiang, S., McGrath, C., Lo, E. C., Ho, S. M., & Gao, "Motivational interviewing to prevent early childhood caries: A randomized controlled trial," *J. Dent.*, p. 103349, 2020.
- [23] D. Hwang, Y., Lee and Y. S. Kim, "Educational Needs Associated with the Level of Complication and Comparative Risk Perceptions in People with Type 2 Diabetes," *Osong public Heal. Res. Perspect.*, vol. 11, no. 4, p. 170, 2020.
- [24] C. Cho, H. W., & Chu, "The story of Korean health insurance system. Osong public health and research perspectives, 8(4), 235.," 2017.
- [25] E. Lee, K. S., Jung, M. S., Kim, M., Cha, K., & Chung, "Impact of Cognitive Aging on Health-Related Quality of Life in Menopausal Women," *Osong Public Heal. Res. Perspect.*, vol. 11, no. 4, p. 185, 2020.



- [26] S. Haghghatpanah, M., Nejad, A. S. M., Haghghatpanah, M., Thunga, G., & Mallayasamy, "Factors that correlate with poor glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients with complications," *Osong public Heal. Res. Perspect.*, vol. 9, no. 4, p. 167, 2018.
- [27] C. Cheon, S. M. Oh, S. Jang, J. S. Park, B. H. Jang, and S. G. Ko, "The relationship between health behavior and general health status: based on 2011 Korea National Health and Nutrition Examination Survey," *Osong public Heal. Res. Perspect.*, vol. 5, no. 1, pp. 28-33, 2014.
- [28] R. Amiruddin, T. Asrianti, and M. T. Abdullah, "Fiber, coffee, cigarette and gestational diabetes mellitus in Makassar Indonesia," *Asian J. Epidemiol.*, vol. 10, no. 1, pp. 26-31, 2017.

General guidelines on references

Authors are responsible for the accuracy and completeness of their references and for correct text citation. References presented with [] following a surname in the main text, such as Kim [1] and Kim et al [2]. When a reference is cited within the content, it is shown as [3] or [4,5] at the end. References should be searchable online. References should be identified non-superscript and Arabic numerals in squared brackets, in the order they appear in the text(NML style), and be placed before punctuation. The last names and initials of all the authors up to 3 should be included. For articles with more than 3 authors, list the first 3 authors only followed by "et al".

Journal article:

Garber A, Klein E, Bruce S, et al. Metformin-glibenclamide versus metformin plus rosiglitazone in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin monotherapy. *Diabetes Obes Metab* 2006;8(2):156-63.

Book chapter:

Belitz HD, Grosch W, Schieberle P. Food chemistry. 3rd rev. ed. Burghagen MM, translator. Berlin (Germany): Springer; 2004. p.1070-86.

Website:



WHO[Internet]. Essential surgical care manual: Resuscitation and anesthesia, important medical conditions for the anesthetist. [cited 2015 Mar 30]. Available from: http://www.steinergraphics.com/surgical/005_13.8.

Tabel 1: Distribusi Karakteristik Umum Responden

Karakteristik Responden	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
	n	%	n	%
Kelompok Umur				
26 - 35	1	3.3	0	0
36 - 45	2	6.7	3	10
46 - 55	11	36.7	10	33.3
56 - 65	11	36.7	10	33.3
> 65	5	16.7	7	23.3
Total	30	100	30	100
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	6	20	11	6.7
Perempuan	24	80	19	63.3
Total	30	100	30	100
Tingkat Pendidikan				
Tidak Sekolah	3	10	1	3.3
SD	12	40	5	16.7
SMP	8	26.7	3	10
SMA	5	16.7	9	30
Perguruan Tinggi	2	6.7	12	40
Total	30	100	30	100
Pekerjaan				
PNS	4	13.3	10	33.3
Karyawan Swasta	1	3.3	1	3.3



Wiraswasta	3	10	5	16.7
Petani/Nelayan	4	13.3	0	0
IRT	18	60	14	46.7
Total	30	100	30	100
Penggunaan Obat				
Oral	30	100	25	83.3
Insulin	0	0	4	13.3
Tidak Menggunakan	0	0	1	3.3
Total	30	100	30	100
Kebiasaan Berolahraga				
Ya	28	93.3	20	66.7
Tidak	2	6.7	10	33.3
Total	30	100	30	100

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 2 : Perbedaan Nilai Mean Pretest dan Posttest Pada Empat Domain Kualitas Hidup Kelompok Intervensi

Domain Kualitas Hidup	Kelompok Intervensi		
	Mean Pretest	Mean Posttest	<i>p-value</i>
Kesehatan Fisik	20,97	26,73	0,0001
Kondisi Psikologis	17,20	20,37	0,0001
Hubungan Sosial	9,40	11,27	0,0001
Kondisi Lingkungan	26,60	31,23	0,0001

Sumber : Data Primer, 2020

Tabel 3: Analisis Bivariat Perbedaan Pretest dan Posttest Kualitas Hidup Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol


Kualitas Hidup	Pretest				Posttest				p value
	Intervensi		Kontrol		Intervensi		Kontrol		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Baik	7	23,3	19	63,3	27	90	7	23,3	0,0001
Cukup	1	3,3	3	10	0	0	1	3,3	



Buruk	22	73,3	8	26,7	3	10	22	73,3
Total	30	100	30	100	30	100	30	100

Sumber : Data Primer, 2020


Figure legend
Figure 1:



Sumber: Data Primer, 2020

Grafik 1: Perbandingan Nilai Mean Pretest dan Posttest Pada Domain 1 dan 2 Kualitas Hidup





Sumber: Data Primer, 2020

Grafik 2: Perbandingan Nilai Mean Pretest dan Posttest Pada Domain 3 dan 4 Kualitas Hidup

(Please upload the figure files as JPG file with resolution higher than 300 dpi and separately)

(Separate from main document and upload separately)

Copyright Transfer and Conflict of Interest Disclosure Form

Title of the paper: **Motivational Interviewing Dan Aktifitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pasien DM Tipe 2 Di Kota Makassar**

I. Copyright Transfer Form

The authors hereby transfer all copyrights in and to the manuscript named above in all forms and media, now or hereafter known, to the Korea Centers for Disease Control and Prevention effective if and when the paper is accepted for publication in the *Osong Public Health and Research Perspectives*. The authors reserve all proprietary right other than copyright, such as patent rights.

Everyone who is listed as an author in this article should have made a substantial, direct, intellectual contribution to the work and should take public responsibility for it.

This paper contains works that have not previously published or not under consideration for publication in other journals.



II. Conflict of Interest Disclosure Form

All authors are responsible for recognizing any conflict of interest that could bias their work in the acknowledgments, disclosing all financial support and any other personal connections.

Please check the appropriate box below:

No author of this paper has a conflict of interest, including specific financial interests, relationships, and/or affiliations relevant to the subject matter or materials included in this manuscript.

or

The authors certify that all conflicts of interest, as applicable to each author, including specific financial interests, relationships, and/or affiliations relevant to the subject matter or materials are disclosed in the manuscript.

(Please describe in detail about these interests.)

These interests may include one or more of the following: employment; consultancy within the past two years; ownership interests – including stock options – in a start-up company, the stock of which is not publicly traded; ownership interest - including stock options but excluding indirect investments through mutual funds and the like - in a publicly traded company; research funding; honoraria directly received from an entity; paid expert testimony within the past two years; any other financial relationship (e.g., receiving royalties); membership on another entity's Board of Directors or its advisory committees (whether for profit or not for profit).

Corresponding author: **Risnah**

Name Signature Date

Authors:

RidwanAmiruddin

Name Signature Date

Nurhaedar Djafar

Name Signature Date

Jumriani Ansar

Name Signature Date

Uliadi Barrung Limbong

Name Signature Date



(This form must be signed by all authors in an order as appeared in the article, and should be returned to the editorial office.)



Edit dengan WPS Office

Motivational Interviewing Dan Aktifitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pasien DM Tipe 2 Di Kota Makassa

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unhas.ac.id Internet Source	2%
2	James E. Grobe, Kathy Goggin, Kari Jo Harris, Kimber P. Richter, Ken Resnicow, Delwyn Catley. "Race moderates the effects of Motivational Interviewing on smoking cessation induction", Patient Education and Counseling, 2020 Publication	1%
3	downloads.hindawi.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
5	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1%
6	dergipark.org.tr Internet Source	<1%
7	scholars.cityu.edu.hk	

Internet Source

<1%

8

manipal.pure.elsevier.com

Internet Source

<1%

9

Myung Ja Kim, Eunhee Lee. "How to Reduce Excessive Use of the Health Care Service in Medical Aid Beneficiaries: Effectiveness of Community-Based Case Management", International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020

Publication

<1%

10

Fabio Efficace, Annarita Cardoni, Francesco Cottone, Marco Vignetti, Franco Mandelli. "Tyrosine-kinase inhibitors and patient-reported outcomes in chronic myeloid leukemia: A systematic review", Leukemia Research, 2013

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off