

Trend dan Isue Riset

# Keperawatan Maternitas

ke Depan



Hasnah, S.Kep. Ns, M.Kes | Megawati Yunus | Rina Nur Inani |  
Andi Riska Roswati | Andryana Agrevita | Supiani Yamlean |  
Resky Auliyah Inani | Bruddin Ibrahim, MM.

# TREND DAN ISUE RISET KEPERAWATAN MATERNITAS KE DEPAN

## KONTRIBUTOR

Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J  
Patima, S.Kep., Ns., M.Kep  
Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I, M.Ed  
Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns, M.Kes.  
Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag.  
Ani Auli Ilmi, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom  
Huriati, S. Kep., Ns., M.Kes.  
Dr. H. Supardin, M.Ag.  
Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Dr. Aan Parhani, Lc, M.Ag.



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved

## **Trend dan Isue Riset Keperawatan Maternitas Ke Depan**

Penulis:

**Hasnah, S. Sit, S.Kep., Ns., M.Kes., Megawati Yunus, Rina Nur Insani, Andi Riska Roswati, Andryana Agrevita, Supiani Yamlean, Resky Auliyah Insani B**

Editor:

**Nidya Nina Ichiana, S.Pd., M.Pd.**

Cetakan I: 2020

viii + 180 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-328-360-6

**Alauddin University Press**

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,

Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

## SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global Covid-19, karya buku "**Trend dan Isue Riset Keperawatan Maternitas ke Depan**" yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program **Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi**, karya ini dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses *upgrading* kapasitas dan *updating* perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas.

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap

akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori sekaligus *legacy* bagi penulisnya di masa datang. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki *basic core* pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban bangsa.

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. *Amin...*

Makassar, 17 Agustus 2020  
Rektor UIN Alauddin Makassar,

**Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Trend dan Isue Riset Keperawatan Maternitas ke Depan” dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini.

Tujuan penyusunan buku ini, untuk memberi gambaran rencana riset keperawatan maternitas ke depan.

Dengan terselesaikannya buku ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan buku. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat kami mengucapkan terina kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. Ph. D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp., A., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus adismistrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku ketua jurusan keperawatan beserta dosen-dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah membantu dalam proses adimistrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan buku.

4. Hasnah S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes., selaku selaku sekretaris jurusan keperawatan.
5. Mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2016 yang telah menemani dari awal hingga akhir penyusunan buku ini.
6. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak terhingga kepada kami dalam penyusunan buku ini.

Disamping itu, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam buku ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantiya.

Samata,            Juni 2020

Penyusun

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I ANTENATAL CARE.....</b>	<b>1</b>
A. Defenisi Antenatal Care .....	1
B. Tujuan Antenatal Care.....	2
C. Pemeriksaan/Kunjungan Antenatal Care .....	2
D. Standar Pelayanan Antenatal Care.....	4
E. Asuhan Keperawatan Antenatal Care .....	7
F. Tinjauan Agama Tentang Antenatal Care .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PREEKLAMPSIA.....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Preeklampsia.....	17
B. Faktor Resiko Preeklampsia.....	17
C. Klasifikasi Preeklampsia .....	20
D. Manifestasi Klinis Preeklampsia .....	21
E. Patofisiologi.....	21
F. Pemeriksaan Penunjang.....	26
G. Penatalaksanaan Preeklampsia .....	27
H. Pencegahan Preeklampsia.....	29
I. Komplikasi Preeklampsia .....	30
J. Asuhan Keperawatan Preeklampsia.....	31
K. Tinjauan Agama Terkait Preeklampsia .....	43
<b>BAB III ANEMIA DALAM KEHAMILAN .....</b>	<b>49</b>
A. Definisi Anemia.....	49
B. Anatomi dan Fisiologi.....	50
C. Klasifikasi anemia.....	54
D. Etiologi Anemia.....	58
E. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia pada saat hamil .....	59
F. Tanda dan Gejala.....	62
G. Patofisiologi.....	64
H. Pencegahan.....	65
I. Penatalaksanaan .....	67
J. Pemeriksaan Penunjang.....	68
K. Pengaruh Anemia dalam Kehamilan .....	71
L. Asuhan Keperawatan Anemia dalam Kehamilan .....	71
M. Pandangan Agama Tentang Anemia dalam Kehamilan.....	82
<b>BAB IV HIPERTENSI KEHAMILAN .....</b>	<b>88</b>
A. Landasan Teori Hipertensi Kehamilan.....	88

B. Asuhan Keperawatan pada Kasus Hipertensi dalam Kehamilan.....	106
C. Tinjauan Agama Terkait Dengan Hipertensi Kehamilan ...	120
<b>BAB V KECEMASAN DALAM KEHAMILAN .....</b>	<b>130</b>
A. Defenisi Kecemasan.....	130
B. Klasifikasi Kecemasan .....	131
C. Perubahan psikologi ibu hamil .....	131
D. Pathofisiologi .....	133
E. Penyebab.....	134
F. Tanda dan Gejala.....	137
G. Dampak dari kecemasan dalam kehamilan .....	139
H. Penanganan Kecemasan pada Kehamilan .....	140
I. Tinjauan Agama Terkait Kecemasan dalam Kehamilan.....	153
DAFTAR PUSTAKA .....	167
BIODATA PENULIS.....	180

# BAB I

## ANTENATAL CARE

### A. Defenisi Antenatal Care

**A**ntenatal Care (ANC) yaitu suatu pelayanan guna memantau, menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan janin, mendeteksi semua komplikasi kehamilan dan mengambil tindakan yang diperlukan, menanggapi keluhan, mempersiapkan kelahiran, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Antenatal Care merupakan suatu program dari pelayanan kesehatan obstetrik yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan yang muncul selama kehamilan (Suthar et al., 2013).

Perawatan antenatal (ANC) dapat didefinisikan sebagai perawatan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan terampil untuk wanita hamil dan remaja perempuan untuk memastikan kondisi kesehatan terbaik untuk ibu dan bayi selama kehamilan (Tekelab et al., 2019)

Perawatan antenatal merupakan pencegahan untuk kesehatan ibu dan bayinya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat diakses yang menyediakan ANC dengan layanan berkualitas bagi masyarakat dengan tujuan menjaga kehamilan agar ibu sehat, proses persalinan yang aman serta memuaskan dan mengusahakan bayi yang dilahirkan juga sehat. Pemeriksaan Antenatal dapat mencegah masalah bagi ibu dan bayi tergantung pada sebuah kontinum operasional perawatan dengan aksesibel, tinggi perawatan berkualitas sebelum dan selama kehamilan, persalinan, dan periode postnatal (Kementrian Kesehatan RI, 2014)

## **B. Tujuan Antenatal Care**

Tujuan dari pelayanan Antenatal Care (ANC) yaitu:

- a. Mempersiapkan kelahiran
- b. Membantu wanita hamil dan pasangannya mempersiapkan diri secara emosional dan fisik untuk kelahiran dan perawatan mereka bayi, terutama mempersiapkan awal dan eksklusif menyusui dan perawatan bayi baru lahir yang penting dan mempertimbangkan peran teman yang mendukung saat lahir
- c. Mendeteksi komplikasi kehamilan
- d. Mengelola kondisi yang sudah ada sebelumnya yang memburuk selama kehamilan
- e. Meringankan risiko yang dapat terjadi selama kehamilan
- f. Efek gaya hidup selama kehamilan
- g. Menciptakan keadaan yang baik bagi ibu selama kehamilan
- h. Mendapatkan informasi dini mengenai kesehatan ibu dan bayi
- i. Menciptakan rasa saling percaya antar ibu dan petugas kesehatan (Gebrecherkos et al., 2020)

## **C. Pemeriksaan/Kunjungan Antenatal Care**

Kunjungan ANC yaitu kunjungan yang diperlakukan bagi setiap ibu hamil secara dini agar mendapatkan asuhan antenatal. Kunjungan antenatal care mampu mendeteksi komplikasi di awal kehamilan diikuti dengan pendidikan kesehatan dan pencegahan komplikasi kehamilan Kehamilan

yang termasuk dalam resiko tinggi harus lebih rutin dalam kunjungan Antenatal Care (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Kunjungan ANC sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan yang muncul selama kehamilan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan bahwa ANC selama kehamilan kunjungan diperlakukan sebanyak enam kali. Dimana, dua kali pada trimester I, satu kali pada trimester II, dan tiga kali pada Trimester III (kementrian Kesehatan RI, 2020)

Kunjungan pertama merupakan kunjungan awal ibu dan petugas kesehatan. Sedini mungkin ibu hamil harus melakukan kunjungan pertama. Tujuan dari kunjungan awal yaitu untuk memiliki identifikasi awal yang mendasarinya kondisi-kondisi yang terjadi misalnya, pencegahan bawaan sifilis, anemia, dan pencegahan malaria (Zile & Villerusa, 2014).

Kunjungan kedua dilakukan pada kehamilan diatas 12-24 minggu. Kunjungan kedua bertujuan untuk menilai ibu dan kesejahteraan janin, Memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan modifikasi kelahiran. Kunjungan ketiga Kunjungan ketiga dilakukan pada saat kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu. Kunjungan ketiga bertujuan untuk Menilai ibu dan kesejahteraan janin. Kecualikan PIH, anemia, kehamilan ganda. Memberikan penyuluhan mengenai kelahiran (Allen-Walker et al., 2020)

Kunjungan terakhir harus sekitar 37 minggu atau dekat tanggal lahir yang diharapkan untuk memastikan hal itu sesuai saran dan perawatan telah diberikan untuk mencegah dan mengelola masalah seperti kelahiran kembar (misalnya kembar), postmaturity (misalnya kelahiran setelah 42 minggu kehamilan, yang membawa peningkatan risiko kematian janin), dan posisi abnormal bayi (mis.

sungsang, tempat sungsang kepala bayi bukan bagian presentasi saat lahir).

#### **D. Standar Pelayanan Antenatal Care**

Kementrian kesehatan republic Indonesia menyatakan bahwa standar pelayanan antenatal terdapat 10 standar, diantaranya yaitu:

##### **a. Pengukuran Berat Badan & Tinggi Badan**

Setiap kali kunjungan dilakukan pengukuran berat badan, agar mendeteksi ada tidaknya gangguan pada perkembangan janin. Kurang dari 9 Kg atau kurang dari 1 Kg selama kehamilan dapat memunculkan terjadi gangguan pada janin.

##### **b. Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU)**

Tinggi Fundus Uteri dilakukan di setiap kunjungan. Bertujuan agar melihat bagaimana perkembangan janin sesuai dengan umur kehamilan. Apabila tidak sesuai maka dapat dicurigai terjadi gangguan pada perkembangan janin.

##### **c. Pengukuran Tekanan Darah (TD)**

Pengukuran TD diperlakukan kunjungan antenatal. Pengukuran pada tiap kali dimana bertujuan agar melihat ada tekanan darah tinggi (Hipertensi) dan preeclamsia selama hamil serta terjadi edema pada wajah. Nilai TD yaitu lebih dari 140/90 mmHg.

##### **d. Pengukuran Detak Jantung Janin (DJJ)**

Pengukuran denyut jantung janin diperlakukan di akhir trimester I. pengukuran ini dapat berlanjut setiap kali

kunjungan. Nilai dari detak jantung janin yaitu lebih dari 160/menit.

e. Pemberian Tablet Tambah Darah (Fe)

Pemberian tablet tambah darah bertujuan agar mencegah kurang darah (Anemia) pada ibu selama kehamilan. Semua diharuskan untuk mengkonsumsi tablet minimal 90 diberikan pada pertemuan awal.

f. Pemberian Imunisasi TT

Pemberian imunisasi TT agar menghindari neonatrum tetanus. Imunisasi diharuskan untuk diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan status imunsasti TT sejak ini. Wanita hamil dengan status T5 (TTLonglife) tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi.

g. Laboratorium (Khusus & Rutin)

Pemeriksaan Lab dilakukan pada ibu selama kehamilan yaitu tes Lab khusus dan rutin. Pemeriksaan Lab Khusus adalah tes yang diberiksan sesuai dengan indikasi yang melakukan kunjungan antenatal, sedangkan pemeriksaan Lab Rutin yaitu tes yang diwajibkan pada ibu selama kehamilan yang berupa tes golongan darah, Hb, dan tes Hiv, Malaria dan lain-lain.

h. Penilaian Status Lingkar Lengan Atas

Penilaian status gizi atau lingkar lengan atas diperlakukan pada trimester pertama dengan tujuan bahwa untuk mengskrining wanita hamil yang berisiko kekurangan energy kronik. Berat bayi lahir rendah merupakan akibat dari wanita hamil hamil kekurangan energy kronik.

i. Wicara Temu (Konseling)

Konseling dilakukan pada kunjungan ANC yang terdiri dari:

1. Kondisi ibu selama kehamilan
2. Perilaku hidup bersih & sehat (PHBS)
3. Peran dari suami dan keluarga terkait perencanaan persalinan
4. Tanda dan bahaya selama kehamilan, kesiapan menghadapi komplikasi serta persalinan
5. Gizi seimbang
6. Tanda dan gejala penyakit menular
7. Pendidikan selama kehamilan terkait tes HIV & Konseling didaerah epidemic
8. Insiasi menyusui dini dan ASI eksklusif
9. KB setelah persalinan
10. Imunisasi
11. Instelegensi selama kehamilan (*Brain booster*)

j. Komunikasi, Informasi, & Edukasi efektif (KIE)

Komunikasi, informasi dan edukasi adalah langkah dari pelayanan anc terkelola yang dilakukan dari kontak awal agar membantu wanita untuk mengatasi masalah yang terjadi selama kehamilan. KIE efektif yang dikelola antara lain:

1. Kewaspadaan menghadapi komplikasi serta persiapan persalinan yaitu gejala dan tanda-tanda pada kehamilan, persalinaan & masa nifas, tempat bersalin, petugas kelahiran, pedamping persalinan dan siaga suami.

2. Inisiasi menyusui dini dan menyusui eksklusif yaitu skin to skin kontak, ASI selama 6 bulan, keinginan agar menyusui, penyuluhan pentingnya ASI, serta perawatan putting susu
3. Penggunaan KB setelah persalinan yaitu metode yang digunakan sesuai keinginan setelah masa nifas
4. Masalah gizi yaitu tablet tambah darah, mengkonsumsi yodium, makanan berpadat, berkalori dan banyak akan zat besi, serta menyediakan makanann tambahan
5. Kelas ibu hamil yaitu semua wanita hamil memakai buku KIA, pertukaran pengalaman diantara wanita hamil serta melakukan senam hamil
6. Penyakit kronis dan penyakit menular yaitu menjelaskan pencegahan, mengenali tanda gejala penyakit, terapkan PHBS serta kepatuhan dengan minum obat (Kemenkes RI, 2017)

## **E. Asuhan Keperawatan Antenatal Care**

### **1. Pengkajian**

#### **Trimester I**

Anamnesa:

- a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, status perkawinan, lamanya perkawinan dan alamat
- b. Keluhan utama
- c. Riwayat kesehatan
- d. Riwayat kesehatan masa lalu

- e. Riwayat pembedahan
- f. Riwayat penyakit yang pernah dialami
- g. Riwayat kesehatan keluarga Penyakit keturunan, anak kembar, dan genogram
- h. Riwayat kesehatan reproduksi
- i. Kaji tentang menses, siklus menstruasi, lamanya, banyaknya, bentuk, bau, dan warna.
- j. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas
- k. Riwayat seksual, riwayat pemakaian obat

Pemeriksaan fisik:

- a. Keadaan umum
- b. TTV
- c. Pemeriksaan head to toe

### **Trimester II**

Anamnesa:

- a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, status perkawinan, lamanya perkawinan dan alamat
- b. Keluhan utama
- c. Riwayat kesehatan
- d. Riwayat kesehatan masa lalu
- e. Riwayat pembedahan
- f. Riwayat penyakit yang pernah dialami
- g. Riwayat kesehatan keluarga
- h. Penyakit keturunan, anak kembar, dan genogram
- i. Riwayat kesehatan reproduksi

- j. Kaji tentang menorrhoe, siklus menstruasi, lamanya, banyaknya, bentuk, bau, dan warna.
- k. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas
- l. Riwayat seksual
- m. Riwayat pemakaian obat  
Pemeriksaan fisik:
  - a. Keadaan umum
  - b. TTV
  - c. Pemeriksaan head to toe

### **Trimester III**

#### Anamnesa

- a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, status perkawinan, lamanya perkawinan dan alamat
- b. Keluhan utama
- c. Riwayat kesehatan
- d. Riwayat kesehatan masa lalu
- e. Riwayat pembedahan
- f. Riwayat penyakit yang pernah dialami
- g. Riwayat kesehatan keluarga
- h. Penyakit keturunan, anak kembar, dan genogram
- i. Riwayat kesehatan reproduksi
- j. Kaji tentang menorrhoe, siklus menstruasi, lamanya, banyaknya, bentuk, bau, dan warna.
- k. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas
- l. Riwayat seksual

m. Riwayat pemakaian obat

Pemeriksaan fisik:

d. Keadaan umum

e. TTV

f. Pemeriksaan head to toe

## 2. Diagnosa dan Intervensi

### a. Berdasarkan SDKI

1) Diagnose :

a) Gangguan rasa nyaman (SDKI, 2017).

b) Deficit pengetahuan (SDKI, 2017).

c) Pola nafas tidak efektif (SDKI, 2017).

### 3. Intervensi

#### a. Gangguan rasa nyaman

Tujuan	Intervensi
Setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan status kenyamanan meningkat. Dengan kriteria hasil : Keluhan ketidaknyamanan dapat menurun Gelisah menurun (SLKI, 2019)	Observasi Identifikasi penurunan energy serta ketidakberdayaan untuk focus Identifikasi keluhan, dan teknik relaksasi Cek TTV Pra dan post latihan Cek apa yang di rasakan setelah latihan Terapeutik Menciptakan lingkungan yang nyaman baik suhu dan pencahayaan dan tidak ada gangguan Berikan keterangan tertulis mengenai perencanaan dan tata cara teknik relaksasi Pakaian yang dipakai nyaman

	<p>Jika memungkinkan tindakan medis perlu dilakukan ketika cara relaksasi sebagai metode pendukung</p> <p>Edukasi</p> <p>Jelaskan manfaat dan tujuan serta jenis relaksasi yang ada</p> <p>Jelaskan secara mendetail intervensi relaksasi yang diinginkan</p> <p>Anjurkan untuk mengambil posisi yang baik dan nyaman</p> <p>Berikan arahan untuk rileks dan meresapi rasa dari relaksasi</p> <p>Sarankan untuk sering mengulang relaksasi yang dipilih (SIKI, 2018)</p>
--	--

b. Deficit pengetahuan

Tujuan	Intervensi
<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pengetahuan dapat meningkat. Dengan kriteria hasil :</p> <p>Meningkatkan pengetahuan untuk mencegah risiko dalam kehamilan</p> <p>Meningkatkan pengetahuan untuk mengurangi risiko cedera (SLKI, 2019)</p>	<p>Observasi</p> <p>Identifikasi factor-factor yang bisa menurunkan pengetahuan mengenai risiko dalam kehamilan</p> <p>Identifikasi kesiapan ibu dalam menerima informasi</p> <p>Terapeutik</p> <p>Siapkan media dan materi yang akan dibawakan kepada ibu hamil</p> <p>Jadwalkan waktu dan tempat</p> <p>Beri kesempatan ibu untuk bertanya</p> <p>Edukasi</p> <p>Jelaskan risiko yang dapat menyebabkan masalah selama kehamilan (SIKI, 2018)</p>

c. Pola nafas tidak efektif

Tujuan	Intervensi
Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pola nafas kembali efektif. Dengan kriteria hasil : Tekanan darah normal Kedalaman napas normal (SLKI, 2019)	Observasi Monitor pola nafas ibu hamil Monitor ada tidaknya bunyi nafas tambahan Terapeutik  Posisikan ibu hamil dengan posisi semi-fowler dan fowler Berikan minuman hangat (SIKI, 2018)

**b. Berdasarkan Nanda dan Nic-Noc**

1) Diagnosa

Trimester I :

- a) Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual muntah
- b) Ketidaknyamanan berhubungan dengan perubahan fisik, pengaruh hormonal

Trimester II :

- a) Resiko gangguan citra tubuh berhubungan dengan persepsi perubahan biofisik
- b) Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan pergeseran diafragma karena pembesaran uterus

Trimester III :

Perubahan eliminasi urine berhubungan dengan pembesaran uterus  
Gangguan rasa nyaman b.d gejala terkait penyakit

## 2) Intervensi

No	Diagnosa	Intervensi
1	Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d mual muntah	Kaji adekuatan asupan nutrisi Kaji frekuensi mual muntah Timbang berat badan Ukur pembesaran uterus Kolaborasi : pantau kadar Hb/Ht
2	Ketidaknyamanan b.d perubahan fisik, pengaruh hormonal	Catat adanya rasa tidak nyaman Anjurkan penggunaan bra peyokong Kaji adanya mual muntah Anjurkan peningkatan minuman berkarbonat, makan sedikit tapi sering
3	Resiko gangguan citra tubuh b.d persepsi perubahan biofisik	Kaji sikap terhadap kehamilan perubahan bentuk tubuh Diskusikan perubahan aspek fisiologis dan respon klien terhadap perubahan Anjurkan gaya dan sumber-sumber yang tersedia dari pakaian saat hamil Diskusikan metode perawatan kulit dan berhias
4	Pola nafas tidak efektif b.d pergeseran diafragma	Kaji status, pola, frekuensi pernapasan Kaji riwayat terdahulu misalnya alergi atau asma Posisikan ibu dengan posisi senyaman mungkin

		Berikan lingkungan yang nyaman, aman, tenang bebas dari asap rokok/bau yang menyengat Kolaborasi dengan dokter dengan pemberian oksigen
5	Gangguan rasa nyaman b.d gejala terkait penyakit	Kaji secara terus menerus ketidaknyamanan klien dan metode mengatasinya Kaji status pernapasan klien Perhatikan adanya keluhan ketegangan pada punggung dan perubahan jalan Perhatikan adanya keluhan frekuensi BAK
6	Perubahan eliminasi urine b.d pembesaran uterus	Berikan informasi tentang perubahan pola berkemih sehubungan dengan trimester III Anjurkan klien untuk melakukan posisi miring kanan dan kiri Motivasi klien untuk minum 6-8 gelas per hari

## F. Tinjauan Agama Tentang Antenatal Care

### 1. Menurut Pandangan Islam Kehamilan

Menurut pandangan islam, kehamilan yaitu anugerah atau sekaligus amanah dari Allah SWT, sehingga ibu hamil diwajibkan untuk menjaga kehamilannya agar janin kandungannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di dalam Q.S Ar-Rad (13):8

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ  
بِمِقْدَارٍ ۝٨

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.

Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Muhammad Quraishy Shihab menjelaskan bahwa yang memberikan mukjizat yang besar kepada Rasulullah. Allah swt mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui keadaan manusia sejak masih berupa sperma yang tersimpan didalam Rahim sampai matinya. Oleh karena itu, dia mengetahui keadaan janin laki-laki atau perempuan yang dikandung dalam Rahim setiap wanita, pengurangan dan penambahan yang terjadi di dalam Rahim dari waktu ke waktu, sampai selesai masa kehamilan dan sempurnalah pertumbuhan janin hingga lahir ia ke dunia. Bagi Allah swt, segala sesuatu telah dibatasi kadar dan waktunya. Sungguh, segala sesuatu besar maupun kecil, bagi Allah ditetapkan dengan perhitungan yang tepat.

## 2. Menurut Pandangan Islam Proses Kehamilan

Proses kehamilan sepenuhnya di emban oleh seorang calon ibu merupakan sebuah kerja keras dan penuh resiko. Oleh sebab itu islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita hamil diperlakukan dengan baik, mendapatkan perhatian besar mengenai masalah kesehatan anak dan mendapatkan perhatian khusus mengenai pertumbuhan dan keselamatan seorang anak dimasa kecil di dalam Q.S Al-Mu'minun (23):12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ  
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

“dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik”.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PREEKLAMPSIA**

#### **A. Definisi Preeklampsia**

**P**reeklampsia atau yang biasa disebut Kehamilan Induced Hypertension (PIH) kehamilan atau toksemia kehamilan, ditandai dengan Tekanan darah meningkat, oedema, bahkan adanya proteinuria. Biasanya preeklampsia terjadi pada ibu hamil yang usia kehamilannya 20 minggu keatas atau tiap triwulan dari kehamilan, pada kehamilan 37 minggu tersebut umumnya preeklampsia biasa terjadi hingga minggu pertama setelah persalinan (Lalenoh, 2018).

Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, edema dan proteinuria yang muncul pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan (Muzalfah et al, 2018).

Preeklampsia adalah sindrom pada kehamilan (>20 minggu), hipertensi ( $\geq 140/90$  mmHg) dan proteinuria (>0,3 g/hari). Terjadi pada 2-5% kehamilan dan angka kematian ibu 12-15% (Malha et al., 2018)

Jadi, Preeklampsia adalah suatu penyakit pada kehamilan dengan timbulnya suatu gejala seperti tekanan darah tinggi, serta edema, dan Timbulnya preeklampsia setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria atau kandungan protein dalam urine meningkat.

#### **B. Faktor Resiko Preeklampsia**

Preeklampsia adalah penyakit spesifik selama kehamilan tanpa etiologi yang jelas Wang. et al (2020),

menurut Norma & Mustika (2013) terdapat beberapa faktor resiko terjadinya preeklampsia:

1. Primigravida atau kehamilan pertama, ibu yang pertama kali hamil sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi pada primigravida menyebabkan peningkatan pelepasan corticotropic-releasing hormone (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol (Nur & Arifuddin, 2017). Berdasarkan teori imunologik, preeklampsia pada primigravida terjadi. karena di primigravida pembentukan blocking antibody terjadi mengenai antigen yang belum sempurna, primigravida juga mengalami pembentukan Human Leucoyte Antigen (HLA-G) memainkan peran dalam memodulasi respons imun sehingga hasil konsepsi ditolak pada ibu hamil atau intoleransi ibu terhadap plasenta yang dapat menyebabkan preeklampsia.
2. Grand multigravida atau kehamilan lebih dari 5 kali sangat beresiko mengalami preeklampsia dikarenakan kurang elastisnya alat-alat kandungan yang mengalami perubahan termasuk pembuluh darah maka lebih mudah mengalami vasokonstriksi, adanya peningkatan cairan, muncul tekanan darah tinggi yang disertai pembengkakan atau edema dan proteinuria.
3. Morbid obesitas atau biasa disebut kegemukan, penyakit ini menyertai kehamilan seperti diabetes mellitus, Obesitas dapat mengakibatkan kolesterol meningkat, bahkan mengakibatkan jantung lebih cepat dan bekerja berat. Ibu hamil dengan obesitas dalam tubuhnya semakin banyak jumlah darah yang

terkandung yang berarti semakin parah jantung dalam memompa darah sehingga dapat menyebabkan preeklampsia. Preeklampsia lebih menjurus terjadi pada ibu hamil yang memiliki Riwayat Diabetes mellitus dikarenakan saat ibu hamil kebutuhan janin yaitu plasenta lebih berperan aktif dalam memenuhi semua kebutuhannya.

4. Riwayat Hipertensi, Orang dengan hipertensi sebelum kehamilan (hipertensi kronis) memiliki risiko 4-5 kali terjadi pre-eklampsia pada kehamilannya. Angka kejadian hipertensi kronis pada kehamilan yang disertai pre-eklampsia sebesar 25%. Sedangkan bila tanpa hipertensi kronis angka kejadian pre-eklampsia hanya 5% (Malha et al., 2018). Ibu hamil dengan hipertensi kronis membuatnya lebih mudah mengalami preeklampsia berat karena pembuluh darah ibu sebelum mencapai 20 minggu telah mengalami vasokonstriksi. Ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan proteinuria selama ibu hamil. Gagal ginjal juga menyebabkan terjadinya preeklampsia akibat terjadi penurunan aliran darah menuju ginjal, sehingga menimbulkan filtrasi glomerulus menurun maka terjadi proteinuria.
5. Usia, ibu hamil pada usia 35 tahun lebih rentan mengalami masalah kesehatan salah satunya adalah preeklampsia. Karena adanya perubahan jaringan rahim dan saluran lahir yang tidak fleksibel seperti halnya pembuluh darah, disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Seiring bertambahnya umur semakin mudah terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah ibu, proteinuria dan edema.

Sebenarnya pada umur 35 tahun belum dianggap rentan, tetapi kapasitas reproduksi semakin menurun sehingga dianggap sebagai fase untuk berhenti hamil.

### C. Klasifikasi Preeklampsia

Menurut (Lalenoh, 2018) klasifikasi preeklampsia atau hipertensi dalam kehamilan terbagi 3, yaitu:

1. Preeklampsia Ringan
  - a. Kenaikan TD 140/90mmHg
  - b. Adanya pembengkakan kaki, muka, jari tangan serta berat badan naik 1kg lebih tiap minggunya
  - c. Adanya Proteinuria
  - d. Tidak ada nyeri kepala
2. Preeklampsia Sedang
  - a. Tekanan darah Sistolik 150-159 mmHg, tekanan diastolic 100-109 mmHg
3. Preeklampsia Berat
  - a. Tekanan darah senilai  $>160/100$  mmHg
  - b. Adanya proteinuria  $>5$  gram/L
  - c. Jumlah urine kurang (Oliguria) dari 500 cc/24Jam
  - d. Serebral terganggu, visus terganggu dan timbul nyeri pada epigastium
  - e. Terjadi pembengkakan/edema paru atau sianosis
  - f. Ada kejang (Eklampsia)
  - g. Timbul keluhan subjektif, seperti : nyeri, gangguan penglihatan, sakit kepala, gangguan kesadaran ataupun odema paru


## D. Manifestasi Klinis Preeklampsia

Menurut Bothamley & Boyle (2013) ada beberapa manifestasi preeklampsia, yaitu :


1. Bertambahnya Berat Badan, terjadi kenaikan berat badan yaitu  $\pm 1$  kg beberapa kali seminggu
2. Timbul pembengkakan akibat BB meningkat, pembekakan pada kaki, muka dan pergelangan pada tangan
3. Hipertensi / tekanan darah tinggi (yang di ukur selama 30 menit setelah pasien beristirahat) dengan tekanan darah  $>140/90$  mmHg
4. Proteinuria
  - a. adanya protein dalam urine sebesar 0,3 gram/L/hari atau pemeriksaan kualitatif senilai +1/+2
  - b. kadar proteinuria 1 g/l yang dikeluarkan melalui kateter yang di ambil sebanyak 2 kali setiap 6 jam.
5. Tanda dan gejala lainnya yaitu: sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastric, mual, muntah, penurunan Gerakan janin, dan ukuran janin lebih kecil tidak sesuai usia kehamilan.

## E. Patofisiologi

### Normal Pregnancy



## Preeklampsia



(Malha et al., 2018)

Pada kehamilan normal, arteri spiral uteri invasiv ke dalam trofoblas, menyebabkan peningkatan aliran darah dengan lancar untuk kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Pada preeklampsia, terjadi gangguan sehingga aliran darah tidak lancar dan terjadi gangguan pada plasenta. Peningkatan sFlt1 menyebabkan plasenta memproduksi free vascular endothelial growth factor (VEGF) dan penurunan placental growth factor (PlGF). Selanjutnya menyebabkan disfungsi endotel pada pembuluh ibu mengakibatkan penyakit multi-organ: hypertension, glomerular dysfunction, proteinuria, brain edema, liver edema, coagulation abnormalities

Menurut Laleno (2018) patofisiologi terjadinya hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan Preeklampsia dan edema diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Cabang-cabang Arteri uterus dan arteri ovarium memberikan aliran darah menuju rahim dan plasenta. kemudian keduanya akan masuk ke miometrium dalam bentuk arteri aquaria sehingga dapat memberikan cabang arteri

radial. arteri radial tersebut akan masuk ke endometrium sehingga menjadi anggota dari arteri basal dari cabang arteri spiral. Dengan kehamilan yang normal, biasa terdapat trofoblas yang masuk kedalam lapisan otot arteri spiral. Trofoblas juga masuk kedalam bagian arteri spiral, sehingga jaringan matriks menjadi longgar serta lumen spiral menjadi lebih lebar. Lumen arteri spiral terjadi vasodilatasi dan distensi sehingga berdampak terjadinya hipotensi, resistensi pembuluh darah juga menurun, bahkan dapat membuat aliran darah ke daerah plasenta utero itu meningkat.

Tekanan darah yang tinggi pada masa kehamilan membuat tidak terdapat invasi yang cukup lengkap di dalam sel trofoblas yang di lapisi otot arteri spiral untuk tetap kaku dan keras maka tidak mungkin terjadi distensi dan vasodilatasi akibat lumen arteri spiral itu sendiri. Maka mengakibatkan arteri spiral mengalami pengecilan lumen pembuluh darah sehingga aliran darah uteroplasenta itu menjadi berkurang, berakibat tidak adanya oksigen yang cukup dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh, dan iskemia pada plasenta.

## 2. Teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel

Iskemia yang dialami plasenta serta tidak adanya oksigen yang cukup dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh itu akan menimbulkan radikal bebas atau senyawa oksidan. Radikal bebas merupakan senyawa yang mendapatkan elektron atom atau molekul yang memiliki elektron tetapi tidak memiliki pasangan. Iskemik pada plasenta dapat menghasilkan sebuah oksidan penting yaitu radikal hidroksi yang toksik, terutama membran endotel didalam pembuluh darah untuk perlindungan dalam tubuh yang normal yaitu produksi oksidan

Hadirnya radikal hidroksil ini didalam pembuluh darah dianggap sebagai racun mengalir dalam aliran darah, sehingga hipertensi dalam kehamilan tersebut biasa disebut dengan "Toksemia". Radikal hidroksil tersebut dapat menghancurkan membrane yang menyimpan asam lemak tidak jenuh membuat lemak perioksida. Lemak peroksida dapat menghancurkan protein sel endotel dan juga nucleus.

Preeklampsia teruji kadar oksidan yang lebih khusus meningkatnya lemak peroksida, sedangkan antioksidan mis. fat-soluble sebagai vitamin dalam preeklampsia mengalami penurunan, yang mengakibatkan dominasi kadar lemak oksidatif peroksida yang tinggi. Lemak perioksidan seperti oksidan sangat toksik bersirkulasi aliran darah ke seluruh tubuh tetapi menghancurkan membrane sel sendotel itu sendiri. Selaput sel endotel sangat rentan terhadap kerusakan akibat peroksida lemak yang relatif gemuk. Secara langsung berkaitan dengan peraliran darah dan yang menampung begitu banyak asam lemak takjenuh.

Lemak peroksida yang terkena sel endotel, sel endeotel mengalami kerusakan, membrane sel endotel itu sendiri yang mulai mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut mengakibatkan gangguan fungsi endotel, dan bahkan kerusakan pada struktur sel endotel secara menyeluruh.

### 3. Teori pembenaran imunologik ibu dan janin

Ibu dengan kehamilan yang normal, respon imunnya tidak lagi tolak keberadaan konsepsi. Terdapat Human Leukocyte Antigen Protein G (HLA-G), yang sangat memiliki berperan penting terkait modulasi respon imun seseorang, sehingga untuk menolak hasil konsepsi (plasenta) ibu tidak bisa. Dengan adanya kehadiran HLA-G maka penyerbuan sel trofoblas menuju kedalam jaringan desidua ibu bisa terjadi.

Ibu yang mengalami preeklampsia maka plasenta mengalami penurunan pada HLA-G.

Penurunan tersebut pada daerah desidua plasenta, maka terlambat invasi trofoblas menuju desidua. Jadi, pentingnya invasi trofoblas ini sehingga menjadikan jaringan desidua yang lunak, juga rapuh mudah dilatasi arteri spiral. Produksi sitikon yang dirangsang oleh HLA-G untuk mempermudah terjadinya reaksi inflamasi.

#### 4. Teori penyesuaian kardiovaskuler

Ibu hamil normal, pembuluh darahnya refrakter. Refrakter adalah suatu pembuluh darah yang tidak peka dengan adanya impuls bahan vasopresor, untuk menimbulkan respon vasokonstriksi maka dibutuhkan kadar vasopresor yang tinggi. Ibu hamil normal, sintesis prostaglandin dalam sel endotel melindungi pembuluh darah refrakter pada vasopresor.

Tetapi pada preeklampsia, kekuatan refrakter menghilang terhadap bahan vasokonstriktor, pada kenyataannya sensitivitas meningkat terhadap vasopresor. kekuatan refraktori pembuluh darah menghilangnya bahan vasopresor sehingga membuat pembuluh darah jadi sensitif akan bahan vasopresor.

#### 5. Teori stimulus inflamasi

Teori yang didasarkan pada fakta adanya proses inflamasi ketika pelepasan puing-puing trofoblas dalam peredaran darah merupakan stimulus utama. Ibu hamil yang normal, memiliki jumlah puing trofoblas yang masih batas wajar, sehingga reaksi inflasi dalam batas normal dan plasenta lepaskan puing-puing trofoblas sebagai nekrotik

trofoblas dan sisa proses apoptosis karena reaksi stres oksidatif. Bahan asing tersebut yang memicu munculnya proses inflamasi. Berbeda dengan adanya proses apoptisis atau kematian sel pada ibu hami yang terkena preeklampsia membuat produksi debris apoptosis dan trofoblas nekrotik mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan stress oksidatif.

## **F. Pemeriksaan Penunjang**

Menurut Saifuddin (2016), Pemeriksaan Laboratorium Preeklampsia adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin menurun kadar normal Hb pada ibu yang sedang hamil adalah 12-14 gram%, peningkatan hemaktrosit (dengan nilai 37-43 vol%), dan trombosit mengalami penurunan (dengan nilai 150.000-450.000/mm<sup>3</sup>)
2. Tes urin, yang ditemukan proteinuria
3. Tes fungsi hati, Bilirubin mengalami peningkatan (yang Normalnya <1 mg / dl), serum Glutamat Pirufat trasaminase (SGPT) mengalami peningkatan dari nilai normal (N=15-45 u/ml), Aspartat aminomtrasferase (AST)>60 ul, SGOT juga mengalami peningkatan (N=<31 u/l), maka total protein serum menurun (N = 6,7-8,7 g/dl)
4. Tes asam urat, peningkatan asam urat (N = 2,4-2,7 mg/dl)
5. Radiologi
  - a. Ultrasonografi, adanya perlambatan pertumbuhan janin intrauterin, respirasi intrauterin melambat,

aktivitas pada janin melambat, dan cairan ketuban dengan volume sedikit.

- b. Kardiografi, ditemukan denyut jantung janin (DJJ) dapat diketahui bahwa mengalami kelemahan.

## **G. Penatalaksanaan Preeklampsia**

Menurut Adriani & Wirjatmadi (2016), Penatalaksanaan Preeklampsia memiliki beberapa prinsip dan beberapa penatalaksanaan sesuai dengan tingkat klasifikasinya, yaitu :

Prinsip penatalaksanaan Preeklampsia

1. Melindungi ibu dari efek peningkatan tekanan darah
2. Mencegah progresivitas penyakit menjadi eklampsia
3. Mengatasi atau menurunkan risiko janin (solusio plasenta, pertumbuhan janin terlambat, hipoksia sampai kematian janin).
4. Melahirkan janin dengan cara yang paling aman dan cepat segera mungkin setelah matur, atau imatur jika diketahui bahwa risiko janin atau ibu akan lebih berat jika persalinan ditunda lebih lama.

Penatalaksanaan preeklampsia ringan

1. Dapat dikatakan tidak mempunyai resiko bagi ibu maupun janin
2. Tidak perlu segera diberikan obat antihipertensi atau obat lainnya, tidak perlu dirawat kecuali tekanan darah meningkat terus (batas aman 140-150/90-100 mmHg)
3. Istirahat yang cukup

4. Pemberian luminal 1-2 x 30 mg/hari bila ibu hamil tidak bisa tidur
5. Pemberian asam asetilsalisilat (aspirin) 1x80 mg/hari
6. Bila tekanan darah tidak turun, anjurkan dirawat dan diberi obat antihipertensi
7. Diet rendah garam dan diuretic, tidak perlu
8. Jika maturitas janin masih lama, lanjutkan kehamilan, periksa tiap satu minggu
9. Indikasi rawat : jika ada perburukan, tekanan darah tidak menurun setelah dua minggu rawat jalan, peningkatan berat badan melebihi 1kg/minggu dua kali secara berturut-turut, atau ibu hamil menunjukkan tanda-tanda preeklampsia berat. Silahkan berikan juga obat antihipertensi.
10. Jika dalam perawatan tidak ada perbaikan, tata laksana sebagai preeklampsia berat. Jika perbaikan, lanjutkan rawat jalan.
11. Pengakhiran kehamilan: ditunggu sampai usia kehamilan 40 minggu, kecuali ditemukan pertumbuhan janin terhambat, gawat janin, solusio plasenta, eclampsia, atau indikasi terminasi lainnya. Minimal usia 38 minggu, janin sudah dinyatakan matur.
12. Persalinan pada preeklampsia ringan dapat dilakukan spontan atau dengan bantuan ekstraksi untuk mempercepat kala II.

Penatalaksanaan preeklampsia berat, Dapat ditangani secara aktif atau konservatif :

1. Aktif berarti kehamilan diakhiri/diterminasi Bersama dengan pengobatan medisinal
2. Konservatif berarti kehamilan dipertahankan Bersama dengan pengobatan medisinal
3. Prinsip tetap pemantauan janin dengan klinis, USG, kardiografi.

## **H. Pencegahan Preeklampsia**

Dari pencegahan preeklampsia dapat mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Diperlukan pengawasan rutin terhadap ibu hamil dengan penambahan berat badan harus diperhatikan, terjadi peningkatan tekanan darah, dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya proteinuria, teraturnya dalam memeriksakan kehamilan dan waspadalah jika timbul tanda awal terjadi preeklampsia. Karena biasanya ibu hamil tidak mengeluh dan tidak memperhatikan tanda awal preeklampsia, ibu hamil perlu lebih waspada terhadap timbulnya tanda dan gejala preeklampsia. Timbulnya preeklampsia tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi bisa diberikan pengetahuan dan pengawasan yang baik untuk ibu yang sedang hamil, diantaranya :

### **1. Pemeriksaan Kehamilan**

Kunjungan kehamilan/ANC (*Antenatal Care*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan awal dari preeklampsia (Nur & Arifuddin, 2017). Rajinlah memeriksakan kehamilan di Pelayanan

Kesehatan, Jika timbul perubahan perasaan ibu dan gerak janin dalam Rahim. Pemeriksaan kehamilan yang bermutu dan teratur serta teliti dapat menemukan tanda-tanda dini terjadinya preeklampsia, agar penyakit tidak menjadi lebih berat maka diberikan pengobatan yang cukup dan pemberian terapi yang tepat untuk ibu dan janinnya harus dilakukan dalam waktu penanganan semestinya. Tujuan utama dari penanganan ini adalah mencegah terjadinya preeklampsia berat, yang akan mengarah pada eklampsia maupun komplikasi (Anasitu, 2015).

## 2. Diet Makan

Makanlah makanan yang memiliki protein tinggi, karbohidrat tinggi, vitamin cukup, lemak rendah, rendah garam dan yang lebih penting yaitu dianjurkan untuk hindari penambahan berat badan.

## 3. Istirahat yang cukup

Dalam bertambahnya usia istirahat yang cukup disesuaikan kemampuan dan kebutuhan, dianjurkan agar ibu hamil lebih sering duduk atau baring mengarah belakang janin agar aliran darah menuju ke plasenta tidak terganggu.

## I. Komplikasi Preeklampsia

Menurut (Lyall & Belfort, 2010) bila preeklampsia tidak cepat ditangani dapat menimbulkan komplikasi yang akan menyebabkan kematian pada ibu dan janinnya, yaitu :

### 1. Kurangnya aliran darah menuju ke plasenta

Preeklampsia dapat mempengaruhi arteri yang membawa darah menuju plasenta. Jika sampai di plasenta namun darah yang sampai tidak cukup, maka terjadi

kekurangan oksigen dan pertumbuhan pada melambat atau lahir dengan berat bayi yang lebih rendah akibat kekurangan nutrisi.

## 2. Terlepasnya Plasenta

Resiko terlepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum ibu melahirkan salah satunya yaitu akibat dari Preeklampsia yang meningkatkan terjadinya resiko yang mengakibatkan pendarahan sehingga dapat mengancam ibu dan bayinya.

## 3. Sindrom HELLP

Hemolysis (enzim sel darah merah) atau yang biasa disingkat dengan (HELLP), adalah tingginya enzim hati dan rendahnya trombosit. Gejala, yang timbul biasanya pusing, muntah, sakit kepala dan sakit perut pada bagian atas.

## 4. Eklampsia

Preeklampsia jika tidak dikontrol, maka akan terjadi eklampsia. Eklampsia menyebabkan terjadinya kerusakan yang permanen pada organ ibu hamil, seperti hati, dan ginjal. Eklampsia yang parah menimbulkan ibu mengatasi koma, kerusakan pada otak dan menyebabkan kematian yang gagal.

## **J. Asuhan Keperawatan Preeklampsia**

### 1. Pengkajian

- a. Anamnesa : Identitas ibu hamil, meliputi : Inisial nama, TTL / Usia, Pendidikan terakhir, suku, pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal.
- b. Data Riwayat Kesehatan ibu
  - 1) Riwayat Kesehatan yang sekarang :

2) Riwayat Kesehatan yang lalu :

3) Riwayat Kesehatan genetic :

c. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum : pada ibu yang menderita preeklampsia biasanya mengalami kelelahan

2) TD : mmHg

3) Nadi : x/menit

4) Nafas : x/menit

5) Suhu : oC

6) BB : Kg

7) Kepala : terlihat kepala yang kurang bersih dan berketombe serta ibu yang mengalami preeklampsia mengeluh sakit kepala

8) Wajah : ibu hamil yang preeklampsia wajahnya tampak bengkak / edema

9) Mata : ibu hamil yang preeklampsia mata dengan penglihatan yang kabur dan konjungtiva anemis

10) Mulut : ibu hamil yang preeklampsia mukosa bibirnya lembab dan mulut terjadi pembengkakan vaskuler pada gusi sehingga bisa mengalami pembengkakan dan pendarahan.

11) Thorax

a) Paru-paru : ibu hamil yang preeklampsia terjadi peningkatan respirasi, nafas pendek dan edema paru.

- b) Jantung : ibu hamil yang preeklampsia mengalami dekomposisi jantung
- c) Payudara : payudara membesar, lebih keras dan padat, areola menghitam dan puting menonjol
- d) Abdomen : terjadinya mual dan muntah akibat nyeri epigastrium
- e) Pemeriksaan janin : ibu hamil yang preeklampsia Gerakan janin melemah dan tidak teraturnya bunyi jantung
- f) Ektremitas : terdapat pembengkakan pada kaki serta jari-jari

## 2. Diagnosa Keperawatan

- a. Nyeri akut
- b. Pola nafas tidak efektif
- c. Hambatan gangguan mobilitas fisik
- d. Deficit pengetahuan
- e. Resiko cedera pada janin (SDKI, 2017)

## 3. Tindakan Keperawatan

- a. Nyeri Akut

Tujuan	Intervensi
Setelah pemberian Tindakan keperawatan diharapkan klien dapat menunjukkan penurunan	<p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi lokasi nyeri, waktu timbulnya nyeri, kualitas, frekuensi</li> <li>b. Identifikasi skala nyeri pada ibu hamil</li> <li>c. identifikasi respons jika timbul nyeri non verbal</li> </ul>

<p>nyeri dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluhan nyeri menurun</li> <li>b. Tekanan darah normal</li> <li>c. Frekuensi nadi normal</li> </ul> <p>(SLKI, 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Identifikasi faktor yang dapat memperingan nyeri dan memperberat nyeri</li> <li>e. Identifikasi pengetahuan ibu hamil serta tanyakan tentang nyeri</li> <li>f. Identifikasi pengaruh budaya dalam menangani nyeri jika timbul</li> <li>g. Pantau/Monitor keberhasilan terapi komplementer pada ibu hamil jika sudah diberikan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teknik nonfarmakologis tetap diberikan pada ibu yang mengalami preeklampsia untuk mengurangi rasa nyeri ibu (misal Terapi music, hypnosis, imajinasi terbimbing, aromate rapi, TENS, terapi pijat, akupresur, terapi bermain serta kompres hangat/dingin)</li> <li>b. Tetap control lingkungan yang bisa memperberat nyeri pada ibu hamil (misal Pencahayaan, kebisingan dan Suhu ruangan)</li> <li>c. Fasilitasi untuk istirahat dan tidur</li> </ul> <p><b>Edukasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan pada ibu hamil penyebab timbulnya nyeri, periode dan pemicu nyeri</li> </ul>
---	--

	<p>b. Jelaskan pada ibu hamil bagaimana strategi dalam meredakan rasa nyeri</p> <p>c. Anjurkan dalam memonitor nyeri jika secara mandiri</p> <p>d. Anjurkan menggunakan analgetik yang tepat</p> <p>e. Ajarkan Teknik-teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu hamil</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <p>a. Kolaborasi pemberian analgetik pada ibu hamil, jika perlu. (SIKI, 2018)</p>
--	---

**b. Pola Nafas Tidak Efektif**

<b>Tujuan</b>	<b>Intervensi</b>
<p>Setelah pemberian Tindakan keperawatan diharapkan Klien menunjukkan pola nafas kembali efektif dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Kedalaman napas normal</p> <p>b. Frekuensi napas normal</p> <p>c. Tekanan</p>	<p><b>Observasi</b></p> <p>a. Tetap monitor pola nafas ibu hamil (mulai dari kedalaman, usaha napas serta frekuensi)</p> <p>b. Tetap monitor adanya bunyi napas tambahan (misal Mengi, Gurgling, ronkhi kering, dan <i>wheezing</i>)</p> <p>c. Tetap untuk Monitor sputum (warna, aroma dan jumlah)</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Patenan jalan napas tetap dipertahankan <i>chin-lift</i> dan headtilt (jika curiga trauma servikal maka lakukan <i>jaw-trust</i>)</p> <p>b. Posisikan ibu hamil dengan posisi semi-fowler atau fowler</p>

<p>darah normal (SLKI, 2019)</p>	<p>c. Berikan minuman yang hangat  d. Jika terdapat lendir, Lakukan penghisapan lendir &lt;15 detik  e. Berikan oksigen (O<sub>2</sub>), jika perlu</p> <p><b>Edukasi</b>  a. Ajarkan ibu hamil melakukan Teknik batuk yang efektif</p> <p><b>Kolaborasi</b>  a. Kolaborasikan pemberian ekspektoran, mukolitik dan bronkodilator, jika perlu. (SIKI, 2018)</p>
----------------------------------	---

**c. Hambatan Gangguan Mobilitas Fisik**

Tujuan	Intervensi
<p>Setelah pemberian Tindakan keperawatan diharapkan klien menunjukkan peningkatan mobilitas fisik, dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Peningkatan pergerakan ekstremitas  b. Peningkatan kekuatan otot  c. Rentang gerak (ROM) normal  d. Nyeri menurun  e. Kecemasan</p>	<p><b>Observasi</b>  a. Identifikasi jika timbul nyeri atau keluhan fisik lainnya  b. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan  c. Pantau tekanan darah dan frekuensi jantung ibu hamil sebelum melakukan mobilisasi  d. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi</p> <p><b>Terapeutik</b>  a. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (misalnya pegangan tempat tidur)  b. Tetap Fasilitasi untuk</p>

<p>menurun</p> <p>f. Kelemahan fisik menurun (SLKI, 2019)</p>	<p>melakukan pergerakan ibu hamil, jika perlu</p> <p>c. Keluarga dilibatkan dalam menolong ibu hamil meningkatkan pergerakan</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan tujuan mobilisasi serta prosedurnya</p> <p>b. Anjurkan untuk tetap lakukan mobilisasi dini</p> <p>c. Ajarkan mobilisasi yang sederhana dilakukan (mis. Duduk di sisi tempat tidur, duduk di tempat tidur dan berpindah dari tempat tidur ke kursi) (SIKI, 2018)</p>
---	---

**d. Defisit Pengetahuan**

<p>Setelah pemberian tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan peningkatan pengetahuan dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Meningkatkan pengetahuan agar mengura-angi risiko cedera</p> <p>b. Meningkatkan pengetahuan untuk</p>	<p><b>Observasi</b></p> <p>a. Identifikasi kesiapan ibu hamil dan kemampuan dalam menerima informasi</p> <p>b. Identifikasi faktor-faktor yang dapat menurunkan ataupun meningkatkan pengetahuan dalam mencegah terjadinya preeklampsia</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Siapkan media dan materi Pendidikan Kesehatan yang akan diberikan pada ibu hamil</p>
---	---

<p>perilaku yang berisiko tinggi</p> <p>c. meningkatkan pengetahuan untuk mencegah (SLKI, 2019)</p>	<p>b. Jadwal kapan akan dilakukan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan bersama</p> <p>c. Beri kesempatan ibu hamil untuk bertanya</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia pada ibu hamil (SIKI, 2018)</p>
---	--

**e. Resiko Cedera pada Janin**

<p>Setelah pemberian tindakan keperawatan, diharapkan klien tidak menimbulkan terjadinya resiko cedera pada janin dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Tidak menimbulkan perdarahan</p> <p>b. Tekanan darah normal</p> <p>c. Pola istirahat dan tidur baik</p> <p>d. Frekuensi denyut nadi normal (SLKI, 2019)</p>	<p><b>Observasi</b></p> <p>a. Identifikasi status obstetric</p> <p>b. Identifikasi Riwayat obstetric</p> <p>c. Identifikasi adanya penggunaan obat, diet dan merokok</p> <p>d. Identifikasi pemeriksaan keha-milan sebelumnya</p> <p>e. Periksa denyut jantung janin selama 1 menit</p> <p>f. Monitor denyut jantung janin</p> <p>g. Monitor tanda vital ibu</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Atur posisi pasien</p> <p>b. Lakukan <i>manuver leopold</i> untuk menentukan posisi janin</p>
---	---

	<p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Jelaskan tujuan dan prosedur dalam pemantauan janin ibu</p> <p>b. Setelah itu berikan ibu informasi dari hasil pemantauan, jika perlu</p> <p>(SIKI, 2018)</p>
--	---

#### 4. Penanganan Preeklampsia pada Kehamilan

##### a. Terapi Murottal Al-Qur'an

Terapi murottal dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dengan irama sedang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat (tartil), dengan mendengarkan lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia, suara manusia merupakan instrument penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Yang dapat menurunkan tekanan darah ibu hamil dari segi kecemasan karena suara tersebut dapat menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormone endorfinalami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian (Widiastuti et al., 2018).

Dimana kecemasan dapat berpengaruh pada stress seseorang dan stress merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya preeklampsia atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Dan hasil yang diperoleh dari tinjauan Literature ada efek terapi murottal pada tekanan darah atau ada perbedaan dalam tekanan darah sebelum dan setelah mendapatkan perawatan. Penurunan rata-rata dalam sistol rata-rata 12.188 dan rata-rata penurunan diastolic rata-rata 6.233, sesuai dengan kesimpulan bahwa terdapat penurunan skor kecemasan sebelum dan sesudah perlakuan serta terdapat

perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan. Terapi murottal bukanlah terapi medis yang dapat menyembuhkan preeklampsia, namun dapat menjadikan ibu hamil lebih tenang dan rileks sehingga mengurangi kecemasan terhadap kondisinya. Kecemasan yang berlarut-larut dapat berbahaya bagi ibu hamil dengan preeklampsia, karena dapat memperberat kondisi preeklampsia, diantaranya tekanan darah semakin tinggi, gangguan organ yang semakin bertambah ataupun sampai pada eklampsia dan kematian (Yuliani et al., 2018).

Hal ini sejalan seperti yang telah diterangkan oleh Anwar (2010) didalam bukunya bahwa membaca maupun mendengarkan Al-Qur'an dapat memberikan efek ketenangan didalam tubuh sebagai adanya unsur meditasi, autosugesti dan relaksasi. Rasa tenang ini yang selanjutnya memberikan respon positif yang sangat berpengaruh mendatangkan persepsi positif.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS Ar-Ra'd'/13:28. Yang membahas mengenai orang yang beriman dan juga hatinya akan tentram jika selalu mengingat Allah :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemah-Nya :

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. (Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 252).

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat Allah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram dan jiwa menjadi tenang. Tidak merasa gelisah, takut ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan merasa Bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya (Al-Qur'an Kemenag RI, 2019).

Terkait ayat tersebut, preeklampsia atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil adalah salah satu faktor pemicunya yaitu stress dimana ketika ibu hamil stress maka ibu hamil akan mengalami kecemasan ataupun kegelisahan, sehingga dengan membaca dan mendengarkan Al-Qur'an sama artinya menemukan obat mujarab bagi berbagai penyakit yang sedang ia alami, keemasannya akan berkurang seperti yang dijelaskan diatas dan ibu hamil akan merasa lebih rileks dan tenang ketika mengingat Allah SWT.

#### b. Terapi Massage Aromatherapy Lavender

Salah satu tanda dan gejala dari preeklampsia adalah terjadinya hipertensi. Penanganan hipertensi pada ibu hamil sampai saat ini masih menggunakan terapi farmakologi atau obat-obatan sebesar 100%. Salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat menurunkan tekanan darah adalah terapi pijat aromatherapy lavender. Pijat aromatherapy lavender merupakan pilihan terapilain selain relaksasi nafas dalam, dimana terapi ini menggunakan minyak esensial dengan aroma lavender yang mampu menembus kulit dan terserap ke dalam tubuh, sehingga memberikan pengaruh penyembuhan dan menguntungkan pada berbagai jaringan dan organ internal (Konsoemardiyah, 2013).

Secara fisiologis, pijatan dengan aromatherapy lavender merangsang dan mengatur tubuh, memperbaiki aliran darah dan kelenjer getah bening, sehingga oksigen, zat makanan, dan sisa makanan dibawa secara efektif dari jaringan tubuh dan plasenta. Dengan pijat aromatherapy lavender bisa menurunkan emosi, merelaksasi dan menenangkan saraf, serta membantu menurunkan tekanan darah. Pada ibu hamil yang mengalami hipertensi, pemberian terapi pijat aromatherapy lavender membantu ibu merasa lebih rileks dan nyaman. Terdapat adanya perbedaan penurunan signifikan antara tekanan darah kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan karena nilai  $p\text{-value} \leq 0,05$  (Isro'aini, 2019).

#### c. Pendidikan Kesehatan

Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya preeklampsia adalah pemberian pengetahuan melalui pendidikan kesehatan yaitu dengan penggunaan alat atau media yang digunakan ketika ingin menyampaikan informasi yang dapat membuat sasaran pendidikan lebih mudah memahami dibandingkan hanya secara lisan, Karena dapat mengamati langsung gambar dan tulisan, dimana media merupakan bentuk dalam menyalurkan pesan atau informasi untuk itu, dalam menentukan media hendaknya menyesuaikan pada karakteristik dari audiens supaya apa yang disampaikan dapat diterima secara efektif (Bagaray, et. al 2016).

Penggunaan audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi mulai dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Penyampaian informasi melalui media video memiliki kelebihan dalam hal memberikan visualisasi

yang baik sehingga memudahkan proses penyerapan pengetahuan. Video termasuk dalam audiovisual karena melibatkan indera pendengaran sekaligus indera penglihatan. Audiovisual ini mampu membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali dan menghubungkan fakta dan konsep (Kustandi, 2011).

## **K. Tinjauan Agama Terkait Preeklampsia**

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan seluruh kehidupan umatnya. Seluruh aspek sudah dijelaskan didalamnya dan dituangkan dalam Al-Qur'an serta dilengkapi dengan Al-Hadist. Allah SWT sudah mengatur semuanya mulai dari konsepsi sampai meninggalnya seorang. Ketika seorang wanita sudah berkeluarga hal yang sangat diinginkan yaitu Kehamilan, karena kehamilan merupakan kabar Bahagia bahwa mereka akan mendapatkan keturunan (anak). Tetapi, banyak wanita yang tidak begitu memahami tanda-tanda awal kehamilan sehingga mereka terkadang tidak mengetahui bahwa ia hamil. Berkaitan dengan tanda-tanda kehamilan, Al-Quran hanya mengemukakan beban yang ditanggung oleh ibu hamil yang setiap saat bertambah berat karena bertambah besarnya kandungan.

### **1. Ayat terkait Kehamilan**

Hal ini diisyaratkan di dalam Q.S Al-A'raf /7:189, sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
 إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا  
 اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemah-Nya :

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (adam) dan dari pada Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, kedua (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata). “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh tentulah kami akan selalu bersyukur.” (Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 175).

Dalam ayat diatas Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu dan dari jenis yang satu itu diciptakan pasangannya, maka hiduplan mereka berpasangan pria-wanita (suami-isteri) dan tentramlah dia dengan isterinya itu. Hidup berpasangan suami-isteri merupakan tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, timbulah keinginan untuk hidup berpasangan sebagai suami-isteri, dan dia akan mengalami keguncangan batin apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan itulah terwujud ketentraman. Ketentraman tidak akan terwujud dalam diri manusia diluar hidup berpasangan suami-isteri. Maka tujuan kehadiran seorang isteri pada seorang laki-laki didalam agama islam ialah menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Bila kedua suami-istri berkumpul, mulailah isterinya mengandung benih. Saat permulaan dari pertumbuhan benih itu terasa

ringan. Pertama-tama terhentinya haid dan selanjutnya benih itu terus berproses, perlahan-lahan. Maka ketika kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan do'a kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, sempurna jasmani, berbudi luhur, cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, isteri itu berjanji akan mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Allah karena menerima nikmat itu dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan (Al-Qur'an Kemenag RI, 2019).

Ayat diatas menjelaskan tanda-tanda kehamilan dengan adanya perubahan yang dialami oleh seorang perempuan karena adanya kandungan janin dalam perut seorang wanita. Kandungan yang begitu bertambah besar setiap harinya menyebabkan bertambahnya beban yang ibu hamil tanggung. Ayat tersebut juga mengandung nilai kepasrahan terhadap takdir Allah Swt dan nilai tanggung jawab yang berat bagi ibu hamil Sehingga menyadarkan untuk senantiasa berdoa kepada-Nya agar kelak melahirkan anak yang sempurna.

Tanggung jawab yang diemban oleh ibu hamil untuk menjaga dan merawat kandungannya memang cukup berat karena dibutuhkan kesabaran untuk menunggu selama sembilan bulan. Perawatan kandungan cukup berpengaruh terhadap perkembangan janin, seorang ibu hamil tentunya harus menghindari beberapa hal diantaranya makanan dan minuman serta hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan janinnya. Selain perlunya perawatan dan penjagaan secara fisik, seorang ibu hamil juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kestabilan mental ibu hamil, karena ibu hamil yang

mengalami stres dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin yang dikandungnya.

Terdapat beberapa pencegahan preeklampsia salah satunya yaitu diet makan yang berpengaruh pada penambahan berat badan ibu hamil yang bisa menyebabkan terjadinya faktor resiko preeklampsia, Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf/7:31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemah-Nya :

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap saat memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 154)

Penggalan akhir dari ayat diatas juga mengisyaratkan masalah lain, yaitu memiliki prinsip terkait agama pada Kesehatan yang dinyatakan oleh para ilmuwan terlepas dari itu perintah makan dan minum yang tidak berlebihan, pandangan hidup agama mereka, tidak melewati batas adalah turunan yang harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena Individu menilai cukup pada kadar tersebut yang Bisa jadi dinilai bahwa melampaui batas ataupun belum cukup bagi orang lain. Maka dikatakan bahwa kutipan ayat terkait makan dan minum tidak berlebih-lebihan mengajarkan kita bagaimana dalam bersikap proporsional. (Shihab, 2009)

Terkait pembenaran ayat diatas memiliki beberapa hal terpenting. Bahwa mengajak setiap individu untuk

mengambil kesenangan hidup ini, mulai dari jenis makanan ataupun minuman yang akan masuk kedalam tubuh, tetapi tidak juga melupakan urusan apapun terkait memerintahkan kesederhanaan yang sangat dibutuhkan bagi masing-masing individu. Jadi ayat diatas adalah salah satu dasar terkait Pendidikan untuk menjadi keselamatan kita dan Kesehatan tubuh.

Ayat di atas menjelaskan tentang makan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang. Olehnya itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya preeklamsia dalam kehamilan adalah dengan melakukan diet untuk menghindari obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko preeklamsia. Jika ayat tersebut dikaitkan pada Seorang ibu hamil maka penggalan ayat diatas terkhusus untuk mengurangi kadar tersebut yang memicu terjadinya preeklamsia, ayat diatas sangat baik dijadikan suatu landasan dalam mencegah terjadinya preeklamsia yang sebagai mana dijelaskan pada kutipan diatas bahwa tidak makan dan minum secara berlebihan atau kurangi kadar yang terkandung dalam makanan seperti yang sudah di sebutkan pada diet makanan apa saja yang baik untuk mencegah terjadinya preeklamsia pada ibu hamil dan juga tidak lupa untuk mengatur porsi makan ibu supaya dapat terhindar dari kegemukan yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya preeklamsia.

## 2. Ayat terkait Penyakit

Selain dari pada pengobatan dan pencegahan preeklamsia untuk kesembuhan pasien, diharapkan pasien juga senantiasa memohon dan meminta kepada yang maha kuasa agar cepat sembuh dari penyakitnya karena hanya Tuhanlah yang maha mengetahui segala kejadian pada

manusia, Sebagaimana dalam Firman Allah SWT, QS. Asy-syu'ara'/26:80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemah-Nya :

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.  
(Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 370 )

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus yakin bahwa Allah SWT menurunkan penyakit kepada manusia tapi dengan berkat Allah pulalah manusia itu akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Yang penting selama kita selalu berusaha untuk selalu berobat dan berdoa kepada-Nya insya Allah, akan memberikan kesembuhan pada kita. Pada sisi lain ayat ini juga berfungsi sebagai sugesti yang dapat menguatkan mental orang yang menderita penyakit sehingga proses penyembuhan dapat berjalan cepat dan lancar. Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatannya sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma Kesehatan, atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan hanyalah Allah. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allat setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Kebanyakan memang membuktikan, kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma Kesehatan yang berlaku (Al-Qur'an Kemenag RI, 2019).

## BAB III ANEMIA DALAM KEHAMILAN

### A. Definisi Anemia

**M**enurut defenisi, anemia ialah kurangnya jumlah eritrosit dalam tubuh, kuantitas hemoglobin, dan volume eritrosit (hematocrit) per 100 ml darah. Namun pengertian anemia yang sering dianut hanya merujuk pada keadaan kadar hemoglobin dalam darah <12 gr%. Sementara anemia saat hamil adalah nilai hemoglobin <11 gr % pada trimester 1 serta 3, dan nilai hemoglobin <10,5 gr % saat trimester 2. Meskipun dalam klinis anemia tidak hanya berdasarkan kadar hemoglobin saja namun juga berdasarkan morfologi sel darah merah serta indeks-indeksnya. (Darmawansyih, 2014)

WHO mendefinisikan anemia saat hamil adalah nilai Hemoglobin (Hb) <11 g/dl, meskipun definisi nilai Hb <10,5 g/dl lebih sering dipakai saat trimester 2, saat hemodilusi fisiologis mencapai nilai maksimum. Defisiensi zat besi ialah faktor terbanyak yaitu sekitar 90 % ibu mengalami anemia, selanjutnya kekurangan asam folat, kedua defisiensi ini dapat terjadi secara bersamaan. Kekurangan vitamin B12 jarang mengakibatkan anemia pada ibu hamil. Pada sindrom HELLP, penghancuran Sel darah merah mengakibatkan anemia hemolitik. (Bothamley & Boyle, 2013)

Terdapat perubahan tubuh yang berarti pada saat hamil. Jumlah darah dalam tubuh mengalami peningkatan sebanyak 20-30 %, sehingga kebutuhan Fe/zat besi serta vitamin dalam tubuh perlu ditingkatkan untuk membentuk Hb. Ketika sedang hamil kebutuhan darah

dalam tubuh meningkat sebanyak 30% karena harus membaginya dengan janin yang dikandung. Dibutuhkan zat besi yang tinggi agar tubuh dapat membentuk eritrosit agar dapat membuat darah ekstra. Untuk membawa oksigen keseluruh tubuh maka diperlukan Hb yang merupakan protein yang mengandung zat besi dalam eritrosit. Pada trimester 2 dan 3 banyak ibu hamil kekurangan Fe (zat besi). Potensi akan terjadi anemia adalah saat tubuh memerlukan lebih tinggi Fe dibanding yang ada dalam tubuh. Ibu hamil berisiko tinggi memiliki bayi berat badan lahir rendah jika ibu menderita anemia pada dua trimester pertama. Anemia pada ibu hamil juga berisiko mengalami perdarahan selama persalinan dan berisiko mengalami infeksi. (Proverawati, 2011)

## **B. Anatomi dan Fisiologi**

### **1. Anatomi**

Bagian-bagian darah:

- a. Air: 91 %
- b. Protein: 35 (albumin, globulin, prothrombin dan fibrinogen)
- c. Mineral: 0,9 % (natrium klorida, natrium bikarbonat, garam fosfat, magnesium, kalsium dan zat besi)
- d. Bahan organik : 0,1 % (glukosa, lemak, asam urat, kreatinin, kolesterol dan asam amino) (Putri & Hasnita, 2020)

Darah terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Sel-sel darah ada 3 macam antara lain:
  - a) Eritrosit (sel darah merah)

Eritrosit berbentuk cakram bikonkav, tanpa inti sel, berdiameter 8 mikron dan ditengah tebalnya 1 mikron. Eritrosit mengandung hemoglobin yang memberinya warna merah.

b) Leukosit (sel darah putih) leukosit dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Granulosit adalah leukosit yang didalam sitoplasmanya memiliki butir-butir kasar (granula). Jenisnya adalah eosinophil, basophil, dan dannetrofil

(2) Agranulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya tidak memiliki granula, jenisnya adalah limfosit (sel T dan sel B) dan monosit

c) Trombosit adalah sel pembeku darah

d) Plasma darah

Terdiri dari air dan protein darah yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. (Putri & Hasnita, 2020)

## 2. Fisiologi

Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel diseluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. (Putri & Hasnita, 2020)

Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung. Darah dipompa oleh jantung menuju paru-paru untuk melepaskan sisa metabolisme berupa karbondioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh darah aorta. Darah mengedarkan oksigen melalui pembuluh darah pulmonalis, lalu dibawa lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah juga mengangkut bahan-bahan sisa metabolisme obat-obatan dan bahan kimia asing ke hati untuk dibuang sebagai urine. (Putri & Hasnita, 2020)

Komponen darah manusia terdiri dari dua komponen: korpuskular adalah unsur padat darah sel-sel darah eritrosit, leukosit, dan trombosit.

### 3. Eritrosit (sel darah merah)

Sel ini berbentuk cakram bikonkav, tanpa inti sel, berdiameter 7-8 mikrometer. Eritrosit mengandung hemoglobin yang memberinya warna merah. Hemoglobin (Hb) adalah protein kompleks terdiri atas protein, globin, dan pigmen hem (besi). Jadi besi penting untuk Hb. Besi ditimbun di jaringan sebagai ferritin dan hemosiderin. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang merah, dari proeritroblas, kemudian normoblas. Keduanya masih mempunyai inti. Normoblas kehilangan intinya dan masuk peredaran darah sebagai eritrosit dewasa. Fungsi utama sel darah merah adalah untuk mentransfer

hemoglobin, yang selanjutnya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Pada laki-laki normal, jumlah rata-rata sel darah merah permili liter kubik ialah 5.200.000 dan pada perempuan normal 4.700.000.(Putri & Hasnita, 2020)

#### 4. Leukosit (sel darah putih)

Jumlah sel pada orang dewasa berkisar antara 6000-9000 sel/cc darah. Fungsi utama dari sel tersebut adalah untuk fagosit (pemakan) bibit penyakit/benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Peningkatan jumlah leukosit merupakan petunjuk adanya infeksi misalnya radang paru-paru. Leukopenia berkurangnya jumlah leukosit sampai dibawah 6000 sel/cc darah. Leukositosis bertambahnya jumlah leukosit melebihi normal (diatas 9000 sel/cc darah) (Putri & Hasnita, 2020)

#### 5. Trombosit (keping darah)

Disebut juga sel darah pembeku, jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000–500.000 sel/cc. Didalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembeku (hemostasis) antara lain adalah faktor VIII (anti haemophilic factor), jika seseorang secara genetic trombositnya tidak mengandung faktor tersebut, maka orang tersebut menderita hemofili.

Proses pembekuan darah yaitu jika trombosit menyentuh permukaan yang kasar akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase (tromboplastin). Pada masa embrio sel-sel darah dibuat limpa dan hati (extra medullary haemopoesi) setelah embrio sudah cukup usia, fungsi itu diambil alih oleh sumsum tulang.(Putri & Hasnita, 2020)

## 6. Plasma darah

Terdiri dari air dan protein darah yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen, cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. Protein dalam serum inilah yang berfungsi sebagai antibody terhadap adanya benda asing (antigen). Zat antibody adalah senyawa gama yang disebut globulin. Tiap antibody bersifat spesifik terhadap antigen dan reaksinya bermacam-macam.

- 1) Antibody yang dapat mengumpulkan antigen disebut presipitin
- 2) Antibody yang dapat menguraikan antigen adalah lisis
- 3) Antibody yang dapat menawarkan racun adalah antitoksin (Putri & Hasnita, 2020)

## C. Klasifikasi anemia

WHO tahun 1972 serta NCI (National Cancer Institute) telah mengklasifikasikan anemia menurut kadar hemoglobinnya yaitu : (Darmawansyih, 2014)

**Tabel 2.1 klasifikasi anemia menurut WHO dan NCI**

Derajat	WHO	NCI
Derajat 0(normal)	$\geq 11.0\text{g/dl}$	Wanita 12.0-16.0g/dl pria 14.0-18.0g/dl
Derajat 1(ringan)	9.5-10.9g/dl	10.0g/dl- normal
Derajat 2(sedang)	8.0-9.4g/dl	8.0-10.0g/dl
Derajat 3(berat)	6.5-7.9g/dl	6.5-7.9g/dl
Derajat 4(mengancam jiwa)	$< 6.5\text{g/dl}$	6.5-7.9 d/dl

Klasifikasi anemia sesuai etiologi terdiri atas :

1. Anemia defisiensi Fe (zat besi)

Anemia defisiensi Fe ialah kurangnya suplai Fe menyebabkan defek pada sintesis Hb, serta munculnya eritrosit warnanya lebih pucat (hipokrom) dan lebih kecil (mikrositer). Anemia defisiensi Fe ialah anemia yang mayoritas terjadi dalam kehamilan, ini diakibatkan karena sedikitnya unsur Fe pada makanan yang dikonsumsi, malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan Fe atau..karena tubuh mengeluarkan terlalu banyak zat besi seperti perdarahan. Tanda dan gejala yang dialami adalah pucat, fertigo, sakit kepala,kelelahan, takhikardi, depresi dan amenorhe.(Darmawansyah, 2014)

Zat besi yang diperlukan ibu pada trimester pertama sedikit karena pada trimester pertama ibu tidak serta tumbuh kembang janin masih perlahan-lahan. Akan tetapi pada permulaan pertumbuhan janin trimester 2, janin bergerak aktif serta pertumbuhannya sangat cepat, dengan menghisap dan menelan air ketuban sehingga kebutuhan O<sub>2</sub> meningkat, mengakibatkan Fe yang dibutuhkan makin banyak agar keseimbangan produksi eritrosit meningkat dan rentang terjadi anemia. Defisiensi ini disebabkan karena kurangnya intake unsur zat besi pada makanan, gangguan reabsorpsi, dan penggunaan terlalu banyaknya zat besi. (Darmawansyah, 2014)

Fe yang dibutuhkan selama hamil yaitu 750 mg yang terdiri atas 425 mg untuk ibu, 300 mg janin dan 25 mg plasenta. Derajat penyerapan atau absorpsi zat besi pada ibu hamil tidak selalu dipengaruhi oleh kebutuhan akan zat besi. Pada minggu ke-30 proses penyerapan sebanyak 30% dari asupan Fe yang ada pada minggu ke-

36 penyerapan sebanyak 66 % asupan Fe yang ada (9 kali lipat absorpsi pada minggu ke-16) peningkatan kebutuhan yang tidak disertai dengan peningkatan intake Fe akan menyebabkan defisiensi Fe yang akhirnya menyebabkan anemia pada ibu hamil. (Darmawansyih, 2014)

## 2. Anemia megaloblastik

Kerusakan pada sintesis timidin serta defek atau kerusakan replikasi DNA diakibatkan kurangnya folat atau vitamin B12, akibat yang bisa timbul yakni pembesaran megaloblas disussum tulang, hemapoesis tdk efektif, dan pengurangan signifikan jumlah eritrosit, leukosit dan trombosit disirkulasi darah. Anemia megaloblastik dalam kehamilan adalah anemia yang dialami ibu hamil yang ditandai dengan terdapat sel megaloblas pada sumsum tulang. Adapun penyebab anemia megaloblastik yakni kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, gangguan metabolisme vitamin B12 dan asam folat serta gangguan sintesis DNA. (Darmawansyih, 2014)

Pada ibu hamil anemia megaloblastic lebih sering dihubungkan dengan asam folat, jarang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 karena ibu hamil memiliki kebutuhan asam folat yang tinggi dibanding seseorang yang tidak sedang hamil. Hal tersebut disebabkan juga karena asam folat juga dibutuhkan janin. Selain risiko anemia pada ibu hamil dan janin, kekurangan asam folat bisa mengakibatkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Hal lain yang bisa terjadi yaitu bayi mengalami kecacatan pada sumsum tulang belakang dan otak, akibatnya bayi akan lahir dengan bibir sumbing, Down's syndrome, erat badan bayi lahir rendah, kelainan pada pembuluh darah,

pembuluh darah yang dilapisi endotel pipa mengalami kerusakan, yang akhirnya mengakibatkan plasenta lahir sebelum waktunya. Abnormalitas lain yang akan terjadi yaitu gangguan miksi serta defekasi, gangguan berjalan serta emosi meningkat, dan tidak mengalami menstruasi pada anak perempuan (Darmawansyih, 2014).

**Tabel 2.2 kebutuhan vitamin B12 dan asam folat pada wanita dewasa dan ibu hamil**

Vitamin / Mineral	Dewasa	Ibu hamil
Vitamin B12	2,4 µg	2,4 µg
Asam folat	400 µg	600 µg

### 3. Anemia hipoplastik

Anemia hipoplastik yang diderita pada perempuan yang tidak hamil belum diketahui penyebabnya secara pasti akan tetapi terdapat faktor pencetus seperti sepsis, racun, sinar rontgen, dan obat-obatan. Sedangkan pada ibu hamil anemia hipoplastik ialah anemia yang diakibatkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat eritrosit. (Darmawansyih, 2014)

### 4. Anemia hemolitik

Anemia yang diakibatkan oleh penghancuran eritrosit lebih cepat. Wanita yang menderita anemia hemolitik biasanya susah untuk mengandung, karena jika mengandung kondisi tersebut akan memperberat keadaannya. Transfusi darah dilakukan untuk meringankan penderitaan ibu dan mencegah terjadinya hipoksia pada janin dan biasanya transfusi harus dilakukan berulang-ulang. Karena Obat penambah darah terbukti tidak memberikan hasil pada kondisi anemia hemolitik. (Darmawansyih, 2014)

#### **D. Etiologi Anemia**

Mayoritas penyebab dari anemia saat hamil yakni kekurangan Fe. Oleh sebab itu ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan pada kunjungan pertama kehamilan untuk mengecek ibu mempunyai penyakit anemia atau tidak. Bukan hanya kunjungan pertama akan tetapi ibu hamil juga perlu memeriksakan kehamilannya setiap trimester karena bisa saja pada saat kunjungan pertama ibu tidak mengalami anemia tetapi pada kunjungan atau kehamilan berikutnya mungkin terjadi (Proverawati, 2011)

Adapun penyebab anemia selama kehamilan menurut Proverawati (2011) yaitu :

1. Jarak hamil yang terlalu dekat
2. Janin yang dikandung kembar
3. Kerap mual muntah pagi hari akibat sakit
4. Fe yang dikonsumsi tidak cukup
5. Sebelum hamil mengalami menstruasi berat
6. Umur ibu saat hamil masih remaja atau belum cukup umur
7. perdarahan (misalnya, cedera atau selama operasi)

Menurut Darmayanti (2014) secara umum, ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab anemia, yaitu:

1. Malnutrisi
2. Defisiensi Fe
3. Malabsorpsi
4. Perdarahan misalnya partus yang sebelumnya, menstruasi dll

5. Menderita penyakit kronik seperti TB paru, malaria, cacing usus, dll

## **E. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia pada saat hamil**

### **1. Umur Ibu**

Umur 20-35 tahun merupakan masa reproduksi yang sehat dan tidak terlalu berisiko mengalami komplikasi jika hamil, umur <20 dan >35 tahun merupakan hamil yang berisiko. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan psikologis ibu hamil dan keadaan biologis ibu hamil. Mengapa pada umur < 20 tahun dapat mengakibatkan anemia, karena pada umur itu perkembangan biologis alat reproduksi belum sempurna. Pada umur <20 tahun dapat terjadi rendahnya perhatian untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi selama hamil, hal ini disebabkan karena pada umur itu psikis belum siap yang berdampak pada guncangan mental. Adapun wanita hamil pada usia >35 tahun berisiko menderita anemia. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya sistem imun sehingga ibu hamil mudah terinfeksi (Takdir, 2017)

### **2. Paritas**

Paritas ialah satu diantara faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap anemia pada kehamilan. Jumlah bayi yang lahir dari ibu hamil dalam keadaan hidup ataupun mati merupakan jumlah paritas

### **3. Jarak Kehamilan**

Dibutuhkan waktu dua tahun agar memperoleh cadangan Fe sebelumnya ke angka normal dengan kondisi kesehatan yang baik serta gizi yang baik selama jangka

waktu tersebut karena setiap kita hamil akan mengakibatkan cadangan Fe pada tubuh kurang. Itulah sebabnya jarak partus sebelumnya dan jarak partus selanjutnya paling sedikit 2 tahun. Selama rentang waktu itu dianjurkan ibu agar menyiapkan fisik dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan Fe serta protein, mengkonsumsi makanan yang bergizi guna terhindar dari anemia dan untuk memulihkan organ tubuh agar mengembalikan fungsi fatal dan anatominya (Takdir, 2017)

Jika jarak kehamilan semakin dekat maka makin besar pula kematian maternal bagi ibu serta anaknya, lebih-lebih jarak kehamilan kurang dari dua tahun akan terjadi komplikasi pada saat hamil dan partus seperti anemia berat, perdarahan dan partus lama. Itu sebabnya seorang wanita membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun supaya membaik secara fisiologi dari dampak kehamilan dan partus agar mampu menyiapkan diri di kehamilan (Takdir, 2017)

#### 4. Status gizi

Status gizi merupakan cerminan akan imbangnya antara asupan dan kebutuhan gizi individu. Jika asupan gizi sesuai maka di sebut gizi baik, apabila kurang di sebut gizi buruk dan jika asupan lebih maka di sebut gizi lebih.(Manuaba, 2010)

#### 5. Pengetahuan

Pengetahuan diterima melalui pengalaman kita sendiri dan dari orang lain. Orang yang mempunyai tanggung jawab akan gizi janin yang ada dalam kandungan adalah ibu hamil itu sendiri. Pengetahuan ibu mempunyai pengaruh terhadap pola ibu dalam

mengonsumsi makanan, lebih-lebih yang kaya akan Fe. Defisiensi Fe pada jangka waktu bisa mengakibatkan ibu menderita anemia.(Takdir, 2017)

#### 6. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC)

Berdasarkan Depkes RI (2001) pemeriksaan ANC memiliki tujuan yaitu mengkaji masalah yang mungkin muncul pada saat hamil, sehingga ibu hamil mampu memelihara kesehatannya dan ibu serta janin yang dikandung dalam keadaan sehat hingga persalinan. Adapun tujuan pemeriksaan ANC yaitu untuk mengetahui penyakit yang menyertai pada saat hamil sehingga dapat ditangani. Jangkauan ANC diidentifikasi melalui kunjungan ibu hamil. Adapun standar kunjungan ibu hamil sedikitnya 4X kunjungan yaitu 1X ditrimester 1 ( K1 ), 1X ditrimester 2 dan 2X ditrimester 3 (K4 ). (Takdir, 2017)

#### 6. Kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen Fe

Pada saat hamil Fe yang diperlukan cukup banyak. Selain dibutuhkan untuk janin dan plasenta karena juga dalam tubuh ibu terdapat proses retensi air/bertambahnya cairan sekitar 40,0%. Jumlah zat besi disarankan dalam kehamilan adalah 18mg/hari. Kebutuhan yang disarankan ini susah didapatkan makanan saja akan tetapi perlu ditambahkan fe pada makanan yang dikonsumsi. Dari makanan yang dikonsumsi terdapat 10–20mg Fe/hari, tetapi hanya kurang dari 10,0% dari angka itu yang diserap. Untuk mengatasi kasus tersebut, WHO mengusulkan agar mengonsumsi suplemen Fe saat kehamilan,dan sejak tahun 1970 Departemen Kesehatan sudah melakukan program perbaikan gizi keluarga dengan cara mendistribusikan suplemen Fe. Ibu hamil dianjurkan

mengonsumsi sekurang kurangnya 90 tablet selama hamil (Takdir, 2017)

Mengonsumsi tablet Fe secara rutin dapat mencegah anemia pada ibu hamil. Tablet Fe harus diminum sesuai dengan aturan dan diperlukan kepatuhan serta kesadaran ibu hamil dalam meminumnya. Akan tetapi kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran tablet besar, rasa, warna obat. Adapun efek yang ditimbulkan dari suplemen Fe yaitu mual, muntah, nyeri lambung, diare dan konstipasi (Takdir, 2017).

#### **F. Tanda dan Gejala**

Gejala awal anemia saat hamil kebanyakan tidak nampak atau tidak terperinci (misalnya kelelahan, kelemahan, pucat, pusing, dipsnea ringan,). Akan tetapi jika sudah terjadi anemia berat gejala yang muncul yaitu takikardi dan hipotensi. Anemia menambah risiko kelahiran prematur dan infeksi ibu setelah persalinan. Adapun gejala anemia menurut American pregnancy tahun 2016 yaitu :

1. Kelelahan
2. Kelemahan
3. Telinga berdengung
4. Sukar konsentrasi
5. Pernapasan pendek
6. Kulit pucat
7. Nyeri dada
8. Kepala terasa ringan

9. Tangan dan kaki terasa dingin (Astutik & Ertiana, 2018)

Adapun tanda-tanda anemia dalam kehamilan yaitu:

1. Meningkatnya kecepatan denyut jantung karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan
2. Meningkatnya kecepatan pernapasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah
3. Lelah karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ termasuk otot jantung dan rangka
4. Kulit pucat karena oksidasi berkurang
5. Mual karena penurunan aliran darah saluran cerna dan susunan saraf pusat
6. Penurunan kualitas rambut dan kulit (Astutik & Ertiana, 2018)

Gejala khas masing-masing anemia, meliputi:

2. Anemia defisiensi besi: disfagia, atrofi papil lidah, stomatitis angularis, dan koilonchia
3. Anemia megaloblastic: glossitis, gangguan neurologis pada defisiensi vitamin B12
4. Anemia hemolitik: ikterus, splenomegaly, dan hepatomegaly
5. Anemia aplastic: perdarahan dan tanda-tanda infeksi. (Putri & Hasnita, 2020)

Masing-masing jenis anemia memiliki manifestasi klinik yang berbeda, antara lain:

### 1. Anemia defisiensi besi

Perubahan kulit dan mukosa yang progresif, seperti lidah yang halus, keilesis dan didapatkan tanda-tanda malnutrisi

### 2. Anemia pada penyakit kronik

Berkurangnya sideroblas dalam sumsum tulang, sedangkan deposit besi dalam sistem retikulo endothelial (Res) normal/bertambah, berat ringannya anemia berbanding lurus dengan aktivitas penyakitnya.

### 3. Anemia asam folat

Didapatkan adanya anoreksia, diare, dipsnea, lidah licin, pucat dan agak ikterik. Terjadi gangguan neurologis, biasanya dimulai dengan parastesia, lalu gangguan keseimbangan dan pada kasus yang berat terjadi perubahan fungsi cerebral, dimensia dan perubahan neuropsikatrik lainnya.

4. Anemia hemolitik: Tanda-tanda hemolysis antara lain icterus dan splenomegali

5. Anemia aplastic: tampak pucat, lemah, timbul demam purpura dan perdarahan (Putri & Hasnita, 2020)

## **G. Patofisiologi**

Anemia pada ibu hamil yang diakibatkan karena defisiensi zat besi mencapai kurang lebih 95%. Ibu hamil sangat rentan terjadi anemia karena pada saat hamil kebutuhan oksigen lebih banyak sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya volume plasma bertambah dan eritrosit meningkat. Namun peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang

lebih besar jika disbanding dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) akibat hemodilusi. Cadangan zat besi pada wanita yang hamil dapat rendah karena menstruasi dan diet yang buruk. Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua atau tiga kali lipat. Zat besi diperlukan untuk produksi sel darah merah ekstra, untuk enzim tertentu yang dibutuhkan untuk jaringan, janin serta plasenta dan untuk mengganti peningkatan kehilangan harian yang normal. (Putri & Hasnita, 2020)

Kebutuhan zat besi janin yang paling besar terjadi selama empat minggu terakhir dalam kehamilan, dan kebutuhan ini akan terpenuhi dengan dengan mengorbankan kebutuhan ibu. Kebutuhan zat besi selama kehamilan tercukupi sebagian karena tidak terjadi menstruasi dan terjadi peningkatan absorpsi besi dari diet oleh mukosa usus walaupun juga bergantung hanya pada cadangan besi ibu. Zat besi yang terkandung dalam makanan hanya diabsorpsi kurang dari 10%, dan diet biasa tidak dapat mencukupi kebutuhan zat besi ibu hamil. Kebutuhan zat besi yang tidak terpenuhi selama kehamilan dapat menimbulkan konsekuensi anemia defisiensi besi sehingga dapat membawa pengaruh buruk pada ibu maupun janin, hal ini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (Putri & Hasnita, 2020)

## **H. Pencegahan**

Adapun untuk mencegah anemia pada kehamilan yaitu dengan cara memenuhi nutrisi yang baik dalam tubuh. Mengonsumsi makanan yang kaya Fe (misalnya sayur hijau, daging merah, sereal, telur, kacang tanah) dapat membantu menjaga Fe yang dibutuhkan untuk

berfungsi dengan semestinya. Agar tubuh mempunyai cukup asam serta folat di berikan vitamin dan kita harus memastikan tubuh mendapat zat besi sekitar 27 mg/hari. Jika ibu menderita anemia pada saat hamil akan diberikan suplemen zat besi untuk dikonsumsi. Ibu hamil juga harus memeriksakan kandungan pada kunjungan pertama untuk menilai ibu mengalami anemia atau tidak (Proverawati, 2011)

Untuk mencegah anemia terutama untuk ibu hamil sudah dilaksanakan secara nasional dengan cara memberikan tablet Fe atau suplemen zat besi. Tablet Fe merupakan suplemen penambah darah untuk menanggulangi anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat Fe yang diberikan saat hamil pada saat hamil ibu memerlukan Fe berlebih agar jumlah eritrosit meningkat dan membentuk eritrosit, janin serta plasenta. Pada saat hamil sangat disarankan mengkonsumsi tablet tersebut dalam jangka waktu tiga bulan dan harus dikonsumsi setiap hari. Adapun pencegahan lainnya yaitu:

- a. Istirahat yang cukup
- b. Mengkonsumsi makanan bergizi serta kaya akan Fe
- c. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan sekurang-kurangnya 4X saat hamil agar mendapat tablet Fe serta vitamin. Selain itu harus megkonsumsi makanan bergizi 3X/hari dan porsi 2X lebih banyak. (Darmawansyih, 2014)

Empat pendekatan dasar yang saat ini digunakan untuk pencegahan dan pengendalian anemia adalah suplementasi dengan tablet zat besi, pengendalian infeksi

penggunaan obat anti-cacing untuk mengendalikan infeksi cacing dan di beberapa daerah ketersediaan makanan pokok yang diperkaya dengan zat besi. Menurut Galloway et al (2002) hasil penelitian tentang persepsi wanita tentang anemia defisiensi besi dan pencegahan serta pengendaliannya di delapan negara berkembang menunjukkan bahwa 50 % negara menganggap gejala anemia sebagai masalah prioritas, tetapi sisanya tidak menganggap ini sebagai prioritas. (Noronha et al., 2013)

## **I. Penatalaksanaan**

### **1. Anemia defisiensi zat besi**

Obat yang dianjurkan diberikan pada keadaan anemia defisiensi besi. Adalah suplemen Fe:

- a. Terapi oral yaitu dengan memberikan preparat besi yakni fero sulfat, fero glukonat atau Na-fero bisira memberikan preparat 60 mg/hari dapat meningkatkan Hb 1 gr % /bulan. Program nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 µg asam folat untuk profilksis
- b. Terapi parenteral akan diberikan jika ibu hamil tidak kuat terhadap Fe/oral, serta terdapat gangguan absorpsi, gangguan pencernaan, umur kehamilan tua. Agar Hb meningkat 2 gr% diberikan preparat parenteral dengan ferum dextran 1000 mg intravena/2 X 10 ml/IM

### **2. Anemia megaloblastik**

Ditangani dengan pemberian vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 pada vegetarian dapat ditangani dengan menambahkan vitamin/oral atau melalui susu kedelai.

Adapun terapi yang umum dipakai untuk menanganinya yaitu:

- a. Diberikan vitamin B12 100-1000 Ug intramuscular sehari selama dua minggu, berikutnya 100-1000 Ug IM/bulan. Apabila terdapat kelainan neurologits, maka diberikan setiap 2 minggu selama 6 bulan, baru kemudian diberikan sekali sebulan. Apabila ibu hamil sensitif terhadap pemberian melalui suntikan maka diberikan 1000 Ug per oral/hari, asal tidak terdapat gangguan absorpsi.
- b. Sebaiknya menghindari transfusi darah, kecuali bila ada dugaan kegagalan fatal jantung. Pada ibu hamil asam folat dianjurkan dengan dosis 80 µg/hari.

### 3. Anemia Hipoplastik

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memonitor adanya perdarahan
- b. Melakukan transfusi darah
- c. Pengobatan infeksi
- d. Transplantasi sumsum tulang
- e. Diet bebas bakteri
- f. Promosi kesehatan untu mencegah infeksi (Darmawansyih, 2014)

### J. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan diagnostic untuk kasus anemia sebagai berikut:

1. Jumlah darah lengkap (JDL): hemoglobin dan hematocrit menurun
2. Jumlah eritrosit: menurun (A / aplastic), menurut berat MCV (mean corpuskuler volum), MCH (mean corpuskuler hemoglobin) menurun, mikrositik dengan eritrosit hipokromik (defisiensi besi) dan peningkatan (AP) pansitopenia
3. Jumlah retikulosit: bervariasi misal menurun (AP), meningkat (respon susumsum tulang terkadang kehilangan darah (hemolysis))
4. Pewarnaan SDM: mendeteksi perubahan warna dan bentuk (dapat mengidentifikasi tipe khusus anemia)
5. LED: peningkatan kerusakan SDM atau penyakit malignasi
6. Jumlah trombosit: menurun (aplastic), meningkat (DB) normal atau tinggi (hemolitik)
7. Hemoglobin elektroforesis: mengidentifikasi tipe struktur Hb
8. Bilirubin serum (tak terkonjugasi): meningkat (AP hemolitik)
9. Besi serum: tidak ada (DB), tinggi (hemolitik)
10. TIBC serum: meningkat (DB)
11. Feritin serum: menurun (DB)
12. LDH serum: mungkin meningkat (AP)

13. Tes schilling: penurunan ekskresi vitamin B12 urine (AP)
14. Analisa gaster: penurunan sekresi dengan peningkatan PH dan tidak adanya asam hidroklorik bebas (AP)

Pemeriksaan penunjang menurut didasarkan pada jenis anemia, yaitu:

1. Anemia aplastic

Pemeriksaan laboratorium

- a. Sel darah merah
- b. Laju endapan darah
- c. Sumsu tulang

2. Anemia hemolitik

Pemeriksaan laboratorium

- a. Peningkatan jumlah retikulasi
- b. Peningkatan kerapuhan sel darah merah
- c. Pemendekan masa hidup eritrosit
- d. Peningkatan bilirubin

3. Anemia megaloblastic

- a. Anemia absorpsi vitamin B12
- b. Endoskopi

4. Anemia defisiensi zat besi

- a. Morfologi sel darah merah
- b. Jumlah besi dalam serum dan ferritin (Putri & Hasnita, 2020)

## **K. Pengaruh Anemia dalam Kehamilan**

Anemia dalam kehamilan dapat menyebabkan abortus, partus prematurus, partus lama, retensio plasenta, perdarahan postpartum karena atonia uteri, syok, infeksi intrapartum maupun postpartum. Anemia yang sangat berat dengan Hb kurang dari 4 g/dl dapat menyebabkan dekompensasi kordis. Akibat anemia terhadap janin dapat menyebabkan terjadinya kematian janin intrauterine, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal. Ibu hamil dengan kadar Hb < 8 g/dl dikaitkan dengan peningkatan resiko berat lahir rendah dan bayi kecil untuk usia kehamilan. Anemia defisiensi besi selama kehamilan diketahui menjadi faktor risiko kelahiran premature, meningkatkan risiko terjadinya perdarahan post partum dan kematian perinatal. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan risiko kematian dan anak serta memiliki konsekuensi negatif pada kognitif dan fisik pengembangan anak-anak dan produktivitas kerja. Anemia pada kehamilan dikaitkan dengan hasil kehamilan yang merugikan. Manifestasi klinisnya meliputi pembatasan pertumbuhan janin, persalinan premature, berat lahir rendah, gangguan laktasi, interaksi yang buruk ibu atau bayi, depresi post partum, dan meningkatkan kematian janin dan neonatal. (Putri & Hasnita, 2020)

## **L. Asuhan Keperawatan Anemia dalam Kehamilan**

### **1. Pengkajian**

#### **a. Identitas klien**

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Suku :

b. Keluhan utama yang sering dijumpai yaitu ibu hamil mengeluh mudah lelah, mata berkunang-kunang dan pusing

c. Riwayat kesehatan

1) Riwayat kesehatan dulu

Dijumpai jarak kehamilan yang berdekatan serta terdapat riwayat penyakit tertentu

2) Riwayat kehamilan dan persalinan.

Dijumpai umur ibu belum cukup < 20 tahun dan jarak kehamilan < 2 tahun

d. Pola aktivitas sehari hari

Ditemukan apabila ibu mengalami anemia gejala yang timbul yaitu lelah, letih, dan malaise sehingga kebutuhan istirahat dan tidur ibu meningkat

Gejala: keletihan, kelemahan, malaise dan kehilangan produktivitas seperti penurunan semangat untuk bekerja, toleransi terhadap latihan rendah, kebutuhan untuk tidur dan istirahat lebih banyak

Tanda: takikardia/takipnea, dispnea pada waktu bekerja atau istirahat, letargi, menarik diri, apatis, lesu

dan kurang tertarik pada sekitarnya. Kelemahan otot, ataksia.

e. Sirkulasi

Gejala: riwayat perdarahan kronik, menstruasi berat, angina, CHF, dan riwayat endocarditis infektif kronis, palpitasi

Tanda: hipotensi postural, disritmia abnormalitas EKG, takikardia, bunyi jantung murmur, pucat pada kulit dan membrane mukosa.

Sklera; biru atau putih, pengisian kapiler melambat, kuku mudah patah, rambut kering dan mudah putus

f. Integritas ego

Gejala: keyakinan agama/budaya mempengaruhi pilihan pengobatan

Tanda: depresi

g. Eliminasi

Gejala: riwayat pielonefritis, diare atau konstipasi, penurunan haluaran urine

Tanda: distensi abdomen

h. Makanan / cairan

Gejala: penurunan masukan diet, kesulitan menelan (ulkus pada faring), mual/muntah, dyspepsia, anoreksia, adanya penurunan berat badan

Tanda: lidah tampak merah, membrane mukosa kering, pucat, turgor kulit buruk dan kering

i. Neurosensory

Gejala: sakit kepala, berdenyut, pusing, vertigo, tidak mampu berkonsentrasi, kelemahan, keseimbangan buruk.

Tanda: peka rangsang, gelisah, tidak mampu merespon

j. Nyeri / kenyamanan

Gejala: nyeri abdomen dan sakit kepala

k. Keamanan

Gejala: riwayat pekerjaan terpajan terhadap bahan kimia, riwayat terpajan pada radiasi, transfuse darah sebelumnya

Tanda: menggigil, berkeringat malam

l. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum; biasanya merasa lemah, lesu, pernapasan lambat, nadi turun dan tekanan darah turun

2) Kepala: biasanya rambut rontok serta akan didapatkan bintik hitam pada wajah

3) Mata: konjungtiva anemis dan sklera tidak ikterik

4) Mulut: bibir pucat serta membrane mukosa kering

5) Abdomen

Inspeksi: perut membesar akan tetapi tidak sesuai usia kehamilan

Palpasi: janin tidak teraba jelas bagiannya

Auskultasi: DJJ sekitar 120-130X/menit

6) Ekstremitas CRT >sekon, didapatkan varises dikaki, tidak terdapat edema, akral dingin

m. Pemeriksaan laboratorium

Ditemukan Hemoglobin ditrimester 1 dan 3 < 11g/dl, ditrimester 2 < 10,5g/dl, Hematokrit : < 37% (normal 37-41 %), eritrosit : < 2,8 juta/mm<sup>3</sup> (normal 4,2-5,4 juta/mm<sup>3</sup>), Trombosit : < 200.000 (normal : 200.000 - 400.000/mel)

2. Diagnosa Keperawatan

- a. Intoleransi aktivitas
- b. Keletihan
- c. Kesiapan peningkatan nutrisi
- d. Risiko perdarahan
- e. Risiko infeksi (SDKI, 2017)

3. Intervensi

No	Diagnosa	Tujuan	Intervensi Keperawatan
1.	Intoleransi aktivitas	Setelah dilakukan intervensi selama maka toleransi aktivitas meningkat, dengan kriteria hasil : a. Frekuensi nadi meningkat b. Dipsnea saat/setelah aktivitas	<b>Manajemen energy</b> Observasi a. Kaji apakah terdapat gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan ibu lelah b. Pantau kelelahan fisik & emosional c. Pantau waktu jam tidur

		<p>menurun</p> <p>c. Keluhan lelah menurun</p> <p>d. Perasaan lemah menurun</p> <p>e. Tekanan darah membaik (SLKI, 2019)</p>	<p>d. Pantau selama melakukan aktivitas apakah terdapat ketidaknyamanan</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Siapkan lingkungan yang nyaman serta rendah stimulus</p> <p>b. Melakukan latihan rentang gerak aktif &amp; pasif</p> <p>c. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan</p> <p>d. Memberi fasilitas duduk disisi tempat tidur jika tidak mampu pindah/jalan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Dianjurkan <i>bed rest</i></p> <p>b. Dianjurkan mengerjakan aktivitas secara berkala</p> <p>c. Dianjurkan untuk memberi tahu perawat bila tanda &amp; gejala tidak berkurang</p> <p>d. Untuk mengurangi kelelahan ajarkan strategi koping</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. berkolaborasi dengan ahli gizi agar asupan makan dapat ditingkatkan (SIKI, 2018)</p>
2.	Keletihan	Setelah dilakukan intervensi selama...maka tingkat keletihan menurun, dengan kriteria hasil :	<p><b>Edukasi</b></p> <p><b>Aktivitas/Istirahat</b></p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengkaji kesiapan dan kemampuan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga meningkat</li> <li>b. Kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat</li> <li>c. Pola istirahat membaik (SLKI, 2019)</li> </ul>	<p>menerima informasi</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan materi serta media pengaturan aktivitas istirahat</li> <li>b. Menjadwalkan untuk memberikan promosi kesehatan sesuai kesepakatan</li> <li>c. Memberi kesempatan kepada klien beserta keluarga agar menanyakan sesuatu</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan seberapa penting melakukan aktivitas fisik serta olahraga secara rutin</li> <li>b. Mengajak pasien untuk ikut serta dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain dan aktivitas lainnya</li> <li>c. Dianjurkan untuk mengatur jadwal aktivitas istirahat</li> <li>d. Mengajarkan cara mengetahui kebutuhan istirahat contohnya pada saat kelelahan, sesak napas saat beraktivitas</li> <li>e. Mengajarkan cara mengetahui target serta jenis aktivitas sesuai kemampuan (SIKI, 2018)</li> </ul>
--	--	---	---

3.	Kesiapan peningkatan nutrisi	<p>Setelah dilakukan intervensi selama maka status nutrisi membaik, dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Porsi makan yang dihabiskan membaik</li> <li>b. Berat badan membaik</li> <li>c. Frekuensi makan membaik</li> <li>d. Nafsu makan membaik (SLKI, 2019)</li> </ol>	<p><b>Edukasi Nutrisi</b></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi</li> <li>b. Mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersiapkan materi serta media seperti jenis jenis nutrisi, table makanan penukar, cara mengelola serta cara menarik makanan</li> <li>b. Menjadwalkan penyuluhan kesehatan sesuai kontrak</li> <li>c. Memberi kesempatan untuk bertanya</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan kepada pasien serta keluarga alergi makanan, makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan pasien</li> <li>b. Mengajarkan cara melakukan diet sesuai program</li> <li>c. Jelaskan hal-hal yang</li> </ol>
----	------------------------------	--	---

			<p>dilakukan sebelum memberikan makan</p> <p>d. Demonstrasikan cara membersihkan mulut</p> <p>e. Demonstrasikan cara mengatur posisi saat makan</p> <p>f. Ajarkan pasien/keluarga memonitor asupan kalori dan makanan</p> <p>g. Ajarkan pasien dan keluarga memantau kondisi kekurangan nutrisi</p> <p>h. Mengajarkan demonstrasi cara memberi makan, menghitung kalori, menyiapkan makanan sesuai program diet (SIKI, 2018)</p>
4.	Risiko perdarahan	<p>Setelah dilakukan intervensi selama ... maka tingkat perdarahan menurun dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Kelembapan membrane mukosa meningkat</p> <p>b. Kelembapan kulit meningkat</p> <p>c. Perdarahan vagina menurun</p> <p>d. Hemoglobin membaik</p> <p>e. Hematocrit membaik</p> <p>f. Tekanan darah membaik (SLKI, 2019)</p>	<p><b>Pencegahan Perdarahan</b></p> <p>Observasi</p> <p>a. Monitor tanda dan gejala perdarahan</p> <p>b. Mengkaji nilai hematokrit/hemoglobin sebelum dan sesudah kehilangan darah</p> <p>c. Mengkaji tanda vital ortostatik</p> <p>d. Memantau koagulasi misalnya prothrombin time (PT), partial thromboplastin time (PTT), fibrinogen, degradasi fibrin dan tau platelet)</p>

			<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan bed rest selama perdarahan</li> <li>b. Batasi tindakan invasive jika perlu</li> <li>c. Gunakan Kasur pencegah decubitus</li> <li>d. Hindari pengukuran suhu rektal</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan</li> <li>b. Anjurkan menggunakan kaus kaki saat ambulasi</li> <li>c. Anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi</li> <li>d. Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan</li> <li>e. Dianjurkan untuk menambah asupan makanan dan vitamin K</li> <li>f. jika terjadi perdarahan dianjurkan untuk segera melapor</li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan jika perlu</li> <li>b. Kolaborasi pemberian produk darah jika perlu</li> <li>c. Kolaborasi pemberian pelunak</li> </ol>
--	--	--	--

			tinja jika perlu (SIKI, 2018)
5.	Risiko infeksi	Setelah dilakukan intervensi selama ... maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil : a. Kultur darah membaik b. Demam menurun c. Kemerahan menurun (SLKI, 2019)	<p><b>Pencegahan infeksi</b></p> <p>Observasi</p> <p>a. Memantau tanda &amp; gejala infeksi lokal sistemik</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Membatasi pembesuk b. Diberikan perawatan kulit pada edema c. Mencuci tangan sebelum &amp; setelah kontak dengan pasien serta lingkungan pasien d. teknik aseptik pada klien beresiko tinggi perlu dipertahankan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. menjelaskan tanda &amp; gejala infeksi b. mengajarkan cara mencuci tangan yang betul c. Ajarkan etika batuk d. Ajarkan memeriksa kondisi luka atau luka operasi e. Dianjurkan untuk menambah asupan nutrisi f. Dianjurkan untuk menambah asupan cairan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasikan pemberian imunisasi, bila perlu</p>

## M. Pandangan Agama Tentang Anemia dalam Kehamilan

### 1. Ayat Tentang Kehamilan

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kehamilan dalam al-Qur'an yaitu surah Al-Ahqaf/46: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبِّئُ بِإِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".(Al-Qur'an kemenag,2019 hal 504)

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan nabi Muhammad saw. Salah satu putri beliau, yaitu "Aisyah, adalah istri Rasulullah saw dan kedua orang tuanya yaitu Abu Quhafah dan ummul Khair binti Shakhar bin Amir telah masuk islam, demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertobat, bersyukur dan berdoa kepada Allah swt karena memperoleh nikmat yang tiada tara.

Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah menghormatinya, memelihara, dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia adalah selalu mendoakannya kepada Allah awt agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya.

Pada ayat ini, Allah swt menerangkan secara khusus mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika anak berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan daripada ayah. Ibu mendung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Semula dirasakan kandungan itu ringan, sekalipun telah mulai timbul perubahan-perubahan dalam dirinya, seperti makan tidak enak, perasaan gelisah, kadang-kadang mual muntah dan sebagainya. Semakin lama kandungan semakin berat. Bertambah berat kandungan itu

bertambah berat pula cobaan yang ditanggung ibu, sampai saat saat melahirkan. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusui. Masa mengandung dan menyusui ialah 30 bulan. (Kemenag, 2019)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa betapa besar pengorbanan ibu saat hamil, melahirkan sampai menyusui. Pada saat hamil, terdapat perubahan perubahan fisiologis dialami ibu hamil, semua sitem yang ada ditubuh mengalami perubahan. Oleh sebab itu kita harus mengormati kedua orang tua terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita,

## 2. Ayat Tentang Anemia Dalam Kehamilan

Status gizi merupakan salah satu faktor terjadinya anemia pada ibu hamil, apabila gizi ibu tidak tercukupi maka akan memberikan dampak negatif bagi ibu hamil tersebut. Makanan yang bergizi merupakan makanan yang halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Qur'an kemenag, 2019 hal 25)

Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan meskipun tanpa sanksi hukum duniawi, seperti menyakiti sesama, menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara mengadu domba dan menyebar kebohongan, berhati dengki, angkuh dan sombong, dan setan juga menyuruh manusia berbuat keji, yaitu perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan pembunuhan, dan setan juga membisikkan agar kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak, padahal Allah Mahasuci dari hal tersebut (Kemenag, 2019)

Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti bahirah, saibah, dan wasilah. Ibnu Abbas

berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Tha'qif, bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, bahirah, saibah, dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah swt. Maka adanya peringatan ini karena setidaknyanya disebabkan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, pertama mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang oleh Allah, dan kedua adanya perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan-makanan ini.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Mengonsumsi makanan dan minuman halal dapat memberikan dampak positif bagi tubuh. Sistem kekebalan tubuh bisa semakin meningkat untuk melawan penyakit karena makanan halal terjaga dari najis, kotoran serta hal-hal yang membahayakan bagi tubuh manusia begitupun dengan ibu hamil.

Kekurangan zat besi juga merupakan salah satu faktor terjadinya anemia pada ibu hamil. Zat besi sendiri telah disebutkan dalam Al -Quran QS Al-Hadid 57: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.(Al-Qur'an Kemenag, 2019 hal 541)

Lalu Kami juga menciptakan besi yang dapat dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam peperangan di samping mempunyai banyak manfaat lain pada masa damai. Itu semua agar manusia memanfaatkan besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, dari alam gaib, mengetahui siapa saja yang membela agama dan rasul-rasul-Nya. Allah benar-benar Mahakuasa karena diri-Nya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan siapa pun.(Shihab, 2007)

Ayat diatas menjelaskan tentang zat besi yang terdapat banyak manfaat bagi manusia khususnya dalam tubuh manusia. Dalam tubuh Fe ikut serta dalam pembentukan eritrosit-eritrosit sendiri sangat penting dalam tubuh karena eritrosit mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh.defisiensi Fe dalam darah mengakibatkan anemia.

## **BAB IV**

### **HIPERTENSI KEHAMILAN**

#### **A. Landasan Teori Hipertensi Kehamilan**

##### 1. Pengertian

Kehamilan merupakan masa terdapatnya janin dalam rahim seorang wanita. masa kehamilan di dahului oleh proses terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) pada wanita. setelah pembuahan terbentuklah janin dan akan bertumbuh di dalam rahim yang merupakan tempat berlindung paling aman dan nyaman bagi janin itu sendiri (Ratna, 2011).

Tekanan darah tinggi merupakan keadaan dimana meningkatnya tekanan sistole 140 mmHg atau di atasnya dan tekanan diastole 90 mmHg atau di atasnya. sementara TD merupakan sebuah tekanan yang timbul dalam pembuluh darah saat jantung memompa darah keseluruh tubuh. Ada 2 faktor yang menentukan tekanan darah yaitu:

1. Curah jantung
2. Resistensi perifer (Darmawansyih, 2014).

Hipertensi kehamilan merupakan hipertensi yang terjadi akibat meningkatnya tekanan sistole dan diastole kurang lebih 140/90 mmHg tekanan akan di ukur sebanyak 2 kali dengan jeda 4 jam. meningkatnya tekanan darah sistole  $\geq 30$  mmHg sedangkan diastole  $\geq 15$  mmHg sebagai nilai ukur hipertensi sudah tidak digunakan lagi (Prawirohardjo, 2013).

## 2. Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan

Berdasarkan Prawirohardjo 2010, klasifikasi hipertensi dalam kehamilan yaitu:

### a. Hipertensi kronik

Hipertensi kronik merupakan Tekanan darah tinggi dengan sistolik  $\geq 140$  mmHg dan diastolic  $\geq 90$  mmHg dan merupakan tekanan darah tinggi yang terdeteksi sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu (Jan & Carolyn, 2010).

### b. Preeklamsia-eklamsia

#### 1) Preeklamsia

Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan, dengan tanda dan gejala yaitu: tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg; terjadi kenaikan berat badan; sesak nafas; nyeri pada epigastrium; proteinuria (+) dan disertai edema. Protein normal dalam urin tidak melebihi 0,3 gram dalam 24 jam. Edema merupakan akumulasi cairan pada tubuh yang terlihat ataupun tidak terlihat. Edema biasanya terlihat pada bagian tibia, wajah, tangan dan bahkan seluruh tubuh (anasarka). Akibatnya dapat terjadi kematian intrauterine pada janin (Yeyeh, 2010).

#### 2) Eklamsia

Eklamsia merupakan kelanjutan dari preeklamsia dan di sertai kejang dan koma. Pada Eklamsia, edema terjadi ketvika ada penumpukan cairan tubuh yang terlihat atau tidak terlihat. 3/4-1 kg/minggu. Edema serebral persisten dan

perdarahan otak (nyeri kepala, muntah), perdarahan hati (nyeri epigastrium, perdarahan abdomen), menyebabkan proteinuria, menyebabkan kejang (trauma jauh, gagal jantung, perdarahan otak) dan atau koma (kelanjutan kejang dari otak dapat di ikuti koma sebagai manifestasi dari cedera serebrovaskular atau stroke yang dapat menimbulkan perdarahan sehingga terjadi koma) (Manuaba, 2013).

### 3) Hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsia

Hipertensi tersebut adalah jenis hipertensi kronik yang tandai dengan preeklamsia atau hipertensi kronis dengan proteinuria. Hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan berusia kurang dari 20 minggu dan berlanjut sampai 6 minggu setelah melahirkan, disertai dengan tanda preeklamsia (tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg, berat badan naik, sesak nafas, nyeri epigastrium, protein urine (+) dan edema. protein dalam urine normalnya tidak lebih dari 0,3 gram dalam 24 jam (Prawirohardjo, 2013).

Keadaan hipertensi pada ibu hamil dapat timbul baik itu sebagai suatu komplikasi kehamilan yang terjadi pada ibu dalam masa kehamilannya, ataupun hipertensi yang telah dialami ibu sejak sebelum hamil dan berlanjut selama masa kehamilannya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, menurut American Commite on Maternal Welfare beberapa kelompok, yaitu :

### a. Hipertensi Kronik

Hipertensi Kronik merupakan keadaan dimana tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum hamil atau pada masa kehamilan sebelum usia 20 minggu dan dapat timbul sebagai hipertensi sekunder yang biasa jarang di temukan pada ibu hamil yang di sebabkan oleh beberapa penyakit kronik seperti penyakit ginjal menahun, penyakit revaskuler dan penyakit endokrin. Akan tetapi dapat muncul sebagai hipertensi primer yakni jenis hipertensi yang penyebabnya tidak jelas, baik itu factor genetic maupun factor lingkungan (Darmawansyih, 2014).

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi kronis biasanya terjadi sebelum minggu ke-20 saat hamil, kemudian biasa bertahan hingga 12 minggu setelah kelahiran (Leeman, Dresang, & Fontaine, 2016).

### b. Hipertensi Gestasional

Muncul ketika usia kehamilan menginjak 20 minggu atau terjadi pada masa nifas, akan tetapi tanpa preeklampsia (proteinuria dan edema) dan normal kembali setelah postpartum disebut juga sebagai transient atau late hypertension (Darmawansyih, 2014).

Hipertensi Gestasional merupakan hipertensi yang tekanan darahnya 140/90 mmHg atau lebih pada masa kehamilan dan tidak terdapat protein pada urin (W. E. Sari, 2016)

Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah tanpa adanya proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi yang

diinduksi kehamilan nonproteinurik sejati tampaknya tidak berhubungan dengan peningkatan morbiditas ibu atau janin. Namun, risiko perkembangan dari hipertensi gestasional ke pre-eklampsia adalah sekitar 20-30% dan karenanya diperlukan kewaspadaan. Tingkat ini meningkat menjadi sekitar 50% ketika hipertensi gestasional berkembang sebelum kehamilan 32 minggu. Sebagai akibat dari risiko perkembangan ini menjadi pre-eklampsia, pemeriksaan urinalisis mingguan dan tekanan darah (BP) umumnya direkomendasikan pada wanita dengan hipertensi gestasional (Ryan & Mccarthy, 2018).

Perkembangan tekanan darah baru setelah 20 minggu kehamilan tanpa bukti disfungsi organ ibu dikenal sebagai hipertensi gestasional. Ini biasanya harus diselesaikan setelah 12 minggu postpartum. Jika hipertensi bertahan lebih dari itu, diagnosis kemungkinan hipertensi kronis atau yang sudah ada sebelumnya yang telah ditutupi oleh penurunan fisiologis BP yang terjadi pada awal kehamilan. Namun, beberapa wanita dengan preeklampsia atau hipertensi gestasional mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasi BP tinggi mereka. Ada juga tingkat kekambuhan HTN kehamilan yang tinggi pada kehamilan berikutnya sebesar 22% (Reddy & Jim, 2019).

### c. Preeklampsia dan eclampsia

Menurut Leslie & Collins (2016), faktor resiko timbulnya preeklamsi terbagi menjadi 2 yaitu:

#### 1) Faktor risiko tinggi

- a) Riwayat hipertensi pada kehamilan yang lalu
  - b) Adanya penyakit ginjal
  - c) Menderita autoimmune (syndrome antifosfolipid)
  - d) Diabetes mellitus tipe I atau II
  - e) Hipertensi kronis
- 2) Faktor risiko menengah
- a) Kehamilan pertama
  - b) Usia diatas 40 tahun
  - c) Jarak kehamilan diatas 10 tahun
  - d) Keturunan
  - e) Kehamilan kembar

Menurut Darmawansyih (2014), preeklampsia merupakan hipertensi yang muncul pada kehamilan >20 minggu dan di tandai dengan adanya protein dalam urin serta pembengkakan.. Preeklampsia disertai kejang (eclampsia). Adapun beberapa factor predisposisi terjadinya preeklampsia yaitu:

- 1) Primigravida
- 2) Gemeli
- 3) Wanita multipara dengan hipertensi kronik
- 4) DM
- 5) Molahidatidosa

6) Hipertensi Gestasional (Transient Hypertension Pregnancy-induced Hypertension).

Hipertensi transien ini menggambarkan kelompok wanita yang mempunyai hipertensi gestasional yang pulih saat masa pascapartum

Temuan	Hipertensi kronis	Hipertensi gestasional	Pre-eklampsia atau eklampsia
Waktu onset	<20 minggu	Pertengahan kehamilan	≥20 minggu
Proteinuria	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Hemokonsentrasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Trombositopenia	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Disfungsi hati	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Kreatinin serum >1.2 mg/dL	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Peningkatan asam urat serum	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Gejala klinik	Tidak ada	Tidak ada	Ada

(Kennedy, Ruth, & Martin, 2014).

Tabel 2. Perbedaan Hipertensi kronis, hipertensi gestasional dan preeklampsia/eclampsia pada kehamilan (Karthikeyan, V.J., 2015)

### 3. Faktor Resiko Hipertensi

Menurut Sarwono Prawirohardjo (2013), untuk penyebabnya itu masih belum jelas akan tetapi ada beberapa yang dapat mempengaruhi faktor resiko hipertensi yaitu:

#### a. Stress

Efek kehamilan yang terjadi secara fisiologis, misalnya terjadi perubahan suasana hati akibat pengaruh hormone kehamilan, terjadi kelelahan, sakit pada punggung, kecemasan terhadap kehamilannya serta proses persalinannya (terutama pada ibu

primigravida), keadaan tersebut merupakan keadaan dimana dapat memicu terjadinya stress pada ibu hamil (Ningsih, 2018).

Stress dapat memicu peningkatan saraf simpatis yang dapat membuat tekanan darah meningkat dengan bertahap, maksudnya disini semakin berat kondisi stress maka akan tinggi pula tekanan darahnya. Stress dapat diartikan sebagai rasa takut serta cemas dari perasaan serta tubuh seseorang terhadap perubahan yang ada di lingkungan (Basri, Akbar, & Dwinata, 2018).

b. Primigravida

Pada awal kehamilan wanita cenderung wanita masih mempunyai respon terhadap peredaran darah untuk menghadapi masa kehamilan serta bersalin. Sehingga menimbulkan komplikasi tekanan darah tinggi (Za, Renjani, & Astuti, 2016).

c. Kehamilan anggur

d. Kehamilan kembar

Kehamilan ganda atau kembar merupakan kehamilan yang mempunyai 2 janin atau lebih. Kehamilan ganda ini dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap ibu dan bayinya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan janin ganda biasa mengalami gangguan dibandingkan janin tunggal seperti peningkatan tekanan darah akibat adanya penambahan beban sirkulasi darah ke janin (Za et al., 2016).

e. Diabetes mellitus dan bayi besar

f. Faktor genetik

Berdasarkan data statistic terbukti bahwa seseorang akan lebih mudah terkena hipertensi jika kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya terkena hipertensi (Pemiliana, Nasution, & Arsah, 2018)

g. Penyakit ginjal

h. Hipertensi saat belum hamil

Riwayat hipertensi yang dialami sebelum kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, dimana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan superimpose preeclampsia (Pemiliana et al., 2018).

i. Kegemukan.

Merupakan salah satu resiko pemicu hipertensi kronis pada ibu, karena kegemukan yang dapat memicu kerja jantung menjadi lebih berat serta tekanan pembuluh darah bisa menjadi tinggi karena banyaknya tumpukan lemak (Isnaniar, Norlita, & Safitri, 2019).

Menurut Imaroh et al (2018), dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi pada ibu hamil yaitu:

a. Usia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Imaroh, umur <20 tahun atau >35 tahun mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Usia 35 tahun keatas cenderung terkena hipertensi kehamilan karena terdapat beberapa faktor seperti munculnya penyakit penyerta (gangguan ginjal, diabetes serta hipertensi) (Juaria, 2015). Kemudian ibu hamil yang berusia diatas

35 harus lebih memperhatikan kesehatannya, dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah mulai mengalami penurunan sehingga mempunyai resiko yang tinggi meningkatnya tekanan darah (Basri et al., 2018).

Sedangkan pada usia >20 tahun juga merupakan kehamilan berisiko terkena hipertensi, karena biasanya hipertensi cenderung meningkat pada usia yang terbilang muda, berhubungan dengan belum maksimalnya organ-organ tubuh untuk memproduksi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi, adanya perasaan tertekan saat ibu merasa belum siap untuk hamil, merasa belum mampu menjadi orang tua, adanya rasa minder pada teman-teman lainnya, masih suka memikirkan diri sendiri, kemudian stress memikirkan harus mengurus suami dan kehamilannya serta memikirkan masalah ekonomi (Philip, 2018).

Usia yang tergolong bagus untuk hamil yaitu 20-35 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi sempurna, kemudian memiliki tingkat resiko rendah untuk terkena hipertensi kehamilan (Za et al., 2016).

#### b. Pendidikan

Rendahnya pendidikan ibu hamil (<9 tahun atau dibawah SMP) maka akan mempengaruhi kejadian hipertensi dengan tingkat risiko 5,2 kali lebih besar.

#### c. Pekerjaan

Wanita hamil yang bekerja dan mengharuskan dirinya berdiri lama akan berisiko terjadinya peningkatan 20-60% hipertensi pada kerjaan yang

mengharuskan untuk lebih ke fisik, sehingga pekerjaan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hipertensi.

Tuntutan dalam bekerja dapat memicu stress pada pekerja sehingga dapat memicu meningkatnya tekanan darah. Sumber stress itu sendiri berasal dari pekerjaan yang meliputi: beban kerja; fasilitas kerja yang kurang mendukung; peran yang tidak jelas dalam pekerjaan; tidak jelasnya tanggung jawab; mempunyai masalah hubungan yang melibatkan orang lain; mempunyai tuntutan dalam bekerja serta dalam keluarga (Astria, Susilawati, & Yuviska, 2016).

#### d. Penghasilan

Faktor ekonomi yang tergolong rendah mempengaruhi masalah gizi, dan dapat mengurangi kunjungan antenatal care dan biasa terdapat kondisi yang tidak higienis. Berdasarkan dalam penelitian Imaroh, mengatakan bahwa ibu hamil dengan penghasilan rendah lebih berisiko terkena hipertensi kehamilan dibandingkan ibu hamil dengan penghasilan tinggi.

#### e. Gravida

Imaroh et al (2018), mengatakan ibu dengan primigravida lebih berisiko terkena hipertensi kehamilan, hal tersebut menjadi alasan kenapa gravida masuk kedalam faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi pada kehamilan. Kehamilan pada ibu multigravida juga dapat terkena hipertensi kehamilan yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: stress atau mempunyai beban pikiran yang banyak, jarak kehamilan yang tidak direncanakan, pekerjaan ibu yang bertambah banyak, dll (Philip, 2018).

f. Genetic

Faktor genetic atau riwayat hipertensi keluarga juga termasuk faktor yang berpengaruh terhadap kejadian hipertensi ibu hamil.

g. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Orang yang obesitas mempunyai tingkat risiko lebih besar untuk terkena hipertensi disbanding orang yang tidak obesitas. Berdasarkan hasil uji statistic pada penelitian, mengatakan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Ibu hamil yang mempunyai indeks IMT diatas 26,0 maka akan mempunyai peluang 2,602 kali peluang untuk terkena hipertensi kehamilan (Febyan & Pamaron, 2018).

h. Natrium

Konsumsi natrium hamil yaitu yang tinggi juga dapat berpengaruh dan dapat memicu terjadinya hipertensi. Konsumsi natrium yang paling sering dikonsumsi ibu yaitu Fast food (seperti mie instant).

Sifat dari natrium yakni dapat menarik cairan sehingga ketika ibu mengkonsumsi garam yang berlebih makanan yang diasingkan, maka tekanan darah ibu akan mengalami peningkatan. Orang yang sensitive akan natrium akan lebih gampang untuk natrium menyebabkan retensi cairan dan membuat tekanan darah meningkat. Karena sifat dari natrium yang dapat meretensi air sehingga meningkatkan volume darah dan secara otomatis tekanan darah juga akan meningkat (Uli, 2013).

#### 4. Patofisiologi

Menurut Reeder dkk (2011), patofisiologi hipertensi ibu hamil di sebabkan oleh adanya pengecilan arteriol, kemudian terjadi penyempitan sistemik hingga rusaknya pembuluh darah yang menjadi karakteristik dari hipertensi kehamilan. Peredaran darah pada arteri terganggu karena adanya segmen yang mengecil dan membesar dengan bergantian. Dengan kinerja segmen tersebut dapat merusak pembuluh darah yang disebabkan oleh terjadinya penurunan suplay darah pada area yang terjadi pelebaran. Jika endotelium pembuluh darah rusak maka trombosit, fibrinogen serta produk darah yang lain akan lepas di interendotelium. Rusaknya pembuluh darah itu berakibat meningkatnya permeabilitas albumin hingga cairan yang mulanya berada di intravaskuler berpindah ke ekstrasvaskuler, kejadian tersebut biasa terlihat sebagai edema.

#### 5. Manifestasi klinis

Menurut Manuaba (2013), terdapat beberapa tanda dan gejala dari hipertensi yaitu:

- a. Terjadi peningkatan tekanan darah.
- b. Nyeri pada kepala
- c. Kejang
- d. Kehilangan kesadaran
- e. Jika sudah proteinuria, berarti masuk ke gejala preklampsia
- f. Cepat lelah, mual, muntah.
- g. Tengok terasa berat atau kaku.
- h. Nyeri epigastrium.

## 6. Pencegahan Hipertensi

Menurut Yeyeh (2010), tindakan preventif dari hipertensi yaitu menerapkan pola hidup sehat, kurangi pikiran pemicu stress, melakukan diet rendah kolesterol, menerapkan pola makan yang bergizi, kemudian terakhir jangan merokok dan minum-minuman keras. Sedangkan untuk pembatasan diet kalori dan rendah garam itu tidak bisa dilakukan karena berpengaruh janin. Penanganan cepat oleh petugas kesehatan sangat penting dan perlu. Kemudian ibu hamil juga perlu diberikan edukasi terkait dengan tanda dan bahaya kehamilan, sehingga ibu dapat memeriksakan kandungannya secara rutin dan tidak terjadi komplikasi yang lebih parah (Juaria, 2015).

Kemudian menurut Febyan & Pamaron (2018), mengatakan bahwa skrining merupakan sebuah langkah penting dalam penentuan diagnosis serta penanganan pada ibu hamil. Jadi dapat disimpulkan bahwa skrining ini selain berfungsi untuk menentukan diagnosis juga berfungsi untuk sebagai tindakan pertama untuk pencegahan serta untuk mengetahui kondisi ibu sebelum terjadi komplikasi yang lebih parah lagi.

Untuk ibu hamil yang mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga, maka dapat diminimalisir dengan pemberian edukasi tentang bagaimana memperhatikan pola hidup yang sehat kemudian menganjurkan ibu hamil untuk rutin memeriksakan kondisinya di pelayanan kesehatan terdekat (Philip, 2018).

Kebutuhan kalsium cukup tinggi pada ibu hamil yaitu sebanyak 2-2,5 gram/hari dan berfungsi untuk

mempengaruhi terbentuknya tulang dan organ lain dari janin. Bila kalsium itu kurang maka tubuh ibu hamil akan merespon agar tubuhnya sendiri dapat memenuhi kekurangannya dengan bantuan jaringan otot yang mengeluarkan kalsium. Dalam minyak ikan terkandung lemak yang tak jenuh dengan jumlah banyak sehingga bisa berfungsi untuk menghindari serta menjadi penghambat pembentukan tromboksen dan dapat meringankan kerja trombosit. Maka dari itu, minyak ikan dapat mengurangi terjadinya preeklampsia dan eklampsia serta mempunyai kandungan kalsium (Manuaba, 2013).

#### 7. Pemeriksaan penunjang

Menurut Manuaba (2013) dan Purwaningsih dkk (2010), mengatakan bahwa terdapat beberapa pemeriksaan yang ditujukan pada ibu hamil yang menderita hipertensi, yaitu:

- a. Melakukan tes urin untuk mengetahui apakah terdapat protein dalam urin atau biasa disebut proteinuria.
- b. Mengumpulan urin hingga 24 jam yang bertujuan agar urin bersih dari kreatinin dan protein.
- c. Tes fungsi hati
- d. Tes fungsi ginjal
- e. Tes tekanan darah dengan profil biofisik
- f. Lakukan Ultrasonography seri, aliran doppler dan tes tekanan kontraksi agar keadaan janin dapat diketahui.

## 8. Penanganan Hipertensi dalam Kehamilan

Terdapat beberapa cara penanganan pada klien dengan hipertensi kehamilan yaitu:

### a. Hipertensi yang cukup ringan.

Merupakan hipertensi yang dapat diatasi sendiri dengan penerapan pola hidup sehat, dengan istirahat yang cukup atau baring dengan posisi miring, berguna untuk membuat aliran darah pada vena cava inferior berkurang dan darah yang menuju ke jantung dapat meningkat. Apabila kondisi hipertensinya cukup berat dan terlihat memburuk segera hubungi petugas Kesehatan

### b. Dalam hipertensi berat.

Terjadi ketika klien terlihat memburuk maka segera larikan kerumah sakit dengan mengatur tirah baring, kemudian di berikan obat anti kejang, pemberian diuretik, kemudian pemasangan terapi infus dextrose 5% serta pemberian antisida (Deak & Moskovitz, 2020).

### c. Hipertensi kronik.

Yaitu dengan di bawa ke Rumah Sakit agar evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh seperti melakukan pemeriksaan laboratorium beserta uji kultur, melakukan pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal atau yang biasa dikenal dengan foto thorax, EKG, fungsi paru (Manuaba, 2013).

Tujuan penanganan untuk hipertensi kronik yaitu untuk mengurangi komplikasi yang akibat hipertensi pada ibu sambil menghindari hal yang dapat membahayakan janin. Penggunaan obat antihipertensi lain kecuali ACE (Angiotensin Converting Enzyme

inhibitor) dapat diteruskan bila telah digunakan sebelum hamil. Obat hipertensi golongan penghambat ACE dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian pada janin yang digunakan pada dua trimester akhir. Bagi wanita hamil yang tidak makan obat antihipertensi sejak awal kehamilan dapat dimulai dengan memodifikasi pola hidup seperti mengurangi aktifitas, menambah istirahat dan membatasi makanan yang dapat memperparah hipertensi seperti makanan yang mengandung garam (Darmawansyih. 2014).

Menurut Purwaningsih, Fatmawati (2010) dan Prawirohardjo (2013), terdapat beberapa penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan yaitu:

- a. Menganjurkan klien untuk latihan isotonic disertai dengan istirahat yang cukup dan tirah baring.
- b. Menghindari minuman berkafein, tidak merokok dan tidak minum minuman keras.
- c. Mengedukasi ibu untuk melakukan pemeriksaan yang teratur minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk ibu yang menderita hipertensi disarankan untuk lebih sering datang memeriksa kondisinya, terutama saat trimester 3, yakni ibu hamil wajib memeriksakan kandungannya setiap 2 minggu selama 2 bulan pertama pada trimester 3 dan pemeriksaan menjadi sekali saat bulan terakhir masa kehamilan.
- d. Lakukan pengecekan janin dengan USG.
- e. Aktivitas fisik dibatasi.

- f. Penggunaan obat antihipertensi pada kehamilan tidak di haruskan, karena obat anti hipertensi yang sering digunakan mempunyai efek merugikan bagi janin. Akan tetapi pada hipertensi yang berat, maka akan diberikan obat-obatan sebagai tindakan sementara.

#### 9. Faktor Penyebab Penanganan Hipertensi dalam Kehamilan Terlambat.

- a. Ibu hamil tidak menjaga kehamilan dengan baik, sehingga tekanan darah tinggi bisa luput dari pengawasan.
- b. Rujukan terlambat karena masalah geografis, sosial, ekonomi, budaya yang berkembang di masyarakat.
- c. Gejala hipertensi tidak jelas dan penyebabnya belum pasti.
- d. Kejadian hipertensi yang diderita bersamaan dengan gangguan tumbuh kembang plasenta dan janin, sehingga sikap yang seharusnya ingin diambil itu terkadang menjadi sulit (Manuaba, 2013).

#### 10. Komplikasi

Menurut Hasliani (2018), ibu hamil yang telah memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelum hamil kemudian tekanan darahnya tidak dipantau dan diatasi maka dapat memicu timbulnya preeklamsia dan eclampsia pada ibu hamil.

Menurut Purwaningsih dkk (2010), Mitayani (2011), Santos & Msn, (2020), mengatakan bahwa ada

beberapa komplikasi terkait dengan hipertensi kehamilan yang mungkin mempengaruhi ibu dan janin. Adapun komplikasi yang mempengaruhi ibu yaitu:

- a. Eklampsia
- b. Pre eklampsia
- c. Lepasnya plasenta sebelum waktunya
- d. Penyakit serebrovaskular
- e. Penyakit ginjal
- f. Terjadinya perdarahan pada subkapsula hepar
- g. Gangguan pembekuan darah
- h. Sindrom HELLP
- i. Ablasia retina

Kemudian komplikasi yang biasa terjadi pada janin yaitu:

- a. Terganggunya perkembangan janin di Rahim
- b. Kelahiran premature
- c. Asfiksia neonatorum
- d. Kematian yang terjadi dalam uterus
- e. Meningkatnya prevalensi kasus kematian
- f. Kesakitan perinata

## **B. Asuhan Keperawatan pada Kasus Hipertensi dalam Kehamilan**

### **1. Pengkajian**

#### **a. Anamnesa**



<https://www.indonesiana.id>

Mengkaji klien dengan tekanan darah tinggi pada masa kehamilan meliputi:

1) Data ibu

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Umur :

Pendidikan :

Suku bangsa :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

2) Data Riwayat kesehatan

- a) Riwayat kesehatan sekarang: Berisi tentang keadaan ibu yang sekarang dan lebih merujuk ke tanda dan gejala hipertensi, seperti ibu datang dengan keluhan mudah lelah, mual dan muntah, sakit kepala, biasa terjadi nyeri epigastrium, tengkuk terasa kaku, jika berat biasa terjadi penurunan kesadaran.

- b) Riwayat kesehatan dahulu: Yaitu mengkaji apakah klien memang menderita hipertensi sebelum hamil atau pada kehamilan terdahulu.
- c) Riwayat kesehatan keluarga: Melakukan pengkajian pada keluarga klien, apakah mempunyai riwayat hipertensi kehamilan.
  - 3) Riwayat perkawinan: Hipertensi kehamilan biasanya dipengaruhi oleh usia saat mengandung, biasa terjadi pada ibu yang mengandung di usia <20 tahun dan juga pada ibu yang usianya <35 tahun (Imaroh et al., 2018)
  - 4) Riwayat obstetri: Biasanya terjadi pada kehamilan pertama, gemeli, hidramnion dan kehamilan anggur serta berpengaruh pada semakin tuanya usia kehamilan



(Prawirohardjo, 2013).

<https://www.parentingclub.co.id>

## **b. Pemeriksaan Fisik**

- 1) Keadaan umum : kebanyakan ibu hamil yang hipertensi mudah lelah
  - a) TD : 140/90 mmHg atau lebih
  - b) Nadi : Ibu hamil yang hipertensi biasanya mempunyai denyut nadi meningkat dari biasanya.
  - c) Suhu : Ibu yang mengalami hipertensi tidak berpengaruh ke suhu tubuh.
  - d) Pernafasan : Biasa ditemukan ibu dengan nafas yang pendek
  - e) Berat Badan : Umumnya terjadi peningkatan berat badan sebanyak 0,5 Kg dalam seminggu akan tetapi pada ibu hamil yang menderita preeklampsia akan terjadi peningkatan BB sebanyak 1 Kg dalam seminggu.
- 2) Kepala : Biasa terdapat ketombe dan biasa ibu hamil juga mengeluhkan sakit kepala.
- 3) Wajah : Jika telah memasuki fase preeklampsia, biasa terjadi pembengkakan pada wajah.
- 4) Mata : Biasa kongjungtiva anemis, edema palvebral dan penglihatan kabur.

- 5) Hidung : Normal (Tidak ada gangguan)
- 6) Bibir : Mukosa bibir Lembab
- 7) Mulut : Biasa terdapat edema vaskuler yang dapat menyebabkan gusi menjadi lunak, sehingga gusi dapat membengkak atau terjadi perdarahan
- 8) Leher : Kelenjar tiroid biasa membesar.
- 9) Thorax :
  - a) Paru-paru : Biasanya akan terjadi peningkatan respirasi
  - b) jantung : Biasa terjadi palpitasi jantung pada ibu hamil yang mengalami hipertensi.
- 10) Payudara : Payudara bertambah besar, kemudian menjadi lebih padat dan keras, puting semakin menonjol serta areola menjadi lebih gelap dan melebar, di permukaan kulitnya terlihat pembuluh darah.
- 11) Abdomen : Biasanya pusar ibu hamil menonjol keluar, terdapat garis yang warnanya lebih gelap (Linea Nigra) dan garis berwarna putih (Linea Alba). Ibu hamil dengan hipertensi biasanya merasakan nyeri pada daerah epigastrium yang disertai berkurangnya nafsu makan, mual dan muntah.

- 12) Pemeriksaan janin : Pada ibu yang hipertensi, biasa didapatkan bunyi jantung janin tidak teratur serta gerakan janin yang lemah (Mitayani, 2011).
- 13) Ekstermitas : Biasa terjadi pembengkakan pada kaki dan tangan.
- 14) Sistem persarafan : Biasa terjadi hiper refleksia
- 15) Genitourinaria : Ibu hamil yang hipertensi, biasa terjadi oliguria dan proteinuria (Ibu yang telah memasuki fase Preeklampsia) (Reeder dkk, 2011).

### **c. Pemeriksaan Penunjang**

Menurut Mitayani (2011), terdapat beberapa pemeriksaan penunjang pada ibu hamil dengan diagnosis hipertensi kehamilan.

#### **1) Pemeriksaan Laboratorium**

##### **a) Pemeriksaan darah lengkap:**

- (1) Hemoglobin (HB) menurun (nilai normal untuk wanita hamil adalah 12-14 gr%)
- (2) Peningkatan pada hematokrit (nilai rujukan 37-43 vol%)
- (3) Trombosit biasa menurun (nilai rujukan 150-450 ribu/mm<sup>3</sup>).

##### **b) Urinalisis**

Untuk ibu hamil dengan Hipertensi ringan tidak terdapat proteinuria.

##### **c) Pemeriksaan fungsi hati**

- (1) Bilirubin meningkat (N=< 1 mg/ dl)
  - (2) LDH (Laktat dehidrogenase) meningkat
  - (3) Aspartat aminomtransferase (AST) > 60 ul.
  - (4) Serum glutamat piruvat transaminase (SGPT) meningkat (N: 15-45 u/ml).
  - (5) Serum glutamat oxaloacetic trasaminase (SGOT) meningkat (N: < 31 u/l).
  - (6) Total protein serum normal (N: 6,7-8,7 g/dl).
- d) Tes kimia darah : Asam urat meningkat (N: 2,4-2,7 mg/ dl).
- e) Radiologi
- (1) Ultrasonografi : Biasa terjadi retardasi pertumbuhan janin intrauterus, pernapasan intrauterus lambat, aktivitas janin lambat, dan volume cairan ketuban sedikit.
  - (2) Kardiotokografi : Denyut jantung janin lemah
- f) Data sosial ekonomi : Sosial ekonomi dapat berpengaruh pada kondisi Ibu hamil, cenderung ibu hamil yang memiliki ekonomi rendah lebih rentan terkena, karena mereka kurang mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan juga melakukan

perawatan antenatal yang teratur (Imaroh et al., 2018).

- g) Data Psikologis : Biasanya ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan berada dalam kondisi yang labil dan mudah marah, ibu merasa khawatir akan keadaan dirinya dan keadaan janin dalam kandungannya, dia takut anaknya nanti lahir cacat ataupun meninggal dunia, sehingga ia takut untuk melahirkan (Prawirohardjo, 2013).

## 2) Diagnosa

Berdasarkan SDKI (2017), berikut adalah diagnosa yang mungkin akan terjadi pada pasien dengan kasus hipertensi kehamilan, yaitu:

- a. Nyeri akut
- b. Intoleransi Aktivitas
- c. Defisit pengetahuan
- d. Risiko perfusi serebral tidak efektif
- e. Resiko perfusi jaringan perifer

## 3) Intervensi

### a. Nyeri Akut

Tujuan	Intervensi
Setelah tindakan keperawatan, diharapkan partisipan mampu menangani masalah nyeri dengan indikator :	<b>Observasi</b> a. Lakukan pengamatan pada lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri

<p>a. Rasa nyeri berkurang</p> <p>b. Tidak kesulitan tidur</p> <p>c. Gelisah berkurang</p> <p>d. Frekuensi nadi membaik</p> <p>e. Pola nafas normal</p> <p>(SLKI, 2019)</p>	<p>c. Perhatikan respon nyeri pada wajah klien.</p> <p>d. Identifikasi faktor yang memperberat serta meringankan nyeri</p> <p>e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri</p> <p>f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri</p> <p>g. pantau keberhasilan terapi komplementer yang telah dilakukan</p> <p>h. Pantau efek samping pemberian obat anti nyeri</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Beri teknik non farmakologis agar rasa nyeri berkurang</p> <p>b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa menurun</p> <p>c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>d. Pada saat pemilihan strategi untuk mengatasi nyeri itu patut untuk mempertimbangkan sumber dan jenis dari nyeri itu sendiri.</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Beri penjelasan tentang penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri</p> <p>b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri</p> <p>c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri sendiri</p>
---	--

	<p><b>Kolaborasi</b></p> <p>a. Kolaborasikan tentang pemberian analgesic untuk meredakan nyeri (SIKI, 2018)</p>
--	---

**b. Intoleransi Aktivitas**

<b>Tujuan</b>	<b>Intervensi</b>
<p>Setelah intervensi keperawatan, diharapkan untuk pasien dapat menunjukkan toleransi terhadap aktivitas dengan indikator:</p> <p>a. Frekuensi nadi ketika beraktivitas normal</p> <p>b. Saturasi oksigen ketika beraktivitas normal</p> <p>c. Ketika beraktivitas nafas dapat normal</p> <p>d. Tekanan darah normal.</p> <p>(SLKI, 2019)</p>	<p><b>Observasi</b></p> <p>a. Lakukan pengecekan kembali gangguan pada fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan.</p> <p>b. Observasi kelelahan fisik</p> <p>c. Observasi pola dan waktu tidur serta jamnya.</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>a. Beri lingkungan yang tenang serta stimulus yang rendah seperti cahaya yang tidak terlalu panas dan suara yang tidak bising</p> <p>b. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif</p> <p>c. Berikan aktivitas distraksi yang membuat rileks dan lebih santai</p> <p>d. Berikan kursi di brankar, ketika pasien tidak bisa pindah tempat atau berjalan.</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>a. Anjurkan klien untuk istirahat</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Anjurkan untuk aktivitas yang bertahap</li> <li>c. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak membaik</li> <li>d. Berikan edukasi terkait dengan cara mengurangi kelelahan</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasikan pada ahli gizi agar asupan makanan dapat meningkat serta membantu mendukung pemberian energy bagi tubuh (SIKI, 2018).</li> </ul>
--	---

**c. Defisit Pengetahuan**

<b>Tujuan</b>	<b>Intervensi</b>
<p>Setelah tindakan dilakukan, pasien diharapkan dapat menunjukkan peningkatan pada pengetahuan dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengurangi terjadinya cedera</li> <li>b. Mengetahui perilaku berisiko tinggi</li> </ul> <p>(SLKI, 2019)</p>	<p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi kesiapan klien untuk menerima informasi</li> <li>b. Identifikasi faktor yang dapat meningkatkan serta menurunkan informasi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beri materi dan media yang terkait dengan pendidikan kesehatan</li> <li>b. Atur jadwal untuk pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</li> <li>c. Beri kesempatan untuk klien mengajukan pertanyaan</li> </ul>

	<p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan</li> <li>b. Ajarkan strategi yang dapat digunakan</li> </ol> <p>(SIKI, 2018)</p>
--	---

**d. Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif**

Tujuan	Intervensi
<p>Setelah tindakan keperawatan, diharapkan partisipan menunjukkan keefektifan perfusi jaringan cerebral dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kesadaran meningkat</li> <li>b. Sakit kepala menurun</li> <li>c. Tekanan darah kembali normal</li> </ol> <p>(SLKI, 2019)</p>	<p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lakukan identifikasi penyebab peningkatan TIK seperti lesi, gang-guan metabolisme, dan edema serebral</li> <li>b. Pantau tanda dan gejala peningkatan TIK (tekanan darah, nadi meningkat, pola nafas ireguler, kesadaran menurun)</li> <li>c. Pantau MAP (Mean Arterial Pressure), jika perlu PAWP dan PAP</li> <li>d. Pantau ICP (Intra Cranial Pressure)</li> <li>e. Pantau CPP (Cerebral Pefussion Pressure)</li> <li>f. Pantau gelombang ICP</li> <li>g. Pantau status perna-pasan</li> <li>h. Pantau intake dan outpun cairan</li> <li>i. Monitor jaringan serebro spinalis (misalnya warna dan konsistensi)</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang</li> <li>b. Beri posisi semi fowler</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Hindari monuver valsava</li> <li>d. Cegah terjadi kejang</li> <li>e. Hindari pemberian cairan IV hipotonik</li> <li>f. Atur ventilator agar PaCO<sub>2</sub> optimal</li> <li>g. Pertahankan suhu tubuh normal</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi pemberian sedasi serta anti konvulsan</li> <li>b. Lakukan kolaborasi pemberian diuretic osmosis</li> <li>c. Kolaborasi pemberian pelunan tinja atau obat supositoria(SIKI, 2018)</li> </ul>
--	---

**e. Resiko Perfusi Jaringan Perifer**

Tujuan	Intervensi
<p>Setelah tindakan keperawatan, diharapkan partisipan menunjukkan keefektifan perfusi jaringan perifer dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denyut nadi perifer meningkat</li> <li>2. Warna kulit pucat menurun</li> <li>3. Pengisian kapiler pada akral membaik</li> <li>4. Turgor kulit membaik</li> <li>5. Tekanan darah membaik</li> </ol>	<p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pantau status kardiopulmonal (frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas dan tekanan darah)</li> <li>b. Pantau status oksigenasi</li> <li>c. Pantau status cairan tubuh</li> <li>d. Pantau tingkat kesadaran serta respon pupil</li> <li>e. Cek adanya riwayat alergi</li> </ol>

<p>(SLKI, 2019)</p>	<p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beri terapi oksigen agar saturasi oksigen dapat normal &gt;94%</li> <li>b. Siapkan peralatan inkubasi serta ventilasi mekanis</li> <li>c. Pasang terapi intravena</li> <li>d. Pasang kateter urine untuk melihat serta menilai produksi urine, bila di perlukan</li> <li>e. Lakukan skin test untuk mencegah adanya alergi terhadap obat tertentu</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beri penjelasan tentang penyebab atau resiko syok</li> <li>b. Jelaskan tanda dan gejala awal terjadinya syok</li> <li>c. Anjurkan untuk segera melapor ketika merasakan tanda dan gejala dari syok</li> <li>d. Anjurkan untuk banyak mengkom-sumsi air putih</li> <li>e. Anjurkan untuk hindari alergen</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasikan tindakan terapi Intravena, bila perlu</li> <li>b. Kolaborasi untuk transfuse darah, bila perlu</li> </ol>
---------------------	---

	c. Kolaborasi untuk pemberian antiinflamasi, bila perlu (SIKI, 2018)
--	--

## C. Tinjauan Agama Terkait Dengan Hipertensi Kehamilan

### 1. Ayat Terkait Kehamilan

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua terutama kepada ibu yang telah mengandung kita. Setiap anak berkewajiban berbuat baik kepada ibunya. Seperti QS. Luqman/31:14 Tentang perjuangan yang menyusahkan bagi ibu yang hamil.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu (Luqman/31:14) (Al-Qur'an Kemenag RI, 2019).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Pada ayat-ayat lain, Allah juga memerintahkan yang demikian, firman-Nya: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا; Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. (al-Isra'/17: 23); Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu adalah:

- a. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas.
- b. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu.; Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya. Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan.

Sesudah lahir ke dunia, sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua tahun (yang utama). Air

susu ibu (ASI) juga terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu, yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh anaknya. Dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak, dan untuk men-cegah segala macam penyakit. Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Oleh sebab itu, susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI.

Seorang ibu sangat dihimbau untuk menyusui anaknya dengan ASI. Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk, kecuali dalam situasi yang sangat memaksa. Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak, dan menyusukan anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada ibunya.

Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan sebab-sebab manusia harus taat dan berbuat baik kepada ibunya. Nabi saw sendiri memerintahkan agar seorang anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
مَنْ أَبٌ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ  
قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَأَلْأَقْرَبُ. (رواه أبو داود  
والترمذي)

daripada kepada bapaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis:

Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, “Aku bertanya ya Rasulullah, kepada siapakah aku wajib berbakti?” Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa lagi?” Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa lagi?” Rasulullah menjawab, “Kepada bapakmu. Kemudian

kepada kerabat yang lebih dekat, kemudian kerabat yang lebih dekat.” (Riwayat Abu Dawud dan at-Tirmizi); Adapun tentang lamanya menyusukan anak, Al-Qur'an memerintahkan agar seorang ibu menyusukan anaknya paling lama dua tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini, dengan firman-Nya, “dan menyapihnya dalam masa dua tahun.” Dalam ayat lain, Allah menentukan masa untuk menyusukan anak itu selama dua tahun. Allah berfirman:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ.....﴾ (233)

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (al-Baqarah/2: 233).

Firman-Nya lagi:

.....﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....﴾ (15)

Artinya :

Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (al-Ahqaf/46: 15);

Pengertian ayat di atas adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu mengandung anaknya minimal enam bulan, dan masa menyusui dua puluh empat bulan atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu bilangan 30 bulan.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dalam masa dua tahun. Pada ayat 233 surah al-Baqarah diterangkan bahwa masa menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang

hendak menyusukan anaknya dengan sempurna. Maksudnya, bila ada sesuatu halangan, atau masa dua tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi.

Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya, yaitu untuk menjarangkan kelahiran. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga tahun, atau kurang sedikit. Sebab dalam masa menyusui, seorang perempuan pada umumnya sukar untuk hamil kembali.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud dari “berbuat baik” dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka, sejak dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan, baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencari nafkah anaknya.

Ibu-bapak dalam ayat ini disebut secara umum, tidak dibedakan antara ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya, apakah ibu bapaknya itu muslim atau kafir.

Di samping apa yang disebutkan di atas, masih ada beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak, antara lain:

- a. Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya ialah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan apa pun dari anak-anaknya, kecuali agar mereka di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- b. Anak adalah buah hati dan jantung dari ibu bapaknya, seperti yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, “Fatimah adalah buah hatiku.”
- c. Sejak dalam kandungan, lalu dilahirkan ke dunia hingga dewasa, kebutuhan makan, minum, pakaian, dan keperluan lain anak-anak ditanggung oleh ibu bapaknya.

Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah, kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebabnya, Allah meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua ibu bapak, sesudah kewajiban beribadah kepada-Nya.

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan bahwa manusia akan kembali kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Pada saat itu, Dia akan memberikan pembalasan yang adil kepada hamba-hamba-Nya. Perbuatan baik akan dibalas pahala yang berlipat ganda berupa surga, sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan azab neraka (Al-Qur’an Kemenag RI, 2019).

## 2. Intervensi Keagamaan

### a. Terap Murottal

Dalam penelitian Fratidhina & Kurniyati (2016), penurunan tekanan darah pada ibu hamil yang menerima pengobatan menunjukkan manfaat dari terapi Al-Qur'an surah Ar-Maryam. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah bahwa tekanan darah sistolik rata-rata dari kelompok intervensi setelah tes adalah 152 mmHg dan kelompok kontrol adalah 161 mmHg dengan rata-rata tes tekanan darah diastolic kelompok intervensi adalah 85 mmHg dan kelompok kontrol adalah 89 mmHg.

Terapi murottal bukanlah perawatan medis yang dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi, tetapi dapat membuat wanita hamil lebih tenang dan menjadi lebih santai sehingga dapat membantu mengurangi kecemasan tentang kondisi mereka. Gangguan kecemasan jangka panjang bisa berbahaya bagi wanita hamil dengan tekanan darah tinggi karena dapat membuat ibu menjadi stress serta dapat memperburuk kondisi ibu dan memicu komplikasi yang lebih serius.

### b. Terapi dzikir

Dalam penelitian Widiastuti et al (2018), dimana pada penelitian ini menggunakan 2 terapi yakni terapi dzikir dan murottal. Terapi dzikir dilakukan dengan menyebut lafal-lafal untuk mengingat Allah, seperti dengan bacaan tasbih selama 25 menit. Sedangkan untuk terapi murottal yaitu dengan mendengarkan bacaan surah Ar-Rahman selama 15 menit.

Ada beberapa cara untuk menghindari efek negatif kecemasan yaitu dengan menggunakan tehnik atau

metode yang dapat mengurangi peningkatan hormone adrenalin pada wanita hamil dengan preklampsia yang menyebabkan kecemasan. Kemudian kecemasan dapat memicu stress yang merupakan salah satu pemicu tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, metode ini disebut metode distraksi dan relaksasi, yaitu untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal lain, sehingga pasien melupakan kecemasan yang dialami sehingga membuat seseorang dapat lebih tenang atau rileks ketika menghadapi stressor.

Terapi murottal dan dzikir adalah metode pengalih perhatian (distraksi) yang dapat dilakukan dengan mendengarkan orang-orang melantunkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Dalam penelitian ini, uji statistik skor kecemasan sebelum dan setelah dilakukan terapi murottal menunjukkan hasil p value <0,0001. Nilai p menunjukan bahwa terapi murottal mampu menurunkan kecemasan pada ibu hamil dengan pre eklampsia secara signifikan. Relaksasi dzikir dan terapi murottal dapat memberikan efek untuk mengurangi tingkat kecemasan.

Sejalan dengan QS. Ar-Ra'd/13:28, yang membahas tentang orang yang beriman dan hatinya akan tentram jika selalu mengingat Allah.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra'd/13:28)

Orang-orang yang mendapat petunjuk llahi dan kembali menerima tuntunan-Nya sebagaimana disebut pada ayat yang lalu itu, adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketenteraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni al-Qur'an yang sangat mempesona kandungan dan redaksinya. Sungguh! Camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaannya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik yaitu surga.

Kata dzikr/zikir pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah. Walaupun makna ini kemudian berkembang menjadi "mengingat". Namun demikian, mengingat sesuatu seringkali mengantar lidah menyebutnya. Demikian juga menyebut dengan lidah dapat mengantar hati untuk mengingat lebih banyak lagi apa yang disebut-sebut itu. Kalau kata "menyebut" dikaitkan dengan sesuatu, maka apa yang disebut itu adalah namanya. Karena itu ayat di atas dipahami dalam arti menyebut nama Allah. Selanjutnya nama sesuatu terucapkan. apabila ia teringat disebut sifat, perbuatan maupun peristiwa yang berkaitan dengannya. Dari sini dzikrullah dapat mencakup makna menyebut keagungan Allah, surga atau neraka-Nya, rahmat dan siksa-Nya atau perintah dan larangan-Nya dan juga wahyu-wahyu-Nya.

Ada juga yang memahaminya dalam arti zikir secara umum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun

selainnya. Bahwa zikir mengantar kepada ketenteraman jiwa tentu saja apabila zikir itu dimaksudkan untuk mendorong hati menuju kesadaran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Bukan sekadar ucapan dengan lidah (Shihab, 2005).

## BAB V

### KECEMASAN DALAM KEHAMILAN

#### A. Defenisi Kecemasan

**K**ecemasan saat hamil adalah kondisi dengan emosi yang kurang baik yang melibatkan ketakutan tentang kehamilan seperti kesehatan dan keselamatan buah hati, proses partus, dan masalah seputar keibuan (Schetter, et al., 2016). Kecemasan merupakan perasaan cemas atau khawatir yang belum pasti. Rasa takut dengan Kecemasan itu berbeda, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya (Stuart, 2012).

Kecemasan pada ibu hamil juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Ibu berfikir dan khawatir jika bayi yang dikandungnya akan lahir sebelum waktunya (Astuti et al., 2017).

Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis dan psikologis seperti kecemasan, kecemasan bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk dan berkembang menjadi stress maupun depresi, mengakibatkan anak dilahirkan belum pada waktunya, BB rendah, waktu persalinan yang cukup lama sampai ada yang menyebabkan harus di oprasi Caesar (Widaryanti & Riska, 2019).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan pada kehamilan itu merupakan emosi yang digambarkan dengan rasa khawatir dan takut akan keselamatan janin yang ada dalam kandungan. Kecemasan bila tidak ditangani akan menimbulkan dampak negative baik untuk bayi maupun untuk ibu.

## B. Klasifikasi Kecemasan

Menurut Peplau dalam Stuart (2012), tingkat ansietas terbagi menjadi 4 tingkat yaitu:

1. kecemasan ringan: derajat kewaspadaan seseorang menjadi meningkat. Dengan terjadinya kecemasan ini bisa memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik.
2. kecemasan sedang: bisa membuat seseorang berpusat terhadap sesuatu yang *urgen* dan mengabaikan yang lainnya. Tingat ini juga bisa menyempitkan pandangan seseorang. Orang tersebut juga menjadi kurang banyak berfikir yang matang akan tetapi seseorang tersebut bisa memfokuskan lebih banyak jangkauan apabila diarahkan untuk mengerjakan.
3. kecemasan berat: seseorang menjadi hanya fokus terhadap satu hal dan tidak memikirkan hal lain. Agar bisa fokus terhadap hal lain individu tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi fokus.
4. Panik: individu menjadi hilang kontrol, susah melakukan sesuatu walaupun ada orang lain yang membantu memberi perintah.

## C. Perubahan psikologi ibu hamil

### 1. Trimester I

Resaksi emosional:

- a. Ambevalen
- b. Kekecewaan
- c. Penolakan

- d. Kecemasan
- e. Depresi
- f. Kesedihan
- g. Perubahan mood
- h. Khawatir jika mengalami keguguran
- i. Penurunan libido
- j. Perasaan tidak percaya akan dirinya yang sedang hamil
- k. Membuktikan kehamilannya

## 2. Trimester II

Sebelum dan setelah gerakan janin mula dirasakan:

- a. Perubahan dari menerima menjadi pemberi kasih sayang
- b. Mengevaluasi hubungan interpersonal dengan ibunya
- c. Belajar sambil mempersiapkan diri untuk peran sebagai ibu
- d. Menyadari bahawa janin itu merupakan individu yang perlu dijaga
- e. Fokus ibu lebih kepada kesehatan dan kesejahteraan sang janin
- f. Sedih dan merasa takut akan suami yang kurang senang
- g. Libido meningkat

## 3. Trimester III

Kecemasan serta persiapan kelahiran:

- a. Merasa khawatir terhadap janin yang akan lahir pada saat belum cukup umur
- b. Selalu siaga akan tanda-tanda persalinan
- c. Lebih protektif
- d. Memimpikan apa yang ditakutkan
- e. Merasa bahwa dirinya itu aneh/buruk
- f. takut tidak di perhatian lagi.
- g. Mempersiapkan nama anak yang akan dilahirkan
- h. Menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan bayi
- i. Menunggu kelahiran dengan bahagia walau ada rasa takut
- j. Aktif mencari informasi maupun dukungan.

Perubahan yang di alami seorang ibu terutama emosional ibu itu merupakan kondisi yang sangat umum baik diawala ataupun diakhir kehamilan. Setiap ibu memiliki respon yang berbeda-beda setiap ibunya dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.(Astuti et al., 2017).

#### **D. Pathofisiologi**

Terjadinya cemas berawal dari adanya rangsangan yang berasal dari faktor pemicu. Usia kandungan yang semakin besar mengakibatkan ibu merasa kurang nyaman, tidur menjadi kurang dan seringkali juga ibu merasakan sesak nafas. Hal ini menyebabkan calon ibu merasakan rasa cemas. Selain itu ketakutan pada resiko kematian pada saat melahirkan juga termasuk faktor yang mengakibatkan kecemasan timbul (Rahmadhani, 2019).

Rangsangan kecemasan akan berpengaruh pada sistem limbik yakni hipotalamus. Kemudian sistem saraf simpatiks yang ada di hipotalamus anterior akan aktif karena merupakan respon fisiologis saat terjadi cemas biasa di kenal dengan fight or flight respon. Saraf vasokonstriktor yang di bawah oleh saraf simpatiks akan menghasilkan norepinefrin untuk di kirim ke reseptor adrenergik alfa otot polos vaskuler sebagai vasospasme pembuluh darah. Pada saat sistem saraf simpatiks aktif menyebabkan tekanan arteri meningkat, laju metabolisme sel meningkat, dan aliran darah ke otot meningkat serta proses glikolisis di hati maupun otot meningkat yang mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat (Rahmadhani, 2019).

## **E. Penyebab**

### **1. Faktor eksternal**

#### **a. Ancaman integritas fisik**

- 1) Internal: perubahan pada tubuh (biologis) seperti saat hamil
- 2) Eksternal : adanya paparan virus, pencemaran di daerah sekitar tempat tinggal, musibah, gizi yang kurang, kurang cocok dengan tempat tinggalnya.

#### **b. Ancaman sistem diri**

- 1) Internal, beragam resiko terhadap kesempurnaan fisik juga bisa mengancam martabat diri, perubahan status dan peran, sosial budaya, hubungan dengan pasangan, dan kurangnya dukungan keluarga.
- 2) Eksternal, kepergian orang yang disayangi, perpisahan, tekanan, lingkungan sosial.

## 2. Faktor internal

- a. Usia: usia yang muda lebih gampang terjadi gangguan kecemasan berbanding terbalik dengan usia yang sudah tua.
- b. Stressor: karakteristik stressor yang bisa merubah seseorang secara mendadak mempengaruhi seseorang tersebut saat menyikapi kecemasan, bergantung pada cara orang tersebut menghadapi stressor.
- c. Lingkungan: individu yang sedang berada didaerah baru akan lebih muda merasakan gangguan kekhawatiran atau kecemasan daripada seseorang tersebut berada pada lingkungan yang sering di tempati oleh orang tersebut.
- d. Pendidikan: tingkat pendidikan berperan penting dalam cara seseorang menganalisis sesuatu dengan kemampuan menganalisis yang baik akan mempermudah seseorang dalam menguraikan suatu masalah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berfikirnya pun akan lebih rasional dan lebih mudah menangkap informasi baru.
- e. Paritas: paritas atau status kehamilan di dalam suatu penelitian mengatakan bahwa ibu hamil yang pertama kali lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinannya. Akan tetapi ibu yang hamil pertama kali lebih cenderung merasa khawatir akan kehamilannya (Hasim, 2018).

Xian, et al, (2019) mengemukakan faktor terkait dengan kecemasan pada kehamilan adalah status pekerjaan, merokok, paritas, adanya gangguan mental lainnya dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Menurut (Kinser, et al, 2017) dukungan sosial yang rendah juga mempengaruhi taraf kecemasan yang dirasakan pada ibu hamil. Prameswari & Ulfah, (2019) mengungkapkan bahwa pengetahuan, status pekerjaan, usia adalah faktor yang harus dipelajari. Analisis data menggunakan Chi-Square dan hasil yang diperoleh  $p = 0,000 < 0,05$ , yang menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara pengetahuan ibu hamil dan kecemasan ibu hamil,  $p = 0,155 < 0,05$ , tidak ada korelasi antara status kerja dan kecemasan ibu hamil,  $p = 0,571 \geq 0,05$  dan ada hubungan antara usia ibu dan kecemasan ibu hamil,  $p = 0,004 < 0,050$ . Ada 23 wanita hamil yang mengalami kecemasan rendah (57,7%), 35 orang memiliki pengetahuan yang baik tentang kehamilan (87,5%).

Bayrampour et al., (2018) dengan judul penelitian "Risk factors for antenatal anxiety: A systematic review of the literature" mendapatkan hasil faktor yang berkaitan dengan kecemasan yakni pernah mengalami keguguran, komplikasi medis, pelecehan anak, kekerasan dalam hubungan (suami), penolakan, dukungan social yang kurang, sejarah kesehatan mental, pengalaman yang merugikan.

Pada penelitian Wu et al., (2020) mengemukakan bahwa Gejala depresi dan kecemasan pada wanita hamil yakni kecenderungan untuk takut, menghindari, dan berfikir buruk. Kemudian rasa takut yang meningkat yang dialami wanita hamil berkaitan dengan keselamatan

janin yang belum lahir. Factor resiko wanita hamil yang lebih muda dari 35 tahun, kurus, primipara, berpenghasilan menengah, bekerja penuh waktu, dan tinggal di tempat yang sempit.

Furtado et al., (2018) dalam penelitian yang berjudul “Risk factors of new onset anxiety and anxiety exacerbation in the perinatal period: A systematic review and meta-analysis”. Hasil penelitian mengatakan tingkat pendidikan rendah, tinggal bersama keluarga besar, multiparitas, riwayat keluarga yang gangguan kejiwaan, hyperemesis gravidum, tidur yang buruk merupakan factor resiko kecemasan prenatal onset baru, sedangkan adanya gangguan kejiwaan komorbiditas merupakan factor yang akan memperburuk kecemasan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecemasan itu terdapat 2 faktor yakni bersal dari factor internal dan factor eksternal. penjelasan diatas terkait penyebab dari kecemasan yang dialami ibu hamil itu dapat berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri ibu. Seperti usia, pengetahuan/pendidikan, perubahan dari fisik, perubahan peran, dukungan social (suami, keluarga, tetangga), kekerasan dalam hubungan, lingkungan, pengalaman (hamil pertama, kehilangan, maupun perpisahan), ekonomi.

## **F. Tanda dan Gejala**

Menurut Hawari (2008) dalam (Rahmadhani, 2019) Keluhan-keluhan orang yang pernah mengalami kecemasan diantaranya yaitu:

1. Cemas
2. Takut
3. *Negative thinking*
4. Berperasaan *sensitive*
5. tegang
6. gelisah
7. Mudah kaget
8. Saat di keramaian merasa takut
9. Pola tidur yang terganggu
10. Mengalami mimpi yang menegangkan
11. Mengalami gangguan daya ingat maupun fokus
12. Gejala-gejala *somatoform* seperti otot dan tulang yang terasa sakit, pendengaran kurang jelas atau berdengung, sesak nafas, pencernaan yang terganggu, gangguan eliminasi, berdebar-debar dan sakit kepala

Pada penelitian Wu et al., (2020) mengemukakan bahwa Gejala depresi dan kecemasan pada wanita hamil yakni kecenderungan untuk takut, menghindari, dan berfikir buruk.

Sinesi et al., (2019) dalam penelitian yang berjudul "Anxiety scales used in pregnancy: systematic review" mendapatkan hasil beberapa gejala kecemasan kehamilan: tingkat kekhawatiran yang meningkat, gejala panic, takut melahirkan, khawatir yang berlebihan tentang kesehatan bayi.

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa ketika seseorang mengalami gangguan cemas

baik itu ibu hamil maupun individu, maka individu tersebut akan berfikiran buruk, mudah tersinggung yang mengakibatkan individu tersebut menjadi gelisah, tegang, mudah kaget, berdampak pada pola tidur yang kurang bagus dan gejala-gejala somatic, Semua itu merupakan gejala dari kecemasan.

### **G. Dampak dari kecemasan dalam kehamilan**

Kecemasan dalam kehamilan memiliki dampak negatif dalam proses kehamilan maupun terhadap janin yang ada dalam kandungan itu sendiri. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Adamson et al., (2018) Dari awal masa bayi hingga akhir masa remaja, temuan menunjukkan perubahan otak struktur dan fungsi di daerah frontal, temporal, dan limbik pada anak yang lahir dari ibu yang mengalami kecemasan prenatal. Abnormalitas otak ini mungkin mendasari hubungan antara kecemasan prenatal dan perilaku anak-anak, meskipun lebih banyak penelitian menggabungkan neuroimaging dan data perilaku diperlukan untuk menentukan hal ini.

Grigoriadis et al., (2018) berkesimpulan bahwa kecemasan antenatal secara signifikan terkait dengan peningkatan risiko depresi pascapersalinan dan dengan penurunan menyusui, meskipun hubungan yang terakhir lebih tentative mengingat keterbatasan studi asli. Ini penting untuk Pahami sepenuhnya dampak dari kecemasan antenatal mengabarkan masalah kejiwaan lebih lanjut dan hasil lainnya yang dapat menyebabkan kesulitan lebih lanjut.

Gül et al., (2020) Dalam studi ini, 260 ibu sehat dan bayi sehat direkrut studi dan hubungan antara adaptasi

dengan peran ibu dan perkembangan bayi telah diperiksa. Karena hasil terbaru dan kami menafsirkan bahwa kecemasan ibu dapat dikaitkan dengan gaya pengasuhan yang terlalu protektif dan karenanya memiliki efek negatif pada keduanya perkembangan motorik halus dan kasar bayi.

Dalam hal ini kita bisa berpendapat bahwa kecemasan pada saat hamil memiliki dampak yang kurang baik terhadap janin selama dalam kandungan maupun setelah janin tersebut lahir.

## **H. Penanganan Kecemasan pada Kehamilan**

### **1. Upaya untuk mengurangi kecemasan**

Penanganan mengurangi kecemasan bertujuan untuk memberikan suasana rileks, nyaman dan tenang agar dampak dari kecemasan bisa diminimalisir. Cara yang bisa digunakan terdapat berbagai macam, secara umum dibagi menjadi 2 yakni dengan menggunakan terapi farmakologis dan non farmakologis. Jenis obat yang sering di pakai dalam upaya meminimalisir rasa cemas yaitu golongan benzodiazpin (diazepam, chlordiazepin, larozeepam, clorazepate, prazepam) golongan non-benzodiazpin (sulpiride, hydroxine, buspirone) golongan Triksikli seta golongan Selektif Serotoninreuptake Inhibitor.

Pada saat keadaan hamil penggunaan obat-obatan harus berhati-hati. Ketika hamil tidak semua obat-obatan bisa di konsumsi oleh ibu hamil, dikarenakan ada sebagian obat yang dapat mengganggu kondisi janin ibu dalam kandungannya. Waktu dan dosis untuk meminum obat bagi ibu hamil diperlukan perhatian khusus dan penggunaan obat juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi

secara terus menerus agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Terapi non farmakologis yakni terapi tanpa pemakaian obat oral namun dapat mengurangi derajat kecemasan seseorang. Jenis terapi yang bisa di gunakan dalam mengurangi derajat kecemasan seperti relaksasi, meitasi, music therapy, hipnotis, dan lain sebagainya.

## 2. Efek Terapi Non Farmakologis Terhadap Kecemasan

Susilowati et al., (2019) mengemukakan bahwa kecemasan ibu hamil mampu dicegah atau diturunkan melalui terapi relaksasi, aromaterapi lavender, terapi murottal al qur'an, musik dan lainnya.

### a) Terapi relaksasi

Relaksasi merupakan salah satu cara untuk bisa menjadi rileks. Keadaan rileks terjadi ketika sistem saraf, panca indra dan organ tubuh kita tidak merasakan ketegangan dan keadaan kita pada saat itu masih dalam keadaan sadar. Relaksasi juga digunakan sebagai terapi penanganan mental yang berfungsi untuk menenangkan pikiran dari stimulus dari luar. Cara melakukan relaksasi dapat melalui hypnosis, yoga dan teknik-teknik yang berhubungan dengan penajakan pikiran (Mansur, 2009). Penelitian Oktaviani & Anggraini, (2016) membuktikan bahwa relaksasi berpengaruh untuk kecemasan dengan hasil uji t test dependen rata - rata skor penurunan kecemasan sebelum dan setelah dilakukan relaksasi sebesar 4.400, p value = 0,000 < 0,05 artinya Ho di tolak, ada pengaruh relaksasi terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil berisiko tinggi.

Pada penelitian yang dilakukan Amini, Donsu, & Prayogi, (2018) yang berjudul perbedaan tehnik relaksasi napas dalam dan terapi musik terhadap kecemasan pada ibu hamil primigravida mempunyai hasil yang signifikan menurunkan kecemasan pada ibu hamil primigravida.

Menurut Potte & Pary (2006) dalam (Andarmoyo, 2012) mengatakan bahwa efek relaksasi yakni :

- 1) Menurunkan TTV
- 2) Berkurangnya konsumsi oksigen
- 3) ketegangan otot berkurang
- 4) kecepatan metabolisme menurun
- 5) kesadaran meningkat
- 6) nyaman
- 7) kekhawatiran berkurang.

Menurut Andarmoyo (2013) posisi sangat penting bagi seorang pasien agar bisa fokus terhadap tindakan yang akan diberikan. Relaksasi itu sendiri dapat dilakukan dengan posisi duduk maupun berbaring. Jadi sebagai perawat harus mengetahui pentingnya memberikan posisi yang akan di berikan ke pasien untuk melakukan relaksasi.

Cara melakukan relaksasi nafas dalam yakni langkah awal yang dilakukan dengan menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tenang serta menjaga privasi diri pasien. Kemudian pastikan keadaan pasien saat itu dalam keadaan rileks. Setelah pasien merasa rileks maka minta agar pasien memejamkan mata dan berkonsentrasi. Kemudian minta pasien untuk bernafas

melalui hidung secara perlahan dan mulai menghitung 1-3 dalam hati, setelah itu menghembuskan nafas melalui mulut seraya menghitung angka 1-3, ulangi prosedur dari awal sampai pasien merasanya nyaman dan rileks.

b) Terapi relaksasi musik

Teknik relaksasi musik merupakan terapi yang menggunakan media music instrument untuk memperbaiki kondisi psikologi maupun fisik individu berbagai kalangan. Musik instrument yakni musik yang memperdengarkan lantunan yang tidak memiliki vocal. Kondisi cemas yang dialami seorang ibu yang sedang hamil dapat mempengaruhi produksi dari adrenalin, irama jantung, tekanan darah dan lainnya. Kecemasan itu sendiri memiliki gejala fisik seperti lelah, emosi yang susah terkontrol, susah tidur, sakit kepala, tidur yang terganggu.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan itu bisa dari ibu itu sendiri maupun dari lingkungannya. Penelitian Meihartati et al., (2019) yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Musik Instrumental Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitiannya Sebelum diberikan intervensi terapi musik instrumental pada saat pre test hampir setengahnya responden mengalami cemas ringan (48%), hampir setengahnya mengalami cemas sedang (45%), dan sebagian kecil mengalami cemas berat (7%). Sesudah diberikan intervensi terapi musik instrumental pada saat post test sebagian kecil responden tidak mengalami kecemasan (15%) hampir setengahnya mengalami cemas ringan (48%), dan hampir setengahnya mengalami cemas sedang (37%). Kesimpulan ada pengaruh teknik relaksasi

musik instrumental terhadap penurunan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III Di Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018.

c) Terapi murotal

Terapi Murottal merupakan salah satu terapi musik di karenakan murotal diartikan sebagai rekaman suara Qori' yang memperdengarkan lantunan ayat atau surah dalam Al-Quran. Terapi ini sering dijadikan sebagai terapi spiritual sebab dengan terapi ini dapat membuat seseorang yang melakukannya jadi mengingat kepada Allah Swt.(Nurqalbi & Kamaruddin, 2019). Dalam Potter & Perry (2005), durasi pemberian terapi music sekitar 15 menit agar mendapatkan hasil yang baik, sedangkan menurut Yuanitasari (2008) durasi pemberian 10 sampai 15 menit sudah dapat merasakan ketenangan. Smith dalam Raja, dkk (2018) tingakt suara yang rendah berkisar 50-60 desibel memberikan sensasi nyaman dan nyeri yang berkurang serta memberikan dampak positif terhadap yang mendengar. Ebrahimi & Ghodrati, (2020) berpendapat bahwa terapi religius telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk mengendalikan kecemasan kehamilan dan memberikan hasil yang signifikan dalam mengendalikan kecemasan ibu selama kehamilan

Budiyarti & Makiah, (2018) Mengemukakan bahwa ada pengaruh terapi murottal al qur'an terhadap kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dan menyimpulkan bahwa lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an memiliki efek langsung dalam mengurangi kegelisahan, kecemasan bahkan depresi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki efek dalam merangsang sistem kekebalan tubuh hingga membantu proses penyembuhan.

Efek ini terjadi dengan cara mendengarkan beberapa ayat Al Qur'an walaupun tanpa memahaminya.

Safitri, (2017) dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan penerapan terapi murotal dan pemberian aromaterapi lavender diterapkan kepada ketiga partisipan selama dua minggu. Pada ketiga partisipan terbukti mengalami penurunan kecemasan setelah diberikan perlakuan terapi murotal dan pemberian aromaterapi lavender. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan terapi murotal dan pemberian aromaterapi lavender dapat mengurangi kecemasan pada ibu hamil.

Murottal mempunyai beberapa manfaat antara lain:

- 1) Seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa
- 2) Mengaktifkan hormon endorfin alami, memberi kenyamanan, serta peralihan rasa takut, tegang, dan cemas. Pernafasan yang teratur menimbulkan efek nyaman (Heru, 2008).
- 3) lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an memiliki efek dalam merangsang sistem kekebalan tubuh hingga membantu proses penyembuhan (Budiyarti & Makiah, 2018).
- 4) Mengingatkan kesadaran kepada Tuhan. Dengan begitu yang mendengarkan menjadi pasrah kepada apa yang terjadi, saat kondisi seperti ini gelombang alpha yang di otak merupakan kondisi energi otak yang optimal dan bermanfaat menurunkan kecemasan (Heru, 2008)

d) Terapi *Aromatherapy*

Aromatherapy adalah terapi yang menggunakan minyak esensial sebagai bahan utama untuk memberikan efek pada psikologi maupun fisik seseorang untuk memperbaiki keadaannya. Efek dari minyak esensial di antaranya sebagai anti virus, memberi ketenangan, mengaktifkan adrenal, dan masih banyak lagi (Runiari, 2010; Ana, (2010). Aromaterapi lavender juga dapat menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil (Salamah, 2019)

Penelitian Salamah, (2019) mengemukakan hasil penelitian menunjukkan tingkat kecemasan pre test kelompok eksperimen mayoritas tidak cemas 8 orang (44,4%) dan posttest mayoritas tidak cemas 13 orang (72,2%). Sedangkan pretest kelompok kontrol mayoritas cemas sedang 14 orang (77,8%) dan posttest mayoritas cemas sedang 13 orang (72,2%). Hasil uji Mann Whitney dengan nilai p value sebesar  $0,000 < 0,05$ , berarti ada perbedaan pemberian aromaterapi lavender terhadap tingkat kecemasan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Seyegan Sleman dan dapat dikatakan pemberian terapi ini dapat menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil.

Hamdamian et al., (2018) menyatakan bahwa Aromaterapi dengan Rose damascena mengurangi keparahan rasa sakit dan kecemasan di tahap pertama persalinan. Aromaterapi dengan Rose damascena adalah metode yang nyaman dan efektif untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan selama tahap pertama persalinan.

Tumbuhan penghasil minyak esensial sekitar 150 sampai 200 jenis, di Indonesia sendiri ada 40 macam tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak esensial tapi belum semua di gunakan (Rafika, 2013).

Bentuk-bentuk aroma terapi sebagai berikut:

- a. Minyak Essensial Aromaterapi: bentuknya cair atau seperti minyak. Cara penggunaannya dengan cara dipanaskan pada tungku atau dioleskan pada saluran udara ataupun kain.
- b. Dupa Aromaterapi: berbentuk padat sehingga apabila dibakar akan berasap. Berguna diletakkan di ruangan yang berukuran besar dan bisa juga untuk ruangan yang terbuka.
- c. Lilin Aromaterapi: jika di bakar akan memberikan aroma yang digunakan untuk terapi
- d. Minyak Aromaterapi untuk pijat: bentuknya sama dengan aromaterapi yang lainnya namun yang membedakan adalah cara menggunakannya yakni untuk minyak pijat.
- e. Garam Aromaterapi: caranya dengan merendam bagian tubuh misal kaki yang berfungsi agar rasa pegal ataupun lelah berkurang. Karena garam *Aromatherapy* di yakini bisa mengeluarkan racun yang ada pada tubuh.
- f. Sabun Aromaterapi: bentuknya padat dan memiliki berbagai aroma wangi dan memiliki ekstrak dari tumbuhan, sehingga baik untuk kesehatan kulit serta terhindar dari serangga (Rafika, 2013).

Cara menggunakan aromaterapi ada beberapa cara sebagai berikut:

- a. Inhalasi: cara ini menggunakan indra penciuman, dimana setiap kali bernafas dapat merangsang *olfactory* dan itu tidak mengganggu pernafasan normal. Aroma yang dihirip akan memberikan efek pada fisik maupun fisiologis orang yang menggunakannya. Inhalasi terbagi mejadi 2 cara yakni langsung dan tidak langsung dimana inhalasi langsung digunakan hanya sendiri, sedangkan yang tidak langsung cara pemakaiannya dilakukan banyak orang di ruangan yang sama. Dalam Walls (2009) cara menggunakan *aromatherapy* inhalasi yakni bisa dengan elektrik, baterai, lilin *diffuser*, ataupun memberi aromatherapy pada kapas atau selembur kain dalam jumlah yang sedikit. Hal ini berguna untuk penenang dan minyak esensial relaksasi. terapi inhalasi aroma efektif sebagai intervensi keperawatan untuk menghilangkan stres pada wanita hamil (Park & Go, 2017)
- b. Pijat: minyak esensial sebelum digunakan untuk memijat dicampur dengan minyak sebagai dasar misalnya minyak zaitun. Terapi aroma pijat salah satu cara agar rasa pegal ditubuh hilang, bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Minyak esensial yang dibutuhkan hanya 2 tetes dan ditambah dengan 1 ml minyak pijat.
- c. Kompres: cara ini hanya perlu sedikit minyak aroma, kompres menggunakan minyak *aromatherapy* berfungsi agar nyeri berkurang.

Sedangkan kompres dingin dengan minyak lavender untuk persalinan di letakkan pada daerah *perineum*.

- d. Berendam: air hangat di tambah minyak esensial kemudian air dipakai berendam memberikan manfaat lebih rileks, rasa pegal dan nyeri menghilang (Rafika, 2013).

Dari penjelasan yang telah di sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan dapat di atasi dengan terapi non-farmakologi. Sudah banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa terapi non-farmakologi memberikan efek yang positif terhadap gangguan psikologi seperti gangguan kecemasan dan untuk ibu hamil juga bisa di lakukan. Ibu hamil yang mengalami kecemasan kurang di sarankan untuk melakukan terapi farmakologis seperti yang telah dijelaskan di atas penyebabnya dikarenakan tidak semua jenis obat dapat dikonsumsi oleh ibu hamil ditakutkan akan memberikan efek terhadap janin.

## 5) Asuhan keperawatan

### a) Pengkajian

Identitas klien (nama, alamat, umur, agama, pendidikan, suku, kehamilan yang keberapa, dan usia kehamilan). Untuk mengetahui ibu sedang mengalami kecemasan kita dapat menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kecemasan yang dimiliki ibu. Ada beberapa kuesioner untuk menilai kecemasan diantaranya SAS/SRAS (Zung Self-Rating Anxiety Scale), HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale), Depression Anxiety Stress Scale (DASS), Pregnancy-Related Anxiety Questionnaire-revised 2 (PRAQ-r2), dan lain sebagainya.

1. Diagnosa
  - a. Gangguan rasa nyaman
  - b. Ansietas
  - c. Deficit pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan (SDKI, 2016)
2. Intervensi
  - a. Gangguan rasa nyaman (SIKI, 2018)

Tujuan	Intervensi
Setelah di lakukan asuhan keperawatan diharapkan status kenyamanan meningkat  Kriteria hasil: 1. Keluhan tidak nyaman menurun 2. Gelisah menurun  (SLKI, 2019)	Observasi 1. Identifikasi penurunan energi, ketidak berdayaan untuk fokus, maupun gejala yang berhubungan dengan psikologis. 2. Identifikasi keluhan, dan kemahiran teknik relaksasi 3. Cek ketegangan otot, dan TTV pra dan post latihan 4. Pantau apa yang di rasakan post latihan  Terapeutik 1. menciptakan lingkungan yang nyaman baik suhu dan pencahayaannya dan tidak ada gangguan jika mengharuskan 2. Bagikan keterangan tertulis mengenai perencanaan dan tata cara teknik relaksasi 3. Pakaian yang digunakan nyaman 4. Suara yang digunakan di usahanakan lembut dan nadanya lambat 5. Pakai cara relaksasi sebagai metode pendukung dengan analg etik dan jika memungkinkan tindakan medis pun di perlukan  Edukasi 1. Jelaskan apa manfaat dan tujuannya serta jenis relaksasi

	<p>yang ada (misal <i>music</i>, relaksasi otot progresif dan nafas dalam)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. penjelasan secara detail intervensi relaksasi yang diinginkan.</li> <li>3. menganjurkan untuk mengambil posisi yang baik dan nyaman</li> <li>4. arahkan untuk rileks dan meresapi rasa dari relaksasi</li> <li>5. sarankan untuk sering mengulang ulang relaksasi yang ditelah di pilih</li> <li>6. praktikkan dan latih teknik relaksasi (misal otot progresif, imajinasi terbimbing, ataupun nafas dalam)</li> </ol>
--	---

### b. Ansietas

Tujuan	Intervensi
Setelah di lakukan asuhan keperawatan diharapkan Tingkat ansietas menurun Kriteria hasil: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku gelisah menurun</li> <li>2. Perilaku tegang menurun</li> <li>3. Keluhan pusing menurun</li> <li>4. Pola tidur membaik</li> </ol>	Observasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi teknik distraksi yang diinginkan</li> </ol>
	Terapeutik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gunakan teknik distraksi (missal: membacabermain, nonton, bernyanyi, antivitas terapi)</li> </ol>
	Edukasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jelaskan manfaatdan jenis distraksi bagi panca indra (missal: music, perhitungan, baca, televisse, video/ permainan genggam)</li> <li>2. anjurkan menggunakan teknik sesuai dengan tingkat energy, kemampuan, usia, tingkat perkembangan</li> <li>3. anjurkan membuat daftar aktivitas yang menyenangkan</li> <li>4. anjurkan berlatih teknik distraksi</li> </ol>

c. Defisit pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan

Tujuan	Intervensi
Setelah di lakukan asuhan keperawatan diharapkan Tingkat pengetahuan meningkat	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu tentang persalinan</li> </ol>
<p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku sesuai anjuran meningkat</li> <li>2. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat</li> <li>3. Perilaku sesuai dengan pengetahuan</li> </ol>	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapkan materi maupun media yang akan digunakan di pendidikan kesehatan</li> <li>2. Jadwalkan waktu pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</li> <li>3. Beri kesempatan untuk bertanya</li> <li>4. Berikan <i>reinforcement</i> positif terhadap perubahan perilaku ibu</li> </ol>
	<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan bagaimana metode persalinan yang dihapakan oleh ibu</li> <li>2. Penjelasan mengenai persiapan maupun tempat persalinan</li> <li>3. Menganjurkan ibu agar ikut dalam kelas ibu hamil ketika usia kehamilannya &gt;36 minggu</li> <li>4. Menganjurkan ibu menerapkan teknik manajemen nyeri persalinan tiap kala</li> <li>5. Menganjurkan untuk ibu menjaga nutrisinya</li> <li>6. Terapkan teknik relaksasi untuk menurunkan tingkat kecemasan dan ketidaknyamanan saat proses persalinan.</li> </ol>

	7. Memberi pemahaman ke ibu tentang tanda-tanda dan bahaya pada persalinan
--	--

## I. Tinjauan Agama Terkait Kecemasan dalam Kehamilan

### a. Kecemasan Maryam

Kitab Al-Qur'an sendiri telah memaparkan apa pengaruh iman terhadap keamanan dan ketenangan hati seseorang. Sepatutnya mengingat Allah Swt dengan cara berzikir. Dalam arti menghadirkan Tuhan dalam pikiran, tingkah laku dan lain sebagainya.

Dalam hal kehamilan kita dapat mengambil pelajaran dari surah Maryam ayat 22-25:

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ  
 النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ  
 تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهَزَيْتِ إِلَيْكَ بِجِذْعِ  
 النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan". Maka dia (jibril) berseruh kepadanya dari tempat yang rendah, "janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhan-mu telah menjadikan anak sungai dibawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu kearahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Dalam tafsir dari Q.S Maryam ayat 22-25 menceritakan tentang proses kehamilan Maryam serta kesedihan yang menggambarkan kecemasan Maryam saat beliau melahirkan seorang anak lelaki tanpa memiliki seorang suami dan tanpa pernah disentuh oleh lawan jenisnya. Maryam merupakan salah satu wanita yang menjaga kehormatannya dan tidak pernah berhubungan dengan lelaki. Maryam yang hamil tanpa disentuh siapapun merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, dia-lah yang mengatur proses penciptaan manusia dia pula yang menentukan rezeki, ajal, serta nasib seseorang. Ketika Allah Swt berkehendak maka jadilah (Shihab, 2009).

Dalam Al-Qur'an menjelaskan pengaruh iman yang aman dan tentram dalam jiwa seseorang, hendaklah berzikir kepada Allah SWT. Berdzikir dalam arti yang luas menyebabkan dan memahami dan menghadirkan Tuhan dalam pikiran, perilaku dan sebagainya.

Dalam QS Ar-Ra'd/13:28-29 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (QS Ar-Ra'd/13:28-29)

Tafsir Kemenag :

Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya. Dijelaskan bahwa orang yang beriman dan melakukan amal saleh, niscaya akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di sisi Allah pada hari kemudian (Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat diatas menjelaskan tentang hati seseorang yang selalu mengingat kepada Allah hatinya akan menjadi tentaram, begitupula pada ibu hamil, bila ibu hamil selalu berserah diri kepada Allah maka kegelisahan maupun kecemasan yang dirasakan akan berkurang dan hati akan tenang.

b. Proses Penciptaan manusia

(1) Penciptaan Nabi Adam as.

Dalam keyakinan yang diajarkan dalam keseluruhan kitab agama Samawy bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yakni Nabi Adam As di surge. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya :

Dalam QS. As-Sajadah: 7

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.” (QS. As-Sajadah: 7)

Dalam tafsir al misbah (11) hal. 183 menjelaskan bahwa dialah membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang dia ciptakan sehingga semua berpotensi berfungsi baik sesuai dengan tujuan dari penciptaannya dan dia telah memulai penciptaan manusia yakni Adam as. Dari tanah. Kemudian, dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam tubuh-nya ruh (ciptaan)-Nya.

Ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata insan pada ayat di atas merupakan Nabi Adam as. Menjadi keyakinan kemudian, bahwa Nabi Adam As merupakan manusia yang pertaa kali diciptakan dengan bahan bakunya adalah tanah. Adapun jenis tanah yang digunakan sebagai bahan baku penciptaan Nabi Adam As adalah tanah liat kering. Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya: QS. Al- Hijir:26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia (adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (QS. Al-Hijir:26)

Tafsir Lengkap Kemenag

(26) Ayat ini menerangkan bahwa setelah menyempurnakan bentuk ciptaan-Nya, Allah lalu meniupkan roh kepadanya. Menurut para saintis, kata hama' (lumpur hitam) pada ayat ini mengisyaratkan akan

terlibatnya molekul air (H<sub>2</sub>O) dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui 'air' adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi/biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. Kata "yang diberi bentuk", mengisyaratkan bahwa reaksi biokimiawi yang terjadi dalam media berair itu, telah menjadikan unsur-unsur, yang semula 'hanya' atom-atom menjadi suatu molekul organik, yang susunan dan bentuknya tertentu, seperti asam amino atau nukleotida.

Pada ayat yang lain, Allah swt menerangkan kejadian manusia itu:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ  
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

Terjemahnya:

"Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap." (ar-Rahman/55: 14-15)

Secara ilmiah, tembikar adalah semacam porcelain, yang dalam proses reaksi kimiawi dapat digunakan sebagai katalis untuk terjadinya proses polimerisasi. Kata "tanah kering seperti tembikar" mungkin mengisyaratkan terjadinya proses polimerisasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam-asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk molekul Desoxyribonucleic Acid (DNA), suatu materi penyusun struktur gena makhluk hidup.

Dan firman Allah swt:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ  
 فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗۤ وَّسٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." (sad/38: 71-72)

Yang dimaksud dengan insan (manusia) dalam ayat ini, ialah Adam a.s. yang merupakan bapak seluruh manusia. Sebagian ahli tafsir berpendapat Adam yang disebut dalam ayat ini bukanlah manusia pertama, karena sebelum itu Allah swt telah menciptakan beribu-ribu Adam. Tetapi Nabi Adam adalah nabi pertama yang diberi tugas untuk berdakwah kepada manusia agar mengikuti jalan yang benar.

Dalam hadis Nabi diterangkan proses penciptaan

اِنَّ اللّٰهَ عَرَّ وَجَلَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ مِّنْ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْاَحْمَرُ  
 وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالطَّيِّبُ وَالْحَبِيْثُ. (رواه أحمد و مسلم عن عائشة)

Adam itu. Nabi Muhammad saw bersabda:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menciptakan Adam dari kepalan tanah yang diambil dari segala macam tanah, maka lahirlah anak Adam menurut kadar tanah itu. Di antara mereka ada yang merah, ada yang hitam, dan ada di antara kedua warna itu. Ada yang mudah, ada yang sukar, ada yang baik, dan ada yang buruk. (Riwayat Ahmad dan Muslim dari '2isyah) (Al-Hijr/15:26)

## (2) Penciptaan Hawa

Hawa adalah ibu dari umat manusia karena ia adalah pasangan Nabi Adam As. Hawa juga diciptakan di surge sebagai teman bagi Nabi Adam As dalam menjalani perjalanan hidupnya. Penciptaan Hawa tidak sama dengan penciptaan Adam As. Namin Hawa diciptakan dalam proses yang berbeda. Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya (QS. Al-Nisa:1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Tafsir al misbah (2) hal. 331

Kata nafsah wahidah yang artinya Adam As. Menjadikan kata zaujaba yang sejarahnya harfiah bermakna pasangannya- adalah istri Adam As yang bernama Hawa. Ayat ini menjelaskan pasangan itu diciptakan dari nafsah wahidah yang berarti Adam, maka musafir terdahulu memahami bahwa istri Adam tercipta dari Adam sendiri. Banyak penafsir mengatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang

bengkok dan karena itu tulisan Qurthubi dalam tafsirnya perempuan bersifat 'auwja'/ bengkok. Pernyataan ini di perkuat dengan sebuah hadis:

“Dari Abi Hurairah Ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernik-mat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya.” (HR. Muslim)

- a. Penciptaan manusia ketiga (keturunan dari Adam as dan Hawa)

Proses penciptaan manusia ketiga ini terjadi secara biologis. Dimana Allah telah menanamkan naluri kepada Adam as dan Hawa untuk memperbanyak keturunan melalui hasrat mereka. Keturunan Adam as dan Hawa berasal dari sperma atau air mani yang bertemu dengan sel telur atau ovum yang berasal atau terdapat pada Rahim perempuan. Dalam al Qur'an telah dijelaskan dalam Qs. Al -Mu'minun: 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati(berasal) dari tana. Kemudian kami jadikan-nya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang

kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.”

Tafsir Lengkap Kemenag

(12) Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Ada segolongan ahli tafsir menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk kita sekalian, yang berasal dari air mani. Dari hasil penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itu pun berasal dari tanah setelah melalui beberapa proses perkembangan. Makanan yang merupakan hasil bumi, yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian anggotanya. Jika manusia itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah, maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah lagi, sesuai dengan firman Allah:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝٥٥﴾

Terjemahnya :

“Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.” (Tāhā/20: 55)

(13) Kemudian Kami (Allah) tempatkan saripati air mani itu dalam tulang rusuk sang suami yang dalam perisetubuhan dengan istrinya ditumpahkan ke dalam rahimnya, suatu tempat penyimpanan yang kukuh bagi janin sampai saat kelahirannya.

(14) Kemudian air mani itu Kami (Allah) kembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi al-'alaq (yang menempel di dinding rahim), dari al-'alaq dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging dijadikan tulang belulang, dan ada bagian yang dijadikan daging, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging, laksana pakaian penutup tubuh, kemudian dijadikan makhluk yang (berbentuk) lain, setelah ditiupkan Roh ke dalamnya, sehingga menjadi manusia yang sempurna, dapat berbicara, melihat, mendengar, berpikir yang tadinya hanya merupakan benda mati. Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Menurut para saintis, Tahapan-tahapan dalam embriologi manusia sebagai berikut:

- Nutfah, atau dalam bahasa Arabnya 'nutfa', mempunyai arti 'sedikit air', atau 'setetes air'. Hal ini jelas mendeskripsikan air yang sedikit yang dipancarkan lelaki saat bersanggama. Air yang sedikit ini mengandung sperma. Sperma atau spermatozoa terdapat di dalam air yang menjijikan dan berbentuk ikan yang berekor panjang (ini adalah salah satu arti kata sulalah. Dalam surah As-Sajdah/32 ayat 8, air mani disebut sebagai "..... Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang diremehkan...." Surah al-Insān/76 ayat 2 dan as-Sajdh/32 ayat 8 berkaitan dengan kandungan

dari air mani. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa air mani terdiri atas empat macam lendir yang berbeda yang dihasilkan oleh empat kelenjar yang berbeda, yaitu kelenjar biji pelir, kelenjar saluran seminal, kelenjar prostat, dan kelenjar saluran kencing.

- Sperma dibentuk di dalam buah pelir. Buah pelir sendiri dibentuk, sebagaimana dibuktikan ilmu pengetahuan, oleh sel-sel yang ada di bawah bakal ginjal, di bagian punggung embrio. Kelompok sel ini kemudian turun sampai di bawah tulang rusuk, pada saat beberapa minggu sebelum kelahiran bayi. Diperkirakan jumlah sperma dalam satu kali ejakulasi adalah 500 – 600 juta ekor. Akan tetapi dari jumlah tersebut, hanya satu yang dapat melakukan pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perubahan cepat dari indung telur. Ia segera menghasilkan membran yang mencegah sperma lain untuk ikut membuahi.
- Setelah sel telur dibuahi, dan menempelkan diri di dinding uterus dan memperoleh makanan dari ibunya, maka ia akan tumbuh cepat. Pada waktu dua sampai tiga minggu kemudian, apabila dilihat dengan mata telanjang, ia akan berubah dari bentukan 'lintah' atau 'alaqah' ke bentukan 'mu«gah' atau 'daging yang telah dikunyah'. Pola yang terakhir ini sebetulnya dibentuk oleh adanya tonjolan dan lekukan, yang pada waktunya nanti akan menjadi organ-organ dalam (jantung, usus) dan luar (kaki, tangan). Surah al-Hajj/22: 5 menambahkan satu catatan dari

embrio. Dalam ayat ini, mudghah dideskripsikan dengan tambahan “yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya ....” Ini menggambarkan hal yang terjadi pada tahap ‘diferensiasi’, dimana banyak organ mulai berkembang dalam waktu yang tidak bersamaan. Sehingga menimbulkan situasi antara selesai di bagian lain namun belum sempurna di bagian lainnya.

- Dua tahapan terakhir yang disebutkan pada surah al-Mu’minun/23: 14 bercerita tentang ‘pembentukan tulang belulang’ setelah tahap mudghah. Pada akhirnya, ceritera diakhiri dengan memberinya “baju”, yang terdiri atas daging dan otot. Apabila kita mengikuti pertumbuhan embrio, maka kira-kira pada umur empat minggu suatu proses ‘diferensiasi’ mulai berjalan. Dalam proses ini kelompok-kelompok sel pada embrio akan berubah bentuk dan mulai membentuk organ-organ berukuran besar. Salah satu yang berkembang pertama kali adalah tulang tengkorak. Proses ini akan disusul kemudian oleh pembentukan calon otot, telinga, mata, ginjal, jantung dan banyak lagi.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَاطِقًا، ثُمَّ يَكُونُ عُلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ فَوَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ بَارِزِعَ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah mengatakan:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya: Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Mu'minun/23:12-14)

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw juga menjelaskan bagaimana proses yang dialami oleh setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke permukaan bumi yang berbunyi: “sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam Rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpalan darah. Kemudian selama itu pula (empat

puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam) : rezekinya, ajal (umur), amalnya, dan buruk baik (nasibnya).” (Hr. Bukhari-Muslim)

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, K. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Afifudin Et.al. (2012). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Achadiat, C. M. (2004). *Prosedur tetap Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: EGC.
- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2016). *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahankari, A. S., Myles, P. R., Dixit, J. V, Tata, L. J., & Fogarty, A. W. (2017). Risk factors for maternal anaemia and low birth weight in pregnant women living in rural India: a prospective cohort study. *Public Health*, 151, 63–73. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.06.023>
- Allen-Walker, V., Hunter, A. J., Holmes, V. A., & McKinley, M. C. (2020). Weighing as part of your care: A feasibility study exploring the re-introduction of weight measurements during pregnancy as part of routine antenatal care. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03011-w>
- Anasitu, M. A. (2015). Pengaturan Gizi pada Penanganan Preeklampsia. *Health and Nutritions Journal*, 1.
- Anwar, S. (2010). *Sembuh dengan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Sabil.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Astutik & Ertiana. (2018). *Anemia dalam Kehamilan*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Astriana, Susilawati, & Yuviska, I. A. (2016). Hubungan Obesitas Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kusumadadi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014. *Jurnal Kebidanan*, 2(1), 43–46.
- Basri, H., Akbar, R., & Dwinata, I. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di Kota Makassar. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 14(2). Retrieved from Website: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKKPendahuluan>
- Bagaray, F. E. K., Wowor, V., & Mintjelungan, C. (2016). Perbedaan efektivitas DHE dengan media booklet dan media flip chart terhadap peningkatan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa SDN 126 Manado. *Jurnal E-Gigi (EG)e-Gigi (EG)*, 4, 7.
- Bothamley, J., & Boyle, M. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Patofisiologi dan Kebidanan (Edisi 4)*. Jakarta: EGC.
- Constance, S. (2009). *Buku Saku Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Carroli, G., Villar, J., Piaggio, G., Khan-Neelofur, D., Gülmezoglu, M., Mugford, M., Lumbiganon, P., Farnot, U., & Bersgjø, P. (2018). WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care. *Lancet*, 357(9268), 1565–1570. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)04723-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04723-1)
- Darmawansyih. (2014). *Penyakit Kronik dalam Kehamilan*. Alauddin: Alauddin University press.
- Daru, J., Zamora, J., Fernández-félix, B. M., Vogel, J., Oladapo, O. T., Morisaki, N., ... Torloni, M. R. (2018). Articles Risk of maternal mortality in women with severe anaemia during pregnancy and post

partum: a multilevel analysis, (18), 1–7.  
[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30078-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30078-0)

- Departemen Kesehatan RI. (2015). Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan.
- Deak, T. M., & Moskovitz, J. B. (2020). Hipertension and Pregnancy. *Emergency Medicine Clinics of NA*, 30(4), 903–917. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2012.08.006>
- Dinkes Gowa. (2019). Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Profil Kesehatan, (47).
- Dinkes Sulsel. (2015). Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Djamil, R. S. M., & Periode, P. (2020). Artikel Penelitian Gambaran Fundus Okuli pada Pasien Preeklampsia dan. 9(Supplement 1), 119–127.
- Farisi, M. I. (2010). Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa.” HEPI UNESA 2012.
- Fatmawati, L., Sulistyono, A., & Notobroto, H. B. (2017). Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia / Eklampsia Di Kabupaten Gresik. 52–58.
- Febyan, & Pamaron, I. B. R. (2018). Tinjauan Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar A Review on The Risk Factors of Hypertension in Pregnancy at Bhayangkara Hospital Denpasar. *Indonesian Journal of Obsetrics & Gynecology Science*, 21–26.
- Fitrayeni, F., Suryati, S., & Faranti, R. M. (2017). Penyebab Rendahnya Kelengkapan Kunjungan Antenatal Care Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran.

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 10(1), 101.  
<https://doi.org/10.24893/jkma.10.1.101-107.2015>

- Fratidhina, Y., & Kurniyati, H. (2016). Pengaruh mendengarkan murottal terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil preeklamsi di rsia pku muhammadiyah tangerang. 40–47.
- Gu, W., & et. al. (2019). Effects of Low-dose Aspirin on the Prevention of Preeclampsia and Pregnancy Outcomes: A Randomized Controlled Trial from Shanghai. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.03.038>
- Gebrecherkos, T., Girmay, G., Lemma, M., & Negash, M. (2020). Knowledge, Attitude, and Practice towards Hepatitis B Virus among Pregnant Women Attending Antenatal Care at the University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia. *International Journal of Hepatology*, 2020.  
<https://doi.org/10.1155/2020/5617603>
- Hamilton, P. M. (1995). *Dasar-Dasar Keperawatan Komunitas*. Jakarta: EGC.
- Hasliani, A. (2018). Hubungan Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklampsia di RSUD Pangkep. 12, 93–98.
- Imaroh, I. I., Nugraheni, S. A., & Dharminto. (2018). Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian Hiperensi Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu, Kota Semarang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 570–580.
- Isnaniar, Norlita, W., & Safitri, N. (2019). Pengaruh Obesitas Terhadap Kejadian Hipertensi Dalam Masa Kehamilan di Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. *Jurnal Photon*, 9(2), 75–87.

- Isro'aini, A. (2019). Pengaruh Massage Aromatherapy Lavender Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia Di PBM. Lilis Suryawati Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- Jan, M. K., & Carolyn, L. G. (2010). Buku Saku Asuhan Kebidanan Varney Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Juaria, H. (2015). Paritas dan umur ibu hamil dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan. 79–86.
- Karthikeyan, V.J. (2015). Hypertension in pregnancy; in Nadar, S. and Lip, G.Y.H., Hypertension. Ed. Oxford Cardiology Library, 2, 22.
- Karwati, Wiryawan, P., & Herawati, D. M. (2019). Analisis Angka Kematian Ibu Karena Hipertensi di Kehamilan di Bandung Barat Kronis Hipertensi preeklamsia. 3(Januari), 67–77.
- Kementrian Kesehatan, R. (2013). Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta: UNICEF.
- Kementrian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014.
- Kemkes RI. (2017). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016 (Health Statistics). In Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id)
- Kemkes RI. (2018). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017.
- Kemkes. (2020). Selama Social Distancing. 11.
- kementrian Kesehatan RI. (2020). modul-11 Buku KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak).

- Kennedy, B. B., Ruth, D. J., & Martin, E. J. (2014). *Modul Manajemen Intrapartum* (4th ed.). Jakarta: EGC.
- Konsoemardiyah. (2013). *Menurunkan Tingkat Kecemasan Dengan Aromaterapi*. Jakarta.
- Kustandi, C. S. (2011). *Media Pembelajaran Manual dan Digital*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Laksono, A. D., Rukmini, R., & Wulandari, R. D. (2020). Regional disparities in antenatal care utilization in Indonesia. *PLoS ONE*, 15(2), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224006>
- Laleno, D. C. (2018). *Preeklampsia Berat dan Eklampsia: Tatalaksana Anestesia Perioptif* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Leeman, L., Dresang, L., & Fontaine, P. (2016). Hypertensive disorder of pregnancy. *American Family Physicians*, 93(2), 121.
- Leslie, D., & Collins, R. E. (2016). Hypertension in Pregnancy. *BJA Education*., 16(1), 33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkv020>.
- Linggardini, K., & Aprilina, H. D. (2016). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pada Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan Tentang Preeklampsia di Wilayah Kerja Puskesmas Sokaraja I. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 14(2), 10–15.
- Lyall, F., & Belfort, M. (2010). *Pre-eclampsia Etiology and Clinical Practic*. New York: University Press.
- Malha et al. (2018). *Hypertension in Pregnancy in Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart Disease* (Vol. 3). Elsevier.

- Manuaba. (2008). *Gawat Darurat Obstetri Ginekologi dan Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta: ECG.
- Manuaba. (2010). *Ilmu Kebidanan, penyakit kandungan dan KB*. Jakarta: EGC.
- Manuaba, C. dkk. (2013). *Gawat Darurat Obstetri Ginekologi & Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta: EGC.
- Mitayani. (2011). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mudjari, N.S., and Samsu, N. (2015). Management of hypertension in pregnancy. *Acta Med Indones-Indones J Intern Med.*, 47(1), 78–86.
- Muzalfah, R., Dyah, Y., Santik, P., & Wahyuningsih, A. S. (2018). Kejadian Preeklampsia pada Ibu Bersalin. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(3), 417–428.
- Ningsih, R. R. (2018). Hubungan Tingkat Stress Dengan Hipertensi Pada Ibu Hamil di RSUD Muntilan.
- Noronha, J. A., Mphil, N., Bhaduri, A., Former, E. D., Bhat, H. V., Pro, F., ... Lecturer, S. G. (2013). Interventional study to strengthen the health promoting behaviours of pregnant women to prevent anaemia in southern India. *Midwifery*, 29(7), e35–e41. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2012.07.014>
- Norma, N., & Mustika. (2013). *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nur, A. F., & Arifuddin, A. (2017). Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di RSUD ANUTAPURA KOTA PALU 2. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 3(2), 69–75.

- Pikir, B. S. (2015). *Hipertensi Manajemen Komprehensif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pemiliana, P. D., Nasution, P., & Arsah. (2018). Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Hipertensi Pada Kehamilan di Puskesmas Setabu Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Bidan Komunitas*, II(3).
- Permenkes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Philip, R. L. (2018). *Gambaran Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan di RSUD Wates Kulon Progo*.
- Prawirohardjo, S. (2013). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Preeclampsia, F. (2013). *Preeclampsia and Maternal Mortality: a Global Burden*.
- Proverawati, A. (2011). *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha medika.

- Purwaningsih, Wahyu dan Fatmawati, S. (2010). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Putri, U. (2016). *Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer di RSUD Sampang*.
- Ratna. (2011). *Buku Ajar Kebidana Komunitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Reddy, S., & Jim, B. (2019). Hypertension and Pregnancy: Management and Future Risks. *Advances in Chronic Kidney Disease*, 26(2), 137–145. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2019.03.017>
- Reeder dkk. (2011). *Keperawatan Maternitas Kesehatan Wanita, Bayi, & Keluarga (18th ed.)*. Jakarta: EGC.
- Ryan, R. M., & Mccarthy, F. P. (2018). Hypertension in pregnancy. *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine*, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2018.03.003>
- Ramanda dkk. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja, 5(2), 120–135.
- Riskesdas. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*.
- Rahnemaei, F. A., Fashami, M. A., Abdi, F., & Abbasi, M. (2020). Factors Effective in the Prevention of Preeclampsia: A Systematic Review. *Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology*, 173–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.01.002>
- Riskesdas. (2018). *Hasil Utama Riskesdas Penyakit Tidak Menular 2018. Hasil Utama Riskesdas Penyakit Tidak Menular*.
- Saifuddin, A. B. (2016). *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan Neonatal*. Jakarta: YBP-SP.

- Santos, T. M. A., & Msn, C. N. M. (2020). Advances In Family Practice Nursing Hypertensive Disorders in Pregnancy Implications for Primary Care. *Advances in Family Practice Nursing*, 2, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.yfnpn.2020.01.004>
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, U. S. C. (2015). Rujukan Kehamilan Beresiko di Rumah Sakit (Abrori, ed.). istana publishing.
- Sari, W. E. (2016). Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional Wirda Elya Sari *Pregnancy with Gestasional Hypertension*. 4, 145–148.
- SDKI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta Selatan: DPP PPNI.
- Setiawan, S. (2017). *Studi Kepustakaan*. Gurupendidikan.Co.Id.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir AL-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian A-Qur'an)*. In Cetakan 1 (Baru). Jakarta: Lentera Hati.
- SIKI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Sini, I. R. (2013). *Bayi Tabung: Mempersiapkan Kehamilan-Menanti Kehamilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suthar, A. B., Hoos, D., Beqiri, A., Lorenz-Dehne, K., McClure, C., & Duncomb, C. (2013). Integración del tratamiento antirretroviral en los centros de atención prenatal y salud materno-infantil: Examen sistemático y metaanálisis. In *Bulletin of the World Health Organization* (Vol. 91, Issue 1, pp. 46–56). <https://doi.org/10.2471/BLT.12.107003>
- Stright, B. R. (2004). *Keperawatan Ibu-Bayi Baru Lahir* (3rd ed.). Jakarta: EGC.
- Santos, T. M. A., & Msn, C. N. M. (2020). ADVANCES IN FAMILY PRACTICE NURSING Hypertensive Disorders in Pregnancy Implications for Primary Care. *Advances in Family Practice Nursing*, 2, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.yfpn.2020.01.004>
- Sari, U. S. C. (2015). *Rujukan Kehamilan Beresiko di Rumah Sakit* (Abrori, ed.). istana publishing.
- Sari, W. E. (2016). *Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional* Wirda Elya Sari Pregnancy Takdir, N. (2017). Analisis Faktor Risiko Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga. *With Gestasional Hypertension*. 4, 145–148.
- Tekelab, T., Chojenta, C., Smith, R., & Loxton, D. (2019). Factors affecting utilization of antenatal care in Ethiopia: A systematic review and metaanalysis. *PLoS ONE*, 14(4), 1–24. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214848>
- Triana, A., Damayanti, I. P., Afni, R., & Yanti, J. S. (2015). *Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. In *Buku Ajar Kebidanan* (pp. 41–53). Yogyakarta: Deepublish.

- Uli, A. (2013). Hubungan Faktor Risiko Hipertensi dengan Kejadian Hipertensi pada Masyarakat Pesisir Laut Kecamatan Belawan.
- Unicef. (2012). Kesehatan Ibu & Anak. UNICEF Indonesia. <https://doi.org/9870>
- Ulivie & Purbadewi. (2013). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil.
- Villar, J., Ba'aqeel, H., Piaggio, G., Lumbiganon, P., Miguel Belizán, J., Farnot, U., Al-Mazrou, Y., Carroli, G., Pinol, A., Donner, A., Langer, A., Nigenda, G., Mugford, M., Fox-Rushby, J., Hutton, G., Bergsjø, P., Bakketeig, L., & Berendes, H. (2018). WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care. *Lancet*, 357(9268), 1551–1564. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)04722-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04722-X)
- Zile, I., & Villerusa, A. (2014). Comparison of antenatal care factors and neonatal outcomes in rural and urban context. *European Journal of Public Health*, 24(suppl\_2). <https://doi.org/10.1093/eurpub/cku165.073>
- Wang, W., & Wang, Y. (2020). Nomogram-based Prediction of Pre-eclampsia in First Trimester of Gestation. *Pregnancy Hypertension*.
- Widiastuti, A., Mulidah, S., Haryati, W., Kebidanan, J., Semarang, P. K., & Tengah, J. (2018). Terapi Dzikir dan Murotal Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Pre Eklampsia Ringan. *14(2)*, 98–105. <https://doi.org/10.31983/link.v14i2.3706>
- Wiknjastro. (2008). *Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- WHO (2013). *World Health Organization*.

- WHO, (2013). Maternal and Reproductive Health.
- WHO. (2014). Maternal Mortality. World Health Organization.
- WHO. (2015). World Health Organization: Maternal mortality fact sheet. 4.
- WHO. (2018). World Health Organization.
- Yuliani, D. R., Widyawati, M. N., & Rahayu, D. L. (2018). Terapi Murottal Sebagai Upaya menurunkan Kecemasan dan Tekanan Darah pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia: Literature Review. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 79–98.
- Yeyeh, R. (2010). *Asuhan Kebidanan 4 (Patologi)*. Jakarta: CV Trans InfoMedia.
- Zhang, Ming MD, P., & et. al. (2020). Preeclampsia Among African American Pregnant Women: An Update on Prevalence, Complications, Etiology, and Biomarkers. *Obstetrical and Gynecological Survey*, 75, 10.
- Za, R., Renjani, R. S., & Astuti, R. (2016). Pengaruh Umur, Kehamilan Ganda dan Gravida pada Kejadian Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh Tahun 2015 Effect of Age, Multiple Pregnancy and Gravida on Preeclampsia at Meuraxa General Hospital in Banda Aceh in 2015. 2(2), 115–125.

## BIODATA PENULIS



**Hasnah** lahir di Malino Gowa, 23 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Perawat Banta-bantaeng Makassar pada tahun 1994, Gelar magister Kesehatan di peroleh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004 pada peminatan Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Karier dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Perawat Kesehatan Palopo, lalu pada tahun 1998-2000 di Akademi Perawat Jiwa Makassar serta pada tahun 2000-2008 di Politeknik Kesehatan Tidung dan sekarang di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sejak memulai karier sampai sekarang mengampuh mata kuliah keperawatan maternitas.



**Hasnah** lahir di Malino Gowa, 23 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Perawat Banta-bantaeng Makassar pada tahun 1994, Gelar magister Kesehatan di peroleh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004 pada peminatan Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Karier dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Perawat Kesehatan Palopo, lalu pada tahun 1998-2000 di Akademi Perawat Jiwa Makassar serta pada tahun 2000-2008 di Politeknik Kesehatan Tidung dan sekarang di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sejak memulai karier sampai sekarang mengampuh mata kuliah keperawatan maternitas.



Alauddin University Press  
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63  
Romangpolong, Samata,  
Kabupaten Gowa

0846324110000

ISBN 978-6023-28360-6



9 786023 283606