

# MODUL INTERVENSI KEPERAWATAN PENCEGAHAN PRE EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL



**KERJASAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## Penyusun:

Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes

## Reviewer:

Prof Dr. dr. H. Muh Syafar, MS

Ansariadi, SKM, M.Sc,PH.Ph.D

Prof Dr. A. Ummuh Salmah, SKM, M.Sc

Prof Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes, M.Sc, PH

Dr. Atik Triratnawati, M.A

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep, Ns, M.Kep

Dr. Lalu Muhammad saleh, SKM, M.Kes

## Editor :

Rasdiyanah, S.Kep, Ns, M,Kep, Sp. Kep, Kom

NurulFadhilahGani, S.Kep, Ns, M.Kep

Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kep

Nurul Khusnul Khotimah, S,Kep, Ns, M.Kep

Rasmawati, S.Kep, Ns, M.Kep, sp. Kep. J

Ilhamsyah, S.Kep, Ns, M. Kep

Ardian Adhiwijaya, S.Kep, Ns, M.Kep

## Desain Grafis :

Ardian Adhiwijaya, S.Kep, Ns, M.Kep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi modul ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Modul Intervensi Keperawatan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil

Peyusun:

Hasnah, S.Kep, Ns, M.Kes

Reviewer:

Prof Dr. dr. H. Muh Syafar, MS

Ansariadi, SKM, M.Sc,PH., Ph.D

Prof Dr. A. Ummuh Salmah, SKM, M.Sc

Prof Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes, M.Sc, PH

Dr. Atik Triratnawati, M.A

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep, Ns, M.Kep

Dr. Lalu Muhammad saleh, SKM, M.Kes

Editor:

Rasdiana, S.Kep, Ns, M,Kep, Sp. Kep, Kom

Nurul Fadhillah Gani, S.Kep, Ns, M.Kep

Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kep

Nurul Khusnul Khotimah, S,Kep, Ns, M.Kep

Rasmawati, S.Kep, Ns, M.Kep, sp. Kep. J

Ilhamsyah, S.Kep, Ns, M. Kep

Ardian Adhiwijaya, S.Kep, Ns, M.Kep

Desain Grafis:

Ardian Adhiwijaya, S.Kep, Ns, M.Kep

Cetakan I: 2020

iii + 55 hlm.; 21 x 29 cm

ISBN: 978-602-328-263-0

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63 Romangpolong,

Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan modul “Intervensi Keperawatan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil”, dapat terselesaikan. Modul ini diperuntukkan bagi perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan terkait intervensi keperawatan untuk ibu hamil dalam mencegah preeklampsia. Dalam pemberian pendidikan kesehatan terkait masalah pencegahan preeklampsia pada ibu hamil, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, pendidik dan konselor. Intervensi keperawatan dalam mencegah masalah preeklampsia pada ibu hamil sangat penting diberikan mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah tersebut dialami oleh ibu hamil terutama di trisemester 3 kehamilan dan juga menjadi ancaman terbesar penyebab kematian ibu saat melahirkan. Oleh karena itu, modul ini berisi informasi-informasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencegahan masalah preeklampsia pada ibu hamil serta berkontribusi dalam mencegah kematian ibu saat melahirkan.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi perawat dalam membantu menjalankan tugas dalam memberikan asuhan keperawatan, memberikan penguatan keyakinan dan mendorong ibu hamil untuk melakukan pola hidup sehat selamakehamilan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Depok, Juni 2020

Penyusun



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1-3
MATERI – 1 KONSEP PRE-EKLAMPSIA	4-8
MATERI – 2 MANAJEMEN STRES	9-18
MATERI – 3 LATIHAN FISIK SELAMA KEHAMILAN	19-30
MATERI – 4 NUTRISI PADA IBU PRE EKLAMPSIA	31-38
MATERI – 5 FORMAT ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL	39-54
DAFTAR PUSTAKA	55



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

**K**esehatan ibu hamil merupakan perhatian dunia. Kesehatan ibu hamil melalui kontrol Angka kematian Ibu menjadi target utama dalam SDG's 2030. Faktanya, hingga saat ini AKI masih relatif tinggi. Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa setiap hari di dunia sebanyak 830 ibu meninggal akibat kehamilan dan persalinan. 99% kematian ibu berasal dari negara berkembang (WHO, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara dengan AKI yang cukup tinggi, khususnya dalam kawasan ASIA tenggara, dengan angka 190 per 100.000 kelahiran hidup kelahiran hidup. Meskipun Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum mencapai target SDG's 2015-2030 yaitu kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah dengan proporsi perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan, sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK terutama preeklampsia-eklampsia. Begitu juga di Sulawesi Selatan, sejak tahun 2013, AKI meningkat menjadi 16,27/100.000 kelahiran, dan kabupaten Gowa merupakan 3 besar daerah dengan AKI tertinggi. Kenaikan ini tentu menjadi pertanyaan besar, karena dalam 5 tahun terakhir telah banyak program yang diluncurkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menurunkan AKI, namun penurunan AKI tetap belum mencapai target.

Selama ini, telah banyak protap yang berisi penatalaksanaan kasus preeklampsia. Intervensi tersebut disusun oleh lembaga nasional baik itu Kemenkes maupun POGI (POGI, 2016). Tetapi, jika dikaji, penatalaksanaan tersebut berfokus pada kasus yang telah terjadi dan penatalaksanaan medis. Sementara masih ada pengembangan penatalaksanaan yang berorientasi preventif, sehingga lebih efektif dalam menurunkan AKI akibat preeklampsia. Intervensi keperawatan yang termuat dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), berisi beberapa pilihan intervensi yang dapat menjadi tindakan preventif kasus preeklampsia.

Untuk mencapai tindakan tersebut diperlukan adanya upaya promosi kesehatan berupa pembuatan panduan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan oleh perawat dalam merawat Ibu hamil untuk mencegah risiko preeklampsia. Perawat merupakan salah satu petugas kesehatan yang berperan tidak hanya sebagai pemberi asuhan akan tetapi dapat berperan sebagai pendidik yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang intervensi keperawatan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam mencegah preeklampsia. Informasi dalam panduan ini berisi materi terkait konsep preeklampsia, manajemen stres, latihan fisik selama kehamilan dan nutrisi untuk ibu hamil serta pedoman dokumentasi dalam membuat asuhan keperawatan pada ibu hamil.

## 1.2 Tujuan

### 1.2.1 Tujuan Umum

Modul ini sebagai panduan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan berupa intervensi pendidikan kesehatan terkait manajemen diri hipertensi untuk meningkatkan efikasi diri dan motivasi pada klien dengan hipertensi.

### 1.2.2 Tujuan Khusus

Modul ini digunakan sebagai panduan bagi perawat dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil agar mampu:

1.2.2.1 Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil dalam melakukan pencegahan terkait masalah preeklampsia.

1.2.2.2 Meningkatkan sikap dan keterampilan ibu hamil dalam menerapkan materi-materi yang diajarkan sehingga mampu mencegah timbulnya preeklampsia:

- 1) Mampu mengelola stres selama kehamilan
- 2) Mampu melakukan latihan fisik selama kehamilan
- 3) Mampu mengelola nutrisi yang baik selama kehamilan

## 1.3 Materi Modul

Modul pendidikan kesehatan ini membahas tentang materi yang dapat perawat berikan kepada Ibu hamil selama masa kehamilan untuk mencegah masalah preeklamsi. Modul perawat ini memuat beberapa materi yaitu konsep preeklampsia, manajemen stres yang dapat diajarkan kepada ibu hamil dalam mengelola stresnya selama kehamilan dan mempersiapkan persalinan, materi terkait latihan fisik sebagai materi yang dapat perawat berikan atau ajarkan kepada ibu hamil untuk

meningkatkan kemampuan atau kondisi fisiknya selama masa kehamilan dan mempersiapkan persalinan, materi terkait nutrisi selama kehamilan yang dapat diajarkan kepada ibu hamil untuk mempertahankan keseimbangan nutrisi yang dikonsumsi selama masa kehamilan.

#### 1.4 Penggunaan Modul

Modul ini sebagai panduan perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil untuk mencegah pre-eklampsia.

#### 1.5 Metode Pengajaran

Metode pendidikan kesehatan yang digunakan dalam bentuk ceramah, review materi, diskusi, dan demonstrasi.

#### 1.6 Media Pengajaran

Media dalam pendidikan kesehatan ini menggunakan modul dan LCD.

#### 1.7 Waktu dan Tempat

Setiap pertemuan pada pendidikan kesehatan akan dilakukan selama 60 menit dan tempat disesuaikan dengan kondisi perawat dan ibu hamil.



**MATERI – 1**  
**KONSEP PRE-EKLAMPSIA**  
**SATUAN ACARA PENYULUHAN**

Materi 1 : Konsep Pre Eklampsia  
Sasaran : Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia  
Tempat : Disesuaikan  
Hari/Tanggal : Disesuaikan  
Waktu : 1 x 60 menit

---

**A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM**

Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang pre eklampsia, ibu hamil dapat mengetahui tentang pre eklampsia dan upaya untuk mencegah terjadinya pre eklampsia,

**B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS**

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, klien dengan hipertensi mampu :

1. Menjelaskan pengertian pre eklampsia
2. Menjelaskan tanda dan gejala pre eklampsia
3. Menjelaskan penyebab terjadinya pre eklampsia
4. Menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia
5. Menjelaskan tentang penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi (intervensi keperawatan)

**C. SASARAN**

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia

**D. MATERI**

1. Pengetian pre eklampsia
2. Tanda dan gejala pre eklampsia
3. Penyebab terjadinya pre eklampsia
4. Faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia

## 5. Penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi (intervensi keperawatan)


### E. METODE

- Ceramah
- Tanya jawab
- Demonstrasi

### F. MEDIA

Modul, lembar balik/LCD

### G. SETTING TEMPAT



### H. KRITERIA EVALUASI

#### a. Struktur

- Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan
- Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan
- Media siap digunakan

#### b. Proses

- Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi.
- Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.
- Klien dapat melakukan latihan/demonstrasi berbagai teknik manajemen stres

#### c. Hasil

- Klien mampu menjelaskan pengertian pre eklampsia
- Klien mampu menjelaskan tanda dan gejala pre eklampsia
- Klien mampu menjelaskan penyebab terjadinya pre eklampsia
- Klien mampu menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia
- Klien mampu menjelaskan tentang penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi (intervensi keperawatan)

## I. KEGIATAN PENYULUHAN

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
1	5 menit	<p>Pembukaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan diri</li> <li>• Menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan</li> <li>• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan yang akan disampaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjawab salam dan mendengarkan</li> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan terkait materi yang disampaikan</li> </ul>
2	50 Menit	<p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan pengertian pre eklampsia</li> <li>• Menjelaskan tanda dan gejala pre eklampsia</li> <li>• Menjelaskan penyebab terjadinya pre eklampsia</li> <li>• Menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia</li> <li>• Menjelaskan tentang penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi (intervensi keperawatan) Menjelaskan pengertian manajemen stres</li> <li>• Menanyakan pada klien tentang materi yang diberikan dan memberi inforcement positif kepada klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan</li> <li>• Mengajukan pertanyaan</li> <li>• Demonstrasi</li> <li>• Menuliskan tindak lanjut</li> <li>• Menjawab dan menjelaskan pertanyaan</li> </ul>
3	5 menit	<p>Terminasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan yang dilakukan</li> <li>• Mengucapkan terima kasih kepada klien yang telah mengikuti kegiatan.</li> <li>• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, dan tempat pertemuan disesi selanjutnya</li> <li>• Mengucapkan salam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan membalas salam</li> </ul>

## MATERI -1: PENDIDIKAN KESEHATAN

### KONSEP PRE-EKLAMPSIA

- Apa pre eklampsia itu?

Pre eklampsia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria terjadi pada usia kehamilan diatas 20 minggu, jika tidak ditangani akan berlanjut menjadi eklampsia. Pengertian lain dari pre eklampsia adalah sindrom khusus kehamilan yang mempengaruhi banyak sistem organ yang ditandai dengan peningkatan tekanan sistolik diatas 160 mmHg dan/atau tekanan diastolik lebih besar 110 mmHg.

- Bagaimana mengetahui terjadinya pre eklampsia?

Pre eklampsia terjadi dengan adanya tanda dan gejala yang ditimbulkan. Adapun tanda dan gejala dari pre eklampsia adalah sakit kepala; masalah dengan penglihatan, seperti penglihatan kabur; nyeri hebat tepat dibawah tulang rusuk; muntah; pembengkakan wajah, tangan atau kaki yang mendadak.

- Apa yang menyebabkan pre eklampsia terjadi?

Penyebab pre eklampsia belum diketahui secara pasti, namun diduga karena gangguan multisistem. Penyebab tersebut unik untuk kehamilan manusia. Pre eklampsia ditandai dengan respons vaskular abnormal plasentasi yang dikaitkan dengan peningkatan sistemik resistensi vaskular, peningkatan agregasi trombosit, aktivasi sistem koagulasi, dan endothelial disfungsi. Temuan klinis pre eklampsia dapat bermanifestasi sebagai sindrom maternal (hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa lainnya kelainan multisistem) atau sindrom janin (keterlambatan pertumbuhan janin, berkurangnya cairan ketuban, dan menurunnya saturasi oksigen).

- Apa saja faktor risiko dari pre eklampsia dan klasifikasinya?

Faktor resiko pre eklampsia diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu:

a. Sedang:

- Usia kehamilan pertama  $\geq$  40 tahun
- Interval kehamilan  $>$  10 tahun
- BMI  $\geq$  35 kg / m<sup>2</sup> pada kunjungan pertama
- Riwayat keluarga pre eklampsia
- Penyakit hipertensi berulang pada beberapa kehamilan

b. Tinggi

- Penyakit hipertensi selama kehamilan
  - Penyakit ginjal kronis
  - Penyakit autoimun seperti lupus sistemik erythematosus atau antiphospholipid syndrome Tipe 1 atau diabetes tipe 2
  - Hipertensi kronis
- Bagaimana penatalaksanaan atau cara mengendalikan pre eklampsia secara non farmakologi?

Masalah pre eklampsia dapat ditangani atau dikendalikan melalui terapi farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi diberikan melalui terapi obat-obatan sedangkan terapi non farmakologi dapat ditangani, salah satunya melalui intervensi keperawatan yang terdiri dari manajemen nutrisi pada ibu hamil; manajemen stres yaitu dengan menerapkan teknik-teknik mengelola stres seperti napas dalam, hipnosis 5 jari, guide imagery, terapi dzikir; menerapkan latihan fisik pada ibu hamil salah satunya melalui latihan yoga. Pemberian intervensi-intervensi tersebut diberikan melalui proses asuhan keperawatan.

# MATERI – 2

## MANAJEMEN STRES

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Materi 2 : Manajemen Stres  
Sasaran : Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia  
Tempat : Disesuaikan  
Hari/Tanggal : Disesuaikan  
Waktu : 1 x 60 menit

---

#### A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah pemberian pendidikan kesehatan terkait manajemen stres, ibu hamil dengan risiko preeklamsia dapat mengetahui pengertian manajemen stres, tujuan manajemen stres serta teknik manajemen stres.

#### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, Ibu hamil mampu :

1. Menjelaskan pengertian manajemen stres
2. Menjelaskan tujuan manajemen stres
3. Menjelaskan teknik manajemen stres
4. Demonstrasi teknik-teknik manajemen stres
  - a. Latihan napas dalam
  - b. Guide Imagery
  - c. Terapi Dzikir
  - d. Hipnosis 5 jari

#### C. SASARAN

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia

#### D. MATERI

1. Pengertian manajemen stres
2. Tujuan manajemen stres
3. Teknik manajemen stres

#### 4. Demonstrasi teknik-teknik manajemen stres

- a. Latihan napas dalam
- b. Guide Imagery
- c. Terapi Dzikir
- d. Hipnosis 5 Jari


#### E. METODE

- Ceramah
- Tanya jawab
- Demonstrasi



#### F. MEDIA

Modul, lembar balik/LCD

#### G. SETTING TEMPAT



Keterangan:

-  : Perawat  
 : Ibu hamil dengan risiko preeklampsia

#### H. KRITERIA EVALUASI

##### a. Struktur

- Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan
- Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan
- Media siap digunakan

##### b. Proses

- Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi.
- Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.
- Klien dapat melakukan latihan/demonstrasi berbagai teknik manajemen stres

##### c. Hasil

- Klien mampu menjelaskan kembali pengertian manajemen stres
- Klien mampu menjelaskan tujuan manajemen stres
- Klien mampu menjelaskan teknik manajemen stres
- Klien mampu mendemonstrasikan salah satu teknik manajemen stres

- a. Latihan napas dalam

- b. Yoga
- c. Guide Imagery
- d. Terapi Dzikir
- e. Hipnosis 5 Jari

#### I. KEGIATAN PENYULUHAN

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
1	5 menit	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan diri</li> <li>• Menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan</li> <li>• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan yang akan disampaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjawab salam dan mendengarkan</li> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan terkait materi yang disampaikan</li> </ul>
2	50 Menit	Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan pengertian manajemen stres</li> <li>• Menjelaskan tujuan manajemen stres</li> <li>• Menjelaskan teknik manajemen stres</li> <li>• Demonstrasi teknik-teknik manajemen stres               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latihan napas dalam</li> <li>b. Mild Yoga</li> <li>c. Guide Imagery</li> <li>d. Terapi Dzikir</li> <li>e. Hipnosis 5 Jari</li> </ul> </li> <li>• Menanyakan pada klien tentang materi yang diberikan dan memberi inforcement positif kepada klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan</li> <li>• Mengajukan pertanyaan</li> <li>• Demonstrasi</li> <li>• Menuliskan tindak lanjut</li> <li>• Menjawab dan menjelaskan pertanyaan</li> </ul>
3	5 menit	Terminasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan yang dilakukan</li> <li>• Mengucapkan terima kasih kepada klien yang telah mengikuti kegiatan.</li> <li>• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, dan tempat pertemuan disesi selanjutnya</li> <li>• Mengucapkan salam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan membalas salam</li> </ul>



## MATERI - 2 : PENDIDIKAN KESEHATAN

### MANAJEMEN STRES

- Apa manajemen stres itu?

Stres merupakan reaksi adaptif seseorang terhadap tantangan atau ancaman yang dihadapi. Pada umumnya, seseorang yang mengalami stres akan merasakan perasaan cemas, depresi, tertekan, takut, letih bahkan marah. Stres dapat menimbulkan perubahan aliran darah dan stres yang terus menerus pada ibu hamil dapat menimbulkan risiko preeklamsi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam mengelola stres atau disebut manajemen stres sehingga dapat mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkan. Pengelolaan stres atau manajemen stres dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

- Apa tujuan dilakukannya manajemen stres?

Mengurangi tingkat stres dan menurunkan tekanan darah terutama pada ibu hamil.

- Seperti apa teknik yang dilakukan untuk menangani stres pada ibu hamil?

Strategi yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam mengelola stres diantaranya dengan menerapkan latihan berikut:

1. Relaksasi napas dalam

• Apa relaksasi napas dalam itu?

Relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk relaksasi dengan melakukan tarikan dan hembusan napas. Bernapas dengan lambat (menahan tarikan napas secara maksimal) dan dilanjutkan dengan mengeluarkan atau menghembuskan napas melalui mulut secara perlahan. Teknik relaksasi ini adalah latihan pernafasan sederhana yang memiliki manfaat terapi berupa menstabilkan tekanan darah, mengendalikan hormon stres serta mengatur detak jantung.

• Apa tujuan dari relaksasi napas dalam?

Latihan napas dalam dapat meningkatkan kemampuan paru untuk menghirup udara, memperbaiki kondisi oksigenasi dalam darah, dapat meningkatkan saturasi oksigen, membuat keadaan rileks sehingga dapat mengontrol peningkatan hormon stres.

• Apa indikasi dilakukan relaksasi napas dalam?

Relaksasi napas dalam dapat dilakukan pada individu yang mengalami stres fisik maupun emosional, nyeri, ansietas, depresi salah satunya pada ibu hamil.

Bagaimana prinsip-prinsip relaksasi napas dalam?

Relaksasi nafas dalam pada prinsipnya merupakan salah satu intervensi keperawatan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan. Perawat mengedukasi klien tentang bagaimana cara melakukan latihan napas dalam, mulai dari menarik napas dengan lambat, menahan inspirasi secara maksimal dan bagaimana menghembuskan napas secara perlahan. Ketenangan yang ditimbulkan dari napas dalam berasal dari zat yang disebut oksida nitrat alami. Zat oksida nitrat alami saat dilakukan napas dalam akan memasuki paru-paru bahkan pusat otak, sehingga tekanan darah yang dalam keadaan tinggi bisa menurun. Selain itu, ketika menarik nafas dengan panjang dan dalam, tubuh akan mengirimkan sinyal untuk memperlambat reaksi di otak, sehingga ada perubahan hormonal dan faktor-faktor fisiologis lain. Melalui cara tersebut sehingga denyut jantung lambat serta menurunkan tekanan darah yang tinggi dan tingkat stres. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan napas dalam yaitu:

- a. Lingkungan yang tenang
- b. Kondisi rileks
- c. Konsentrasi sambil memejamkan mata

Bagaimana tahapan melakukan relaksasi napas dalam?

- a. Persiapan

Persiapan lingkungan berupa lingkungan yang tenang dengan posisi yang nyaman.

- b. Pelaksanaan

- 1) Duduk dikursi atau berbaring yang membuat nyaman. Jika duduk jaga punggung agar tetap lurus. Jika berbaring, taruh bantal di bawah lutut agar posisi tetap bengkok dalam saat relaksasi.
- 2) Tangan diletakkan dipaha dengan telapak tangan menghadap ke atas atau bawah.
- 3) Menutup mata untuk mencegah pikiran terganggu oleh benda luar
- 4) Menarik napas dalam-dalam melalui hidung sampai hitungan keempat, keluarkan lewat mulut sambil mengencangkan otot perut, ulangi selama satu menit. Tutup mulut dan rilekskan otot-otot wajah.
- 5) Selanjutnya menarik napas dengan irama normal 3 kali
- 6) Tarik napas kembali melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan.
- 7) Ulangi selama 15 menit, dengan selingan istirahat setiap 5 kali pernapasan.

- c. Evaluasi

Lakukan evaluasi setelah proses selesai dilakukan

- 1) Observasi tanda/gejala stres
- 2) Bernapas dalam dikatakan berhasil apabila mengalami penurunan pada tanda/gejala (tekanan darah dan tingkat stres).

## 2. Guide Imagery (Imajinasi terbimbing)

Apa yang dimaksud dengan Guide Imagery (Imajinasi terbimbing)?

Guide imagery adalah cara yang dilakukan untuk mengkaji kekuatan pikiran seseorang untuk menimbulkan perasaan tenang dan keheningan saat seseorang dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Selain itu, guide imagery juga merupakan suatu teknik relaksasi yang menggunakan kekuatan pikiran melalui komunikasi dalam tubuh yang melibatkan indra penciuman, penglihatan, pendengaran dan sentuhan untuk membantu kesembuhan dan meningkatkan kualitas kesehatan.

Apa tujuan dari Guide Imagery (Imajinasi terbimbing) ?

Tujuan dilakukannya manajemen marah adalah:

- a. Mengurangi stres
- b. Meningkatkan perasaan tenang dan damai
- c. Mengurangi nyeri
- d. Menurunkan tekanan darah
- e. Meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup

Bagaimana prinsip dilakukannya Guide Imagery (Imajinasi terbimbing)?

- a. Fokuskan pikiran
- b. Berpakaian yang longgar dan nyaman
- c. Situasi rileks, penuh konsentrasi dan lingkungan nyaman.

Bagaimana Guide Imagery (Imajinasi terbimbing) dilakukan?

a. Persiapan:

- 1) Posisi yang nyaman
- 2) Lingkungan yang tenang
- 3) Siapkan musik relaksasi

b. Pelaksanaan:

- 1) Anjurkan klien mengenakan pakaian yang longgar.
- 2) Tidur atau duduk dengan posisi yang nyaman.
- 3) Anjurkan klien untuk menutup mata dengan lembut.
- 4) Minta klien menarik napas dalam dan perlahan untuk menimbulkan relaksasi.
- 5) Minta klien untuk menggunakan seluruh pancaindranya dalam menjelaskan bayangan dan lingkungan bayangan tersebut.
- 6) Mulailah membayangkan tempat yang menyenangkan dan dapat dinikmati.

7) Minta klien untuk menjelaskan perasaan fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh bayangannya, dan bantu klien untuk mengeksplorasi respons terhadap bayangannya.

8) Ulangi 10 sampai 15 menit sampai klien tertidur.

9) Ciptakan lingkungan yang sunyi dan bebas dari gangguan.

c. Evaluasi

1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu

2) Lakukan pengukuran tekanan darah

3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan

### 3. Terapi Dzikir

Apa yang dimaksud dengan Terapi Dzikir?

Terapi dzikir adalah salah satu terapi relaksasi yang berasal dari kata *adz-dzikir* yang artinya ingat. Dzikir berarti mengingat Allah, menyebut nama Allah, baik dengan cara menyebut lafal-lafal dzikir melalui tahlil, tasbih, tahmid, taqdis, asmaul husna maupun membaca doa-doa yang mat'sur dari Rasulullah, takut dan berharap hanya pada Allah, merasa yakin bahwa manusia berada dibawah kehendak Allah dalam segala urusannya. Dzikir menjadi terapi relaksasi karena pelafalan kata-kata atau lafaz Allah yang berulang-ulang yang diyakini memiliki efek menurunkan kecemasan atau mencegah timbulnya stres seperti yang dialami oleh Ibu hamil. Dzikir dapat membentuk persepsi yang positif pada individu sehingga meningkatkan keyakinan bahwa stresor atau masalah apapun dapat dihadapi karena bantuan dari Allah.

Apa tujuan dan manfaat terapi dzikir?

Tujuan dan manfaat dilakukannya terapi dzikir adalah:

1) Menurunkan kecemasan dan kegelisahan

2) Mencegah stress

3) Menentramkan dan mendamaikan hati

4) Menambah keyakinan kepada Allah

5) Mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan masalah

6) Menghilangkan rasa takut

7) Mendapatkan kenikmatan dan keselamatan lahir batin

Bagaimana prinsip dilakukannya terapi dzikir?

1) Fokuskan pikiran

2) Dilakukan dengan latihan napas dalam atau relaksasi lainnya seperti hipnosis 5 jari.

3) Rileks, penuh konsentrasi dan lingkungan nyaman.

4) Mengukur tekanan darah sebelum terapi dzikir dilakukan.

Bagaimana terapi dzikir dilakukan?

Terapi dzikir dilakukan dalam keadaan meditatif dengan disertai latihan pernapasan atau latihan hipnosis 5 jari. Keadaan meditatif dapat memunculkan gelombang alpha pada otak sehingga seseorang akan merasa lebih tenang. Selanjutnya, mengucapkan kalimat-kalimat dzikir dan pengucapan kalimat autosugesti lainnya yang akan menstimulus aktivitas hipotalamus sehingga menghambat kerja kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin dan nonadrenalin serta menghambat kerja dari hormon tiroksin yang menyebabkan seseorang mudah lelah, cemas, tegang dan susah tidur. Selain itu, melakukan terapi dzikir dalam keadaan meditatif dapat mempengaruhi dan menstimulasi susunan syaraf otonom dengan menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktifitas saraf parasimpatis sehingga dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, ketegangan otot-otot, menurunkan kadar glukosa dalam darah, sehingga dapat membuat seseorang rileks.

Bacaan dzikir yang dilafazkan yaitu kalimat "*Lailahailallah*" yang berarti tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah SWT, yang menunjukkan bahwa keyakinan bertuhan hanya kepada Allah SWT. Keyakinan akan Allah SWT menimbulkan kontrol yang kuat di dalam diri terhadap segala sesuatu yang kurang menyenangkan untuk lebih positif serta yakin bahwa hal-hal tersebut sudah diatur oleh Allah SWT. Kontrol tersebut diharapkan mampu meningkatkan kerja saraf parasimpatis sehingga dapat menurunkan kecemasan, ketegangan dan menurunkan tekanan darah.

Bacaan atau lafaz dzikir Allahu Akba yang berarti Allah Maha besar yang dapat menunjukkan sikap optimis. Sikap optimis menjadi sumber energi baru, semangat baru, menghilangkan rasa putus asa dalam menghadapi masalah yang mengganggu jiwanya seperti rasa cemas, ketegangan, rasa sakit atau gangguan psikologis lainnya. Bacaan atau lafaz lain dalam dzikir yang dapat diterapkan sebagai terapi relaksasi adalah "*Astagfirullahjaladzim*", "*Subhanallah*", dan "*Alhamdulillah*".

Evaluasi terapi dzikir?

- 1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu
- 2) Lakukan pengukuran tekanan darah
- 3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan

#### 4. Hipnosis 5 Jari

Hipnosis 5 jari sebagai salah satu jenis terapi hipnosis?

Hipnosis 5 jari merupakan salah satu jenis terapi self hipnosis untuk memfokuskan pikiran dengan membawanya ke gelombang alpha/theta yang akan mengakibatkan kondisi relaksasi pada klien. Hipnosis 5 jari juga dapat diartikan sebagai salah satu




proses untuk mengaktifkan kekuatan pikiran yang rileks melalui komunikasi batin yang melibatkan indra seperti penciuman, penglihatan, pendengaran serta dapat dilakukan kurang lebih selama 10 menit.

Apa tujuan dan manfaat hipnosis 5 jari?

Adapun tujuan dan manfaat hipnosis 5 jari yaitu menciptakan kondisi yang rileks untuk saraf otonom sehingga mampu menyuplai darah di otot, mengaktifkan saraf parasimpatis sehingga mampu merilekskan kondisi tubuh, mengatur dan mengendalikan hormon-hormon yang dapat menimbulkan stres dan kecemasan, menurunkan tekanan darah sehingga dapat menimbulkan kondisi nyaman di dalam diri.

Bagaimana prinsip dilakukannya hipnosis 5 jari?

Pada umumnya prinsip kerja hipnosis 5 jari sama halnya dengan terapi hipnosis pada umumnya yaitu dengan melibatkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar (conscious mind) merupakan pikiran yang dapat dikendalikan atau disadari (proses mental) yang memiliki fungsi untuk menyaring informasi yang diterima oleh otak, membandingkan dengan informasi yang telah ada di dalam memori seseorang, menganalisis serta memutuskan informasi baru yang akan disimpan, dibuang atau diabaikan sementara. Selain itu, terdapat pikiran bawah sadar (subconscious) yang merupakan proses pikiran atau mental yang berlangsung secara otomatis atau tidak disadari. Fungsi-fungsi organ tubuh seseorang cara kerjanya di atur oleh pikiran bawah sadar. Adapun proses kerja dari terapi hipnosis yaitu:



Bagaimana hipnosis 5 jari dilakukan?

Hipnosis 5 jari dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Ujung ibu jari dan ujung telunjuk disatukan dengan disertai tarikan napas dalam serta mengingat nikmat kesehatan yang telah Allah berikan atau mengingat dan mengucapkan lafaz Allah dalam hati seperti "Subhanallah".
- 2) Selanjutnya pindahkan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari tengah, yang disertai tarikan napas dalam sambil mengingat hal-hal yang menyenangkan yang telah dilalui dengan pasangan, orang tua, anak-anak dan orang-orang terdekat lainnya atau mengingat dan mengucapkan lafaz Allah dalam hati seperti "Alhamdulillah".

- 3) Selanjutnya pindahkan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari manis, yang disertai dengan tarikan napas dalam sambil mengingat kembali penghargaan, usaha keras serta pertolongan Allah disetiap aktivitas yang telah Ibu lakukan atau mengucapkan lafaz Allah "*Allahu Akbar*".
- 4) Selanjutnya memindahkan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari kelingking, yang disertai dengan tarikan napas dalam sambil mengingat tempat terindah yang pernah Ibu kunjungi bersama keluarga atau hal-hal yang akan ibu ubah ke arah yang lebih positif atau sambil mengucapkan "*Astagfirullahjaladzim*".

Evaluasi terapi hipnosis 5 jari?

- 1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu
- 2) Lakukan pengukuran tekanan darah
- 3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan

# MATERI - 3

## LATIHAN FISIK SELAMA KEHAMILAN

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Materi 3 : Latihan Fisik Selama Kehamilan

Sasaran : Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia

Tempat : Disesuaikan

Hari/Tanggal : Disesuaikan

Waktu : 1 x 60 menit

---

#### A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah pemberian pendidikan kesehatan terkait latihan fisik, ibu hamil dengan risiko preeklamsia dapat mengetahui pengertian latihan fisik, tujuan dan manfaat latihan fisik selama hamil, jenis-jenis latihan fisik yang dapat dipraktikkan di rumah dan dapat mendemostrasikan latihan fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya.

#### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, klien dengan ibu hamil mampu :

1. Menjelaskan pengertian latihan fisik
2. Menjelaskan manfaat latihan fisik selama hamil
3. Prinsip pelaksanaan latihan fisik untuk ibu hamil
4. Menjelaskan jenis-jenis latihan fisik yang dapat dipraktikkan di rumah
  - a. Latihan fisik berupa pemanasan, latihan inti dan pendinginan
  - b. Latihan yoga selama kehamilan

#### C. SASARAN

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia

#### D. MATERI

1. Pengertian latihan fisik
2. Manfaat latihan fisik



3. Prinsip pelaksanaan latihan fisik
4. Jenis latihan fisik untuk ibu hamil
  - a. Latihan fisik (pemanasan, latihan inti dan pendinginan)
  - b. Yoga selama kehamilan


#### E. METODE

- Ceramah
- Tanya jawab
- Demonstrasi

#### F. MEDIA

Modul, lembar balik/LCD

#### G. SETTING TEMPAT



#### H. KRITERIA EVALUASI

##### a. Struktur

- Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan
- Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan
- Media siap digunakan

##### b. Proses

- Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi.
- Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.
- Klien dapat melakukan latihan/demonstrasi latihan fisik untuk ibu hamil

##### c. Hasil

- Klien mampu menjelaskan kembali pengertian latihan fisik
- Klien mampu menjelaskan manfaat latihan fisik
- Klien mampu menjelaskan prinsip pelaksanaan latihan fisik
- Klien mampu mendemonstrasikan salah satu latihan fisik

## I. KEGIATAN PENYULUHAN

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
1	5 menit	<p>Pembukaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan diri</li> <li>• Menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan</li> <li>• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan yang akan disampaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjawab salam dan mendengarkan</li> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan terkait materi yang disampaikan</li> </ul>
2	50 Menit	<p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan pengertian latihan fisik</li> <li>• Menjelaskan manfaat latihan fisik</li> <li>• Menjelaskan prinsip latihan fisik</li> <li>• Demonstrasi latihan fisik selama kehamilan sesuai usia kehamilan</li> <li>• Menanyakan pada klien tentang materi yang diberikan dan memberi inforcement positif kepada klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan memperhatikan</li> <li>• Mengajukan pertanyaan</li> <li>• Demonstrasi</li> <li>• Menuliskan tindak lanjut</li> <li>• Menjawab dan menjelaskan pertanyaan</li> </ul>
3	5 menit	<p>Terminasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan yang dilakukan</li> <li>• Mengucapkan terima kasih kepada klien yang telah mengikuti kegiatan.</li> <li>• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, dan tempat pertemuan disesi selanjutnya</li> <li>• Mengucapkan salam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendengarkan dan membalas salam</li> </ul>

## MATERI – 3: PENDIDIKAN KESEHATAN

### LATIHAN FISIK UNTUK IBU HAMIL

- Pengertian Latihan Fisik

Latihan fisik merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang dalam pelaksanaannya melibatkan gerakan tubuh yang berulang. Latihan fisik dilakukan dengan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan latihan dilakukan.

- Manfaat Latihan fisik Untuk Ibu Hamil

Latihan fisik pada ibu hamil memiliki manfaat antara lain:

- a. Mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti hipertensi dan diabetes selama kehamilan
- b. Meningkatkan kemampuan fisik yang cenderung menurun selama proses kehamilan
- c. Meningkatkan kekuatan otot dari tubuh ibu hamil sehingga mampu menopang beban kehamilan yang semakin bertambah disetiap bulannya dan memudahkan proses persalinan
- d. Meminimalkan timbulnya nyeri pada pinggang.
- e. Meningkatkan aktifitas pencernaan sehingga dapat mengurangi konstipasi

- Prinsip Pelaksanaan Latihan Fisik Untuk Ibu Hamil

Pelaksanaan latihan fisik selama kehamilan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan pada saat latihan fisik selama kehamilan maka latihan fisik dilakukan dengan baik, benar, terukur dan teratur.
- b. Menerapkan tahapan latihan fisik yaitu dimulai dari pemanasan, latihan inti dan diakhiri dengan pendinginan.
- c. Latihan fisik selama hamil dilakukan dengan frekuensi latihan 3-5 kali seminggu dan tidak dilakukan dalam waktu yang lama.
- d. Latihan fisik yang dilakukan merupakan jenis latihan ringan sampai sedang dan tidak melakukan latihan yang terlalu berat karena berdampak pada kesehatan janin.
- e. Denyut nadi ibu hamil selama latihan fisik berkisar antara 100 – 104 kali/menit.
- f. Latihan fisik dilakukan secara bertahap dan dibawah pengawasan tenaga yang terlatih

Selain prinsip diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menginstruksikan Ibu hamil untuk melakukan latihan fisik, yaitu:

- a. Lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum latihan fisik dilakukan untuk mengetahui adanya kontraindikasi.
  - b. Berikan informasi kepada ibu hamil terkait program latihan fisik yang dianjurkan dan jika perlu mintalah persetujuan (informed consent).
  - c. Berikan informasi kepada ibu hamil untuk teratur melakukan pemeriksaan antenatal untuk mencegah adanya masalah pada kehamilan terutama selama program latihan fisik dilakukan.
  - d. Instruksikan kepada ibu hamil untuk menyediakan alas atau matras saat latihan fisik dilakukan, melakukan latihan fisik dengan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, dan latihan fisik dilakukan dengan menggunakan pakaian yang longgar.
  - e. Ingatkan ibu hamil agar melakukan latihan fisik dengan hati-hati dan melakukan perubahan posisi secara pelan atau tidak mendadak.
- Jenis Latihan Fisik Untuk Ibu Hamil
- Terdapat beberapa jenis program latihan fisik yang direkomendasikan untuk ibu hamil. Latihan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Berikut tahapan dan jenis latihan fisik pada ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan yaitu:

#### 1. Pemanasan (Warning-Up)

Pemanasan merupakan tahapan awal berupa gerakan untuk mempersiapkan tubuh untuk melakukan latihan fisik bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera selama latihan fisik terjadi. Gerakan pemanasan dilakukan selama 10-15 menit yang terdiri atas gerakan ringan, peregangan dan berjalan kaki.

Adapun gerakan pemanasan atau peregangan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan luas gerak disekitar persendiaan serta melibatkan tulang dan otot dan secara perlahan mendekati batas luas gerakan sendiri, kemudian ditahan 8-10 detik disertai dengan relaksasi.
- b. Gerakan dilakukan sampai munculnya rasa regangan tanpa munculnya rasa nyeri
- c. Gerkaan dengan melibatkan persendian dan otot-otot tubuh dibagian atas, bawah serta sisi tubuh bagian kiri dan kanan selama 5-10 menit.
- d. Gerakan dilakukan dengan relaksasi napas dalam.

#### 2. Latihan Inti

Latihan inti selama kehamilan disesuaikan dengan usia kehamilan atau trisemester kehamilan. Latihan inti ini terdiri atas latihan aerobik dan latihan kekuatan. Latihan aerobik Adapun jenis latihan fisik di setiap trisemester kehamilan adalah:

a. Trisemester 1

- 1) Latihan inti di usia kehamilan trisemester pertama bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi jantung-paru (stamina)
- 2) Latihan inti terdiri atas latihan yang bersifat aerobik yaitu jalan kaki dengan kecepatan 3 km/jam, berenang, bersepeda statis dan juga senam aerobik ringan selama 10-20 menit dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu (selang satu hari istirahat).
- 3) Selain itu, latihan inti dapat juga berupa latihan kegel yang dapat dilakukan bersamaan dengan latihan inti atau diluar dari latihan inti lainnya. Latihan kegel dapat dilakukan dengan frekuensi 5 kali seminggu.
- 4) Tidak dianjurkan untuk melakukan latihan olahraga dengan risiko cedera tinggi.

b. Trisemester 2

- 1) Latihan inti pada trisemester dua dilakukan selain untuk meningkatkan atau daya tahan atau kondisi jantung-paru, juga untuk meningkatkan kekuatan otot perut, dasar panggul dan tungkai.
- 2) Latihan inti yang dapat dilakukan berupa latihan yang sifatnya aerobik seperti jalan kaki, bersepeda statis dan berenang. Latihan inti ini dapat dilakukan selama 10-20 menit dengan frekuensi 3 kali seminggu (selang 1 hari istirahat).
- 3) Selain aerobik dapat, latihan inti yang dapat dilakukan di usia kehamilan ini adalah latihan kekuatan otot berupa senam hamil. Latihan ini dapat dilakukan selama 10-20 menit dengan frekuensi 2 kali seminggu.
- 4) Latihan kegel juga dapat dilakukan pada usia kehamilan trisemester 2 dengan frekuensi 5 kali seminggu.
- 5) Adapun latihan yang perlu dihindari selama yaitu latihan dengan posisi terlentang karena dapat mengakibatkan pasokan darah ke janin menurun akibat penurunan curah jantung ibu.

c. Trisemster 3

- 1) Meningkatkan kekuatan otot pernapasan, punggung dan dasar panggul merupakan tujuan dari dilakukannya latihan inti pada usia kehamilan trisemester 3.
- 2) Jenis latihan inti pada usia ini terdiri atas latihan bersifat aerobik yaitu berjalan kaki selama 10-20 menit dengan intensitas ringan selama 3 kali seminggu.
- 3) Latihan inti dengan menggunakan otot-otot dasar panggul dan pengaturan pernapasan seperti senam hamil dengan frekuensi 2 kali seminggu selama 10-20 menit.

- 4) Latihan kegel juga dapat dilakukan diusia kehamilan ini dengan frekuensi 5 kali seminggu
- 5) Latihan atau gerakan yang perlu dihindari diusia kehamilan ini yaitu berputar, berjinjit, jongkok, tungkai yang menyilang serta tungkai dan kaki dengan beban tambahan.

### 3. Pendinginan (cooling down)

Pada tahapan pendinginan dilakukan latihan setelah rangkaian kegiatan atau gerakan pada tahap pemanasan dan latihan inti. Pada latihan pendinginan dilakukan gerakan peregangan pada sendi dan otot dengan tingkat yang lebih ringan dibandingkan saat pemanasan dan disertai gerakan relaksasi seperti napas dalam.

Berdasarkan Canadian Guideline (2019), rekomendasi spesifik untuk aktivitas fisik pada ibu hamil terdiri atas:

1. Selama kehamilan, wanita tanpa kontraindikasi diharuskan aktif secara fisik. Adapun wanita yang secara spesifik perlu diperiksa adalah wanita yang tidak aktif melakukan aktivitas fisik sebelumnya, wanita dengan diagnosis diabetes melitus gestasional dan wanita dengan kategori kelebihan berat badan atau obesitas dengan IMT sebelum kehamilan  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ .
2. Wanita setidaknya melakukan aktivitas fisik ringan-sedang selama 150 menit (selama dilakukan 3 kali seminggu) untuk mencapai manfaat klinis dan menurunkan komplikasi kehamilan.
3. Latihan fisik yang dapat dilakukan oleh ibu selama kehamilan dapat berupa latihan aerobik dan latihan ketahanan untuk mencapai mafaat yang lebih besar.
4. Latihan otot dasar panggul atau kegel dapat dilakukan setiap hari untuk mengurangi risiko inkontinensia urine.
5. Wanita hamil yang mengalami nyeri kepala ringan, mual atau kurang enak badan saat melakukan latihan fisik diharapkan memodifikasi kembali posisi latihan mereka dan menyingkahi posisi terlentang.

- Pemantauan dan Evalausi

#### Pemantauan

Latihan fisik yang dilakukan selama kehamilan terus dilakukan pemantauan dengan melakukan perhitungan denyut nadi atau tes bicara (Ibu hamil tidak sampai merasakan terengah-engah akibat latihan yang dilakukan). Selain itu, latihan fisik dihentikan jika ditemukan kondisi seperti perdarahan pervaginam; muka, tangan dan pergelangan kaki mengalami pembengkakan; vagina mengeluarkan cairan; munculnya gejala kelelahan, sakit kepala, pusing dan pandangan gelap; mengalami palpitasi; kontraksi yang berlebihan

> 8 kali/jam; nyeri perut; berat badan menurun; munculnya tanda gawat janin; dan sesak napas. Oleh karena itu, latihan fisik diharapkan dilakukan sesuai rekomendasi petugas kesehatan (dokter).

#### Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan keaktifan dan partisipasi ibu hamil selama latihan dan manfaat latihan fisik selama kehamilan.

- **Yoga Selama Kehamilan**  
Apa itu yoga?

Yoga adalah suatu gerakan untuk mendapatkan gerakan harmonis dari aktivitas tubuh, pikiran dan jiwa. Salah satu latihan yoga yang diperuntukkan untuk ibu hamil adalah Posisi Pranayama. Yoga merupakan salah satu jenis yoga yang diperuntukkan untuk ibu hamil, wanita menstruasi dan menopause. Latihan yoga selama masa kehamilan dapat meningkatkan berat badan janin dan mengurangi kelahiran prematur serta komplikasi persalinan seperti preeklamsi.

#### Apa tujuan Yoga?

Tujuan dari yoga adalah:

1. Melancarkan peredaran darah
2. Mencegah hipertensi
3. Mencegah penyakit jantung
4. Mencegah diabetes
5. Mencegah osteoarthritis

#### Kontraindikasi dikukannya Yoga?

Gerakan yoga dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembengkakan pada tangan dan kaki
2. Tremor pada ekstermitas atas maupun bawah
3. Kram pada perut bagian bawah
4. Hamil dengan penyakit jantung dan kehamilan dengan gerakan janin yang lemah.

#### Bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan Yoga?

1. Yoga dapat dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 20 minggu ke atas, tanpa riwayat penyakit komplikasi selama kehamilan, tidak memiliki riwayat persalinan preterm, dan BBLR.
2. Dilakukan secara teratur. Yoga yang dilakukan secara teratur mampu membantu perenggangan, memperkuat otot, melenturkan persendian dan menguatkan tulang serta sebagai gerakan untuk stimulasi pengeluaran hormon secara teratur.

3. Berbaras dalam. Yoga dilakukan dengan napas dalam untuk meningkatkan kapasitas paru sehingga proses pernapasan menjadi optimal.
4. Makan seimbang. Yoga yang dilakukan secara teratur dengan disertai asupan nutrisi yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan secara holistik
5. Berpikir positif. Latihan yoga yang dilakukan dengan tenang dan pikiran yang positif dapat meningkatkan keseimbangan mental dan emosional, melancarkan aliran darah dan mengurangi stres sehingga memulihkan tubuh dari berbagai masalah kesehatan terutama disaat hamil.

Bagaimana gerakan Yoga?

Yoga dapat dilakukan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Persiapan

##### a. Persiapan alat

Pakaian nyaman dan longgar, tidak menggunakan alat kaki, menggunakan matras atau karpet.

##### b. Persiapan klien

Minum sesaat sebelum latihan yoga, makan 1-3 jam sebelum latihan, mengukur tekanan darah (sistolik <180 mmHg dan diastolik <120 mmHg), tidak ditemukan tanda-tanda syok (akral dingin, wajah pucat dan berkeringat), frekuensi irama jantung <100 x/menit.

##### c. Persiapan lingkungan

Yoga sebaiknya dilakukan di pagi hari, tempat tenang dan nyaman, udara segar, melakukan yoga secara rutin di waktu yang sama, dapat dilakukan dengan musik rileksasi.

#### 2. Pelaksanaan

##### a. Pemanasan

Pemanasan dilakukan sebelum melakukan yoga yang menggunakan melenturkan otot dan sendi sehingga gerakan yoga mudah dilakukan dan menghindari risiko cedera. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menengadahkan kepala ke atas dan ke bawah selama 8 kali
- 2) Menengok ke arah kanan dan kiri selama 8 kali
- 3) Memutar leher dari kiri ke kanan dan arah sebaliknya sebanyak 8 kali
- 4) Memutar bahu kiri dan kanan sebanyak 8 kali
- 5) Meregangkan pergelangan tangan, lutut dan jari-jari kaki.

##### b. **Gerakan *Prenatal Gentle Yoga***

- 1) Gerakan *prenatal gentle yoga* terdiri atas slide angle pose dan triangle pose yang dilakukan selama 5-10 kali napas. Gerakan ini memiliki beberapa manfaat



antara lain menguatkan kaki, lutut, pergelangan kaki, pangkal paha, tulang belakang dan pinggang serta menstimulus merangsang organ perut.



*Slide Angle Pose* (5-10 kali napas)



*Triangle Pose* (5 - 10 kali napas)

- 2) Gerakan berikutnya adalah *warior 1* dan *warior 2*. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5-10 kali napas. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah menguatkan otot bokong, pinggul, mendapatkan atau meningkatkan energi di dalam tubuh.



*Warior 1* (5 - 10 kali napas)



*Warior 2* (5 - 10 kali napas)

- 3) Gerakan selanjutnya adalah *Goddess Pose*. Gerakan ini juga dilakukan selama 5 - 10 kali napas. Manfaat gerakan ini adalah menguatkan bahu dan dada, mengurangi stres, meningkatkan aliran energi pada bagian fungsi organ reproduksi serta merenggangkan otot paha, dada dan pinggul.



*Goddess Pose (5 - 10 kali napas)*

- 4) Gerakan selanjutnya adalah *Half Squat*. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5 - 10 kali napas. Gerakan ini memiliki manfaat antara lain menguatkan tubuh bagian bawah, melebarkan pinggul dan panggul, keseimbangan dan stabilitas ibu hamil meningkat, meningkatkan ketenangan serta menenangkan pikiran.



*Half Squat (5-10 kali napas)*

- 5) Gerakan berikutnya adalah *Gate Pose*. Gerakan ini dilakukan dengan 5 -10 kali napas. Gerakan ini memberikan manfaat antara lain meregangkan tulang belakang, paha belakang, bahu dan merangsang organ perut. Selain itu, terdapat pula gerakan *tiger stretch*. Gerakan ini juga dilakukan selama 5 - 10 kali napas, dengan manfaat antara lain memberikan kekuatan pada kaki dan tulang punggung.



*Gate Pose*



*Tiger Stretch*

- 6) Gerakan terakhir adalah *butterfly pose*. Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 kali napas. Gerakan ini bermanfaat untuk membuka panggul dan memperkuat otot paha.



*Butterfly Pose (5-10 kali napas)*

#### Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah yoga pernapasan dilaksanakan:

1. Observasi tekanan darah dan nadi setelah melakukan gerakan yoga.
2. Latihan fisik pada ibu hamil dikatakan berhasil, jika tekanan darah stabil atau dalam batas normal, ibu merasa rileks.

# MATERI - 4

## NUTRISI PADA IBU PRE EKLAMPSIA

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Materi 4	: Nutrisi pada Ibu preeklampsia
Sasaran	: Ibu preeklampsia dan keluarganya
Tempat	: Rumah ibu hamil yang mengalami preeklampsia
Hari/Tanggal	: Menyesuaikan
Waktu	: 1 x 45 menit

---

#### A. Tujuan Instruksional Umum

Setelah pemberian edukasi kesehatan mengenai nutrisi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia, ibu hamil dan keluarga dapat mengetahui dan menjelaskan tentang pengertian dan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia.

#### B. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah penyuluhan diberikan, Ibu hamil dan keluarganya mengetahui tentang:

1. Pengertian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
2. Tujuan pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
3. Syarat pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
4. Makanan yang baik dikonsumsi oleh Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
5. Fase pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia

#### C. Sasaran

Penyuluhan ini diberikan pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia beserta keluarganya

#### D. Materi

Materi pada penyuluhan ini yaitu nutrisi pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia meliputi:

1. Pengertian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
2. Tujuan pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
3. Syarat pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia

4. Makanan yang baik dikonsumsi oleh Ibu hamil yang mengalami preeklampsia
6. Fase pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia

#### E. Metode

Ceramah dan diskusi, narasumber memberikan informasi terkait nutrisi pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia serta keluarga yang mendampingi kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber serta ibu hamil dan keluarganya.

#### F. Media

Materi ditampilkan menggunakan power point (PPT) dan leaflet yang dapat digunakan oleh keluarga.

#### G. Setting Tempat

Tempat yang tenang serta nyaman disertai penerangan yang cukup.

#### H. Kriteria Evaluasi

##### 1. Struktur

- a. Satuan Acara Penyuluhan (SAP) sudah siap sebelum kegiatan dilaksanakan
- b. Satuan Acara Penyuluhan (SAP) sesuai dengan masalah yang terjadi
- c. Kontrak waktu sudah tepat dengan sasaran penyuluhan
- d. Media sudah disiapkan yaitu PPT dan Leaflet

##### 2. Proses

- a. Peserta yang hadir sesuai dengan jumlah peserta yang diundang
- b. Media dapat digunakan dengan baik dan efektif
- c. Pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai waktu.
- d. Partisipasi peserta yang hadir
- e. Peserta dapat mengikuti sampai selesai

##### 3. Hasil

- a. Klien serta keluarganya mampu menjelaskan kembali nutrisi yang baik pada Ibu preeklampsia
- b. Klien mampu mendemonstrasikan nutrisi yang baik pada Ibu preeklampsia

#### I. Kegiatan Penyuluhan

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
1	Pembukaan (5 menit)	1. Memberikan salam dan menanyakan kondisi Ibu dan keluarga saat akan diberikan penyuluhan	1. Memperkenalkan diri 2. Mendengarkan 3. Memperhatikan

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saling memperkenalkan diri antara pemberi materi dengan Ibu hamil serta keluarganya</li> <li>3. Menanyakan pada Ibu hamil /keluarga apakah mengetahui nutrisi yang baik diberikan pada Ibu preeklampsia</li> <li>4. Menjelaskan tujuan dari penyuluhan yang akan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menjawab pertanyaan</li> </ol>
2	Penyajian (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerangkan materi tentang pemberian nutrisi pada Ibu preeklampsia</li> <li>2. Mempersilahkan Ibu hamil /keluarga untuk bertanya terkait materi yang telah diberikan</li> <li>3. Menjawab pertanyaan ibu hamil dan keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendengarkan serta memperhatikan materi yang diberikan oleh pemberi materi</li> <li>2. Bertanya apabila ada yang kurang dimengerti terkait materi yang telah diberikan</li> </ol>
3	Penutup (5 menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan terminasi terkait perasaan dan pemahaman tentang materi yang telah diberikan</li> <li>2. Menyimpulkan materi tentang nutrisi pada Ibu preeklampsia bersama – sama dengan Ibu hamil serta keluarganya</li> <li>3. Mengevaluasi pemahaman Ibu hamil dan keluarganya dengan meminta Ibu hamil dan keluarga untuk menyebutkan kembali beberapa materi yang telah dibahas sebelumnya</li> <li>4. Melakukan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Ibu hamil dan keluarganya terkait pemberian nutrisi pada Ibu preeklampsia serta kontrak waktu kembali apabila</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengutarakan perasaan, tanggapan, serta masukan kepada pemberi materi setelah materi diberikan</li> <li>2. Bersama-sama dengan pemberi materi menyimpulkan materi yang telah dibahas sebelumnya terkait nutrisi pada ibu preeclampsia</li> <li>3. Mengulang kembali materi yang disampaikan serta rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengontrol nutrisi pada</li> </ol>

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
		<p>masih ada intervensi yang perlu untuk dilanjutkan</p> <p>5. Mengakhiri pertemuan dan memberikan salam</p>	<p>ibu preeclampsia</p> <p>4. Membuat kesepakatan rencana pertemuan selanjutnya</p> <p>5. Mengakhiri pertemuan dan menjawab salam</p>

## MATERI – 4: PENDIDIKAN KESEHATAN

### NUTRISI PADA IBU PREEKLAMPSIA

- Pengertian

Nutrisi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia adalah pengaturan diet yang dilakukan pada ibu preeklampsia dengan memperhatikan asupan garam dan protein (Almatsier, 2006)

- Tujuan diet pada Ibu preeklampsia

Terapi gizi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia dilakukan agar status gizi dan tekanan darah dalam batas normal dapat dicapai dan dipertahankan. Tujuan lainnya adalah menurunkan retensi garam atau air, keseimbangan nitrogen, serta menegah terjadinya penyulit atau factor lain yang terjadi selama kehamilan atau pasca persalinan (Kemenkes RI, 2019)

- Syarat pemberian pada Ibu preeklampsia

Syarat pemberian diet pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia:

1. Makanan yang diberikan mengandung energy dan kandungan gizi yang cukup. Pemberian dapat dilakukan secara berangsur sesuai dengan tingkat preeklampsia dan kemampuan pasien menerima makanan yang diberikan. Pemberian diet untuk menambah energy maksimal 300 kkal dari pemberian diet sebelum hamil.
2. Pemberian garam disesuaikan dengan tingkat keparahan retensi garam dan air. Peningkatan berat badan < 3 kg/ bulan atau dibawah 1 kg/ minggu.
3. Pemberian diet tinggi protein ( 1,5 g/ kg berat badan)
4. Pemberian lemak dalam jumlah sedang, berupa lemak tidak jenuh tunggal dan tidak jenuh ganda.
5. Pemberian cukup vitamin, utamanya vitamin C dan B6.
6. Bentuk makanan yang disajikan disesuaikan dengan kemampuan makan pasien.
7. Kandungan Mineral cukup terutama kalsium dan kalium
8. Pemberian cairan 2,5 Liter per hari. Pada keadaan oliguria, dilakukan pembatasan input cairan dan disesuaikan dengan pengeluaran cairan melalui urin, muntah, keringat dan pernafasan.

- Jenis Diet Ibu preeklampsia

Kemenkes RI (2019), menjelaskan pemberian jenis diet pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia dibagi menjadi 3 bagian, yakni

1. Diet preeklampsia I, diet pertama ini diberikan pada ibu hamil yang mengamai pre dan



eklamsi berat. Diet yang diberikan berupa sari buah dan susu dengan pemberian minimal 1500 ml. Diet ini hanya diberikan 1-2 hari karena kurangnya kandungan gizi dan energy yang terkandung pada diet ini.

2. Diet preeklampsia II, pemberian diet ini dilakukan pada saat kondisi sudah brangsur baik dan telah melewati diet preeklampsia 1. Makanan yang diberikan berupa makanan yang berbentuk lunak dan rendah garam
3. Diet preeklampsia III, makanan yang diberikan pada kategori ini adalah makanan yang memiliki kandungan protein tinggi dan rendah garam. Pemberian dilakukan dalam bentuk makanan biasa, namun apabila kondisi belum memungkinkan, dapat diberikan dalam bentuk makanan lunak.

#### Makanan yang boleh dikonsumsi oleh Ibu preeklampsia

BAHAN MAKANAN	Preeklampsia I	Preeklampsia II	Preeklampsia III
Beras		Tiga gelas (150 gram)	Empat gelas (200 gra)
Telur 1 butir		50 gram	50 gram
Tempe 2 potong / 4 potong sedang		2 potong sedang (50 gram)	4 potong sedang (100 gram)
Sayuran 2 gelas		200 gram	200 gram
Daging 2 potong sedang		100 gram	100 gram
Sari buah atau buah	5 gelas (1000 gram)	4 potong sedang papaya (400 gram)	4 potong sedang papaya (400 gram)
Gula pasir	8 sendok (80 gram)	3 sendok (30 gram)	3 sendok (30 gram)
Minyak nabati		Satu setengah sendok makan (15 gram)	Dua setengah sendok makan (25 gram)
Susu bubuk khusus ibu hamil	15 sendok (75 gram)	5 sendok makan (25 gram)	10 sendok makan (50 gram)

### Tahapan Pemberian Diet pada Ibu preeklampsia

WAKTU / JAM	MAKANAN
06.00	Air teh sebanyak satu gelas
08.00	Sari Tomat sebanyak satu gelas
10.00	Sari jeruk sebanyak satu gelas
13.00	Susu dan sari alpukat sebanyak satu gelas
16.00	Susu dan sari tomat sebanyak satu gelas
18.00	Jeruk dan sari papaya sebanyak satu gelas
20.00	Susu dan teh sebanyak satu gelas

Waktu pemberian Diet preeklampsia I

Waktu pemberian Diet preeklampsia II & III

WAKTU	BAHAN MAKANAN
Pagi	Beras sebanyak 1 gls tim atau sebanyak 50 gram
	Telur 1 butir
	Sayuran 5 ½ sdm atau sebanyak 55 gram
	Minyak 5,5 sendok makan
	Susu bubuk sebanyak 5 sendok makan
	Gula pasir sebanyak 1 sendok makan
Pukul 10.00	Buah papaya 1 potong atau sebanyak 100 gram
	Gula pasir sebanyak 1 sdm
Siang	Beras 1 gelas tim (50 gram) pada diet II, dan 1,5 gelas tim (75 gram) pada diet III
	Daging 1 potong sedang atau sebanyak 50 gram
	Tahu ½ buah (50 gram) untuk diet I, dan 1 buah (100 gram) untuk diet II
	Sayuran ¾ gelas atau sebanyak 75 gram
	Buah papaya 1 potong sedang (100 gram)
Pukul 16.00	Buah papaya 1 potong tau sebanyak 100 gram
	Gula pasir 1 sendok makan
	Susu bubuk 5 sdm (hanya pada diet preeclampsia III)
Malam	Beras sebanyak I gelas tim atau 50 gram pada diet II dan 1,5 gelas atau 75 gram pada diet III
	Ikan 1 potong sedang atau sebanyak 5 gram

	Tempe 1 potong sedang pada diet II dan 2 potong sedang pada diet III
	Sayuran $\frac{3}{4}$ gelas atau sebanyak 75 gram
	Buah papaya 1 potong sedang atau sebanyak 100 gram
	Minyak $\frac{1}{2}$ sdm (5 gram) pada tipe II dan 1 sdm (10 gram) pada tipe III

## MATERI- 5

### FORMAT ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL

#### PENGAJIAN KEPERAWATAN INDIVIDU

Fasilitas Yankes	No. Register		
Nama Perawat yang mengkaji	Tanggal Pengkajian		
<b>DATA PENGAJIAN INDIVIDU YANG SAKIT</b>			
Nama Individu yang sakit :	Diagnosa Medik :		
Sumber Dana Kesehatan :	Rujukan Dokter/ Rumah Sakit :		
Status Obstrektri : G = P = A =	Riwayat Persalinan - Tahun : - Tempat : - Proses : Normal/Caesar - Penolong Persalinan :		
<b>Keadaan Umum</b> Kesadaran : GCS : TD : mm/Hg P : x/ menit S : °C N : x/ menit <input type="checkbox"/> Takikardia <input type="checkbox"/> Bradikardia <input type="checkbox"/> Tubuh teraba hangat <input type="checkbox"/> Menggigil	<b>Sirkulasi/ Cairan</b> <input type="checkbox"/> Edema <input type="checkbox"/> Bunyi jantung: ..... <input type="checkbox"/> Asites <input type="checkbox"/> Akral dingin <input type="checkbox"/> Tanda Perdarahan: purpura/ hematoma/ petekie/ hematemesis/ melena/ epistaksis* <input type="checkbox"/> Tanda Anemia : Pucat/ Konjungtiva pucat/ Lidah pucat/ Bibir pucat/ Akral pucat* <input type="checkbox"/> Tanda Dehidrasi: mata cekung/ turgor kulit berkurang/ bibir kering * <input type="checkbox"/> Pusing <input type="checkbox"/> Kesemutan <input type="checkbox"/> Berkeringat <input type="checkbox"/> Rasa Haus <input type="checkbox"/> Pengisian kapiler > 2 detik	<b>Perkemihan</b> <input type="checkbox"/> Pola BAK ...x/hr, vol ..ml/hr <input type="checkbox"/> Hematuri <input type="checkbox"/> Poliuria <input type="checkbox"/> Oliguria <input type="checkbox"/> Disuria <input type="checkbox"/> Inkontinensia <input type="checkbox"/> Retensi <input type="checkbox"/> Nyeri saat BAK <input type="checkbox"/> Kemampuan BAK : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung* <input type="checkbox"/> Alat bantu: Tidak/Ya*..... <input type="checkbox"/> Gunakan Obat : Tidak/Ya*... <input type="checkbox"/> Kemampuan BAB : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung* <input type="checkbox"/> Alat bantu: Tidak/Ya*...	<b>Pernapasan</b> <input type="checkbox"/> Sianosis <input type="checkbox"/> Sekret / Slym <input type="checkbox"/> Irama ireguler <input type="checkbox"/> Wheezing <input type="checkbox"/> Ronki ..... <input type="checkbox"/> Otot bantu napas ..... <input type="checkbox"/> Alat bantu nafas ..... <input type="checkbox"/> Dispnea <input type="checkbox"/> Sesak <input type="checkbox"/> Stridor <input type="checkbox"/> Krepirasi
<b>Pencernaan</b> <input type="checkbox"/> Mual <input type="checkbox"/> Muntah <input type="checkbox"/> Kembung <input type="checkbox"/> Nafsu Makan : Berkurang/Tidak* <input type="checkbox"/> Sulit Menelan <input type="checkbox"/> Disphagia <input type="checkbox"/> Bau Nafas <input type="checkbox"/> Kerusakan gigi/gusi/ lidah/ geraham/rahang/palatum* <input type="checkbox"/> Distensi Abdomen <input type="checkbox"/> Bising Usus: ..... <input type="checkbox"/> Konstipasi <input type="checkbox"/> Diare .....x/hr <input type="checkbox"/> Hemoroid, grade ..... <input type="checkbox"/> Teraba Masa abdomen ..... <input type="checkbox"/> Stomatitis <input type="checkbox"/> Warna ..... <input type="checkbox"/> Riwayat obat pencahar ..... <input type="checkbox"/> Maag <input type="checkbox"/> Konsistensi ..... Diet Khusus: Tidak/Ya*..... <input type="checkbox"/> Kebiasaan makan-minum : Mandiri/ Bantu sebagian/ Tergantung* <input type="checkbox"/> Alergi makanan/minuman : Tidak/Ya*..... <input type="checkbox"/> Alat bantu : Tidak/Ya*.....	<b>Muskuloskeletal</b> <input type="checkbox"/> Tonus otot <input type="checkbox"/> Kontraktur <input type="checkbox"/> Fraktur <input type="checkbox"/> Nyeri otot/tulang* <input type="checkbox"/> Drop Foot Lokasi ..... <input type="checkbox"/> Tremor Jenis ..... <input type="checkbox"/> Malaise / fatigue <input type="checkbox"/> Atropi <input type="checkbox"/> Kekuatan otot ..... <input type="checkbox"/> Postur tidak normal ..... <input type="checkbox"/> RPS Atas : bebas/ terbatas/ kelemahan/ kelumpuhan (kanan / kiri)* <input type="checkbox"/> RPS Bawah :bebas/terbatas/ kelemahan/kelumpuhan (kanan / kiri)* <input type="checkbox"/> Berdiri : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung* <input type="checkbox"/> Berjalan : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung* <input type="checkbox"/> Alat Bantu : Tidak/Ya*..... <input type="checkbox"/> Nyeri : Tidak/Ya*.....	<b>Neurosensori</b> <b>Fungsi Penglihatan :</b> <input type="checkbox"/> Buram <input type="checkbox"/> Tak bisa melihat <input type="checkbox"/> Alat bantu ..... <input type="checkbox"/> Visus ..... Disartria <b>Fungsi pendengaran :</b> <input type="checkbox"/> Kurang jelas <input type="checkbox"/> Tuli ..... <input type="checkbox"/> Alat bantu ..... <input type="checkbox"/> Tinnitus <b>Fungsi Perasa</b> <input type="checkbox"/> Mampu <input type="checkbox"/> Terganggu	<b>Fungsi perabaan :</b> <input type="checkbox"/> Kesemutan pada ..... <input type="checkbox"/> Kebas pada ..... <input type="checkbox"/> Disorientasi <input type="checkbox"/> Parese <input type="checkbox"/> Halusinasi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Amnesia <input type="checkbox"/> Paralisis <input type="checkbox"/> Refleks patologis ..... <input type="checkbox"/> Kejang : sifat ..... lama frekwensi <b>Fungsi Penciuman</b> <input type="checkbox"/> Mampu <input type="checkbox"/> Terganggu
<b>Mental</b> <input type="checkbox"/> Cemas <input type="checkbox"/> Denial <input type="checkbox"/> Marah <input type="checkbox"/> Takut <input type="checkbox"/> Putus asa <input type="checkbox"/> Depresi <input type="checkbox"/> Rendah diri <input type="checkbox"/> Menarik diri	<b>Komunikasi dan Budaya</b> <input type="checkbox"/> Interaksi dengan Keluarga : Baik/ terhambat* ..... <input type="checkbox"/> Berkomunikasi :	<b>Kebersihan Diri</b> <input type="checkbox"/> Gigi-Mulut kotor <input type="checkbox"/> Mata kotor <input type="checkbox"/> Kulit kotor <input type="checkbox"/> Perineal/genital kotor	<b>Perawatan Diri Sehari-hari</b> <input type="checkbox"/> Mandi : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung*
<b>Tidur dan Istirahat</b> <input type="checkbox"/> Susah tidur <input type="checkbox"/> Waktu tidur ..... <input type="checkbox"/> Bantuan obat, .....			

<input type="checkbox"/> Agresif <input type="checkbox"/> Perilaku kekerasan <input type="checkbox"/> Respon pasca trauma ..... <input type="checkbox"/> Tidak mau melihat bagian tubuh yang rusak	Lancar/ terhambat* ..... <input type="checkbox"/> Kegiatan sosial sehari-hari : .....	<input type="checkbox"/> Hidung kotor <input type="checkbox"/> Kuku kotor <input type="checkbox"/> Telinga kotor <input type="checkbox"/> Rambut-Kepala kotor	<input type="checkbox"/> Berpakaian : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung* <input type="checkbox"/> Menyisir Rambut : Mandiri/ Bantu sebagian/tergantung*
Laboratorium :			
Keterangan Tambahan terkait Ibu Hamil :			
<b>DIAGNOSA KEPERAWATAN :</b>			
<b>MENGETAHUI :</b>			
Nama Koordinator Perkesmas		Tanggal/ Tandatangan	

## PERENCANAAN KEPERAWATAN

Fasilitas Yankes	No. Register
Nama Perawat	Nama Penanggungjawab/ KK
Nama Individu/ Keluarga/ Kelompok	Alamat
Penyakit/ Masalah Kesehatan	

Tgl/ No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Rencana Tindakan						
1.	Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan	Definisi Kecukupan informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu Ekspetasi Meningkat Kriteria hasil	Edukasi kesehatan Definisi Mengajarkan pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih serta sehat Tindakan Observasi						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Definisi</td> <td>Pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari yang cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Gejala dan tanda mayor</td> <td>                     Subyektif                      1 Mengekspresikan keinginan untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya                       Objektif                      1 Pilihan hidup sehari-hari tepat untuk memenuhi tujuan program kesehatan                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Gejala dan tanda minor</td> <td>                     Subyektif                      1 Mengekspresikan tidak adanya hambatan yang berarti dalam mengintegrasikan program yang ditetapkan untuk mengatasi masalah kesehatan                      2 Menggambarkan berkurangnya faktor risiko terjadinya masalah kesehatan                       Objektif                      1 Tidak ditemukan adanya gejala masalah kesehatan atau penyakit yang tidak terduga                 </td> </tr> </table>	Definisi	Pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari yang cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan	Gejala dan tanda mayor	Subyektif 1 Mengekspresikan keinginan untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya  Objektif 1 Pilihan hidup sehari-hari tepat untuk memenuhi tujuan program kesehatan	Gejala dan tanda minor	Subyektif 1 Mengekspresikan tidak adanya hambatan yang berarti dalam mengintegrasikan program yang ditetapkan untuk mengatasi masalah kesehatan 2 Menggambarkan berkurangnya faktor risiko terjadinya masalah kesehatan  Objektif 1 Tidak ditemukan adanya gejala masalah kesehatan atau penyakit yang tidak terduga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku sesuai ajuran</li> <li>• Verbalisasi minat dalam belajar</li> <li>• Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik</li> <li>• Kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik</li> <li>• Perilaku sesuai dengan pengetahuan</li> </ul> Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkat (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</li> <li>• Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul> Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan</li> <li>• Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</li> <li>• Berikan kesempatan untuk bertanya</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan</li> <li>• Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>• Aajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul>
Definisi	Pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari yang cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan								
Gejala dan tanda mayor	Subyektif 1 Mengekspresikan keinginan untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya  Objektif 1 Pilihan hidup sehari-hari tepat untuk memenuhi tujuan program kesehatan								
Gejala dan tanda minor	Subyektif 1 Mengekspresikan tidak adanya hambatan yang berarti dalam mengintegrasikan program yang ditetapkan untuk mengatasi masalah kesehatan 2 Menggambarkan berkurangnya faktor risiko terjadinya masalah kesehatan  Objektif 1 Tidak ditemukan adanya gejala masalah kesehatan atau penyakit yang tidak terduga								

2.	Gangguan tumbuh kembang		Status perkembangan Definisi Kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kelompok usia Ekspektasi Menurun Kriteria hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan/perilaku sesuai usia</li> <li>• Kemampuan melakukan perawatan diri</li> <li>• Respon sosial</li> <li>• Kontak mata</li> </ul> Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkat (5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemarahan</li> <li>• Regrei</li> </ul> Pilihan Meningkat (1) Cukup meningkat (2) Sedang (3) Cukup menurun (4) Menurun (5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afek</li> <li>• Pola tidur</li> </ul> Pilihan: Memburuk (1) Cukup memburuk (2) Sedang (3) Cukup membaik (4) Membaik (5)	Perawatan kehamilan resiko tinggi Definisi Mengidentifikasi dan merawat ibu yang beresiko selama masa kehamilan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan Tindakan Observasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi faktor resiko kehamilan misalnya diabetes dan hipertensi</li> <li>• Identifikasi riwayat obstetris</li> <li>• Identifikasi sosial dan demografi</li> <li>• Monitor status fisik dan psiko sosial selama kemilan</li> </ul> Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampingi ibu saat merasa cemas</li> <li>• Diskusikan seksualitas aman selama hamil</li> <li>• Diskusikan ketidaknyamanan selama hamil</li> <li>• Diskusikan persiapan persalinan dan kelahiran</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan resiko janin mengalami kelahiran prematur</li> <li>• Informasikan kemungkinan intervensi selama proses kelahiran</li> <li>• Anjurkan melakukan perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan</li> <li>• Anjurkan ibu untuk beraktifitas dan beristirahat yang cukup</li> <li>• Ajarkan cara menghitung gerakan janin</li> <li>• Ajarkan aktifitas yang aman selama hamil</li> <li>• Ajarkan mengenali tanda bahaya</li> </ul> Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi dengan spesialis jika ditemukan tanda dan bahaya dari kehamilan</li> </ul>
	Definisi	Kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia		
	Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Efek ketidakmampuan fisik</li> <li>2 Keterbatasan lingkungan</li> <li>3 Inkonsisten respon</li> <li>4 Pengabaian</li> <li>5 Terpisah dari orang tua dan /atau orang terdekat</li> <li>6 Defisiensi stimulus</li> </ol>		
	Gejala dan tanda mayor	Subyektif 1 (tidak tersedia) Objektif <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai (fisik, bahasa, motorik, psikososial)</li> <li>2 Pertumbuhan fisi terganggu</li> </ol>		
Gejala dan tanda minor	Subyektif 1 (tidak tersedia) Objektif <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia</li> <li>2 Afek datar</li> <li>3 Respon sosial lambat</li> <li>4 Kontak mata terbatas</li> <li>5 Nafsu makan menurun</li> <li>6 Lesu</li> <li>7 Mudah marah</li> <li>8 Regresi</li> <li>9 Pola tidur terganggu (pada bayi)</li> </ol>			

3.	Risiko cedera pada ibu		Tingkat Cedera	Pencegahan cedera
	Definisi	Beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik pada ibu selama masa kehamilan sampai dengan proses persalinan	Definisi Keparahan dari cedera yang diamati atau dilaporkan Ekspektasi Menurun Kriteria hasil	Definisi Mengidentifikasi dan menurunkan resiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik Tindakan Observasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera</li> <li>• Identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera</li> <li>• Identifikasi kesesuaian alas kaki atau stocking elastis pada ekstremitas bawah</li> </ul> Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediakan pencahayaan yang memadai</li> <li>• Gunakan lampu tidur selama jam tidur</li> <li>• Sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan ruang rawat</li> <li>• Gunakan alas lantai jika beresiko mengalami cedera serius</li> <li>• Sediakan alas kaki anti slip</li> <li>• Sediakan pispot atau urinal untuk eliminasi ditempat tidur, jika perlu</li> <li>• Pastikan bel panggilan atau telpon mudah dijangkau</li> <li>• Pertahankan posisi tempat tidur diposisi terendah saat digunakan</li> <li>• Pastikan roda tempat tidur atau kursi roda dalam kondisi terkunci</li> <li>• Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>• Pertimbangkan penggunaan alarm elektronik pribadi atau alarm sensor pada tempat tidur atau kursi</li> <li>• Diskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan</li> <li>• Diskusikan mengenai alat bantu mobilitas yang sesuai</li> <li>• Diskusikan bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien</li> </ul>
	Faktor risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Besarnya ukuran janin</li> <li>2 Malposisi janin</li> <li>3 Induksi persalinan</li> <li>4 Persalinan lama kala I, II dan III</li> <li>5 Disfungsi uterus</li> <li>6 Efek metode/intervensi bedah selama persalinan</li> <li>7 Kurangnya dukungan keluarga dan orang tua</li> <li>8 Kurang adeuatnya observasi dan antisipasi</li> <li>9 Keterlambatan pengambilan keputusan dan manajemen</li> <li>10 Skrining dan perawatan prenatal yang tidak adekuat</li> <li>11 Kecemasan berlebihan pada proses persalinan</li> <li>12 Riwayat cedera pada persalinan sebelumnya</li> <li>13 Usia ibu (&lt;15 atau &gt;35)</li> <li>14 Parietas banyak</li> <li>15 Perubahan hormonal</li> <li>16 Perubahan postur tubuh</li> <li>17 Ketuban pecah</li> <li>18 Proses infeksi</li> <li>19 Penyakit penyerta</li> <li>20 Masalah kontraksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi aktifitas</li> <li>• Toleransi makanan</li> </ul> Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkat (5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejadian cedera</li> <li>• Luka/lecet</li> <li>• Ketegangan otot</li> <li>• Perdarahan</li> <li>• Ekspresi wajah kesakitan</li> <li>• Gangguan kognitif</li> <li>• Agitasi</li> <li>• Iritabilitas</li> <li>• Fratur</li> <li>• Gangguan mobilitas</li> <li>• Gangguan kognitif</li> </ul> Pilihan Meningkat (1) Cukup meningkat (2) Sedang (3) Cukup menurun (4) Meningkat (5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan darah</li> <li>• Frekuensi nadi</li> <li>• Frekuensi napas</li> <li>• Pola istirahat dan tidur</li> <li>• Nafsu makan</li> </ul> Pilihan: Memburuk (1) Cukup memburuk (2) Sedang (3) Cukup membaik (4) Membaik (5)	
	Kondisi klinis terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Posisi tubuh lordosis</li> <li>2 Kelelahan</li> <li>3 Ketuban pecah</li> <li>4 Penurunan kadar hemoglobin</li> </ol>		



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkatkan frekuensi observasi dan pengawasan pasien, sesuai kebutuhan</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan aasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga</li> <li>• Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri</li> </ul> <p>Perawatan kehamilan resiko tinggi</p> <p>Definisi</p> <p>Mengidentifikasi dan merawat ibu yang beresiko selama masa kehamilan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>Tindakan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi faktor resiko kehamilan misalnya diabetes dan hipertensi</li> <li>• Identifikasi riwayat obstetris</li> <li>• Identifikasi sosial dan demografi</li> <li>• Monitor status fisik dan psiko sosial selama kemilan</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampingi ibu saat merasa cemas</li> <li>• Diskusikan seksualitas aman selama hamil</li> <li>• Diskusikan ketidaknyamanan selama hamil</li> <li>• Diskusikan persiapan persalinan dan kelahiran</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan resiko janin mengalami kelahiran prematur</li> <li>• Informasikan kemungkinan intervensi selama proses kelahiran</li> <li>• Anjurkan melakukan perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan</li> <li>• Anjurkan ibu untuk beraktifitas dan beristirahat yang cukup</li> <li>• Ajarkan cara menghitung gerakan janin</li> <li>• Ajarkan aktifitas yang</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>aman selama hamil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajarkan mengenali tanda bahaya</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi dengan spesialis jika ditemukan tanda dan bahaya dari kehamilan</li> </ul> <p>Pencegahan kejang</p> <p>Definisi</p> <p>Mengidentifikasi dan menurunkan resiko terjadinya kontraksi otot dan gerakan yang tidak terkendali</p> <p>Tindakan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor status neurologis</li> <li>• Monitor tanda tanda vital</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baringkan pasien agar tidak terjatuh</li> <li>• Rendahkan ketinggian tempat tidur</li> <li>• Pasang side/rail tempat tidur</li> <li>• Berikan alas empuk dibawah kepala jika memungkinkan</li> <li>• Jauhkan benda benda berbahaya terutama benda tajam</li> <li>• Sediakan subtion disamping tempat tidur</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anjurkan segera melapor jika merasakan aura</li> <li>• Anjurkan tidak berkendara</li> <li>• Ajarkan keluarga pertolongan pertama pada keluarga</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi pemberian anti konvulsan jika perlu</li> </ul>
4.	Resiko cedera pada janin		Tingkat Cedera	Pencegahan cedera
	Definisi	Beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik pada janin selama proses kehamilan dan persalinan	Definisi Keparahan dari cedera yang diamati atau dilaporkan	Definisi Mengidentifikasi dan menurunkan resiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik
	Faktor risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Besarnya ukuran janin</li> <li>2 Malposisi janin</li> <li>3 Induksi persalinan</li> <li>4 Persalinan lama kala I, II dan III</li> <li>5 Disfungsi uterus</li> </ol>	<p>Ekspektasi</p> <p>Menurun</p> <p>Kriteria hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi aktifitas</li> <li>• Toleransi makanan</li> </ul> <p>Pilihan:</p> <p>menurun (1)</p> <p>cukup menurun (2)</p>	<p>Tindakan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera</li> <li>• Identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan</li> </ul>

		<p>6 Kecemasan yang berlebihan tentang proses persalinan</p> <p>7 Riwayat persalinan sebelumnya</p> <p>8 Usia ibu (&lt;15 tahun atau &gt; 35 tahun)</p> <p>9 Paritas banyak</p> <p>10 Efek metode/intervensi bedah selama persalinan</p> <p>11 Nyeri pada jalan lahir</p> <p>12 Penggunaan alat bantu persalinan</p> <p>13 Nyeri pada abdomen</p> <p>14 Kelelahan</p> <p>15 Merokok</p> <p>16 Efek agen farmakologi</p> <p>17 Pengaruh budaya</p> <p>18 Pola makan yang tidak sehat</p> <p>19 Faktor ekonomi</p> <p>20 Konsumsi alkohol</p> <p>21 Terpapar agen teratogen</p>	<p>Sedang (3)</p> <p>Cukup meningkat (4)</p> <p>Meningkat (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejadian cedera</li> <li>• Luka/lecet</li> <li>• Ketegangan otot</li> <li>• Perdarahan</li> <li>• Ekspresi wajah kesakitan</li> <li>• Gangguan kognitif</li> <li>• Agitasi</li> <li>• Iritabilitas</li> <li>• Fraktur</li> <li>• Gangguan mobilitas</li> <li>• Gangguan kognitif</li> </ul> <p>Pilihan</p> <p>Meningkat (1)</p> <p>Cukup meningkat (2)</p> <p>Sedang (3)</p> <p>Cukup menurun (4)</p> <p>Menurun (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan darah</li> <li>• Frekuensi nadi</li> <li>• Frekuensi napas</li> <li>• Pola istirahat dan tidur</li> <li>• Nafsu makan</li> </ul> <p>Pilihan:</p> <p>Memburuk (1)</p> <p>Cukup memburuk (2)</p> <p>Sedang (3)</p> <p>Cukup membaik (4)</p> <p>Membaik (5)</p>	<p>cedera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kesesuaian alas kaki atau stocking elastis pada ekstremitas bawah</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediakan pencahayaan yang memadai</li> <li>• Gunakan ampu tidur selama jam tidur</li> <li>• Sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan ruang rawat</li> <li>• Gunakan alas lantai jika beresiko mengalami cedera serius</li> <li>• Sediakan alas kaki anti slip</li> <li>• Sediakan pispot atau urinal untuk eliminasi ditempat tidur, jika perlu</li> <li>• Pastikan bel panggilan atau telpon mudah dijangkau</li> <li>• Pertahankan posisi tempat tidur diposisi terendah saat digunakan</li> <li>• Pastikan roda tempat tidur atau kursi roda dalam kondisi terkunci</li> <li>• Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>• Pertimbangkan penggunaan alarm elektronik pribadi atau alarm sensor pada tempat tidur atau kursi</li> <li>• Diskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan</li> <li>• Diskusikan mengenai alat bantu mobilitas yang sesuai</li> <li>• Diskusikan bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien</li> <li>• Tingkatkan frekuensi observasi dan pengawasan pasien, sesuai kebutuhan</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga</li> <li>• Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan</li> </ul>
	Kondisi klinis terkait	<p>1 Ketuban pecah sebelumnya</p> <p>2 Infeksi</p> <p>3 Penyakit penyerta: Asma, hipertensi</p> <p>4 Masalah kontraksi</p> <p>5 Efek pengobatan pada ibu</p>		

				<p>duduk selama beberapa menit sebelum berdiri</p> <p>Pengukuran gerakan janin</p> <p>Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung gerakan janin dimulai umur kehamilan mulai umur 8 minggu</li> </ul> <p>Tindakan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi pengetahuan dan kemampuan ibu menghitung gerakan janin</li> <li>Monitor gerakan janin</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hitung dan catat gerakan janin minimal 10 kali gerakan dalam 12 jam</li> <li>Lakukan pemeriksaan kardiocografi</li> <li>Catat jumlah gerakan janin dalam 12 jam sehari</li> <li>Berikan oksigen 2 sampai 3 L permenit jika gerakan janin belum mencapai 10 kali dalam 12 jam</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan manfaat menghitung gerakan janin dapat meningkatkan hubungan ibu dan janin</li> <li>Anjurkan ibu memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum menghitung gerakan janin</li> <li>Anjurkan posisi miring kiri saat menghitung gerakan janin, agar janin dapat memperoleh oksigen dengan optimal dengan meningkatkan sirkulasi fetomaternal</li> <li>Anjurkan ibu segera memberitahu perawat jika gerakan janin tidak mencapai 10 kali dalam 12 jam</li> <li>Anjurkan ibu cara menghitung gerakan janin</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi dengan tim medis jika ditemukan gawat janin</li> </ul>
5.	Persiapan peningkatan nutrisi		Status nutrisi	Edukasi nutrisi
	Definisi	Pola asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan	Definisi Ketidakadekuatan asupan nutrisi untuk membutuhkan kebutuhan metabolisme	Definisi Memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan nutrisi

		dapat ditingkatkan		
	Gejala dan tanda mayor	Subjektif 1 Mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi Objektif 1 Makan teratur dan adekuat	Ekspektasi Membaik Kriteria hasil • Porsi makanan yang dihabiskan • Kekuatan otot mengunyah • Kekuatan otot menelan • Serum albumin • Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi	Tindakan Observasi • Periksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi • Identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi
	Gejala dan tanda minor	Subjektif 1 Mengekspresikan pengetahuan tentang pilihan makanan dan cairan yang sehat 2 Mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat (mis. Piramida makanan, pedoman American Diabetic Associati atau pedoman lainnya) Objektif 1 Penyiapan dan penyimpanan makanan dan minuman yang aman 2 Sikap terhadap makanan dan minuman sesuai dengan tujuan kesehatan	• Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat • Pengetahuan tentang minuman yang sehat • Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat • Penyiapan dan penyimpangan minuman dan makanan yang aman • Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkat (5) • Perasaan cepat kenyang • Nyeri abdomen • Sariawan • Rambut rontok • diare Pilihan Meningkat (1) Cukup meningkat (2) Sedang (3) Cukup menurun (4) Meningkat (5) • Berat badan • Frekuensi massa tubuh • Frekuensi makan • Nafsu makan • Bising usus • Tebal lipatan kulit trisep Pilihan: Memburuk (1) Cukup memburuk (2) Sedang (3) Cukup membaik (4) Membaik (5)	Terapeutik • persiapkan materi dan media seperti jenis jenis nutrisi, tabel makanan penerang, cara mengelola, cara menakar akanan • Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan • Berikan kesempatan untuk bertanya Edukasi • Jelaskan pada pasien dan keluarga alergi makanan, makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan pasien • Ajarkan cara melaksanakan diet sesuai program • Jelaskan hal hal yang dilakukan sebelum memberi makan (mis. Perawatan mulut, obat-obatan yang harus diberikan sebelum makan) • Demonstrasikan cara membersihkan mulut • Demonstrasikan cara mengatur posisi saat makan • Ajarkan pasien dan keluarga monitor asupan kalori dan makanan • Ajarkan pasien dan keluarga memantau kondisi kekurangan nutrisi • Anjurkan mendemonstrasikan cara memberi makan, menghitung kalori dan menyiapkan makanan sesuai dengan program diet

6.	Pola napas tidak efektif		Pola napas Definisi Inspirasi dan atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat Ekspektasi Membaik Kriteria hasil • Dispneu • Penggunaan otot bantu napas • Pemanjangan fase ekspirasi • Ortopnea • Pernapasan pursed –lip • Pernapasan cuping hidung Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkat (5) • Verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan • Eksudat dada • Ventilasi semenit • Kapasitas vital • Diameter thoraks anterior-posterior • Tekanan ekspirasi • Tekanan inspirasi Pilihan Memburuk (1) Cukup memburuk (2) Sedang (3) Cukup membaik (4) Membaik(5)	Manajemen jalan nafas Definisi Mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas Tindakan Observasi • Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) • Monitor bunyi nafas tambahan • Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik • Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan healthy – tilt dan chin – livt • Posisikan semi fouler • Berikan minum hangat • Lakukan fisioterapi dada jika perlu • Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik • Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal • Berikan oksigen jika perlu Edukasi • Anjurkan asupan cairan 2000 ml perhari, jika tidak kontraindikasi • Ajarkan tehik batuk efektif • Kolaborasi • Kolaborasi pemberian brongkodilator jika perlu
	Definisi	Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat		
	Penyebab	1 Obesitas 2 Penurunan energi 3 Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru-paru 4 Kecemasan 5 Efek agen farmakologis		
	Gejala dan tanda mayor	Subjektif 1 Dispnea Objektif 1 Penggunaan otot bantu pernapasan 2 Fase ekspirasi memanjang 3 Pola napas abnormal (takipnea, bradipnea, hiperventilasi, kusmaul, cheyne-stokes		
	Gejala dan tanda minor	Subjektif 1 Ortopneu Objektif 1 Penapasan pursed-lip 2 Pernapasan cuping hidung 3 Diameter thoraks anterior-posterior meningkat 4 Ventilasi semenit menurun 5 Kapasitas vital menurun 6 Tekanan ekspirasi menurun 7 Tekanan inspirasi menurun 8 Ekskursi dada berubah		
7.	Risiko perfusi serebral tidak efektif		Perfusi serebral Definisi Keadekuatan aliran darah serebral untuk menunjang fungsi otak Ekspektasi Meningkat Kriteria hasil Pilihan: • Tingkat kesadaran	Managemen peningkatan tekanan intraraniaal Definisi Identifikasi penyebab peningkatan tik Observasi • Monitor tanda dan gejala peningkatan tik • Monitor MAP (mean
	Definisi	Beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah keotak		
	Faktor resiko	1 Keabnormalan masa protrombin dan/atau masa tromboplastin parsial 2 Aterosklerosis		

		3 Koagulasi (mis. Anemia sel sabit) 4 Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kognitif</li> <li>Pilihan</li> <li>menurun (1)</li> <li>cukup menurun (2)</li> <li>Sedang (3)</li> <li>Cukup meningkat (4)</li> <li>Meningkat (5)</li> <li>• Sakit kepala</li> <li>• Gelisah</li> <li>• Kecemasan</li> <li>• Agitasi</li> <li>• Demam</li> <li>Pilihan</li> <li>Meningkat (1)</li> <li>Cukup meningkat (2)</li> <li>Sedang (3)</li> <li>Cukup menurun (4)</li> <li>Menurun (5)</li> <li>• Tekanan arteri rata-rata</li> <li>• Tekanan intra kranial</li> <li>• Tekanan darah sistole</li> <li>• Tekanan darah diastole</li> <li>• Refleks saraf</li> <li>Pilihan:</li> <li>Memburuk (1)</li> <li>Cukup memburuk (2)</li> <li>Sedang (3)</li> <li>Cukup membaik (4)</li> <li>Membaik (5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>arterial pressure)</li> <li>• Monitor CVP (central venous pressure)</li> <li>• Monitor PAWP, jika perlu</li> <li>• Monitor PAP, jika perlu</li> <li>• Monitor ICP, jika tersedia</li> <li>• Monitor CPP (cerebral perfusion pressure)</li> <li>• Monitor gelombang ICP</li> <li>• Monitor status pernapasan</li> <li>• Monitor intake dan output cairan</li> <li>• Monitor cairan serebrospinalis</li> <li>• Terapeutik</li> <li>• Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang</li> <li>• Berikan posisi semifouler</li> <li>• Hindari manufer valsava</li> <li>• Cegah terjadinya kejang</li> <li>• Hindari penggunaan PEEP</li> <li>• Hindari pemberian cairan IV hipotonik</li> <li>• Atur ventilator agar PaCo<sub>2</sub></li> <li>• Pertahankan suhu tubuh normal</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu</li> <li>• Kolaborasi pemberian diuretik osmosis, jika perlu</li> <li>• Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu</li> </ul>
8.	Nyeri Akut			
	Definisi	Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan	Kontrol nyeri Definisi Tindakan untuk meredakan pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan Ekspektasi Meningkat Kriteria hasil • Melaporkan nyeri terkontrol • Kemampuan mengenali	Manajemen nyeri Definisi Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan Tindakan Observasi • Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi,
	Penyebab	1 Agen		

		<p>cederaan fisiologis (mis: inflamasi, iskemia, eoplasma)</p> <p>2 Agen cederaan kimiawi (mis: terbakar, bahan kimia ringan)</p> <p>3 Agen cederaan fisik (mis: abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)</p>	<p>onset nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan mengenali penyebab nyeri</li> <li>• Kemampuan menggunakan tehnik non-farmakologis</li> <li>• Dukungan orang terdekat</li> </ul> <p>Pilihan:  menurun (1)  cukup menurun (2)  Sedang (3)  Cukup meningkat (4)  Meningkat (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluhan nyeri</li> <li>• Penggunaan analgesik</li> </ul> <p>Pilihan  Meningkat (1)  Cukup meningkat (2)  Sedang (3)  Cukup menurun (4)  Menurun(5)</p>	<p>frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi skala nyeri</li> <li>• Identifikasi respon nyeri nonverbal</li> <li>• Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> <li>• Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</li> <li>• Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri</li> <li>• Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</li> <li>• Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</li> <li>• Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>• Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</li> <li>• Fasilitasi istirahat dan tidur</li> <li>• Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> <li>• Jelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>• Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>• Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat</li> <li>• Ajarkan tehnik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</li> </ul>
	Gejala dan tanda mayor	<p>Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengeluh nyeri</li> </ol> <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tampak meringis</li> <li>2 Bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri)</li> <li>3 Gelisah</li> <li>4 Frekuensi nadi meningkat</li> <li>5 Sulit tidur</li> </ol>		
	Gejala dan tanda minor	<p>Subjektif</p> <p>Tidak tersedia</p> <p>Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tekanan darah meningkat</li> <li>2 Pola napas berubah</li> <li>3 Nafsu makan berubah</li> <li>4 Proses berpikir terganggu</li> <li>5 Menarik diri</li> <li>6 Berfokus pada diri sendiri</li> <li>7 diaforesis</li> </ol>		
9.	Hipervolemia			
	Definisi	Peningkatan volume cairan intravaskuler interstisial, dan/atau intraseluler	Keseimbangan cairan Definisi Kemampuan menangani masalah kesehatan keluarga secara optimal untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga Ekspektasi	Manajemen hipervolemia Definisi Mengidentifikasi dan mengelola kelebihan cairan intravaskuler dan ekstraseluler serta mencegah terjadinya komplikasi Tindakan Observasi
	Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gangguan mekanisme regulasi</li> <li>2 Kelebihan asupan</li> </ol>		



		cairan 3 Kelebihan asupan natrium 4 Gangguan aliran balik vena 5 Efek agen farmakologis (mis. Kortikosteroid)	Meningkatkan Kriteria hasil • Kemampuan menjelaskan masalah kesehatan yang dialami • Aktifitas keluarga mengatasi masalah kesehatan tepat • Tindakan untuk mengurangi faktor resiko Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkatkan (5) • Verbalisasi esulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan • Gejala penyakit anggota keluarga Pilihan Meningkatkan (1) Cukup meningkat (2) Sedang (3) Cukup menurun (4) Meningkatkan (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa tanda dan gejala hipervolemia</li> <li>Identifikasi penyebab hipervolemia</li> <li>Monitor status hemodinamik (mis. Frekuensi jantung, tekanan darah)</li> <li>Monitor in-take dan output cairan</li> <li>Monitor tanda hemokonsentrasi (mis. Kadar natrium, hematokrit, berat jenis urin)</li> <li>Monitor tanda tekanan osmotik plasma (mis. Kadar protein dan albumin meningkat)</li> <li>Monitor kecepatan infus secara ketat</li> <li>Monitor efek samping giuretik</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama</li> <li>Batasi asupan cairan dan garam</li> <li>Tinggikan kepala tempat tidur 30-40°</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asupan melapor jika haluaran urin &lt;0.5 mL/kg/jam dalam 6 jam</li> <li>Anjurkan melapor jika BB bertambah lebih dari 1 kg dalam sehari</li> <li>Ajarkan cara pengukuran dan mencatat asupan haluaran cairan</li> <li>Ajarkan cara membatasi cairan</li> <li>Kolaborasi</li> <li>Kolaborasi pemberian diuretik</li> <li>Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik</li> <li>Kolaborasi pemberian continuous renal replacment therapy, jika perlu</li> </ul>
	Gejala dan tanda mayor	Subjektif 1 Ortopnea 2 Dispnea 3 Proxysmal nocturnal dyspnea Objektif 1 Edema anasarka dan/atau edema perifer 2 Berat badan meningkat dalam waktu singkat 3 Jugular venous pressure (JVP) dan/atau Central Venous Pressure meningkat 4 Reflek hepatojugularis positif		
	Gejala dan tanda minor	Subjektif Tidak tersedia Objektif 1 Distensi vena jugularis 2 Terdengar suara napas tambahan 3 Hepatomegali 4 Kadar Hb/Ht turun 5 Oliguria 6 Intake lebih banyak dari ouput 7 Kongesti paru		
10.	Gangguan pola tidur		Pola tidur	Dukungan tidur
	Definisi	Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor	Definisi Keadekuatan kualitas dan kuantitas tidur	Definisi Menfasilitasi siklus tidur dan terjaga yang teratur

		eksternal	Ekspektasi Membaik Kriteria hasil	Tindakan
	Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Hambatan lingkungan (mis. Kebisingan)</li> <li>2 Kurang terkontrol tidur</li> <li>3 Kurang privasi</li> <li>4 Restraint fisi</li> <li>5 Ketidadaan teman tidur</li> <li>6 Tidak familiar dengan peralatan tidur</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan beraktifitas</li> </ul> Pilihan: menurun (1) cukup menurun (2) Sedang (3) Cukup meningkat (4) Meningkatkan (5)	Observasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pola aktifitas dan tidur</li> <li>• Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik atau psikologis)</li> <li>• Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. Kopi dan teh)</li> <li>• Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi</li> </ul>
	Gejala dan tanda mayor	Subjektif <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengeluh sulit tidur</li> <li>2 Mengeluh sering terjaga</li> <li>3 Mengeluh tidak puas tidur</li> <li>4 Mengeluh perbuahan pola tidur</li> <li>5 Mengeluh istirahat yang tida cukup</li> </ol> Objektif (Tidak tersedia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluhan sulit tidur</li> <li>• Keluhan sering terjaga</li> <li>• Keluhan pola tidur berubah</li> <li>• Keluhan istirahat tidak cukup</li> </ul> Pilihan Meningkatkan (1) Cukup meningkat (2) Sedang (3) Cukup menurun (4) Meningkatkan (5)	Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)</li> <li>• Batasi waktu tidur siang, jika perlu</li> <li>• Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</li> <li>• Tetapkan jadwal tidur rutin</li> <li>• Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. Pijat, akupresure)</li> <li>• Sesuaikan jadwal dan atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga</li> </ul>
	Gejala dan tanda minor	Subjektif <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengeluh kemampuan beraktifitas menurun</li> </ol> Objektif (tidak tersedia)		Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit</li> <li>• Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur</li> <li>• Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur</li> <li>• Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM</li> <li>• Anjurkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur</li> <li>• Anjurkan rekalsasi autogenik atau cara non-farmakologi lainnya</li> </ul>

## IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

Fasilitas Yankes		No. Register	
Nama Perawat		Nama Penanggungjawab/ KK	
Nama Individu/ Keluarga/ Kelompok		Alamat	
Penyakit/ Masalah Kesehatan			

Tgl/ No.	Diagnosa Keperawatan	Implementasi	Evaluasi	Ttd Perawat

## DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S. (2006). Penuntun diet edisi terbaru instalasi gizi perjan rs Dr Ciptomangunkusumo dan asosiasi dietisien Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Attwood M and Lee Tara. 2013. Pregnancy Health Yoga. London: Duncan Baird Publishers.
- Kemendes RI. 2010. Panduan Teknis Latihan Fisik Selama Kehamilan dan Nifas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kemendes kesehatan RI, (2019). Penatalaksanaan diet ibu hamil dengan preeklamsi. Diunduh pada tanggal 27 April 2020 dari <http://yankes.kemkes.go.id/read-penatalaksanaan--diet-ibu-hamil-dengan-pre-eklamsi--6380.html>
- Mottola MF, et al. 2018. 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. doi:10.1136/bjsports-2018-100056.
- Niko, Puti Febrina. (2018). Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil. Jurnal Ismika, Vol.01 No. 01 (2018):24-33.
- Rasdiyanah., Wiarsih, W., & Sukihananto. (2017). Modul manajemen diri hipertensi. Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- Snyder, M and Lindquist, R. (2014). Complementary & alternative therapies in nursing. New York: Springer Publishing Company, LLC.
- Widuri Nur Anggraeni. (2014). Pengaruh Terapi Relaksasi Zikir untuk Menurunkan Stres pada Penderita Hipertensi Esensial. Jurnal Intervensi Psikologi, Vol 6 No. 1, Juni 2014, hlm. 86-87.

# MODUL INTERVENSI KEPERAWATAN PENCEGAHAN PRE EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL



**Alamat:**

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar  
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63  
Romangpolong, Samata,  
Kabupaten Gowa

ISBN 978-602-328-263-0



9 786023 282630