

**ANALISIS MOLECULAR DOCKING POTENSI SENYAWA PADA DAUN
MIYANA (*Coleus blumei*) SEBAGAI ANTIBIOTIK TERHADAP BAKTERI
MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

SABILLA SURYANING AMANDA

NIM. 60300116031

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabilla Suryaning Amanda
NIM : 60300116031
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta/23 November 1997
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul : Analisis *Molecular Docking* Potensi Senyawa Pada Daun Miyana (*Coleus blumei*) Sebagai Antibiotik Terhadap Bakteri MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar, adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa, ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 17 Februari 2021

Penyusun



Sabilla Suryaning Amanda
NIM: 60300116031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Molecular Docking Potensi Senyawa Pada Daun Miyana (*Coleus blumei*) Sebagai Antibiotik Terhadap Bakteri MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*)**”, yang disusun oleh **Sabilla Suryaning Amanda, NIM: 60300116031**, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 M, bertepatan dengan 5 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 17 Februari 2021 M.

5 Rajab 1442 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. ()
Sekretaris : Devi Armita, S.Si., M.Si. ()
Munaqisy I : Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. ()
Munaqisy II : Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing I : Dr. Hafsan, S. Si., M.Pd. ()
Pembimbing II: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. ()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam dengan limpahan rahmat, kasih sayang serta karuniaNya kepada penulis sehingga skripsi penulis dengan judul “Analisis *Molecular Docking* Potensi Senyawa Pada Daun Miyana (*Coleus blumei*) Sebagai Antibiotik Terhadap Bakteri MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*)” dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Tak lupa pula Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'- tabi'in hingga sampai kepada kita umatnya. Skripsi ini adalah salah satu persyaratan yang digunakan untuk memperoleh gelar sarjana sains pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang tua penulis yaitu Muh. Dahlan dan Aminah Nurhayati yang selalu memberikan motivasi, arahan, limpahan kasih sayang yang tiada tara, ketulusan dan doa yang tak henti hentinya mereka panjatkan. Serta saudara saya Citra dwi khairani, Andi Amaral ma'rufi dan Ahmad Azizul akbar yang banyak membantu dalam berbagai hal serta memberikan semangat dan dukungannya.

Dengan selesainya skripsi ini semua tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.a, PhD. selaku rektor Universitas Islam Negeri alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV atas segala fasilitas yang telah diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta wakil dekan I, II dan III beserta seluruh jajaran staff administrasi yang telah memberikan banyak fasilitas dan bantuan selama belajar hingga penyelesaian tugas akhir ini.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dengan membantu serta memberikan arahan, saran dan petunjuk kepada penulis terkait pengurusan hal-hal yang berkaitan tentang mata kuliah sampai penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar.
4. Ibu Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu, arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Pembimbing II yang senantiasa selalu memberi arahan, saran, motivasi, serta bimbingannya yang telah banyak berkontribusi selama

penulis menempuh kuliah sampai pada penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. dan Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag., selaku penguji biologi dan penguji agama yang telah memberikan banyak saran, arahan serta kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini dan staff jurusan Biologi ibu Sumiaty, S.Pd yang telah memberikan arahan dan membantu segala hal mengenai persuratan, pelaksanaan akademik, pengurusan KRS dan sebagainya.
8. Civitas akademik dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi.
9. Kepala Laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam praktikum.
10. Tim *In Silico* yaitu Miftahul Jannah, Widyawati jafar, Nur alfishah, Susi Susanti, Syahrul Gunawan, M. Dhio Ingra F dan Risman Rifaldi yang telah berjuang bersama, memberikan motivasi, bantuan dan semangat kepada penyusun.
11. Sahabat- sahabat saya, Nirwana Sari, A. Suci Ayu, Sutimah Binti Sudirman, Nila Mulyani, Miftahul Jannah, Hamidah Samad, Hariani, Nurhidaya,

Risdayanti Adi purba dan Widyawati Jafar yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya kepada penulis.


12. Teman-teman Biologi angkatan 2016 “Immunoglobulin” yang telah memberikan semangat dan *support* yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah kami berserah. Semoga semua pihak yang banyak membantu penulis mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Biologi dan dapat pula digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak lain.

Makassar, 17 Februari 2021



Sabilla Suryaning Amanda
NIM.60300116031




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL | i |
| LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang lingkup penelitian | 8 |
| D. Kajian Pustaka..... | 9 |
| E. Tujuan penelitian..... | 11 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | 13 |
| A. Ayat yang Relevan | 13 |
| B. Tinjauan Umum tentang Miyana (<i>Coleus blumei</i>)..... | 14 |
| B.1 Tinjauan Umum tentang Miyana (<i>Coleus blumei</i>)..... | 14 |
| B.2 Tinjauan Umum tentang Senyawa Miyana (<i>Coleus blumei</i>) | 18 |
| C. Tinjauan Umum tentang Antibiotik | 19 |
| C.1 Tinjauan Umum tentang Antibiotik dan Mekanisme Kerja Antibiotik | 19 |
| C.2 Tinjauan Umum tentang Resistensi Antibiotik | 21 |
| D. Tinjauan Umum tentang MRSA (<i>Methicillin Resistent Staphylococcus aureus</i>) | 22 |

| | |
|--|-----------|
| E. Tinjauan Umum tentang Mekanisme resistensi pada MRSA (<i>Methicillin resistant Staphylococcus aureus</i>) | 24 |
| F. Tinjauan Umum tentang <i>In Silico</i> dan <i>Molecular Docking</i> | 27 |
| G. Kerangka pikir..... | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 31 |
| A. Jenis dan Pendekatan Ilmiah | 31 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 31 |
| C. Variabel Penelitian | 31 |
| D. Definisi Operasional Penelitian..... | 32 |
| E. Instrument Penelitian | 32 |
| F. Prosedur Kerja..... | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Hasil Penelitian | 41 |
| B. Pembahasan..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 63 |
| KEPUSTAKAAN | 64 |
| LAMPIRAN | 69 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 99 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.2.2.1 Daftar senyawa ligan yang digunakan..... | 33 |
| Tabel 3.2.2. 2 Daftar senyawa ligan kontrol yang digunakan yang telah di unduh di situs PubChem dalam bentuk sdf | 35 |
| Tabel 3.2.2. 3 Daftar makromolekul (Protein) target yang akan digunakan | 36 |
| Tabel 4. 1 Hasil penambatan makromolekul dengan ligan (<i>Scoring</i>) | 41 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------------------|--|----|
| Gambar 2. 1 | morfologi miyana (<i>Coleus blumei</i>)..... | 17 |
| Gambar 2.2 | mekanisme resistensi MRSA (<i>Methicillin resistant Staphylococcus aureus</i>) | 26 |
| Gambar 3.1.1 | situs <i>website</i> Pubchem..... | 38 |
| Gambar 3.1 2 | situs <i>website</i> PDB (<i>Protein data bank</i>)..... | 38 |
| Gambar 3.1 3 | situs <i>website</i> Way2Drug | 39 |
| Gambar 4.2.a.1 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]- dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 43 |
| Gambar 4.2.a.2 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Aristolone dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 43 |
| Gambar 4.2.a.3 | visualisasi 2D dan 3D interaksi hexadecahydro-pyrene dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 44 |
| Gambar 4.2.a.4 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Dotriacontane dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 44 |
| Gambar 4.2.a. 5 | visualisasi 2D dan interaksi Octadecane dengan mutan penicillin binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 44 |
| Gambar 4.2.a. 6 | visualisasi 2D dan interaksi Triacotane dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 45 |
| Gambar 4.2.a.7 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Z)-3-heptadecen-5-yne dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 45 |
| Gambar 4.2.a. 8 | visualisasi 2D dan 3D interaksi 2-methylthiophene dengan mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')..... | 45 |
| Gambar 4.2.b.1 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]- dengan Protein Methicillin resisten <i>mecR1</i> | 46 |
| Gambar 4.2.b. 2 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Dotriacontane dengan Protein Methicillin resisten <i>mecR1</i> | 46 |
| Gambar 4.2.b. 3 | visualisasi 2D dan 3D interaksi 2-methylthiophene dengan Protein Methicillin resisten <i>mecR1</i> | 46 |
| Gambar 4.2.b.4 | visualisasi 2D dan 3D interaksi Octadecane dengan Protein Methicillin resisten <i>mecR1</i> | 47 |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| Gambar 4.2.b.5 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Triacontane</i> dengan <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> | 47 |
| Gambar 4.2.b.6 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Aristolone</i> dengan <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> | 47 |
| Gambar 4.2.b.7 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> dengan <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> | 48 |
| Gambar 4.2.b.8 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Hexadecahydro-pyrene</i> dengan <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> | 48 |
| Gambar 4.2.c.1 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]-</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 49 |
| Gambar 4.2.c.2 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>2-methylthiophene</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 49 |
| Gambar 4.2.c.3 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Octadene</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 50 |
| Gambar 4.2.c.4 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Aristolone</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 50 |
| Gambar 4.2.c.5 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 51 |
| Gambar 4.2.c.6 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Dotriacontane</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 51 |
| Gambar 4.2.c.7 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Triacontane</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 52 |
| Gambar 4.2.c.8 | visualisasi 2D dan 3D interaksi <i>Hexadecahydro-pyrene</i> dengan <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> | 52 |
| Gambar 4.B | Mekanisme resistensi MRSA dan Mekanisme Penghambatan senyawa terhadap protein target..... | 60 |

ABSTRAK

Nama : Sabilla Suryaning Amanda
NIM : 60300116031
Judul Skripsi : Analisis *Molecular Docking* Potensi Senyawa Pada Daun Miyana (*Coleus blumei*) Sebagai Antibiotik Terhadap Bakteri MRSA (*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus*)

Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman yang berasal dari Asia tenggara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.319/9/2006 menyatakan bahwa miyana merupakan tanaman biofarmaka dari 66 komoditas tanaman biofarmaka di Indonesia. Miyana (*Coleus blumei*) memiliki kandungan senyawa yang dapat digunakan sebagai pengobatan salah satunya dapat dijadikan sebagai antibiotik terhadap bakteri resisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa yang terdapat pada daun miyana (*Coleus blumei*) yang memiliki potensial sebagai kandidat antibiotik untuk bakteri MRSA (*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus*) terhadap sisi pengikatan pada protein *Methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* menggunakan program *Autodock Vina* (PyRx), *PyMol*, dan *Discovery Studio 2019*. Sebanyak 8 ligan dari senyawa Miyana (*Coleus blumei*) ditambahkan pada protein target bakteri MRSA. Hasil penelitian didapatkan 1 ligan yang berpotensi sebagai antibiotik pada ketiga target protein yaitu *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan ΔG binding -8.3 terhadap penambatan pada protein *Methicillin resistant mecR1*. *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan ΔG binding -9.0 terhadap penambatan pada *Protein mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2'). *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan ΔG binding -8.1 terhadap penambatan pada *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*. Senyawa ligan tersebut mengikat pada residu asam amino protein target dengan ikatan hidrogen dan hidrofobik.

Kata kunci: Miyana (*Coleus blumei*), antibiotik, *Molecular Docking*, protein *Methicillin resistant mecR1*, *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2'), *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*.

ABSTRACT

Name :Sabilla Suryaning Amanda
NIM :60300116031
Title :Potential's Molecular Docking Analysis of Miyana (*Coleus blumei*) leaf compound as Antiotic MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*)

Miyana (Coleus blumei) is a plant native to southeast Asia. Based on the Decree of the Minister of Agriculture No. 511/Kpts/PD.319/9/2006 stated that miyana is a biopharmaceutical plant of 66 commodities of biopharmaceutical plants in Indonesia. Contains compounds that can be used as a treatment, one of which can be used as an antibiotic against resistant bacteria. This study aims to find out the type of compound contained in the leaves of miyana (Coleus blumei) that have the potential as antibiotic candidates for MRSA (Methicillin Resistent Staphylococcus aureus) bacteria to the binding side on the protein Methicillin resistant mecR1, Mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP 2') and Oxacilloyl-acylated MecR1 extracellular antibiotic-sensor using the program Autodock Vina (PyRx), PyMol, dan Discovery Studio 2019. A total of 8 ligans from the Miyana compound (Coleus blumei) has been tethered to the target protein of MRSA bacteria. The results of the study obtained 1 ligament that has the potential as an antibiotic in all three protein targets, namely Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]- with ΔG binding -8.3 against tethering on the protein Methicillin resistant mecR1. Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]- with ΔG binding -9.0 against tethering on the Protein mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2'). Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]- with ΔG binding -8.1 against tethering on the Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor. These ligan compounds bind to the residues of target protein amino acids with hydrogen and hydrophobic bonds.

Kata kunci: *Miyana (Coleus blumei), antibiotic, Molecular Docking, protein Methicillin resistant mecR1, Protein mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP 2'), Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah swt. yang memiliki berbagai variasi baik dari morfologi, buah yang dihasilkan maupun kandungan senyawanya. Allah swt., menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar, porsi dan manfaatnya masing-masing. Tanaman dapat dijadikan sebagai sumber pangan nabati bagi makhluk hidup. Selain itu tanaman memiliki berbagai potensi senyawa yang dapat dijadikan sebagai obat dan antibiotik. Tanaman yang tumbuh di bumi memiliki berbagai macam jenis dan variasinya, memiliki berbagai macam bentuk, buah, kegunaan yang berbeda-beda. Di dalam al-Qur'an Allah swt., telah menjelaskan mengenai penciptaan tanaman yaitu sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-An'aam/ 06:99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman

yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Tafsir al-Mishbah, pada QS. al-An'aam/ 06:99 telah dijelaskan bahwa Allah swt. telah menurunkan air hujan. Dengan air tersebut ditumbuhkan berbagai jenis tanaman. Tanaman tersebut mengeluarkan buah-buahan segar serta berbagai jenis biji-bijian. Dan dengan air tersebut, Allah swt., menumbuhkan berbagai macam kebun seperti zaitun, anggur dan delima. Terdapat tanaman dengan bentuk yang serupa, akan tetapi mengandung rasa, aroma serta kegunaan yang berbeda. Lalu amatilah tanaman dan buah itu dengan penuh penghayatan serta pembelajaran dari hal tersebut. Sesungguhnya hal ini adalah Kekuasaan Allah swt., bagi para umat manusia yang beriman kepada-Nya (Shihab, 2010).

Adapun maksud dari ayat dan tafsir tersebut dapat diketahui bahwa Allah swt. telah menciptakan berbagai macam tanaman yang memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. Di dalam tanaman tersebut terdapat berbagai macam kegunaan dan manfaat yaitu memiliki berbagai macam vitamin, zat gizi serta senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan manusia dengan mengolahnya menjadi berbagai produk yang bermanfaat contohnya seperti vitamin serta antibiotik. Salah satu tanaman yang bermanfaat yaitu Miyana (*Coleus blumei*) karena memiliki kandungan senyawa-senyawa yang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Surahmida dan Umaruddin pada tahun 2019 pada daun miyana terdapat kandungan senyawa yang dapat dijadikan sebagai antibakteri. Sehingga

miyana (*Coleus blumei*) dapat digunakan sebagai obat dalam menangani berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik β -laktam yaitu *methicillin*.

Resistensi antibiotik ini merupakan salah satu masalah terbesar dalam dunia kesehatan dikarenakan bakteri penyebab berbagai penyakit ini sudah tidak sensitif terhadap antibiotik pada umumnya. Akan tetapi, setiap penyakit pasti ada obatnya seperti bakteri resisten. Sebagaimana telah dijelaskan Nabi Muhammad swa. yang telah diriwayatkan oleh Muslim dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ
بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda setiap penyakit ada obatnya. Dan jika telah ditemukan suatu obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu atas izin Allah swt. Tanaman merupakan salah satu ciptaan Allah swt., yang mengandung banyak manfaat bagi makhluk hidup lainnya, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia serta dapat dijadikan sebagai berbagai macam obat.

Tanaman diciptakan dengan berbagai macam bentuk, rasa aroma, kegunaan serta berbagai macam kandungan di dalamnya seperti klorofil, vitamin dan senyawa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik bagi bakteri yang mengalami resistensi salah satunya yaitu MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*). Selain itu tanaman telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif yang sudah turun menurun di wariskan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam kekayaan alam, dengan iklim tropis dan tanah yang subur membuat Indonesia kaya akan berbagai macam tanaman. Dengan hal ini, akan ada banyak obat yang dapat diciptakan untuk mengobati berbagai macam penyakit atas izin Allah Swt.

Resistensi antibiotik merupakan salah satu permasalahan dalam dunia kesehatan karena memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi kesehatan manusia. Resistensi antibiotik dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri resisten yang tidak dapat ditangani dikarenakan bakteri penyebab penyakit tersebut telah memiliki kekebalan pada obat atau antibiotik sehingga bakteri tersebut sudah tidak sensitif terhadap antibiotik. Dengan adanya resistensi antibiotik maka akan memperparah kondisi infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus pada manusia. Salah satu resistensi yang terjadi pada bakteri yaitu resistensi bakteri *Staphylococcus aureus* terhadap *penicillin* dan *methichillin* atau biasa disebut dengan MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*) (Asri, dkk. 2017).

MRSA merupakan *Staphylococcus aureus* yang memiliki strain yang resisten terhadap antibiotik yang disebabkan adanya ekspresi dari *penicillin binding protein* (PBP2a) yang memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap antibiotik khususnya golongan β -laktam. Adanya afinitas ini menyebabkan proses biosintesis peptidoglikan tetap berjalan dikarenakan *Penicillin binding protein 2a* (PBP2a) tidak dapat berikatan dengan antibiotik β -laktam. Hal ini terjadi dikarenakan MRSA memiliki SCCmec (*Staphylococcus Cassete Chromosome mec*) yang merupakan pembawa dari gen pengkode *Penicillin binding protein 2a* (PBP2a) yaitu gen *mecA* (Deurenberg and Stobberingh, 2008).

MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) termasuk salah satu penyakit nosokomial yang menyebar dengan cepat di antara pasien di Rumah sakit yang menyebabkan penanganan dan pengobatan tidak tepat dikarenakan belum ada penanganan yang efektif dan obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini serta kemampuan dari bakteri yang berevolusi untuk bertahan melawan antibiotik yang biasa digunakan (Mun., et.all, 2013). Karena adanya resistensi pada *Staphylococcus aureus* menyebabkan penanganan dan pengobatan yang belum memadai sehingga dibutuhkan obat yang tepat yaitu antibiotik terhadap MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*). Antibiotik tersebut dapat didapatkan dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam tanaman. Salah satunya yang terdapat pada daun miyana (*Coleus blumei*).

Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman yang berasal dari Asia tenggara. Namun, keberadaan miyana sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia

sendiri miyana tumbuh dengan sangat subur di berbagai daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.319/9/2006 menyatakan bahwa miyana merupakan tanaman biofarmaka dari 66 komoditas tanaman biofarmaka di Indonesia (Anita., Dkk, 2018).

Masyarakat Halmahera Barat menggunakan miyana sebagai obat untuk berbagai penyakit. Berdasarkan hasil pengumpulan data etnobotani menunjukkan bahwa masyarakat Halmahera Barat menggunakan miyana untuk dijadikan obat terhadap penyakit pada saluran pernafasan yaitu obat batuk (Wakhidah dan Silalahi, 2018). Menurut Nurcahaya (2018) masyarakat di kecamatan Tinggimoncong, Gowa telah menggunakan miyana sebagai obat wasir dengan cara merebus 10 lembar daun miyana dan ditambahkan 1 rimpang kunyit dan diminum sehari sekali.

Terdapat berbagai macam senyawa alami yang terdapat pada tanaman yang dapat dijadikan sebagai antibiotik untuk bakteri resisten. Salah satunya yaitu senyawa yang berasal dari tanaman miyana (*Coleus blumei*) salah satunya yaitu flavonoid. Di mana miyana (*Coleus blumei*) memiliki berbagai kandungan dan potensi senyawa yang sangat berkhasiat bagi tubuh dan dapat dijadikan obat serta dapat dijadikan sebagai antibiotik. Untuk mengetahui potensi dari tanaman miyana (*Coleus blumei*) yang dapat dijadikan sebagai kandidat antibiotik terhadap MRSA (*Metichillin Resistent Staphylococcus aureus*) dapat dilakukan dengan metode *in silico* yaitu dengan *molecular docking*.

In silico merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari senyawa yang dapat dijadikan sebagai kandidat obat. Penggunaan metode studi *in*

in silico ini memiliki banyak keuntungan diantaranya yaitu mengurangi jumlah hewan coba yang digunakan dan dibutuhkan pada saat percobaan serta dapat mengetahui mekanisme senyawa kandidat obat terhadap targetnya dalam bentuk visualisasi yang dapat dilakukan dengan *molecular docking* (Mirza, 2019).

Molecular docking adalah metode *in silico* yang berbasis komputasi. Metode ini dapat digunakan untuk mencari pola interaksi yang paling tepat antara molekul ligan dan reseptor. Saat ini penelitian dengan menggunakan metode komputasi sangat penting diberbagai aspek penelitian pada bidang biologi dan medis. Salah satu manfaat dari penggunaan metode ini yaitu dapat dilihat dalam berbagai proses penemuan dan pembuatan obat (Widodo, Dkk., 2018).

Pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh Surahmida dan Umaruddin mengenai Identifikasi dan Analisa Senyawa Kimia dari Ekstrak Daun miyana (*Coleus blumei*) dengan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis dan aktivitas biologis yang dapat dimanfaatkan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa miyana (*Coleus blumei*) memiliki kandungan senyawa yang dapat digunakan sebagai antibiotik terhadap sisi pengikatan pada *protein Methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* pada bakteri resisten MRSA (*Metichillin Resistensi Staphylococcus aureus*) dengan menggunakan metode *in silico* dan memberikan informasi terkait manfaat dari miyana (*Coleus blumei*) kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi dan nilai *scoring* penambatan senyawa ligan pada daun miyana (*Coleus blumei*) terhadap sisi pengikatan pada *protein Methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin - binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*?

C. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Daun miyana (*Coleus blumei*) memiliki beberapa kandungan senyawa yang dapat dijadikan sebagai obat dan antibiotik yaitu *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]-, 2-methylthiophene, Z)-3-heptadecen-5-yne, Octadecane, dotriacontane, hexadecahydro-pyrene, aristolone, silicone grease, triacontane, siliconfet, 1-(4-phenylcyclohexyl)-1-hexanone, anilino-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine.*
2. Dalam analisisnya, pengujian yang dilakukan yaitu uji *in silico* dengan metode komputasi dengan menggunakan data mining yaitu senyawa uji yang merupakan hasil GCMS dari penelitian Surahmida dan Umaruddin dapat di unduh melalui situs *website* PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dengan menyimpan dalam bentuk SDF (*.sdf) serta protein target yang didapatkan pada situs *website* RSCB PDB (<https://www.rcsb.org/>). Kemudian untuk preparasi senyawa protein dilakukan dengan menggunakan *software*

Discovery studio 2019 Client. Preparasi ligan target dilakukan dengan menggunakan *software PyRx 0.8*. Selanjutnya untuk mengetahui proses *Molecular docking* dan *virtual screening* dilakukan dengan menggunakan *Autodock vina* yang terintegrasi dalam aplikasi *PyRx 0.8* di mana aplikasi ini digunakan untuk mengetahui *scoring function*. Selanjutnya untuk analisis molekul dapat menggunakan aplikasi *PyMOL* yang digunakan untuk memahami hubungan struktur, memahami efek dari suatu mutasi, serta mekanisme ligan dan protein.

3. Bakteri resisten merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk bertahan dari antibiotik dengan mengubah beberapa komponen dalam sel nya maupun mengubah mekanismenya. MRSA yaitu *Staphylococcus aureus* yang memiliki strain yang resisten terhadap antibiotik yang disebabkan karena adanya ekspresi jenis *penicillin binding protein (PBP2a)* dengan afinitas yang sangat rendah terhadap antibiotik khususnya golongan β -laktam. Selain *penicillin binding protein (PBP2a)* terdapat *protein Methicillin resistant mecR1*, dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* yang menyebabkan bakteri *Staphylococcus aureus* menjadi resisten.

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Anita., dkk (2018) melakukan penelitian mengenai Potensi Flavonoid Ekstrak Daun Miana (*Coleus atropurpureus*) Sebagai Senyawa Anti *Mycobacterium*

tuberculosis Strain H37rv dan Mdr dengan *Microscopy Observation Drug Susceptibility* (Mods). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktifitas senyawa antimikrobia yang terbuat dari ekstrak etanol 96% daun miana (*Coleus atropurpureus*) yang dapat menghambat pertumbuhan *Multi Drug Resistant* (MDR) *Mycobacterium tuberculosis* dengan menggunakan metode *Microscopy Observation Drug Suceptibility* (MODS). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pada ekstrak etanol 96% dengan metode sianida (HCl-Mg) terdapat kandungan senyawa flavonoid pada daun miana sedangkan pada ekstrak etanol 96 % dengan menggunakan Spektrofotometer didapatkan hasil bahwa terdapat kandungan senyawa flavonoid dengan total 8,59 mgRE/gram ekstrak.

2. Khusnan, Dkk (2016) melakukan penelitian Mengenai Resistensi Antibiotik dan Deteksi Gen Pengode *Methicillin Resistent Staphylococcus aureus* (MRSA) Isolat Broiler di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gen pengkode MRSA pada Broiler. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *in silico*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gen yang bertanggung jawab terhadap MRSA (*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus*) pada 23 *Staphylococcus aureus* terdeteksi adanya gen *mecA* dengan jumlah isolat yaitu 8 (34,8 %).
3. Pakadang dan Salim (2019) melakukan penelitian dengan judul Kombinasi Daun Miana (*Coleus scutellarioides* (L.) Benth) dan Rimpang Jahe (*Zingiber officinale* Rosc.) sebagai antibakteri *Streptococcus pneumoniae*,

Staphylococcus aureus, *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumonia* penyebab Batuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi daun miana dan rimpang jahe memberikan aktivitas antibakteri *Streptococcus pneumonia*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Klebsiella pneumonia* penyebab batuk. Kombinasi yang paling efektif terutama untuk *Staphylococcus aureus* adalah kombinasi 2:1.

4. Surahmida dan Umaruddin (2019) melakukan penelitian dengan judul Identifikasi dan Analisa Senyawa Kimia Ekstrak Daun Miana (*Coleus blumei*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis dan biologis dari daun miana yaitu (Z)-3-heptadecen-5-yne; 2- methylthiophene; 1-(4-phenylcyclohexyl)-1-hexanone; hexahydro-3H1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-; silicone grease triacontane; octadecane; siliconfett; dotriacontane; hexadecahydro-pyrene; aristolone dan anilino-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui interaksi dan nilai *scoring* hasil penambatan senyawa ligan pada daun miana (*Coleus blumei*) terhadap sisi pengikatan pada *mutan penicillin - binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2'), *protein methicillin resistant mecR1*, dan *oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai potensi senyawa dari daun miyana (*Coleus blumei*) yang dapat dijadikan sebagai kandidat antibiotik bakteri resisten secara mendalam.
2. Memberikan informasi mengenai potensi kandungan senyawa dari daun miyana (*Coleus blumei*) sehingga dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan bagi para peneliti dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumber informasi bahwa *molecular docking* berguna dalam *screening* senyawa yang memiliki efektivitas yang paling akurat.
4. Sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat dan peneliti khususnya dalam bidang farmasi.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. *Ayat yang Relevan*

Tanaman mengandung berbagai kandungan senyawa, vitamin dan zat lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Senyawa tersebut berperan penting bagi tubuh manusia seperti vitamin, zat besi serta antioksidan. Tanaman banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan herbal bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang mempercayai khasiat dari tanaman yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Kandungan senyawa yang baik telah Allah swt., terangkan di dalam al-Qur'an Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Asy-syu'araa/26: 7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Tafsir al-Mishbah ayat tersebut menjelaskan mengenai kekufuran dan pendustaan. Di mana, apabila mereka terus mempertahankan pendustaan dan kekufuran dan mereka tidak merenungi serta mengamati sebagian ciptaan Allah di bumi ini? Sebenarnya, apabila mereka bersedia untuk merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah swt., niscaya mereka akan mendapatkan sebuah petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang

mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2010).

Ayat dan tafsir tersebut telah menjelaskan bahwa Allah swt., telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik. Baik yang dimaksudkan pada ayat tersebut yaitu memiliki khasiat dan kegunaan yang bermanfaat bagi tubuh. Tanaman memiliki berbagai macam kandungan senyawa yang sangat baik bagi tubuh. Salah satunya senyawa antioksidan dan antibakteri yang dapat dijadikan obat maupun antibiotik untuk mengobati berbagai penyakit. Antibiotik digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri. Namun, pada saat sekarang banyak bakteri yang mengalami resistensi. Resistensi merupakan kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Sehingga bakteri tersebut sudah tidak sensitif apabila diberikan antibiotik. Salah satu tanaman yang mengandung manfaat yang baik yaitu miyana (*Coleus blumei*). Miyana (*Coleus blumei*) memiliki kandungan senyawa yang dapat dijadikan sebagai antibiotik salah satunya yaitu senyawa flavonoid.

B. Tinjauan Umum tentang Miyana (*Coleus blumei*)

B.1 Tinjauan Umum tentang Miyana (*Coleus blumei*)

Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman yang berasal dari Asia tenggara. Namun, keberadaan miyana sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri miyana tumbuh dengan sangat subur di berbagai daerah salah satunya di Toraja, Sulawesi selatan. Masyarakat Toraja memanfaatkan miyana sebagai obat untuk penyakit TBC (*Tuberculosis*), asma dan penyakit lainnya. Berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.319/9/2006 menyatakan bahwa miyana merupakan tanaman biofarmaka dari 66 komoditas tanaman biofarmaka di Indonesia (Anita., Dkk, 2018).

Miyana, iler atau jawer kotok merupakan salah satu tanaman yang berasal dari keluarga lamiaceae yang merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Asia. Miyana ini tumbuh pada tanah dengan subur baik di tanah yang kering maupun di tanah yang lembab. Tanaman ini memiliki tinggi 0,5 - 1 m namun ada beberapa yang bisa tumbuh sampai setinggi 2 m. Tanaman ini digunakan sebagai obat di Asia, salah satunya di Filipina. Miyana pada umumnya digunakan sebagai obat sakit kepala, memar, luka pendarahan, sinusitis, tetes mata dan karminatif (Hamidah., dkk, 2019).

Masyarakat Sulawesi telah lama menggunakan daun miyana sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman ini dapat mudah tumbuh di mana saja akan tetapi akan lebih mudah tumbuh pada kondisi lingkungan yang lembab. Masyarakat biasanya menggunakan daun miyana ini untuk mengobati demam, batuk, influenza, asma dan penyakit pada paru-paru (Basir., dkk, 2020).

Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman herba (*Herbaceous*) dan tanaman menahun dengan tinggi 0,5 sampai 1,5 m dengan batang (*Caulis*) yang berambut (*Pilosus*). Memiliki tangkai daun 2 sampai 9 cm; helaian daun bulat telur (*Ovatus*) dengan pangkal (*Basis*) yang membulat (*Rotundatus*) atau menutupi baji dan ujung (*Apex*) yang meruncing (*Acuminatus*). Memiliki bunga (*Flos*) dalam anak payung (*Umbella*) yang berhadapan (*Superpositio*) dengan panjang 0,5 sampai 5 cm dengan kelopak (*Calyx*) berambut dan terdapat bintik-bintik kelenjar rapat serta

memiliki mahkota berbibir 2 dengan panjang 1 cm dengan bibir bawah yang menggantung dan sisi luar berambut. Tangkai sari (*Filamentum*) gundul dengan kepala sari (*Anthera*) berwarna ungu. Memiliki buah keras berbentuk telur (Steenis, et.al, 2013).

Miyana (*Coleus blumei*) adalah tanaman liar yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini berasal dari familia Lamiaceae. Tanaman ini merupakan tanaman herba dengan siklus hidup tahunan dengan tinggi 0,5 sampai 1,5 m dengan batang beralur dan berbentuk persegi empat dengan berambut. Miyana merupakan tanaman dengan percabangan yang banyak. Daun miyana berbentuk bulat telur (*Ovatus*) dengan ujung meruncing (*Acutus*), tepi beringgit (*Crenatus*) dengan tulang daun menyirip (*Penninervis*) serta permukaan daun yang mengkilap. Daun miyana merupakan daun tunggal (Qalbi., dkk, 2017).

Miyana termasuk kedalam familia Lamiaceae dalam genus Coleus. Di mana miyana memiliki bau aromatik (bau khas). Tanaman ini adalah tanaman yang memiliki warna dan bentuk yang memiliki ciri khas serta memiliki berbagai jenis yang bervariasi. Warna daun dari miyana bervariasi yaitu ada yang berwarna merah, ping, ungu, kuning, hijau dan coklat bahkan campuran dari beberapa warna tersebut (Surahmida dan Umarudin, 2019).

Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman yang memiliki berbagai variasi warna daun yang berbeda-beda. Tanaman ini tumbuh di tanah perkebunan maupun di pekarangan rumah. Tanaman ini digunakan sebagai tanaman obat di beberapa Negara termasuk di Indonesia, India, Mexico, Thailand dan beberapa Negara lain. Hal ini

dikarenakan miyana memiliki berbagai senyawa yang bersifat farmakologi (Zhu, et.all, 2015).

Daun miyana merupakan daun tunggal yang memiliki warna bervariasi yaitu ada yang memiliki warna ungu, ungu kecoklatan sampai berwarna ungu kehitaman. Tanaman ini masuk kedalam *Lamiaceae* yang dapat tumbuh dengan subur di daerah tropis. Di Indonesia sendiri tanaman ini di setiap daerah memiliki berbagai sebutan yang berbeda-beda ada yang menyebutnya miyana, mayana, iler dan pakadang (Rizal., dkk, 2015).



Gambar 2. 1 morfologi miyana (*Coleus blumei*)

Sumber : (Roviqowatu., dkk, 2012)

Adapun susunan klasifikasi dari miyana (*Coleus blumei*) adalah sebagai berikut:

Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Lamiales
Famili : Lamiaceae
Genus : Coleus
Spesies : *Coleus blumei* (Steenis., et.al, 2013).

B.2 Tinjauan Umum tentang Senyawa Miyana (*Coleus blumei*)

Miyana (*Coleus sp.*) adalah tanaman yang mudah untuk dibudidayakan serta dapat tumbuh di daerah tropis. Miyana (*Coleus sp.*) merupakan tanaman herbal yang digunakan dan dimanfaatkan dalam bidang medis dikarenakan memiliki senyawa flavonoid. Miyana dapat dijadikan alternatif pengobatan herbal di dunia. Salah satunya dapat digunakan sebagai antimalarial (Roviqowati., et al, 2019).

Miyana (*Coleus blumei*) memiliki berbagai kandungan senyawa seperti flavonoid, tanin, asam rosmanik, quersetin, streptozocin, fitol, steroid, saponin dan minyak atsiri. Kandungan senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologis salah satunya quersetin yang digunakan sebagai antihistamin. Aktivitas biologis lain dari senyawa daun miyana yaitu dapat dijadikan sebagai antibakteri maupun antivirus yaitu dijadikan sebagai obat batuk dan TBC (Wakhidah dan Silalahi, 2018).

Miyana (*Coleus blumei*) secara tradisional digunakan sebagai obat luar dan obat dalam. Bagian yang dapat dijadikan obat adalah akar dan daun. Miyana mengandung berbagai senyawa yang dapat dijadikan obat untuk menambah nafsu makan, obat bisul, obat wasir, obat nyeri menstruasi dan obat radang THT (telinga, hidung dan tenggorokan (Verawati., dkk. 2019).

Metabolit sekunder yang paling banyak terkandung dalam miyana (*Coleus scutellarioides*) adalah asam rosmarinik (RA) dan antosianin. Senyawa ini tersebar luas di tanaman obat dalam famili Lamiaceae dan disintesis oleh molekul L-*Felalanin* dan L-*tyrosine*. Senyawa ini merupakan sistem pertahanan terhadap infeksi jamur dan bakteri (Zhu, et.all, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Surahmida dan Umarudin (2019) didapatkan hasil bahwa terdapat 8 senyawa yang memiliki aktivitas biologis dan farmakologis dari daun miyana (*Coleus blumei*) yang didapatkan dari hasil analisis *Gas Chromatography Mass Spectrophotometry* (GCMS) dengan pelarut n-heksana yaitu *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl], 2-methylthiophene, Z)-3-heptadecen-5-yne, Dotriacontane, Hexadecahydro-pyrene, Aristolone, Triacontane* dan *Octadecane*.

C. Tinjauan Umum tentang Antibiotik

C.1 Tinjauan Umum tentang Antibiotik dan Mekanisme Kerja Antibiotik

Antibiotik merupakan obat yang biasa digunakan untuk membasmi mikroorganisme penyebab infeksi. Pada umumnya infeksi yang disebabkan mikroba

dapat ditangani sistem pertahanan tubuh atau sistem imun akan tetapi kinerja dari sistem imun perlu adanya penggunaan antibiotik untuk menunjang kinerjanya. Salah satu antibiotik yang dapat digunakan untuk infeksi yang disebabkan mikroba yaitu ampisilin yang merupakan derivat dari penisilin. Ampisilin termasuk kedalam kelompok antibiotik jenis β -laktam yang memiliki spektrum antimikroba yang luas yang efektif untuk melawan mikroba gram positif maupun gram negatif. Ampisilin dapat digunakan sebagai obat untuk infeksi pada manusia yaitu infeksi pada saluran urin yang disebabkan *Escherichia coli* dan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan *Streptococcus pneumonia* (Masrianto, Dkk., 2013).

Mekanisme antibiotik ada yang menargetkan menyerang dinding sel (*Cell wall*) dari bakteri. Dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan sehingga peptidoglikan mengalami pengikatan silang dari untai glikus dengan bantuan enzim transglikosidase kemudian rantai peptida akan memanjang dan membentuk ikatan silang dari satu peptida ke peptida yang lainnya. Kemudian protein pengikat penisilin (PBP) akan menghubungkan bagian dari rantai peptida tersebut yang dihubungkan secara silang oleh residu glisin. Hubungan silang ini memperkuat dinding sel. Contohnya yaitu antibiotik golongan β -laktam dan glikopeptida yang menghambat sintesis dinding sel. Di mana cincin β -laktam meniru bagian D alanil yang biasanya diikat oleh PBP. Kemudian PBP akan berinteraksi dengan cincin β -laktam dan tidak tersedia untuk sintesis peptidoglikan baru sehingga tidak terjadi pembentukan peptidoglikan baru yang akan menyebabkan lisis pada bakteri (Džidić et al, 2008).

Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan mekanisme yaitu antibiotik yang menghambat sintesis sel bakteri dinding (penisilin dan sefalosporin), antibiotik yang mengganggu membran sel mikroorganisme, yang memengaruhi permeabilitas (beberapa agen antijamur), antibiotik yang menghambat sintesis protein dengan mempengaruhi fungsi 30S atau 50S subunit ribosom (tetrasiklin, makrolida, dan klindamisin), antibiotik yang menghambat langkah metabolisme penting dari mikroorganisme (sulfonamida dan trimethoprim), antibiotik yang mengganggu sintesis asam nukleat (metronidazol dan kuinolon). Resistensi juga bisa menyebabkan mutasi yang dihasilkan dari perubahan basa nukleotida tunggal menghasilkan resistensi, seperti yang telah diketahui dengan baik oleh aminoglikosida. Proses ini dapat terjadi melalui transduksi, transformasi atau konjugasi. Transduksi adalah proses di mana DNA eksogen ditransfer dari satu *bakteriophage* yang lain dengan intervensi *bakteriophage*. Sedangkan transformasi adalah proses di mana bakteri memperoleh segmen DNA yang bebas di lingkungan. Dan konjugasi di mana terjadi perpindahan materi genetik oleh sel ke sel secara kontak langsung, melalui pilus atau jembatan seks. Ini adalah mekanisme transfer antibiotik yang paling umum pada gen resistensi (Soares et al, 2012).

C.2 Tinjauan Umum tentang Resistensi Antibiotik

Resistensi antibiotik merupakan suatu kondisi dari bakteri atau virus untuk mempertahankan dirinya yaitu dengan memiliki mekanisme pertahanan terhadap antibiotik yang diberikan. Adanya resistensi antibiotik akan menyebabkan suatu

infeksi pada manusia dikarenakan bakteri atau virus akan semakin parah. Pada tahun 2013 di Amerika Serikat terdapat 25.000 kematian disebabkan oleh resistensi antibiotik. Sedangkan di Eropa terdapat 28.000 jumlah kematian akibat resistensi antibiotik. Salah satu mekanisme penularan resistensi ini disebabkan penularan secara langsung seperti melalui hasil olahan yang terbuat dari hewan yaitu daging, susu, telur (Hellen et.al, 2016).

Terjadinya bakteri yang resisten terhadap antibiotik erat kaitannya dengan penggunaan agen yang berasal dari pangan yang bersumber dari hewan. Infeksi yang terjadi pada manusia yang melibatkan bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik telah meningkat secara umum yang disebabkan oleh pangan asal hewan yang telah disuntikkan antibiotik akan menyebabkan adanya residu antibiotik sehingga infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen sudah tidak dapat lagi ditangani dan diberikan antibiotik (Hiroi et.al, 2012).

D. Tinjauan Umum tentang MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*)

MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) adalah salah satu penyebab dari terjadinya suatu penyakit yang didapatkan setelah mendapatkan suatu tindakan medis baik di klinik, puskesmas maupun di rumah sakit. Infeksi nosokomial terjadi karena adanya tindakan medis seperti penggunaan alat bantu, pemberian antibiotik secara bertahap, tindakan pembedahan, serta pascaoperasi. Infeksi ini terus mengalami peningkatan dan menyebar ke seluruh dunia (Kemalapur, dkk. 2017).

MRSA merupakan *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik yang disebabkan adanya ekspresi dari *penicillin binding protein* (PBP2a) yang memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap antibiotik khususnya golongan β -laktam. Adanya afinitas ini menyebabkan proses biosintesis peptidoglikan tetap berjalan dikarenakan *Protein binding protein 2a* (PBP2a) tidak dapat berikatan dengan antibiotik β -laktam. Hal ini terjadi dikarenakan MRSA memiliki SCCmec (*Staphylococcus Cassete Chromosome mec*) yang merupakan pembawa dari gen pengkode *Protein binding protein 2a* (PBP2a) yaitu gen *mecA* (Deurenberg and Stobberingh, 2008).

MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) adalah salah satu bakteri yang merupakan bakteri penyebab infeksi nosokomial. Infeksi ini menyebabkan bertambahnya morbiditas dan mortalitas serta menambah jumlah biaya perawatan. MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) memiliki kemampuan dan ketahanan hidup 7 hari - 7 bulan pada permukaan yang kering. Dan tetap bersifat virulensi kurang dari 10 hari pada permukaan yang kering sehingga masih dapat menyebabkan infeksi suatu penyakit (Asri, dkk. 2017).


MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) merupakan bakteri *Staphylococcus aureus* yang memiliki kekebalan pada antibiotik yang disebabkan karena adanya perubahan genetik karena adanya paparan dari terapi dan dosis antibiotik yang diberikan secara tidak rasional. Adapaun faktor-faktor terjadinya MRSA ini yaitu lingkungan serta beberapa aktivitas yang dilakukan seperti kontak saat olahraga, kebersihan setiap individu dan perawatan medis yang telah dilakukan

seperti riwayat perawatan, riwayat infeksi penyakit lain dan riwayat operasi (Mahmudah, dkk. 2013).

MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) merupakan salah satu penyakit nosokomial yang menyebar dengan cepat di antara pasien di Rumah sakit yang menyebabkan penanganan dan pengobatan tidak tepat dikarenakan belum adanya obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini serta kemampuan dari bakteri yang berevolusi untuk bertahan melawan antibiotik yang biasa digunakan (Mun., et.all, 2013).

E. Tinjauan Umum tentang Mekanisme resistensi pada MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus)

Terdapat dua kelas dari *Penicillin binding protein* yaitu HMM (*High molecular mass*) dan LMM (*Low molecular mass*). Pada HMM (*High molecular mass*) terdiri dari dua kelas yaitu A dan B. HMM kelas A berfungsi dalam reaksi katalis transpeptidase dan reaksi transglykosilasi sedangkan hmm kelas B hanya berfungsi dalam katalis reaksi transpeptidase. Pada LMM (*Low molecular mass*) regulasi pada peptidoglikan. Pada MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*) terdapat *Penicillin binding protein* 2a yang termasuk dalam kelas HMM (*High molecular mass*) yaitu kelas B yang hanya terlibat dalam proses transpeptidase. Adanya *Penicillin binding protein* 2a mengakibatkan terjadinya resistensi. Adapun mekanisme dari resistensi pada MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*) yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 mekanisme resistensi MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*)

Sumber: (Shalaby., et.al, 2020).

Mekanisme resistensi pada MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*) terjadi berdasarkan keberadaan antibiotik β-laktam. Pada **Gambar 2.2** bagian kiri mekanisme resistensi terjadi tanpa adanya antibiotik β-laktam di mana β-laktam merupakan *inducer* sehingga transkripsi dari blaI yang meregulator blaZ dan mecI yang meregulator mecA sehingga mecA tidak berjalan dan tidak dapat mengkodekan PBP2a dan menginaktivkan protease. Pada bagian kanan mekanisme yang terjadi yaitu terjadi proses pembentukan β-laktamase oleh blaI yang meregulator blaZ sehingga terjadi transkripsi. Kemudian β-laktamase ini akan membuka cincin dan menginaktivasi antibiotik β-laktam. Mekanisme yang kedua yaitu dengan pembentukan PBP2a yang dikodekan oleh gen mecA. Di mana mecR1 meregulator mecA sehingga proses transkripsi berlangsung dan proses transpeptida

berjalan yang menyebabkan afinitas dari *Penicillin binding protein* rendah. Karena adanya afinitas yang rendah menyebabkan situs aktif Ser403 tertutup sehingga antibiotik β -laktam tidak dapat berikatan dengan sisi aktif Ser403 yang menyebabkan tidak terjadinya pengikatan dan tidak terjadi hidrolisis. Situs aktif dari *penicillin binding protein* 2a yaitu Ser403 tertutup karena adanya perubahan konformasi yang disebabkan adanya proses transpeptidase yang tinggi. Situs Ser403 yang tertutup mengakibatkan antibiotik tidak dapat mengakses situs aktif ini dan menyebabkan tidak terjadinya pengikatan oleh antibiotik. Sehingga *Ceftaroline* akan mengikat pada situs allosterik yang menyebabkan perubahan konformasi yang akan mengarah ke pembukaan situs aktif Ser403. Kemudian *Ceftaroline* akan mengasilasi Ser403 dan menghambat PBP2a.

Struktur dari *penicillin binding protein* 2a (PBP2a) memiliki situs aktif yang tertutup yang menyebabkan antibiotik golongan β -laktam tidak dapat mengakses situs aktif dari *penicillin binding protein* yang mengikat antibiotik sehingga menyebabkan tidak terjadi pengikatan silang antara peptidoglikan dengan antibiotik. Selain itu, pada MRSA (*Methicillin resistant antibiotik Staphylococcus aureus*) memiliki strain yang resisten terhadap antibiotik dikarenakan adanya hasil dari biosintesis *penicillin binding protein* dengan afinitas yang rendah yaitu PBP2a, PBP2' atau mecA (Fishovitz., et.al, 2014)

Respon ini diatur oleh kromosom mecdivergon yang mengkode transduksi sinyal termasuk penekanan dalam transkripsi, mecI dan transduser. mecR1 terdiri

dari domain metaloprotease dan domain sensor ekstraseluler yang mengkode produksi β -lactamase (Marrero, et al. 2006).

F. Tinjauan Umum tentang *In Silico* dan Molecular Docking

In silico merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari senyawa yang dapat dijadikan sebagai kandidat obat. Penggunaan metode studi *in silico* ini memiliki banyak keuntungan diantaranya yaitu mengurangi jumlah hewan coba yang digunakan dan dibutuhkan pada saat percobaan serta dapat mengetahui mekanisme senyawa kandidat obat terhadap targetnya dalam bentuk visualisasi (Mirza, 2019).

In silico adalah salah satu metode yang merupakan kemajuan dari studi imun informatika yang memprediksi molekul baru serta fungsinya. Metode ini membantu memilih molekul yang lebih baik sebelum dilakukan pengujian secara *in vitro* atau kondisi *in vivo*. Metode ini dilakukan untuk mendesain, memprediksi sifat stabilitas, fisika, kimia dan mengoptimalkan ekspresi dari host (Dana, et.al., 2020).

In silico mengambil peranan penting dalam katalisis homogen. *In silico* membantu dalam menafsirkan hasil penelitian, menafsirkan interaksi pada obat dan target reseptor serta memprediksi aktivitas katalitik dan selektivitas. Metode ini juga digunakan untuk membuat visualisasi dari molekul sederhana tiga dimensi (3D) yang dapat dengan mudah dilakukan atau bahkan digabungkan dengan *real time* (Foscato, et. All, 2020).

In silico adalah suatu istilah yang menggambarkan simulasi yang dilakukan di komputer. Di Los Alamos, New Mexico pada tahun 1989 istilah *in silico* telah

digunakan pada *workshop* dengan judul *Celluler automata: Theory and Appllication*. Penggunaan *in silico* dapat berkontribusi dalam penanganan penyakit baru dan pengembangan suatu obat (khaerunnisa., dkk, 2020).

Molecular docking adalah metode yang berbasis komputasi. Metode ini dapat digunakan untuk mencari pola interaksi yang paling tepat antara molekul ligan dan reseptor. Saat ini penelitian dengan menggunakan metode komputasi sangat penting diberbagai aspek penelitian pada bidang biologi dan medis. Salah satu manfaat dari penggunaan metode ini yaitu dapat dilihat dalam berbagai proses penemuan dan pembuatan obat (Widodo, 2018).

Molecular docking merupakan salah satu pemodelan komputasi yang berasal dari struktur kompleks yang terbentuk dari dua atau lebih suatu interaksi molekuler. Contohnya seperti protein dengan asam nukleat. Dalam hal ini dilakukan untuk mendesain kandidat obat baru yang dimulai dari pencarian dan pembentukan struktur, kemudian proses *docking* sampai proses pengikatan oleh molekul tersebut (Ruyck, et.all, 2016).

Molecular docking dapat digunakan untuk membuat dan mengetahui interaksi antara molekul kecil dan molekul besar seperti protein serta mengetahui aktivitas pengikatan protein target dan proses biokimia. Metode ini melibatkan dua proses atau langkah dasar dalam prediksi yaitu konformasi dan posisi ligan serta pengikatannya. Kedua yaitu metode pengambilan sampel serta skema analisis akhir (Meng, et.al., 2011).

Uji *in silico* dilakukan untuk memprediksi aktivitas molekul dengan sel target yang dipilih dengan cara melakukan *docking*. *Docking* bertujuan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan suatu molekul kecil (ligan) ke dalam sel target yaitu molekul besar (protein). Hasil dari *docking* ini berupa nilai *Rerank score* (RS) atau nilai energi. *Docking* ini sangat penting dalam dunia medis dalam merancang, optimasi serta menemukan obat (Hardjono, 2015).


Terdapat beberapa *software* yang digunakan dalam *molecular docking* yaitu *discovery studio* yang dapat digunakan untuk mengedit, visualisasi, membuka dan melakukan analisis data. *AutoDock Vina* yang digunakan untuk melakukan *scoring* atau *screening* virtual. *PyMOL* yang digunakan untuk menampilkan gambar 3D serta untuk memahami struktur biologi. Serta situs *website* yaitu PDB (*Protein data bank*) (<https://www.rcsb.org/>) yang digunakan untuk mengunduh makromolekul biologis. PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) yang digunakan untuk mengunduh struktur 3D senyawa ligan atau senyawa kimia yang digunakan dalam penambatan. *Pass Server* (Way2Drug) (<https://www.pharmaexpert.ru/passonline/>) yang digunakan untuk bioaktivitas dari senyawa tersebut (Widodo, dkk., 2018).

Menurut Stefaniu (2019) terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk mempelajari *Molecular docking* yaitu sebagai berikut:

1. Preparasi ligan, optimalisasi ligan dan analisis struktur 3D. Diantara beberapa konformer ligan yang digunakan adalah yang paling stabil.

2. Preparasi reseptor. Penggunaan protein harus fleksibel dalam mengikat ligannya sehingga molekul air harus di lepaskan sebelum melakukan penambatan.
3. Identifikasi *binding site*. Langkah ini memiliki peranan penting dalam merancang obat dengan komputasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa lokasi yang mengikat dan memprediksi reseptor.

G. Kerangka pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Ilmiah

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk mengetahui penambatan ligan dari senyawa pada daun miyana (*Coleus blumei*) terhadap reseptor yang berperan penting dalam menyebabkan resistensi pada *Staphylococcus aureus* yaitu *protein methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin - binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')* dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* dengan menggunakan metode *molecular docking*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan Agustus-Oktober 2020.

C. Variabel Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu potensi kandungan senyawa pada daun miyana (*Coleus blumei*) yang dapat di jadikan antibiotik bakteri resisten MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*).

D. Definisi Operasional Penelitian

Adapun definisi operasional dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Miyana (*Coleus blumei*) merupakan tanaman yang mengandung senyawa yang memiliki khasiat dan dapat dijadikan tanaman herbal. Terutama pada bagian daun yang mengandung senyawa yang dapat dijadikan sebagai antibiotik.
2. Bakteri resisten merupakan bakteri yang memiliki pertahanan terhadap beberapa antibiotik salah satunya yaitu bakteri MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*). MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) adalah *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik yang disebabkan karena adanya ekspresi dari *penicillin binding protein* (PBP2a) dengan afinitas yang sangat rendah terhadap antibiotik khususnya golongan β -laktam

E. Instrument Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop ASUS X441B dengan spesifikasi RAM DDR 4G, Processor AMD Dual Core A9-9425. Up to 3.7 GHz, memory 4GB serta laptop terhubung dengan koneksi internet MIFI Andromax M3Z.

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu aplikasi PyRx 0.8, Discovery Studio 2019 Client, PyMOL, situs website Pass Server (Way2Drug) (<https://www.pharmaexpert.ru/passonline/>), situs website SWISSADME (<http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2/>) dan Screening data mining dengan situs PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dan PDB (Protein data bank) (<https://www.rcsb.org/>).



2. Bahan



Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

- 2.1 Struktur 3D dan 2D dari senyawa hasil GCMS daun miyana (*Coleus blumei*).

Adapun senyawa ligan yang digunakan dan telah diunduh dengan format sdf pada situs website PubChem adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.1 Daftar senyawa ligan yang digunakan

| No | Nama ligan | Struktur 3D Ligan |
|----|---|---|
| 1 | <i>Hexahydro - 3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-</i> |  |
| 2 | <i>2-methylthiophene</i> |  |



| | | |
|---|------------------------------|---|
| 3 | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> |  |
| 4 | <i>Octadecane</i> |  |
| 5 | <i>Dotriacontan</i> |  |
| 6 | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> |  |
| 7 | <i>Aristolone</i> |  |
| 8 | <i>Triacontane</i> |  |

Adapun senyawa yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Hexahydro-3H-1[2'-trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-, 2-methylthiophene, Z)-3-heptadecen-5-yne, Octadecane, dotriacontane, hexadecahydro-pyrene, aristolone, triacontane*. Struktur 3D dan 2D dari senyawa tersebut yang diunduh melalui situs *website* PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dalam bentuk SDF.

2.2 Struktur 3D ligan kontrol

Adapun senyawa ligan kontrol yang digunakan dan telah diunduh dengan format sdf melalui situs *website* PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dalam bentuk SDF adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2. 2 Daftar senyawa ligan kontrol yang digunakan yang telah di unduh di situs PubChem dalam bentuk sdf



| No | Nama ligan | Sruktur 3D Ligan |
|----|---|--|
| 1 | <i>Pnm C₁₆ H₂₀ N₂ O₄ S</i> |  |
| 2 | <i>Ion Cadmium</i> | Cd^{++} |
| 3 | <i>2r,4s)-5,5-Dimethyl-2-[(1r)-1-[(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Yl)Carbonyl] Amino]-2-Oxoethyl]-1,3-Thiazolidine-4-Carb Oxylic Acid</i> |  |


Adapun senyawa yang digunakan sebagai ligan kontrol yaitu Pnm $C_{16}H_{20}N_2O_4S$ sebagai kontrol pada *protein Methicillin resistant mecR1*, Ion cadmium sebagai kontrol dari *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dan *2r,4s)-5,5-Dimethyl-2-[(1r)-1-[(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Yl)Carbonyl] Amino]-2-Oxoethyl]-1,3-Thiazolidine-4-Carb Oxylic Acid* sebagai kontrol dari *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*

2.3 Bank Data Protein

Adapun reseptor target (Makromolekul) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *protein Methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* yang di unduh melalui situs *website PDB (Protein Data Bank)* (<https://www.rcsb.org/>).

Tabel 3.2.2. 3 Daftar makromolekul (Protein) target

| No | Nama makromolekul | Struktur 3D Makromolekul |
|----|---|--|
| 1 | <i>Protein mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')</i> |  |
| 2 | <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> |  |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <i>Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> |  |
|---|--|--|


F. *Prosedur Kerja*

Adapun prosedur kerja dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. *Screening* data mining (Pencarian struktur tiga dimensi dan dua dimensi serta prediksi aktivitas biologi)

1.1 Pencarian struktur 3D dan 2D Ligan


Adapun prosedur kerja dalam mencari struktur ligan 3D dan 2D yaitu senyawa dari *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]-, 2-methylthiophene, Z)-3-heptadecen-5-yne, Octadecane, dotriacontane, hexadecahydro- pyrene, aristolone, triacontane* di cari di situs *website* PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) lalu didownload dalam bentuk SDF.



Gambar 3.1. 1 situs *website Pubchem*
 Sumber : <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>

1.2 Pencarian struktur makromolekul target


Adapun prosedur kerja dalam mencari struktur makromolekul target yaitu pertama-tama ditentukan makromolekul yang akan menjadi target reseptor yaitu *protein Methicillin resistant mecR1*, *Mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')* dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*. Kemudian diunduh dalam bentuk format *pdb melalui situs *website PDB (Protein data bank)* (<https://www.rcsb.org/>)



Gambar 3.1 2 situs *website PDB (Protein Data Bank)*
 Sumber: <https://www.rcsb.org/>

1.3 Prediksi aktivitas biologi

Adapun prosedur kerja dalam mencari prediksi aktivitas biologi yaitu dengan menyalin *canonical SMILES* yang terdapat pada masing-masing senyawa yang telah dicari di *website* PubChem. Kemudian *canonical SMILES* tersebut dimasukkan kedalam kolom *get prediction* pada Way2Drug (<http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>). Serta dapat dicari di situs *website* SWISSADME (<http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2/>).



Gambar 3.1 3 situs *website* Way2Drug

Sumber: <http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>

2. Preparation (Penyiapan Struktur Ligan dan Makromolekul)

2.1 Preparation Ligan

Adapun prosedur kerja dalam penyiapan ligan dilakukan dengan menggunakan *autodock tools*. Dengan cara ligan yang telah diunduh dalam format SDF diinput kedalam *autodock tools* pada aplikasi PyRx 0.8 yaitu pada *open babel*

kemudian senyawa ligan tersebut di *minized selected* lalu di *convert to pdb* kemudian disimpan dalam bentuk format *pdqt*.

2.2 *Preparation* Makromolekul

Adapun prosedur kerja dalam penyiapan makromolekul dilakukan dengan menggunakan *Discovery studio*. Dengan cara protein yang telah diunduh dalam format *pdb* diinput kedalam pada aplikasi *Discovery studio* kemudian dipisahkan dari senyawa lainnya selain protein dan *active site* lalu disimpan dalam bentuk format *pdb*.

3. Penambatan molekul dan *scoring*

Adapun prosedur kerja dalam penambatan molekul dilakukan dengan menggunakan *PyRx 0.8* dengan cara ligan dan makromolekul (protein) yang telah dipreparasi dan diunduh dalam format *pdb* ditambahkan kedalam *vina wizard* yang terdapat pada aplikasi *PyRx 0.8* kemudian diklik *forward* lalu ditempatkan *grid box* disesuaikan dengan *active site* setiap protein setelah itu dilanjutkan *forward* dan ditunggu hasil *scoring*nya kemudian hasil tersebut disimpan.

4. Analisis hasil penambatan (*scoring*)

Adapun prosedur kerja dalam analisis hasil penambatan dilakukan dengan menggunakan *PyMOL* dan *Discovery studio*. Dengan menggunakan hasil *scoring* yang telah dilakukan. Adapun prosedur kerja dalam visualisasi interaksi ikatan dalam bentuk 3D dan 2D dilakukan menggunakan *software Discovery studio* dengan cara hasil analisis pada *PyMOL* yang telah disimpan dalam bentuk *pdb* diinput kedalam *Discovery studio* kemudian dilihat interaksinya secara 3D dan 2D.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penambatan makromolekul dan ligan

Penambatan makromolekul dengan ligan menggunakan *Autodock vina* yang terdapat pada *software PyRx*. Adapun hasil dari penambatan makromolekul dan ligan adalah sebagai berikut.


Tabel 4. 1 Nilai afinitas energi pengikatan (*Binding affinity*)

| Makromolekul | Ligan | Binding affinity ΔG_{bind} (kcal/mol) | Root Mean Square Deviation Lower bound (RSMD) | Root Mean Square Deviation Upper bound (RSMD) |
|---|---|---|--|--|
| <i>Protein mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')</i> | <i>Ion cadmium (kontrol)</i> | -10,3 | 2,8 | 3,38 |
| | <i>Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]-</i> | -9,0 | 1,981 | 2,169 |
| | <i>2-methylthiophene</i> | -3,5 | 0,89 | 2,685 |
| | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> | -4,1 | 16,38 | 19,146 |
| | <i>Octadecane</i> | -5,0 | 1,455 | 2,463 |
| | <i>Dotriacontan</i> | -5,2 | 2,00 | 5,652 |
| | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | -7,4 | 1,85 | 2,09 |
| | <i>Aristolone</i> | -6,8 | 1,674 | 2,16 |
| | <i>Triacontane</i> | -4,8 | 1,147 | 6,898 |
| | | <i>Pnm C₁₆ H₂₀ N₂ O₄ S (Penicillin)</i> | -8,0 | 2,598 |


| | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Protein Methicillin resisten mecRI</i> | Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]- | -8,3 | 1,446 | 2,334 |
| | <i>2-methylthiophene</i> | -3,1 | 1,537 | 2,587 |
| | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> | -4,1 | 1,819 | 5,793 |
| | <i>Octadecane</i> | -3,8 | 1,007 | 1,931 |
| | <i>Dotriacontan</i> | -4,0 | 1,8872 | 4,545 |
| | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | -5,9 | 1,775 | 2,515 |
| | <i>Aristolone</i> | -6,1 | 2,176 | 3,346 |
| | <i>Triacontane</i> | -4,2 | 1,599 | 9,351 |
| <i>Oxacilloyl-acylated mecRI extracellular antibiotic-sensor</i> | <i>2r,4s)-5,5-Dimethyl-2-[(1r)-1-[(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-yl)Carbonyl]Amino]-2-Oxoethyl]-1,3-Thiazolidine-4-Carb Oxylic Acid</i> | -8,0 | 2,47 | 6,89 |
| | Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]- | -8,1 | 2,02 | 3,42 |
| | <i>2-methylthiophene</i> | -2,9 | 1,693 | 2,639 |
| | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> | -3,6 | 1,996 | 4,624 |
| | <i>Octadecane</i> | -3,8 | 0,785 | 4,444 |
| | <i>Dotriacontan</i> | -3,8 | 1,557 | 5,215 |
| | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | -6,3 | 1,001 | 4,193 |
| | <i>Aristolone</i> | -6,0 | 1,542 | 2,623 |
| | <i>Triacontane</i> | -3,8 | 1,43 | 6,835 |

2. Visualisasi interaksi ligan dan protein


- a. Penambatan *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') dengan senyawa ligan




Gambar 4.2.a. 1 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2').




Gambar 4.2.a. 2 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Aristolone* dengan *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2').




Gambar 4.2.a. 3 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *hexadecahydro-pyrene* dengan mutan *penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.




Gambar 4.2.a. 4 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Dotriacontane* dengan mutan *penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.




Gambar 4.2.a. 5 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Octadecane* dengan mutan *penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.



Gambar 4.2.a. 6 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Triacontane* dengan *mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.




Gambar 4.2.a. 7 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Z-3-heptadecen-5-yne* dengan *mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.




Gambar 4.2.a. 8 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *2-methylthiophene* dengan *mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*.


b. Penambatan *Protein Methicillin resisten mecR1* dengan senyawa ligan




Gambar 4.2.b. 1 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 2 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Dotriacontane* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 3 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *2-methylthiophene* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 4 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Octadecane* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 5 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Triacontane* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*



Gambar 4.2.b. 6 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Aristolone* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 7 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Z*-3-heptadecen-5-yne dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*




Gambar 4.2.b. 8 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Hexadecahydro-pyrene* dengan *Protein Methicillin resisten mecR1*


c. Penambatan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* dengan senyawa ligan




Gambar 4.2.c. 1 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*




Gambar 4.2.c. 2 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *2-methylthiophene* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*




Gambar 4.2.c. 3 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Octadene* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*




Gambar 4.2.c. 4 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Aristolone* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*




Gambar 4.2.c. 5 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Z)-3-heptadecen-5-yne* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*



Gambar 4.2.c. 6 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Dotriacontane* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*



Gambar 4.2.c. 7 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Triacontane* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*



Gambar 4.2.c. 8 (a) visualisasi 2D; (b). visualisasi 3D interaksi *Hexadecahydro-pyrene* dengan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor*

3. Analisis *Lipinski rule of five***Tabel 2** hasil Analisis *Lipinski rule of five* senyawa ligan

| No | Komponen senyawa | Mass | hydrogen bond donor | hydrogen bond acceptors | LOGP | Molar Refractivity |
|----|--|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4"-trifluoromethylphenyl]- | 416.000000 | 0 | 3 | 5.479492 | 92.053993 |
| 2 | <i>2-methylthiophene</i> | 98.000000 | 0 | 0 | 2.056520 | 29.055996 |
| 3 | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne,</i> | 234.000000 | 0 | 0 | 5.876901 | 79.050980 |
| 4 | <i>Dotriacontane</i> | 450.000000 | 0 | 0 | 10.047289 | 177.057938 |
| 5 | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | 232.000000 | 0 | 0 | 4.542430 | 86.211990 |
| 6 | <i>Aristolone</i> | 218.000000 | 0 | 1 | 3.593999 | 64.972977 |
| 7 | <i>Triacontane</i> | 422.000000 | 0 | 0 | 9.434709 | 166.123947 |
| 8 | <i>Octadecane</i> | 254.000000 | 0 | 0 | 7.267802 | 85.219963 |

B. Pembahasan

Daun miyana (*Coleus bumei*) merupakan tanaman herbal yang sangat diminati dan disukai oleh masyarakat. Selain mudah didapatkan, miyana (*Coleus blumei*) ini mengandung senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh salah satunya untuk dijadikan obat asma dan dapat dijadikan antibiotik. Terdapat metode yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dari suatu senyawa terhadap suatu infeksi penyakit yang diakibatkan karena adanya infeksi mikroba resisten secara

visualisasi yaitu dengan menggunakan metode *in silico*. *In silico* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari kandidat senyawa dari suatu obat. *Molecular docking* adalah salah satu pemodelan komputasi yang berasal dari struktur kompleks yang terbentuk dari dua atau lebih suatu interaksi molekuler.

1. Preparasi dan prediksi aktivitas biologi

Struktur makromolekul yang diperoleh dari PDB (*Protein data bank*) didapatkan hasil bahwa terdapat tiga protein yang digunakan sebagai makromolekul reseptor yaitu *protein methicillin resistant mecR1* pada strain 27r *Staphylococcus aureus* resisten *methicillin* dengan identitas 2IWC yang diperoleh dari difraksi sinar-X dengan resolusi 1.80 Å, *Mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP2') pada *Staphylococcus aureus* subs. N315 dengan identitas 1VVQ yang diperoleh dari difraksi sinar-X dengan resolusi 2.10 Å, dan *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* pada *Staphylococcus aureus* dengan identitas 2IWD yang diperoleh dari difraksi sinar-X dengan resolusi 2.40Å. Dalam pengunduhan makromolekul terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu protein tersebut memiliki *ramachandran outliers* yang mendekati 0 (mendekati warna biru) hal ini dikarenakan protein ini memiliki keakuratan yang terbaik.

Struktur makromolekul tersebut telah terikat oleh molekul penambat yaitu air dan ligan kontrol yaitu Pnm C₁₆ H₂₀ N₂ O₄ S sebagai kontrol pada *protein methicillin resistant mecR1*, Ion kadmium sebagai kontrol dari *mutan penicillin-binding protein 2a* (PBP2a atau PBP 2') dan *2r,4s)-5,5-Dimethyl-2-[(1r)-1-[(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Yl)Carbonyl] Amino}-2-Oxoethyl]-1,3-Thiazolidine-4-Carb Oxylic Acid*

sebagai kontrol dari *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* yang dapat mengganggu jalannya proses *docking* sehingga molekul air dan ligan kontrol tersebut harus dihilangkan dengan cara di preparasi pada *Discovery studio*. Hal ini sesuai dengan teori Muttaqin, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa molekul air dapat mengganggu proses simulasi *docking* sehingga molekul air tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan interaksi yang berlangsung saat proses *docking* adalah ligan dan reseptor.

Prediksi aktivitas biologi dapat diketahui dengan cara mencari di situs dengan menggunakan situs *website SWISSADME* (<http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2/>) dan juga *Way2Drug* (<http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>). Hasil yang didapatkan adalah dari ke delapan senyawa uji yaitu terdapat 7 senyawa yang dapat dikatakan akurat dan baik yaitu *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-, Z)-3-heptadecen-5-yne, Octadecane, dotriacontane, hexadecahydro-pyrene, aristolone, triacontane* dengan nilai P_a lebih besar dibandingkan nilai P_i . Sedangkan terdapat 1 senyawa yang tidak akurat yaitu *2-methylthiophene* hal ini dikarenakan nilai dari nilai *Probability activity* (P_a) dan *Probability in activity* (P_i) yang kurang dari 7. Hal ini sesuai dengan teori Widodo, dkk (2018) yang menyatakan senyawa lain yang telah diketahui potensinya berdasarkan gugus fungsinya maka senyawa baru dapat diketahui dan diprediksi potensinya dengan menggunakan gugus fungsi dari senyawa yang lain dengan menggunakan *Pass Server* (<http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>). Hasil prediksi dapat dikatakan baik, akurat serta memungkinkan aktivitas senyawa secara

eksperimental tinggi yaitu apabila nilai dari nilai *Probability activity* (P_a) lebih dari 0,7 ($P_a > 0,7$) kemudian nilai dari *Probability activity* (P_a) lebih rendah dibandingkan *Probability in activity* (P_i) ($P_a > P_i$).

2. Penambatan makromolekul dengan ligan

Penambatan makromolekul dengan ligan dilakukan dengan menggunakan *autodock vina* yang terdapat pada *PyRx*. Protein dan ligan yang digunakan pada tahap ini telah di optimasi di mana protein dioptimasi dengan menggunakan *discovery studio* sedangkan ligan dengan *open babel* yang terdapat pada aplikasi *PyRx*. Selanjutnya dilakukan *docking* dengan cara memasukkan protein dan ligan pada *vina wizard* kemudian dilakukan *forward* lalu dilakukan pencarian optimum global dengan *local search* atau pencarian optimum terlokalisasi. Masing-masing volume *grid box* yang digunakan berbeda antara satu protein dengan protein lainnya. Volume *grid box* yang digunakan untuk protein dengan kode protein 1VQQ: ($x=1,64$ $y=36,8$ dan $z=47,9$), 2IWC: ($x=27,9439$ $y=6,38$ dan $z=87,19$), dan 2IWD: ($x=28,07$ $y=6,12$ dan $z=85,9$).

Dari keseluruhan proses penambatan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dari kedelapan senyawa uji yang telah ditambatkan dengan ketiga protein target terdapat satu senyawa yang berpotensi sebagai antibiotik antibiotik resisten MRSA (*Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*) yaitu *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan hasil *scoring* mendapatkan nilai energi bebas pengikatan ΔG_{bind} yang paling kecil dibandingkan senyawa uji lainnya yaitu -9,0, -8,3 dan -8,1. Hal ini sesuai dengan teori Riswanto

(2018) dan Kartasasmita (2009) yang mengemukakan bahwa semakin kecil hasil *scoring* atau nilai energi bebas pengikatan ΔG_{bind} dari suatu senyawa ligan uji dengan makromolekul reseptor maka semakin tinggi tingkat afinitas dari senyawa ligan terhadap makromolekul reseptornya yang artinya kompleks ligan dan reseptor tersebut akan semakin stabil dan apabila semakin rendah nilai ΔG_{bind} maka reaksi yang terjadi berjalan spontan. Penambatan ligan dan makromolekul dapat dikatakan baik jika nilai dari *Root Mean Square Deviation* (RMSD) memiliki nilai yang lebih kecil dari ligan *copy* atau sama dengan dua. $\Delta G < 0$ (reaksi akan berlangsung secara spontan), $\Delta G = 0$ (reaksi akan berjalan reversible) dan $\Delta G > 0$ (reaksi tidak berjalan)

Nilai dari energi ikatan atau *Rerank score* menunjukkan hasil jumlah dari energi yang dibutuhkan dalam membentuk suatu ikatan antara ligan dan reseptor. Nilai *rerank score* (RS) yang dihasilkan semakin kecil mengindikasikan ikatan tersebut akan semakin stabil. Apabila ikatan ligan dan reseptor semakin stabil maka dapat diprediksi aktivitasnya juga semakin tinggi (Hardjono, 2015).

Tujuan dari *scoring* atau penilaian terhadap hasil penambatan yaitu untuk mengetahui senyawa mana yang memiliki efektivitas pada makromolekul reseptor. Dalam penililaian ini dapat dilihat dari beberapa komponen energi seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, efek hidrofobik serta entropi pengikat (Meng et.al, 2012).

3. Analisis dan visualisasi hasil penambatan

Analisis dan visualisasi hasil penambatan dapat diketahui berdasarkan nilai ΔG_{bind} yang didapatkan dari hasil penambatan yang telah dilakukan pada *software PyRx* kemudian hasil *docking* tersebut harus dibentuk dalam keadaan kompleks


dengan reseptor dengan menggunakan *PyMOL* setelah itu visualisasi dapat dilakukan pada *Discovery studio 2019 client* dengan cara melihat interaksi antara ligan dengan makromolekul.

Tujuan dari penambatan makromolekul dan ligan yaitu untuk membantu dalam mempelajari suatu obat baik interaksinya, kecocokan situs aktif pada protein serta menghitung energi interaksi dari ligan untuk menentukan ligan yang memiliki efektivitas yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk mencapai konformasi yang optimal dari interaksi ligan dan makromolekul (Namita, et.all, 2011).

Berdasarkan hasil penambatan antara kedelapan ligan uji dan protein target yaitu *Mutan penicillin-binding protein 2a*, *Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* dan *Protein Methicillin resisten mecR1* diketahui bahwa ligan yang berpotensi sebagai kandidat antibiotik resisten MRSA (*Methicillim Resistent Staphylococcus aureus*) yaitu senyawa *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan mekanisme yang dijelaskan pada **gambar 4.B**.

Mekanisme dari senyawa *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* dalam menangani resistensi dapat diketahui dari hasil penambatan molekuler ligan ini dengan protein *mecR1*. Protein *mecR1* merupakan protein sensor membran yang mendeteksi keberadaan β -lactam yang bertindak sebagai induser aktivasi gen *mecA* yang mengkode sintesis PBP2a. Aktivasi gen *mecA* ditekan oleh *mecI* sebagai repressor yang mengikat pada situs promotor dan memblok transkripsi *mecA* (Peacock dan Paterson, 2015). Berdasarkan visualisasi hasil penambatan diketahui ligan senyawa *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -*

6' [4''-trifluoromethylphenyl]- menambat pada sisi aktif protein MecR1. Penambatan ini menyebabkan inaktivasi dari mecR1 melalui mekanisme inhibitor kompetitif, sehingga mecI tetap mengikat pada promotor dan memblok transkripsi gen MecA untuk sintesis protein PBP2a. Mekanisme resistensi MRSA dan peran *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* mengatasi resistensi dapat dilihat pada **gambar 4.b**



Gambar 4.B. (1). Mekanisme resistensi MRSA (a); β -laktam dideteksi oleh PBD (*penicillin binding domain*) pada mecR1; (b) aktivitas *autolysis* MPD (*metalloproteins domain*) pada mecR1 terpicu dan memediasi lisis mecI; (c) fragmen dinding sel, yang sebelumnya terjadi karena terganggu oleh β -laktam bertindak sebagai ko-aktivator mengikat pada mecI dan mengganggu pengikatan mecI pada operator dan mendorong proteolysis mecI; (d) degradasi mecI menyebabkan transkripsi mecA dan mengekspresikan protein PBP2a. (2). Ketika Ligan *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* menambat pada sisi aktif mecR1, aktivitas sensor mecR1 terganggu sehingga lisis mecI tidak terjadi. mecI tetap terikat pada operator dan memblok transkripsi mecA untuk sintesis PBP2a.

Protein PBP2a merupakan protein inducibel yang meregulasi resistensi metisilin. Berdasarkan hasil visualisasi penambatan senyawa *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* pada protein PBP2a, diketahui ligan tidak menambat pada sisi aktif protein PBP2a tetapi menambat pada sisi alosterik. Menurut sumber Lim and Strynadka (2002), struktur kristal protein PBP2a menunjukkan konformasi sisi aktif yang tertutup oleh aktivitas transpeptidase. Struktur ini tidak memberikan akses pada antibiotik β -laktam menuju sisi katalitik Ser403 sehingga sintesis dinding sel tetap terjadi. Ketika ligan menambat pada sisi alosterik menyebabkan konformasi protein target berubah dan membuka sisi katalitik residu Ser403, memungkinkan antibiotik mencapai sisi katalitik dan menghambat sintesis dinding sel *Staphylococcus aureus* (Shalabi dkk, 2020).

Senyawa *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* akan masuk ke dalam sel bakteri melalui dinding sel kemudian akan mengeluarkan sinyal kimiawi yang akan di tangkap oleh situs aktif dari protein target. Kemudian *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* akan terikat pada situs aktif dari protein target kemudian terjadi proses transduksi yang diawali dengan adanya perubahan konformasi dari protein. Kemudian setelah proses transduksi selesai maka akan menghasilkan respon berupa terhambatnya proses katalis yang menyebabkan tidak terbentuknya PBP2a.

Menurut Susilowati (2019) penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi berlangsung dengan cara molekul sinyal terikat pada protein reseptor yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dari protein. Adanya perubahan konformasi ini

merupakan transduksi awal sinyal. Terdapat 4 komponen dasar dari komunikasi sel yaitu stimulus sel yang berupa molekul kimia, reseptor atau penerima sinyal, transduser dan respons sel.

Tahap pensinyalan terdiri dari 3 tahapan yaitu penerimaan, transduksi dan respon. Tahap penerimaan sinyal yaitu pendeteksian sinyal yang datang oleh sel target. Sinyal kimiawai terdeteksi. Pada tahap pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor dan menginisiasi proses transduksi. Di mana pada tahap transduksi terjadi perubahan sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon. Respon dapat berupa aktivitas katalis (Kurniati, 2020).

3. Analisis *Lipinski Rule of five*

Analisis *Lipinski Rule of five* digunakan untuk mengetahui suatu senyawa dapat diserap oleh tubuh atau tidak dengan menentukan sifat fisikokimia suatu senyawa saat melintasi membrane sel di dalam tubuh. Adapun hasil analisis senyawa uji dengan menggunakan *Lipinski Rule of five* (<http://www.scfbio-iitd.res.in/software/drugdesign/lipinski.jsp>) didapatkan hasil bahwa dari kedelapan ligan uji hanya satu ligan yang memenuhi syarat dari *Lipinski Rule of five* yaitu *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-* dengan berat molekul 416, memiliki gugus hidrogen donor 0, hidrogen aseptor 3, molar *Molar Refractivity* 92.053993 dan LogP 5.479492. Adapun syarat *Lipinski Rule of five* yaitu senyawa ligan memiliki berat molekul <500 Da, ikatan hidrogen donor <5, ikatan hidrogen akseptor <10, nilai logP<5, serta *Molar Refractivity* antara 40-130.

Menurut Adriani (2018) ligan akan lebih mudah menembus membran sel dengan berat molekul <500 Da dibandingkan ligan dengan berat molekul >500 Da. Nilai $\log P < 5$ lebih efektif dibanding ligan dengan nilai $\log P > 5$ dikarenakan ligan dengan nilai $\log P > 5$ akan lebih mudah menembus membran sel pada lapisan lipid bilayer dan tersebar keseluruh tubuh yang akan mengakibatkan toksisitas meningkat dan sensitifitas dari ligan terhadap protein target berkurang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari kedelapan senyawa ligan uji yaitu *Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4'' trifluoromethylphenyl]-, 2-methylthiophene, Z)-3-heptadecen-5-yne, Octadecane, Aristolone Dotriacontan, Triacontane dan Hexadecahydro-pyrene* yang telah ditambatkan dengan ketiga protein yaitu *mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP2')*, *Protein Methicillin resisten mecR1, Oxacilloyl-acylated mecR1 extracellular antibiotic-sensor* didapatkan hasil bahwa senyawa *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* berpotensi sebagai antibiotik MRSA (*Methicillin resistant Staphylococcus aureus*). Berdasarkan visualisasi hasil penambatan yang telah dilakukan senyawa *Hexahydro - 3H - 1 [2'trifluoromethyl] -6' [4''-trifluoromethylphenyl]-* menambat pada sisi aktif protein mecR1. Penambatan ini menyebabkan inaktivasi dari mecR1 melalui mekanisme inhibitor kompetitif, sehingga mecI tetap mengikat pada promotor dan memblok transkripsi gen mecA untuk sintesis protein PBP2a.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan adanya uji in vitro dan in vivo terkait penelitian ini.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

Adriani. "Prediksi senyawa Bioaktif Dari Tanaman Sanrego (*Lunasia Amara*) Sebagai Inhibitor Enzim *Siklooksigenase-2* (Cox-2) Melalui Pendekatan *Molecular Docking*." *Jurnal Ilmiah Pena*, vol. 1 no.1 (2018): h. 6–11.

Anita., Arisanti, D., Fatmawati. "Jurnal Ilmu Alam Dan Lingkungan." *Ilmu Alam Dan Lingkungan*, vol. 18 no.9 (2018): h. 61–73.

Asri., Chairani, R. "Identifikasi MRSA Pada Diafragma Stetoskop Di Ruang Rawat Inap Dan HCU Bagian Penyakit Dalam." *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol.6 no.2 (2017): h. 239-250.

Athar, M. "First Protein Drug Target's Appraisal of Lead-Likeness Descriptors to Unfold the Intervening Chemical Space." *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol.72, (2017): p. 272–82.

Basir, B., Isnansetyo, A., Istiqamah, I., Firmansyah. "Toksisitas Daun Miana (*Coleus scutellarioides* (L) Benth) Sebagai Antibakteri Pada Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*)". *Journal of Fisheries and Marine Science*, vol.2, no.1 (2020): h.56-61.

Dana, H., Chalbatani, G., Gharagouzloo, E., Memari, F., Rasoolzadeh, R., Marmari. "In Silico Analysis, Molecular Docking, Molecular Dynamic, Cloning, Expression and Purification of Chimeric Protein in Colorectal Cancer Treatment." *Drug Design, Development and Therapy*, vol.14 (2020): p. 309–29.

Deurenberg, R.H., and Stobberingh E.E. "The Evolution of *Staphylococcus Aureus*." *Infection, Genetics and Evolution*, vol.8, no.6 (2008): p.747–863

Džidić, S., Suskovic, J., Kos, B. "Antibiotic Resistance Mechanisms in Bacteria: Biochemical and Genetic Aspects." *Food Technology and Biotechnology*, vol. 46 no.1 (2008): p. 11–21.

Fishovitz, J., Hermoso, J., Chang, M., Mobashery, S. "Critical Review Penicillin-binding Protein 2a of Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*". *International Union of Biochemistry and Molecular Biology*. vol. 66 no. 88 (2014) : 572-577.

Foscato, M and Jensen, V. "Automated in Silico Design of Homogeneous Catalysts". *American Chemical Society*, vol. 10 (2020):p. 2354–2377.

Hadis Riwayat Muslim No. 4048

Hamidah, M., Moektiwardoyo, M., Abdassah, M. "Review Artikel: Senyawa Aktif

- Antiinflamasi Daun Jawer Kotok (*Plectranthus Scutellarioides* (L.) R.Br.)” *Farmaka*, vol. 17 no. 1 2019, 2019): h. 89–91.
- Hardjono, S. “Prediksi Sifat Farmakokinetik, Toksisitas dan Aktivitas Sitotoksik Turunan N-Benzoil-N’-(4-Fluorofenil)Tiourea sebagai Calon Obat Antikanker Melalui Pemodelan Molekul (*Prediction of Pharmacokinetic Properties, Toxicity and Derivatives as Anticancer Drugs.*” *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, vol. 14 no. 2 (2015): h. 246–55.
- Haryanto, Sugeng. *Ensiklopedia Tanaman Obat Indonesia*. Bogor: Penerbit Palmall, 2012.
- Hellen, G., Molly K., Pant, S., Gandra, S., Levinson, J., Barter, D., White, A., Laxminarayan, R. *The State Of The World’s Antibiotics 2015*. Washington, D.C: Center For Disease Dynamics, Economics & Policy:2015.
- Hiroi, M., Kawamori, F., Sano, Y., Miwa, N., Sugiyama, K., Kudo, Y., Masuda, T. “Antibiotic Resistance in Bacterial Pathogens from Retail Raw Meats and Food Producing Animals in Japan.” *Journal of Food Protection*, vol. 75 no. 10 (2012): p. 1774–1782.
- Kartasasmita, RE, Herowati, R, Harmastuti N, Gusdinar T. " Quercetin derivatives penambatan based on study of flavonoids interaction to cyclooxygenase-2 penambatan turunan kuersetin berdasarkan studi interaksi flavonoid terhadap enzim". *Indo. J.chem*, vol 9 no.2 (2009): h. 297–302.
- Khaerunnisa., suhartati., Awaluddin. *Penelitian In Silico Untuk Pemula*. Surabaya: Airlangga university press, 2020.
- Khusnan., Kusmanto, D., Slipranata, M. “Resistance of Antibiotics and Detection of Gene Encoding Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Isolated from Broiler in Yogyakarta.” *Jurnal Kedokteran Hewan - Indonesian Journal of Veterinary Sciences*, vol.10 no.1 (2016): p.13–18.
- Kemalapuri, Wahyu, D., Jannah, S., Budiharjo, A. “Deteksi Mrsa (*Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus*) pada Pasien Rumah Sakit dengan Metode Maldi-Tof Ms dan Multiplex PCR.” *Jurnal Biologi*, vol. 6 no.4 (2017): h. 51–61.
- Kurniati, T. *BIOLOGI SEL*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2020.
- Lim, D and Strynadka, N.C.J "Stuvtural basis for the β -Laktam resistance of PBP2a From *Methicillin Resistent Staphylococcus aureus*". *Nature Struktur Biologi*, vol. 9 no. 12 (2002): p. 870-876.
- Mahmudah., Raisa., Soleha, t., Ekowati, C. “Identifikasi *Methicillin-Resistant*


- Staphylococcus Aureus* (MRSA) Pada Tenaga Medis Dan Paramedis Di Ruang Intensivacare Unit (ICU) Dan Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek” *Medical Journal of Lampung University*, vol. 2, no. 4, (2013): h. 70–78.
- Marrero, A., Fernandez, G., Castellanos, R., Ruth, X. " Unbound and Acylated Structures of the MecR1 Extracellular Antibiotic-sensor Domain Provide Insights into the Signal-transduction System that Triggers Methicillin Resistance". *J. Mol. Biol.* vol. 361 : p. 506-521.
- Masrianto., Fakhurrrazi., Azhari. “Uji Residu Antibiotik Pada Daging Sapi Yang Dipasarkan Di Pasar Tradisional Kota Banda Aceh.” *Jurnal Medika Veterinaria*, vol. 7 no.1 (2013): h. 13–14.
- Meng, X., Zhang, H., Mezei, M., Cui, M. “Molecular Docking: A Powerful Approach for Structure-Based Drug Discovery.” *Current Computer Aided-Drug Design*, vol. 7 no. 2 (2012): p. 146–57.
- Mirza, D. "Studi *In Silico* Dan *In Vitro* Aktivitas Antineuroinflamasi Ekstrak Etanol 96% Daun *Marsilea Crenata C Presl*". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2019.
- Mun, S., Joung, D., Kim, Y., Kang, O., Kim, S., Seo., Y., Kim, Y., Lee, D., Shin, D., Kweon, K., Kwon, D “Synergistic Antibacterial Effect of Curcumin against Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus*.” *Phytomedicine*, vol. 20 (2013): p. 714-718.
- Muttaqin, F., Ismail, Muhammad. "Studi *Molecular Docking*, *Molecular Dynamic*, dan Prediksi Toksisitas Senyawa Turunan Alkaloid Naftiridin Sebagai Inhibitor Protein Kasein Kinase 2-A Pada Kanker LeukemiA". *Jurnal of pharmacasript* vol. 2 no.2 (2019) :p. 1–12.
- Namita, P., Mukesh, R., Kumar, T. "Evaluation of Analgesic Potential of *Kigelia Pinnata* Leaf Extract In". *International Research Journal of Pharmacy* , vol. 2 No.10 (2011): P. 87–89.
- Nurchahaya. "Kajian Etnobotani Tanaman Obat Tradisional Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa ". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauudin, 2018.
- Pakadang, S.R dan Salim,H. “Kombinasi Daun Miana (*Coleus Scutellarioides* (L.) Benth) Dan Rimpang Jahe (*Zingiber Officinale* Rosc.) Sebagai Antibakteri *Streptococcus Pneumonia*, *Staphylococcus Aureus*, *Staphylococcus Epidermidis*, *Klebsiella Pneumonia* Penyebab Batuk.” *Media Farmasi*, vol. 15, no. 1 (2019): h.1-6.

- Peacock, S and Paterson, G. " Mechanisms of Methicillin Resistance in *Staphylococcus aureus*". *The Annual Review of Biochemistry*. vol. 84 (2015): p. 577-601.
- Qalbi, B.M., Djangi, J., Muhaedah. "Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Kloroform Daun Tumbuhan Iler (*Coleus Scutellarioides*, Linn, Benth)." *Jurnal Chemica*, vol. 18, no. 1 (2017): h. 48–55.
- Riswanto, Nofianti, T., Mardianingrum, R., Lestari, T., Sepriliani, A. " Desain dan Studi In Silico Senyawa Turunan Kuwanon-H sebagai Kandidat Obat Anti-HIV". *Jurnal Kimia VALENSI: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia*, vol.4 no.1 (2018): h. 57-66
- Rizal, N.M., Nurhaeni, Ridhay, A. "Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Mayana (*Coleus Atropurpureus [L] Benth*) Berdasarkan Tingkat Kepolaran Pelarut Antibacterial Activity of Mayana Plant Leaf Extract (*Coleus Atropurpureus [L] Benth*) Using Several Levels of Solvent Polarity]. *KOVALEN*, vol.4 no 3 (2015): p. 957–961.
- Roviqowati, F., Widiyastuti, Y., Samanhudi., Yunus, A. "Total Flavonoid Content of Four Iler Accessions (*Coleus Atropurpureus* Benth.) in Karangpandan, Central Java, Indonesia." *Annals of Biology*, vol.35, no.2 (2019): h. 253–257.
- Ruyck, J.D., Brysbaert, G., Blossey, R., Lensink, M. "*Molecular Docking as a Popular Tool in Drug Design , an in Silico Trave*". *Dovepress* (2016): p. 1–11.
- Setiawati, A., Florentinus, D., Yuliani, S. "Retrospective Validation of a Structure-Based Virtual Screening Protocol to Identify Ligands for Estrogen Receptor Alpha and Its Application to Identify the Alpha-Mangostin Binding Pose." *Indonesian Journal of Chemistry*, vol.14, no.2, (2014): p. 103–08.
- Shalaby, M., Dokia, E., Serya, R., Abouzid, M. " Penicillin binding protein 2a: An overview and a medicinal chemistry perspective". *European Journal of Medicinal Chemistry* (2020): p. 1-47.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soares, G., Figuerido, M., Faveri. "Mechanisms of Action of Systemic Antibiotics Used in Periodontal Treatment and Mechanisms of Bacterial Resistance to These Drugs." *Journal of Applied Oral Science*, vol.20 no.3 (2012): h. 295–305.
- Stefaniu, Amalia. *Moleculer Docking and Moleculer Dynamic*. British library cataloguing, 2019
- Steenis, V. FLORA. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.

- Susilowati, R.P. *Kajian Sel dan Molekuler*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2019.
- Surahmaida dan Umarudin. "Identifikasi Dan Analisa Senyawa Kimia Ekstrak Daun Miana (*Coleus Blumei*).” *IPTEK Journal of Proceedings Series*, vol. 1, no. 4 (2019): p. 24–27.
- Verawati., Nofiandi., Rahmawati. "Profil Kandungan Kimia Dan Nilai Toksisitas Lc50 Fraksi Non Polar Daun *Solenostemon scutellarioides* (L) Codd.” *SCIENTIA Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*, vol. 9 no. 1 (2019): h. 7–12.
- Wakhidah, A., Silalahi, M. "Etnofarmakologi Tumbuhan Miana (*Coleus scutellarioides* (L.) Benth) Pada Masyarakat Halmahera Barat, Maluku Utara.” *Pro-Life*, vol.5 no. 2 (2018): h. 567–78.
- Widodo., Utomo, D., Ramadhani, A., Hasanah, A., Fitriah, A. *Cara Mudah Melakukan Docking Dengan PyRx(1)*. Malang: Global Science, 2018.
- Zhu, Q., Xie, X., Lin, H., Sui, S., Shen, R., Yang, Zhongfang, Lu, K., Li, M., Liu, Y. "Isolation and Functional Characterization of a Phenylalanine Ammonia-Lyase Gene (SsPAL1) from *Coleus* (*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd).” *Molecules*, vol.20 no.9 (2015): p. 16833–16851.

LAMPIRAN


1. Tampilan situs *website PubChem, PDB (Protein Data Bank), Pass Server (Way2Drug), dan SWISSADME*




(<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>)



(<https://www.rcsb.org/>)




(<http://pharmaxpert.ru/PASSonline/index.php>)




(<http://lmm.ecust.edu.cn/admetSAR2/>)


2. Tampilan software yang digunakan



Pyrx 0.8



Discovery Studio 2019 Client




PyMOL

3. Prosedur kerja

- 1) *Screening* data mining (Pencarian struktur tiga dimensi dan dua dimensi serta prediksi aktivitas biologi)


a. Pencarian struktur 3D dan 2D Ligan



1. Buka situs *website* *pubchem*



2. Input nama senyawa yang akan di gunakan dalam kolom *search*

3. Kemudian klik hasil pencarian yang telah didapatkan





4. Save 3D *conformer* dari senyawa yang didapatkan dalam bentuk *sdf**

b. Pencarian struktur makromolekul target




1. Buka situs *website PDB (Protein data bank)*

2. Berikut tampilan awal dari situs *website PDB (Protein data bank)*



3. Input nama makromolekul yang akan dicari pada kolom *search*



4. Kemudian klik semua ID yang di munculkan lalu lihat dari *Ramachandra outliers* yang mendekati biru



5. Save file dengan cara mendownload file



2) Preparation (Penyiapan Struktur Ligand dan Makromolekul)

a. Preparation Ligand




1. Buka aplikasi PyRx kemudian klik *open babel* lalu dimasukkan senyawa ligan yang telah diunduh dalam bentuk *3D Conformer*

2. Kemudian klik kanan lalu pilih *minimized selected* atau *all*




3. Kemudian klik ok

4. Kemudian *convert selected to Autodock ligand* atau *all*




5. Kemudian save ligan yang telah di preparasi tadi


b. Preparation Makromolekul




- 1) Membuka software
Discovery studio client
2019



- 2) Klik file pada
pojok kiri layar
lalu klik open




- 3) Pilih file
makromolekul yang
telah diunduh pada
Protein data bank



- 4) Berikut tampilan dari
makromolekul yang
telah dibuka




- 5) Kemudian klik kanan
lalu pilih *colour* lalu
pilih *background*




- 6) Ubah warna
background menjadi
putih lalu klik ok




7) Kemudian klik kanan lalu pilih mouse mode kemudian pilih *rote*



8) Berikut tampilan dari makromolekul setelah diubah *background*






9) Kemudian hilangkan ligan, molekul air, hetatm dan hanya menyisakan protein dan *active site*





10) Kemudian save makromolekul yang telah di preparasi dengan format *protein data bank files*

3) Penambatan molekul dan *scoring*



1. Buka aplikasi *PyRx* lalu klik *vina wizard*
2. Kemudian masukkan file ligand an
3. Kemudian klik *forward*


makromolekul yang telah di preparasi sebelumnya



4. Setelah itu sesuaikan *grid box* nya sesuai dengan *active site* nya lalu klik *forward*
5. Setelah muncul hasil *scoring save* hasil *scoring* dalam bentuk file excel dan dalam bentuk *sdf*

4) Analisis hasil penambatan secara visualisasi


a. Pymol



1. Buka aplikasi
Pymol

2. Klik file lalu open
senyawa ligan
yang telah di
docking


3. Kemudian open
lalu masukkan
makromolekul
yang telah di
docking



4. Kemudian klik file
lalu pilih ekspor
molecule

5. Kemudian pada
selection ubah
enable menjadi all

6. Kemudian ubah
state -1 menjadi 1



7. *Save*

4. Analisis potensi dan sifat senyawa ligan pada daun miyana (*Coleus blumei*) melalui situs *website Way2Drug*

| Senyawa | Probability activity (Pa) | Probability in activity (Pi) |
|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-2-methylthiophene</i> | 0,127 | 0,73 |
| <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> | 0,012 | 0,004 |
| <i>Octadecane</i> | 0,727 | 0,005 |
| <i>Dotriacontan</i> | 0,835 | 0,006 |
| <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | 0,835 | 0,006 |
| <i>Aristolone</i> | 0,735 | 0,030 |
| <i>Triacontane</i> | 0,875 | 0,007 |
| | 0,905 | 0,002 |






5. Analisis potensi dan sifat senyawa ligan pada daun miyana (*Coleus blumei*) melalui situs *website SwissAdme*

| Senyawa | Human Intestinal Absorption | Human oral bioavailability | Carcinogenicity (binary) | Carcinogenicity (trinary) |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <i>Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-2-methylthiophene</i> | + | + | - | Non-required |
| <i>Z)-3-heptadecen-5-yne</i> | + | + | + | Warning |
| <i>Octadecane</i> | + | + | - | Non-required |
| <i>Dotriacontan</i> | + | + | + | Non-required |
| <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | + | + | - | Non-required |
| <i>Aristolone</i> | + | + | - | Non-required |
| <i>Triacontane</i> | + | + | + | Non-required |

6. Lipinski rule


| No | Komponen senyawa | mass | hydrogen bond donor | hydrogen bond acceptors | LOGP | Molar Refractivity |
|----|---|------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | <i>Hexahydro-3H-1[2'trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-</i> | 416.000000 | 0 | 3 | 5.479492 | 92.053993 |
| 2 | <i>2-methylthiophene</i> | 98.000000 | 0 | 0 | 2.056520 | 29.055996 |
| 3 | <i>Z)-3-heptadecen-5-yne,</i> | 234.000000 | 0 | 0 | 5.876901 | 79.050980 |
| 4 | <i>Dotriacontane</i> | 450.000000 | 0 | 0 | 10.047289 | 177.057938 |
| 5 | <i>Hexadecahydro-pyrene</i> | 232.000000 | 0 | 0 | 4.542430 | 86.211990 |
| 6 | <i>Aristolone</i> | 218.000000 | 0 | 1 | 3.593999 | 64.972977 |
| 7 | <i>Triacontane</i> | 422.000000 | 0 | 0 | 9.434709 | 166.123947 |
| 8 | <i>Octadecane</i> | 254.000000 | 0 | 0 | 7.267802 | 85.219963 |

7. Makromolekul (Protein) target yang di preparasi


| Nama makromolekul | Sebelum | Sesudah |
|--|---|---|
| <i>Protein mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP 2')</i> |  |  |
| <i>Protein Methicillin resisten mecR1</i> |  |  |
| <i>Oxacilloyl-acylated MecR1 extracellular antibiotic-sensor</i> |  |  |

8. Hasil visualisasi ligan kontrol

- a. Ligan kontrol *2r,4s*-5,5-Dimethyl-2-[(1*r*)-1-[(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-yl)Carbonyl] Amino]-2-Oxoethyl]-1,3-Thiazolidine-4-Carb Oxylic Acid



- b. Ligan kontrol Pnm $C_{16}H_{20}N_2O_4S$



9. Data mining

- a. Data mining protein

Hasil PDB (*Protein Data Bank*)

- 1) Protein Methicillin resisten mecR1

Metode : X-Ray Diffraction (2iwc)
 Ramachandran outliers : Mendekati Biru/0
 Ligan kontrol : PNM $C_{16}H_{20}N_2O_4S$
 OGFZUTGOGYUTKZ-KWCYVHTRSA-N

2) *Mutan penicillin-binding protein 2a (PBP2a atau PBP 2')* (Ivqq)

Metode : X-Ray Diffraction
 Ramachandran outliers : Mendekati Biru/0
 Ligan control : **CADMIUM ION** (WLZRMICYVCSSEQC
 UHFFFAOYSA-N)
CHLORIDE ION (VEXZGXHMUGYJMC-
 UHFFFAOYSA-

3) *Oxacilloyl-acylated MecR1 extracellular antibiotic-sensor domain (2iwd)*

Metode : X-Ray Diffraction
 Ramachandran outliers : Mendekati Biru/0
 Ligan control : **(2R,4S)-5,5-dimethyl-2-[(1R)-1-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)carbonyl]amino]-2-oxoethyl]-1,3-thiazolidine-4-carb oxylic acid**
 C₁₉ H₂₁ N₃ O₅ S
 QXXMSXCGXIRLPM-ISTRZQFTSA-N

b. Data mining ligan

1. *Hexahydro-3H-1[2'-trifluoromethyl]-6'[4''-trifluoromethylphenyl]-*
Hasil way 2 drug

| | | |
|-------|-------|---|
| 0,127 | 0,107 | Antibacterial, ophthalmic |
| 0,076 | 0,073 | Multidrug resistance-associated protein inhibitor |

Hasil swiss adme

| | | |
|------------------------------------|---------------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.9915 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.5143 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | - | 0.9429 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | <i>Non-required</i> | 0.6575 |

2. *2-methylthiophene*
Hasil way 2 drug

| | | |
|-------|-------|--|
| 0,012 | 0,004 | <i>Beta lactamase II inhibitor</i> |
| 0,707 | 0,013 | <i>IgA-specific serine endopeptidase inhibitor</i> |
| 0,013 | 0,008 | <i>Antibiotic</i> |

Hasil swiss adme

| | | |
|------------------------------------|---------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.9859 |
| <i>Caco-2</i> | + | 0.8268 |
| <i>Blood Brain Barrier</i> | + | 0.9944 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.7000 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | - | 0.8857 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Warning | 0.4670 |

3. (Z)-3-heptadecen-5-yne

Hasil way2drug

| | | |
|-------|-------|---|
| 0,727 | 0,005 | <i>Poly(beta-D-mannuronate) lyase inhibitor</i> |
| 0,497 | 0,019 | <i>Antimycobacterial</i> |
| 0,464 | 0,017 | <i>Antimutagenic</i> |

Hasil swiss adme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.9349 |
| <i>Caco-2</i> | + | 0.9357 |
| <i>Blood Brain Barrier</i> | + | 1.0000 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | - | 0.6429 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | - | 0.5143 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.5561 |

4. Octadecane

Hasil way2drug

| | | |
|-------|-------|--|
| 0,835 | 0,006 | <i>Membrane permeability inhibitor</i> |
| 0,832 | 0,003 | <i>Beta-mannosidase inhibitor</i> |

Hasil swissadme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.8865 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.5286 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | + | 0.7143 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.6328 |

5. Dotriacontane

Hasil way 2 drug

| | | |
|-------|-------|--|
| 0,835 | 0,006 | <i>Membrane permeability inhibitor</i> |
| 0,832 | 0,003 | <i>Beta-mannosidase inhibitor</i> |

Hasil swissadme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.8865 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.5286 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | + | 0.7143 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.6328 |

6. *Hexadecahydro-pyrene*

Hasil way2drug

| | | |
|-------|-------|--|
| 0,735 | 0,030 | <i>Beta- receptor kinase inhibitor</i> |
|-------|-------|--|

Hasil swissadme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.9708 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.7143 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | - | 0.6429 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.4339 |

7. *Aristolone*

Hasil way2drug

| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| 0,875 | 0,007 | <i>CYP2J substrate</i> |
| 0,792 | 0,004 | <i>CYP2B5 substrate</i> |

Hasil swiss adme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.9950 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.8143 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | - | 0.9429 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.5012 |

8. *Triacontane*

Hasil way2drug

| | | |
|-------|-------|--|
| 0,905 | 0,002 | <i>Poly(beta-D-mannuronate) lyase inhibitor</i> |
| 0,769 | 0,012 | <i>Protein-disulfide reductase (glutathione) inhibitor</i> |

Hasil swiss adme

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Human Intestinal Absorption</i> | + | 0.8865 |
| <i>Human oral bioavailability</i> | + | 0.5286 |
| <i>Carcinogenicity (binary)</i> | + | 0.7143 |
| <i>Carcinogenicity (trinary)</i> | Non-required | 0.6328 |

RIWAYAT HIDUP



Sabilla Suryaning Amanda, lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 November 1997. Merupakan anak dari pasangan Muhammad Dahlan dan Aminah Nurhayati. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Negeri Pajjaiang Makassar dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 25 Makassar dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 18 Makassar pada jurusan IPA dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur UMPTKIN. Selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis menempuh pendidikan dengan bantuan beasiswa BIDIKMISI yang diperoleh selama 8 semester.