

**ANALISIS AKTIVITAS ANTI KANKER SENYAWA TUMBUHAN MAJA  
(*Aegle marmelos*) TERHADAP PENYAKIT KANKER PAYUDARA  
DENGAN METODE PENAMBATAN MOLEKULER  
(*Molecular docking*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**MIFTAHUL JANNAH**

**60300116001**

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 60300116001  
Tempat/Tgl.Lahir : Ujungpandang/28 Juni 1999  
Jurusan/Prodi : Biologi/S1  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Judul : Analisis Aktivitas Anti Kanker Senyawa Tumbuhan Maja  
(*Aegle marmelos*) terhadap Penyakit Kanker Payudara  
dengan Metode Penambatan Molekuler (*Molecular  
docking*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar, adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa, ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Februari 2021

Penyusun

  
Miftahul Jannah

NIM. 60300116001

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Aktivitas Anti Kanker Senyawa Tumbuhan Maja (*Aegle marmelos*) terhadap Penyakit Kanker Payudara dengan Metode Penambatan Molekuler (*Molecular docking*)”, yang disusun oleh Miftahul Jannah, NIM: 60300116001, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 M, bertepatan dengan 5 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 17 Februari 2021 M.  
5 Rajab 1442 H.

### DEWAN PENGUJI

**Ketua** : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

**Sekretaris** : Selis Meriem, S.Pd., M.Si

**Munaqisy I** : Dr. Fatmawati, S.Si., M.Si

**Munaqisy II** : Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag

**Pembimbing I** : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd

**Pembimbing II** : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Diketahui Oleh:**  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**

  
**Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M. Pd.**  
**NIP. 19740412 200003 1 001**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatillahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “**Analisis Aktivitas Anti Kanker Senyawa Tumbuhan Maja (*Aegle marmelos*) terhadap Penyakit Kanker Payudara dengan Metode Penambatan Molekuler (*Molecular docking*)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Serta tidak lupa pula kita panjatkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'-tabi'in hingga sampai kepada kita umatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orang tua, penulis ungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya karena berkat kerja keras, didikan, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang dengan tulus selalu mendoakan, memberi dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih secara mendalam diantaranya:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu memberi dukungan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku pembimbing I terima kasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya atas bimbingan, dukungan, dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si. M.Si selaku pembimbing II terima kasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si dan Bapak Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik dan membimbing dengan baik proses perkuliahan.
8. Seluruh staf Jurusan Biologi, Laboran laboratorium Biologi dan civitas akademik fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri


Alauddin Makassar atas segala bentuk bantuannya selama masa studi penulis ucapkan banyak terimakasih.

9. Civitas akademik lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas segala bentuk bantuannya penulis ucapkan banyak terimakasih.
10. Kepada teman-teman IMMUNOGLOBULIN (Mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2016) yang telah banyak membantu penulis, memberikan dukungan, motivasi dan tempat berbagi cerita serta suka duka bersama selama kurang lebih 4 tahun.
11. Kepada adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2017, 2018 dan 2019 atas segala bentuk bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan kemajuan ilmu pengetahuan. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Samata-Gowa, Februari 2021

Penulis



Miftahul jannah

NIM. 60300116001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv-vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii-viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix-xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii-xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRAC</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1-6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6-7
D. Kajian Pustaka.....	7-9
E. Tujuan Penulisan .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Ayat dan Hadis yang Relevan dengan Penelitian.....	10-11
B. Tinjauan Umum tentang Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ).....	12-15
C. Tinjauan Umum tentang Senyawa Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ).....	15-19

D. Tinjauan Umum tentang Kanker Payudara .....	19-23
E. Tinjauan Umum tentang Protein Target pada Kanker Payudara .....	23-27
F. Tinjauan Umum tentang <i>Molecular Docking</i> dan <i>In Silico</i> .....	27-31
G. Sumber Informasi <i>Database</i> .....	31-33
H. Perangkat Lunak .....	33-34
I. Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
C. Variabel Penelitian .....	36
D. Definisi Opeasional Variabel .....	36-37
E. Instrumen Penelitian .....	37-38
F. Prosedur Kerja .....	38-41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	42-55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57-62
<b>LAMPIRAN</b> .....	63-70
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	71

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Habitus Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ), (Tim KKN-KP Biologi UNM, 2015) .....	14
<b>Gambar 2.2</b> Biji Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ) .....	14
<b>Gambar 2.3</b> Bunga Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ).....	14
<b>Gambar 2.4</b> Daun Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ) .....	14
<b>Gambar 2.5</b> Buah Tumbuhan Maja ( <i>Aegle marmelos</i> ).....	14
<b>Gambar 2.6</b> Berbagai Struktur Senyawa Bioaktif <i>Aegle marmelos</i> .....	16
<b>Gambar 2.7</b> Persentase kasus kanker di Indonesia tahun 2018 .....	21
<b>Gambar 2.8</b> Konsep Dasar <i>Molecular docking</i> .....	28
<b>Gambar 2.9</b> Proses Analisis <i>docking</i> .....	30
<b>Gambar 4.a.2.a.1.</b> Visualisasi <i>docking</i> ligan ID 10680 dengan protein ID 1a28.....	47
<b>Gambar 4.a.2.a.2.</b> Ilustrasi Intraseluler Mekanisme Pensinyalan <i>Progesteron Receptor (PR)</i> .....	48
<b>Gambar 4.a.2.b.1.</b> Visualisasi <i>docking</i> ligan ID 10680 dengan protein ID 2jab.....	49
<b>Gambar 4.a.2.b.2.</b> Ilustrasi Intraseluler Mekanisme Pensinyalan <i>Human Epidermal Growth Factor Receptor (HER-2)</i> .....	50
<b>Gambar 4.a.2.c.1.</b> Visualisasi <i>docking</i> ligan ID 10680 dengan protein ID 6b0f .....	51

## Gambar 4.a.2.c.1. Ilustrasi Intraseluler Mekanisme Pensinyalan

*Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ..... 52

### Lampiran Gambar

#### 2. Preparasi ligan protein target

##### a. Preparasi senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

##### 1. Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

**Gambar 2.a.1.a** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 3606 ..... 68

**Gambar 2.a.1.b** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 6760 ..... 68

**Gambar 2.a.1.c** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 10680 ..... 68

**Gambar 2.a.1.d** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 550058 ..... 68

**Gambar 2.a.1.e** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 5280371 ..... 69

**Gambar 2.a.1.f** Senyawa uji (ligan) tumbuhan maja (*Aegle marmelos*)

ID 91715000 ..... 69

##### 2. Senyawa kontrol (ligan) kanker payudara (*Breash cancer*)

**Gambar 2.a.2.a** Senyawa *Progesterone* (ID 5994) ..... 69

**Gambar 2.a.2.b** Senyawa (*E*)-3-[4-[[2-[2-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorophenyl]-6-hydroxy-1-benzothiophen-3-yl]oxy]phenyl]prop-2-enoic acid (ID 118574930) ..69

**b. Preparasi protein target kanker payudara (*Breash cancer*)**

**1. Protein target kanker payudara (*Breash cancer*)**

**Gambar 2.b.1.a Progesteron Receptor (PR) (ID 1a28).....70**

**Gambar 2.b.1.b Human Epidermal Growth Factor Receptor (HER-2)  
(ID 2jab).....70**

**Gambar 2.b.1.c Estrogen Receptor Alpha (ER $\alpha$ ) (ID 6b0f).....70**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Klasifikasi tumbuhan maja ( <i>Aegle marmelos</i> ) .....	14-15
<b>Tabel 2.2</b> Senyawa yang teridentifikasi pada bagian tumbuhan <i>Aegle marmelos</i> .....	17-19
<b>Tabel 4.a.1.a</b> Data <i>scoring</i> hasil <i>docking</i> ligan dan protein target (ID 1a28) .....	42-43
<b>Tabel 4.a.1.b</b> Data <i>scoring</i> hasil <i>docking</i> ligan dan protein target (ID 2jab) .....	43
<b>Tabel 4.a.1.c</b> Data <i>scoring</i> hasil <i>docking</i> ligan dan protein target (ID 6b0f) .....	44
<b>Lampiran Tabel</b>	
<b>Tabel 1.a.1</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawa 2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12 <i>b</i> -octahydroindolo[2,3- <i>a</i> ]quinolizin-2-yl)ethyl acetate .....	63
<b>Tabel 1.a.2</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawa <i>Flavone</i> .....	63
<b>Tabel 1.a.3</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawan [4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl] <i>Phenyl</i> ]2,2,2-trifluoroacetate.....	63
<b>Tabel 1.a.4</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawa <i>Dihydrodiethylstilbestrol</i> .....	63-64
<b>Tabel 1.a.5</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawa <i>Skimmianine</i> .....	64
<b>Tabel 1.a.6</b> Hasil <i>SwissADME</i> Senyawa <i>Bergabtol</i> .....	64
<b>Tabel 1.b.1</b> Hasil <i>Way2Drug</i> Senyawa 2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12 <i>b</i> -octahydroindolo[2,3- <i>a</i> ]quinolizin-2-yl)ethyl acetate .....	64
<b>Tabel 1.b.2</b> Hasil <i>Way2Drug</i> Senyawa <i>Flavone</i> .....	64-65
<b>Tabel 1.b.3</b> Hasil <i>Way2Drug</i> Senyawan [4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl] <i>Phenyl</i> ]2,2,2-trifluoroacetate.....	65
<b>Tabel 1.b.4</b> Hasil <i>Way2Drug</i> Senyawa <i>Dihydrodiethylstilbestrol</i> .....	65
<b>Tabel 1.b.5</b> Hasil <i>Way2Drug</i> Senyawa <i>Bergabtol</i> .....	65-66
<b>Tabel 1.c.1</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 3606 .....	66

<b>Tabel 1.c.2</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 6760 .....	66
<b>Tabel 1.c.3</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 10680 .....	67
<b>Tabel 1.c.4</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 550058 .....	67
<b>Tabel 1.c.5</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 5280371 .....	67
<b>Tabel 1.c.6</b> Hasil <i>Lipinski Rule of Five</i> senyawa ID 91715000 .....	67



## ABSTRAK

**Nama : Miftahul jannah**

**Nim : 60300116001**

**Judul : Analisis Aktivitas Anti Kanker Senyawa Tumbuhan Maja (*Aegle marmelos*) terhadap Penyakit Kanker Payudara dengan Metode Penambatan Molekuler (*Molecular docking*)**

---

Kanker payudara telah menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terapi hormon lini pertama bekerja sebagai antagonis reseptor kanker payudara namun memiliki efek samping yang buruk bagi kesehatan. Diperlukan suatu pengembangan terapi yang memiliki target spesifik dan selektifitas yang tinggi terhadap terapi kanker payudara dengan eksplorasi potensi bahan alam berkhasiat. Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa senyawa dari ekstrak tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap berbagai jenis kanker, dengan kata lain tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) juga dapat berpotensi menjadi alternatif bahan alam pengganti terapi hormon yang lebih aman dan juga memiliki target spesifik terhadap kanker payudara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antikanker pada senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) terhadap penyakit kanker payudara dengan metode penambatan molekul (*Molecular docking*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) memiliki nilai *scoring docking* yang baik yakni mencapai (-8,0 kkal/mol) diantaranya adalah senyawa (ID 3606, 10680, dan 91715000) pada protein ID 1a28). Senyawa ID 10680 pada protein ID 2jab yang diperoleh dari *Blind docking* serta senyawa ID 3606 dan 10680 pada protein ID 6b0f. Namun yang memiliki nilai  $\Delta G^\circ$  *Binding Affinity* (-8,0 kkal/mol) dari interaksinya pada seluruh protein target hanya ada satu yaitu senyawa *Flavone* (ID 10680) yang di mana pada hasil visualisasi ikatannya juga terbentuk berbagai aktifitas ikatan seperti *Hydrophobic*, *Electrostatic* serta ikatan *Hydrogen conventional* yang membuktikan interaksi yang terjadi pada sisi aktif protein, serta memiliki kemampuan dalam menembus dinding sel atau dengan kata lain senyawa tersebut dapat bereaksi sebagai obat apabila berikatan dengan reseptor penanda pada kanker payudara.

**Kata kunci:** Kanker payudara; *Molecular docking*; Reseptor; *Screening* senyawa; Senyawa bioaktif; Tumbuhan maja (*Aegle marmelos*).

## ABSTRAC

**Name :** Miftahul jannah

**SIDN :** 60300116001

**Title :** *Analisis of Anticancer Activities of Maja Plant Compounds (Aegle marmelos) Against Breast Cancer with Molecular Improvement*

**Methods (Molecular docking)**

---

Breast cancer has become a health problem around the world, including in Indonesia. First-line hormone therapy works as a breast cancer receptor antagonist but has adverse side effects for health. It is necessary to develop a therapy that has a specific target and high selectivity for breast cancer therapy with the exploration of the potential of efficacious natural ingredients. Some researchers have proven that compounds from maja plant extracts (Aegle marmelos) show antiproliferative activity against various types of cancer, in other words, maja growth (Aegle marmelous) can also potentially be an alternative to natural ingredients to replace hormone therapy that is safer and also has specific targets for breast cancer. The purpose of this study was to determine the anticancer activity of maja (Aegle marmelous) plant compounds against breast cancer using the molecular docking method. The results of this study indicate that several maja plant compounds (Aegle marmelous) have a good docking scoring value which reaches (-8.0 kcal/mol) including compounds (ID 3606, 10680, and 91715000) in protein ID 1a28). Compound ID 10680 on ID 2jab protein obtained from blind docking and compound ID 3606 and 10680 on protein ID 6b0f. However, there is only one which has a value of  $\Delta G^\circ$  Binding Affinity (-8.0 kcal/mol) from the interaction on all target proteins, namely the Flavone compound (ID 10680), in which the bond visualization results also form various bonding activities such as Hydrophobic, Electrostatic and Conventional hydrogen bonds which prove the interactions that occur on the active side of proteins, and have the ability to penetrate the cell walls or in other words these compounds can react as drugs when they bind to marker receptors in breast cancer.

**Keywords:** Breast cancer; Molecular docking; Receptors; Compound screening; Bioactive compounds; Maja plants (Aegle marmelos).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Allah swt. yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan maksud dan tujuan masing-masing. Tidak ada satupun yang Allah swt. ciptakan tanpa manfaat dan mudarat bagi manusia. Di antara bukti penciptaan Allah swt. yang tersebar di muka bumi adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang Allah swt. ciptakan dengan sejuta manfaat agar dapat digunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, antara lain digunakan sebagai bahan pangan, bangunan, hingga obat-obatan. Allah swt. menumbuhkan tanaman dengan menurunkan air hujan dari langit yang diserap olah tanah dan kemudian dimanfaatkan oleh tanaman tersebut untuk pertumbuhannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS an-Nahl/16: 11.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementerian Agama RI, 2017).

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa air yang diturunkan dari langit itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji-bijian, zaitun, kurma, anggur, dan jenis buah-buahan lainnya. Sesungguhnya di dalam

penciptakan hal-hal di atas terdapat tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnyanya dan selalu memikirkan kekuasaan pencipta-Nya (Shihab, 2010).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah swt. dari penciptaan tumbuhan tidak hanya karena Allah swt. menurunkan air hujan untuk pertumbuhan tanaman saja, tapi ada manfaat yang terkandung di dalamnya yang perlu kita kaji. Salah satunya dalam bidang medis atau obat-obatan herbal yang lebih toleran kepada tubuh manusia dibandingkan obat-obatan kimiawi, dan tugas kita sebagai manusia adalah mengkajinya. Demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah swt.) bagi orang-orang yang berfikir.

Tumbuhan telah dimanfaatkan oleh manusia sejak berabad-abad yang lalu sebagai bahan sandang, bahan pangan, bahan papan dan sebagai obat-obatan. Sudah sejak lama tumbuhan obat telah digunakan oleh manusia dalam sistem pengobatan tradisional karena tumbuhan obat dikenal memiliki potensi terapeutik yang digunakan untuk melawan berbagai macam penyakit, termasuk dalam pengobatan penyakit kanker.

Kanker merupakan sekelompok penyakit seluler dan genetik karena dimulai dari satu sel yang memiliki DNA yang kemudian bermutasi sebagai komponen dasar dari gen tersebut. Sel yang mengalami kerusakan genetik tidak lagi mengikuti mekanisme pengaturan siklus sel normal yang mengakibatkan terjadinya proses proliferasi yang tidak terkendali. Mutasi yang terjadi pada materi genetik berupa DNA pada gen yang mengatur siklus sel (pertumbuhan, kematian dan pemeliharaan sel) akan mengakibatkan ketidakteraturan siklus sel

dan salah satu akibatnya adalah terbentuknya kanker atau karsinogenesis (Parwata, 2014).

Hingga saat ini kanker telah menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kanker payudara. Kanker payudara merupakan tumor ganas yang dapat menyerang jaringan payudara yang terdiri dari saluran kelenjar (saluran air susu), kelenjar susu (kelenjar pembuat air susu) dan jaringan pendukung payudara. Keganasan yang terjadi pada sel payudara menyebabkan jaringan payudara berubah menjadi tidak normal dan berkembang biak secara tidak terkendali (*American Cancer Society*, 2017).

Berdasarkan penghitungan dari *Globocan, International Agency for Research on Cancer* (IARC) tahun 2018, kanker payudara merupakan jenis kanker dengan angka kejadian kasus baru tertinggi mencapai 58.256 (16,7%) kasus, dengan persentase yang terjadi khususnya pada wanita mencapai (30,9%) dari berbagai kasus kanker yang terdata (WHO, 2019).

Setiap kasus kanker payudara pada wanita memiliki reseptor yang bertanggung jawab sebagai penanda kanker tersebut yaitu Estrogen Reseptor Alpa ( $ER\alpha$ ), Reseptor Progesteron (PR) dan Reseptor Faktor Pertumbuhan Epidermal Manusia 2 (HER-2) yang memiliki peran pada regulasi proses proliferasi, migrasi, dan pertumbuhan sel kanker payudara dan merupakan penanda imunohistokimia untuk memfasilitasi target terapi (Asif et al, 2016).

Pengobatan menggunakan tamoxifen merupakan metode terapi hormon lini pertama untuk terapi penyakit kanker payudara. Tamoxifen bekerja sebagai

antiestrogenik dengan efek samping berupa penggumpalan darah, strok, kanker rahim, dan katarak (Suganya et al, 2014; Senkus et al, 2015). Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, ribuan wanita yang menjalani pengobatan menggunakan tamoxifen mengalami penurunan bahkan tidak memberikan respon terhadap pengobatan kemoterapi kanker payudara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena timbulnya resistensi. Sekitar 40% pasien pada akhirnya tidak mengalami kesembuhan atau bahkan meninggal karena resistensi setelah terapi selama kurang lebih 7-10 bulan (Yaghmaie et al, 2005). Diperlukan suatu pengembangan terapi terhadap kanker payudara yang memiliki target spesifik dan selektifitas yang tinggi terhadap terapi kanker payudara dengan eksplorasi potensi bahan alam berkhasiat (Rastini et al, 2019).

Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki banyak spesies tumbuhan yang tersebar di seluruh nusantara, salah satunya adalah tumbuhan maja yang dikenal juga dengan sebutan buah nusantara karena tumbuhan ini dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Tumbuhan dengan nama ilmiah *Aegle marmelos* ini sudah sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional untuk penyakit kulit, demam, dan gangguan pencernaan.

Dalam lima dekade terakhir, tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) telah dipelajari oleh para ilmuwan dan dilaporkan bahwa dari berbagai senyawa fitokimia yang teridentifikasi dari *A. marmelos* terdapat berbagai senyawa yang memiliki aktivitas pengobatan salah satunya adalah aktivitas antikanker (Kumar Sekar et al, 2011).

Berdasarkan hasil uji fitokimia, tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti alkaloid, glikosida jantung, saponin, steroid, kumarin (marmelosin, marmesin, marmin, imperatorin, skopoletin), terpenoid, fenilpropenoid, tanin, polisakarida dan flavonoid,  $\gamma$ -sitosterol, aegelin, lupeol, rutin, marmesinin,  $\beta$ -sitosterol, dan feniletil kayu manis, antioksidan dan senyawa lainnya yang dapat melindungi kita dari penyakit kronis (Jhahhria and Kumar, 2016).

Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa senyawa dari ekstrak tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) menunjukkan aktivitas antiproliferatif melawan pertumbuhan abnormal dari sel usus besar, payudara, dan leukemia (Bhatti et al, 2013). Dengan kata lain, tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) dapat dijadikan sebagai alternatif bahan alam pengganti terapi hormon yang lebih aman dan juga memiliki target spesifik terhadap kanker payudara.

Dalam penelitian ini, *virtual screening* terhadap kemampuan interaksi senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) dilakukan melalui pendekatan *in silico*. Pendekatan *in silico* memiliki keuntungan dibandingkan metode *in vivo* dan *in vitro* karena lebih efisien dalam waktu pengerjaan dan biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih sedikit (Zuchrian, 2010).

Penelitian dengan metode *in silico* bukan merupakan pengganti dari penelitian *in vivo* dan *in vitro*, tetapi merupakan komplemen atau pelengkap dari metode yang telah ada sebelumnya. Hasil analisis dari penelitian *in silico* dapat digunakan sebagai validasi dari hasil yang telah diperoleh dari pengujian laboratorium ataupun sebagai tahap awal dalam memastikan suatu metode atau

riset yang masih sulit dilakukan dengan penelitian berbasis konvensional (Andry, 2009; Zuchrian, 2010).

Metode *docking* merupakan salah satu bagian dari pendekatan *in silico* yang berkembang pesat dalam mendesain obat yang memiliki target spesifik, bekerja dengan cepat dan memiliki biaya yang terjangkau. Obat biasanya tersusun dari senyawa mikro yang mampu terikat spesifik pada bagian permukaan atau di bagian dalam suatu protein (*active side*), baik menghambat atau memicu aktivitasnya (Widodo et al, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan studi *in silico* untuk menganalisis aktivitas anti kanker dari senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) terhadap penyakit kanker payudara sebagai bahan literatur dan informasi ilmiah mengenai aktivitas anti kanker dari tanaman maja (*Aegle marmelos*).

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aktivitas anti kanker pada senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) terhadap penyakit kanker payudara dengan metode penambatan molekul (*Molecular docking*)?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini yaitu dengan menganalisis aktivitas anti kanker pada senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) terhadap penyakit kanker payudara dengan metode penambatan molekul (*Molecular docking*). Data mining berupa Struktur 3 dimensi senyawa tumbuhan diperoleh dari website <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/> yang diunduh ke dalam bentuk

SDF. Struktur 3 dimensi protein target diperoleh dari *website* <https://www.rcsb.org/> yang diunduh dan disimpan ke dalam format PDB. Preparasi struktur 3 dimensi senyawa tumbuhan menggunakan aplikasi *Discovery Studios 2019 Client*. Preparasi struktur 3 dimensi protein target menggunakan aplikasi *PyRx 0.8*. Proses *docking* atau penambatan ligan pada reseptor target menggunakan aplikasi *AutoDock Vina* yang terdapat di dalam aplikasi *PyRx 0.8* yang telah didownload sebelumnya. Kemudian hasil akhir berupa interpretasi data diproses menggunakan aplikasi *PyMOL* atau *LIGPLOT<sup>+</sup>*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini adalah:

1. (Bhatti et al, 2013) dengan judul “*Pharmacognostic Standardisation and Antiproliferative Activiti of Aegle marmelos (L.) Correa Leaves in Various Human Cancer Cell Lines*”. Studi fitokimia menunjukkan alkaloid, antrakuinon, terpenoid dalam alkohol, ekstrak kloroform dan tanin, terpenoid, gula pereduksi dalam petroleum eter dan ekstrak heksana. Ekstrak etanol menunjukkan penghambatan maksimum pada usus besar dan karsinoma payudara garis sel dengan dosis 100 µg / ml. Kromatografi kolom ekstrak etanol menghasilkan lima fraksi. Dari Hal ini, fraksi 2, 4 dan 5 menunjukkan penghambatan yang signifikan pada garis sel leukemia dengan IC 50 sebesar 12,5, 86,2 dan > 100 µg / ml untuk fraksi 2, 4 dan 5. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi dari fraksi 2 terungkap imperatorin sebagai salah satu fitokonstituen utama. Di antara ekstrak berbeda yang

diteliti, ekstrak etanol menunjukkan aktivitas antiproliferatif yang signifikan dan fraksi 2 yang mengandung imperatorin furanokumarin terlihat aktivitas antiproliferatif terhadap garis sel leukemia dengan IC 50 sebesar 12,5  $\mu\text{g}/\text{ml}$ .

2. (Liliana and Istyastono, 2015) dengan judul “Uji *In silico* Senyawa Emodin Sebagai Ligan pada Reseptor Estrogen Alpa”. Penelitian *in silico* menggunakan protokol *docking* dan protokol analisis *post docking* menunjukkan bahwa emodin bukan merupakan ligan aktif pada ER- $\alpha$ . Hasilnya ditampilkan sebagai skor ChemPLP dengan rata-rata -75.292 dan bitstring PLIF. Emodin mengikat residu asam amini LEU 346, LEU 387, dan ARG 394. Saat ini protokol yang digunakan dalam penelitian ini belum mengidentifikasi senyawa marginal seperti emodin sebagai ligan aktif pada ER- $\alpha$ .
3. (Farmasi et al, 2008) dengan judul “*Docking* Kurkumin dan Senyawa turunannya pada Reseptor Progesteron: Studi Interaksinya sebagai *Selective Progesteron Receptor Modulators (SPRMs)*”. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui afinitas dan interaksi dari kurkumin dan senyawa turunannya sebagai *Selective Progesterone Receptor Modulators (SPRMs)* dalam mengadakan inhibisi kompetitif dengan hormon progesteron. Dari hasil penambatan senyawa diperoleh nilai energi ikatan bebas terendah pada senyawa kurkumin dalam bentuk keto baik dengan maupun tanpa air. Afinitas terbesar dari senyawa turunan

kurkumin ditunjukkan oleh senyawa PGV-1 pada keadaan ada air dan senyawa HGV-1 tanpa air pada reseptor progesteron.

4. (Rastini et al, 2019) dengan judul “*Molecular Docking* Aktivitas Antikanker dari Kuersetin terhadap Kanker Payudara secara *in silico*”. Hasil dari penelitian ini yaitu energi ikatan senyawa kuersetin pada protein HER-2 mencapai  $-8,24 \text{ kkal/mol}$ , sedangkan energi ikatan dari ligan kontrol terhadap protein HER-2 mencapai  $-10,45 \text{ kkal/mol}$ . Energi pengikatan tersebut membuktikan bahwa senyawa kuersetin berpotensi sebagai antikanker payudara karena dapat memodulasi ekspresi berlebih dari protein HER-2.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas anti kanker pada senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) terhadap penyakit kanker payudara dengan metode penambatan molekul (*Molecular docking*).

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu menjadi bahan literatur dan informasi ilmiah mengenai aktivitas anti kanker dari senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*) yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan alam pengganti terapi hormon yang lebih aman dan juga memiliki target spesifik terhadap kanker payudara.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Ayat dan Hadis yang Relevan dengan Penelitian***

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. as-Syu'ara/26: 7 yang berbunyi.

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementerian Agama RI, 2017).

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah swt. di bumi ini. Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengelurkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2010).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tidakkah manusia akan berhenti melakukan hal yang buruk dan merenungkan ciptaan Allah swt. yang ada di sekitarnya, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah swt. Tuhan semesta alam menganugrahkan manusia dengan berjuta jenis tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Salah satu manfaat yang dapat dikaji oleh manusia ialah adanya senyawa yang terkandung dalam tumbuhan yang bermanfaat dalam penyembuhan penyakit tertentu. Contohnya seperti yang akan dilakukan dalam

penelitian ini. Di mana ligan yang merupakan senyawa yang terkandung di dalam tanaman maja (*Aegle marmelos*) akan dicocokkan dengan reseptor yang merupakan protein yang berperan di dalam penyakit kanker payudara dengan metode komputasi. Yang di mana bila ligan dan reseptornya cocok maka akan membentuk ikatan yang menghasilkan interaksi dan reaksi yang bermanfaat dalam proses terapi penyembuhan penyakit.

HR. Ahmad

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلَيْهِ مَنْ عَلِمَهُ مِنْ جَهْلِهِ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

Artinya:

Seorang A'rabi datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Yaitu, yang paling baik akhlaknya diantara mereka." Kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau menjawab, "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak tahu" (HR. Ahmad 17728).

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yaitu yang mengerjakan segala perintah Allah swt. dan menjauhi larangannya. Kemudian dianjurkan untuk berobat bagi yang sedang menderita penyakit, karena berobat atas penyakit adalah wajib. Pada dasarnya setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah dengan sesuatu yang halal lagi baik. Baik itu pengobatan tradisional menggunakan potensi bahan alam yang berkhasiat seperti tanaman obat, maupun pengobatan secara modern melalui terapi medis. Perlu diketahui bahwa kewajiban kita adalah berobat, sedangkan kesembuhannya datang dari Allah swt.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanaman Maja (*Aegle marmelos*)**

Buah bael (*Aegle marmelos* (L.) Correa) atau buah maja merupakan buah tropis asli Asia Tenggara dan tergolong dalam Famili *Rutaceae*. Tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 1200 meter dari permukaan laut terutama di daerah perbukitan dan hutan kering. Tumbuhan ini ditemukan hampir di semua negara bagian di India seperti Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Jammu dan Kashmir, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu dan Benggala Barat. Dan juga dibudidayakan di negara Nepal, Myanmar, Vietnam, Tibet, Ceylon, Laos, Kamboja, Malayasia, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Indonesia, Fiji dan beberapa bagian Kepulauan Filipina (Bhar et al, 2019).

Buah maja (*Aegle marmelos* (L.) Correa) merupakan salah satu jenis tumbuhan yang terbilang unik dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam sejarahnya, buah maja sangat erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit (Fatmawati, 2015). Kata Majapahit sendiri berasal dari dua kata yaitu: Maja dan Bitter yang artinya buah maja yang memiliki rasa yang pahit. Selain itu, ternyata di Bagian lain dari tanaman maja ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan yaitu sebagai obat tradisional untuk penyakit demam, sembelit, disentri, diare, hepatitis, tuberkulosis, radang selaput lendir hidung, gangguan otak, gangguan hati, gatal-gatal (kudis, bisul, bisul, eksim), anti inflamasi, gangguan pendengaran, gangguan kencing, dan larvasida (Kapoor, 1990; Singh, 2000; Tasyrifah, 2010; Wilujeng et al, 2017). Studi praklinis juga telah menunjukkan bahwa ekstrak daun bael adalah efektif dalam menghambat

pertumbuhan leukemia K562, T-limfoid Jurkat, B-limfoid Raji, eritroleukemia HEL, melanoma Colo38, dan garis sel kanker payudara MCF7 dan MDA-MB-231 (Baliga et al, 2013).

Tumbuhan bael (*Aegle Marmelos* (L.) Correa) termasuk dalam famili *Rutaceae*, tergolong dalam pohon subtropis yang tumbuh lambat dan keras serta satu-satunya tanaman yang masuk dalam genus *Aegle*. Pohon itu tumbuh dengan baik di alam liar hingga sekitar 12 - 15 meter, bahkan di iklim yang ekstrim dan kering. Tumbuhan ini memiliki cabang berduri dan helai daunnya berjumlah tiga sampai lima helai dalam satu tangkai yang berbentuk lonjong dan runcing. Bunganya harum dan ditemukan berkelompok di sepanjang cabang muda. Buah yang bisa dimakan berbentuk bulat atau lonjong, tergantung pada varietasnya. Daging buahnya tertutup oleh cangkang buah yang tipis dan keras, berwarna abu-abu kehijauan saat mentah dan kekuningan saat matang. Cangkangnya memiliki aroma yang khas. Daging buahnya berwarna orange pucat, manis, dan sangat aromatik. Benih yang jumlahnya sekitar sepuluh sampai lima belas, tertanam di pulp dan memiliki rambut yang berstruktur seperti wol. Setiap benih dibungkus dalam lendir transparan yang mengeras (Baliga et al, 2013; Dhankhar et al, 2011; Manandhar et al, 2018).

	
<p><b>Gambar 2.1.</b> Habitus Tumbuhan Maja (<i>Aegle marmelos</i>), (Tim KKN-KP Biologi UNM, 2015)</p>	<p><b>Gambar 2.2.</b> Biji Tumbuhan Maja (<i>Aegle marmelos</i>), (Lamia, 2018).</p> 
	
<p><b>Gambar 2.5.</b> Buah Tumbuhan Maja (<i>Aegle marmelos</i>), (Vardhini, 2018)</p>	<p><b>Gambar 2.4.</b> Daun Tumbuhan Maja (<i>Aegle marmelos</i>), (Bhar et al, 2019)</p>

**Table 2.1. Klasifikasi Tumbuhan Maja (*Aegle marmelos* (L.), (Bhar et al,2019).**


<i>Regnum</i>	<i>Plantae</i>
<i>Subregnum</i>	<i>Tracheobionta</i>
<i>Super division</i>	<i>Spermatophyta</i>

<i>Division</i>	<i>Magnoliophyta</i>
<i>Class</i>	<i>Magnoliopsida</i>
<i>Subclass</i>	<i>Rosidae</i>
<i>Order</i>	<i>Sapindales</i>
<i>Family</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>Genus</i>	<i>Aegle</i>
<i>Species</i>	<i>Aegle marmelos</i>

### **C. Tinjauan Umum tentang Senyawa Tanaman Maja (*Aegle marmelos*)**

Fitokimia adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan mensintesis berbagai metabolit sekunder untuk melawan agen infeksius (Piasecka et al, 2015; Sharma and Dubey, 2018). Senyawa bioaktif didefinisikan sebagai senyawa metabolit sekunder yang menimbulkan efek farmakologis atau toksikologis pada manusia dan hewan. Penggunaan obat sintetik yang sering telah membuat patogen resisten terhadap banyak obat. Hal ini mendorong kebutuhan untuk menyaring tanaman obat untuk senyawa bioaktif baru karena biodegradabilitasnya, keamanan, dan lebih efek sampingnya lebih sedikit (Bernhoft, 2008; Sharma and Dubey, 2018).

Skrining fitokimia pada tumbuhan (*Aegle marmelos*) telah mengungkap berbagai kelas senyawa seperti alkaloid, glikosida jantung, saponin, steroid, kumarin (marmelosin, marmesin, marmin, imperatorin, scopoletin), terpenoid, fenilpropanoid, tanin, polisakarida, flavonoid dan turunan senyawanya seperti pada gambar berikut:



**Gambar 2.6.** Berbagai struktur senyawa bioaktif *Aegle marmelos*. A: alkaloid; B: kumarin; C: minyak esensial; D: flavonoid; E: tanni; F: senyawa lain-lain (Baliga et al, 2013 ; Dhankhar et al, 2011 ; Rahman and Parvin, 2014; Manandhar et al, 2018).

Semua biokonstituen telah terbukti mengungkap banyak aktivitas farmakologis seperti antijamur, antioksidan, antibakteri, antiprotozoal, antispermatogenik, antiinflamasi, anthelmintik, antidiabetik, antikanker, pencahar, obat penurun panas dan ekspektoran (Arora et al, 2016; Lamia, 2018). Dalam (Sharma and Dubey, 2018) teknik analisis GC-MS (*Gas Cromatografi - Massa Spectrometri*) dilakukan untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman maja (*Aegle marmelos*) seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.** Senyawa yang teridentifikasi pada bagian tumbuhan *Aegle marmelos*

<b>Bagian Tumbuhan</b>	<b>Nama Senyawa</b>
<b>Akar</b>	<i>Phenol</i>
	<i>Benzene, 1-bromo-2-methyl-</i>
	<i>Benzene, Nitro-</i>
	<i>Acetic acid, Propyl ester</i>
	<i>2,3-Dihydro-3,5-Dihydroxy-6-Methyl-4H-Pyran-4-One</i>
	<i>2,3-Dihydro-Benzofuran</i>
	<i>Acetic Acid, Propyl Ester</i>
	<i>Ethyl 2-hydroxybenzyl sulfone</i>
	<i>5-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>Cytidine</i>
	<i>D-Allose</i>
	<i>3-Deoxy-d-mannonic lactone</i>
	<i>7-Hexadecene, (Z)-</i>
	<i>1,3,4,5-Tetrahydroxy-Cyclohexanecarboxylic Acid</i>
	<i>7-Hexadecene, (Z)-</i>
	<i>Dibutyl phthalate</i>
	<i>Dodecanoic Acid, Methyl Ester</i>
	<i>Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester</i>
	<i>3-Octadecene, (E)-</i>
	<i>3,6-Octadecadienoic Acid, Methyl Ester</i>
<i>trans-2-Dodecen-1-ol, pentafluoropropionate</i>	
<i>Tetracosamethyl-cyclododecasiloxane</i>	
<i>9-Tetradecenal, (Z)-</i>	
<i>7-Hexadecene, (Z)-</i>	
<b>Batang</b>	<i>Phenol</i>

	<i>Benzene, 1-bromo-2-methyl-</i>
	<i>Benzene, Nitro-</i>
	<i>Acetic acid, Propyl ester</i>
	<i>2,3-Dihydro-3,5-Dihydroxy-6-Methyl-4H-Pyran-4-One</i>
	<i>2,3-Dihydro-Benzofuran</i>
	<i>Acetic Acid, Propyl Ester</i>
	<i>Ethyl 2-hydroxybenzyl sulfone</i>
	<i>5-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>Cytidine</i>
	<i>D-Allose</i>
	<i>3-Deoxy-d-mannonic lactone</i>
	<i>7-Hexadecene, (Z)-</i>
	<i>1,3,4,5-Tetrahydroxy-Cyclohexanecarboxylic Acid</i>
<b>Kulit kayu</b>	<i>Benzene, nitro-</i>
	<i>6-Dodecene, (E)-</i>
	<i>2,5-Dihydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one</i>
	<i>7-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>Hexestrol, O-trifluoroacetyl-</i>
	<i>5-Octadecene, (E)-</i>
	<i>1,2-Benzenedicarboxylicacid, butyl 2-methylpropylester</i>
	<i>Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester</i>
	<i>Isoquinolin-6-ol, 7-methoxy-1-methyl-</i>
	<i>1-Hexadecanol</i>
	<i>2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2, 3-dihydrofuro[3,2-g]chromen-7-one</i>
	<i>(S)-7-Hydroxy-8,8-dimethyl-7,8-dihydropyrano(3,2-g) chromen-2 (6H)-one</i>
<b>Daun</b>	<i>Cyclobutane, 1,2-bis (1-methylethenyl)-, trans-</i>
	<i>Benzene, nitro-</i>
	<i>4-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>Benzene, 1-methyl-4-(1,2,2-trimethylcyclopentyl)-, (R)-</i>
	<i>7-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>7-Hexadecene, (Z)-</i>
	<i>3-Tridecene</i>
	<i>1,2-Benzenedicarboxyli acid, butyl 2-methylpropylester</i>
	<i>Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester</i>
	<i>9-Eicosene, (E)-</i>
	<i>Dimethyl{bis[(4,8,8-trimethyldecahydro -1,4-methanoazulen-9-yl) methoxy]}silane</i>
	<i>1,7-Dimethyl-4-(1-methylethyl) cyclodecane</i>

	<i>Carbamic acid, methylnitroso-, 1-naphthalenyl</i>
<b>Kulit buah</b>	<i>Fenol</i>
	<i>Benzene, Nitro-</i>
	<i>5-Tetradecene, (E) -</i>
	<i>5-Tetradecene, (E) -</i>
	<i>5-Eicosene, (E) -</i>
	<i>Dibutyl phthalate</i>
	<i>Asam benzenepropanoic, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl) - 4-hydroxy-, methyl ester</i>
	<i>5-Eicosene, (E) -</i>
	<i>Asam fosfonat, dioctadecyl ester</i>
<b>Daging Buah</b>	<i>Benzene, 1-bromo-2-methyl-</i>
	<i>Benzene, nitro-</i>
	<i>7-Tetradecene, (Z)-</i>
	<i>Tricyclo[3.3.1.1 (3,7)]decan-6-one,2- (4-allyloxyphenyl)-5,7-dipropyl-1,3-diaza-</i>
	<i>7-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>5-Tetradecene, (E)-</i>
	<i>5-Octadecene, (E)-</i>
	<i>Dibutyl phthalate</i>
	<i>Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester</i>
	<i>5-Eicosene, (E)-</i>
	<i>n-Heptadecanol-1</i>
	<i>Furo[2,3-b] quinoline, 4,7,8-trimethoxy-</i>
	<i>2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) oxy]-, (E)-</i>
	<i>Cyclobarbital</i>
	<i>Benzene, 1-bromo-2-methyl-</i>
	<i>Benzene, nitro-</i>
	<i>7-Tetradecene, (Z)-</i>
	<i>2,6-Dimethyl-3,5,7-octatriene-2-ol, E, E-</i>
	<i>Benzene, 1-bromo-2-methyl-</i>
	<i>Benzene, nitro-</i>
<i>7-Tetradecene, (Z)-</i>	

#### D. Tinjauan Umum tentang Kanker Payudara

Kanker atau keganasan pada sel hingga saat ini menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Salah satu jenis kanker yang sering dialami oleh


wanita di seluruh dunia adalah kanker payudara. Selain pada wanita, kanker payudara juga dapat terjadi pada pria, namun dengan perbandingan yang sangat kecil yaitu mencapai 1: 1000 (Mulyani, 2013). Kanker payudara merupakan jenis penyakit yang tidak menular dan cenderung terus meningkat jumlah penderitanya setiap tahun (DEPKES RI, 2009).

Kanker payudara termasuk kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita remaja dan dewasa muda diusia <40 tahun. Saat ini, kanker payudara pada wanita remaja dan dewasa muda menyumbang sekitar 7% dari semua diagnosa kanker payudara pada seluruh kelompok umur (Keegan et al, 2012). Walaupun diagnosis kanker payudara lebih sedikit pada wanita dibawah usia 40 tahun, namun dapat mempunyai dampak yang lebih besar dibanding wanita diatas usia 40 tahun, karena cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk. Kanker payudara pada wanita usia muda lebih mungkin untuk menjadi subtype kanker yang lebih agresif dan dalam stadium lanjut, baik karena subtype biologis yang agresif atau karena rendahnya indeks kecurigaan dan diagnosis yang tertunda (Hussein et al, 2013).

Diagnosis kanker payudara dapat dipastikan melalui beberapa pemeriksaan di antaranya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiodiagnostik dan patologi anatomi. Rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan pedoman dalam diagnosis penyakit kanker payudara, menentukan jenis histopatologis, serta profil imunohistokimia yang dapat digunakan untuk memudahkan proses terapi. Setelah diagnosis kanker

payudara ditegakkan, pasien kanker payudara akan menjalani terapi sesuai dengan stadium (Anggo, 2013; Parini, 2018).

Faktor resiko pada kanker payudara dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi paritas di usia muda, mutasi gen *Breast cancer susceptibility gene 1* (Brca 1) atau *Breast cancer susceptibility 2* (Brca 2), mutasi gen p53 (protein 53) dan riwayat dalam keluarga penderita kanker payudara. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa paparan hormon eksternal, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol dan jarang berolahraga (Hartaningsih and Sudarsa, 2013).



**Gambar 2.7.** Persentase kasus kanker di Indonesia tahun 2018 (WHO, 2019).

Berdasarkan penghitungan data yang diperoleh dari *Globocan*, *International Agency for Research on Cancer* (IARC) tahun 2018, kanker payudara merupakan jenis kanker dengan angka kejadian kasus baru tertinggi

mencapai 58.256 (16,7%) kasus, dengan persentase kasus yang terjadi khususnya pada wanita mencapai (30.9%) dari berbagai kasus kanker yang terdata (WHO, 2019).

Penyebab utama terjadinya keganasan pada sel adalah adanya mutasi yang terjadi pada gen yang berada pada sel somatik. Mutasi yang merupakan penyebab kanker dapat berasal faktor lingkungan seperti paparan zat karsinogen kimia, sinar-X dan gelombang radiasi tinggi lainnya serta dapat berasal dari beberapa virus (Urry, 2017). Mutasi yang terjadi pada materi genetik normal akan mengubah susunan nukleotida pada DNA, hal tersebut mengakibatkan asam amino yang merupakan penyusun protein yang dikodekannya juga akan berubah, sehingga protein dan fungsinya awalnya pun akan berubah menjadi tidak normal (Sudiana, 2008).

Fase awal dalam keganasan sel payudara adalah fase asimtomatik (tanpa gejala dan tanda-tanda tertentu). Timbulnya benjolan atau penebalan pada daerah payudara adalah tanda dan gejala yang paling umum, sedangkan pada stadium lanjut kanker payudara tanda dan gejalanya meliputi kulit cekung, retraksi atau kelainan pada puting, keluarnya cairan berupa darah dari puting. Penebalan kulit dengan pori-pori yang menonjol menyerupai kulit jeruk merupakan tanda gejala lanjut dari kanker payudara. Jika ada keterlibatan nodul, dapat menimbulkan gejala yang lebih berat seperti pembesaran kelenjar getah bening. Terjadinya metastasis yang meluas ditandai dengan gejala seperti anoreksia atau penurunan berat badan, rasa nyeri pada daerah bahu, pinggang, punggung dan area bawah

seperti pelvis, gangguan pencernaan, penglihatan menjadi kabur dan sakit pada kepala (Gale, 1999; Arafah; Notobroto, 2017).

Pengobatan menggunakan tamoxifen merupakan terapi hormon lini pertama yang digunakan dalam terapi penyakit kanker payudara hingga saat ini (Suganya et al, 2014; Senkus et al, 2015). Namun dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, ribuan wanita yang menjalani pengobatan menggunakan tamoxifen mengalami penurunan atau bahkan tidak memberikan respon terhadap pengobatan kemoterapi kanker payudara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena timbulnya resistensi. Sekitar 40% pasien pada akhirnya tidak mengalami kesembuhan atau bahkan meninggal akibat resistensi setelah terapi selama kurang lebih 7-10 bulan (Ring and Dowsett, 2004; Wind and Holen, 2011). Diperlukan suatu pengembangan terapi terhadap kanker payudara yang memiliki target spesifik dan selektifitas yang tinggi terhadap terapi kanker payudara dengan eksplorasi potensi bahan alam berkhasiat (Rastini et al, 2019).

#### **E. Tinjauan Umum tentang Protein Target pada Kanker Payudara**

Analisis kanker payudara meliputi pemeriksaan imunohistokimia dari reseptor penanda seperti *estrogen receptor* (ER), *progesterone receptor* (PR) dan *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2). Derajat keganasan dari kanker payudara dapat memprediksi prognosis dan menentukan metode terapi yang tepat, status protein ER dan protein PR dapat menentukan dilakukannya terapi hormonal (Davey, 2006; Muhartono et al, 2016) dan memprediksi prognosis KPI (Aryandono, 2006; Muhartono et al, 2016). Selain status hormonal,

diketahui pula peranan protein HER-2 yang berpengaruh dalam pertumbuhan, proses proliferasi dan diferensiasi sel payudara (Gray, 2010; Grushko, 2008; Muhartono et al, 2016). Status ekspresi protein HER-2 digunakan juga untuk mengetahui prognosis, prediksi, dan terapi kanker payudara yang tepat (Ayadi, 2008; Muhartono et al, 2016).

*Estrogen receptor* (ER) adalah ligan yang berpengaruh pada proses transkripsi dan termasuk ke dalam superfamili kelas reseptor hormon nuklir dari molekul reseptor yang dapat mengikat  $17\beta$ -estradiol (hormon estrogen). Tipe ER yang diketahui hingga saat ini yaitu ER $\alpha$  dan ER $\beta$ . Kedua ER tersebut direpresentasikan secara luas ke dalam berbagai jaringan, namun terdapat beberapa perbedaan penting dalam pola dan lokasi ekspresinya (Couse et al, 1997; Nursalam dan Fallis, 2016). ER $\alpha$  terekspresi atau dapat teridentifikasi dalam sel kanker hipotalamus, endometrium, stroma ovarium dan payudara (Yaghmaie et al, 2005; Nursalam dan Fallis, 2016). Pada pria, protein ER $\alpha$  dapat ditemukan di dalam sel epitel duktus eferen (Hess, 2003; Nursalam dan Fallis, 2016). Sedangkan protein ER $\beta$  terekspresi pada sel endotel, prostat, mukosa usus, paru-paru, jantung, tulang, otak dan ginjal (Babiker et al, 2002; Nursalam dan Fallis, 2016).

Ekspresi dan fungsi dari *Estrogen receptor* (ER), *Progesteron receptor* (PR), dan *Human epidermal growth factor receptor 2* (HER-2) memiliki peranan dalam melemahkan kinerja hormon bersangkutan pada terapi antiestrogenik kanker payudara. *Progesteron receptor* (PR) memiliki dua bentuk isoform (PR $\alpha$  dan PR $\beta$ ) yang berasal dari gen sama dan melalui aktivasi dan promotor yang

berbeda. Penelitian telah menunjukkan bahwa *body mass index* (BMI) menunjukkan respon terhadap tumor positif ER dan positif PR pada wanita setelah masa *menopause*. Total penambahan massa tubuh yang diperoleh pada rentang usia 18 atau 20 tahun juga telah berkorelasi langsung dengan kedua ER (+) dan PR (+) pada kanker payudara. Protein HER-2 dikenal juga sebagai reseptor faktor pertumbuhan yang mempengaruhi pengaturan proliferasi sel serta keganasan dari jenis kanker payudara. Kombinasi peningkatan protein HER-2 dan protein PR akan berkorelasi dengan *body mass index* (BMI) pada wanita yang memasuki masa *menopause*, namun berbanding terbalik dengan wanita yang masih dalam masa *premenopause*. Sebaliknya ekspresi protein HER-2 sendiri dinilai berbanding terbalik dengan *body mass index* (BMI) pada wanita *pascamenopause*. Ekspresi protein ER dan protein PR adalah yang paling penting selama tahap awal perkembangan tumor, tetapi tidak menjadi penentu untuk perkembangan selanjutnya (Cleary et al, 2010; Hakim et al, 2018).

Sama halnya dengan hormon lain, hormon estrogen dan hormon progesteron bertindak mengikat reseptor pada organ yang menjadi target terapi. ER terdapat dalam membran inti dari sel target sedangkan PR terdapat pada sitoplasma sel target. ER memiliki dua bentuk isoform yang mempunyai peran yang berbeda dalam kesuburan, antara Reseptor Estrogen Alfa ( $ER\alpha$ ) dan Reseptor Estrogen Beta ( $ER\beta$ ) (Cunningham, 2009). Aktivasi keduanya memicu transkripsi gen yang dikenal sebagai elemen estrogen spesifik. Mutasi yang terjadi pada protein ER akan menyebabkan ekspresi sel tidak normal dan tidak terkendali (Crandall et al, 2009). Aktivasi protein ER mengakibatkan terjadinya transkripsi

gen yang akan menghasilkan *messenger RNA* (mRNA) dan mensintesis protein baru (Cunningham, 2009).

*Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2/*neu*) adalah tirosin trans membran kinase. Nama protein HER-2/*neu* berasal dari "*Human Epidermal Growth Factor Receptor*", karena memiliki homologi substansial dengan *Epidermal Growth Factor Receptor* (EGFR). Amplifikasi atau ekspresi berlebihan dari gen HER-2 terjadi pada 10-30% kanker payudara dan sangat terkait dengan peningkatan jumlah relaps dan prognosis yang lebih buruk karena kasus seperti itu lebih sering memiliki derajat histologis *intermediate* atau tinggi, lebih sering mengalami defisiensi reseptor estrogen (ER) dan reseptor progesteron (PR) (ER dan PR negatif) dan ditemukan metastasis kelenjar getah bening (Vrbic et al, 2013).

Protein HER-2 adalah reseptor pada sel payudara. Dalam kondisi normal, reseptor HER-2 membantu mengendalikan pertumbuhan, proliferasi dan perbaikan sel payudara. Tapi, pada sekitar 25% kanker payudara, gen HER-2 tidak bekerja dengan benar dan membuat salinan gen yang berlebih. Semua gen HER-2 ekstra ini menyebabkan sel-sel payudara menghasilkan terlalu banyak reseptor HER-2 (*over expression* protein HER-2), yang selanjutnya memicu pertumbuhan dan proliferasi sel payudara menjadi tak terkendali dan bertransformasi menjadi keganasan (*American Cancer Society*, 2017) .

Ekspresi protein HER-2 yang tidak normal berbanding lurus dengan prognosis yang buruk, ukuran tumor yang lebih besar, metastase ke kelenjar getah bening, serta angka harapan hidup yang lebih rendah (Liao, 2016). Reseptor HER-


2 menjadi target terapeutik yang penting untuk terapi kanker karena terdapat beberapa alasan, yang pertama karena peningkatan kadar HER-2 menyebabkan tumoregenesis dan tingkat ekspresi gen HER-2 jauh lebih tinggi pada sel kanker dari pada sel dewasa normal, yang kedua karena *over expression* HER-2 ditemukan pada tumor primer dan organ metastasis. Selain itu, HER-2 adalah pasangan utama dalam aktivasi jalur sinyal HER, dan memiliki potensi mitogenik tertinggi di antara semua kompleks HER. Inhibisi dimerisasi HER-2 mencegah aktivasi beberapa kaskade sinyal intraselular yang dapat menyebabkan karsinogenesis (Amtiria dan Berawi, 2018).

#### **F. Tinjauan Umum tentang Molecular Docking & In silico**

*In silico* adalah metode komputasi yang terus berkembang dan penerapannya dilakukan secara meluas, salah satunya dalam kajian farmakologi atau penemuan kandidat obat baru. Metode ini memanfaatkan *database* molekul, pemodelan dan pengolahan data, identifikasi kekerabatan, serta penambatan molekuler (Ekins et al, 2007; Fitriah, 2017).

*Molecular docking* atau penambatan molekuler merupakan prosedur komputasi yang dapat memprediksi ikatan non-kovalen antara makromolekul (target) dengan molekul kecil (ligan) secara akurat. Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi konformasi ikatan yang terjadi serta afinitas ikatan yang terbentuk. Prediksi ini penting karena digunakan sebagai *virtual screening* untuk senyawa yang memiliki potensi sehingga dapat dikembangkan menjadi obat baru (Trott dan Olson, 2009; Zuchriah, 2010).

Tujuan dari *molecular docking* adalah untuk memperoleh bentuk konformasi ikatan bebas yang optimal antara protein dan ligan serta orientasi relatifnya sehingga energi bebas dari sistem secara keseluruhan dapat diminimalkan. Metode komputasi dengan menemukan ligan yang cocok secara geometris dan energi kepada sisi aktif atau situs pengikatan protein disebut penambatan atau pengikatan molekul. Penambatan molekul membantu dalam mempelajari interaksi antara ligan sebagai obat dan reseptor sebagai protein target dengan mengidentifikasi sisi aktif yang sesuai pada protein tersebut, memperoleh geometri terbaik serta menghitung energi interaksi dari ligan untuk merancang senyawa yang lebih afektif (Mukesh dan Rakesh, 2011).



**Gambar 2.8.** Konsep dasar *Molecular docking* (Mukesh dan Rakesh, 2011).

Untuk melakukan *screening* penambatan, hal utama yang harus dimiliki adalah struktur protein target dan struktur ligan yang akan diujikan. Struktur protein diperoleh melalui teknik kristografi sinar-x dan spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR). Struktur dalam bentuk tiga dimensi protein dan ligan yang potensial, bertindak sebagai *input* (data mining) dalam proses penambatan.

Penambatan molekul yang optimal tergantung pada dua faktor yaitu penentuan geometri yang tepat dan nilai *scoring* penambatan (Mukesh dan Rakesh, 2011).

*Scoring* berfungsi untuk menghitung energi ikatan kompleks ligan dan reseptor protein yang terbentuk dan mengurutkan peringkat energi pengikatan senyawanya (Apriani, 2015). Identifikasi tersebut didasarkan pada teori energi bebas Gibbs. Nilai energi bebas Gibbs yang semakin kecil menunjukkan konformasi ikatan yang stabil, sebaliknya untuk nilai energi bebas Gibbs yang besar menunjukkan konformasi ikatan yang tidak stabil. Penggunaan algoritma sebagai penentu geometri situs aktif berperan dalam penentuan konformasi (*docking pose*) yang paling stabil (Funkhouser, 2007; Apriani, 2015). Gugus fungsi ligan akan berinteraksi langsung dengan residu asam amino protein target yang akan membentuk ikatan intermolekul. Kekuatan dari ikatan inilah yang dihitung dan diperingkatkan (*ranking*) dengan *Scoring function*.

Menurut (Mukesh dan Rakesh, 2011), berdasarkan interaksi yang terjadi, terdapat beberapa jenis *Molecular docking*, yaitu:


1. *Docking* antara protein dan ligan
2. *Docking* antara protein dan peptida
3. *Docking* antara protein dan protein
4. *Docking* antara protein dan nukleotida

*Docking* juga memfisiualisasikan tahapan interaksi yang terjadi antara dua molekul dalam ruang tiga dimensi. Penambatan molekul telah berperan penting dalam proses penemuan obat baru selama bertahun-tahun. Salah satu motivasi

utama dalam penemuan obat baru di antaranya mengidentifikasi situs pada molekul kecil, menunjukkan nilai afinitas pengikatan yang optimal, dan selektivitas kelayakan senyawa target melalui profil ADME (Adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi). Dalam upaya merancang obat diperlukan teknik dalam menentukan dan memprediksi geometri, konformasi, dan sifat elektronik molekul uji (Krovat et al, 2005; Nogrady, 2005; Suharna, 2012).

Sampai sekarang setidaknya sudah ada 60 program *docking* dan yang paling sering digunakan adalah *discovery studio* yang dapat digunakan dalam preparasi protein dan *AutoDock Vina* yang dapat digunakan mempreparasi ligan dan melakukan proses *docking* karena memiliki akurasi sangat baik dan banyak digunakan untuk menghitung *binding affinity* antara *small molecule* dengan protein (Widodo et al, 2018).

Pengetahuan tentang struktur dan ligan *binding site* dari protein reseptor merupakan bagian terpenting sebelum melakukan *docking*. Tanpa mengetahui sisi pengikatan ligan, maka *docking* menjadi kurang terarah dan sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal. *Docking* dilakukan dengan software yang lisensi terbuka dan melalui langkah-langkah sebagai berikut:



**Gambar 2.9.** Proses analisis *docking*

Proses *docking* menggunakan *AutoDock Vina* yang terintegrasi dalam *software PyRx*, sedangkan analisis interaksi *docking* dapat menggunakan aplikasi *PyMOL* dan *LIGPLOT<sup>+</sup>* (Widodo et al, 2018).

### G. Sumber Informasi Database

*PubChem* (<http://PubChem.ncbi.nlm.nih.gov>) merupakan sebuah situs yang berisi kumpulan *database* dari informasi molekuler dalam bentuk 3D yang berasal dari kontribusi peneliti biologi molekuler diseluruh dunia (Fathiyah, 2015). *PubChem* adalah tempat penyimpanan informasi molekuler yang dapat diakses secara umum, dan merupakan sebuah karya ilmiah dari *US National Institutes of Health* (NIH). Basis data *PubChem* telah berisi lebih dari 27 juta data struktur kimia, yang terdiri dari hampir 70 juta senyawa endapan dan berisi lebih dari 449.000 data *bioassa* dengan lebih dari ribuan biokimia *in vitro* dan *screening* berbasis sel, lebih dari 7000 protein dan gen yang terikat dengan lebih dari 1,8 juta senyawa (Xie, 2010). Dalam situs *PubChem* ini dapat diperoleh struktur kimia suatu senyawa yang akan digunakan dalam penambatan molekul yang dapat berfungsi sebagai ligan (Fitriah, 2017).

*Protein Data Bank* atau PDB (<http://www.rcsb.org/pdb/>) merupakan sebuah situs yang berisi kumpulan *database* molekuler dalam bentuk 3D yang mempunyai lebih dari 32.500 makromolekul biologis. Molekul tersebut didapatkan dari berbagai jenis organisme termasuk pada manusia, hewan, tumbuhan dan bakteri. Ukuran senyawa yang terdapat pada situs *database* ini memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang berukuran kecil, potongan-

potongan DNA hingga molekul berstruktur kompleks seperti ribosom (Berman *et al.*, 2000; RCSB, 2014). Makro molekul berupa protein yang diperoleh dari *Protein Data Bank* akan berperan sebagai reseptor target dalam proses *molecular docking* (Fitriah, 2017).

*Way2Drug* atau dikenal juga dengan *PASS Online (Prediction of Activity Spectra for Substances)* merupakan salah satu situs yang dimanfaatkan dalam memprediksi aktivitas biologi sebuah senyawa (Jamkhande *et al.*, 2014). Analisis ini di dasarkan pada hubungan dari struktur senyawa dengan aktivitas biologis yang dimiliki senyawa tersebut (Pramely, 2012). *Way2Drug* juga merupakan *software* yang dimanfaatkan dalam bidang farmakologi untuk memprediksi aktivitas senyawa sintesis yang akan digunakan sebagai kandidat obat baru.

*SwissADME* atau dikenal juga dengan *Pre-ADMET Online* merupakan *software* yang dapat diakses secara *online* dan dimanfaatkan untuk memprediksi berbagai sifat yang dimiliki oleh struktur kimia dari suatu senyawa. *Software* ini dapat digunakan dalam memperoleh data terkait kemampuan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi hingga toksisitas suatu senyawa kimia (Kang, 2005; Fitriah, 2017).

*Lipinski Rule of Five (RO5)* merupakan situs *online* yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kemampuan suatu senyawa kimia atau obat ketika diaplikasikan melalui oral kepada manusia (Lipinski, 2004; Fitriah, 2017). Lokasi reseptor yang menjadi target penelitian berada di dalam sel sehingga ligan uji harus dapat menembus membran sel dan terikat dengan reseptor targetnya (Kuiper *et al.*, 1996; Fitriah, 2017). Situs ini dapat membantu dalam penentuan

biovibilitas senyawa yang akan berikatan dengan reseptor (Arwansyah et al, 2014). Dalam upaya merancang obat yang aktif bila digunakan secara oral, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai antara lain berat molekul <500, memiliki gugus hidrogen donor <5, memiliki gugus hydrogen akseptor <10, Nilai logP <5, dan *molar refractivity* sebaiknya diantara 40-130 (Lipinski, 2004; Fitriah, 2017).

#### H. Perangkat Lunak`


*AutoDock Vina* merupakan perangkat lunak yang dapat difungsikan untuk melakukan proses *docking* senyawa dan *screening* awal senyawa. *AutoDock Vina* memiliki beragam kegunaan, kinerja yang baik serta tingkat akurasi yang memudahkan proses analisis (Sandeep et al, 2011). Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menambatkan molekul dengan jumlah banyak sekaligus serta meminimalisir ukuran senyawa agar proses penambatan molekul tidak menghabiskan waktu yang lama. Penambatan molekul menggunakan *AutoDock Vina* akan memperoleh *score* hasil penambatan dari interaksi antara suatu molekul senyawa dengan protein target (Trott dan Olson, 2009; Fitriah, 2017).

*Discovery Studio* merupakan *software* yang dapat dimanfaatkan dalam memvisualisasi struktur makro molekul dan kompleksnya dengan interaktif. *Discovery Studio* dapat digunakan dalam proses membuka, mengedit struktur molekul, dan menganalisis data hasilkan dari perangkat lunak lain. *Software* ini dapat diterapkan pada *linux* dan *windows* serta terintegrasi dengan setiap fitur yang ada di desktop (Visualizer, 2005; Apriani, 2015).

*Open Babel* merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengubah beberapa format pada berkas kimia. Selain itu *software* ini menyediakan beberapa kegunaan diantaranya mencari konformer dan visualisasi 2D, penyeleksian, pencarian sub struktur, kemiripan serta konversi *batch*. *Open Babel* memfasilitasi setidaknya 111 format berkas kimia, membaca 82 format dan menulis 85 format yang dapat diakses tanpa dipungut biaya (O'Boyle, *et al.*, 2011).

*PyMOL* adalah *software* visualisasi yang dioperasikan agar dapat memahami struktur dan menampilkan visualisasi 3D dari suatu molekul yang memiliki kualitas yang tinggi dan menyajikannya dalam beberapa warna, baik itu molekul kecil (ligan) maupun makromolekul (protein). Visualisasi sangat penting untuk lebih memahami dan mendalami struktur suatu molekul (DeLano dan Bromberg, 2004; Apriani, 2015).

## I. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Waktu dan lokasi dari penelitian ini yaitu dimulai pada bulan Juli - September 2020. Pelaksanaannya menggunakan perangkat keras berupa *notebook* dan perangkat lunak berupa *website* dan aplikasi *docking* senyawa yang dioperasikan di daerah Pao-pao, Sungguminasa, kabupaten Gowa.

#### ***B. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan mengidentifikasi komplekstasi dan efek dari penyatuan ligan yang berasal dari senyawa tanaman dengan reseptor yang merupakan protein target dari penyakit kanker payudara menggunakan metode *Molecular docking* atau secara *in silico*.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas meliputi bentuk konformasi dari ikatan yang terbentuk antara ligan dan protein target serta variabel terikat yang meliputi skor penambatan antara molekul ligan dan molekul reseptor.

#### ***D. Defenisi Operasional Variabel***

Adapun definisi oprasional variabel pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*) ini merupakan berbagai jenis senyawa fitokimia yang terkandung di dalam berbagai bagian dari tanaman *A. marmelos* yang diidentifikasi menggunakan alat GC-MS dan *discreening* awal melalui *website SWISSADME* dan aplikasi *WAY2Drug*.
2. Protein yang berperan dalam penyakit kanker payudara merupakan protein yang berperan sebagai reseptor penanda pada kanker tersebut, diantaranya adalah *Estrogen Receptor Alpha (ER $\alpha$ )*, *Progesteron Receptor (PR)*, dan *Human Epidermal Growth Factor Receptor (HER-2)* yang juga berfungsi mengedalikan pertumbuhan dan proliferasi dari sel kanker payudara.
3. Analisis *in silico* merupakan metode berbasis komputasi yang dikembangkan dan diterapkan secara luas dalam bidang farmakologi, salah satunya adalah upaya menemukan kandidat obat baru melalui pemodelan dan penambatan (*docking*) mikro molekul (ligan) yang merupakan senyawa aktif dari tumbuhan ke pada sisi aktif dari protein yang merupakan reseptor penanda dari penyakit tertentu. Hasil penambatan yang diperoleh berupa moda-moda ikatan antara ligan dan reseptor serta energi ikatan yang merupakan tolak ukur dari konformasi dan efek apa bila senyawa dan protein target berikatan.

## **E. Instrumen Penelitian**

### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perangkat keras berupa satu set *notebook* dengan spesifikasi prosesor Intel<sup>®</sup> Core 2 Duo T5870 2,0 GHz, memori 1 GB, DDR2 800 MHz, dan harddisk 250 GB. Perangkat

lunak yang digunakan antara lain system oprasi *Windows 7*, *Discovery studio*, *PyRx*, *AutoDock Vina*, *PyMOL*, *Lipinski Rule of Five* (<http://www.scfbio-iitd.res.in/software/drugdesign/lipinski.jsp>), *SWISSADME* (<http://lmm.d.ecust.edu.cn/admetsar2/>), *WAY2Drug* (<http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>). Sumber *data base* adalah *PubChem* (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dan *Protein Data Bank* (<https://www.rcsb.org>).

## 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain struktur 3D ligan uji berupa senyawa *Hexastrol (Dihydrodiethylstrilbestrol)* CID: 3606, *Furo [2,3-b] quinoline, 4,7,8-trimethoxy- (Oxalic acid;4,7,8-trimethoxyfuro[2,3-b] quinolone)* CID: 6760, *Flavone* CID: 10680, *Corynan-17-ol, 18,19-didehydro, 10-methoxy, acetate (ester)* CID: 550058, *Bergabtol (4-Hydroxy-7H Furo (3-2-g) Chromen-7-One)* CID: 5280371, *Hexestrol, O-trifluoroacetyl-([4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenyl] 2,2,2-trifluoroacetate)* CID: 91715000. Struktur Protein 3D *Estrogen Receptor Alpha (ER $\alpha$ )* ID: 6b0f, *Progesteron Receptor (PR)* ID: 1a28, *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER-2)* ID: 2jab dan ligan kontrol masing-masing reseptor.

## F. Prosedur Kerja

### 1. Pengumpulan *data mining* dan *screening* awal senyawa

Langkah pertama yaitu senyawa yang merupakan data sekunder hasil GC-MS tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) dalam (Tagad *et al*, 2018., Sharma *et al*, 2018., Vardhini *et al*, 2018) *discreening* awal melalui *website SWISSADME*

(<http://lmmd.ecust.edu.cn/admet2/>) dan *WAY2Drug* (<http://pharmaexpert.ru/PASSonline/index.php>) dengan menggunakan *Colonical smiles* dari senyawa tersebut untuk mengetahui potensi, adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas dari senyawa tersebut. Setelah didapatkan beberapa kandidat senyawa, langkah selanjutnya yaitu pengumpulan *data mining* dari kandidat senyawa dan protein target yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai protein dan senyawa yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

## 2. Preparasi ligan dan protein target

Preparasi ligan dilakukan dengan terlebih dahulu mengunduh struktur ligan 3D melalui *website PubChem* (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dan disimpan dalam format PDB. Selanjutnya dengan menggunakan *Open babel* dalam *software PyRx*, seluruh ligan diturunkan energi aktifasinya dan disimpan ke dalam format PDB.

Preparasi protein dilakukan dengan terlebih dahulu mengunduh struktur protein 3D melalui *website Protein data bank* (<https://www.rcsb.org>) dan disimpan dalam format SDF. Selanjutnya dengan menggunakan *software Discovery studio*, struktur protein 3D dibersihkan dari molekul-molekul lain termasuk dari ligan kontrol sehingga hanya menyisakan struktur protein saja, kemudian disimpan kembali dalam bentuk format PDB (Fitriah, 2017) .

## 3. Penambatan molekul (*Molecular docking*) dan *scoring*

Penambatan molekul senyawa (ligan) kepada reseptor target (protein) dilakukan menggunakan *software AutoDock Vina* yang dapat diakses melalui *software PyRx*. dan proses *docking* menggunakan *Autodock vina*, ligan

ditambahkan terlebih dahulu yang kemudian menyusul penambahan makromolekul untuk penentuan *grid box* atau posisi *active site* dari protein. Setelah itu akan *diforward* untuk proses *scoring* energi ikatan antara ligan dan protein target. Jika nilai *affinity* mode 1 dari ligan uji semakin rendah atau mencapai  $(-8,0)$  *kcal/mol* maka dikatakan layak untuk dilanjutkan ketahap visualisasi hasil *docking*. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses *Molecular docking* yaitu sebelum melakukan proses *docking* terhadap senyawa uji, terlebih dahulu dilakukan *redocking* menggunakan ligan kontrol atau *native ligand* untuk proses *Validasi* (Fitriah, 2017; Rastini, 2019).

#### 4. Visualisasi hasil *docking*

Visualisasi hasil *docking* struktur 3D dilakukan dengan memanfaatkan *software PyMOL* dengan menggunakan data hasil *scoring* tiap ligan dan protein yang telah dipreparasi sedangkan untuk visualisasi interaksi ikatan struktur 3D dan 2D dilakukan dengan memanfaatkan *software Discovery studio* (Fitriah, 2017).

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif meliputi data hasil *creening* awal (*SWISSADME* dan *WAY2Drug*) yang dilakukan sebelum penelitian dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Analisis hasil *docking* dilakukan dengan cara mengelompokkan model ligan yang memiliki afinitas yang paling rendah serta jenis-jenis ikatan yang terbentuk (Fitriah, 2017). Kemudian dilanjutkan dengan analisis akhir ligan yang merupakan validasi hasil pengujian menggunakan *website Lipinski Rule of Five* (<http://www.scfbioiitd.res.in>

[/software/drugdesign/lipinski.jsp](#)) untuk mengetahui kemampuan ligan dalam penembus dinding sel untuk mencapai protein target.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

#### 1. Penambatan molekul (*Molecular docking*)

Penambatan molekul senyawa (ligan) kepada reseptor (protein target) dilakukan menggunakan *software AutoDock Vina* yang dapat diakses melalui *software PyRx* (Fitriah, 2017; Rastini, 2019). Hasil penambatan molekul dan *scoring* senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*) dengan reseptor progesteron (PR) ID 1a28 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.a.1.a** Data *scoring* hasil *docking* ligan dan protein target (ID 1a28)

Ligan	Progesteron Receptor (PR) (ID 1a28)		
	$\Delta G^\circ$ (kcal/mol)	Jumlah Interaksi	
		Kontak Hidrofobik	Ikatan Hidrogen
<i>Control</i>	-9.7	7 residu	1
<i>Dihydrodiethylstilbestrol</i> (ID 3606)	-8.3	10 residu	0
<i>Skimmianine</i> (ID 6760)	-7.0	4 residu	1
<i>Flavone</i> (ID 10680)	-8.7	6 residu	0
<i>2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12b- octahydroindolo[2,3- a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate</i> (ID 550058)	-7.9	5 residu	1
<i>Bergabtol</i> (ID 5280371)	-7.7	8 residu	2

<b>[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate (ID 91715000)</b>	<b>-8.0</b>	12 residu	2
---	-------------	-----------	---

Hasil penambatan molekul dan *scoring* senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*) dengan reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2 (HER-2) ID 2jab dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.a.1.b** Data *scoring* hasil *docking* ligan dan protein target (ID 2jab)

Ligan	<b>Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER-2) (ID 2jab)</b>		
	$\Delta G^\circ$ (kcal/mol)	Jumlah Interaksi	
		Kontak Hidrofobik	Ikatan Hidrogen
<b>Control</b>	-	-	-
<b>Dihydrodiethylstilbestrol (ID 3606)</b>	7	3 residu	0
<b>Skimmianine (ID 6760)</b>	-6.4	7 residu	1
<b>Flavone (ID 10680)</b>	<b>-8.5</b>	7 residu	1
<b>2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate (ID 550058)</b>	-7.1	6 residu	2
<b>Bergabtol (ID 5280371)</b>	-6.8	7 residu	0
<b>[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate (ID 91715000)</b>	-6.4	5 residu	1

Hasil penambatan molekul dan *scoring* senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*) dengan reseptor eskrogen alfa (ER $\alpha$ ) ID 6b0f dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.a.1.c** Data *scoring* hasil *docking* ligan dan protein target (ID 6b0f)

Ligan	<i>Estrogen Receptor Alpha (ER<math>\alpha</math>)</i> (ID 6b0f)		
	$\Delta G^{\circ}$ (kcal/mol)	Jumlah Interaksi	
		Kontak Hidrofobik	Ikatan Hidrogen
<i>Control</i>	-7.5	7 residu	2
<i>Dihydrodiethylstilbestrol</i> (ID 3606)	<b>-8.0</b>	8 residu	1
<i>Skimmianine</i> (ID 6760)	-6.1	9 residu	1
<i>Flavone</i> (ID 10680)	<b>-8.3</b>	5 residu	1
<i>2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate</i> (ID 550058)	-7.1	7 residu	2
<i>Bergabtol</i> (ID 5280371)	-6.9	6 residu	1
<i>[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate</i> (ID 91715000)	-7.3	6 residu	1

Penambatan molekul senyawa (ligan) kepada reseptor (protein target) dilakukan menggunakan *software AutoDock Vina* yang dapat diakses melalui *software PyRx*. *Software* ini dapat melakukan proses penambatan molekul dalam jumlah yang lebih dari satu sekaligus dan meminimalisir ukuran senyawa agar

proses penambatan molekul dapat dilakukan dengan cepat. Penambatan molekul menggunakan *AutoDock Vina* akan memperoleh *score* hasil penambatan dari interaksi antara suatu molekul senyawa dengan protein target (Trott dan Olson, 2009; Fitriah, 2017). Dalam proses *docking* menggunakan *AutoDock Vina*, ligan ditambahkan terlebih dahulu yang kemudian menyusul penambahan makromolekul untuk penentuan *grid box* atau posisi *active site* dari protein. Setelah itu akan di *forward* untuk proses *scoring* energi ikatan antara ligan dan protein target. Jika nilai *affinity* mode 1 dari ligan uji semakin rendah atau mencapai  $(-8,0)$  *kcal/mol* maka dikatakan layak untuk dilanjutkan ketahap visualisasi hasil *docking* (Fitriah, 2017; Rastini, 2019).

Berdasarkan data *scoring* ( $\Delta G^\circ$  *Binding Affinity*) dari hasil *docking* antara ligan *A. marmelos* (ID 3606, 6760, 10680, 550058, 5280371, dan 91715000) dengan protein target kanker payudara (ID 6b0f, ID 1a28, ID 2jab), diketahui bahwa senyawa tumbuhan *A. marmelos* dapat berinteraksi dengan sisi aktif dari protein target. Di antaranya berhasil memperoleh nilai konformasi ikatan mencapai  $(-8,0)$  *kcal/mol* yaitu senyawa *Dihydrodiethylstilbestrol* (ID 3606), *Flavone* (ID 10680), *[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate* (ID 91715000) pada protein *Progesteron receptor* (PR) (ID 1a28). Senyawa *Flavone* (ID 10680) pada protein *Human epidermal growth factor receptor* (HER-2) (ID 2jab) yang diperoleh dari *Blind docking* dan senyawa *Dihydrodiethylstilbestrol* (ID 3606) dan *Flavone* (ID 10680) pada protein *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) (ID 6b0f). Namun hanya ada satu ligan uji yang memiliki nilai  $\Delta G^\circ$  *Binding Affinity* yang mencapai  $(-8,0)$  *kcal/mol* dari

interaksinya pada ketiga protein target. Ligan tersebut adalah senyawa *Flavone* dengan ID 10680 yang mengindikasikan ligan tersebut merupakan senyawa yang berpotensi sebagai obat apabila berikatan dengan protein target.

Senyawa *Flavone* ID 10680 yang telah dioptimasi ditambahkan (*docking*) satu-persatu pada protein *Progesteron Receptor* (PR) ID 1a28, *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) ID 2jab, *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ID 6b0f yang juga telah dipreparasi menggunakan aplikasi *Autodock vina*. Berdasarkan *scoring* dari hasil *docking* yang dilakukan, diperoleh delapan konformasi ikatan antara senyawa *Flavone* dengan protein-protein tersebut. Makromolekul 1a28, 2jab, dan 6b0f masing-masing memiliki nilai ikatan -8.7 *kcal/mol*, -8.5 *kcal/mol*, dan -8.3 *kcal/mol* yang merupakan nilai konformasi energi terendah dan yang paling stabil. Hasil *docking* antara ligan kontrol atau *native ligand* dan proteinnya (1a28 dan 6b0f) memperoleh nilai ikatan sebesar -9.7 *kcal/mol* dan -7.5 *kcal/mol*. Hal tersebut menunjukkan dua hasil yang berbeda, di mana nilai ikatan senyawa *Flavone* lebih tinggi dari *native ligand* makromolekul 1a28. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi senyawa *Flavone* dalam berikatan dengan sisi aktif protein lebih lemah dari *native ligand*-nya, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk berikatan. Lain halnya dengan makromolekul 6b0f, di mana nilai ikatan senyawa *Flavone* lebih rendah dari *native ligand*-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi senyawa *Flavone* dalam berikatan dengan sisi aktif protein 6b0f lebih baik dari *native ligand*-nya. Sedangkan untuk protein 2jab yang tidak mempunyai *native ligand*, nilai konformasi -8.5 *kcal/mol* merupakan nilai mutlak dari energi ikatan yang terbentuk, atau dengan kata lain


senyawa *Flavone* yang bersumber dari tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) dapat bereaksi sebagai obat apabila berikatan dengan reseptor target pada kanker payudara.

## 2. Visualisasi hasil *docking* dan Mekanisme Intaseluler Reseptor dan Ligan

Visualisasi hasil *docking* struktur 3D dilakukan dengan memanfaatkan *software PyMOL* dengan menggunakan data hasil *scoring* tiap ligan dan protein yang telah dipreparasi sedangkan untuk visualisasi interaksi ikatan struktur 3D dan 2D dilakukan dengan memanfaatkan *software Discovery studio* (Fitriah, 2017). Berikut visualisasi hasil *docking* dari ligan dengan nilai konformasi terendah yaitu *Flavone* dengan ID 10680:


### a. Progesteron Receptor (PR) ID 1a28

Struktur hasil visualisasi penambatan molekul senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan reseptor progesteron (PR) ID 1a28 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.a.2.a.1.** Visualisasi *docking* senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan protein *Progesteron Receptor* (PR) ID 1a28

Visualisasi *docking* antara makromolekul *Progesteron Receptor* (PR) ID 1a28 dengan ligan *Flavone* (ID 10680) menunjukkan berbagai Ikatan energi yang terbentuk, di antaranya yang mendominasi adalah ikatan *hydrophobic* seperti yang terlihat pada residu asam amino PRO A:696, TPR A:732, LEU A:758, VAL A:729 dan LYS A:822 yang menandakan adanya aktifitas *hydrophobic*. Terbentuk pula ikatan *electrostatic* seperti yang terlihat pada residu ARG B:766. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi interaksi antara ligan *Flavone* (ID 10680) dengan sisi aktif dari makromolekul *Progesteron Receptor* (PR) ID 1a28.




**Gambar 4.a.2.a.2. Ilustrasi intraseluler mekanisme pensinyalan *Progesteron Receptor* (PR).** Sekitar 10% metastase kanker payudara juga dapat diinisiasi oleh PR. Progesteron dapat memacu ekspresi protein dengan menembus membran sel dan membentuk kompleks dengan PR di sitosol. Kemudian bertranslokasi ke nukleus dan berikatan dengan *Progesteron Receptor Element* (PRE) yang mempromotori teradinya regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi dan kemudian proliferasi secara tidak terkendali (McDonnell, 1995; Sable et al, 2005; Briskin, 2013).

Mekanisme penambatan dan pensinyalan senyawa *Flavon* terhadap *Progesteron Receptor* (PR) berlangsung secara intraseluler, di mana *Flavon*

bekerja dengan menebus membran sel dan berikatan dengan *Progesteron Receptor* (PR) yang berada di sitosol. *Flavon* menambat pada situs aktif dari dan menginduksi *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) sehingga mengubah konformasinya dan membentuk homodimer. Kemudian kompleks ligan dan reseptor bertranslokasi dari sitosol ke nukleus untuk berikatan dengan *Progesteron Receptor Element* (PRE) yang berada pada gen target (PGR – k11q22). Kompleks DNA dan reseptor dengan bantuan protein HSP dan FT akan menekan proses transkripsi reseptor target dan kemudian mengatur kembali proliferasi sel (McDonnell, 1995; Sable at al, 2005; Brisken, 2013).

b. *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) ID 2jab


Struktur hasil visualisasi penambatan molekul senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2 (HER-2) ID 2jab dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.a.2.b.1.** Visualisasi *docking* senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan protein *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) ID 2jab

Visualisasi *docking* antara makromolekul *Human Epidermal Growth Factor Receptor* (HER-2) ID 2jab dengan ligan *Flavone* (ID 10680)

menunjukkan berbagai Ikatan energi yang terbentuk, di antaranya yang mendominasi adalah ikatan *hydrophobic* seperti yang terlihat pada residu asam amino PHE B:81, ALA A:56, PHE B:89, LEU A:86, PHE A:81 dan PHE A:89 yang menandakan adanya aktifitas *hydrophobic*. Terbentuk pula ikatan *hydrogen conventional* seperti yang terlihat pada residu TVR A:52 yang menandakan bahwa terjadi interaksi antara ligan *Flavone* (ID 10680) dengan sisi aktif dari *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) ID 2jab.




**Gambar 4.a.2.b.2. Ilustrasi intraseluler mekanisme pensinyalan *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2).** Sekitar 30% metastase kanker payudara juga dapat diinisiasi oleh reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau HER-2. Overekspresi dari HER-2 dapat memacu terjadinya overekspresi pada jalur reseptor protein kinase yang melibatkan onkoprotein seperti (PI3K-Akt) dan (RAS-MAPK), setelah itu mengaktifasi ER $\alpha$  dan bertranslokasi ke nukleus untuk berikatan dengan reseptor elemen, kompleks tersebut akan mempromotori teradinya regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi dan kemudian proliferasi secara tidak terkendali (Montenuro et al, 2013; Schettini et al, 2016).

Mekanisme penambatan dan pensinyalan senyawa *Flavon* terhadap *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) berlangsung secara

intraseluler, di mana *Flavon* berikatan dengan *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) yang berada di permukaan membran sel. *Flavon* menambat pada situs aktif dari *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ). *Flavon* berikatan dan menginduksi *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* (HER-2) dan mengirimkan sinyal pada jalur reseptor protein kinase yang melibatkan onkoprotein seperti (P13K-Akt) dan (RAS-MAPK), setelah itu mengaktifasi ER $\alpha$  dan bertranslokasi ke nukleus untuk berikatan dengan reseptor elemen HER-2 (SRE) yang berada pada gen target (ERBB2 – k17q12). Kompleks DNA dan reseptor dengan bantuan protein ko-aktivator dan faktor transkripsi (CoA/Ap1-Sp1) akan menekan proses transkripsi reseptor target dan kemudian mengatur kembali proliferasi sel (Montenurro et al, 2013; Schettini et al, 2016).


c. *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ID 6b0f

Struktur hasil visualisasi penambatan molekul senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan reseptor estrogen alfa (ER $\alpha$ ) ID 6b0f dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.a.2.c.1.** Visualisasi *docking* senyawa *Flavone* (ID 10680) dengan protein *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ID 6b0f

Visualisasi *docking* antara makromolekul *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ID 6b0f dengan ligan *Flavone* (ID 10680) menunjukkan berbagai Ikatan energi yang terbentuk, di antaranya yang mendominasi adalah ikatan *hydrophobic* seperti yang terlihat pada residu asam amino PHE B:445, ILE B:326, PRO B:324 dan MET B:357 yang menandakan adanya aktifitas *hydrophobic*. Terbentuk pula ikatan *hydrogen conventional* seperti yang terlihat pada residu LYS B:449 yang menandakan bahwa terjadi interaksi antara ligan *Flavone* (ID 10680) dengan sisi aktif dari makromolekul *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) ID 6b0f.



**Gambar 4.a.2.c.2. Ilustrasi intraseluler mekanisme pensinyalan *Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ).** Sekitar 80% metastase kanker payudara diinisiasi oleh adanya aktivitas reseptor estrogen alpa. Estrogen ( $17\beta$ -estradiol) dapat memacu ekspresi protein dengan menembus membran sel dan membentuk kompleks dengan ER $\alpha$  di sitosol. Kemudian bertranslokasi ke nukleus dan berikatan dengan *Estrogen Receptor Element* (ERE) yang mempromotori teradinya regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi dan kemudian proliferasi secara tidak terkendali. Aktivitas protein tersebut juga dapat memacu terjadinya overekspresi onkogen dan onkoprotein yang juga berperan dalam proliferasi dan apoptosis sehingga menyebabkan keganasan pada sel (Mason et al, 2010; Mohammad, 2015).

Mekanisme penambatan dan pensinyalan senyawa *Flavon* terhadap *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) berlangsung secara intraseluler, di mana *Flavon* bekerja dengan menebus membran sel dan berikatan dengan *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) yang berada di sitosol. *Flavon* menambat pada domain E yang di dalamnya terdapat domain fungsi transaktivasi AF2 (*Activation function-2*) yang mengaktivasi faktor transkripsi dan merupakan domain pengikatan ligan dan situs aktif dari *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ). *Flavon* berikatan dan menginduksi *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) sehingga mengubah konformasinya dan membentuk homodimer. Kemudian kompleks ligan dan reseptor bertranslokasi dari sitosol ke nukleus dan mengikat sekuens DNA konsensus polindromik yang dikenal dengan estrogen reseptor elemen (ERE) yang berada pada gen target (ESR1 - k6q25.1) yang mengkode ekspresi *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ). Kompleks DNA dan reseptor dengan bantuan protein ko-aktivator dan ko-represor (CoA/R) akan menekan proses transkripsi reseptor target dan kemudian mengatur kembali proliferasi sel (Mason et al, 2010; Mohammad, 2015).

Flavon adalah golongan senyawa jenis flavonoid yang banyak ditemukan di alam. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol alam terbesar yang ditemukan di dalam tanaman. Golongan senyawa ini juga merupakan hasil metabolisme sekunder dari tanaman yang diketahui memiliki bioaktivitas farmakologis (Perwata, 2016). Flavonoid adalah salah satu senyawa yang memiliki sifat fitoestrogen yang berfungsi sebagai Modulator Estrogen Spesifik (SERMs) (Ross dan Kasum, 2002; Fitriah, 2017). Modulator Estrogen Spesifik akan berinteraksi dengan reseptor estrogen untuk menghasilkan efek

antiestrogenik, dikarenakan pada senyawa flavonoid terdapat cincin fenolik yang memiliki kemampuan untuk mengikat reseptor estrogen (Hsiesh, 1998; Fitriah, 2017). Mekanisme fitoestrogen dalam bentuk Modulator Estrogen Spesifik yang berinteraksi dengan reseptor estrogen akan membentuk efek terapi yang serupa dengan efek penggunaan tamoxifen. SERMs bekerja dengan menembus membran sel dan berikatan dengan reseptor estrogen yang berada di sitosol, kemudian membentuk kompleks dan bertranslokasi ke nukleus dan kemudian berikatan dengan *Estrogen Respon Element* (ERE) yang terdapat di DNA sekitar reseptor target yang akan dikontrol transkripsinya. Kompleks tersebut selanjutnya akan berikatan dengan protein ko-repressor CoR yang akan menekan proses transkripsi reseptor target dan kemudian mengatur proliferasi sel (Bryant, 2002; Girault et al., 2006; Fitriah, 2017).

Berdasarkan hasil visualisasi *docking* antara ketiga reseptor (ID 1a28, 2jab dan 6b0f) dengan senyawa *Flavone* (ID 10680) menunjukkan berbagai ikatan yang terbentuk, di antaranya yang mendominasi residu asam amino adalah ikatan *hydrophobic* yang terlihat pada setiap hasil visualisasi yang menandakan adanya aktifitas *hydrophobic*. Ikatan *hydrophobic* merupakan molekul non polar yang tidak larut dalam air dan ikatan yang penting pada proses penyatuan daerah non polar molekul ligan dengan daerah non polar reseptor target (Hariz, 2019). Terbentuk pula ikatan *electrostatic* yang terlihat pada visualisasi protein ID 1a28 yang menandakan terjadinya aktifitas *electrostatic*. Menurut Apriani (2015), adanya interaksi *electrostatic* dan ikatan *hydrophobic* juga memberikan kontribusi pada nilai bebas ikatan dari konformasi ligan an reseptor selain ikatan *hydrogen*.

Selain itu, yang terpenting adalah berhasil terjadi interaksi antara senyawa dengan sisi aktif dari protein ID 2jab dan ID 6b0f yang ditandai dengan terbentuknya energi berupa ikatan *hydrogen conventional*. Ikatan *hydrogen* dan *hydrophobic* yang menyebabkan perubahan aktivitas biologis dan memberikan efek farmakologi tertentu (Alfisah, 2020) atau dengan kata lain senyawa tersebut dapat bereaksi sebagai obat apabila berikatan dengan reseptor penanda pada kanker payudara.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengidentifikasi adanya aktivitas anti kanker payudara pada senyawa tumbuhan maja (*Aegle marmelos*) dengan metode penambatan molekul (*Molecular docking*). Nilai *scoring docking* yang memenuhi syarat terjadinya interaksi (-8,0 *kcal/mol*) dihasilkan oleh senyawa (ID 3606, 10680, dan 91715000) pada ketiga protein target. Namun dari ketiga senyawa tersebut hanya ada satu yaitu senyawa *Flavone* (ID 10680) yang menunjukkan hasil visualisasi yang membentuk berbagai aktifitas ikatan berupa *hydrophobic*, *electrostatic* serta ikatan *hydrogen conventional*. Interaksi yang terjadi pada sisi aktif protein target tersebut, mengindikasikan bahwa senyawa tersebut memiliki kemampuan dalam menembus dinding sel atau dengan kata lain senyawa tersebut dapat bereaksi sebagai obat apabila berikatan dengan molekul reseptor target pada kanker payudara.

#### **B. Saran**

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ketahap *Molecular dynamic* untuk melihat lebih jelas interaksi yang terjadi antara senyawa uji dan sisi aktif reseptor di dalam tubuh, yang kemudian dilanjutkan ketahap *in vitro* untuk diuji dalam skala laboratorium untuk memastikan potensinya sebagai obat kanker payudara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. Usamah bin Syarik. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz. Al-Alamiah. Hadis No. 17728.
- Alfisah, N. 2020. "Molecular docking Potensi Senyawa Aktif Bawang Merah (*Allium ascalonicum*) sebagai Antifungi dalam Menghambat Enzim Lanosterol 14-Alpha Demethylase dan Squalene Monooxygenase". Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- American Cancer Society. 2017. "*Breast Cancer Grades.*" Atlanta: America.
- American Cancer Society. 2017 "*Treatment of Breast Cancer by Stage.*" Atlanta: America.
- Amtiria, Rahma, Berawi, K, N. 2018. "Peran *Human Epidermal Growth Factor Receptor-2* Pada Kanker Payudara" *Jurnal Agromedicine*. 5(2): h. 644–647.
- Apriani, F. "Studi Penambatan Molekul Senyawa-Senyawa Amidasi Etil Para Metokisinamat Pada Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (Ppar $\gamma$ )". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Arafah, Alfita, B, R., Notobroto, H, B. 2017. "Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)." *Ijph*.
- Arora, D., Sharma, N., Singamaneni, V., Sharma, V., Kushwaha, M., Abrol, V. 2016. "Isolation and Characterization of Bioactive Metabolites from *Xylariopsisidi*, an Endophytic Fungus of the Medicinal Plant *Aegle Marmelos* and Their Role in Mitochondrial Dependent Apoptosis against Pancreatic Cancer Cells". *J Phytomedicine*. 7(4) doi:10.1016/j.phymed.2016.07.004.
- Arwansyah., Ambarsari, L., Sumaryada, T, I. 2014. "Simulasi *Docking* Senyawa Kurkumin Dan Analognya Sebagai Inhibitor Reseptor Androgen Pada Kanker Prostat." *J Current Biochemistry*. 1(1): h. 11-19.
- Asif, A, M., Muhammad, H. *et al.* 2016. "HER-2 Positive Breast Cancer - A Mini-Review." *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*. 17(4): p. 1609-1615.
- Babiker, F, A., *et al.* 2002. "Estrogenic Hormone Action in the Heart: Regulatory Network and Function." *Cardiovascular Research Journal*. 53(3). doi:10.1016/S0008-6363(01)00526-0.
- Baliga., M, S, Thilakchand., K, R, Rai., M, P, Rao., S, Venkatesh., P. 2013. "*Aegle Marmelos* (L.) Correa (Bael) and Its Phytochemicals in the Treatment and Prevention of Cancer." *Integrative Cancer Therapies Journal*. 12(3): p. 187-196.

- Bernhoft, A. "A Brief Review on Bioactive Compounds in Plants." *Bioactive Compounds in Plants - Benefits and Risks for Man and Animals*. 2008.
- Bhar, K., Mondal, S., Suresh, P. 2019. "An Eye-Catching Review of *Aegle Marmelos* L. (Golden Apple)." *Pharmacognosy Journal*. 11(2): p. 207-224.
- Bhatti., R. Singh., J. Saxena., A, K, Suri., N, Ishar., M, P, R. 2013. "Pharmacognostic Standardisation and Antiproliferative Activity of *Aegle marmelos* (L.) Correa Leaves in Various Human Cancer Cell Lines." *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*. p. 628-634.
- Brisken, C. 2013. "Progesterone Signalling in Breast Cancer: a neglected Hormone Coming into the Limelight". *Nature Reviews Cancer*. (13): p. 386-396.
- Cleary, M. P., *et al.* 2010. "Effect of Obesity on Breast Cancer Development." *Journal of Veterinary Pathology*. doi:10.1177/0300985809357753.
- Couse, J, F., *et al.* 1997. "Tissue Distribution and Quantitative Analysis of Estrogen Receptor- $\alpha$  (ER $\alpha$ ) and Estrogen Receptor- $\beta$  (ER $\beta$ ) Messenger Ribonucleic Acid in the Wild-Type and ER $\alpha$ -Knockout Mouse." *Endocrinology*. 138(11). doi:10.1210/endo.138.11.5496.
- Crandall, C, J., Sehl, M, E., Crawford, S, L., Gold, E, B., Habel, L, A., Butler, L, M. 2009. "Sex Steroid Metabolism Polymorphisms and Mammographic Density in Pre- and Early Perimenopausal Women." *Breast Cancer Research*. doi:10.1186/bcr2340.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. 2009. "Chapter 3: Implantation, Embryogenesis, and Placental Development." *Williams Obstetrics*. p. 36-77.
- Dhankhar, S., Ruhil, S., Balhara, M., Chhillar, A. 2011. "*Aegle Marmelos* (Linn.) Correa: a Potential Source of Phytomedicine." *Journal of Medicinal Plants Research*. 5(9): p. 1497-507
- Dinesh, K, S., Gaurav, K., Karthick, L., Bhaskara, R, K, V. 2011. "A Review on Pharmacological and Phytochemical Properties of *Aegle Marmelos* (L.) Corr. Serr. (*Rutaceae*)". *Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research*. 1(2): p. 8-17
- Ekins, S., Mestres, J., Testa, B. 2007. "In Silico Pharmacology for Drug Discovery: Applications to Targets and Beyond." *British Journal of Pharmacology*. doi:10.1038/sj.bjp.0707306.
- Farmasi, F., *et al.* 2008 "Docking Kurkumin dan Senyawa Analognya pada Reseptor Progesteron: Studi Interaksinya sebagai *Selective Progesterone Receptor*". (1): pp. 14–20.
- Fatmawati, I. 2015. "Efektivitas Buah Maja (*Aegle Marmelos* (L.) Corr.) Sebagai Bahan Pembersih Logam Besi." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*. (9): p.

81-87.

- Fitriah, A. 2017 "Analisis Interaksi Senyawa Flavonoid Sukun (*Artocarpus Altilis*) Terhadap Reseptor Estrogen Alfa ( $E\alpha$ ) Secara In Silico Sebagai Model Kandidat Antikanker Payudara". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hakim, A., Widyanti, S., Alfianto, U. "Hubungan antara Obesitas dengan Reseptor Hormonal (Reseptor Estrogen dan Progesteron) dan Ekspresi HER 2/NEU pada Pasien Kanker Payudara di RS X Surakarta". *J Biomedika*. 10(1): p. 30-34.
- Hariz, M, F. "Uji Sitotoksik, Toksisitas, dan Prediksi Sifat Fisikokimia Senyawa Isoliquiritigenin dan Oxyresveratrol Terhadap Reseptor B $\beta$  Lymphoma 2 (4AQ3) dan Vaskular Endotelia Growth Factor Reseptor-2 (2RL5) Sebagai Terapi Kanker Servic Secara In Silico". *Skripsi*, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Hartaningsih, N, M, D., Sudarsa, I, W. 2013. "Kanker Payudara Pada Pasien Wanita Usia Muda di Bagian Bedah Onkologi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tahun 2002- 2012". *Journal of Petrology*. 3(6).
- Hess, R, A. 2003. "Estrogen in the Adult Male Reproductive Tract: A Review." *Reproductive Biology and Endocrinology*. 1(52). doi:10.1186/1477-7827-1-52.
- Hussein, A., et al. "Epidemiology and Prognosis of Breast Cancer in Young Women." *Journal of Thoracic Disease*, 2013, doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2013.04.13.
- Jamkhande, P, G., et al. 2014. "Antioxidant, Antimicrobial Activity and In Silico PASS Prediction of *Annona Reticulata* Linn. Root Extract." *Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences*. doi:10.1016/j.bjbas.2014.05.008. p. 140-148
- Jhajhria, A., Krishan, K. 2016. "Tremendous Pharmacological Values of *Aegle Marmelos*." *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*.
- Keegan, T, H, M., et al. 2012. "Occurrence of Breast Cancer Subtypes in Adolescent and Young Adult Women." *Breast Cancer Research*. 14(2). doi:10.1186/bcr3156.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Krovat, E, M., et al. "Recent Advances in Docking and Scoring." *Current Computer - Aided Drug Design*, 2005.
- Liao, N. 2016. "HER-2 Positive Breast Cancer, How Far Away from the Cure?- On the Current Situation of Anti-HER2 Therapy in Breast Cancer

- Treatment and Survival of Patients.” *Chinese Clinical Oncology*. 5(3). doi:10.21037/cco.2016.05.10.
- Liliana. Istyastono., E, P. 2015. “Uji *In silico* Senyawa Emodin sebagai Ligan pada Reseptor Estrogen Alpa.” *Jurnal Farmasi Sains Dan Komunitas*. 12(2): h. 48-53.
- Lipinski, C, A. 2004. “Lead- and Drug-like Compounds: The Rule-of-Five Revolution.” *Drug Discovery Today: Technologies*. 1(4): p. 337-341
- Manandhar, B., Paudel, K, R., Sharma, B., Kark., R. 2018. “Phytochemical Profile and Pharmacological Activity of *Aegle Marmelos* Linn.” *Journal of Integrative Medicine*. doi:10.1016/j.joim.2018.04.007. p. 1-23.
- Mason, C,E., Shu, F,J., Wang, C., Session, R,M., Kallen, R,G., Sidell, N., Yu, T., Liu, M,H., Cheung, E., Kallen, C,B. 2010. "Location Analysis for the Estrogen Receptor Alpa Reveals Binding to Diverse ERE Sequences and Widespread Binding Within Repetitive DNA Elements". *Nucleic Acids Res.* No. 38. p. 2355-2368.
- McDonnell, D, P. 1995. "Unraveling the Human Progesteron Receptor Signal Transduction Pathway". *TEM*. 6(4): p. 133-138
- Mohammad, I. 2015. "Role of Estrogen Nuclear Receptor (ER) in T Helper Cell". Tesis. Swedish University of Agricultural Science.
- Montemurro, F., Cosimo, S,D., Arpono, G. 2013. "Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive and hormone receptor-positive breast cancer: new insights into molecular interactions and clinical implications". *Journal Annals of Oncology*. 24(11): p. 2715-2724.
- Muhartono., Ramanisa, S., Mutiara, H., Riduan, R, J. 2016. “Hubungan Antara Status Reseptor Estrogen, Reseptor Progesteron Dan *Human Epidermal Growth Factor Receptor 2* Dengan Derajat Keganasan Karsinoma Payudara Invasif.” *Jurnal Majalah Kedokteran Andalas*. 39(2): p. 65-72.
- Mukesh, B., Rakesh, K. 2011. “Molecular Docking. A Review” *International Journal of Research in Ayurveda & Pharmacy*. 2(6): p. 1746-1751.
- Mulyani, N, S. 2013. “*Kanker Payudara Dan PMS Pada Kehamilan*”. Jakarta: Nuha Medika.
- Nursalam. 2016. "Metode Penelitian, and A." *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9): p. 1689-1699.
- Parwata, I, M, O, A. 2014. “Kanker dan Antikanker”. *Bahan Ajar*. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Bali. p. 1-4.
- Piasecka, A., Jedrzejczak, R, N., Bednarek, P. 2015. “Secondary Metabolites in Plant Innate Immunity: Conserved Function of Divergent Chemicals.” *New Phytologist*. doi:10.1111/nph.13325.

- Rahman S., Parvin, R. 2014. "Therapeutic Potential of *Aegle Marmelos* (L.)-An Overview." *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*. 4(1): p. 71–77.
- Rastini, M, B, O., *et al.* 2019. "Molecular Docking Aktivitas Antikanker Dari Kuersetin Terhadap Kanker Payudara Secara In Silico." *Jurnal Kimia*. 13(2): h. 180-184.
- Ring, A., Dowset, M. 2004. "Mechanisms of Tamoxifen Resistance." *Endocrine-Related Cancer*. (11): p. 643-648. doi:10.1677/erc.1.00776.
- Sable, S,G., Shah, C., Rosario, G., Sachdeva, G., Puri, C. 2005. "Progesterone Receptors: Various Forms and Function Reproductive Tissue". *Journal of Frontiers in Bioscience*. (10): p. 2118-2130.
- Sandeep, G., Nagasree, K, P., Hanisha, M., Kumar, K. 2011. "Autodock LE: A GUI for Virtual Screening with Autodock Vina." *BMC Research Notes*. doi:10.1186/1756-0500-4-445.
- Schettini, F., Buono, G., Cardalesi, C., Desideri, I., Placido, S,D., Mastro, L,D. 2016. "Hormone Receptor/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive breast cancer: Where we are now and where we are going". *Cancer Treatment Reviews*. (46): p. 20-26.
- Senkus, E., Kyriakides, S., Ohno, S., Penault-Llorca, F., Poortmans, P., Rutgers, E., *et al.* "Primary Breast Cancer: ESMO Clinical Practice Clinical Practice Guidelines." *Ann Oncol*. 2015.
- Sudiana, I. K. (2008). *Patobiologi Molekuler Kanker*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sharma., N, Dubey., W. 2018. "Determination of Volatile Bioactive Compounds from Extracts of Bael (*Aegle Marmelos*) Plant Parts and Their Comparative Analysis." *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*. 11(3): p. 393–397.
- Suganya, J., Radha, M., Naorem, D, L., Nishandhini, M., 2014. "In Silico Docking Studies of Selected Flavonoids - Natural Healing Agents against Breast Cancer." *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*. 15(19) p. 8155-8159.
- Suharna, S. 2012. "Studi *In silico* Senyawa Turunan Flavonoid Terhadap Penghambatan Enzim *Tirosinase*". *Skripsi*. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2010. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tagad., V, B, Sahoo., A, K, Annapure., U, S. 2018. "Phytochemical Study and GC-MS Analysis of Bael (*Aegle marmelos*) Fruit Pulp". *Journal of Life Science Informatics Publications*. 4(5): p. 779-791

- Tim KKN-KP Biologi UNM. "Atlas Tumbuhan Sulawesi Selatan". Makassar: Penerbit Jurusan Biologi FMIPA UNM, 2015.
- Trott, O., & Olson, A. (2009). Software News and Update Autodock Vina: Improving the Speed and Accuracy of Docking with a New Scoring Function, Efficient Optimization, and Multithreading. *Journal of Computation Chemistry*. 31(2): 455-46.
- Urry, L.S., dkk. (2017). *Campbell Biology, Eleventh Edition*. New York: Pearson Education.
- Vardhini, S, P., Sivaraj, C., Arumugam, P., Ranjan, H., Kumaran, T., Baskar, M. 2018. "Antioxidant , Anticancer , Antibacterial Activities and GC- MS Analysis of Aqueous Extract of Pulps of *Aegle Marmelos* ( L .) Correa." *The Journal of Phytopharmacology*. 7(1): p. 72-78.
- Visualizer, Discovery Studio. "V4. 0.100. 13345." *Accelrys Software Inc*, 2005.
- Vrbic, S., *et al.* "Current and Future Anti-HER2 Therapy in Breast Cancer." *Journal of B.U.ON*. 2013.
- WHO. "Kasus Kanker Payudara Paling Banyak Terjadi Di Indonesia." *Databoks*, 2019.
- Wilujeng., S, Laksitarahmi., P, I, Suharnanik, Tiaranisa., P. 2020. "Antioxidant Maja Fruit ( *Aegle Marmelos* ( L ) Carrea ) Lowering Blood Sugar Mus Musculus". *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*. 2(3): p. 362-367.
- Wind, N. S., dan Holen, I. 2011. " Multidrug Resistance in Breast Cancer: From In Vitro Models to Clinical Studies". *International Journal of Breast Cancer*. 26(3): p. 197–203
- Xie, X, Q, S. 2010. "Exploiting PubChem for Virtual Screening." *Expert Opinion on Drug Discovery*. 5(12): p. 1205-1220.
- Yaghmaie, F., *et al.* "Caloric Restriction Reduces Cell Loss and Maintains Estrogen Receptor-Alpha Immunoreactivity in the Pre-Optic Hypothalamus of Female B6D2F1 Mice." *Neuroendocrinology Letters*. 2005.

## LAMPIRAN

### 1. Pengumpulan *data mining* dan *screening* awal senyawa

#### a. Hasil *screening* awal *website SWISSADME*

**Tabel 1.a.1** Hasil *SwissADME* Senyawa 2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate

<i>ADMET predicted profile</i>	<i>Value</i>	<i>Probability</i>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9942
<i>Human oral bioavailability</i>	-	0.7571
<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	0.9571
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.7181

**Tabel 1.a.2** Hasil *SwissADME* Senyawa Flavone

<i>ADMET predicted profile</i>	<i>Value</i>	<i>Probability</i>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9906
<i>Human oral bioavailability</i>	+	0.7714
<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	0.8888
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.8906

**Tabel 1.a.3** Hasil *SwissADME* Senyawan [4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3 yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate

<i>ADMET predicted profile</i>	<i>Value</i>	<i>Probability</i>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9939
<i>Human oral bioavailability</i>	-	0.7286
<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	0.6429
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.8746

**Tabel 1.a.4** Hasil *SwissADME* Senyawa Dihydrodiethylstilbestrol

<i>ADMET predicted profile</i>	<i>Value</i>	<i>Probability</i>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9951
<i>Human oral bioavailability</i>	-	0.5714

<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	0.6143
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.8045

**Tabel 1.a.5** Hasil SwissADME Senyawa *Skimmianine*

<b>ADMET predicted profile</b>	<b>Value</b>	<b>Probability</b>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9713
<i>Human oral bioavailability</i>	+	0.6429
<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	0.9360
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.7257

**Tabel 1.a.6** Hasil SwissADME Senyawa *Bergabtol*

<b>ADMET predicted profile</b>	<b>Value</b>	<b>Probability</b>
<i>Human Intestinal Absorption</i>	+	0.9865
<i>Human oral bioavailability</i>	+	0.5714
<i>Carcinogenicity (binary)</i>	-	1.0000
<i>Estrogen receptor binding</i>	+	0.9374

b. Hasil screening awal website WAY2Drug

**Tabel 1.b.1** Hasil Way2Drug Senyawa *2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate*

<b>Pa</b>	<b>Pi</b>	<b>Activity</b>
0,391	0,017	<i>Antineoplastic alkaloid</i>
0,211	0,024	<i>Antineoplastic (thyroid cancer)</i>
0,169	0,090	<i>Antineoplastic (endocrine cancer)</i>
0,233	0,160	<i>Antineoplastic (solid tumors)</i>
0,162	0,135	<i>Antineoplastic (non-small cell lung cancer)</i>
0,119	0,114	<i>Antineoplastic (gastric cancer)</i>

**Tabel 1.b.2** Hasil Way2Drug Senyawa *Flavone*

<b>Pa</b>	<b>Pi</b>	<b>Activity</b>
0,597	0,010	<i>Antineoplastic (breast cancer)</i>
0,616	0,042	<i>Antineoplastic</i>
0,453	0,005	<i>Antineoplastic enhancer</i>
0,366	0,012	<i>Antineoplastic (cervical cancer)</i>
0,354	0,009	<i>Antineoplastic (sarcoma)</i>

0,333	0,017	<i>Antineoplastic (small cell lung cancer)</i>
0,307	0,010	<i>Antineoplastic (renal cancer)</i>
0,305	0,021	<i>Antineoplastic (melanoma)</i>
0,287	0,005	<i>Antineoplastic (uterine cancer)</i>
0,306	0,024	<i>Antineoplastic (brain cancer)</i>
0,305	0,035	<i>Antineoplastic (colorectal cancer)</i>
0,299	0,033	<i>Antineoplastic (colon cancer)</i>
0,239	0,018	<i>Antineoplastic (bladder cancer)</i>
0,265	0,048	<i>Antineoplastic (lung cancer)</i>
0,235	0,023	<i>Antineoplastic (carcinoma)</i>
0,275	0,080	<i>Antineoplastic (pancreatic cancer)</i>
0,190	0,024	<i>Antineoplastic (squamous cell carcinoma)</i>
0,179	0,056	<i>Antineoplastic (thyroid cancer)</i>
0,171	0,049	<i>Antineoplastic (ovarian cancer)</i>
0,141	0,067	<i>Antineoplastic (gastric cancer)</i>
0,121	0,055	<i>Antineoplastic, alkylator</i>
0,152	0,089	<i>Antineoplastic (glioma)</i>
0,098	0,049	<i>Antineoplastic antibiotic</i>

**Tabel 1.b.3** Hasil *Way2Drug* Senyawan [4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3-yl]Phenyl]2,2,2-trifluoroacetate

<b>Pa</b>	<b>Pi</b>	<b>Activity</b>
0,209	0,127	<i>Antineoplastic (bone cancer)</i>
0,117	0,098	<i>Antineoplastic (uterine cancer)</i>
0,273	0,266	<i>Antineoplastic (non-Hodgkin's lymphoma)</i>

**Tabel 1.b.4** Hasil *Way2Drug* Senyawa Dihydrodiethylstilbestrol

<b>Pa</b>	<b>Pi</b>	<b>Activity</b>
0,405	0,103	<i>Antineoplastic (non-Hodgkin's lymphoma)</i>
0,148	0,037	<i>Antineoplastic, alkylator</i>
0,142	0,053	<i>Antineoplastic antimetabolite</i>
0,210	0,122	<i>Antineoplastic (bone cancer)</i>
0,170	0,088	<i>Antineoplastic (bladder cancer)</i>
0,205	0,178	<i>Antineoplastic (small cell lung cancer)</i>
0,115	0,106	<i>Antineoplastic (uterine cancer)</i>
0,149	0,143	<i>Antineoplastic (endocrine cancer)</i>

**Tabel 1.b.5** Hasil *Way2Drug* Senyawa Bergabtol

<b>Pa</b>	<b>Pi</b>	<b>Activity</b>
0,659	0,033	<i>Antineoplastic</i>
0,419	0,009	<i>Antineoplastic (cervical cancer)</i>

0,394	0,006	<i>Antineoplastic (sarcoma)</i>
0,387	0,034	<i>Antineoplastic (breast cancer)</i>
0,284	0,034	<i>Antineoplastic enhancer</i>
0,199	0,019	<i>Antineoplastic antibiotic</i>
0,223	0,055	<i>Antineoplastic (non-small cell lung cancer)</i>
0,230	0,079	<i>Antineoplastic (brain cancer)</i>
0,199	0,071	<i>Antineoplastic (lung cancer)</i>
0,150	0,033	<i>Antineoplastic (uterine cancer)</i>
0,150	0,046	<i>Antineoplastic (carcinoma)</i>
0,172	0,070	<i>Antineoplastic (colon cancer)</i>
0,177	0,075	<i>Antineoplastic (colorectal cancer)</i>
0,169	0,075	<i>Antineoplastic (thyroid cancer)</i>
0,168	0,077	<i>Antineoplastic (renal cancer)</i>
0,169	0,078	<i>Antineoplastic (melanoma)</i>
0,149	0,105	<i>Antineoplastic (lymphoma)</i>
0,158	0,131	<i>Antineoplastic (glioblastoma multiforme)</i>

c. Analisis akhir ligan menggunakan *website Lipinski Rule of Five*

**Tabel 1.c.1** Hasil *Lipinski Rule of Five*

3606	<i>mass: 270.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 2</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 2</i>
	<i>LOGP: 4.785200</i>
	<i>Molar Refractivity: 82.277573</i>

**Tabel 1.c.2** Hasil *Lipinski Rule of Five*

6760	<i>mass: 259.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 0</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 5</i>
	<i>LOGP: 3.006799</i>
	<i>Molar Refractivity: 71.170982</i>

**Tabel 1.c.3** Hasil *Lipinski Rule of Five*

10680	<i>mass: 222.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 0</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 2</i>
	<i>LOGP: 3.302799</i>
	<i>Molar Refractivity: 65.819489</i>

**Tabel 1.c.4** Hasil *Lipinski Rule of Five*

550058	<i>mass: 368.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 1</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 4</i>
	<i>LOGP: 3.850999</i>
	<i>Molar Refractivity: 105.912674</i>

**Tabel 1.c.5** Hasil *Lipinski Rule of Five*

5280371	<i>mass: 202.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 1</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 4</i>
	<i>LOGP: 2.070600</i>
	<i>Molar Refractivity: 52.547798</i>


**Tabel 1.c.6** Hasil *Lipinski Rule of Five*

91715000	<i>mass: 366.000000</i>
	<i>hydrogen bond donor: 1</i>
	<i>hydrogen bond acceptors: 3</i>
	<i>LOGP: 5.547301</i>
	<i>Molar Refractivity: 92.302780</i>

## 2. Preparasi ligan dan protein target

- a. Preparasi senyawa tanaman maja (*Aegle marmelos*)

1. Senyawa uji (ligan) tanaman maja (*Aegle marmelos*) yang digunakan




**Gambar 2.a.1.a** Senyawa *Dihydrodiethylstilbestrol* (ID 3606)




**Gambar 2.a.1.b** Senyawa *Skimmianine* (ID 6760)




**Gambar 2.a.1.c** Senyawa *Flavone* (ID 10680)



**Gambar 2.a.1.d** Senyawa *2-(3-Ethenyl-9-methoxy 1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl)ethyl acetate* (ID 550058)



**Gambar 2.a.1.e** Senyawa *Bergabtol* (ID 5280371)




**Gambar 2.a.1.f** Senyawa [4-[4-(4-Hydroxyphenyl)hexan-3yl]Phenyl] 2,2,2-trifluoroacetate (ID 91715000)

2. Senyawa kontrol (ligan) kanker payudara (*Breast cancer*) yang digunakan




**Gambar 2.a.2.a** Senyawa *Progesterone* (ID 5994)




**Gambar 2.a.2.b** Senyawa (*E*)-3-[4-[[2-[2-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorophenyl]-6-hydroxy-1-benzothiophen-3-yl]oxy]phenyl]prop-2-enoic acid (ID 118574930)

b. Preparasi protein target kanker payudara (*Breast cancer*)

1. Protein target kanker payudara (*Breast cancer*) yang digunakan



**Gambar 2.b.1.a** *Progesteron Receptor* (PR) (ID 1a28)



**Gambar 2.b.1.b** *Human Epidermal Growth Factor Receptor* (HER-2) (ID 2jab)



**Gambar 2.b.1.c** *Estrogen Receptor Alpha* (ER $\alpha$ ) (ID 6b0f)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul jannah, lahir di Ujungpandang 28 Juni 1999. Merupakan anak tunggal dari pasangan Umar B, S.Pd. dan Rosniati, S,SOS. Memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Mawar pada tahun 2003 dan tamat ditahun 2004. Selama masa di Taman Kanak-kanak, tergabung dalam kelompok tari dan melakukan berbagai pementasan. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Negeri Pao-pao dan menamatkan pada tahun 2010. Selama masa Sekolah dasar, pernah tergabung dalam kelompok Karate dan Paskibraka sekolah. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 04 Sungguminasa pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Selama masa Sekolah Menengah Pertama, pernah tergabung dalam anggota Para Muda Karana. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Madani Alauddin Pao-pao pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Selama masa Sekolah Menengah Atas, pernah tergabung dalam pengurus Organisasi Siswa dan anggota Sanggar Seni sekolah. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2021. Selama itu, pernah menjabat sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi sebagai anggota minat dan bakat serta sebagai kordinator dari Unit Kegiatan Himpunan yaitu rumah biologi kreatif hingga tahun 2018.