

**PEMBUATAN SAMPO ANTI KUTU RAMBUT DARI EKSTRAK DAUN  
JERUK NIPIS (*CITRUS AURANTIFOLIA*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan  
Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NURUL MAWADDAH WARAHMAH**

NIM : 60500116013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Mawaddah Warahmah  
NIM : 60500116013  
Tempat/Tgl.Lahir : Sinjai/ 12 Maret 1999  
Jurusan : Kimia Sains  
Judul : Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2020

Penyusun



Nurul Mawaddah Warahmah  
NIM : 60500116013

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)", yang disusun oleh Nurul Mawaddah Warahmah, NIM: 60500116013, mahasiswa jurusan kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021 bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 21 Januari 2021 M  
8 Jumadil Akhir 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M. Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Sitti Chadijah, M. Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S. Si., M. Si., Ph. D.	(.....)
Pembimbing II	: Rahmiani Gani, S. Pd., M. Sc.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M. Pd  
NIP. 19710412 200003 1 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji atas kebesaran sang khalik Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpetik berjuta rasa syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami diberikan kekuatan dan kesempatan menyelesaikan skripsi berjudul **“Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)”**. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang karena perjuangannya kita dapat menikmati cahaya islam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Akan tetapi semuanya dapat dilalui karena adanya dukungan, motivasi serta do'a yang tak henti-hentinya mengalir dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus kami berikan kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifa Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku ketua Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si.,M.Si., selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing I yang tiada henti memberi masukan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Rahmiani Gani, S.Pd., M.Sc selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku penguji satu yang senantiasa memberi masukan dan kritik dalam melengkapi skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji dua yang senantiasa memberi masukan dan kritik dalam melengkapi skripsi ini
9. Bapak-Ibu dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini.
10. Para laboran Jurusan Kimia dan terkhusus untuk laboran Kimia Analitik, Kak Ismawati S.Si., yang senantiasa memberikan bimbingan dan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi selama penelitian.
11. Terima kasih kepada Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi yang telah mendidik dan membantu kami selama proses perkuliahan.
12. Terima kasih yang paling utama untuk kedua orang tua saya Mansur dan Ramlah yang telah mendukung dan memotivasi saya selama ini, serta adik-adik saya Amanda Qalby Khayria dan Sakinah Izzatul Jannah.
13. Terima kasih kepada keluarga besar Nodjeng Tarimba dan Muse, Keluarga besar LIGAN dan Keluarga besar HMJ Kimia yang senantiasa memberi dukungan.
14. Terima kasih untuk teman baik saya Harfendi dan Satriani, teman penelitian saya Gebriella dan Nurwahyuni dan teman-teman di dua rumah impian yang senantiasa menemani saya dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi.

Gowa, November 2020

**Penulis,**

Nurul Mawaddah Warahmah

## DAFTAR ISI


	Hal
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kutu Rambut ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) .....	7
B. Sampo .....	10
C. Daun Jeruk Nipis ( <i>Citrus aurantifolia</i> ) .....	13
D. Kandungan Daun Jeruk Nipis .....	15
E. Ekstraksi .....	17
F. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR).....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22

A. Waktu dan Tempat .....	22
B. Alat dan bahan .....	22
C. Prosedur penelitian .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Hasil .....	26
B. Pembahasan .....	28
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BIOGRAFI.....</b>	<b>54</b>




## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kutu Rambut .....	7
Gambar 2.2 Sampo.....	1
Gambar 2.3 Daun Jeruk Nipis.....	14
Gambar 2.4 Struktur Flavonoid .....	16
Gambar 2.5 Struktur Limonoid.....	16
Gambar 2.6 FTIR ( <i>Fourier Transform Infra Red</i> ).....	19
Gambar 4.1 Grafik FTIR Daun Jeruk Nipis.....	32



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Kandungan Jeruk Nipis.....	13
Tabel 2.2 Jenis Pelarut Ekstraksi .....	18
Tabel 2.3 Daerah Serapan IR Limonoid .....	21
Tabel 3.1 Formulasi Sampo Anti Kutu.....	24
Tabel 4.1 Hasil Uji Fitokimia .....	26
Tabel 4.2 Daerah Serapan FTIR Daun Jeruk Nipis.....	26
Tabel 4.3 Karakteristik Sampo Anti Kutu Rambut.....	27
Tabel 4.4 Efektivitas Sampo Anti Kutu Rambut .....	27



## ABSTRAK

**Nama** : Nurul Mawaddah Warahmah  
**NIM** : 60500116013  
**Jurusan** : Kimia  
**Fakultas** : Sains dan Teknologi  
**Judul** : Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut dari Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

---

Daun jeruk nipis adalah tanaman dengan nama latin *Citrus aurantifolia* dan banyak tumbuh hampir di seluruh penjuru Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dan konsentrasi optimum ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) pada sampo anti kutu rambut terhadap efektivitas mortalitas kutu rambut. Hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) mengandung flavonoid, tanin, terpenoid, saponin. Formulasi sampo dibuat dengan beberapa konsentrasi bahan aktif ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dari 3%, 5%, 7% dan 9%. Selanjutnya dilakukan analisis sampo anti kutu rambut meliputi uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji tinggi busa dan uji efektivitas. Berdasarkan analisis sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) diperoleh sampo berwarna hijau kehitaman, mempunyai bau khas daun jeruk nipis, pH normal sekitar 5-6, homogen, viskositas pada rentang 100-5900 cP dan tinggi busa pada rentang 5-6 cm. Uji efektivitas terhadap kutu rambut menunjukkan konsentrasi optimum dari sampo anti kutu terhadap mortalitas kutu rambut adalah konsentrasi ekstrak 9% dan sampo yang memenuhi syarat sebagai sampo yang baik digunakan adalah sediaan sampo dengan konsentrasi ekstrak 5% dan 7%.

**Kata Kunci:** Sampo, daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), anti kutu rambut

## ABSTRACT

**Name** : Nurul Mawaddah Warahmah  
**NIM** : 60500116013  
**Majors** : Chemistry  
**Faculty** : Science and Technology  
**Topic** : Making Anti-head lice shampoo from lime leaf extract (*Citrus aurantifolia*)

---

Lime is a plant with the Latin name *Citrus aurantifolia* and grows mostly throughout Indonesia. This study to determine the characteristics of anti-head lice shampoo from variations of lime leaf extract (*Citrus aurantifolia*) and the optimum concentration of lime leaf extract (*Citrus aurantifolia*) on the effectiveness of head lice mortality. The results of the phytochemical screening test showed that the ethanol extract of lime leaves contained flavonoids, tannins, terpenoids and saponins. The shampoo formulation is made with several concentrations of the active ingredient (*Citrus aurantifolia*) lime leaf extract from 3%, 5%, 7% and 9%. After that, analysis of anti-head lice shampoo includes organoleptic test, high foam test and effectiveness test. Based on the analysis of anti-head lice shampoo from lime leaf extract (*Citrus aurantifolia*), the shampoo is green-black, has a distinctive smell of lime leaves, normal pH around 5-6, homogenous, viscosity in range of 100-5900 cP and high foam in the range 5-6 cm. The effectiveness test against head lice shows the optimum concentration of anti-lice shampoo against head lice mortality is 9% and qualifies as a good shampoo to use is a shampoo with extract concentrations of 5% and 7%.

**Key Words:** Shampoo, lime leaves (*Citrus aurantifolia*), anti-head lice

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia termasuk salah satu negara yang beriklim tropis. Salah satu syarat yang menunjukkan Indonesia beriklim tropis yaitu ditinjau dari segi suhunya yang menunjukkan bahwa suhu rata-rata harian lebih tinggi dibandingkan suhu dari iklim lain (Karyono, 2001). Iklim tropis menyebabkan adanya pembagian musim menjadi dua yaitu musim penghujan dan musim kemarau (Nuryaman, dkk., 2018). Musim kemarau dan musim penghujan menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan bagi kesehatan pada manusia (Karyono, 2001). Pada umumnya penyakit tropis disebabkan oleh infeksi virus dan parasit (Hotez, 2007).

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit yaitu penyakit *Pediculus capitis*. *Pediculus capitis* disebabkan oleh infeksi kutu rambut (Kristinawati, dkk., 2018). Kutu rambut (*Pediculus humanus capitis*) hanya hidup pada kepala manusia dan dapat menular dengan bertemunya rambut yang satu ke rambut lainnya atau menggunakan aksesoris rambut dan sisir secara bersama (Sari dan Fatriyadi, 2016). Seseorang yang tinggal pada pemukiman-pemukiman yang padat penduduk biasanya rentan terinfeksi *Pediculus capitis* (Alatas dan Linuwih, 2013).

Munculnya kutu rambut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu seberapa sering seseorang mencuci rambut, *gender*, menggunakan tempat tidur bersama, panjang rambut serta jenis-jenis rambut (Lukman, dkk., 2018). Kutu rambut manusia dapat menginfeksi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sejauh ini yang paling banyak terinfeksi kutu rambut adalah anak-anak (Vahabi, dkk., 2012). Menurut Setyoasih dan Suryani (2016) investasi kutu rambut lebih

rentan pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki yang disebabkan karena kebersihan yang kurang diperhatikan.

Infeksi kutu rambut memberikan dampak yang buruk diantaranya adalah rasa gatal pada kepala. Rasa gatal ini disebabkan karena iritasi yang disebabkan oleh sekret yang dikeluarkan kutu rambut saat menghisap darah (Virgianti dan Rahmah, 2016). Selain itu, hal ini juga dapat memberikan dampak pada psikis seperti mengurangi tingkat kepercayaan diri karena rasa malu (Sari dan Fatriyadi, 2016). Meninjau dampak buruk yang disebabkan oleh kutu rambut pada kepala harus dilakukan pengobatan untuk menyembuhkannya. Pengobatan untuk pedikulosis (infeksi kulit kepala) dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, apabila tidak dilakukan perawatan secara intensif maka akan meningkatkan resiko untuk terinfeksi kembali (Alatas dan Linuwih, 2013).

Pengobatan pedikulosis dapat dilakukan dengan pemberian pedikulosida (Alatas dan Linuwih, 2013). Pedikulosida adalah pestisida yang dapat digunakan untuk mematikan kutu. Pedikulosida yang sering digunakan untuk mengobati pedikulosis adalah pedikulosida kimiawi seperti *lidane* dan *permethrin* 1% (Virgianti dan Rahmah, 2016). Tingginya permintaan pedikulosida yang terjadi di seluruh dunia membuat harga pedikulosida menjadi relatif mahal. Selain itu, banyak perusahaan kimia yang tidak bersedia menyediakan pedikulosida dikarenakan mahalnya biaya bahan yang digunakan untuk membuatnya (Lee, dkk., 2004). Selain itu, penggunaan pedikulosida juga memiliki efek samping yang merugikan manusia seperti dampak kesehatan dan kebalnya kutu rambut terhadap insektisida (Virgianti dan Rahmah, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi infeksi pedikulosis dan aman dari efek samping pedikulosida kimiawi adalah dengan menggunakan pedikulosida alami.

Pedikulosida alami dapat diperoleh dari bahan alami. Bahan alami yang digunakan dapat berupa tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang memiliki manfaat dan mampu mengobati berbagai macam penyakit serta untuk mencegah penyakit. Tanaman obat yang dianggap berkhasiat adalah tanaman yang memiliki zat aktif seperti metabolit sekunder yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit (Novitasari dan Putri, 2016)

Tanaman obat yang dapat digunakan sebagai pedikulosida adalah tanaman yang diperkirakan memiliki kandungan insektisida seperti senyawa golongan saponin, tanin, flavonoid, alkaloid steroid serta minyak atsiri (Kristinawati, dkk., 2018). Allah swt telah menumbuhkan berbagai tumbuhan yang dapat digunakan oleh manusia salah satunya adalah jeruk nipis. Manfaat dari tanaman tersebut telah diisyaratkan Allah swt, seperti yang dipahami dalam firman-Nya pada QS As-Syu'ara/ 26:7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”.

(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang (bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) jenisnya (Tafsir Jalalain).

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat-obatan adalah tanaman jeruk. Tanaman jeruk dipercaya memiliki kandungan zat aktif seperti flavonoid, kartenoid dan limonoid (Yulianti dan Andrini, 2010). Salah satu tanaman jeruk yang paling sering digunakan adalah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). Tanaman jeruk nipis ini selain digunakan sebagai bahan masakan juga memiliki manfaat lain

contohnya sebagai koagulan latex (Farida, dkk., 2009), biolarvasida nyamuk demam berdarah (Mangampa dan Nisa, 2017), antibakteri, antifungal, antioksidan, antikanker, pemutih gigi, antikolestrol dan sebagai pestisida alami (Prastiwi dan Ferdiansyah, 2017).

Filtrat daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berpotensi untuk mematikan kutu rambut. Menurut Kristinawati, dkk. (2018) filtrat daun jeruk nipis yang dikombinasikan dengan daun pandan wangi juga membasmi kutu rambut pada konsentrasi 50% : 50% dan 60% : 40% dengan angka kematian 20,83% dan 41,67%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novianti dan Ramdhayani (2017) daun jeruk nipis memiliki kandungan senyawa terpenoid dalam hal ini limonoida yang dapat bertindak sebagai insektisida. Selain itu ekstrak daun jeruk nipis efektif membunuh kutu beras pada konsentrasi 15 mL. Sehingga diduga ekstrak daun jeruk nipis juga mampu membasmi kutu rambut. Akan tetapi untuk membasmi kutu rambut tidak memungkinkan jika ekstrak daun jeruk nipis langsung digunakan pada rambut. Sehingga, ekstrak daun jeruk nipis harus diolah terlebih dahulu menjadi sampo agar dapat lebih mudah digunakan dan diaplikasikan pada rambut.

Sampo adalah bahan kosmetik yang biasanya digunakan untuk membersihkan kulit kepala dan rambut yang dapat digunakan dalam waktu yang rutin. Pembuatan sampo anti kutu dari bahan alami sebelumnya telah dilakukan oleh Tee dan Badia (2019) menggunakan ekstrak daun sirsak. Hasil yang didapatkan cukup memuaskan untuk mortalitas kutu rambut dengan konsentrasi 1% . Surani dan Putriana (2017) memaparkan bahwa pembuatan sampo dari bahan kimia berbahaya seperti pestisida dianggap tidak efisien disebabkan adanya efek samping. Sehingga, cara lain yang ditempuh adalah dengan membuat sampo anti kutu dari bahan alami seperti ekstrak nimba, ekstrak mehdi, ekstrak tulasi, ekstrak ceremai dan ekstrak buah cabe jawa.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik sampo berdasarkan variasi konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dan efektivitas sampo ekstrak daun jeruk nipis terhadap mortalitas kutu rambut (*Pediculus humanus capitis*). Langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membuat sampo anti kutu dari ekstrak daun jeruk nipis dengan konsentrasi 0%, 3%, 5%, 7%, 9% lalu diuji secara in vitro. Selanjutnya dilakukan uji karakterisasi dengan uji viskositas, organoleptik, homogenitas, tinggi busa dan pH sampo. Hal lain yang perlu diperhatikan pada pembuatan sampo adalah perbandingan yang sesuai terhadap ekstrak karena ekstrak masing-masing memiliki efektivitas yang berbeda-beda.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*)?
2. Berapa konsentrasi optimum ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) pada sampo anti kutu rambut terhadap efektivitas mortalitas kutu rambut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sifat karakteristik sampo anti kutu rambut dari variasi ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*).
2. Untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) pada sampo anti kutu rambut terhadap efektivitas mortalitas kutu rambut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan sampo anti kutu dari ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Kutu Rambut (Pediculus humanus capitis)*

Kutu rambut (*Pediculus humanus capitis*) merupakan salah satu parasit berupa serangga yang tinggal pada tubuh manusia khususnya pada bagian rambut. Kutu rambut (Gambar 2.1) termasuk golongan famili *Pediculidae* yang bertahan hidup dengan mengisap darah manusia (Saraswati dan Putriana, 2017). Apabila dibiarkan maka kutu rambut ini akan menyebabkan infeksi pada kulit kepala. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit seperti *Pediculosis capitis* yakni penyakit menular yang dapat menginfeksi kulit kepala (Lukman, dkk., 2018).



**Gambar 2.1** Kutu Rambut

Klasifikasi dari kutu rambut menurut Susanto dalam Darmadi, dkk (2018) adalah sebagai berikut:

- Kingdom* : *Animalia*
- Divisi* : *Anthropoda*
- Kelas* : *Insekta*
- Ordo* : *Phthiraptera*
- Famili* : *Pediculidae*
- Genus* : *Pediculus*
- Spesies* : *Pediculus humanus capitis*

Secara morfologi kutu rambut merupakan serangga (insekta) dengan metamorfosis yang tidak sempurna terdiri dari telur-nimfa-kutu dewasa. Kutu rambut memiliki panjang kurang lebih 1-3 mm dengan warna bervariasi mulai dari putih, abu-abu hingga hitam. Kutu rambut dalam tubuh manusia dapat hidup selama 1 bulan sedangkan tanpa tubuh manusia hanya dapat bertahan antara 1-2 hari (Bohl, 2015). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi karena kutu rambut menurut Lukman, dkk. (2018) adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis kelamin

Infeksi kutu rambut umumnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang berpengaruh antara infeksi kutu rambut dan jenis kelamin dengan nilai OR 0,003 yang menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat resiko terinfeksi kutu rambut sebesar 0,003 dibandingkan laki-laki. Kutu rambut dapat menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan lebih rentan terserang akibat memiliki volume rambut yang lebih besar dibandingkan laki-laki sehingga lebih sukar untuk dibersihkan.

#### 2. Tingkat pendidikan

Salah satu resiko berikutnya adalah dengan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan nilai OR 1,448. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang bersekolah pada tingkat SD dan SMP lebih cenderung terserang infeksi dibandingkan siswa SMA.

#### 3. Kebersihan Rambut

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah faktor kebersihan rambut dengan nilai OR sebesar 2,434. Hal ini disebabkan karena kutu rambut menyukai tempat yang lembab dan kurang bersih.

#### 4. Penggunaan sisir atau aksesoris

Pemakaian sisir secara bersama atau aksesoris rambut seperti jepitan atau ikat rambut juga berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai OR sebesar 3,679 dengan demikian potensi tertular 3 kali lebih besar.

#### 5. Panjang rambut

Panjang rambut juga berpengaruh terhadap infeksi kutu rambut dengan nilai OR sebesar 143,11. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan rambut panjang memiliki 143 kali resiko untuk tertular ataupun terinfeksi kutu rambut.

#### 6. Jenis rambut

Jenis rambut juga sangat berpengaruh dengan nilai OR sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan responden dengan rambut yang lurus dapat terserang pedikulosis dengan resiko 0,642.

Upaya pencegahan dan pengobatan infeksi kutu rambut harus dilakukan untuk menghentikan infeksi kutu rambut. Solusi yang banyak ditempuh masyarakat untuk mengobati ataupun mencegah bermacam-macam diantaranya dengan menggunakan obat serangga dengan cara disemprotkan langsung, menggunakan pestisida serta pengobatan lainnya. Namun, cara ini dianggap kurang efektif karena pengobatan seperti ini harus dilakukan berulang kali tetapi resiko dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dijelaskan tadi sangatlah berbahaya (Lukman, dkk., 2018).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga didapatkan cara alami yakni dengan menggunakan bahan alami untuk mengobati atau mencegah terjadinya infeksi kutu rambut. Bahan-bahan alami ini kemudian diolah dan dibuat menjadi sediaan sampo.

## B. *Sampo*

Sampo adalah salah satu bahan kosmetik yang sering digunakan untuk membersihkan kulit kepala ataupun rambut (Jusnita dan Syah, 2017). Sampo dapat dibuat dengan bahan alami ataupun sintesis. Sampo herbal biasanya lebih dipilih oleh masyarakat karena dianggap aman dan bebas dari efek samping. Sampo (Gambar 2.2) yang terbuat dari bahan sintesis dinilai tidak efektif oleh masyarakat untuk digunakan mengatasi masalah rambut seperti ketombe dan kutu (Surani dan Putriana, 2017).



**Gambar 2.2** Contoh Sampo Komersial

Masalah rambut seperti ketombe dan kutu tentunya merupakan hal yang sangat mengganggu. Oleh sebab itu dibuat alternatif pembuatan sampo dengan menggunakan bahan alami (herbal) untuk mengatasi gangguan tersebut. Tanaman yang berpotensi digunakan sebagai bahan sampo anti kutu adalah ekstrak tanaman nimba, ekstrak buah cabe (Surani dan Putriana, 2017), ekstrak bawang putih, seledri, ekstrak paw paw (Saraswati dan Putriana, 2017), ekstrak daun sirsak (Tee dan Badia, 2019) dan daun jeruk nipis (Kristinawati, dkk., 2018).

Menurut Surani dan Putriana (2017), bahwa pembuatan sampo yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Evaluasi yang perlu dilakukan dalam membuat sampo yang baik adalah dengan melakukan berbagai uji sebagai berikut:

### 1. Pengamatan organoleptik

Pengamatan organoleptik dilakukan untuk mengetahui rasa dan bau pada sampo.

### 2. Pengukuran pH

Pengukuran pH pada sampo bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH pada sampo. Hal ini diperlukan karena kulit manusia sangatlah sensitif terhadap pH. Sediaan sampo dianggap baik apabila memiliki rentang pH 5,0-9,0. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka akan merusak (mengiritasi) kulit kepala.

### 3. Pengukuran tinggi busa

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar surfaktan dapat bekerja pada sampo yang telah dibuat. Kemampuan surfaktan yang dianggap baik untuk sebuah sampo adalah dengan tinggi busa 1,3-22 cm. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan busa pada rambut pada saat pengaplikasian sampo.

### 4. Analisis kadar air

Analisis kadar air ini bertujuan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat pada sampo dikarenakan kandungan air yang terdapat pada sampo mempengaruhi masa simpan dari sampo. Syarat yang harus dipenuhi dari analisis ini adalah dengan persentase kadar air sebanyak 95%.

### 5. Uji kekentalan (viskositas)

Uji dilakukan untuk mengetahui kekentalan dari sampo. Semakin padat atau semakin kental sampo maka akan membuat rambut kaku dan sulit dicuci. Sebaliknya, jika viskositas sampo memenuhi syarat optimum yakni mampu menurunkan tegangan air sebesar 40 dyns/cm maka akan semakin mudah dicuci atau dibilas.

## 6. Uji aktivitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat dari sampo yang digunakan. Konsentrasi ekstrak berpengaruh pada daya hambat sediaan sampo. Semakin kecil ekstrak yang ditambahkan maka akan semakin kecil daya hambat dari sediaan sampo.

Formulasi sediaan sampo juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sampo. Bahan-bahan yang perlu digunakan dalam pembuatan sampo adalah ekstrak bahan alam yang akan digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan sampo. Pengawet juga sangat diperlukan untuk mempertahankan masa simpan dari sampo bahan-bahan yang sering digunakan sebagai bahan pengawet adalah propil paraben, metil paraben, hidroksi benzoat, formaldehida. Parfum dan pewarna juga diperlukan untuk memberikan aroma khas dan warna, parfum ini biasanya diambil dari ekstrak tanaman yang memiliki bau yang khas seperti menthol, ekstrak mawar dan ekstrak tumbuhan lain yang memiliki bau khas (Saraswati dan Putriana, 2017).

Bahan yang juga penting dalam pembuatan sampo adalah surfaktan yang berfungsi sebagai agen pembuat busa dan pembersih. Bahan tambahan lain juga dapat berupa pengental seperti karboksi metil selulosa (CMC), gom dan metil selulosa yang berfungsi untuk memudahkan pada saat penuangan sampo. EDTA, etil alkohol, glokol mono dan distearat juga diperlukan dalam pembuatan sampo dikarenakan bahan ini juga berfungsi sebagai anti keruh pada sampo. Selain itu ditambahkan juga finishing agent yang berfungsi untuk melembutkan rambut pada saat disisir serta melembutkan rambut (telur dan polipeptida), menghilangkan minyak pada rambut (lanolin, minyak mineral) (Saraswati dan Putriana, 2017).

### C. Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Jeruk nipis adalah tanaman dengan nama latin *Citrus aurantifolia* dan banyak tumbuh hampir di seluruh penjuru Indonesia. Jeruk nipis merupakan tanaman yang memiliki biji dan memiliki bentuk yang memiliki ukuran yang kecil, berbentuk oval atau bahkan adapula yang bulat. Jeruk nipis ini memiliki kandungan air yang asam dengan daging buah yang kuning kehijauan (Ali, dkk., 2009). Jeruk nipis memiliki pohon yang tinggi dan rimbun serta memiliki duri pada pangkal dahannya (Rukmana, 2003). Jeruk nipis dikenal kandungannya yang memiliki berbagai macam khasiat. Manfaat lain dari jeruk nipis adalah sebagai antikanker, obat abses, antifungal, antioksidan, pemutih gigi dan antikolestrol. Jeruk nipis memiliki kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, *eriocitrin*, *neoponcirin* dan *hasperidin* (Prastiwi dan Ferdiansyah, 2017). Adapun kandungan dari jeruk nipis dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1** Kandungan gizi jeruk nipis

No.	Zenis Kandungan	Banyaknya kandungan (g)*
1	Air	86,00
2	Vitamin C	0,027
3	Lemak	0,10
4	Protein	0,80
5	Kalsium	0,04
6	Fosfor	0,022
7	Zat besi	0,0006
8	Vitamin B1	0,04
9	Karbohidrat	12,30

Sumber: Depkes RI (2004)

Jeruk nipis menjadi tanaman yang sangat dikenal karena selain sebagai bahan makanan jeruk nipis juga sering digunakan sebagai obat-obatan alternatif yang dipilih masyarakat (Razak, dkk., 2013). Salah satu bagian jeruk nipis yang biasa digunakan sebagai bahan obat adalah daun jeruk nipis. Daun jeruk nipis dapat dilihat pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3** Daun Jeruk Nipis

Menurut Rukmana (2003), Taksonomi dari daun jeruk nipis adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Subdivisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledonae</i>
Ordo	: <i>Rutales</i>
Famili	: <i>Rutaceae</i>
Genus	: <i>Citrus</i>
Spesies	: <i>Citrus aurantifolia</i>

Daun jeruk nipis memiliki bentuk yang agak bulat dan memiliki ujung yang tidak runcing dengan warna hijau yang tidak terlalu mencolok yakni warna hijau muda. Adapun manfaat daun jeruk nipis adalah sebagai berikut:

#### 1. Biolarvasida

Daun jeruk nipis diyakini dapat digunakan sebagai biolarvasida. Hal ini telah dibuktikan oleh Prijadi (2014) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa ekstrak daun jeruk nipis dapat membunuh larva nyamuk *Aedes spp* dengan dosis 100 mg/L air. Rata-rata tingkat mortalitas daun jeruk nipis adalah 67%.

## 2. Antibakteri

Daun jeruk nipis dapat digunakan sebagai antibakteri. Kandungan minyak atsiri daun jeruk nipis memiliki aktivitas antibakteri sebesar 12,5% pada *P. gingivalis*. Sehingga daun jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat kumur, bahan pembuat odol alami dan gel atau krim oral (Kharismayanti, dkk., 2018).

## 3. Bioinsektisida


Ekstrak daun jeruk nipis dapat pula digunakan sebagai bioinsektisida yang berfungsi untuk membunuh kutu rambut. Ekstrak daun jeruk nipis yang dipadukan dengan daun pandan wangi dapat mematikan kutu rambut masing-masing 12,50%, 20,83% dan 41,67% dengan konsentrasi 40%:60%, 50%:50%, 60%:40% (Kristinawati, dkk., 2018). Selain itu daun jeruk nipis sebagai insektisida berfungsi untuk membasmi hama walang sangit yang terdapat pada tanaman padi. Daun jeruk nipis dapat mematikan 9 dari 10 sampel hama walang sangit dengan kadar 250 g/L (Kasi, 2012).

### **D. Kandungan Daun Jeruk Nipis**

Daun jeruk nipis memiliki berbagai kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan ataupun pestisida alami, adapun kandungan jeruk nipis adalah sebagai berikut:

#### 1. Flavonoid

Daun jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid (Namani, dkk., 2018). Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang seringkali ditemukan pada tumbuhan. Senyawa salah satu senyawa alami yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan alternatif, struktur dari flavonoid (Gambar 2.4) dapat dilihat di bawah ini:




**Gambar 2.4** Struktur Flavonoid

Senyawa flavonoid memiliki daya bioaktivitas antioksidan sangat tergantung pada struktur inti dan gugus fungsinya. Sehingga aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh jumlah gugus hidroksilnya (Arifin dan Ibrahim, 2018). Flavonoid juga dapat berperan sebagai bioinsektisida. Flavonoid dapat menembus dan merusak membran sel pada serangga (Adrianto, dkk., 2014).

## 2. Limonoida

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prijadi (2014), bahwa daun jeruk nipis memiliki kandungan limonoida. Pada tanaman jeruk limonoida menimbulkan rasa pahit (Yulianti dan Andrini, 2010). Adapun struktur dari limonoida (Gambar 2.5) adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.5** Struktur Limonoida

Limonoida merupakan turunan dari senyawa terpenoid yang dapat dibuktikan dengan uji triterpenoid dengan menggunakan pereaksi Liebermann-Burchardt yang

menunjukkan adanya kuning atau orange kemerah-merahan (Mangampa, dkk., 2017). Limonoid dapat berfungsi sebagai insektisida, Limonoid akan bertindak sebagai racun kontak yang dapat masuk ke dalam tubuh kutu rambut melalui kulit (dinding sel), dapat pula menjadi racun yang merusak pencernaan serta masuk melalui pernafasan (Kristinawati, 2018)

### 3. Minyak Atsiri

Kandungan minyak atsiri pada daun jeruk nipis memiliki penyusun dari *caryophyllene* (Wulandari, dkk., 2015). Minyak atsiri adalah minyak yang sangat bermanfaat bagi manusia dan dapat dihasilkan salah satunya dengan cara destilasi (Effendi dan Widjanarko, 2014). Kandungan minyak atsiri pada makanan yang dikonsumsi oleh serangga dapat mempengaruhi pencernaan pada serangga sehingga mengganggu sistem metabolisme yang terjadi (Wibaldus, 2016). Selain itu, minyak atsiri dapat menjadi racun kontak yang sangat berpengaruh terhadap kematian kutu rambut (Kristinawati, 2018).

### 4. Saponin

Sakka (2018) menyatakan bahwa daun jeruk nipis memiliki kandungan saponin. Hal ini dibuktikan dengan melakukan uji kualitatif yang menunjukkan bahwa pada saat ekstrak dikocok dengan penambahan air terdapat busa yang menandakan bahwa terdapat kandungan saponin. Saponin adalah senyawa triterpen atau glikosida steroid (Yanuartono, dkk., 2017). Saponin dapat berfungsi sebagai biolarvasida (Adrianto, dkk., 2014). Saponin biasanya diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol hal ini dikarenakan saponin bersifat polar sehingga lebih mudah larut pada metanol (Novitasari dan Putri, 2016). Saponin memiliki dampak yang buruk terhadap hewan karena saponin merupakan antinutrisi bagi hewan (Yanuartono, 2017).

### E. Ekstraksi

Ekstraksi adalah langkah yang ditempuh untuk memisahkan suatu bahan alam dengan kandungan yang dimilikinya. Ekstraksi dilakukan dengan beberapa pertimbangan mulai dari kesesuaian pelarut yang digunakan hingga alat-alat khusus. Ekstraksi baru akan dihentikan apabila telah tercapai kesetimbangan antara pelarut dan zat yang diekstrak dari tanaman. Ekstraksi biasanya digunakan untuk mengisolasi bahan aktif dari suatu tanaman untuk dijadikan obat-obatan (Mukhriani, 2014).

Proses ekstraksi tidak boleh dilakukan dengan sembarang cara. Proses ekstraksi harus memperhatikan jenis tanaman dan bagian tanaman seperti kelopak bunga, daun, tangkai. Pelarut yang cocok dan tidak cocok juga harus diperhatikan. Contoh pelarut yang dapat digunakan dalam proses ekstraksi menurut Mukhriani (2014) dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2** Jenis pelarut untuk ekstraksi

<b>Pelarut polar</b>	<b>Pelarut nonpolar</b>	<b>Pelarut semi polar</b>
Air	etil asetat	n-heksan
Etanol	Diklorometan	petroleum eter
Metanol		Kloroform

Sumber: Mukhriani (2014)

Ekstraksi dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni sebagai berikut:

#### 1. Maserasi

Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan suhu kamar. Pada metode ekstraksi ini tidak dilakukan pemanasan. Bahan-bahan yang diekstrak disimpan pada wadah yang kedap udara. Proses ekstraksi ini dihentikan apabila konsentrasi zat dalam pelarut telah sama dengan konsentrasi zat pada tanaman. Setelah proses perendaman dilakukan proses penyaringan. Kekurangan dari metode ini adalah banyaknya pelarut yang digunakan serta memerlukan waktu yang lama (Mukhriani, 2014). Metode maserasi ini juga dilakukan untuk sampel yang tidak

dapat diekstraksi dengan suhu yang tinggi (panas) seperti tanaman yang mengandung minyak atsiri. Metode ini juga mudah dilakukan karena biaya dan peralatan yang digunakan sangat sederhana (Rahmadani, dkk., 2018).

## 2. Reflux

Metode reflux adalah metode ekstraksi dengan menghubungkan antara labu dan kondensor. Setelah itu dilakukan proses pemanasan hingga melewati titik didih dan uap akan mencair kembali masuk kedalam labu (Mukhriani, 2014).

## 3. Perkolasi

Perkolasi adalah metode yang dilakukan dengan cara membasahi serbuk sampel dalam perkulator kelebihan dari metode ekstraksi ini adalah sampel akan selalu terkena pelarut baru sedangkan kelemahannya sampel akan sulit terkena larutan apabila tidak homogen selain itu pelarut yang digunakan pada metode ini banyak dan waktupun yang diperlukan banyak (Mukhriani, 2014).

## 4. Soxhlet

Metode soxhletasi dilakukan dengan cara memasukkan sampel dalam kertas saring dan dimasukkan kembali kedalam tabung diatas labu dan di bawah kondensor. Kelebihan dari metode ini adalah ekstraksi akan terjadi secara kontinu dan merata sedangkan kelemahannya adalah akan sangat sulit mengekstraksi sampel yang bersifat termolabil karena sampel akan berada terus-menerus pada suhu yang tinggi dan itu akan mempengaruhi sampel (Mukhriani, 2014).

## **F. FTIR (Fourier Transform Infra Red)**

FTIR (*Fourier transform infra red*) adalah suatu teknik pembacaan infra merah yang dikembangkan. FTIR berfungsi untuk menentukan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa (Sulistiyani dan Huda, 2017). FTIR (Gambar 2.6) memiliki "*Michelson Interferometer*" yang dapat mengukur dengan sensitif dan

akurat (Setiabudi, dkk., 2012). Prinsip kerja pada alat ini adalah mengidentifikasi zat berupa atom (molekul), dimana cahaya IR akan terbagi menjadi dua. Cahaya pertama akan melalui sampel dan cahaya kedua menjadi pembanding lalu lewat pada *chopper* secara berurutan (Pambudi, dkk., 2017).



**Gambar 2. 6** FTIR (*Fourier transform infra red*)

FTIR memiliki beberapa keuntungan dibandingkan spektroskopi IR lainnya diantaranya yaitu sangat sensitif dibandingkan sistem dispersi lainnya hingga 1000 kali, mampu menghasilkan signal dan nois S/N yang tinggi menggunakan waktu yang singkat (Setiabudi, dkk., 2012). Berdasarkan beberapa penelitian FTIR dapat digunakan dalam menentukan gugus fungsi suatu senyawa seperti yang dilaporkan oleh Sulistyawati dan Huda (2017), bahwa spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk menganalisa protein. Hal ini dapat dilakukan dengan memvariasikan pellet sampel dan KBr yang berfungsi untuk mengetahui puncak-puncak yang dihasilkan pada pembacaan protein serta gugus fungsi pada sampel.

Menurut Pambudi, dkk. (2017), bahwa sampel yang akan diidentifikasi menggunakan FTIR adalah sampel yang telah dibentuk pellet terlebih dahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alminda dan Ramadhania (2018), FTIR sangat akurat dalam mengukur karotenoid pada suatu sampel dibandingkan dengan UV-Vis, dan NIR (*Near Infrared Reflectance*). Cahaya yang akan dihasilkan pada daerah

tengah sinar infra merah adalah 400-4000  $\text{cm}^{-1}$  *wavenumbers*. Pembacaan FTIR berbeda-beda tergantung pada panjang gelombangnya. Adapun daerah serapan IR limonoid berdasarkan penelitian Seetraman, dkk. (2017) dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

**Tabel 2.3** Daerah serapan Inframerah Limonoid

<b>Daerah Serapan (<math>\text{Cm}^{-1}</math>)</b>	<b>Ikatan dan Jenis Gugus Fungsi</b>
2925,9	OH <i>stretching</i>
1751,7-1719	COO
1604,9	C=O <i>stretching</i>
914,15	C-O <i>stretching</i>
1177,2	C-O eter

Sumber: Seetraman, dkk. (2017)

FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya Limonoid. Hal tersebut ditandai dengan kandungan gugus fungsi seperti OH *stretching*, COO, C=O *stretching*, C-O *stretching*, C-O eter, O-Me metoksi, C-H *stretching* (Seetraman, dkk., 2017). FTIR dalam penggunaannya juga memiliki metode yang tidak perlu menggunakan pellet, metode tersebut disebut FTIR-ATR. Penggunaan FTIR-ATR dilakukan dengan memasukkan sampel menggunakan aksesoris ATR lalu menempatkannya pada spektrofotometer FTIR. Detektor yang digunakan pada FTIR-ATR adalah DTGS (*deuterated triglycine sulphate*). Perangkat lunak yang digunakan OPUS 7.2.139.1.24 (*Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Jerman*), perangkat ini berfungsi untuk menunjukkan spektrum yang dihasilkan oleh FTIR. Pengukuran pada FTIR-ATR dilakukan pada kisaran 1000-4000  $\text{cm}^{-1}$  dengan menggunakan resolusi 8  $\text{cm}^{-1}$ , kecepatan payar yang digunakan yakni 72 payar/menit. Data yang dihasilkan dari data FTIR tersimpan dalam file xls dan diolah kembali secara kemometrik (Rafi, dkk., 2016).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2020, di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain FTIR (*Fourier Transform Infra Red*) Thermo Fisher Scientific IS50, rotary evaporator merek RE-100 Pro D-LAB, viskometer Brookfield tipe RVT (VM-BF-RV-01), neraca analitik merek Kern ABJ, pH meter merek Lutron, hotplate, blender merek Kirin, gelas ukur 10 mL, gelas kimia (100 mL, 250 mL dan 450 mL), tabung reaksi, kaca arloji, cawan petri, wadah maserasi, wadah ekstrak dan pipet tetes.

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain akuades (H<sub>2</sub>O), besi (III) klorida (FeCl<sub>3</sub>) 5% dan 1%, ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 96%, hidroksipropil metil selulosa (HPMC), kertas saring, metil paraben (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>), natrium lauril sulfat (CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>CH<sub>2</sub>(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OSO<sub>3</sub>Na), pereaksi (Dragendroff, Mayer, Lieberman-Burchard dan Wagner).

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Ekstraksi Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)**

Persiapan sampel dilakukan dengan mengambil daun jeruk nipis di Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Setelah itu daun jeruk nipis dicuci lalu dipotong kecil-kecil. Daun jeruk nipis kemudian dikeringkan pada suhu ruang. Daun jeruk nipis yang telah kering selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Setelah itu ditimbang 500 gram dan dimasukkan kedalam wadah maserasi. Kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sampai terendam dalam wadah tertutup selama 24 jam. Selanjutnya filtrat disaring dengan kain kasa dan ampas direndam kembali dengan pelarut yang sama. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat lalu dipekatkan dengan menggunakan alat *rotary evaporator* (Prijadi, 2014).

#### **2. Skrining Fitokimia**

Skrining fitokimia berfungsi untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder pada sampel (Sakka, 2018). Adapun cara ujinya adalah sebagai berikut:

- a. Uji flavonoid dilakukan dengan cara, ekstrak daun jeruk nipis sebanyak 3 tetes dimasukkan ke dalam plat tetes dan ditambahkan  $\text{FeCl}_3$  5% sebanyak 1 tetes.
- b. Uji Saponin dilakukan dengan cara, ekstrak daun jeruk nipis diambil sebanyak 2 mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan air sebanyak 10 mL, lalu dikocok dengan kuat selama 10 menit lalu didiamkan selama 10 menit. Jika busa atau buih bertahan dalam 10 menit maka menandakan adanya saponin.
- c. Uji Tanin dilakukan dengan cara, ekstrak daun jeruk nipis sebanyak 3 tetes dimasukkan ke dalam plat tetes. Setelah itu ditambahkan 2 tetes larutan besi (III) klorida 1%, lalu diamati warna yang terbentuk. Apabila larutan berubah warna menjadi biru/ hijau kehitaman maka terdapat tanin dalam sampel.

- d. Uji alkaloid dilakukan dengan cara, ekstrak daun jeruk nipis sebanyak 3 tetes dimasukkan ke dalam plat tetes kemudian ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendroff. Uji alkaloid juga dapat dilakukan menggunakan pereaksi Wagner dan Mayer dengan melakukan cara yang sama.
- e. Uji Triterpenoid dilakukan dengan cara, ekstrak daun jeruk nipis dimasukkan sebanyak 3 tetes ke dalam plat tetes lalu ditambahkan peraksi Liebermann-Burchard sebanyak 2 tetes.

### **3. Identifikasi Gugus Fungsi Menggunakan FTIR**

Analisis menggunakan FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang menandakan adanya kandungan limonoid yang terdapat pada ekstrak daun jeruk nipis. Langkah yang dilakukan untuk analisis FTIR yaitu ekstrak daun jeruk nipis diambil sebanyak 10 mg dan ditambahkan KBr 100 mg, lalu digerus dalam lumpang. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam cetakan sehingga terbentuk pellet. Pellet yang terbentuk ditempatkan pada spektrofotometer FTIR dan dianalisis pada panjang gelombang  $400-4000\text{ cm}^{-1}$  (Winingsih, dkk., 2016).

### **4. Formulasi Pembuatan Sampo Anti Kutu Rambut**

Pembuatan shampo anti kutu dilakukan dengan mengikuti prosedur kerja dari Tee dan Badia (2019). Hidroksi propil metil selulosa (HPMC) ditimbang sebanyak 0,5 gram, metil paraben 0,075 gram dan natrium lauril sulfat sebanyak 2 gram. Natrium lauril sulfat dimasukkan ke dalam air yang telah dipanaskan hingga larut kemudian ditambahkan HPMC lalu digerus hingga terbentuk mucilago (campuran 1). Selanjutnya, metil paraben dilarutkan dengan etanol dalam jumlah yang sedikit hingga larut (campuran 2). Campuran 1 dan 2 lalu di homogenkan (campuran 3). Ekstrak daun jeruk nipis dimasukkan ke dalam campuran 3 lalu

diaduk sampai homogen dan didinginkan (campuran 4). Campuran 4 dimasukkan ke dalam gelas kimia lalu dihimpitkan menjadi 50 mL.

**Tabel 3.1** Formulasi shampo anti kutu

Bahan	Formulasi					Khasiat
	F0	F1	F2	F3	F4	
Ekstrak daun jeruk nipis	0%	3%	5%	7%	9%	Zat aktif
Natrium lauril sulfat	4%	4%	4%	4%	4%	Surfaktan
HPMC	1%	1%	1%	1%	1%	Basis
Metil Paraben	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	Pengawet
Akuades	Ad 50	Ad 50	Ad 50	Ad 50	Ad 50	Pelarut

**Keterangan:**

F0: Formulasi 0% daun jeruk nipis

F1 : Formulasi 3% daun jeruk nipis

F2: Formulasi 5% daun jeruk nipis

F3: Formulasi 7% daun jeruk nipis

F4: Formulasi 9% daun jeruk nipis

### 5. Uji Karakteristik Sediaan Shampo


Uji karakteristik pada sediaan shampo adalah sebagai berikut:

- a. Uji organoleptik berupa identifikasi sampo anti kutu rambut dengan melihat wujud, warna dan aroma.
- b. Uji homogenitas dilakukan dengan cara sampo anti kutu sebanyak 50 mL diamati homogen atau tidaknya dan dilakukan sebanyak 3 kali (Jusnita dan Syah, 2017).
- c. Uji kestabilan pH dilakukan dengan cara sampo anti kutu ditimbang sebanyak 1 gram lalu dilarutkan dalam 100 mL akuades dan diukur menggunakan pH meter digital.
- d. Uji viskositas dilakukan dengan cara sampo anti kutu sebanyak 100 mL dimasukkan dalam wadah lalu diukur viskositasnya menggunakan alat viskometer Brookfield dengan spindle nomor 6 dengan laju 50 rpm.

- e. Uji tinggi busa dilakukan dengan cara sampo anti kutu ditimbang sebanyak 0,1 gram dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan akuades sebanyak 10 mL lalu dikocok selama 20 detik, tinggi busa yang dihasilkan diukur menggunakan mistar.

#### **6. Uji Efektivitas Anti Kutu**

Kertas saring dimasukkan ke dalam cawan petri kemudian ditetesi dengan 0,5 mL sediaan sampo secara merata. Sebanyak 5 ekor kutu kepala dimasukkan ke dalam wadah uji lalu ditutup menggunakan plastik yang telah diberi rongga udara. Kutu rambut diamati pergerakannya setiap 5 menit selama 2 jam sebanyak 3 kali (Nurhaini, dkk., 2020).



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Penelitian sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk nipis terdiri dari beberapa langkah yaitu ekstraksi sampel, skrining fitokimia, analisis menggunakan FTIR, pembuatan sampo serta uji karakteristik dan uji efektivitas. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Skrining Fitokimia**

**Tabel 4.1** Skrining Fitokimia Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Komponen	Pereaksi	Hasil pengamatan	Keterangan
Flavonoid	FeCl <sub>3</sub> 5%	Hijau kehitaman	+
Saponin	Akuades	Berbuih	+
Triterpenoid	Lieberman-Burchard	Hijau kecoklatan	+
Tanin	FeCl <sub>3</sub> 1%	Hijau kehitaman	+
Alkaloid	Dragendroff	Terbentuk Endapan	+

**2. Identifikasi Gugus Fungsi Menggunakan FTIR**

**Tabel 4.2** Daerah Serapan FTIR Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)

Komponen	Daerah serapan (cm <sup>-1</sup> )	Referensi (cm <sup>-1</sup> )*	Ikatan dan jenis gugus fungsi
Limonoid	2926,4; 3404,13	2925,9	OH <i>stretching</i>
	1730,64	1751,7-1719	COO
	1613,12	1604,9	C=O <i>stretching</i>
	894,26	914,15	C-O <i>stretching</i>
	1155,72	1177,2	C-O eter
	1075,23	1044,3	O-Me metoksi
	620,22	636,49	C-H <i>stretching</i>

\*Sumber: Seetraman, dkk. (2017)

### 3. Karakteristik Sediaan Sampo

Tabel 4.3 Karakteristik Sampo Anti Kutu Rambut

Karakteristik	Sampo Anti Kutu				
	F0	F1	F2	F3	F4
Organoleptik:	Bening	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
Warna	Kehitaman	Kehitaman	Kehitaman	Kehitaman	Kehitaman
Wujud	Cairan kental	Cairan kental	Cairan kental	Cairan kental	Cairan kental
Bau	Tidak berbau	Daun jeruk nipis	Daun jeruk nipis	Daun jeruk nipis	Daun jeruk nipis
Homogenitas	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen	Homogen
Tinggi busa	5,06 ± 0,08	5,6 ± 0,22	6,04 ± 0,02	6,13 ± 0,024	6,46 ± 0,51
Ph	6,91 ± 0,07	6,33 ± 0,04	6,13 ± 0,02	6,04 ± 0,02	5,86 ± 0,008
Viskositas	100 cP	300 cP	2200 cP	3300 cP	5900 cP

### 4. Efektivitas Sampo Anti Kutu Rambut

Tabel 4.4 Efektivitas Sampo Anti Kutu Rambut

Perlakuan	Jumlah Kutu	Waktu Mati (Menit)						Jumlah Kutu yang Mati
		5	10	15	20	25	30	
F0	5	-	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
F1	5	1	1	1	1	1	-	5
		1	1	1	1	1	-	5
		1	1	1	1	1	-	5
F2	5	1	1	-	3	-	-	5
		2	3	-	-	-	-	5
		1	1	3	-	-	-	5
F3	5	5	-	-	-	-	-	5
		4	1	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
F4	5	5	-	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
		5	-	-	-	-	-	5
Akuades	5	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Peditox	5	1	1	-	1	1	1	5
		2	3	-	-	-	-	5
		1	1	1	2	-	-	5

**Keterangan:**

F0: Formulasi 0% daun jeruk nipis

F1: Formulasi 3% daun jeruk nipis

F2: Formulasi 5% daun jeruk nipis

F3: Formulasi 7% daun jeruk nipis

F4: Formulasi 9% daun jeruk nipis

## **B. Pembahasan**

Sampo anti kutu rambut sebelumnya telah dibuat oleh Tee dan Badia (2019) dengan bahan alami daun sirsak. Sampo anti kutu dari bahan alami diharapkan dapat mengurangi infestasi kutu rambut di kepala manusia. Sampo kutu rambut dari bahan alami dapat digunakan sebagai alternatif menggantikan obat anti kutu dari pestisida yang dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan efek samping. Penggunaan bahan alami sebagai pedikulosida dapat dimanfaatkan dengan baik, mengingat di Indonesia terdapat banyak tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan alternatif salah satunya daun jeruk nipis.

### **1. Preparasi Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)**

Penelitian ini menggunakan daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai bahan aktif pembuatan sampo anti kutu rambut. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil daun jeruk nipis yang masih segar lalu dilakukan sortasi basah. Sortasi basah bertujuan memisahkan daun yang layak dan daun yang tidak layak digunakan sekaligus memisahkan sampel dari zat lain yang dapat mengganggu efektivitas dari sampel untuk selanjutnya dilakukan pencucian (Sakka, 2018). Pencucian berfungsi untuk membersihkan sampel dari kotoran yang menempel. Setelah proses pencucian maka dilakukan proses perajangan agar sampel mudah kering. Pengeringan kemudian dilakukan pada sampel.

Luliana, dkk., (2016) menyatakan bahwa pengeringan salah satu langkah penting untuk menjaga senyawa yang terdapat pada simplisia agar tetap stabil. Pengeringan juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya reaksi enzimatik agar jamur tidak dapat berkembang biak serta menjamin mutu sampel. Sampel yang kering ditandai dengan mudahnya diremah atau mudah hancur. Daun jeruk nipis yang telah

kering dipilih kembali dan dipisahkan dari pengotor yang ikut tercampur pada proses pengeringan yang disebut sebagai sortasi kering (Sakka, 2018).

Daun jeruk nipis yang telah kering kemudian dihaluskan menggunakan blender. Fungsi dari penghalusan ini agar simplisia dapat dengan mudah berinteraksi dengan pelarut. Simplisia yang mudah bereaksi dengan pelarut akan memudahkan proses pengikatan metabolit sekunder yang ada (Kiswandono, 2017). Sampel yang telah halus selanjutnya diekstraksi menggunakan metode maserasi.

## **2. Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)**

Ekstraksi daun jeruk nipis dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Metode maserasi digunakan karena daun jeruk nipis tidak dapat diekstraksi menggunakan suhu yang sangat tinggi karena dapat merusak kandungan metabolit sekunder yang terdapat di dalamnya (Ramadani, dkk., 2018). Etanol dipilih sebagai pelarut dalam proses maserasi karena etanol memiliki sifat universal sehingga metabolit sekunder dengan sifat polar, semi polar dan non polar dapat ditarik secara keseluruhan. Etanol 96% digunakan karena dapat dengan mudah masuk ke dalam simplisia dibandingkan dengan etanol dengan konsentrasi yang rendah (Jusnita dan Syah, 2017).

Perendaman daun jeruk nipis dilakukan selama 3 hari dengan mengganti larutan setiap 1x24 jam. Proses perendaman disertai dengan proses pengadukan terlebih dahulu agar semua bagian simplisia dapat terkena pelarut. Novitasari dan Putri (2016) melaporkan bahwa proses perendaman simplisia memiliki keuntungan tersendiri karena pada saat perendaman terjadi dinding maupun membran dari sel simplisia akan pecah karena tekanan yang berbeda dalam sel dan luar sel sehingga zat aktif pada membran plasma akan tertarik oleh pelarut.

Hasil dari proses perendaman simplisia adalah ekstrak etanol daun jeruk nipis. Ekstrak yang didapatkan dari proses maserasi kemudian dipekatkan menggunakan *rotary evaporator*. Pada pemakaiannya *rotary evaporator* disetel dengan suhu 41°C karena pada suhu tinggi metabolit sekunder akan mudah rusak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadani, dkk., (2018) yang menyatakan suhu yang aman bagi metabolit sekunder tertentu adalah 50°C dikarenakan suhu yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada metabolit sekunder. Prinsip kerja dari *rotary evaporator* adalah pemisahan antara maserat dengan pelarut menggunakan pemanasan di bawah titik didih pelarut. Metabolit sekunder pada saat proses pemekatan larutan juga diyakini tidak rusak karena labu penampung ekstrak terus berputar dengan kecepatan tertentu serta adanya penurunan tekanan. Proses pemekatan maserat ini selesai apabila sampel telah kental dan pelarut tidak lagi menetes pada *receiver flask* (Yulia dan Ranova, 2019).

### **3. Kandungan Metabolit Sekunder pada Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)**

#### **a. Skrining Fitokimia**

Ekstrak daun jeruk nipis yang telah dikentalkan kemudian dianalisis fitokimia. Ekstrak pekat daun jeruk nipis diencerkan menggunakan etanol 96% lalu dihomogenkan. Pengujian dilakukan dengan mengambil 2 tetes ekstrak lalu ditambahkan peraksi besi (III) klorida 5%. Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat kandungan flavonoid yang ditandai dengan terbentuknya warna hijau kecoklatan atau hitam (Nugrahaningtyas, dkk., 2005). Perubahan warna dapat terjadi karena terjadinya ikatan antara cincin benzena dan  $Fe^{3+}$  (Zaini dan Sophia, 2020).


Uji saponin yang dilakukan dengan melarutkan ekstrak ke dalam aquades dan dipanaskan lalu di kocok hingga terbentuk buih. Buih yang terbentuk menandakan adanya kandungan saponin pada ekstrak daun jeruk nipis. Saponin dapat membentuk busa dikarenakan saponin memiliki gugus hidrofil yang dapat berikatan dengan air dan hidrofob yang dapat berikatan dengan udara sehingga terbentuk buih pada saat proses pengocokan (Marpaung dan Romelan, 2018).

Uji tanin dilakukan dengan menambahkan pereaksi besi (III) klorida 1% yang ditandai dengan perubahan menjadi warna hijau kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya gugus OH yang dapat terhidrolisis oleh ion  $Fe^{3+}$  dan menghasilkan senyawa kompleks. Uji triterpenoid dilakukan dengan menambahkan pereaksi Liebermann-Burchard yang ditandai dengan adanya perubahan warna kecoklatan. Adanya cincin kecoklatan yang terbentuk dikarenakan terjadinya reaksi oksidasi pada golongan senyawa yang mengandung triterpenoid (Illing, 2017).

Uji kandungan alkaloid dilakukan dengan menambahkan pereaksi Dragendrof yang ditandai dengan terbentuknya endapan putih atau jingga (Yuda, dkk., 2017). Hal ini disebabkan karena adanya reaksi pengendapan yang terjadi karena pengganti logam (Nova, 2016). Uji fitokimia pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilaporkan oleh Namani, dkk. (2018) bahwa daun jeruk nipis mengandung senyawa metabolit sekunder seperti tanin, flavonoid. Sakka (2018) juga menyatakan bahwa daun jeruk nipis memiliki kandungan saponin, alkaloid (Afrina, dkk., 2016) dan triterpenoid (Widiyanti, 2006).

b. Hasil analisis gugus fungsi menggunakan FTIR

Pengujian menggunakan Spektrofotometer FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Kandungan gugus fungsi yang dianalisis adalah gugus fungsi yang menunjukkan adanya kandungan limonoid pada sampel. Adapun hasil analisis FTIR ekstrak daun jeruk nipis adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1** Grafik FTIR Ekstrak Daun Jeruk Nipis

Berdasarkan hasil pembacaan didapatkan setidaknya tujuh hasil pembacaan gugus fungsi yang menunjukkan adanya limonoid yang terkandung dalam ekstrak daun jeruk nipis diantaranya adalah OH *stretching* (2926,44 cm<sup>-1</sup>), COO (1730,64 cm<sup>-1</sup>), C=O *stretching* (1613,12 cm<sup>-1</sup>), C-O *stretching* (894,26 cm<sup>-1</sup>), C-O eter (1155,72 cm<sup>-1</sup>), O-Me metoksi (1075,23 cm<sup>-1</sup>), C-H *stretching* (620,22 cm<sup>-1</sup>). Hal ini sesuai dengan penelitian Seetharaman, dkk., (2017) yang menyatakan bahwa struktur dasar

limonoid dapat diketahui jika memiliki gugus fungsi *O-H stretching*, *COO*, *C=O stretching*, *C-O stretching*, *C-O eter*, *O-Me metoksi*, *C-H stretching*.

#### 4. Sampo Anti Kutu Rambut

Pembuatan sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk nipis menggunakan bahan seperti daun jeruk nipis, HPMC, natrium lauril sulfat dan metil paraben. Daun jeruk nipis berfungsi sebagai zat aktif yang dapat mematikan kutu karena daun jeruk nipis mengandung metabolit sekunder yang bersifat toksik terhadap kutu rambut manusia (Prastiwi dan Ferdiansyah, 2017). Selain bahan aktif, pembuatan sampo ini menggunakan pengental yaitu hidroksi propil metil selulosa (HPMC).

HPMC berfungsi sebagai basis yang memiliki sifat alir pseudoplastis yang dapat digunakan untuk membuat busa menjadi stabil dan juga untuk meningkatkan viskositas sediaan sampo. HPMC memiliki struktur yang dapat mengentalkan sediaan sampo sehingga memperlambat kemampuan mengalir sampo. Selain itu, HPMC saat dilarutkan dalam air memiliki warna yang jernih sehingga tidak mengubah warna dari sediaan sampo. Keuntungan lain yang didapatkan saat menggunakan HPMC adalah kisaran pH-nya luas dan mudah homogen dengan pengawet yang digunakan (Faizatun, dkk., 2008). HPMC juga tidak berpengaruh terhadap pH dan tinggi busa sediaan sampo (Rashati dan Eryani, 2016).

Bahan pengawet yang digunakan dalam pembuatan sampo anti kutu rambut dari daun jeruk nipis adalah metil paraben sebanyak 0,015%. Metil paraben dapat digunakan sebagai pengawet karena berpotensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur (Malonda, dkk., 2017). Penggunaan metil paraben dalam sediaan sampo ini terbilang aman dan tidak melebihi kadar yang telah ditetapkan BPOM

yaitu sebanyak 0,4% dan 0,8% masing-masing untuk tunggal dan campuran (Andini, dkk., 2017).

Surfaktan yang digunakan dalam pembuatan sediaan sampo anti kutu daun jeruk nipis adalah natrium lauril sulfat atau sodium lauril sulfat (SLS). Natrium lauril sulfat dapat digunakan sebagai bahan kosmetik diantaranya sabun, sampo, sabun mandi hingga pasta gigi. Ciri-ciri dari bahan ini adalah berbentuk kristal, berwarna putih adapula yang berwarna putih kekuningan, rasanya pahit, bersabun dan memiliki bau yang kurang sedap. Natrium lauril sulfat dapat membentuk busa karena adanya mikro emulsi, membuat minyak larut karena mampu membuat tegangan permukaan menjadi turun (Ramadhany, 2020).

### **5. Hasil Uji Karakteristik Sediaan Sampo**

Uji organoleptik merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bau, warna dan wujud dari sampo yang dibuat (Tee dan Badia, 2017). Hasil uji organoleptik dari sediaan sampo anti kutu ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) memiliki wujud cairan kental dan tidak menggumpal. Sampo yang diperoleh memiliki bau khas daun jeruk nipis, sehingga tidak diperlukan tambahan parfum sebagai penambah aroma sampo.

Sampo dengan konsentrasi ekstrak 7% dan 9% yaitu sampo F3 dan F4 memiliki bau yang lebih tajam dibandingkan sampo dengan konsentrasi ekstrak yang lebih rendah (F0, F1, F2). Warna dari sediaan sampo tanpa ekstrak terlihat bening sedangkan sampo dengan ekstrak daun jeruk nipis berwarna hijau kehitaman. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka sampo akan semakin kental, memiliki bau yang tajam dan warna yang semakin gelap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qomariah, dkk. (2020) ketertarikan konsumen dalam menggunakan sebuah produk dipengaruhi oleh kualitasnya. Tjiptono (2001)

memaparkan kualitas produk yang menjadi daya tarik konsumen diantaranya bau, warna dan rasa.

Uji homogenitas pada sediaan sampo berfungsi untuk mengetahui homogen atau tidaknya sediaan sampo. Hasil pengamatan homogenitas sediaan sampo yaitu homogen. Tidak terdapat gumpalan kasar ataupun warna yang berbeda dari sediaan sampo, sehingga sediaan sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk nipis homogen. Firdaus dan Arief (2019) melaporkan bahwa sampo yang baik merupakan sampo yang bahannya tercampur atau terdispersi secara merata (homogen).

Apabila sediaan sampo tidak homogen yaitu terdapat butiran kasar maka akan mengiritasi kulit kepala (Nurhaini, dkk., 2020). Selain bahan yang tidak tercampur secara merata hal yang dapat mempengaruhi homogenitas sediaan sampo adalah kotoran. Kotoran pada sampo akan menyebabkan terbentuknya butiran kasar ataupun warna yang berbeda sehingga sampo menjadi tidak layak untuk digunakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen dalam memilih sampo adalah jaminan kesehatan yang terdapat pada sampo. Salah satunya adalah kebersihan (Habibah, 2018).

Pengujian pH dilakukan untuk mengetahui kisaran pH dari sediaan sampo. pH merupakan suatu indikator yang menunjukkan sifat basa atau asam dari sediaan sampo. Pengukuran pH berperan penting terhadap kenyamanan dalam penggunaan sampo karena berpengaruh terhadap kesehatan kulit kepala dan rambut (Nasmety, dkk., 2019). Sampo yang memiliki pH terlalu asam atau terlalu basa akan menyebabkan iritasi pada kulit kepala (Malonda, 2017).

Pengujian pH sampo dilakukan dengan menggunakan pH meter. Hasil uji pH pada sediaan sampo F0, F1, F2, F3 dan F4 berturut-turut 6,91; 6,33; 6,13; 6,04 dan 5,86. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis yang ditambahkan maka

akan terjadi penurunan pH. Hal ini disebabkan karena daun jeruk nipis memiliki sifat asam karena kandungan asam askorbat (Subagja dan Nafi'ah, 2020) dan asam sitrat (Sinata dan Luthfi, 2020) yang terdapat di dalamnya. Sediaan sampo anti kutu ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) sesuai dengan standar SNI yakni memiliki pH 5-9.

Uji tinggi busa dilakukan untuk mengetahui kemampuan sampo dalam membentuk busa. Pengujian tinggi busa penting dilakukan karena busa pada sampo memegang peranan penting dalam pemakaiannya. Busa pada sampo berfungsi untuk mengikat kotoran karena busa dapat mencampurkan minyak dan air sehingga kotoran yang berminyak pada rambut atau kulit kepala mudah untuk dibersihkan (Prasetiyo, dkk., 2020).

Hasil pengukuran tinggi busa pada sediaan sampo F0, F1, F2, F3 dan F4 berturut-turut adalah 5,06 cm; 5,6 cm; 5,8 cm; 6,62 cm dan 6,46 cm. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surani dan Putriana (2017) tinggi sampo yang baik digunakan adalah 1,3-22 cm. Hal ini sesuai dengan sampo anti kutu yang dibuat termasuk kategori sampo yang baik untuk digunakan.

Tingginya busa yang dimiliki sampo pada konsentrasi ekstrak yang lebih besar disebabkan karena adanya kandungan saponin pada ekstrak (Sitompul, dkk., 2016). Saponin merupakan sabun alami yang dapat digunakan untuk membersihkan serta mengandung buih apabila dilarutkan dalam air (Gusviputri, 2017). Kemampuan saponin dalam membentuk busa dikarenakan saponin memiliki gugus hidrofil yang dapat berikatan dengan air dan hidrofob yang dapat berikatan dengan udara sehingga terbentuk buih pada saat proses pengocokan (Marpaung dan Romelan, 2018).

Selain itu, tinggi busa pada sampo juga dipengaruhi oleh kandungan natrium lauril sulfat (surfaktan) yang terkandung pada sampo. Natrium lauril sulfat

merupakan surfaktan jenis alkil sulfat sehingga dapat membentuk busa dengan baik. Hal ini disebabkan karena alkil sulfat adalah ester organik asam sulfat yang memiliki rantai hidrokarbon yang panjangnya berbeda (Nasmety, dkk., 2019).

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan sediaan sampo. Hasil uji viskositas sediaan sampo F0, F1, F2, F3 dan F4 berturut-turut 100 cP, 300 cP, 2200 cP, 3300 cP, dan 5900 cP. Penambahan HPMC sebagai *basic*/ pengental pada sediaan sampo memiliki konsentrasi yang sama yaitu 1%. Namun, setiap terjadi penambahan konsentrasi ekstrak maka akan semakin tinggi viskositas sediaan sampo. Sampo dengan konsentrasi ekstrak F0 (100 cP) dan F1 (300 cP) persen tidak memenuhi persyaratan sebagai sampo yang baik karena viskositasnya yang rendah. Sedangkan sampo dengan konsentrasi F4 (5900 cP) memiliki viskositas yang sangat tinggi sehingga tidak sesuai dengan persyaratan viskositas untuk sampo. Viskositas sediaan sampo yang baik sesuai dengan standar SNI adalah 400-4000 cP yaitu pada sediaan sampo dengan konsentrasi ekstrak F2 (2200 cP) dan F3 (3300 cP).

Semakin tinggi viskositas suatu sampo maka akan semakin sulit untuk dicuci dan dibersihkan. Apabila viskositasnya sangat rendah maka sampo tidak akan bertahan lama pada rambut karena memiliki tegangan permukaan yang sangat kecil menyebabkan sampo akan mudah terbawa oleh air (Surani dan Putriana, 2017). Viskositas juga berpengaruh terhadap proses penuangan sampo dari wadah (Faizatun, 2008). Sampo yang terlalu kental sulit dituang dari wadah hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen dalam menggunakan sampo.

## **6. Hasil Uji Efektivitas Anti Kutu**

Pengujian efektivitas dari sediaan sampo ekstrak daun jeruk nipis dilakukan dengan cara *in vitro*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 5 ekor kutu dewasa yang dimasukkan ke dalam cawan petri yang dilakukan secara triplo dan

diamati setiap 5 menit selama 2 jam. Hasil yang didapatkan dari sediaan sampo F0 dengan konsentrasi ekstrak 0% dapat mematikan 1 ekor kutu sedangkan pada sediaan sampo F1, F2, F3 dan F4 masing-masing konsentrasi ekstrak 3%, 5% dan 7% dan 9% dapat mematikan 100% kutu rambut. Pada kontrol negatif menggunakan akuades tidak dapat mematikan kutu rambut. Kontrol positif menggunakan peditox dengan kandungan permethrin 1% dapat mematikan 100% kutu. Namun dengan peditox membutuhkan waktu (30 menit) yang lebih lama untuk mematikan kutu dibandingkan sediaan sampo anti kutu dari ekstrak daun jeruk nipis F2 (25 menit), F3 (10 menit) dan F4 (5 menit). Berdasarkan data dari penelitian yang didapatkan semakin tinggi ekstrak daun jeruk nipis maka akan semakin tinggi tingkat kematian serta semakin cepat waktu yang digunakan untuk mematikan kutu rambut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tee dan Badia (2018), bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak maka akan semakin besar tingkat kematian kutu rambut manusia.

Sediaan sampo dari ekstrak daun jeruk nipis dapat berpengaruh terhadap mortalitas kutu karena mengandung flavonoid, tanin, saponin, minyak atsiri (Wulandari, dkk., 2015) serta limonoid (Kristinawati, 2018). Kandungan flavonoid dapat berperan sebagai bioinsektisida pada serangga. Flavonoid masuk ke dalam sistem pernafasan serangga yakni berupa spirakel yang berada di permukaan tubuh sehingga menimbulkan kerusakan spirakel dan menghambat sistem pernafasan serangga. Selain itu flavonoid juga dapat menyebabkan melemahnya fungsi saraf pada serangga (Yuliana, dkk., 2016).

Arneti, dkk., (2018) juga melaporkan bahwa adanya kandungan tanin pada tanaman sebagai insektisida dapat mengganggu kerja dari enzim protease yang menyebabkan ATP yang tidak terbentuk, tidak berlangsungnya sintesis protein yang menyebabkan larva menjadi kekurangan energi. Saponin yang terdapat pada sediaan

sampo dapat berfungsi untuk mencuci zat lilin yang terdapat pada kutu rambut manusia sehingga menyebabkan kutu rambut kehilangan banyak cairan yang dapat berdampak kematian (Indawati, dkk., 2017). Selain itu, saponin juga memiliki dampak yang buruk terhadap hewan karena saponin merupakan antinutrisi bagi hewan (Yanuartono, 2017). Saponin juga dapat merusak membran pada serangga (Umami dan Ahsanunnisa, 2019), merusak kutikula serta mengganggu sistem pernapasan pada serangga (Marliza dan Fenida, 2019).

Kandungan minyak atsiri pada daun jeruk nipis apabila dikonsumsi oleh serangga dapat mempengaruhi pencernaan pada serangga sehingga mengganggu sistem metabolisme yang terjadi (Wibaldus, 2016). Selain itu, minyak atsiri dapat menjadi racun kontak yang sangat berpengaruh terhadap kematian kutu rambut. Kandungan limonoid pada daun jeruk nipis akan bertindak sebagai racun kontak yang dapat masuk ke dalam tubuh kutu rambut melalui kulit (dinding sel), dapat pula menjadi racun yang merusak pencernaan serta masuk melalui pernafasan (Kristinawati, 2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik sampo anti kutu rambut dari ekstrak daun jeruk nipis berdasarkan hasil uji organoleptik memiliki bau khas daun jeruk nipis, wujud yang kental dan memiliki warna hijau kehitaman serta homogenitas yang baik, memiliki pH 5-6, tinggi busa berkisar antara 5-6 cm serta viskositas 100-5900 cP.
2. Konsentrasi optimum dari sediaan sampo anti kutu rambut daun jeruk nipis terhadap mortalitas kutu rambut adalah sediaan sampo F4 dengan konsentrasi ekstrak 9% dan sediaan sampo yang memenuhi syarat sebagai sampo yang baik digunakan adalah sediaan sampo F2 dan F3 dengan konsentrasi ekstrak 5% dan 7%.

#### **B. Saran**

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan menentukan variasi konsentrasi hidroksi propil metil selulosa (HPMC) sebagai basis dalam pembuatan sampo untuk menemukan konsentrasi HPMC yang sesuai untuk sampo pada konsentrasi ekstrak 3% dan 9% agar memenuhi standar viskositas yang baik untuk sediaan sampo.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

- Adrianto, Hebert, dkk. "Efektivitas Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hytrix*), Jeruk Limau (*Citrus amblycarpa*) dan Jeruk Bali (*Citrus maxima*) Terhadap Larva *Aedes aegypti*". *Aspirator* 6, no.1 (2014): h. 1-6.
- Alatas, Sahar Salim Saleh dan Sri Linuwih. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Mengenai Pedikulosis Kapitis dengan Karakteristik Demografi Santri Pesantren X, Jakarta Timur". *JKI* 1, no. 1 (2013): h. 53-57.
- Ali, Farida, dkk. "Koagulasi Lateks dengan Ekstrak Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*)". *Teknik Kimia* no. 2, (2009): h. 11-21.
- Alminda, Fikri Dwi dan Zelika Mega Ramadhania. "Teknik Isolasi dan Identifikasi Senyawa Karotenoid". *Farmaka* 16, no.2 (2018): h. 264-273.
- Andini, Tricia, dkk. "Optimasi Pembentuk Film Polivinil Alkohol dan Humektan Propilen Glikol pada Formula Masker Gel *Peel off* Sari Buah Labu Kuning (*Curcuma moschata Duchesne*) sebagai Antioksidan". *Farmasi Galenika* 3, no.2 (2017): h. 165-173.
- Arifin, Bustanul dan Sanusi Ibrahim. "Struktur, Bioaktivitas dan Antioksidan Flavonoid" *Zarah* 6, no. 1 (2018): h. 21-29.
- Arneti, dkk. "The potential of *Vitex trifolia* (Verbenaceae) as a botanical insecticide to control *Crociodolomia pavonana* (Lepidoptera: Crambidae)." *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* 4, no. 2 (2018): h. 169-172
- Arwinda, Gusviputri, dkk. "Pembuatan Sabun dengan Lidah Buaya (*Aloe vera*) sebagai Antiseptik Alami" *Widya Teknik* 12, no. 1 (2016): h. 11-21.
- Bintoro, Adi, dkk. "Analisis dan Identifikasi Senyawa Saponin Dari Daun Bidara (*Zhizipus mauritania* L.) (Analysis and Identification of Saponin Compound from Bidara Leaves (*Zhizipus mauritania* L.))" *Itekima* 2, no.1(2017): h. 84-94.
- Bohl, B. "Clinal Praticce Update: *Pediculosis capitis*" *Peiatric Nursing* 1, no. 1 (2015): h. 27-34.
- Darmadi, dkk. "Efektifitas Ekstrak Kulit Duku (*Lansium domesticum corr*) Terhadap Mortalitas Pedikulus Humanus Capitis sebagai Penyebab Pedikulosis pada Anak" *JOPS* 1, no. 2 (2018): h. 10-19.
- Effendi, Violetha Prisca dan Simon Bambang Widjanarko. "Destilasi dan Karakterisasi Minyak Atsiri Rimpang Jeringau (*Acorus calamus*) dengan Kajian Lama Waktu Destilasi dan Rasio Bahan: Pelarut" *Pangan dan Agroindustri* 2, no. 2 (2014): h. 1-8.
- Faizatun, dkk. "Formulasi Sediaan Sampo Ekstrak Bunga *Chamomile* dengan Hidroksi Propil Metil Selulosa sebagai Pengental" *Ilmu Kefarmasian Indonesia* 6, no. 1 (2008): h. 15-22.

- Habibah, Shofy Fajriana. "Gambaran Formalin pada Kosmetik Jenis Sampo dan Kondisioner". Disetrasi: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.
- Hartini, Veronika Adelina, dkk. "Isolasi Senyawa Triterpenoid dari Daun Ketapang Kencana (*Terminalia Muelleri Benth*) dan Uji Aktivitas Sitotoksik dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)" *Kimia Sains dan Aplikasi* 15, no. 2 (2012): h. 47-52.
- Hotez, Peter J, dkk. "Contol of Neglected Tropical Desease" *Medicine* 357, no. 10 (2007): h. 1018-1027.
- Illing, Ilmiati, dkk. "Uji Fitokimia Ekstrak Buah Dengan". *Dinamika* 8, no.1 (2017): h. 66-84.
- Indawati, Sulis, dkk. "Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn) Terhadap Mortalitas Kutu Kepala (*Pediculus humanus varian capitis*)" *Analisis Kesehatan* 6, no. 2 (2017): h. 507-511.
- Jusnita, Nina dan Riska Arguar Syah. "Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik sediaan Shampo dari Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* Linn.). *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal* 2, (2017): h. 24-39.
- Karyono, Tri Harsu. "Wujud Kota Tropis di Indonesia: Suatu Pendekatan Iklim Lingkungan dan Energi". *Dimensi Teknik Arsitektur* 29, no. 2 (2001): 141-146.
- Kasi, Pauline Destinugrainy. "Pemanfaatan Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) sebagai Insektisida Nabati Terhadap Hama Walang Sangit (*Leptocorisa oratorius*) Pada Tanaman Padi". *Dinamika* 3, no.1 (2012): h. 12-18.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajna Pentashihan Mushalaf Al-Qur'an (LPMQ), 2016.
- Kharismayanti, Amelia, dkk. "Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277 secara In Vitro" Makalah yang disajikan pada 5<sup>th</sup> Dentistry Scientific Meeting di Universitas Jember, Jawa Timur, 5 Mei 2018.
- Kiswandono, Agung Abadi. "Skrining Senyawa Kimia Dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks pada Biji Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) terhadap Rendamen Ekstrak yang Dihasilkan" *Sains Natural Universitas Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2011): h. 126-134.
- Kiswandono, Agung Abadi. "Skrining Senyawa Kimia dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks Pada Biji Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) terhadap Rendemen Ekstrak yang Dihasilkan" *Sains Natural Universitas Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2017): h. 126-134.
- Kristinawati, Erna dkk. " Efektivitas Kombinasi Filtrat Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dan Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius*) sebagai Insektisida Alami Pembasmi Kutu Rambut" *Media Bina Ilmiah* 12, no.6 (2018): h. 7-12.
- Kurniasih, Meiwarti, dkk. "Diagnosis Penyakit Tropis Berbasis Web dengan Metode Certainty Factor". *Coding* 5, no. 3 (2017): h. 64-71.

- Lee, Miwa Takano, dkk. "Home Remedies to Control Head Lice: Assessment of Home Remedies to Control the Human Head Louse, *Pediculus humanus capitis* (Anoplura: Pediculidae)". *Pediatric Nursing* 19, no. 6 (2004): h. 393-398.
- Lukman, Nihayah dkk. "Hubungan Faktor-Faktor Risiko Pediculosis capitis terhadap Kejadiannya pada Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Jember". *Agromedicine and Medical Sciences* 4, no. 2 (2018): 102-109.
- Luliana, Sri, dkk. "Pengaruh Cara Pengeringan Simplisia Daun Senggani (*Melastoma malabathricum* L.) terhadap Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil)" *Pharm Sci* 3, no. 3 (2016): h. 120-130.
- Luliana, Sri, dkk. "Pengaruh Cara Pengeringan Simplisia Daun Senggani (*Melastoma malabathricum* L.) Terhadap aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil)". *Pharm Sci* 3, no. 3 (2016): h. 120-129.
- Mabruroh, Eva Qomariyah, dkk. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Daun Murbei (*Morus alba* Linn)". *Chemical Science* 1, no. 8 (2019): h. 16-22.
- Malonda, Tasya C., dkk. "Formulasi Sediaan Sampo Anti Ketombe Ekstrak Daun Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.) dan Uji Aktivitasnya terhadap Jamur *Candida albicans* ATCC 10231 Secara In Vitro". *Ilmiah Farmasi* 6, no.4 (2017): h. 98-109.
- Malonda, Tasya C., dkk. "Formulasi Sediaan Sampo Antiketombe Ekstrak Daun Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.) dan Uji Aktivitasnya terhadap Jamur *Candida albicans* ATCC 10231 Secara In Vitro" *Pharmakon* 6, no.4 (2017): h. 97-109.
- Mangampa, Yunita, dkk. "Efek Biolarvasida Nyamuk *Aedes aegypti* dari Granul Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*)". *Ilmiah Manuntung* 3, no. 2 (2017): h. 116-121.
- Marliza, Hesti, dan Rizka Fenida. "Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilium*) sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Dengan Metode Elektrik." *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan* 9, no. 2 (2019): 31-34.
- Mukhriani. "Ekstraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif". *Kesehatan* 7, no. 2 (2014): h. 361-367.
- Namani, Jokha Al, dkk. "Phytochemical Screening, Phenolic Content and Antioxidant Activity of *Citrus aurantifolia* L. Leaves Grown in Two Regions of Oman". *Pharmaceutical Sciences* 14, no. 1 (2018): h. 27-34.
- Nasmety, Agnes Berta, dkk. "Pengaruh Konsentrasi *Cocamide dea* sebagai Surfaktan pada Pembuatan Sampo Ekstrak Daun Alamanda" *Medical Science* 6, no.2 (2019): h. 78-82.
- Ningrum, Dita Widiya, dkk. "Uji aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etanol daun Johar (*Senna siamea* Lamk)" *Kimia Sains dan Aplikasi* 20, no. 3 (2017): h. 123-129.

- Nova, Clementia. "Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Sirih Lengkung (*Piper aduncum* L.)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, 2016.
- Noviati, Wiwi dan Eryuni Ramdhayani. "Efektivitas Daun Mimba dan Daun Jeruk Nipis Sebagai Insektisida Kutu Beras (*Sitophilus oryzae*)". *Nasional* 4, no.1 (2017): h. 12-15.
- Novitasari, Anik Eko dan Dinda Zahriana Putri. "Isolasi dan Identifikasi Saponin pada Ekstrak Daun Mahkota Dewa dengan Ekstraksi Maserasi". *Sains* 6, no. 12 (2016): h. 11-13.
- Nugrahaningtyas, Khoirina Dwi, dkk. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dalam Rimpang Temu Ireng (*Curcuma aeruginosa* Roxb.)". *Biofarmasi* 3, no.1 (2005): h. 32-38.
- Nuryaman, Yosep, dkk. "Komparasi Algoritma Kmean dan AHC Untuk Klasifikasi Curah Hujan di Indonesia". *Iktaith-Informatika* 2, no.2 (2018): h. 70-75.
- Pambudi, Aji, dkk. "Analisis Morfologi dan Spektroskopi Infra Merah Serat Bambu Betung (*Dendrocalamus asper*) Hasil Proses Alkalisasi sebagai Pen gtuat Komsposit absorpsi Suara". *Teknik ITS* 6, no. 2 (2017): h. 441-444.
- Prastiwi, Silvia Sari dan Ferry Ferdiansyah. "Review Artikel: Kandungan Dan Aktivitas Farmakologi Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia* S.)". *Suplemen* 15, no. 2 (2017): h. 1-8.
- Prijadi, Dio K, dkk. "Uji Efektifitas Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dalam Menghambat Pertumbuhan Larva *Aedes* sp". *eBiomedik* 2, no.1 (2014): h. 1-5.
- Putra, Fariz Ihsan, dkk. "Perancangan Knowledge Management Sistem dalam Penanganan Penyakit Tropis dengan Pemenuhan Prinsip Ergonomi Kongnitif". *Teknologi* 1, no. 1 (2010): h. 1-10.
- Qomariah, Nur, dkk. "Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Kredibilitas Endorser Agnezmo Terhadap Minta Beli Shampoo Clear (Studi Kasus Desa Kelabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)". *Ilmiah Riset Manajemen* 9, no. 22 (2020): h. 164-180.
- Rafi, Mohamad, dkk. "Potensi Spektroskopi Ft-Ir-Atr dan Kemometrik untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing dan Sapi". *Chemical Science* 5, no. 3 (2016): h. 233-237.
- Rahmadani, Nina, dkk. "Penerapan Metode Ekstraksi Pelarut dalam Pemisahan Minyak Atsiri Jahe Merah (*Zingiber officinale* Var. *Rubrum*)". *Kovalen* 4, no. 1 (2014): h. 74-81.
- Ramadani, Febriz Rizki, dkk. "Pemanfaatan Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) sebagai Pewarna Alami Kosmetik Pemerah Pipi (*Blush On*)". *Healthcare Technology and Medicine* 4, no. 2 (2018): h. 165-175.
- Ramadhany, Berliana Riestian. "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Terhadap Produk Nurayya Sampo Dandruff Tanpa Kandungan SLS". *E-jurnal* 9, no.2 (2020): h. 51-59.

- Rashati, Dewi dan Mikhania Christiningtyas Eryani. "Pengaruh Variasi Konsentrasi HPMC terhadap Mutu Fisik dan Stabilitas Sediaan Sampo Ekstrak Etanol Daun Katuk (*Sauropus androgynus* (L) Merr)" *Ilmiah Farmasi* 1, no. 2 (2016): h. 1-10.
- Razak, Abdul, dkk. "Uji Daya Hambat Air Perasan Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* s.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus Aureus* Secara In Vitro" *Kesehatan Andalas* 1, no.2 (2013): h. 5-8.
- Rukmana, Rahmat. *Jeruk Nipis, Prospek Agribisnis, Budi Daya dan Pasca panen*. Jakarta: Kanisius, 2003.
- Sangi, Meiske S, dkk. "Uji Toksisitas Dan Skrining Fitokimia Tepung Gabah Pelepah Aren (*Arenga pinnata*)". *Jurnal Ilmiah Sains* 12, no. 2 (2012): h. 127-134.
- Sakka, La. "Identifikasi Senyawa Alkaloid, Flavonoid, Saponin dan Tanin pada Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) di Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru Menggunakan Metode Infusa". *Kesehatan Diagnosis* 12, no. 6 (2018): 670-674.
- Saraswati, Nurmalia dan Norisca Aliza Putriana. "Review Artikel: Aktivitas Anti Kutu Rambut (*Pediculus humanus capitis*) dari Minyak Esensial Tanaman Nimba, Teh, Saga Rambut Dan Srikaya Secara In-Vitro" *Suplemen* 15, no. 2 (2017): h. 241-250.
- Sari, Destika dan Jhons Fatriyadi. "Dampak Infestasi Pedikulosis Kapitis Terhadap Anak Usia Sekolah". *Majority* 5, no. 5 (2016): h. 69-74.
- Seetharaman, Prabukumar, dkk. "Isolation of Limonoid Compound (Hamisonine) from endophytic fungi *Penicillium oxalicum* LA-1 (KX622790) of *Limonia acidissima* L. For its larvical efficacy against LF vector, *Culex quinquefasciatus* (Diptera: Culicidae)". *Environ Sci* 24, no. 26 (2017): H. 21272-21282.
- Setiabudi, dkk. *Karakterisasi Material: Prinsip dan Aplikasinya dalam Penelitian Kimia*. Bandung, UPI Press, 2012.
- Setyoasih, Atik dan Dyah Suryani. "Hubungan antara Pengetahuan, Personal Hygiene, dan Infestasi *Pediculus humanus var. capitis* pada Santriwati Muhammadiyah Boarding School Prambanan Sleman Yogyakarta" *Kedokteran dan Kesehatan* 12, no. 2 (2016): h. 190-201.
- Sitompul, Merdinda Bellia, dkk. "Formulasi dan Uji Aktivitas Sediaan Sampo Antiketombe Ekstrak Etanol Daun Alamanda (*Allamanda catharica* L.) terhadap Pertumbuhan Jamur *Candida albicans* Secara In Vitro" *Pharmakon* 5, no. 3 (2016): h. 122-129.
- Sulistiyani, Martin dan Nuril Huda. "Optimasi Pengukuran Spektrum Vibrasi Sampel Protein Menggunakan Spektrofotometer Fourier Infrared (FTIR)" *In dones. J. Chem. Sci* 6, no.2 (2017): h. 1-4.
- Sulistiyani, Martin, dkk. "Spektroskopi Fourier Transform Infra Red dengan Metode Reflektansi (Atr-Ftir) pada Optimasi Pengukuran Spektrum Vibrasi Vitamin C" *Kimia* 1, no. 2 (2018): h. 39-43.


- Surani, Fanni dan Norisca Aliza Putriana. "Evaluasi Berbagai Sediaan Shampo Herbal Anti Ketombe dan Anti Kutu: Review Artikel". *Suplemen* 15, no. 2 (2017): h. 218-232.
- Tafsir Jalalain.
- Tee, Selfyana Austin dan Esti Badia. "Uji Efektivitas Shampo Antikutu Rambut Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata L.*) Secara In Vitro". *Warta Farmasi* 8, no. 2 (2019): h. 1-9.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Andy, 2001
- Umami, NT Reza, dan R. Ahsanunnisa. "Potensi Ekstrak Daun Salam (*Syzygium polyanthum*) sebagai Insektisida Hayati Terhadap Nyamuk *Aedes Aegypti*." *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (2019): h. 1-9.
- Vahabi, dkk. "Prevalence and risk factors of pediculus (humanus) capitis (Anoplura: Pediculidae) in Primary Schools in Sanandaj City, Kurdistan Province, Iran". *Tropical Biomedicine* 29, no.2 (2012): h. 207-211.
- Virgianti, Dewi Peti dan Lia Aulia Rahmah. "Efektivitas Beberapa Merk Minyak Kayu Putih Terhadap Mortalitas *Pediculus humanus capitis* secara In Vitro". *Ilmu-ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi* 15, no. 1 (2016): h. 10-18.
- Wibaldus, dkk., 2016 "Bioaktivitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Rayap Tanah (*Coptotermes sp.*)". *JKK* 5, no. 1 (2016): 44-51.
- Winingsih, Wiwin, dkk. "Penggunaan FTIR-ATR ZnSe (Fourier Transform Infra Red) untuk Penetapan Kadar Kuersetin dalam Teh Hitam (*Camelia sinesis L.*)". *JSTFI* 5, no.1 (2016): h. 47-53.
- Wulandari, Mutiara Juni, dkk. "Jenis-Jenis Komponen Minyak Atsiri yang Diisolasi dari Daun Citrus aurantifolia dan Citrus nobilis". *Kesehatan* 2, no. 1 (2015): h. 5-8.
- Yang, Young-Cheol, dkk. "Insecticidal Activity of Plant Essential Oils Against *Pediculus humanus capitis* (Anoplura: Pediculidae)". *Entomological* 41, no.4 (2019): h. 699-704.
- Yanuartono, dkk. "Saponin: Dampak Terhadap Ternak (Ulasan)". *Peternakan* 6, no.2 (2017): h. 79-90.
- Yuda, Putu Era Sandhi Kusuma, dkk. "Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Tanaman Patikan Kebo (*Euphorbia hirta L.*)". *Ilmiah Medicamento* 3, no. 2 (2017): h. 61-70.
- Yulia, Mega dan Ranova Riki. "Uji Aktivitas Antioksidan Teh Daun Sirsak (*Annona muricata Linn*) Berdasarkan Teknik Pengolahan". *Katalisator* 4, no. 2 (2019): 84-90.
- Yuliana, Vina, dkk. "Aplikasi Penyemprotan Perasan Daun Kamboja (*Plumeria acuminata*) Terhadap Kematian Lalat Rumah (*Musca domestica*).". *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan* 13, no. 1 (2016): h. 299-305.

- Yulianti, Devi dan Andrini. “Kandungan Flavonoid dan Limonoid pada Berbagai Fase Pertumbuhan Tanaman Jeruk Kalamondin (*Citrus mitis Blanco*) dan Purut (*Citrus hystrix Dc.*)”. *Horl* 20, no. 4 (2010): h. 360-367.
- Zaini, Muhammad dan Vivi Shofia. “Skrining Fitokimia Ekstrak *Carica papaya radix*, *Piper ornatum folium* dan *Nephelium lappaceum* Semen Asal Kalimantan Selatan”. *Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2020): h.15–27.



## LAMPIRAN

### Lampiran I. Skema Alur Penelitian



## Lampiran II. Data Hasil Pengamatan

### 1. Data hasil uji tinggi busa

Konsentrasi Sampo (%)	Pengujian			Rata- rata
	I	II	III	
F0	5	5	5,2	5,06
F1	5,5	5,5	6	5,6
F2	6,1	6,15	6,16	6,13
F3	6,05	6,07	6,01	6,04
F4	6,7	7	5,7	6,46

### 2. Data hasil uji pH menggunakan pH meter

Sampo Anti Kutu	Pengujian			Rata- rata
	I	II	III	
F0	6,86	6,86	7,02	6,91
F1	6,37	6,26	6,36	6,33
F2	6,1	6,15	6,16	6,13
F3	6,05	6,07	6,01	6,04
F4	5,88	5,86	5,86	5,86

### Lampiran III. Contoh Perhitungan Viskositas Sampo Anti Kutu

#### 1. Analisis data viskositas sediaan sampo

Diketahui:

Spindle : 6  
RPM : 50  
Faktor koreksi : 200


##### a. Formula 0 (0%)

Viskositas = faktor koreksi x hasil baca

$$= 200 \times 0,5$$

$$= 100$$

Untuk menghitung viskositas sampo F1, F2, F3 dan F4 dilakukan dengan cara yang sama seperti diatas.



#### Lampiran IV. Contoh Perhitungan Persentase Ekstrak

**a. Konsentrasi 3% (%b/v)**

$$\frac{3}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 1,5 \text{ gram}$$

Perhitungan konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis 5%, 7%, 9% dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas.



**Lampiran V. Perhitungan Persentase HPMC, SLS Dan Metil Paraben****a. HPMC 1% (%b/v)**

$$\frac{1}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 0,5 \text{ gram}$$

**b. SLS 4% (%b/v)**


$$\frac{4}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 2 \text{ gram}$$


**c. Metil paraben 0,15% (%b/v)**

$$\frac{0,15}{100} = \frac{b}{50}$$

$$b = 0,075 \text{ gram}$$



## Lampiran VI. Hasil Analisis FTIR



## Lampiran VII. Dokumentasi Penelitian



Daun Jeruk Nipis



Ekstrak Daun Jeruk Nipis



Sampo



Uji Efektivitas

## BIOGRAFI



Nurul Mawaddah Warahmah atau biasa dipanggil Lulu memiliki hobi membaca buku dan menulis. Lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 1999 dari pasangan Mansur N dan Ramlah. Nurul memiliki dua adik bernama Amanda Qalby Khairyah dan Sakinah Izzatul Jannah. Jenjang pendidikannya pertama kali dilaksanakan di TK Pertiwi Mannanti, kemudian melanjutkan pendidikannya di SD 96 Mannanti, SMPN 5 Sinjai Selatan, SMAN 1 Tellulimpoe.

Pendidikan tertinggi Penulis di tempuh di UIN Alauddin Makassar Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Selama berkuliah penulis aktif dalam organisasi Intra dan berbagai kegiatan kemahasiswaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A A K K A S S S A R R