

**Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>s</sub>W dari Larva Kumbang Sagu**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Kimia Jurusan Kimia  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**TENDRI ABENG**  
NIM: 60500117031

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tendri Abeng  
Nim : 60500117031  
Tempat/tgl Lahir : Pertasi Kencana/ 25 Oktober 1998  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Garuda Kompleks Anugrah Bintang Cemerlang, No. D7,  
Maros  
Judul : Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>8</sub>W dari Larva  
Kumbang Sagu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Gowa, Agustus 2021

Penyusun



Tendri Abeng  
NIM: 60500117031

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>s</sub>W dari Larva Kumbang Sagu**” yang disusun oleh **Tendri Abeng**, NIM: 60500117031, mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqassyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Agustus 2021 bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia.

Samata-Gowa, Jumat, 06 Agustus 2021 M  
27 Zulhijjah 1442 H

### DEWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.	(.....)
<b>Sekretaris</b>	: Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si.	(.....)
<b>Munaqys 1</b>	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.	(.....)
<b>Munaqys 2</b>	: Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag.	(.....)
<b>Pembimbing 1</b>	: Dr. Maswati Baharuddin, M.Si	(.....)
<b>Pembimbing 2</b>	: Amalyah Febryanti, S.Si., M.Si.	(.....)

**Diketahui Oleh:**  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**  
NIP. 197104122000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>s</sub>W dari Larva Kumbang Sagu”**. Salam dan Salawat penulis curahkan kepada baginda Rasulullah yang telah membawa perubahan bagi umat islam.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi dan meraih gelar sarjana di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, M.Si dan Ibu Amalyah Febryanti, S.Si., M.Si, selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya selama pengerjaan penelitian dan penulisan skripsi.

6. Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah berkenan memberikan kritikan maupun saran kepada penulis.
7. Dosen Jurusan Kimia dan staf serta karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin , terkhusus kepada Kak Fitria Azis, S.Si., S.Pd yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ambo Tang dan Ibu Dubeng yang senantiasa selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis sampai ke jenjang ini.
10. Segenap keluarga penulis yang selalu memberikan ruang dan waktu diskusi selama penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi serta memberikan bantuan materi yang mendukung penyelesaian penelitian dan skripsi penulis.
11. ORBITAL angkatan 2017 (Nur Alfina, Ismail dan Hajrah HA) serta LIGAN angkatan 2016 (Muliani, S.Si dan Wulan Wahyuningsih, S.Si).

Penulis berharap segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak mendapatkan berkah dari-Nya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Gowa, Agustus 2021

Penulis,



**Tendri Abeng**

**NIM: 60500117031**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-5
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6-18
A. Tanaman Sagu ( <i>Metroxylon</i> sp.) .....	6
B. Larva Kumbang Sagu ( <i>Rhychophorus ferrugeneis</i> ) .....	8
C. Selulosa .....	10
D. Enzim Selulase .....	12
E. Aktivitas Enzim Selulase .....	13
F. Bakteri Selulolitik .....	15
G. Spektrofometer UV-Vis .....	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	19-25
A. Waktu dan Tempat .....	19
B. Alat dan Bahan .....	19
C. Prosedur Penelitian .....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	26-39
A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan .....	28
1. Produksi Enzim Selulase .....	28
2. Pengukuran Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS .....	29
3. Karakterisasi Enzim Selulase pada Isolat R <sub>8</sub> W .....	31
3.1 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi Suhu .....	31
3.2 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi pH .....	33
3.3 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi Konsentrasi Substrat .....	35
4. Pengukuran Aktivitas Enzim Selulase pada Substrat Selulosa Sekam Padi .....	38
BAB V PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41-46
LAMPIRAN .....	47-97
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Hasil Pengaruh Variasi Suhu terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	26
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Pengaruh Variasi pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	27
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Pengaruh Variasi Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	28





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Larva Kumbang Sagu .....	9
<b>Gambar 2.2</b> Struktur Selulosa .....	9
<b>Gambar 2.3</b> Diagram Skematik Degradasi Selulosa .....	13
<b>Gambar 2.4</b> Spektrofotometer UV-Vis .....	18
<b>Gambar 4.1</b> Reaksi Asam Dinitrosalisilat (DNS) dengan Glukosa .....	30
<b>Gambar 4.2</b> Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	32
<b>Gambar 4.3</b> Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	34
<b>Gambar 4.4</b> Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Skema Penelitian .....	47
<b>Lampiran 2</b> Prosedur Kerja Penelitian .....	48
<b>Lampiran 3</b> Pembuatan Kurva Standar Glukosa .....	57
<b>Lampiran 4</b> Penentuan Kadar Glukosa pada Variasi Suhu .....	59
<b>Lampiran 5</b> Penentuan Kadar Glukosa pada Variasi pH .....	62
<b>Lampiran 6</b> Penentuan Kadar Glukosa pada Variasi Konsentrasi Substrat .....	65
<b>Lampiran 7</b> Penentuan Kadar Glukosa Ekstrak Kasar Selulase pada Substat Selulosa Sekam Padi .....	68
<b>Lampiran 8</b> Penentuan Aktivitas Enzim Selulase .....	69
<b>Lampiran 9</b> Perhitungan Standar Devisiasi Sampel .....	77
<b>Lampiran 10</b> Dokumentasi Penelitian .....	84

## ABSTRAK

**Nama : Tendri Abeng**

**Nim : 60500117031**

**Judul : Karakterisasi Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>8</sub>W dari Larva Kumbang Sagu**

---

Karakterisasi enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas selulase pada suhu, pH dan konsentrasi substrat optimum serta mengetahui aktivitas enzim dengan menggunakan substrat selulosa sekam padi. Metode dalam penelitian ini meliputi produksi enzim, karakterisasi enzim selulase dengan metode DNS pada variasi suhu (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, pH (5, 6, 7, 8, 9), dan konsentrasi substrat CMC (0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%) serta optimalisasi aktivitas selulase pada substrat alami. Hasil penelitian ini menunjukkan enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu optimum pada suhu 50 °C dengan aktivitas enzim sebesar 0,070 U/mL, pH 8 dengan aktivitas enzim sebesar 0,069 U/mL, konsentrasi substrat 2% dengan aktivitas enzim sebesar 0,063 U/mL dan aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada substrat selulosa sekam padi sebesar 0,103 U/mL.

**Kata Kunci:** Karakterisasi, Larva kumbang sagu, Bakteri Selulolitik, Selulase, Sekam padi

## ***ABSTRACT***

**Name : Tendri Abeng**

**Nim : 60500117031**

**Title : Characterization of R8W Bacterial Cellulase Isolate from Sago Beetle Larvae**

---

Cellulase enzyme characterization of R<sub>8</sub>W bacteria isolates from sago beetle larvae has been carried out. This study aims to determine cellulase activity at optimum temperature, pH and substrate concentration and to determine enzyme activity using rice husk cellulose as a substrate. The methods in this study include enzyme production, cellulase enzyme characterization by DNS method at various temperatures (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, pH (5, 6, 7, 8, 9), and CMC substrate concentrations (0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%) as well as optimizing cellulase activity on natural substrates. The results of this study showed the cellulase enzyme R<sub>8</sub>W bacterial isolate from sago beetle larvae was optimum at temperature of 50 °C with enzyme activity of 0.070 U/mL, pH 8 with enzyme activity of 0.069 U/mL, substrate concentration of 2% with enzyme activity of 0.063 U/mL and cellulase enzyme activity of R<sub>8</sub>W bacterial isolate from sago beetle larvae on cellulose substrate rice husk of 0.103 U/mL.

**Keywords:** Characterization, Sago Beetle Larvae, Cellulolytic Bacteria, Cellulase, Rice Husk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris menghasilkan produk-produk tani yang melimpah. Produk tani yang melimpah meningkatkan hasil samping berupa limbah (Flimban, dkk., 2019: 8). Batang sagu menjadi salah satu limbah yang masih mengandung selulosa. Batang sagu yang tidak diolah akan mengalami pembusukan dimana bagian yang membusuk tersebut digunakan untuk media pertumbuhan organisme. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Hastuty (2016: 17) bahwa larva ulat sagu berasal dari kumbang merah yang hidup pada batang sagu yang telah membusuk. Ulat sagu hidup pada batang sagu dengan mengonsumsi nutrisi dalam tanaman sagu.

Larva ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*) mengonsumsi selulosa dengan mengubah selulosa menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim selulase dalam pencernaan larva tersebut. Enzim selulase didapatkan dari bakteri atau jamur yang berpotensi menghasilkan enzim. Seperti yang dilaporkan Baharuddin, dkk., (2016: 24) bahwa bakteri selulolitik dapat diisolasi dari larva kupu-kupu *cossus cossus*. Menurut Supriyatna dan Article (2016: 319), bakteri selulolitik diisolasi dari larva *hermetia illucens* dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,41 U/mL. Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri selulolitik dapat diisolasi dari larva *osphanteria coerulescens* dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,52 U/mL pada suhu 60 °C (Hatefi, dkk., 2017: 162).

Enzim selulase diproduksi dengan cara isolasi. Isolasi enzim selulase dapat dilakukan pada komponen tubuh mikroorganisme yang berperan sebagai media pertumbuhan bakteri penghasil selulase. Usus mikroorganisme menjadi salah satu komponen tubuh yang mengandung bakteri selulolitik, seperti yang dilaporkan

Pandiarajan dan Revathy (2020: 5) bahwa bakteri selulolitik diisolasi dari usus ulat sutera (*Bombyx Mori L*). Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri selulolitik dapat diisolasi dari usus larva kumbang sagu. Hasil penelitian tersebut didapatkan 5 isolat yaitu R<sub>1</sub>W, R<sub>4</sub>W, R<sub>8</sub>W, R<sub>9</sub>W, dan R<sub>10</sub>W. Isolat R<sub>8</sub>W memiliki aktivitas enzim selulase sebesar  $5,1425 \times 10^{-2}$  U/mL (Wahyuningsih, 2020: 30).

Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt Qs. an-Nahl/16: 69.

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

terjemahnya:

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah swt memberikan izin kepada lebah-lebah itu dengan izin yang bersifat qadari dan taskhiri (penundukkan) agar makan dari tiap-tiap macam buah-buahan serta menempuh jalan-jalan yang telah Allah mudahkan baginya dan sesuai yang dikehendakinya, baik itu atmosfer udara yang begitu besar, padang sahara yang membentang luas, ataupun dari lembah-lembah dan gunung-gunung yang tinggi. Kemudian masing-masing lebah itu kembali ke sarangnya tanpa membelok ke arah kanan maupun kiri. Akan tetapi langsung kembali ke sarangnya tempat penetasan telur dan madunya. Kemudian ia membuat lilin dari sayap-sayapnya, memuntahkan madu dari mulutnya, dan menetaskan telur dari duburnya, setelah itu ia kembali terbang ke tempat gembalaannya (Tafsir Ibnu Katsir: 114).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan lebah dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh makanan dan mengetahui letak tempat tinggalnya. Selain itu lebah memproduksi madu yang memiliki manfaat sebagai obat. Sebagaimana Allah menciptakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dengan membawa manfaat yang besar seperti pemanfaatan isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu yang menghasilkan enzim selulase untuk mendegradasi senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana.

Degradasi selulosa dengan bantuan enzim dipengaruhi beberapa faktor seperti suhu, pH maupun konsentrasi substrat yang didegradasi. Faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh pada aktivitas enzim. Peningkatan aktivitas enzim dapat dilakukan dengan menjaga kestabilan enzim terhadap suhu maupun pH (Sui, dkk., 2019: 6). Enzim bekerja pada keadaan optimum untuk menghasilkan sebuah produk.

Kualitas kerja enzim ditinjau dari karakteristiknya terhadap pengaruh suhu, pH maupun konsentrasi substrat. pH optimum digunakan untuk mengaktifkan sisi aktif enzim yang akan berikatan dengan substrat. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Pandiarajan dan Revathy (2020: 12), aktivitas optimal enzim selulase yang menghidrolisis substrat bubuk selulosa bekerja secara optimal pada pH 7 sebesar 0,45 U/mL. faktor lain yang berpengaruh terhadap aktivitas enzim adalah suhu.

Suhu optimum enzim meningkatkan kompleksitas pembentukan substrat dengan enzim. Menurut Baharuddin (2016: 23), suhu optimum enzim selulase dari larva *Cossus cossus* sekitar 70 °C dengan aktivitas enzim sebesar  $2,775 \times 10^{-2}$  U/mL pada isolat CC2 dan  $4,359 \times 10^{-2}$  U/mL pada isolat CC4. Menurut Azadian, dkk., (2017: 193), suhu optimum enzim selulase dari *Bacillus Sonorensis* sebesar 70 °C. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim adalah substrat. Enzim selulase bekerja hanya pada substrat yang sesuai seperti selulosa (Xue, dkk., 2017: 5).

Substrat yang umum digunakan dalam produksi enzim selulase adalah CMC (*Carboxyl Methyl Cellulose*). CMC adalah senyawa turunan selulosa yang bersifat murni. Kemurnian dari substrat CMC dimanfaatkan untuk penentuan aktivitas enzim selulase. Seperti yang telah dilaporkan Putri (2016: 60) variasi konsentrasi substrat CMC 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5% digunakan untuk melihat aktivitas optimum selulase. Selain CMC substrat lain dapat diperoleh dari limbah pertanian seperti sampah tebu, bubuk rumput, sekam sorgum, jerami gandum, eceng gondok dan sekam padi (Waghmare, dkk., 2018: 402). Sekam padi mengandung selulosa sebesar 45,57% dan kadar lignin sebesar 20,47% (Asnani, dkk., 2015: 93). Menurut Purkan (2015: 98) sekam padi dimanfaatkan sebagai inducer untuk memproduksi enzim selulase dari *Aspergillus niger*.

Pengaruh dari pH, suhu, dan konsentrasi substrat optimum akan menjaga kestabilan kerja enzim. Kestabilan enzim dibutuhkan dalam pemanfaatan enzim di berbagai bidang, salah satu di antaranya adalah di bidang industri. Enzim dimanfaatkan di bidang industri tersebut untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas (Gao, dkk., 2018: 7). Menurut Hafid, dkk., (2017: 674), hidrolisis enzimatik digunakan dalam menghasilkan glukosa yang dapat difermentasi lebih lanjut menjadi bioetanol.

Berdasarkan latar belakang di atas, kestabilan enzim dalam proses hidrolisis dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya faktor suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Maka dilakukan penelitian, karakterisasi enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimal enzim selulase dalam mendegradasi substrat.



**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada suhu, pH, dan konsentrasi substrat optimum?
2. Berapa aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada substrat selulosa sekam padi?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada suhu, pH, dan konsentrasi substrat optimum.
2. Mengetahui aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada substrat selulosa sekam padi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada penulis dan masyarakat tentang pemanfaatan larva kumbang sagu.
2. Memberikan informasi kepada penulis dan pembaca tentang keadaan optimum aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Tanaman Sagu (Metroxylon sagu)*

Sagu merupakan tanaman dengan nama latin *Metroxylon sagu* yang termasuk kedalam kingdom *plantae* dengan famili *Arecaceae* (Palmae). Sagu merupakan salah satu penghasil karbohidrat tinggi yang banyak diolah menjadi bahan pangan tradisional oleh masyarakat. Menurut Putri (2019: 1092), kadar karbohidrat sagu sebesar 48,92%, kadar gula 54,32%, protein 0,67%, dan kadar air 4,10%.

Sagu merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi kesehatan. Seperti yang telah dilaporkan Vita (2017: 119), tanaman sagu dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, bahan bangunan/perkakas rumah tangga, bahan bakar, dan pengendali lingkungan. Menurut Karamoy, dkk., (2019: 11), kulit batang sagu dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan bio-briket. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. As-Syuara/26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”

Menurut tafsir Al-Maraghi menjelaskan apakah mereka akan terus-menerus tenggelam dalam kekufuran terhadap Allah dan pendustaan terhadap Rasul-nya? Dan apakah mereka tidak berfikir tentang berbagai keajaiban kekuasaannya, tidak pula memperhatikan bumi dengan berbagai jenis, bentuk, dan warna tumbuh-tumbuhannya yang membuktikan kekuasaan serta kekuatan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar (Tafsir Al-Maraghi: 80).

Ayat lain yang juga membahas mengenai keragaman tanaman yaitu dalam QS. Taha/20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۳

terjemahnya:

“Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat diatas menjelaskan bahwa Allah yang telah menjadikan bagi kamu hai Fir’aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi. Dia (Allah swt) juga telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempu, dan menurunkan dari langit air yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka kami tumbuhkan dengannya yakni dengan perantaraan hujan itu jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang keragaman tumbuh-tumbuhan baik yang bermacam-macam dengan segala manfaatnya. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang kaya akan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Salah satu jenis tanaman baik dan memiliki manfaat yang tumbuh di bumi adalah tanaman sagu. Tanaman sagu merupakan tumbuhan yang banyak diolah. Pengolahan tumbuhan sagu menghasilkan limbah. Limbah yang dihsilkan berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat hasil pengolahan tumbuhan sagu adalah batang sagu. Menurut McClatchey (2006: 12) menyatakan bahwa limbah pengolahan sagu menghasilkan kulit batang sagu sekitar 17-25% dan ampas sagu sekitar 75-83%.

Menurut Vita (2017: 114) Batang sagu menjadi tempat utama dihasilkannya pati melalui proses fotosintesis tepatnya pada empulur. Batang bagian bawah pada umumnya mempunyai kandungan pati yang lebih tinggi dari pada bagian atas. Batang sagu mengandung senyawa organik seperti selulosa. Selulosa merupakan polimer yang mudah terdegradasi. Kandungan selulosa dalam batang sagu berfungsi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme. Batang sagu bagian pucuk pohon menjadi tempat bertelurnya kumbang merah kelapa (Widiastuti dan Kisan, 2014: 209).

#### **B. Larva Kumbang Sagu (*Rhynchophorus ferrugeneus*)**

Mikroba mampu hidup dengan bantuan nutrisi dalam suatu tanaman. Mikroba ditemukan pada tanaman dan dalam makhluk hidup lainnya. Bahan organik yang terkandung dalam tanaman memberikan pemasok energi bagi mikroba. Bahan organik digunakan untuk memberi nutrisi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan mikroba maupun mikroorganisme lainnya (Pulungan, dkk., 2018: 46).

Serangga identik sebagai hama dalam bidang pertanian. Serangga terdiri dari beberapa jenis yang bermanfaat bagi manusia. Nutrisi bagi serangga berbeda-beda tergantung dari jenis serangga. Jenis serangga terbagi menjadi dua yaitu serangga herbivora dan serangga karnivora (Wali, dkk., 2017: 47). Serangga jenis herbivora antara lain belalang, larva kupu-kupu (ulat), dan kumbang. Serangga karnivora atau serangga pemakan segalanya antara lain, lalat, dan beberapa jenis ulat pemangsa (Alrazik, dkk., 2017: 2).

Larva kumbang sagu berasal dari serangga kumbang merah kelapa yang tumbuh pada tanaman sagu. Tanaman sagu yang telah ditebang menghasilkan batang pucuk pohon sagu yang menjadi tempat hidupnya kumbang sagu. Larva dari kumbang merah kelapa dikenal sebagai ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*)

(Ariani, dkk., 2018: 132). Menurut Hastuty (2016: 14), klasifikasi larva kumbang sagu adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia  
Filum : Arthropoda  
Kelas : Insecta  
Ordo : Coleoptera  
Family : Curculionidae  
Genus : *Rhynchophorus*  
Spesies : *R.ferrugineus*

Ulat sagu diperoleh dari limbah batang sagu yang telah ditebang sekitar 20-40 hari. Ulat sagu yang diperoleh dari batang sagu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain durasi waktu pembusukan batang sagu, volume atau kandungan karbohidrat batang sagu dan jumlah serangga betina yang menyimpan telur pada media tumbuh. Ulat sagu dipanen dari batang sagu satu kali pada setiap batang sagu. Limbah batang sagu dalam kondisi buruk menjadi media pertumbuhan kembali untuk telur serangga kumbang merah setelah proses pemanenan (Hastuty, 2016: 17).




**Gambar 2.1** Larva Kumbang Sagu  
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Ulat sagu secara konvensional dimanfaatkan sebagai bahan pangan dengan kandungan protein tinggi. Menurut Kasi dan Cambaba (2017: 13), kadar protein tertinggi yang diperoleh pada larva kumbang sagu sebesar 12,04%. Selain protein, ulat

tersebut juga mengandung karbohidrat. Menurut Ariani, dkk., (2018: 133), kandungan karbohidrat dalam larva kumbang sagu sebesar 8,69%.

### C. *Selulosa*

Selulosa adalah biopolimer yang ketersediaannya melimpah di alam. Selulosa tergolong kedalam jenis homopolimer D-glukosa yang tersusun secara linear. Selulosa tersusun dari monomer-monomer glukosa yang terhubung oleh ikatan 1,4 glikosidik. Selulosa dengan struktur yang kriptalin terdegradasi oleh enzim selulase yang memutus ikatan 1,4 glikosidik (Setyoko dan Utami, 2016: 863). Selulosa merupakan komponen jaringan tanaman pembentuk dinding sel. Selulosa dalam pembentukan dinding sel tanaman berasosiasi dengan polimer lain seperti polimer hemiselulosa dan polimer lignin (Hatefi, dkk., 2017: 158).




**Gambar 2.2** Struktur Selulosa  
(Sumber: Baharuddin, dkk., 2016: 2)

Selulosa merupakan komponen utama dalam tanaman. Selulosa mampu bertindak sebagai substrat untuk pertumbuhan suatu mikroorganisme. Selulosa yang berasosiasi dengan polimer lain seperti polimer hemiselulosa dan polimer lignin disebut senyawa lignoselulosa. Lignoselulosa merupakan komponen organik yang melimpah. Lignoselulosa terkandung dalam jaringan tanaman dengan tiga bagian polimer yaitu lignin, hemiselulosa dan selulosa. Pendegradasian lignoselulosa dibantu oleh kinerja enzim yang sesuai dengan substrat. Lapisan pertama dalam jaringan tanaman adalah lignin yang mampu terdegradasi oleh lignase. Hemiselulosa yang mengisi ruang antara selulosa didegradasi oleh hemiselulase. Selulosa merupakan

polimer yang terdegradasi dengan selulase. Enzim selulase terdiri dari tiga enzim di antaranya endoglukanase, eksoglukanase atau selobiohidrolase dan  $\beta$ -glukosidase (Champreda, dkk, 2019: 3).

Pendegradasian selulosa sebagai bahan pembuatan bioetanol dikonversi dengan cara hidrolisis. Hidrolisis selulosa dapat dilakukan secara kimia maupun enzimatik. Metode hidrolisis memiliki keuntungan dan kekurangan. Metode hidrolisis enzimatik merupakan metode yang menguntungkan dari segi biaya dan bersifat ramah lingkungan. Hidrolisis secara enzimatik berarti degradasi selulosa dengan bantuan enzim. Salah satu proses hidrolisis enzimatik terjadi pada pembuatan bioetanol dengan proses sakarifikasi dan fermentasi serentak (SFS). Secara umum reaksi dalam proses SFS yaitu:



Glukosa hasil hidrolisis difermentasi dengan bantuan ragi menjadi etanol. Fermentasi untuk menghasilkan bioetanol merupakan reaksi perubahan gula heksosa menjadi etanol dan karbon dioksida secara anaerob. Satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida ( $CO_2$ ) (Karisma, 2015: 24). Menurut Setyoko dan Utami (2016: 863), enzim yang digunakan dalam hidrolisis selulosa adalah enzim selulase. Penelitian lain juga menyatakan bahwa enzim selulase dimanfaatkan untuk menghidrolisis batang jagung dan bubur kentang, dimana hasil hidrolisis tertinggi diperoleh pada hari ke-60 fermentasi (Xu, dkk., 2020: 8).


#### D. Enzim Selulase

Enzim selulase diproduksi dari berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan jamur (Kuhad, dkk., 2016: 265). Sumber mikroorganisme penghasil enzim selulase terdapat di dalam rumen hewan ruminansia dalam jumlah yang besar. Seperti yang dilaporkan Setyoko dan Utami (2016: 864), bakteri selulolitik diisolasi dari cairan rumen sapi untuk hidrolisis biomassa. Enzim merupakan biomolekul yang tersusun atas asam amino yang bekerja secara spesifik terhadap substrat. Enzim selulase berfungsi mengonversi selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana (Hafid, dkk., 2017: 674).

Penggunaan selulase meluas di bidang industri seperti industri kertas maupun industri energi terbarukan (Flimban, dkk., 2019: 8). Aktivitas enzim selulase terhadap stabilitas pH dan stabilitas suhu sangat diperlukan dalam bidang industri (Hatefi, dkk., 2017: 163). Kinerja enzim selulase dalam menghidrolisis biomassa dipengaruhi oleh suhu, pH maupun konsentrasi substrat (Sui, dkk., 2019: 6). Stabilitas enzim dalam bidang industri menjadi faktor penting seperti dalam industri pembangkit listrik melalui sistem MFC (Manzoor, dkk., 2018: 19). Penelitian lain menyatakan bahwa *pretreatment* alkali dengan bantuan iradiasi ultrasonik dalam pembuatan biofuel mengurangi penggunaan enzim (Subhedar, dkk., 2018: 19).

Reaksi biokimia dibantu oleh enzim sebagai biokatalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Selulase tersusun atas tiga enzim utama yang bekerja secara sinergis dalam proses degradasi selulosa. Tiga enzim ini meliputi endoglukanase, eksoglukanase atau selobiohidrolase dan  $\beta$ -glukosidase (Thomas, dkk., 2018: 429).





**Gambar 2.3** Diagram Skematik Degradasi Selulosa  
(Sumber: Saropah, dkk., 2012: 37)

Enzim selulase memecah ikatan (1-4) glikosida pada selulosa menjadi selobiosa dan didegradasi kembali menjadi monomer glukosa. Degradasi ini dibantu oleh tiga enzim. Endoglukanase berfungsi memutus secara acak ikatan β-(1,4) glikosida pada struktur selulosa amorf membentuk molekul selulosa yang lebih sederhana. Eksoglukanase berperan dalam proses pemutusan dua unit glukosa dari ujung gula pereduksi dan non pereduksi membentuk molekul selobiosa. β-glukosidase berfungsi menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa (Behera, dkk., 2017: 200).

#### **E. Aktivitas Enzim Selulase**

Aktivitas kerja suatu enzim selulase dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat (Putri, 2016: 22). Kerja suatu enzim selulase dengan membentuk aktivitas yang spesifik. Aktivitas spesifik enzim selulase menggambarkan tingkat kemurnian suatu enzim. Menurut Ramadhan, dkk., (2020: 69) semakin tinggi aktivitas spesifik dari enzim semakin tinggi kemurniaannya. Aktivitas spesifik enzim merupakan banyaknya substrat yang dipecah oleh enzim. Aktivitas enzim selulase

ditentukan berdasarkan banyaknya glukosa yang dihasilkan dari pemecahan selulosa oleh enzim.

Faktor suhu berpengaruh terhadap kontak enzim dengan substrat. Enzim merupakan serangkaian asam amino yang sistem kerjanya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Menurut Setyoko dan Utami (2016: 866), suhu optimum bakteri selulolitik adalah 39 °C dengan aktivitas selulase sebesar 306,35 µmol/mL. Penelitian lain juga menyatakan bahwa suhu optimum enzim selulase dari *Bacillus* sp. sekitar 50 °C dengan efisiensi hidrolisis enzimatik 80% (Sriariyanun, dkk., 2015: 26). Enzim tidak mampu bekerja dibawah suhu optimum atau diatas suhu optimum. Pada saat mencapai suhu optimum kecepatan reaksi kontak enzim dengan substrat berlangsung cepat seiring dengan kenaikan energi kinetik. Penelitian lain juga melaporkan bahwa suhu aktivitas *Bacillus pumilus* relatif stabil pada suhu 30 °C - 50 °C dan didapatkan suhu optimumnya sekitar 50 °C (Bhuyan, dkk., 2018: 18).

Faktor pH dan faktor substrat memiliki peran dalam mengaktifkan sisi aktif enzim dalam proses hidrolisis. Menurut Dar, dkk., (2019: 8), pH optimum dari bakteri selulolitik adalah pH 5 dengan aktivitas selulase sebesar 80% pada substrat CMC dan avicel yang menunjukkan aktivitas selulase 23,6 U/mL dan 3,6 U/mL. Penelitian lain juga menyatakan bahwa pH optimum bakteri selulolitik dari *Pleurotus ostreatus* adalah pH 4 dengan menggunakan berbagai substrat limbah pertanian. Aktivitas selulase tertinggi dari bakteri selulolitik tersebut didapatkan pada substrat kulit kacang tanah sebesar 23,6 U/mL (Okereke, dkk., 2017: 10).

Faktor substrat sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa. Kompleks enzim substrat terjadi saat sisi afinitas enzim sesuai dengan jumlah molekul substrat. Aktivitas enzim selulase meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat (Istianah, dkk., 2020: 15). Menurut Rulianah, dkk.,

(2019: 44) konsentrasi penambahan substrat 5%, 6%, dan 7% dari kayu mahoni didapatkan penambahan sebesar 7% menunjukkan aktivitas selulase tertinggi sebesar 39,034 U/mL. Penelitian lain juga menyatakan bahwa konsentrasi 4% dari substrat tongkol jagung menunjukkan aktivitas enzim selulase tertinggi sebesar 2,082 U/mL (Ramadhan, dkk., 2020: 69).

#### **F. Bakteri Selulolitik**

Mikroorganisme merupakan organisme yang tidak tampak dengan mata secara langsung. Mikroorganisme terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah bakteri. Bakteri selulolitik adalah bakteri yang mampu mendegradasi selulosa dengan bantuan enzim selulase yang dihasilkan. Degradasi selulosa dengan enzim selulase dari bakteri selulolitik bekerja secara spesifik seperti prinsip kunci dan gembok. Enzim bekerja pada sisi aktif yang spesifik terhadap substrat. Pertumbuhan mikroorganisme selulolitik dipengaruhi oleh nutrisi yang terdapat di lingkungan seperti ketersediaan sumber makronutrien. Salah satu sumber nutrisi diperoleh dari selulosa (Murtiyaningsih dan Hazmi, 2017: 307).

Mikroorganisme berdasarkan suhu lingkungannya terbagi menjadi psikofil, mesofil, termofil, dan hipertermofil. Mikroorganisme dapat tumbuh dalam kondisi optimumnya. Kondisi optimum dari setiap mikroorganisme berpengaruh terhadap proses produksi enzim. Kondisi optimum dari mikroorganisme berbeda-beda seperti yang dilaporkan Setiawati, dkk., (2019: 6), suhu optimum mikroba termofil diatas 40 °C. Penelitian lain juga menyatakan bahwa suhu optimum *Bacillus Circulans* adalah 70 °C dengan aktivitas enzim selulase tertinggi pada isolat CC4 sebesar  $4,359 \times 10^{-2}$  U/mL (Baharuddin, 2016: 23).

Bakteri mampu bertahan hidup di lingkungan dengan menguraikan senyawa kompleks menjadi nutrisi untuk pertumbuhannya. Keberadaan bakteri menjadi

melimpah dengan cara hidup yang mampu bersifat bebas maupun patogen terhadap makhluk hidup. Bakteri yang bersifat non patogen dimanfaatkan dalam bidang industri seperti dalam pembuatan bioenergi (Flimban, dkk., 2019: 8). Keberadaan bakteri secara umum dapat diisolasi dari berbagai ekosistem, meliputi ekosistem tanah, air, dan limbah organik. Menurut Thomas, dkk., (2018: 435), bakteri selulolitik diisolasi dari ekosistem tanah dan didapatkan strain bakteri genus *Bacillus* sp. Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri selulolitik dapat diisolasi dari sumber air panas dan ditemukan strain bakteri *B. Stratosphericus* dan *B. Subtilis*. Bakteri *B. Stratosphericus* menunjukkan aktivitas enzim endoglukanase sebesar 0,35 U/mL dan glukosidase sebesar 0,21 U/mL, sedangkan bakteri *B. Subtilis* menunjukkan aktivitas enzim endoglukanase sebesar 3,78 U/mL dan beta glukosidase sebesar 8,15 U/mL (Singh, dkk., 2019: 11).

Isolasi bakteri bertujuan memperoleh satu jenis isolat bakteri yang murni. Isolasi bakteri diperoleh dari sumber yang mengandung nutrisi bagi mikroorganisme. Menurut Barbosa, dkk., (2020: 13), bakteri selulolitik diisolasi dari usus larva *Spehenophorus levis* diperoleh 4 strain bakteri diantaranya *Paenibacillus*, *Bacillus*, *Enterobacter* dan *Klebsiella*. Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri selulolitik diisolasi dari usus larva kumbang chafer atau belatung putih (*Holotricia palella*) dan diperoleh 7 strain bakteri diantaranya *Clostridia*, *Epsilonproteobacteria*, *Betaproteobacteria*, *Arcobacter*, *Treponema*, *Comamonas*, dan *Clostridium* (Sheng, dkk., 2016: 10).

Mikroba selulolitik bisa diisolasi dari batang kayu. Menurut Setiawati, dkk., (2019: 6), mikroba selulolitik yang diisolasi dari sarang rayap didapatkan dekomposer konsorsium mikroba selulolitik diantaranya isolat bakteri dan jamur selulolitik. Menurut Setiawati, dkk., (2019: 7) aktivitas mikroba dapat menurunkan kandungan

selulosa kompos dari limbah pertanian khususnya limbah ampas tebu dalam waktu satu bulan, sedangkan pada kompos limbah jerami padi dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam masa inkubasi satu bulan memperlihatkan kecenderungan penurunan selulosa.

Secara umum organ tubuh mikroorganisme khususnya usus banyak menyimpan mikroba. Mikroba membantu dalam proses biokimia yang terjadi dalam tubuh mikroorganisme. Menurut Bhuyan, dkk., (2018: 19), bakteri selulolitik diisolasi dari larva ulat muga (*Antheraea assamensis helfeI*) diperoleh strain bakteri genus *Bacillus*. Bakteri selulolitik dari larva kumbang sagu diperoleh isolat bakteri R<sub>8</sub>W yang memiliki karakteristik seperti genus *Bacillus* (Wahyuningsih, 2020: 34). Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri selulolitik dapat diisolasi dari usus larva kumbang *Coleoptera* (Hatefi, dkk., 2017: 163). Menurut Dantur, dkk., (2015: 6), bakteri selulolitik dapat diisolasi dari usus *Diatraea saccharalis* dan diperoleh 3 isolat yang menunjukkan aktivitas selulase tertinggi diantaranya isolat *K. variicola*, *K. pneumonia* dan *Bacillus pumilus*.


Mikroba saling berinteraksi secara simbiotik dalam mendegradasi senyawa-senyawa kompleks dan menemukan senyawa bioaktif dalam proses bioteknologi. Keragaman dan struktur mikroba dalam usus serangga dipengaruhi oleh nutrisi dan faktor lingkungan fisiologis. *Antheraea assamensis* adalah polifag yang produksi enzimnya dipengaruhi oleh nutrisi dan kualitas daun yang dikonsumsi oleh serangga (Bhuyan, dkk., 2018: 3).

Bakteri selulolitik dimanfaatkan dalam bidang produksi energi terbarukan seperti pembuatan bioetanol ataupun biofuel. Bakteri selulolitik memiliki banyak manfaat diantaranya digunakan sebagai pembangkit listrik. Menurut Flimban, dkk., (2019: 8), bakteri selulolitik mampu mendegradasi selulosa untuk pembangkit listrik

dalam reaktor MFC. Penelitian lain juga menyatakan bahwa bakteri yang diisolasi dari serangga *coleoptera* dapat digunakan sebagai antibiotik (Skowronek, dkk., 2020: 9). Pada penelitian tersebut didapatkan 12 isolat yang menunjukkan aktivitas antibakteri. Isolat *P. chlororaphis* menunjukkan aktivitas antibiotik yang tertinggi.

### G. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan alat yang berfungsi dalam pengukuran cahaya. Pada dasarnya prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis berdasarkan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan konsentrasi suatu larutan akan berbanding lurus dengan absorbansi suatu zat dalam larutan tersebut pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu metode analisis yang mudah dengan waktu yang cepat. Kelebihan lain dari metode tersebut adalah tidak memerlukan biaya yang besar serta penggunaan jumlah sampel dan pelarut yang dibutuhkan sedikit.



**Gambar 2.4** Spektrofotometer UV-Vis  
(Sumber: Azizah, 2017: 18)

Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan dalam analisis kimia secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk mengukur aktivitas enzim. Pengukuran aktivitas enzim dilakukan menggunakan metode DNS. Metode tersebut menggunakan reagen asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) yang akan bereaksi dengan gula reduksi pada proses hidrolisis substrat. Reaksi antara reagen DNS dengan gula reduksi akan menyerap cahaya dari sumber radiasi pada panjang gelombang 540 nm.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Analitik, Laboratorium Anorganik dan Laboratorium Kimia-Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta di Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah spektrofotometer UV-Vis *Geneys 20* (Varian, Amerika Serikat), sentrifus dingin *Z 366 K* (*Hermele*, Jerman), *Shaker MASQ 7000* (Thermo Scientific, Amerika Serikat), inkubator *hareus* (Thermo Scientific, Jerman), oven *GmbH* (*Memmert*, Jerman), autoklaf *yx-280 D* (*GEA*, Jerman), *laminar air flow Isocide 14644-1* (*Esco*, Singapura), *magnetic stirrer* (*Health*, Amerika Serikat), *sieve shaker AS 200* (*Retsch*, Amerika Serikat), vortex mixer wizard (*Velp Scientifica*, Italia), neraca analitik *ABS* (*Kern*, Jerman), penangas air *SH-31* (*Maspion*, Indonesia), alat-alat gelas *pyrex*, pembakar spiritus, jarum ose, rak tabung dan gegep.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah isolat bakteri  $R_8W$  yang diperoleh dari larva kumbang sagu (*Rhynchophorus*) di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Wahyuningsih, 2020). Selain itu, beberapa bahan yang digunakan, diantaranya adalah akuades ( $H_2O$ ), akubides

(Waterone) alkohol ( $C_2H_5OH$ ) 70%, aluminium foil, buffer asetat pH 5, buffer fosfat pH 6, pH 7, dan pH 8, buffert Tris-HCl pH 9, ekstrak ragi, glukosa ( $C_6H_{12}O_6$ ), kalium nitrat ( $KNO_3$ ), karboksimetil selulosa (CMC) p.a, kertas pH, magnesium sulfat ( $MgSO_4$ ), monokalium fosfat ( $KH_2PO_4$ ), natrium kalium tatrak (KNaC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>.4H<sub>2</sub>O) p.a, nutrient agar (NA), nutrient broth (NB), natrium hidroksida (NaOH) 10%, natrium hipoklorit (NaOCl) 8%, natrium sulfat ( $Na_2SO_3$ ), plastik *wrapping*, pereaksi dinitrosalisilat (DNS) p.a, dan tisu.

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Pembuatan Media**

##### **a. Pembuatan Media Inokulum**

Media inokulum dibuat dengan 0,05 gram  $KH_2PO_4$ , 0,02 gram  $MgSO_4$ , 0,7 gram  $KNO_3$ , 2,5 gram nutrient broth, 0,2 gram ekstrak ragi dan 1 gram CMC. Bahan media inokulum dilarutkan dengan akuades sebanyak 100 mL. Bahan media inokulum dipanaskan dan diaduk hingga larut. Kemudian media inokulum dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas sumbat. Kemudian media inokulum disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121 °C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Media inokulum didinginkan pada suhu ruang (Azizah, 2017).

##### **b. Pembuatan Media Produksi**

Media produksi dibuat dengan 5 gram CMC, 0,1 gram  $MgSO_4$ , 3,5 gram  $KNO_3$ , 0,25 gram  $KH_2PO_4$ , 12,5 gram nutrient broth dan 1 gram ekstrak ragi. Bahan media produksi dilarutkan dengan akuades sebanyak 500 mL. Media produksi dipanaskan dan diaduk hingga larut. Kemudian media produksi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas sumbat. Kemudian media produksi disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121 °C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Media produksi didinginkan pada suhu ruang (Azizah, 2017).



## **2. Produksi Enzim Selulase dari Isolat Mikroba Larva Kumbang Sagu**

### **a. Penyiapan Inokulum**

Isolat bakteri R<sub>8</sub>W larva kumbang sagu diambil dari media agar sebanyak 5 ose. Isolat dipindahkan ke dalam media inokulum secara aseptis. Kemudian inokulum dihomogenkan dengan *shaker* pada suhu ruang dan kecepatan 180 rpm selama 24 jam (Azizah, 2017).

### **b. Produksi Enzim**

Media inokulum dimasukkan ke dalam media produksi sebanyak 75 mL. Campuran inokulum dengan media produksi dihomogenkan dengan *shaker* pada suhu ruang dan kecepatan 180 rpm selama 48 jam. Campuran tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 4500 rpm dan suhu 4 °C selama 10 menit pada sentrifus dingin. Setelah itu, campuran tersebut dipisahkan menjadi supernatan (ekstrak kasar enzim) dan endapan (residu). Supernatan diambil sebagai ekstrak kasar enzim selulase. Ekstrak kasar enzim selulase disimpan dalam lemari (Azizah, 2017).

## **3. Persiapan Reagen dan Larutan Standar Glukosa**

### **a. Pembuatan Pereaksi DNS**

Sebanyak 1 gram DNS dilarutkan ke dalam 20 mL larutan NaOH p.a dan 50 mL *water one*. Kemudian bahan pereaksi DNS ditambahkan 1 gram K-Na tartrat dan 1 gram Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Bahan pereaksi DNS dihomogenkan. Selanjutnya bahan pereaksi DNS ditambahkan *water one* hingga volume akhir 100 mL. Kemudian pereaksi DNS dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di dalam lemari pendingin (Azizah, 2017).

### **b. Pembuatan Larutan Buffer Asetat pH 5**

Buffer asetat dibuat dengan campuran larutan A (CH<sub>3</sub>COOH) dan Larutan B (CH<sub>3</sub>COONa). Sebanyak 2,7 gram natrium asetat (CH<sub>3</sub>COONa) dicampurkan dengan

*waterone* sebanyak 100 mL. sebanyak 12 mL asam asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) dicampurkan dengan *waterone* sebanyak 100 mL. selanjutnya 30 mL larutan A dicampurkan dengan larutan B sebanyak 80 mL. Kemudian dihomogenkan (Pertiwi, 2017).

**c. Pembuatan Larutan Buffer Fosfat pH 6, 7, dan 8**

Buffer fosfat dibuat dengan campuran larutan A ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) dan Larutan B ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ). Sebanyak 1,7799 gram natrium hidrogen fosfat ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) dicampurkan dengan *waterone* sebanyak 200 mL. Sebanyak 1,5601 gram natrium dihidrogen fosfat ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ) dicampurkan dengan *waterone* sebanyak 200 mL. Larutan buffer pH 6 dibuat dengan campuran 12,3 mL larutan A dan larutan B sebanyak 87,7 mL. Larutan buffer pH 7 dibuat dengan campuran 61,1 mL larutan A dan larutan B sebanyak 38,9 mL. Larutan buffer pH 8 dibuat dengan campuran 94,7 mL larutan A dan larutan B sebanyak 5,3 mL. Kemudian dihomogenkan (Pertiwi, 2017).

**d. Pembuatan Larutan Buffer Tris-HCl pH 9**

Larutan buffer Tris-HCl dibuat dengan campuran larutan A (2,103 gram Tris dalam 100 mL *waterone*) dan larutan B (10 mL HCl dalam 100 mL *waterone*). Selanjutnya dipipet 25 mL larutan A kedalam labu ukur 100 mL. Kemudian ditambahkan larutan B sebanyak 5,3 mL dan dihomogenkan sampai volume akhir 100 mL (Putri, 2016).

**e. Pembuatan Standar Glukosa**

Larutan standar glukosa dibuat dengan larutan induk glukosa 1 mg/mL. Larutan induk glukosa dibuat dengan 0,025 gram glukosa. Glukosa dilarutkan dengan akuades sampai volume 25 mL. Larutan induk diencerkan hingga diperoleh konsentrasi (0,2 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,8 mg/mL; dan 1 mg/mL) dalam 5 mL. Larutan standar (0,2 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,8 mg/mL; dan 1 mg/mL) serta blanko dipipet sebanyak 3 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Larutan

standar ditambahkan 3 mL reagen DNS dan dihomogenkan dengan vortex selama 20 detik. Selanjutnya campuran dipanaskan selama 10 menit dan didinginkan selama 10 menit. Larutan standar dan blanko diukur serapannya pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Azizah, 2017)

#### **4. Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim Selulase**

##### **a. Penentuan Suhu Optimum**

CMC 1% dan larutan buffer fosfat pH 7 dimasukkan ke dalam 5 buah tabung reaksi sebanyak 2 mL. Campuran ditambahkan ekstrak kasar enzim selulase sebanyak 2 mL. Kemudian campuran diinkubasi pada suhu berbeda (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C dan 70 °C) selama 15 menit. Selanjutnya campuran ditambahkan 2 mL pereaksi DNS dan dihomogenkan dengan vortex pada kecepatan 1200 rpm selama 20 detik. Campuran tersebut dipanaskan didalam air mendidih selama 10 menit. Selanjutnya campuran didinginkan didalam air es selama 10 menit. Kemudian campuran diukur serapannya pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Putri, 2016).

##### **b. Penentuan pH Optimum**

Larutan CMC 1% dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi sebanyak 2 mL. Larutan CMC 1% ditambahkan buffer (buffer asetat pH 5, buffer fosfat pH 6, 7 dan 8 serta buffer Tris-HCl pH 9) pada masing-masing tabung sebanyak 2 mL. Selanjutnya campuran ditambahkan ekstrak kasar enzim selulase pada masing-masing tabung sebanyak 2 mL. Campuran diinkubasi pada suhu 37 °C selama 15 menit. Selanjutnya campuran ditambahkan 2 mL pereaksi DNS dan dihomogenkan dengan vortex pada kecepatan 1200 rpm selama 20 detik. Campuran tersebut dipanaskan didalam air mendidih selama 10 menit. Selanjutnya campuran didinginkan didalam air es selama

10 menit. Kemudian campuran diukur serapannya pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Putri, 2016).

### **c. Penentuan Konsentrasi Substrat Optimum**

Ekstrak kasar enzim sebanyak 2 mL direaksikan dengan 2 mL substrat CMC dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. Campuran tersebut ditambahkan buffer fosfat pH 7 sebanyak 2 mL. Kemudian campuran diinkubasi selama selama 15 menit. Selanjutnya campuran ditambahkan 2 mL pereaksi DNS dan dihomogenkan dengan vortex pada kecepatan 1200 rpm selama 20 detik. Campuran tersebut dipanaskan didalam air mendidih selama 10 menit. Selanjutnya campuran didinginkan didalam air es selama 10 menit. Kemudian campuran diukur serapannya pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Putri, 2016).

## **5. Penentuan Aktivitas Enzim Selulase dalam Substrat Alami**

### **a. Isolasi Selulosa pada Sekam Padi**

Sekam padi dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian sekam padi dihaluskan menggunakan blender dan diayak. Serbuk sekam padi didelignifikasi menggunakan NaOH 10% selama 90 menit pada suhu 55°C. Hasil delignifikasi disaring dan residunya direndam dengan NaOCl 8% selama 1 jam menggunakan *magnetic stirrer*. Endapan dicuci dengan akuades sampai pH netral (uji dengan kertas lakmus). Kemudian endapan dikeringkan didalam oven pada suhu 50 °C selama 7 jam (Pramana, dkk., 2016).

### **b. Aktivitas Enzim Selulase menggunakan Substrat Alami**

Bubuk selulosa sekam padi dengan konsentrasi substrat optimum ditambahkan 2 mL buffer pH optimum dan 2 mL ekstrak kasar enzim dalam gelas kimia 100 mL. Campuran diinkubasi selama 15 menit pada suhu optimum (Baharuddin, 2016). Campuran tersebut dipipet ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 mL. Kemudian

campuran ditambahkan reagen DNS sebanyak 3 mL dan dihomogenkan dengan vortex pada kecepatan 1200 rpm selama 20 detik. Campuran tersebut dipanaskan didalam air mendidih selama 10 menit. Selanjutnya campuran didinginkan didalam air es selama 10 menit. Kemudian campuran diukur serapannya pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang ( $\lambda$ ) 540 nm (Azizah, 2017). Aktivitas selulase dalam proses hidrolisis didasarkan pada jumlah gula pereduksi. Satu unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang menghasilkan 1  $\mu$ mol glukosa per menit (U/mL) yang dinyatakan dalam persamaan:

$$\text{Aktivitas Enzim} = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_{\text{enzim}}} \times \frac{V_{\text{substrat}}}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol}$$

Keterangan:

- [glukosa] = Kadar glukosa
- $F_p$  = Faktor pengenceran
- $V_{\text{enzim}}$  = Volume enzim
- $V_{\text{substrat}}$  = Volume substrat
- t = Waktu inkubasi

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Ekstrak kasar enzim selulase yang diperoleh dari isolat bakteri R<sub>8</sub>W dikarakterisasi menggunakan substrat CMC 1%, suhu 37 °C dan pH 7. Keadaan optimum yang telah didapat digunakan dalam penentuan aktivitas enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa sekam padi.

#### 1. Suhu Optimum Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>8</sub>W dari Larva Kumbang Sagu

Hasil pengujian suhu optimum enzim selulase dari isolat bakteri larva kumbang sagu didapatkan pada suhu 50 °C menggunakan kondisi pH 7 dan konsentrasi substrat CMC 1%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Hasil Pengaruh Variasi Suhu terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Suhu (° C)	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas enzim (U/mL) ± SE
30	0,296	0,133	0,050 ± 0,004
40	0,322	0,143	0,053 ± 0,002
50	0,432	0,189	0,070 ± 0,002
60	0,422	0,185	0,068 ± 0,003
70	0,357	0,155	0,058 ± 0,004

## 2. pH Optimum Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>s</sub>W dari Larva Kumbang

### Sagu

pH optimum enzim selulase dari isolat bakteri larva kumbang sagu adalah pH 8 menggunakan kondisi suhu 37 °C dan konsentrasi substrat CMC 1%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Hasil Pengaruh Variasi pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

pH	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas enzim (U/mL) ± SE
5	0,144	0,071	0,026 ± 0,001
6	0,275	0,115	0,042 ± 0,005
7	0,285	0,128	0,047 ± 0,001
8	0,426	0,186	0,069 ± 0,005
9	0,384	0,169	0,063 ± 0,007

## 3. Konsentrasi Substrat Optimum Enzim Selulase Isolat Bakteri R<sub>s</sub>W dari Larva Kumbang Sagu

Konsentrasi substrat optimum enzim selulase dari isolat bakteri larva kumbang sagu adalah 2% menggunakan kondisi suhu 37 °C dan pH 7. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Hasil Pengaruh Variasi Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase**

Konsentrasi Substrat (%)	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas enzim (U/mL) $\pm$ SE
0,5	0,193	0,091	0,034 $\pm$ 0,001
1	0,226	0,104	0,039 $\pm$ 0,001
1,5	0,286	0,129	0,048 $\pm$ 0,002
2	0,387	0,170	0,063 $\pm$ 0,004
2,5	0,361	0,160	0,059 $\pm$ 0,006

#### 4. Aktivitas Enzim Selulase pada Subtrat Selulosa Sekam Padi

Selulosa yang digunakan berasal dari limbah sekam padi hasil delignifikasi. Aktivitas enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa dari sekam padi pada suhu 50 °C, pH 8, dan konsentrasi substrat 2% adalah 0,103 U/mL.

#### B. Pembahasan

##### 1. Produksi Enzim Selulase

Produksi enzim terdapat pada fase akhir logaritmik sampai fase awal stasioner. Produksi enzim akan terus berlangsung sampai nutrisi pada media habis. Bakteri memproduksi enzim dengan mensintesis CMC pada media produksi. CMC pada media produksi berfungsi sebagai inducer. CMC tersebut menginduksi pembentukan enzim (Putri, 2016: 48). CMC juga berfungsi sebagai sumber karbon untuk menghasilkan glukosa. Peningkatan sumber karbon akan berpengaruh pada produksi enzim. Produksi enzim meningkat seiring peningkatan sumber karbon.



Saropah (2012: 43) menyatakan bahwa kelebihan sumber karbon dalam media produksi akan mengurangi jumlah oksigen sehingga menurunkan produksi enzim. Selain karbon dari CMC, terdapat unsur lain yang dibutuhkan oleh mikroba, seperti ion kalium yang berasal dari dikalium hidrofosfat ( $K_2HPO_4$ ), kalium dari kalium nitrit ( $KNO_3$ ), ion magnesium dari magnesium sulfat ( $MgSO_4$ ), dan nitrogen dari *yeast extract*.


Enzim selulase merupakan enzim ekstrakseluler yang dapat dipisahkan dari dinding sel bakteri dengan cara sentrifugasi (Putri, 2016: 48). Metode sentrifugasi termasuk metode pemisahan berdasarkan berat molekul. Ekstrak kasar enzim pada metode sentrifugasi akan terpisah dari dinding sel. Pemisahan terbagi menjadi dua yaitu supernatan yang memiliki berat molekul rendah dan pelet merupakan sel bakteri dengan berat molekul lebih berat sehingga akan mengendap pada saat proses sentrifugasi. Proses sentrifugasi dilakukan pada suhu 4 °C dengan kecepatan 4500 rpm selama 10 menit. Suhu dingin pada proses sentrifugasi bertujuan agar protein dalam enzim tidak mengalami denaturasi akibat suhu tinggi (Nababan, dkk., 2019: 196).

## **2. Pengukuran Aktivitas Enzim Selulase dengan Metode DNS**

Ekstrak kasar enzim selulase diukur aktivitasnya dengan metode DNS. Metode DNS memiliki keunggulan dari segi pembuatan pereaksi yang mudah dan metode ini memiliki ketelitian yang tinggi dalam pengukuran sampel dalam jumlah banyak (Khaerah, 2016: 56). Pengukuran aktivitas enzim dengan metode tersebut didasari oleh jumlah gula pereduksi hasil hidrolisis selulase. Glukosa yang dihasilkan dari proses hidrolisis memiliki gugus aldehida yang dapat dioksidasi oleh asam 3,5 dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil. Reaksi antara glukosa dengan pereaksi DNS merupakan reaksi redoks. DNS bertindak sebagai senyawa oksidator yang akan tereduksi membentuk 3-amino-5-dinitrosalisilat. Reaksi tersebut berlangsung secara

bersamaan dengan proses oksidasi gugus aldehida dalam suasana basa pada suhu 90-100 °C (Pertiwi P, 2017: 25).

Suasana basa ditimbulkan dari komponen pendukung dalam pereaksi DNS, yaitu NaOH. Selain NaOH, komponen pendukung lainnya, seperti KNa-tartrat yang berfungsi menjaga kompleks warna dari DNS agar tetap stabil. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> berfungsi menghilangkan pengaruh dari oksigen terlarut terhadap glukosa yang dihasilkan (Putri, 2016: 51). Reaksi antara pereaksi DNS dengan glukosa dapat dilihat pada Gambar 4.1.



**Gambar 4.1** Reaksi asam dinitrosalisilat (DNS) dengan glukosa

Reaksi antara DNS dengan glukosa akan berlangsung terus menerus selama dalam larutan yang dianalisis masih terdapat gula pereduksi. Gula pereduksi dalam larutan ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Warna kuning yang dihasilkan dari pereaksi DNS berubah menjadi warna coklat kemerahan. Warna coklat kemerahan yang semakin pekat menandakan semakin banyak gula pereduksi yang dihasilkan. Warna tersebut berasal dari senyawa 3-amino-5-dinitrosalisilat yang merupakan senyawa aromatis. Senyawa tersebut mampu menangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nm (Azizah, 2017: 33).

Kadar gula reduksi yang dihasilkan ditentukan dengan kurva standar glukosa. Hasil pengukuran deret standar glukosa yang dibuat dengan konsentrasi 0,2 mg/mL,

0,4 mg/mL, 0,6 mg/mL, 0,8 mg/mL, dan 1 mg/mL didapatkan persamaan linear  $y = 2,4369x - 0,0294$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,9983. Nilai  $R^2$  merupakan pengaruh dari faktor pengganggu. Hasil yang didapatkan menggambarkan bahwa penggunaan metode DNS dalam penentuan gula reduksi pada larutan standar menghasilkan kurva kalibrasi yang cukup linear. Persamaan ini digunakan dalam pengukuran kadar glukosa dalam sampel (Pratiwi, dkk., 2018: 137).


### **3. Karakterisasi Enzim Selulase pada Isolat R<sub>8</sub>W**

#### **3.1 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi Suhu**

Aktivitas enzim selulase optimal pada kondisi optimum. Kondisi optimum enzim dalam membentuk kompleks enzim dengan substrat dipengaruhi oleh suhu. Suhu berpengaruh terhadap laju katalis dalam suatu reaksi enzimatik. Pada saat mencapai suhu optimum, kecepatan reaksi meningkat akibat peningkatan energi kinetik. Peningkatan energi kinetik akan memperbesar peluang terbentuknya kompleks enzim substrat (C. Putri & Wardani, 2018: 103).

Perubahan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim dan dapat menurunkan aktivitas enzim ketika melampaui batas suhu optimum. Penurunan aktivitas enzim akibat suhu di atas suhu optimum mampu merusak struktur protein dalam enzim (Asrianti, 2017: 34). Suhu optimum isolat bakteri R<sub>8</sub>W dapat dilihat pada Gambar 4.2. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W optimum pada suhu 50 °C. Enzim yang dihasilkan suatu mikroba bekerja optimum pada suhu tertentu. Enzim selulase umumnya memiliki aktivitas optimal pada rentang suhu 20-50 °C. Enzim yang bekerja pada kondisi suhu tersebut merupakan enzim golongan mesozim. Kusumaningrum, dkk., (2019: 248) menyatakan bahwa enzim yang bekerja pada rentang suhu 50-80 °C termasuk kedalam golongan termozim atau

termostabil. Berdasarkan hal tersebut enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W termasuk kedalam golongan mesozim.



**Gambar 4.2** Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Aktivitas enzim selulase optimum pada suhu 50 °C dengan aktivitas enzim sebesar 0,070 U/mL. Berdasarkan kurva di atas, aktivitas enzim meningkat seiring peningkatan suhu. Suhu dibawah kondisi optimum memiliki aktivitas selulase yang rendah yaitu pada suhu 30 °C dengan aktivitas selulase sebesar 0,050 U/mL. Hal ini sesuai dengan yang telah dilaporkan Putri (2016: 53) pada suhu rendah frekuensi tumbukan antara molekul enzim dengan substrat menjadi berkurang sehingga substrat yang dihidrolisis sedikit.

Suhu di atas kondisi optimum juga menurunkan aktivitas selulase. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan pemutusan ikatan pada struktur sekunder dan tersier enzim. Ikatan pada struktur enzim yang terputus akan menyebabkan enzim kehilangan bentuk aslinya. Suhu yang tinggi akan memutus ikatan hidrogen pada konformasi enzim. Ikatan hidrogen yang terputus akan mengakibatkan protein enzim mengalami


denaturasi (Putri, 2016: 53). Protein enzim yang mengalami denaturasi menjadikan enzim bersifat inaktif atau akan menurunkan aktivitas enzim. Penelitian ini sebanding dengan penelitian C. Putri & Wardani, (2018: 102), enzim selulase dari *Bacillus sp.* pada isolat TO4 dan TO5 optimal pada suhu 50 °C dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,597 U/mL dan 0,557 U/mL.

Penelitian lain juga menyatakan bahwa suhu optimum enzim selulase optimal pada suhu 50 °C adalah enzim selulase dari *Bacillus sp.* (Sriariyanun, dkk., 2015: 26), enzim selulase dari *Bacillus pumilus* (Bhuyan, dkk., 2018: 18), enzim selulase dari *Bacillus licheniformis* B7 (Nallusamy, dkk., 2016: 2444). Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian Putri (2016: 52), enzim selulase yang dihasilkan oleh *L. plantarum* memiliki suhu optimum sebesar 65 °C dengan aktivitas enzim sebesar 0,052 U/mL. Enzim selulase pada penelitian tersebut tergolong kedalam enzim termozim. Selain faktor suhu, aktivitas enzim selulase dalam pembentukan kompleks enzim substrat juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pH.

### **3.2 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi pH**

Enzim merupakan salah satu protein yang memiliki aktivitas biokimia. Enzim juga berperan sebagai katalis dalam suatu reaksi. Enzim selulase membutuhkan kondisi pH tertentu dalam reaksi enzimatik. Perubahan kondisi pH akan berpengaruh terhadap efektifitas sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim memegang peran penting dalam pembentukan kompleks enzim-substrat (Irawati, 2016: 44). Perubahan pH juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya aktivitas enzim. Aktivitas enzim yang tinggi ditentukan berdasarkan gugus aktif rantai samping enzim. Gugus aktif ini berfungsi sebagai sisi katalitik dalam mengikat substrat. Perubahan pH memengaruhi proses ionisasi dari gugus samping asam amino pada enzim. Enzim bekerja optimal pada kondisi tertentu yang mampu meningkatkan aktivitasnya (Marina, dkk., 2018: 146).

Pada penelitian ini pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dapat dilihat pada Gambar 4.3



**Gambar 4.3** Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase

berdasarkan kurva diatas aktivitas enzim meningkat seiring tingginya nilai pH. Aktivitas enzim selulase optimal pada pH 8 dengan nilai aktivitas enzim sebesar 0,069 U/mL dan aktivitas enzim menurun pada pH 9.

Nilai pH di atas pH optimum akan menurunkan aktivitas enzim. Hal ini dikarenakan perubahan pH yang tidak sesuai akan menyebabkan terjadinya proses denaturasi enzim (Silvera, dkk., 2015: 203). Nilai pH di atas pH optimum juga mengakibatkan konformasi enzim berubah. Perubahan ini terjadi karena terputusnya ikatan pada protein enzim yang menjaga struktur tersier (Hamzah, 2018: 20). Denaturasi enzim akan memengaruhi tinggi atau rendahnya daya katalis enzim. Enzim memiliki gugus aktif yang bermuatan negatif dan positif. Pada saat mencapai pH optimum aktivitas akan meningkat karena keseimbangan antara kedua muatan gugus aktif enzim terjadi. Muatan gugus aktif enzim pada kondisi lingkungan asam

cenderung positif dan pada lingkungan basa cenderung negatif sehingga menurunkan nilai aktivitas enzim menurun (Dini dan Munifah, 2014: 73).


Setiap enzim memiliki pH optimum untuk mencapai aktivitas maksimumnya. Sisi aktif enzim hanya aktif pada kisaran daerah pH optimum. Pada kurva di atas daerah pH optimum enzim selulase dari isolat bakteri R<sub>8</sub>W berada pada pH 7 sampai pH 9 dan optimum pada pH 8. Hal ini sejalan dengan penelitian Alam, dkk., (2013: 52), aktivitas enzim selulase dari bakteri termofilik yang diisolasi dari kompos pertanian optimal pada pH 8 dengan aktivitas enzim sebesar 1,623 U/mL. Penelitian lain yang mendapatkan pH 8 sebagai pH optimal adalah enzim selulase dari *Bacillus Circulans* dengan nilai aktivitas enzim sebesar 0,021 U/mL Irawati (2016: 45), enzim selulase isolat OS-16 dari padang pasir (Sonia dan Kusnadi, 2015: 16). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Purkan, dkk., (2015: 100), aktivitas enzim selulase yang berasal dari *Aspergillus niger* adalah pH 4, enzim selulase yang berasal dari limbah rumput laut adalah pH 5 (Dini dan Munifah, 2014: 73).

Penambahan asam atau basa akan mengakibatkan perubahan asam amino. Perubahan asam amino membuat aktivitas enzim menurun. Putri (2016: 59) menyatakan bahwa larutan enzim pada kondisi lingkungan yang asam dan lingkungan basa yang tinggi membentuk ion zwitter. Kondisi ini ditandai dengan penurunan aktivitas enzim akibat sisi aktif enzim yang akan berikatan dengan substrat tidak terbentuk.

### **3.3 Aktivitas Enzim Selulase pada Variasi Konsentrasi Substrat**

Substrat merupakan faktor penting dalam mekanisme kerja enzim. Aktivitas enzim ditentukan dari banyaknya substrat yang mampu dihidrolisis. Konsentrasi substrat yang tinggi akan meningkatkan laju katalis enzim sampai pada kecepatan maksimum. Pada saat mencapai kecepatan maksimum, konsentrasi substrat berlebih

tidak meningkatkan kecepatan reaksi. Konsentrasi substrat yang berlebih mengakibatkan sisi katalitik enzim menjadi jenuh. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sisi aktif enzim yang berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat (Oktavia, dkk., 2014: 215). Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh jumlah substrat yang seimbang. Pada penelitian ini aktivitas enzim selulase yang dipengaruhi oleh variasi konsentrasi substrat dapat dilihat pada Gambar 4.4



**Gambar 4.4** Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Kompleks enzim substrat terbentuk melalui kontak enzim dengan substrat pada sisi aktif enzim. Konsentrasi substrat yang tinggi akan meningkatkan aktivitas enzim dan akan menurun pada konsentrasi tertentu (Prastika, 2018: 51). Penurunan aktivitas enzim pada konsentrasi tertentu disebabkan oleh sisi aktif enzim telah berikatan dengan substrat. Menurut penelitian Hardi, dkk., (2017: 176), konsentrasi substrat rendah hanya membentuk kompleks enzim yang sedikit, sedangkan konsentrasi substrat yang tinggi mengakibatkan sisi aktif enzim akan berikatan lebih banyak membentuk kompleks enzim substrat.



Berdasarkan kurva di atas, aktivitas enzim meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Pada konsentrasi 0,5-2% mengalami peningkatan aktivitas enzim. Hal ini seperti yang telah dilaporkan Irawati (2016: 54), konsentrasi substrat sebanding dengan aktivitas enzim, pada konsentrasi rendah kompleks enzim substrat menghasilkan gula pereduksi yang sedikit sehingga aktivitas enzim rendah. Penambahan substrat di atas 2% menurunkan aktivitas enzim akibat tingginya jumlah glukosa yang dihasilkan. Putri (2016: 62) menyatakan bahwa tingginya jumlah produk glukosa hasil hidrolisis selulosa akan menempel pada sisi alosterik enzim dan menjadi inhibisi produk glukosa sehingga penurunan aktivitas enzim terjadi.

Aktivitas enzim selulase dari isolat R<sub>8</sub>W optimal pada konsentrasi substrat 2% dengan nilai aktivitas enzim selulase sebesar 0,063 U/mL. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Pertiwi (2017: 30) yang menyatakan bahwa aktivitas enzim selulase dari khamir *Candida utilis* optimal pada konsentrasi substrat 2% dengan nilai aktivitas enzim sebesar 0,033 U/mL. Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Putri (2016: 60), pengukuran aktivitas enzim selulase dari *Lactobacillus plantarum* pada variasi konsentrasi substrat menghasilkan aktivitas enzim yang optimal pada konsentrasi substrat 1,5% dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,060 U/mL. Penelitian lain juga mengukur pengaruh konsentrasi substrat optimum terhadap aktivitas enzim selulase dari *Bacillus Circulans*. Konsentrasi optimal diperoleh pada konsentrasi 2,5% dengan aktivitas selulasenya sebesar 0,022 U/mL. Perbedaan aktivitas enzim dari pengaruh konsentrasi substrat optimumnya disebabkan oleh perbedaan karakteristik dari enzim selulase yang dihasilkan suatu mikroorganisme (Irawati, 2016: 55).

Mikroorganisme penghasil enzim selulase adalah bakteri maupun khamir. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme memiliki aktivitas yang berbeda. Aktivitas ini

disebabkan oleh perbedaan asam amino penyusun enzim. seperti yang telah dilaporkan Sukharnikov, dkk., (2012: 41073), asam amino penyusun enzim selulase dari bakteri *Hahella chejuensis* adalah triptofan, glutamin, asam aspartat, serin, treonin, fenilalanin, lisin, tirosin, aspargin, histidin, arginin, asam glutamat sedangkan komponen penyusun asam amino selulase dari khamir *Aspergillus terreus* adalah metionin, asam glutamat, treonin, serin, glisin, fenilalanin, leusin, valin, alanin, arginin, prolin, sistein, asam aspartat, prolin, sistein, histidin, lisin, tirosin, dan triptofan (Mirzaakhmedov, dkk., 2011: 1009).

Aktivitas enzim selulase merupakan banyaknya substrat yang mampu dihidrolisis. Substrat akan berikatan pada sisi aktif enzim. Enzim menyediakan sisi yang mampu mengikat proton pada gugus amino, karboksi dan gugus fungsional lainnya (Irawati, 2016: 48). Substrat terikat pada sisi aktif enzim melalui ikatan hidrogen, interaksi hidrofob, dan interaksi kovalen. Residu pada sisi aktif enzim bertindak sebagai donor atau aseptor proton (Nauli, 2014: 95).

#### **4. Aktivitas Enzim Selulase pada Substrat Selulosa Sekam Padi**

Produksi enzim selulase membutuhkan senyawa induser berupa substrat bagi mikroorganisme. Sekam padi mengandung tiga komponen utama yaitu selulosa sebesar 32,67%, hemiselulosa sebesar 31,68% dan lignin sebesar 18,81% (Maruf dan Damajanti, 2020: 32). Kandungan lignin yang tinggi pada sekam padi menghambat proses hidrolisis substrat oleh enzim sehingga delignifikasi perlu dilakukan. Delignifikasi merupakan proses pemutusan ikatan lignin yang mengikat selulosa dan hemiselulosa.

Delignifikasi bertujuan memecah struktur lignoselulosa sehingga selulosa mudah dihidrolisis oleh enzim. Delignifikasi dapat dilakukan secara kimia menggunakan alkali atau larutan asam (Novia, dkk., 2017: 23). Sekam padi

didelignifikasi menggunakan natrium hidroksida (NaOH) 10% dan natrium hipoklorit (NaOCl) 8%, natrium hidroksida (NaOH) 10% berfungsi merusak struktur lignin dalam sekam padi.

Sekam padi yang ditambahkan NaOH pada proses pemanasan akan menghasilkan endapan yang berwarna hitam yang mengindikasikan adanya lignin pada sekam padi (Umaningrum, dkk., 2018: 30). Sisa-sisa kadar lignin pada sekam padi didelignifikasi kembali dengan menggunakan NaOCl 8%. Seperti yang telah dilaporkan Setyaningsih, dkk., (2020: 63) penggunaan NaOCl 8% pada proses *bleaching* diperoleh selulosa sekam padi berwarna putih sempurna yang menandakan tidak adanya lignin yang tertinggal pada proses delignifikasi. Rusaknya struktur lignin akan mempermudah mikroorganisme menghidrolisis substrat untuk pertumbuhan maupun produksi enzim.

Pengukuran aktivitas enzim selulase dengan menggunakan selulosa sekam padi pada pH dan suhu optimum menghasilkan aktivitas enzim sebesar 0,103 U/mL. Besarnya aktivitas enzim disebabkan oleh struktur lignin dari sekam padi telah terdelignifikasi sehingga proses hidrolisis selulosa meningkat dan kondisi yang digunakan adalah kondisi optimal hasil pengukuran dengan substrat CMC. Baharudin, (2014: 131) menyatakan bahwa semakin rendah kadar selulosa pada substrat semakin kecil kompleks enzim substrat yang terbentuk. Penggunaan selulosa sebagai substrat alami mampu meningkatkan aktivitas enzim selulase dari isolat R<sub>8</sub>W.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purkan (2015: 100), aktivitas enzim selulase dengan penambahan substrat sekam padi didapatkan aktivitas enzim sebesar 0,251 U/mL. Baharuddin (2014: 132) menyatakan bahwa aktivitas enzim selulase optimal pada penggunaan substrat dari selulosa jerami padi. Aktivitas enzimnya sebesar 0,0435 U/mL pada isolat CC4 dan 0,0245 U/mL pada isolat CC2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu optimal pada suhu 50 °C dengan aktivitas enzim sebesar 0,070 U/mL, pH 8 dengan aktivitas enzim sebesar 0,069 U/mL, dan konsentrasi substrat 2% dengan aktivitas enzim sebesar 0,063 U/mL.
2. Aktivitas enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu pada substrat selulosa sekam padi sebesar 0,103 U/mL.

#### **B. Saran**

Penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan variasi waktu inkubasi. Waktu inkubasi dilakukan untuk mencari waktu inkubasi optimum sehingga aktivitas enzim selulase meningkat. Selain itu, pengaplikasian enzim selulase isolat bakteri R<sub>8</sub>W dari larva kumbang sagu sebagai katalis dalam pembuatan bioetanol perlu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al Qarim.

- Alam, M. S., Sarjono, P. R., & Aminin, A. L. (2013). Isolasi dan Karakterisasi Selulase dari Bakteri Selulolitik Termofilik Kompos Pertanian Desa Bayat, Klaten, Jawa Tengah. In *Jurnal Sains Dan Matematika* (Vol. 21, Issue 2, pp. 48–53).
- Alrazik, M. U., Jahidin, J., & Damhuri, D. (2017). Keanekaragaman Serangga (Insecta) Subkelas Pterygota Di Hutan Nanga-Nanga Papalia. *Jurnal Ampibi*, 2(1), 1–10.
- Ariani, A., Anjani, G., Sofro, M. A. U., & Djamiatun, K. (2018). Tepung ulat sagu (*Rhyinchophorus ferrugineus*) imunomodulator Nitric Oxide (NO) sirkulasi mencit terapi antimalaria standar. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(2), 131–138. <https://doi.org/10.14710/jgi.6.2.131-138>
- Azadian, F., Badoei-dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A., Karami, Z., & Hassanshahian, M. (2017). Production and characterization of an acidothermophilic, organic solvent stable cellulase from *Bacillus sonorensis* HSC7 by conversion of lignocellulosic wastes. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 15(1), 187–196. <https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2016.12.005>
- Azizah, N. (2017). Pemurnian Enzim Selulase dari Isolat Khamir Jenis *Candida Utilis* Menggunakan Fraksinasi Amonium Sulfat. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Baharuddin, M. (2016). Cellulase Enzyme Activity of *Bacillus Circulans* from Larvae *Cossus Cossus* in Lignocellulosic Substrat. *American Journal of Biomedical and Life Sciences*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.11648/j.ajbls.20160402.13>
- Baharuddin, M., Sappewali, S., Karisma, K., & Fitriyani, J. (2016). Produksi Bioetanol dari Jerami Padi (*Oryza sativa* L.) dan Kulit Pohon Dao (*Dracontamelon*) Melalui Proses Sakarifikasi dan Fermentasi Serentak (SFS). *Chimica et Natura Acta*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/cna.v4.n1.10441>
- Baharudin, M. (2014). Aktivitas Enzim Selulase Kasar dari Isolat Bakteri Larva *Cossus cossus* dalam Hidrolisis Jerami Padi. *Jurnal Kimia VALENSI*, 4(2), 128–133. <https://doi.org/10.15408/jkv.v0i0.3610>
- Barbosa, K. L., Malta, V. R. dos S., Machado, S. S., Leal Junior, G. A., da Silva, A. P. V., Almeida, R. M. R. G., & da Luz, J. M. R. (2020). Bacterial Cellulase From The Intestinal Tract Of The Sugarcane Borer. *International Journal of Biological Macromolecules*, 161, 441–448. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.06.042>
- Behera, B. C., Sethi, B. K., Mishra, R. R., Dutta, S. K., & Thatoi, H. N. (2017). Microbial Cellulases – Diversity & Biotechnology With Reference to Mangrove Environment: A Review. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 15(1), 197–210. <https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2016.12.001>
- Bhuyan, P. M., Sandilya, S. P., Nath, P. K., Gandotra, S., Subramanian, S., Kardong, D., & Gogoi, D. K. (2018). Optimization and Characterization of Extracellular Cellulase Produced by *Bacillus Pumilus* MGB05 Isolated from Midgut of Muga Silkworm (*Antheraea Assamensis* Helfer). *Journal of Asia-Pacific Entomology*,

- 21(4), 1171–1181. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.08.004>
- C. Putri, R. A., & Wardani, A. K. (2018). Isolasi dan Karakterisasi Parsial Enzim Selulase Bakteri Selulolitik Hasil Isolasi dari Limbah Padat Tapioka (Onggok). *Agroindustrial Technology Journal*, 2(2), 98. <https://doi.org/10.21111/atj.v2i2.3133>
- Dan, P., Enzim, K., Ekstrak, S., Dari, K., Yang, B., Dari, D., Rumput, L., Cellulose, C., Crude, E., From, E., Isolated, B., & Seaweed, F. (2014). Produksi dan Karakterisasi Enzim Selulase Ekstrak Kasar dari Bakteri yang Diisolasi dari Limbah Rumput Laut. *Produksi Dan Karakterisasi Enzim Selulase Ekstrak Kasar Dari Bakteri Yang Diisolasi Dari Limbah Rumput Laut*, 6(3). <https://doi.org/10.17969/jtipi.v6i3.2315>
- Dantur, K. I., Enrique, R., Welin, B., & Castagnaro, A. P. (2015). Isolation of Cellulolytic Bacteria from The Intestine of Diatraea Saccharalis Larvae and Evaluation of Their Capacity to Degrade Sugarcane Biomass. *AMB Express*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s13568-015-0101-z>
- Dar, M. A., Pawar, K. D., Rajput, B. P., Rahi, P., & Pandit, R. S. (2019). Purification of A Cellulase from Cellulolytic Gut Bacterium, Bacillus Tequilensis G9 and Its Evaluation for Valorization of Agro-Wastes Into Added Value Byproducts. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 20(April), 101219. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101219>
- Dwismar, R., Baharuddin, M., & HS, S. (2013). Isolasi dan Uji Aktivitas Enzim Selulase dari Bakteri Symbion Larva Kupu-Kupu Family: Cossidae Terhadap Variasi Lama Inkubasi. *Al-Kimia*, 1(1), 76–85.
- Flimban, S., Oh, S. E., Joo, J. H., & Hussein, K. A. (2019). Characterization and Identification of Cellulose-Degrading Bacteria Isolated from a Microbial Fuel Cell Reactor. *Biotechnology and Bioprocess Engineering*, 24(4), 622–631. <https://doi.org/10.1007/s12257-019-0089-3>
- Gao, Z., Chu, J., Jiang, T., Xu, T., Wu, B., & He, B. (2018). Lipase immobilization On Functionalized Mesoporous Tio<sub>2</sub>: Specific Adsorption, Hyperactivation and Application in Cinnamyl Acetate Synthesis. *Process Biochemistry*, 64(September), 152–159. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2017.09.011>
- Hafid, H. S., Rahman, N. A. A., Shah, U. K. M., Baharuddin, A. S., & Ariff, A. B. (2017). Feasibility of Using Kitchen Waste As Future Substrate for Bioethanol Production: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 74(February), 671–686. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.071>
- Hamzah, H. (2018). Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Keong Sawah Pila ampullaceal Menggunakan Substrat Serbuk Gergaji Kayu. *Pharmauho: Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan*, 4(1), 16–21. <https://doi.org/10.33772/pharmauho.v4i1.4626>
- Hastuty, S. (2016). *Pengolahan Ulat Sagu (Rhynchophorus Ferruginenes) Di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*. 01(1), 12–19. [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)
- Hatefi, A., Makhdoumi, A., Asoodeh, A., & Mirshamsi, O. (2017). Characterization of A Bi-Functional Cellulase Produced by A Gut Bacterial Resident of Rosaceae Branch Borer Beetle, Osphranteria Coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae).



- International Journal of Biological Macromolecules*, 103, 158–164. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.05.042>
- Hui, Z., Yang, L., Ailing, L., & Xiaoyuan, N. (2017). 张慧<sup>1</sup> 李阳<sup>2</sup> 刘爱玲<sup>3</sup> 牛小媛<sup>2</sup>. 11(9), 1565–1568. <https://doi.org/10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2017.09.025>
- Irawati, R. (2016). Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat pada Enzim Selulase Kasar yang Diproduksi Oleh *Bacillus circulans*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kasi, P. D., & Cambaba, S. (2017). Protein Analysis of Sago Grub Based on Instar Larval Stages. *Proceedings of International Conference on Natural and Social Science, March*.
- Kuhad, R. C., Deswal, D., Sharma, S., Bhattacharya, A., Jain, K. K., Kaur, A., Pletschke, B. I., Singh, A., & Karp, M. (2016). Revisiting Cellulase Production and Redefining Current Strategies Based on Major Challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 55, 249–272. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.132>
- Kusumaningrum, A., Wayan Gunam, I. B., & Mahaputra Wijaya, I. M. (2019). Optimasi Suhu dan pH terhadap Aktivitas Enzim Endoglukanase Menggunakan Response Surface Methodology (RSM). *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(2), 243. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i02.p08>
- Manzoor, N., Cao, L., Deng, D., Liu, Z., Jiang, Y., & Liu, Y. (2018). Cellulase Extraction from Cellulolytic Bacteria Promoting Bioelectricity Production by Degrading Cellulose. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 829, 241–248. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.09.041>
- Marina, Lambui, O., & Suwastika, I. N. (2018). *Karakterisasi Selulase Asal Bakteri Tanah Danau Kalimpa ' a Sulawesi Tengah Cellulase Characterization On Soil Bacteria From Lake Kalimpa ' a Central Sulawesi*. 7(2), 138–147.
- Maruf, A., & Damajanti, N. (2020). Pengaruh Jumlah Siklum HEM (High Energy Milling) pada Karakteristik MFC (Microfibrillated Cellulose) Dari Sekam Padi. *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.30595/techno.v21i1.5387>
- Mirzaakhmedov, S. Y., Ruzmetova, D. T., Berdiev, N. S., & Salikhov, S. I. (2011). Identification of The Amino-Acid Composition of Cellulolytic Enzymes by A Phenylthiocarbamoyl Method. *Chemistry of Natural Compounds*, 46(6), 1008–1009. <https://doi.org/10.1007/s10600-011-9814-7>
- Murtiyaningsih, H., & Hazmi, M. (2017). Isolasi dan Uji Aktivitas Enzim Selulase pada Bakteri Selulolitik Asal Tanah Sampah. *Agritop*, 15(2), 293–308. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.003>
- Nababan, M., Gunam, I. B. W., & Mahaputra Wijaya, I. M. (2019). Produksi Enzim Selulase Kasar dari Bakteri Selulolitik. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, 7(2), 190. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i02.p03>
- Nallusamy, S., Amira, A. Z., Saif, A. B., Abdulkhadir, E., & Elsadig, A. E. (2016). Isolation and Characterization of Cellulolytic *Bacillus Licheniformis* from Compost. *African Journal of Biotechnology*, 15(43), 2434–2446.

<https://doi.org/10.5897/ajb2016.15641>

- Nauli, Tigor. (2014). Penentuan Sisi Aktif Selulase *Aspergillus Niger* dengan *Docking Ligan*. *JKTI*, 16(2), 94-100.
- Novia, Wijaya, D., & Yanti, P. (2017). Pengaruh Waku Delignifikasi Terhadap Lignin dan Waktu SSF terhadap Etanol Pembuatan Bioetanol dari Sekam Padi. *Teknik Kimia*, 23(1), 19–27.
- Okereke, O. E., Akanya, H. O., & Egwim, E. C. (2017). Purification and Characterization of An Acidophilic Cellulase from *Pleurotus Ostreatus* and its Potential for Agrowastes Valorization. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 12, 253–259. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2017.10.018>
- Oktavia, Y., Andhikawati, A., Nurhayati, T., & Tarman, K. (2014). Karakterisasi Enzim Kasar Selulase Kapang Endofit dari Lamun. *Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6(1), 209–218.
- Pandiarajan, J., & Revathy, K. (2020). Cellulolytic Potential of Gut Bacterial Biomass in Silkworm *Bombyx mori*. *L. Ecological Genetics and Genomics*, 14, 100045. <https://doi.org/10.1016/j.egg.2019.100045>
- Pertiwi P, N. (2017). Karakterisasi Enzim Selulase yang Dihasilkan Khamir *Candida Utilis* *Candida*. *Skripsi*.
- Prastika, E. Z. (2013). Pengaruh Konsentraasi Substrat dan Lama Waktu Inkubasi Terhadap Aktivitas Enzim Protease yang Diproduksi Oleh *Bacillus Subtilis*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pratiwi, Y. H., Ratnayani, O., & Wirajana, I. N. (2018). Perbandingan Metode Uji Gula Pereduksi dalam Penentuan Aktivitas  $\alpha$ -L-Arabinofuranosidase dengan Substrat Janur Kelapa (*Cocos Nucifera*). *Jurnal Kimia*, 134. <https://doi.org/10.24843/jchem.2018.v12.i02.p07>
- Pulungan, D. R., Wardati, -, & Fauzana, H. (2018). Pemberian Kotoran Larva Kumbang Tanduk (*Oryctes Rhinoceros*) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) Di Pembibitan Utama. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 8(2), 45–51. <https://doi.org/10.37859/jp.v8i2.734>
- Purkan, D, P. H., & S, S. (2015). Produksi Enzim Selulase dari *Aspergillus Niger* Menggunakan Sekam Padi dan Ampas Tebu sebagai Induser . Production of Cellulase Enzyme from *aspergilus niger* using Rice Husk and Bagasse as Inducer. *Jurnal Ilmu Dasar*, 16(2), 95–102.
- Rahayu, A. G., Haryani, Y., & Puspita, F. (n.d.). Uji Aktivitas Selulolitik. *Program Studi S1 Kimia Bidang Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau*, 2, 319–327.
- Setiawati, M. . et all. (2019). Peran Mikroba Dekomposer Selulolitik dari Sarang Rayap dalam Menurunkan Kandungan Selulosa Limbah Pertanian Berselulosa Tinggi. 17(2), 1–8.
- Setyaningsih, L. W. N., Mutiara, T., Hapsari, C. Y., Kusumaningtyas, N., Munandar, H., & Pranata, R. J. (2020). Karakteristik dan Aplikasi Selulosa Kulit Jagung pada Pengembangan Hidrogel. *Journal of Science and Applicative Technology*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.35472/jsat.v4i2.252>




- Setyoko, H., & Utami, B. (2016). *Seminar Nasional XIII Pendidikan Biologi FKIP UNS 863 Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase Cairan Rumen Sapi untuk Hidrolisis Biomassa Isolation and Characterization of Cellulase Enzymes Cow's Liquid Rumen for Biomass Hydrolysis*. 13(1), 863–867.
- Sheng, P., Huang, J., Zhang, Z., Wang, D., Tian, X., & Ding, J. (2016). Construction and Characterization of a Cellulolytic Consortium Enriched from The Hindgut of *Holotrichia Parallela* Larvae. *International Journal of Molecular Sciences*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/ijms17101646>
- Sholihati, A. M., Baharuddin, M., & Santi, S. (2015). Produksi dan Uji Aktivitas Enzim Selulase dari Bakteri *Bacillus subtilis*. *Al-Kimia*, 3(2), 78–90. <https://doi.org/10.24252/AL-KIMIA.V3I2.1672>
- Silvera Devi, S. A. P. (2015). Optimalisasi pH Produksi Enzim Selulase dari Bakteri Endofitik *Pseudomonas stutzeri* LBKURCC45, *Pseudomonas cepacia* LBKURCC48 dan *Pseudomonas stutzeri* LBKURCC59. *JOM FMIPA Unri*, 2(1), 199–204.
- Singh, S., Jaiswal, D. K., Sivakumar, N., & Verma, J. P. (2019). Developing efficient Thermophilic Cellulose Degrading Consortium for Glucose Production from Different Agro-Residues. *Frontiers in Energy Research*, 7(JUL). <https://doi.org/10.3389/fenrg.2019.00061>
- Skowronek, M., Sajnaga, E., Pleszczyńska, M., Kazimierczak, W., Lis, M., & Wiater, A. (2020). Bacteria from The Midgut of Common Cockchafer (*Melolontha melolontha* L.) larvae Exhibiting Antagonistic Activity Against Bacterial Symbionts of Entomopathogenic Nematodes: Isolation and Molecular Identification. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(2). <https://doi.org/10.3390/ijms21020580>
- Subhedhar, P. B., Ray, P., & Gogate, P. R. (2018). Intensification of Delignification and Subsequent Hydrolysis for The Fermentable Sugar Production from Lignocellulosic Biomass Using Ultrasonic Irradiation. *Ultrasonics Sonochemistry*, 40, 140–150. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.01.030>
- Sui, Y., Cui, Y., Xia, G., Peng, X., Yuan, G., & Sun, G. (2019). A facile Route to Preparation of Immobilized Cellulase on Polyurea Microspheres for Improving Catalytic Activity and Stability. *Process Biochemistry*, 87(September), 73–82. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.09.002>
- Sukharnikov, L. O., Alahuhta, M., Brunecky, R., Upadhyay, A., Himmel, M. E., Lunin, V. V., & Zhulin, I. B. (2012). Sequence, Structure, and Evolution of Cellulases in Glycoside Hydrolase Family 48. *Journal of Biological Chemistry*, 287(49), 41068–41077. <https://doi.org/10.1074/jbc.M112.405720>
- Supriyatna, A., & Article, H. (2016). *Biosaintifika*. 8(3), 314–320. <https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v8i3.6762>
- Thomas, L., Ram, H., & Singh, V. P. (2018). Inducible Cellulase Production from An Organic Solvent Tolerant *Bacillus* sp. SV1 and Evolutionary Divergence of Endoglucanase in Different Species of The Genus *Bacillus*. *Brazilian Journal of Microbiology*, 49(2), 429–442. <https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.05.010>
- Umaningrum, D., Nurmasari, R., Astuti, M. D., & Mulyasuryani, A. (n.d.). *Menggunakan Variasi Konsentrasi Basa Isolation of Celluloce from Rice Straw*

*Using Base Concentration Isolasi Selulosa dari Jerami Padi Menggunakan Variasi Konsentrasi ... (Dewi Umaningrum, dkk.). 12(1), 25–33.*

- Vita. (2017). Etnobotani Sagu (Metroxylan Sagu) di Lahan Basah Warisan Budaya Sriwijaya. *Kalpataru*, 26(2), 107–122.
- Wahyuni, S. (2018). *Isolasi dan Karakteristik Bakteri Selulolitik Berbasis Limbah Jagung Sebagai Bioaktivator Pakan Berserat*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/10103>
- Wahyuningsih, W (2020) Isolasi dan Identifikasi Mikroba Penghasil Selulase dari Larva Kumbang Sagu. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Xu, D., Ding, Z., Bai, J., Ke, W., Zhang, Y., Li, F., & Guo, X. (2020). Evaluation of The Effect of feruloyl Esterase-Producing *Lactobacillus Plantarum* and Cellulase Pretreatments on Lignocellulosic Degradation and Cellulose Conversion of Co-ensiled Corn Stalk and Potato Pulp. *Bioresource Technology*, 310(222), 123476. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123476>
- Xue, D., Lin, D., Gong, C., Peng, C., & Yao, S. (2017). Expression of A Bifunctional Cellulase with Exoglucanase and Endoglucanase Activities to Enhance The Hydrolysis Ability of Cellulase from A Marine *Aspergillus niger*. *Process Biochemistry*, 52, 115–122. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2016.09.030>

**LAMPIRAN 1**  
**SKEMA PENELITIAN**



**LAMPIRAN 2**  
**PROSEDUR KERJA PENELITIAN**

**1. Pembuatan Media**

**b. Pembuatan Media Inokulum**

0,05 gram  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 0,02 gram  $\text{MgSO}_4$ , 0,7 gram  $\text{KNO}_3$ , 2,5 gram nutrien broth, 0,2 gram ekstrak ragi dan 1 gram CMC

- Dilarutkan dengan akuades 100 mL.
- Dipanaskan dan diaduk hingga larut.
- Ditungkup dengan kapas sumbat.
- Disterilisasi pada  $T = 121\text{ }^\circ\text{C}$  ( $P = 1\text{ atm}$ ) selama 15 menit.
- Didinginkan pada suhu ruang.

Media Inokulum


**c. Pembuatan Media Produksi**

5 gram CMC, 0,1 gram  $\text{MgSO}_4$ , 3,5 gram  $\text{KNO}_3$ , 0,25 gram  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 12,5 gram nutrien broth dan 1 gram ekstrak ragi.

- Dilarutkan dengan akuades 500 mL.
- Dipanaskan dan diaduk hingga larut.
- Ditungkup dengan kapas sumbat.
- Disterilisasi pada  $T = 121\text{ }^\circ\text{C}$  ( $P = 1\text{ atm}$ ) selama 15 menit.
- Didinginkan pada suhu ruang.


Media Produksi



## 2. Produksi Enzim dari Isolat Bakteri R<sub>8</sub>W dari Larva Kumbang Sagu



## 4. Persiapan Reagen dan Larutan Standar Glukosa

### a. Pembuatan Pereaksi DNS



**b. Pembuatan Larutan Buffer Asetat pH 5****c. Pembuatan Larutan Buffer Fosfat****1) Buffer Fosfat pH 6**

## 2) Buffer Fosfat pH 7

1,7799 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  (Larutan A) dan 1,5601 g  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  (Larutan B)

— Dihimpitkan dengan *waterone* sampai volume akhir 100 mL

Larutan Buffer Fosfat

— Dipipet 61,1 mL larutan A

— Dipipet 38,9 mL larutan B

— Dihomogenkan

Larutan Buffer Fosfat pH 7

## 3) Buffer Fosfat pH 8

1,7799 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  (Larutan A) dan 1,5601 g  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  (Larutan B)

— Dihimpitkan dengan *waterone* sampai volume akhir 100 mL



Larutan Buffer Fosfat

— Dipipet 94,7 mL larutan A

— Dipipet 5,3 mL larutan B

— Dihomogenkan


Larutan Buffer Fosfat pH 8

**d. Pembuatan Larutan Buffer Tris-HCl****e. Pembuatan Larutan Standar Glukosa**



## 5. Karakterisasi Enzim Selulase

### a. Penentuan Suhu Optimum



**b. Penentuan pH Optimum**

2 mL CMC 1%

- Dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi.
- Ditambahkan 2 mL buffer asetat pH 5, buffer fosfat pH 6, 7, dan 8 serta buffer Tris-HCl pH 9.
- Ditambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim selulase.
- Diinkubasi pada  $T = 37^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit.
- Ditambahkan 2 mL pereaksi DNS.
- Dipanaskan campuran dalam tabung reaksi selama 10 menit pada penangas air mendidih dan didinginkan dalam air es selama 10 menit
- Diukur pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm.

Hasil

**c. Penentuan Konsentrasi Substrat Optimum**


2 mL CMC dengan Variasi Konsentrasi  
0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%

- Ditambahkan 2 mL ekstrak kasar enzim dan 2 mL larutan buffer pH 7.
- Diinkubasi pada  $T = 37^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit.
- Ditambahkan 2 mL pereaksi DNS.
- Dipanaskan campuran dalam tabung reaksi selama 10 menit pada penangas air mendidih dan didinginkan dalam air es selama 10 menit
- Diukur pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm.


Hasil

## 6. Aktivitas Enzim Selulase dalam Substrat Alami

### 1. Isolasi Selulosa Sekam Padi



## 2. Aktivitas Enzim Pada Selulosa Sekam Padi



### LAMPIRAN 3: PEMBUATAN KURVA STANDAR GLUKOSA

#### 1. Pembuatan Larutan Standar Glukosa

Larutan induk glukosa konsentrasi 1 mg/mL dibuat dalam 25 mL dibutuhkan 0,025 gram glukosa p.a kemudian dilarutkan dengan *waterone* sebanyak 25 mL. Cara pembuatan larutan induk glukosa adalah

$$\frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ mL}} = \frac{10 \text{ mg}}{10 \text{ mL}} = \frac{25 \text{ mg}}{25 \text{ mL}} = \frac{0,025 \text{ g}}{25 \text{ mL}}$$

Larutan induk glukosa konsentrasi 1 mg/mL diencerkan dengan variasi konsentrasi (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1) mg/mL dalam 5 mL sesuai dengan rumus perhitungan pengenceran sebagai berikut dibawah ini:

a. Konsentrasi 0,2 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 M_1 &= V_2 M_2 \\ V_1 \cdot 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,1 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 1 \text{ mL larutan induk glukosa} + 4 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

b. Konsentrasi 0,4 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 M_1 &= V_2 M_2 \\ V_1 \cdot 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,4 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 2 \text{ mL larutan induk glukosa} + 3 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 0,6 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 M_1 &= V_2 M_2 \\ V_1 \cdot 1 \text{ mg/mL} &= 5 \text{ mL} \cdot 0,6 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= 3 \text{ mL larutan induk glukosa} + 2 \text{ mL } \textit{water one} \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 0,8 mg/mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$


$$V_1 \cdot 1 \text{ mg/mL} = 5 \text{ mL} \cdot 0,8 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = 4 \text{ mL larutan induk glukosa} + 1 \text{ mL water one}$$

## 2. Data Absorbansi Larutan Standar Glukosa

Konsentrasi Larutan Standar (mg/mL)	Absorbansi $\lambda=540 \text{ nm}$
0,0	0
0,2	0,393
0,4	0,988
0,6	1,429
0,8	1,912
1	2,412

## 3. Kurva Standar Glukosa



**LAMPIRAN 4: PENENTUAN KADAR GLUKOSA EKSTRAK KASAR ENZIM SELULASE PADA VARIASI SUHU**

**Data Absorbansi Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Variasi Suhu**

Suhu (°C)	Ulangan	Absorbansi
30	1	0.282
	2	0.294
	3	0.314
40	1	0.318
	2	0.333
	3	0.315
50	1	0.439
	2	0.418
	3	0.440
60	1	0.395
	2	0.432
	3	0.440
70	1	0.354
	2	0.386
	3	0.332

**Konsentrasi Glukosa Ekstrak Kasar Enzim Selulase**

$$y = 2,4369x - 0,0294$$

$$x = \frac{y + 0,0294}{2,4368}$$

keterangan:

y = Absorbansi

x = Konsentrasi Glukosa (mg/mL)

1) Konsentrasi glukosa pada suhu 30 °C

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,282+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,3114}{2,4369} \\
 &= 0,1277 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

2) Konsentrasi glukosa pada suhu 40 °C

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,318+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,3474}{2,4369} \\
 &= 0,1425 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

3) Konsentrasi glukosa pada suhu 50 °C

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,439+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,4684}{2,4369} \\
 &= 0,1922 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$



4) Konsentrasi glukosa pada suhu 60 °C

$$\begin{aligned}[\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,395+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,4244}{2,4369} \\ &= 0,1741 \text{ mg/mL}\end{aligned}$$

5) Konsentrasi glukosa pada suhu 70 °C

$$\begin{aligned}[\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,354+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,3834}{2,4369} \\ &= 0,1573 \text{ mg/mL}\end{aligned}$$

**LAMPIRAN 5: PENENTUAN KADAR GLUKOSA EKSTRAK KASAR  
ENZIM SELULASE PADA VARIASI pH**

**Data Absorbansi Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Variasi pH**

pH	Ulangan	Absorbansi
5	1	0.144
	2	0.144
	3	0.145
6	1	0.226
	2	0.234
	3	0.367
7	1	0.278
	2	0.282
	3	0.295
8	1	0.424
	2	0.467
	3	0.387
9	1	0.412
	2	0.416
	3	0.326

1) Konsentrasi glukosa pada pH 5

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,144+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,1734}{2,4369} \\
 &= 0,0711 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

2) Konsentrasi glukosa pada pH 6

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,226+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,2554}{2,4369} \\
 &= 0,1048 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

3) Konsentrasi glukosa pada suhu pH 7

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,278+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,3074}{2,4369} \\
 &= 0,1261 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

4) Konsentrasi glukosa pada suhu pH 8

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,424+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,4534}{2,4369} \\
 &= 0,1860 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

5) Konsentrasi glukosa pada pH 9

$$\begin{aligned}[\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,412+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,4414}{2,4369} \\ &= 0,1811 \text{ mg/mL}\end{aligned}$$



**LAMPIRAN 6: PENENTUAN KADAR GLUKOSA EKSTRAK KASAR  
ENZIM SELULASE PADA VARIASI KONSENTRASI SUBSTRAT**

**Data Absorbansi Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Variasi  
Konsentrasi Substrat**

Konsentrasi Substrat (%)	Ulangan	Absorbansi
0	1	0.198
	2	0.199
	3	0.182
0,5	1	0.226
	2	0.227
	3	0.225
1,5	1	0.276
	2	0.281
	3	0.303
2	1	0.360
	2	0.381
	3	0.422
2,5	1	0.390
	2	0.384
	3	0.310

1) Konsentrasi glukosa pada konsentrasi substrat 0,5%

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,198+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,2274}{2,4369}
 \end{aligned}$$

$$= 0,0933 \text{ mg/mL}$$

2) Konsentrasi glukosa pada konsentrasi substrat 1 %

$$[\text{glukosa}] = \frac{y+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,226+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,2554}{2,4369}$$

$$= 0,1048 \text{ mg/mL}$$

3) Konsentrasi glukosa pada konsentrasi substrat 1,5 %

$$[\text{glukosa}] = \frac{y+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,276+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,3054}{2,4369}$$

$$= 0,1253 \text{ mg/mL}$$

4) Konsentrasi glukosa pada konsentrasi substrat 2 %

$$[\text{glukosa}] = \frac{y+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,360+0,0294}{2,4369}$$

$$= \frac{0,3894}{2,4369}$$

$$= 0,1597 \text{ mg/mL}$$

5) Konsentrasi glukosa pada konsentrasi substrat 2,5 %

$$\begin{aligned}[\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,390+0,0294}{2,4369} \\ &= \frac{0,4194}{2,4369} \\ &= 0,1721 \text{ mg/mL}\end{aligned}$$



**LAMPIRAN 7: PENENTUAN KADAR GLUKOSA EKSTRAK KASAR ENZIM SELULASE PADA SUBSTRAT SELULOSA SEKAM PADI**

**Data Absorbansi Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Substrat Selulosa Sekam Padi**

Selulosa sekam padi (%)	Ulangan	Absorbansi
	1	0.671
2	2	0.657
	3	0.641

1) Konsentrasi glukosa pada selulosa sekam padi konsentrasi 2 %

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{y+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,671+0,0294}{2,4369} \\
 &= \frac{0,7004}{2,4369} \\
 &= 0,287 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$



### LAMPIRAN 8: PENENTUAN AKTIVITAS ENZIM SELULASE

$$AE = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol}$$

Keterangan:

AE = aktivitas Enzim (U/mL)

Mr glukosa = 180 mg/mmol

VE = volume Enzim (mL)

VS = volume substrat (mL)

t = waktu inkubasi (Menit)

#### 1. Aktivitas enzim selulase pada variasi suhu

Suhu (°C)	Ulangan	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas Enzim (U/mL)	Rata-rata Aktivitas Enzim (U/mL)
30	1	0.282	0.127	0.047	0.050
	2	0.294	0.132	0.049	
	3	0.314	0.140	0.055	
40	1	0.318	0.142	0.053	0.053
	2	0.333	0.148	0.056	
	3	0.315	0.141	0.052	
50	1	0.439	0.192	0.071	0.070
	2	0.418	0.183	0.067	
	3	0.440	0.193	0.072	
60	1	0.395	0.174	0.064	0.068
	2	0.432	0.189	0.070	
	3	0.440	0.193	0.072	
70	1	0.354	0.157	0.058	0.058
	2	0.386	0.170	0.063	
	3	0.332	0.148	0.054	

1) Aktivitas enzim selulase pada suhu 30 °C

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1277}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{127,7 \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,047 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

2) Aktivitas enzim selulase pada suhu 40 °C

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1425}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{142,5 \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,052 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

3) Aktivitas enzim selulase pada suhu 50 °C

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1922}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{192,2 \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,071 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

4) Aktivitas enzim selulase pada suhu 60 °C

$$\text{AE} = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,1741}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{174,1 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,064 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

5) Aktivitas enzim selulase pada suhu 70 °C

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1573}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{157,3 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,058 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

## 2. Aktivitas enzim selulase pada variasi pH

pH	Ulangan	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas Enzim (U/mL)	Rata-rata Aktivitas Enzim (U/mL)
5	1	0.144	0.071	0.026	0.026
	2	0.144	0.071	0.026	
	3	0.145	0.072	0.027	
6	1	0.226	0.104	0.038	0.042
	2	0.234	0.108	0.040	
	3	0.367	0.133	0.049	
7	1	0.278	0.126	0.046	0.047
	2	0.282	0.127	0.047	
	3	0.295	0.133	0.049	
8	1	0.424	0.186	0.068	0.069
	2	0.467	0.203	0.075	
	3	0.387	0.171	0.064	
9	1	0.412	0.181	0.067	0.063
	2	0.416	0.183	0.068	
	3	0.326	0.145	0.054	

### 1) Aktivitas enzim selulase pada pH 5

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{0,0711}{180 \text{ mg}/\text{mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{71,1 \mu\text{mol}/\text{mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,026 \text{ U}/\text{mL}
 \end{aligned}$$

### 2) Aktivitas enzim selulase pada pH 6

$$\text{AE} = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,1048}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{104,8 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,038 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

3) Aktivitas enzim selulase pada pH 7

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1261}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{126,1 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,046 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

4) Aktivitas enzim selulase pada pH 8

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1860}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{186 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,068 \text{ U/mL}
 \end{aligned}$$

5) Aktivitas enzim selulase pada pH 9

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\
 &= \frac{0,1811}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{181,1 \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}}$$

$$= 0,067 \text{ U/mL}$$

### 3. Aktivitas enzim selulase pada variasi konsentrasi substrat

Konsentrasi Substrat (%)	Ulangan	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas Enzim (U/mL)	Rata-rata Aktivitas Enzim (U/mL)
0.5	1	0.198	0.093	0.034	0.034
	2	0.199	0.094	0.035	
	3	0.182	0.086	0.032	
1	1	0.226	0.104	0.038	0.039
	2	0.227	0.105	0.039	
	3	0.225	0.104	0.039	
1.5	1	0.276	0.125	0.046	0.048
	2	0.281	0.127	0.047	
	3	0.303	0.136	0.050	
2	1	0.360	0.159	0.059	0.063
	2	0.381	0.168	0.062	
	3	0.422	0.185	0.068	
2.5	1	0.390	0.172	0.063	0.059
	2	0.384	0.169	0.062	
	3	0.310	0.139	0.051	

#### 1) Aktivitas enzim selulase pada konsentrasi substrat 0,5%

$$AE = \frac{[\text{glukosa}]}{Mr \text{ glukosa}} \times \frac{F_p}{VE} \times \frac{VS}{t} \times 1000 \mu\text{mol/mmol}$$

$$= \frac{0,0933}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol/mmol}$$

$$= \frac{93,3 \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}}$$

$$= 0,034 \text{ U/mL}$$

2) Aktivitas enzim selulase pada konsentrasi substrat 1%

$$\begin{aligned} \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{0,1048}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{104,8 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\ &= 0,038 \text{ U/mL} \end{aligned}$$

3) Aktivitas enzim selulase pada konsentrasi substrat 1,5%

$$\begin{aligned} \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{0,1253}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{125,3 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\ &= 0,048 \text{ U/mL} \end{aligned}$$

4) Aktivitas enzim selulase pada konsentrasi substrat 2%

$$\begin{aligned} \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{V_E} \times \frac{V_S}{t} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{0,1597}{180 \text{ mg/mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \text{ } \mu\text{mol/mmol} \\ &= \frac{159,7 \text{ } \mu\text{mol/mL}}{2700 \text{ menit}} \\ &= 0,059 \text{ U/mL} \end{aligned}$$

5) Aktivitas enzim selulase pada konsentrasi substrat 2,5%

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{\text{VE}} \times \frac{\text{VS}}{t} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{0,1721}{180 \text{ mg}/\text{mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{172,1 \mu\text{mol}/\text{mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,063 \text{ U}/\text{mL}
 \end{aligned}$$

#### 4. Aktivitas enzim selulase pada selulosa sekam padi

Substrat	Ulangan	Absorbansi	Konsentrasi glukosa (mg/mL)	Aktivitas Enzim (U/mL)	Rata-rata Aktivitas Enzim (U/mL)
Selulosa sekam padi (50 °C, pH 8, 2%)	1	0.671	0.287	0.106	0.103
	2	0.657	0.275	0.102	
	3	0.641	0.273	0.101	

1) Aktivitas enzim selulase pada substrat selulosa sekam padi

$$\begin{aligned}
 \text{AE} &= \frac{[\text{glukosa}]}{\text{Mr glukosa}} \times \frac{F_p}{\text{VE}} \times \frac{\text{VS}}{t} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{0,287}{180 \text{ mg}/\text{mmol}} \times \frac{1}{2 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{15 \text{ menit}} \times 1000 \mu\text{mol}/\text{mmol} \\
 &= \frac{287 \mu\text{mol}/\text{mL}}{2700 \text{ menit}} \\
 &= 0,106 \text{ U}/\text{mL}
 \end{aligned}$$



## LAMPIRAN 9: PERHITUNGAN STANDAR DEVIASI SAMPEL

### 1. STANDAR DEVIASI SAMPEL PADA VARIASI SUHU

$$\text{Suhu } 30\text{ }^{\circ}\text{C} = \bar{x} = \frac{0,047 + 0,049 + 0,055}{3} = 0,050$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,047 - 0,050)^2 + (0,049 - 0,050)^2 + (0,055 - 0,050)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,000009 + 0,000001 + 0,000025}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000175} = 0,004 \end{aligned}$$

$$\text{Suhu } 40\text{ }^{\circ}\text{C} = \bar{x} = \frac{0,053 + 0,056 + 0,052}{3} = 0,053$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,053 - 0,053)^2 + (0,056 - 0,053)^2 + (0,052 - 0,053)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0 + 0,000009 + 0,000001}{2}} \\ &= \sqrt{0,000005} = 0,002 \end{aligned}$$

$$\text{Suhu } 50\text{ }^{\circ}\text{C} = \bar{x} = \frac{0,071 + 0,067 + 0,072}{3} = 0,070$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{(0,071 - 0,070)^2 + (0,067 - 0,070)^2 + (0,072 - 0,070)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,000001 + 0,000009 + 0,000004}{2}} \\
 &= \sqrt{0,000007} = 0,002
 \end{aligned}$$

$$\text{Suhu } 60^\circ\text{C} = \bar{x} = \frac{0,064 + 0,070 + 0,071}{3} = 0,068$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,064 - 0,068)^2 + (0,070 - 0,068)^2 + (0,071 - 0,068)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,000016 + 0,000004 + 0,000009}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0000145} = 0,003
 \end{aligned}$$

$$\text{Suhu } 70^\circ\text{C} = \bar{x} = \frac{0,058 + 0,063 + 0,054}{3} = 0,058$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,058 - 0,058)^2 + (0,063 - 0,058)^2 + (0,054 - 0,058)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0 + 0,000025 + 0,000016}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0000205} = 0,004
 \end{aligned}$$

## 2. STANDAR DEVIASI SAMPEL PADA VARIASI pH

$$\text{pH 5} \quad = \bar{x} = \frac{0,026 + 0,026 + 0,027}{3} = 0,026$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,026 - 0,026)^2 + (0,026 - 0,026)^2 + (0,027 - 0,026)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0 + 0 + 0,000001}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000005} = 0,001 \end{aligned}$$

$$\text{pH 6} \quad = \bar{x} = \frac{0,038 + 0,040 + 0,049}{3} = 0,042$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,038 - 0,042)^2 + (0,040 - 0,042)^2 + (0,049 - 0,042)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,000016 + 0,000004 + 0,000049}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000345} = 0,005 \end{aligned}$$

$$\text{pH 7} \quad = \bar{x} = \frac{0,046 + 0,047 + 0,049}{3} = 0,047$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(0,046 - 0,047)^2 + (0,047 - 0,047)^2 + (0,049 - 0,047)^2}{3 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,000001 + 0 + 0,000004}{2}}$$

$$= \sqrt{0,0000025} = 0,001$$

pH 8  $= \bar{x} = \frac{0,068 + 0,075 + 0,063}{3} = 0,069$

S  $= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$

$$= \sqrt{\frac{(0,068 - 0,069)^2 + (0,075 - 0,069)^2 + (0,063 - 0,069)^2}{3 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,000001 + 0,000036 + 0,000036}{2}}$$

$$= \sqrt{0,0000365} = 0,005$$

pH 9  $= \bar{x} = \frac{0,067 + 0,068 + 0,054}{3} = 0,062$

S  $= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$

$$= \sqrt{\frac{(0,067 - 0,062)^2 + (0,068 - 0,062)^2 + (0,054 - 0,062)^2}{3 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,000025 + 0,000036 + 0,000064}{2}}$$

$$= \sqrt{0,0000625} = 0,007$$

### 3. STANDAR DEVIASI SAMPEL PADA VARIASI KONSENTRASI SUBSTRAT

Konsentrasi Substrat 0,5%

$$\bar{x} = \frac{0,034 + 0,035 + 0,032}{3} = 0,034$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,034 - 0,034)^2 + (0,035 - 0,034)^2 + (0,032 - 0,034)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0 + 0,000001 + 0,000004}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000025} = 0,001 \end{aligned}$$

Konsentrasi Substrat 1%

$$\bar{x} = \frac{0,038 + 0,039 + 0,039}{3} = 0,039$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,038 - 0,039)^2 + (0,039 - 0,039)^2 + (0,039 - 0,039)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,000001 + 0 + 0}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000005} = 0,001 \end{aligned}$$

Konsentrasi Substrat 1,5%

$$\bar{x} = \frac{0,046 + 0,047 + 0,050}{3} = 0,048$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,046 - 0,048)^2 + (0,047 - 0,048)^2 + (0,050 - 0,048)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,000004 + 0,000001 + 0,000004}{2}} \\ &= \sqrt{0,0000045} = 0,002 \end{aligned}$$

Konsentrasi Substrat 2%

$$\bar{x} = \frac{0,059 + 0,062 + 0,068}{3} = 0,063$$

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0,059 - 0,063)^2 + (0,062 - 0,063)^2 + (0,068 - 0,063)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0,000016 + 0,000001 + 0,000025}{2}} \\ &= \sqrt{0,000021} = 0,004 \end{aligned}$$

Konsentrasi Substrat 2,5%

$$\bar{x} = \frac{0,063 + 0,062 + 0,051}{3} = 0,059$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,063 - 0,059)^2 + (0,062 - 0,059)^2 + (0,051 - 0,059)^2}{3-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,000016 + 0,000009 + 0,000064}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0000445} = 0,006
 \end{aligned}$$

#### 4. STANDAR DEVIASI SAMPEL PADA SELULOSA SEKAM PADI

Selulosa Sekam Padi

$$\bar{x} = \frac{0,106 + 0,102 + 0,101}{3} = 0,103$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,106 - 0,103)^2 + (0,102 - 0,103)^2 + (0,101 - 0,103)^2}{3-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,000009 + 0,000001 + 0,000004}{2}} \\
 &= \sqrt{0,000007} = 0,002
 \end{aligned}$$

## LAMPIRAN 10: DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. PEMBUATAN MEDIA INOKULUM




Ditimbang komponen  
Media inokulum



Dilarutkan media dengan  
aquades panas




Disterilkan media dengan  
autoklaf





## 2. PEMBUATAN MEDIA PRODUKSI



Ditimbang komponen  
Media produksi



Dipanaskan aquades



Dilarutkan media dengan  
aquades panas



Disterilkan media dengan  
autoklaf

### 3. PRODUKSI ENZIM SELULASE



Diambil 5 ose isolat terpilih



Diinokulasikan ke dalam media inokulum



Dishaker dan diinkubasi selama 24 jam



Media inokulum setelah inkubasi 24 jam



Diinokulasikan 75 mL ke dalam media produksi



Dishaker dan diinkubasi selama 48 jam



Media produksi setelah diinkubasi selama 48 jam



Disentrifugasi media produksi selama 10 menit





Ekstrak kasar enzim selulase

#### 4. PEMBUATAN PEREAKSI DNS



Ditimbang komponen pereaksi DNS



Dilarutkan dengan NaOH + waterone





Dihimpitkan sampai 100 mL



Dimasukkan ke dalam botol coklat

## 5. PEMBUATAN LARUTAN BUFFER



Dicampurkan larutan A dan B



Larutan buffer fosfat yang telah Diuji dengan kertas pH



Dicampurkan larutan A dan B



Larutan buffer asetat yang telah Diuji dengan kertas pH



Dicampurkan larutan A dan B



Larutan buffer Tris-HCl yang telah diuji dengan kertas pH

## 6. PEMBUATAN STANDAR GLUKOSA




Deret standar glukosa



Diinkubasi selama 15 menit



Ditambahkan pereaksi DNS



Dihomogenkan selama 20 detik





Deret standar glukosa sebelum pemanasan



Dipanaskan selama 10 menit



Deret standar glukosa setelah pemanasan



Diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm



## 7. AKTIVITAS ENZIM SELULASE PADA VARIASI SUHU



2 mL CMC 1% + 2 mL buffer pH 7  
+ 2 mL ekstrak kasar selulase + 2 mL  
Pereaksi DNS



Sampel sebelum dipanaskan



Sampel setelah dipanaskan



Diukur dengan spektrofotometer  
UV-Vis pada panjang gelombang  
540 nm

## 8. AKTIVITAS ENZIM SELULASE PADA VARIASI pH



2 mL CMC 1% + 2 mL variasi buffer  
+ 2 mL ekstrak kasar selulase + 2 mL  
Pereaksi DNS



Sampel sebelum dipanaskan



Sampel setelah dipanaskan



Diukur dengan spektrofotometer  
UV-Vis pada panjang gelombang  
540 nm


## 9. AKTIVITAS ENZIM SELULASE PADA VARIASI KONSENTRASI SUBSTRAT



2 mL CMC 1% + 2 mL variasi buffer  
+ 2 mL ekstrak kasar selulase + 2 mL  
Pereaksi DNS



Sampel sebelum dipanaskan




Sampel setelah dipanaskan



Diukur dengan spektrofotometer  
UV-Vis pada panjang gelombang  
540 nm



## 10. ISOLASI SELULOSA DARI SEKAM PADI



Didelignifikasi dengan NaOH 10% selama 90 menit pada suhu 55 °C dan direndam dengan NaOCl 8% selama 1 jam .



Dipisahkan filtrat dan residu dengan kertas saring



Dinetralkan residu yang telah disaring



Dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 °C

## 11. AKTIVITAS ENZIM PADA SELULOSA SEKAM PADI



3 mL campuran substrat dan enzim  
+ 3 mL pereaksi DNS



Sampel sebelum dipanaskan



Sampel setelah dipanaskan



Diukur dengan spektrofotometer  
UV-Vis pada panjang gelombang  
540 nm

## RIWAYAT HIDUP



Tendri Abeng lahir di Pertasi Kencana pada tanggal 25 Oktober 1998. Penulis akrab disapa Tenten. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan H.Ambo Tang dan Hj.Dubeng. Pada tahun 2005 penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Kalaena dan pada tahun 2011 melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Kalaena dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kalaena yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 9 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis telah menyelesaikan studinya dan menyanggah gelar sarjana sains (S.Si) pada tanggal 09 Agustus 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R