

**IDENTIFIKASI CENDAWAN MIKORIZA ARBUSKULA  
(CMA) PADA PERAKARAN KELAPA SAWIT  
(*Elaeis guineensis*) DI DESA BUKIT HARAPAN  
KECAMATAN BULUTABA KABUPATEN  
PASANGKAYU**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**Putri Nuragam Muliani**  
NIM. 60300115028

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
2021

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nuragam Muliani  
NIM : 60300115028  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 28 Mei 1997  
Jur/Prodi : Biologi/S1  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Judul : Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Perakaran Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Maret 2021

Penyusun,

Putri Nuragam Muliani  
NIM: 60300115028

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada  
Perakaran Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Desa  
Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu

Nama Mahasiswa : Putri Nuragam Muliani


NIM : 60300115028

Jurusan : Biologi

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui komisi pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si.

Pembimbing II



Hasyimuddin, S.Si., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Biologi



Dr. Muhammad Halifah, M.Pd  
NIP. 197404122000031001



Dr. Masriany, S.Si., M.Si  
NIP. 19810707200642002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Perakaran Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu", yang disusun oleh Putri Nuragam Muliani, NIM: 60300115028, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Kamis, 25 Februari 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 25 Maret 2021  
11 Sya'ban 1442 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah M., M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Hajrah, S.Si. M.Sc.	(.....)
Munaqisy I	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag. M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Halifah, M.Pd  
NIM 197104121000031001

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji atas kehadiran Allah swt. dan shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah saw. yang senantiasa memberi inspirasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Perakaran Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Duani dan ibunda Mantasiah yang senantiasa mendoakan, mendidik, menyemangati, memberi nasehat, kepercayaan, materi dan merawat penulis sejak kecil sampai sekarang.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang berjasa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin serta jajarannya.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi serta jajarannya.

4. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si. sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. Bapak Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag.,M.Hum selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran serta masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
8. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik atas saran, dukungan, bimbingan dan arahan-arahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis selama perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sumiati, S.Pd. staf jurusan biologi yang telah banyak membantu terutama dalam hal persuratan.
10. Seluruh dosen jurusan Biologi yang telah banyak mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
11. Seluruh staf akademik dan karyawan dalam Lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Dr. Retno Prayudyaningsih M.Sc. dan Kak A. Sri Rahma Dania S.Si. yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi BP2LKH.

13. Teman-teman yang benar-benar memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian studi (Sri Alfiah, Marni, Hamina, Irmadamayanti, Irmawati, Ayu Lestrianni, Irmawati B.) atas motivasi, saran dan dukungannya selama penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi.
14. Tim PKL (Fatimah Mansir dan Fachrunnisa) yang selalu memberikan masukan serta motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi.
15. Teman-teman angkatan saya IMPULS yang sangat membantu selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi .
16. Teman KKNku di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atas motivasi dan dukungannya.
17. Kakak-kakak Kwaci (Kak Muth, kak Iffah, Kak Mardiah, Kak Hikmah, Kak Hijrah, Kak Dhila dan Kak Izzah) atas dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis hanya berdoa kepada Allah swt. agar rahmat dan hidayah-Nya senantiasa terlimpah kepada seluruh pihak. Akhirnya hanya kepada-Nya penulis bertawakkal dan mengucapkan banyak syukur semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya robbal 'alamin.

Gowa, 25 Maret 2021

Penyusun

Putri Nuragam Muliani  
NIM: 60300115028

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I      PENDAHULUAN .....	 1-12
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	12
 BAB II      TINJAUAN TEORITIS .....	 13-35
A. Tinjauan ayat yang relevan.....	13
B. Tinjauan Umum Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) .....	17



C. Tinjauan Umum Kelapa Sawit ( <i>Elaeis guineensis</i> ) .....	25
D. Tinjauan Umum tentang Desa Bukit Harapan .....	30
E. Kerangka Fikir.....	35
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN.....	36-41
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
C. Variabel Penelitian .....	36
D. Definisi Operasional Variabel .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Alat dan Bahan .....	37
G. Prosedur Kerja .....	38
H. Analisis Data .....	41
BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42-56
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan.....	47
BAB V    PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
KEPUSTAKAAN .....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	69

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Jenis CMA di Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit	
Harapan.....	42
Tabel 4.2 Hasil pengukuran indikator lingkungan.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ektomikoriza.....	18
Gambar 2.2. Endomikoriza.....	19
Gambar 2.3. Spora mikoriza.....	23
Gambar 2.4. Kelapa Sawit.....	28
Gambar 2.5. Peta Wilayah Kabupaten Pasangkayu.....	31
Gambar 4.1. Perbandingan Kelimpahan Relatif Spora di Desa Bukit Harapan.....	46

## ABSTRAK

**Nama : Putri Nuragam Muliani**  
**NIM : 60300115028**  
**Judul Skripsi : Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Perakaran Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu**

---

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) adalah cendawan yang dapat bersimbiosis dengan akar tanaman. CMA ini memiliki struktur khusus yaitu arbuskula sebagai tempat pertukaran nutrisi antara tanaman dengan CMA. CMA berperan dalam meningkatkan penyerapan unsur hara, memperpanjang fungsi perakaran, lebih tahan terhadap kondisi kering dan serangan patogen. Cendawan ini dapat bersimbiosis dengan berbagai macam tanaman perkebunan seperti halnya kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi genus CMA yang terdapat di perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan metode penyaringan basah dan sentrifugasi. Identifikasi dilakukan sampai tingkat genus berdasarkan karakter morfologi meliputi bentuk, warna serta ornamen spora kemudian diidentifikasi menggunakan website INVAM. Dari hasil identifikasi ditemukan 2 genus spora yaitu *Glomus* dan *Acaulospora* dengan nilai kelimpahan relatif masing-masing 83,1% dan 16,9%.

Kata kunci : Identifikasi, Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*), Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)

## ABSTRACT

**Name : Putri Nuragam Muliani**

**Student ID Number : 60300115028**

**Title : Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (CMA) in Palm Oil Roots (*Elaeis guineensis*) in Bukit Harapan Village, Bulutaba District, Pasangkayu Regency**

---

Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) is a fungus that can symbiosis with plant roots. This AMF Has a special structure namely arbuscula as a place of exchange of ntrients between plant and AMF. AMF plays a role in increasing nutrient absorption, extending root function, more resistance to dry conditions and pathogen attack. This fungus can symbiosis with various AMF kinds of plantation plants such as oil palm. This study aims to identify the AMF genus found in oil palm plantations in Bukit Harapan Village, Bulutaba District, Pasangkayu Regency by using the wet screening method and sentrifugation. Identification was carried out to the genus level based on morphological characters including the shape, color and ornament of the spores then identified using the INVAM website. From the identification results found 2 spore genera, namely *Glomus* and *Acaulospora* with the relative abundance values of 83,1% and 16,9%.

**Keywords:** Identification, oil palm (*Elaeis guineensis*), Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Hamparan bumi yang sangat luas memungkinkan untuk hidup berbagai macam jenis makhluk hidup. Mulai dari hewan, tumbuhan, fungi sampai mikroorganisme. Semuanya hidup berdampingan di alam sehingga membentuk ekosistem yang kompleks. Di dunia internasional Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini meliputi variasi gen, jenis dan spesies. Penjelasan tentang keanekaragaman terdapat dalam QS Shaad/38:27 yang berbunyi

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ  
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Kementerian Agama RI, 2015).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa tidak sekali-kali Dia menciptakan makhluk-Nya dengan main-main, melainkan Dia ciptakan mereka supaya mereka menyembah-Nya dan mengesakan-Nya. Kemudian Allah akan menghimpun mereka di hari perhimpunan, maka Dia akan memberi pahala kepada

orang yang taat dan mengazab orang yang kafir (Al-Mahali dan As-Syuyuti, 2010).

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah swt. telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Hal ini menunjukkan betapa banyak dan beragam ciptaan-Nya yang terbentang di antara langit dan bumi. Tidak semua ciptaan-Nya telah diketahui oleh manusia sehingga sangat diperlukan proses dan cara-cara pengenalan semua ciptaan Allah. Dengan mengetahui dan mengenali sesuatu tentu akan menambah wawasan keilmuan mengenai hikmah atau manfaat dari penciptaan tersebut.

Di alam terdapat berbagai bentuk simbiosis yang secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi tanaman yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan bagi kedua organisme yang terlibat. Salah satu contohnya yaitu simbiosis antara tanaman dan mikoriza (Utoyo, 2016). Hubungan simbiosis antara inang dengan CMA juga diketahui dapat mengkolonisasi hampir seluruh akar tanaman perkebunan seperti halnya pada kelapa sawit. (Yulianto, 2016).

Pada saat ini pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sedang berkembang pesat. Dari segi ekonomi kelapa sawit dinilai dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga memiliki keuntungan lain yaitu dapat bersimbiosis dengan CMA. Dilaporkan bahwa kelapa sawit memiliki rata-rata jumlah spora CMA tertinggi di bandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (Yulianto, 2016).

CMA adalah satu kelompok cendawan yang hidup di dalam tanah, termasuk golongan endomikoriza yang mempunyai struktur hifa yang disebut arbuskula sebagai tempat kontak dan transfer unsur hara mineral antara jamur dan tanaman inangnya (Hidayat, 2013).

CMA ditemukan pada hampir sebagian besar tumbuhan dan pada umumnya tidak memiliki inang yang spesifik. Meski demikian CMA memiliki tingkat populasi dan komposisi jenis yang sangat beragam yang dipengaruhi oleh karakteristik tanaman dan faktor lingkungan seperti suhu, PH tanah, kelembaban tanah, kandungan fosfor dan konsentrasi logam berat. Sehingga sangat mungkin setiap ekosistem mengandung spora CMA dengan jenis yang sama ataupun berbeda (Margaretta, 2011).

Kehadiran CMA penting bagi ketahanan ekosistem, pemeliharaan keragaman biologi dan stabilitas tanaman. Kegunaan mikoriza untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistem sekarang mulai dikenal, terutama karena pengaruhnya untuk mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan meningkatkan produktivitas. Jika dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak memiliki CMA, akar tumbuhan yang memiliki CMA ternyata lebih efisien karena penyerapan air dan hara dibantu oleh jamur. Benang-benang hifa jamur memiliki akses dan jangkauan lebih luas dalam mengeksploitasi nutrisi pada suatu area (Moriera *et al*, 2007).

CMA dapat bersimbiosis dengan hampir 90% tanaman. CMA bersifat simbiosis mutualisme dengan tanaman, bersifat antagonis terhadap parasit dan hidup bebas secara alami di daerah rhizosfer. Hubungan simbiosis antar inang



dengan CMA meliputi penyediaan fotosintat (karbohidrat) oleh tanaman inang, sebaliknya tanaman inang mendapatkan tambahan nutrisi yang diambil cendawan dari tanah. CMA juga diketahui dapat mengkolonisasi hampir seluruh akar tanaman perkebunan (Yulianto dkk, 2016).

Pada saat ini pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sedang berkembang pesat. Dari segi ekonomi kelapa sawit dinilai dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga ternyata memiliki keuntungan lain yaitu karena akar tanaman kelapa sawit dapat bersimbiosis dengan CMA. Mikroorganisme tersebut dapat meningkatkan penyerapan unsur hara dalam tanah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti halnya memberi manfaat besar bagi tumbuhan kelapa sawit dan tumbuhan lain jika diambil, diisolasi dan dilakukan perbanyakan untuk diaplikasikan ke tumbuhan perkebunan lainnya. Dilaporkan bahwa kelapa sawit memiliki rata-rata jumlah spora mikoriza tertinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (Yulianto dkk, 2016).

Keberadaan jenis CMA pada kelapa sawit perlu untuk diketahui karena setiap tumbuhan diinfeksi oleh CMA yang berbeda-beda. Jenis dan dominansi CMA sangat dipengaruhi oleh tanaman inang, vegetasi dan lingkungannya. Tidak semua CMA mempunyai sifat morfologi dan fisiologi yang sama sehingga penting untuk mengetahui identitasnya melalui proses identifikasi. Dalam penelitian (Kartika, 2017) mengatakan jenis CMA di perakaran kelapa sawit yang ditanam di tanah gambut bekas hutan didominasi oleh genus *Glomus*.

Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sendiri belum pernah dilakukan Identifikasi CMA. Oleh karena itu perlu untuk

dilakukan identifikasi guna mengetahui keragaman CMA pada perakaran tanaman kelapa sawit. Selain untuk melaporkan data tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, identifikasi CMA ini juga dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan pupuk hayati sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas tanaman kelapa sawit yang bersifat ramah lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukanlah penelitian tentang identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada perakaran tanaman kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu.

## **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan yaitu

1. Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) apa saja yang terdapat pada perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu?
2. Berapa persentase kelimpahan relatif Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang terdapat pada perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian yaitu sampel penelitian berupa tanah di sekitar perakaran kelapa sawit. Tanah diambil disekitar perakaran kelapa sawit yang berumur 7 tahun dengan jarak 100 cm dari pohon dan dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Sampel diambil pada musim kemarau.

### **D. Kajian Pustaka**

Adapun kajian pustaka ini berisi tentang penelitian yang mendukung jalannya penelitian ini yaitu antara lain:

1. Ahmad Shafwan S. Pulungan dengan penelitian yang berjudul “Isolasi dan Identifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula dari Perakaran Tebu (*Sacharum officinarum* L.) di Area Perkebunan Tebu Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang” pada tahun 2009. Sampel tanah untuk keperluan identifikasi mikoriza diambil di perkebunan tebu Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang dengan metode ICRAF yaitu dengan menggunakan plot pengamatan berukuran 20 m x 20 m lalu diambil tanah disekitar perakaran tanaman dengan kedalaman 20 cm. Kemudian dilakukan ekstraksi spora guna memisahkan spora dari sampel tanah dengan teknik tuang saring dan sentrifugasi. Selanjutnya dibuatkan preparat spora untuk diidentifikasi jenis sporanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tumbuhan dan tempat pengambilan

sampel. Penelitian ini mengambil sampel di perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu.

2. Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula Dari Perakaran Tanaman Pertanian yang diteliti oleh Eka Sukmawaty, Hafsan dan Asriani pada tahun 2016. Pengambilan sampel penelitian ini yaitu di daerah pertanian Malino Sulawesi Selatan yang diambil dari tanaman kentang (*Solanum tuberosum*), stroberi (*Fragaria annanassa*) dan tomat (*Solanum lycopersicum*). Identifikasi spora mikoriza dilakukan dengan penyaringan basah dan diidentifikasi menurut *International Culture Collection of (Vesikular) Arbuscular Mycorrhizal* (INVAM) diperoleh 16 isolat cendawan. Pada akar tanaman kentang (*Solanum tuberosum*) diperoleh 8 genus yaitu 6 spora genus *Glomus* dan 2 spora genus *Acaulospora*, pada tanaman stroberi (*Fragaria annanassa*) diperoleh 5 genus yaitu 2 genus *Glomus* dan 1 genus *Ambispora* dan pada tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) ditemukan 3 genus spora *Glomus*.
3. Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) pada Beberapa Tekstur Tanah di Lahan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah yang diteliti oleh Engelbert Manaroinsong dan A.A. Lolong pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah yaitu di lahan PT. Sapta Karya Damai (SKD), PT. Agro Bukit dan areal pertanian kelapa dan kelapa sawit milik petani di Samudra Besar. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu mikoriza yang ditemukan di tiga lokasi perkebunan kelapa sawit

adalah dari genus *Glomus* dengan populasi bervariasi menurut jenis tanah yaitu berkisar antara 175,3-283 buah per 100 mg tanah. Populasi tertinggi ditemukan pada jenis tanah gambut di lokasi Agro Bukit dengan 283 buah per 100 mg tanah di perkebunan kelapa sawit yang belum berproduksi normal (umur <5 tahun). Populasi terendah ditemukan pada tekstur tanah liat berlempung di lokasi pertanian kelapa sawit PT. Agro bukit yaitu 175,3 buah per 100 mg tanah di perkebunan kelapa sawit telah berproduksi yang berumur lebih dari 10 tahun. Pada penelitian ini yang akan dijadikan sampel penelitian adalah tanah di perkebunan kelapa sawit yang berumur <10 tahun.

4. Karakteristik Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Beberapa Rhizosfer Tanaman Perkebunan yang diteliti oleh Indra Yulianto, Bambang Utoyo dan Dewi Riniarti. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi dan keanekaragaman CMA yang ada di berbagai areal tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang menjadi objek penelitian yaitu tanaman kakao, karet, kopi dan kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan spora mikoriza pada rhizosfer tanaman diperoleh bahwa rata-rata jumlah spora terendah terdapat pada perkebunan karet (1 spora) sedangkan jumlah tertinggi pada tanaman kelapa sawit (2,4 spora). Jenis spora pada semua rhizosfer tanaman kakao, karet, kopi dan kelapa sawit didominasi oleh jenis *Glomus* dengan berbagai tipe yang berbeda (10 tipe). *Glomus* tipe 2 mendominasi pada semua rhizosfer tanaman perkebunan yang diteliti.

5. Status Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Berbagai Sistem Pengelolaan Dan Umur Tanaman Kelapa Sawit yang diteliti oleh Rossy A. Arman, Fikrinda, Muyassir, A. Anhar, N.F. Mardatin dan T. Arabia. Berdasarkan hasil penelitiannya umur tanaman kelapa sawit mempengaruhi keberadaan FMA di dalam tanah serta kolonisasinya pada akar tanaman dengan membandingkan keberadaan FMA pada umur 2-3 bulan, 3 tahun, 7 tahun dan >10 tahun. Jumlah spora terbanyak dijumpai pada kelapa sawit dengan umur 7 tahun yang berbeda nyata dengan kelapa sawit umur 2-3 bulan, 3 tahun dan >10 tahun.
6. Isolasi Karakterisasi dan Pengujian Keefektifan Cendawan Mikoriza Arbuskular terhadap Bibit Kelapa Sawit pada Tanah Gambut Bekas Hutan yang dilakukan oleh Elis Kartika pada tahun 2006 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan spora alami sebelum *trapping* menggunakan tanaman inang yaitu 1-10 spora per 50 gram tanah sedangkan setelah *trapping* didapatkan 162 spora per 50 gram tanah. Berdasarkan teknik *Most Probable Number* (MPN), jumlah propagul infeksi di rizosfer kelapa sawit pada tanah gambut bekas hutan pada percobaan ini mencapai 1100 per gram tanah. Kepadatan spora dan jumlah propagul pada tanah bekas hutan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis tanah PMK bekas kebun karet tetapi lebih tinggi daripada tanah PMK bekas hutan hasil penelitian Kartika (2006) yang juga meneliti kelapa sawit. Perbedaan di antara contoh jenis tanah tersebut dapat dikarenakan perbedaan lingkungan asal, tanaman inang dan keberadaan

vegetasi lain di bawa tanaman kelapa sawit maupun cara pengelolaannya. Bibit kelapa sawit yang bersimbiosis dengan CMA menunjukkan tanggap pertumbuhan dan serapan P lebih tinggi daripada bibit tanpa inokulasi CMA. Penelitian ini akan mengidentifikasi mikoriza di perakaran kelapa sawit namun tidak sampai pada tahapan inokulasi pada tumbuhan inang.

7. Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Rhizosfer *Desmodium* sp. Asal PT. Cibaliung Sumberdaya Banten yang diteliti oleh Sri Muryati, Irdika Mansur dan Sri Wilarso Budi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman FMA dari rhizosfer 4 jenis *Desmodium* sp. asal PT. Cibaliung Sumberdaya, Banten dengan menggunakan berbagai jenis tanaman inang. Pengamatan keberadaan spora FMA dilakukan dengan melihat persentase kolonisasi akar, kepadatan spora FMA dan keragaman spora FMA pada sampel tanah yang diamati. 4 sampel tanah yang didapatkan juga dibuatkan kultur trapping dengan menggunakan 3 jenis tanaman inang yaitu *S. vulgare*, *P. javanica* dan *D. ovalifolium*. Kultur memiliki 12 kombinasi yang diulang sebanyak 7 kali sehingga terdapat 84 pot tanaman. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keanekaragaman FMA dari 4 rhizosfer *Desmodium* sp. sebelum dan setelah trapping menunjukkan peningkatan jumlah spora, keragaman jenis FMA, sedangkan nilai persentase kolonisasi akar relatif bervariasi. Hasil pengamatan jumlah spora menunjukkan peningkatan dari 10-89 spora per 20 g tanah meningkat menjadi 16-114 spora per 20 g tanah, keragaman tipe spora terdiri dari 8 tipe Glomus dan

1 Acaulospora menjadi 23 tipe Glomus dan 3 tipe Acaulospora. Sedangkan persentase kolonisasi akar dari 92-100% dan setelah kultur trapping menjadi 22,2-95,5%.

8. Identifikasi Spora Jamur *Mikoriza Vesikular Arbuskular* (MVA) Pada Tanah Tercemar Minyak Bumi Di Bojonegoro yang dilakukan oleh Rizka Faiza, Yuni Sri Rahayu dan Yuliani pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kepadatan spora mikoriza dari tanah tercemar minyak bumi dan mengidentifikasi jenis tanaman yang terinfeksi mikoriza. Hasil pengamatan yang didapatkan yaitu terdapat 4 genus mikoriza yang bersimbiosis dengan tanaman di tanah tercemar minyak bumi yaitu *Glomus* (2 tipe spora), *Gigaspora* (3 tipe spora), *Acaulospora* (1 tipe spora) dan *Sclerocystis* (1 tipe spora). Satu genus mikoriza tersebut dapat menginfeksi lebih dari satu tanaman. Persentase spora pada tanah tercemar minyak bumi seluas 275 m<sup>2</sup>, dimana *Glomus* sp. 1 merupakan genus spora mikoriza yang mendominasi pada tanah tercemar minyak bumi dengan persentase penyebaran sebesar 69,83% (169 spora). Tanaman yang dapat bersimbiosis dengan mikoriza pada tanah tercemar minyak bumi antara lain adalah *Stachytarpheta mutabilis*, *Lantana camara*, *Imperata cylindrica*, *Calotropis gigantea*, *Eupatorium odoratum*, *Sida rhombifolia* dan *Tectona grandis*. Kepadatan spora tertinggi pada tanah yang ditumbuhi tanaman *Sida rhombifolia* yaitu 61 spora per 50 g tanah.



#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) apa saja yang terdapat pada perakaran tanaman kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk mengetahui persentase kelimpahan relatif Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang terdapat pada perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis-jenis CMA pada perakaran tanaman kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu.
2. Menambah wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat ataupun mahasiswa tentang keberadaan CMA pada tanaman kelapa sawit.
3. Menambah pendukung referensi bagi perpustakaan dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Ayat yang Relevan***

Tanah merupakan habitat asli yang penting bagi makhluk hidup baik itu yang berukuran makro seperti cacing, predator seperti tikus dan hewan lainnya yang hidup di tanah maupun untuk makhluk hidup yang berukuran mikro seperti cendawan, bakteri dan protozoa. Organisme tersebut masing-masing memiliki peran penting dalam siklus materi-energi yang sangat diperlukan oleh tanaman. Kolaborasi dan aktivitas organisme tanah ini memerlukan kondisi lingkungan yang mendukung seperti temperatur, pH, struktur tanah, kelembaban dan faktor lainnya (Umniyatie, 2014).

Secara alami tanah memiliki potensi mikroorganisme yang mampu menekan perkembangan patogen dalam tanah. Sebagian besar mikroorganisme antagonis tersebut hidup sebagai saprofit. Kemampuan organisme untuk beradaptasi terhadap berbagai keadaan lingkungan merupakan potensi yang besar untuk dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati (Baker, 1974). Hal ini tentu dapat memberikan keuntungan bagi tumbuhan itu sendiri, bagi lingkungan dan bagi manusia. Salah satu bentuk mikroorganisme yang bermanfaat yaitu mikoriza yang bersimbiosis dengan akar tanaman sehingga dapat menguntungkan satu sama lain. Mikoriza ini berukuran mikroskopis yang dapat mengkolonisasi akar atau pun hidup di tanah sekitar perakaran (Rao, 2010).

Dalam QS al-Furqan/25:2 dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk-Nya dengan ukurannya masing-masing.

لَهُ يَكُنْ وَلَمْ وَلَدًا يَتَّخِذْ وَلَمْ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ لَهُ الَّذِي  
تَقْدِيرًا فَقَدَرَهُ شَيْءٌ كُلٌّ وَخَلَقَ الْمُلْكِ فِي شَرِيكُ

Terjemahnya:

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa hanya Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. Dia telah menciptakan sesuatu dan memberikan ukuran dan aturan yang sangat cermat kepada masing-masing berupa rahasia-rahasia yang dapat menjamin keberlangsungan tugasnya secara teratur dan sistematis. Seperti halnya pada unsur-unsur yang membentuk sebuah komposisi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan pernah melenceng. Begitu pula yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Masing-masing terbagi pada kelompok dan jenis yang berbeda. Sedangkan dalam tahap perkembangannya, sifat-sifatnya berkembang dari makhluk hidup bersel satu seperti mikrobat, sampai kepada makhluk hidup yang bersel banyak, seperti manusia yang dapat dikatakan paling sempurna. Setiap jenis memiliki sifat-sifat tertentu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Semua itu berjalan menurut hukum dan aturan yang bersifat konstan dan teliti yang menggambarkan secara

jelas kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan (Shihab, 2013).

Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur alam ini Allah swt. tidak membutuhkan bantuan siapapun sehingga ditegaskan bahwa Allah swt. tidak memiliki anak ataupun sekutu. Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya dalam berbagai pola dan ukuran yang beragam ada yang sangat besar dan ada pula yang sangat kecil yang bahkan tidak dapat tampak secara kasat mata. Meskipun sangat kecil dan tak tampak oleh manusia ciptaan Allah swt. sungguh tidak ada yang sia-sia setiap ciptaan-Nya memiliki perannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Ali Imran:3/191.

خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُودًا قِيَمًا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ  
عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَطِلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ  
النَّارِ

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut tafsir Ibnu Katsir Allah swt. menjelaskan ciri khas orang yang berakal melalui firman tersebut. Mereka tidak pernah putus dari berdzikir dan mengingat-Nya dalam semua keadaan mereka. Lisan, jiwa dan hati mereka semua mengingat Allah swt. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di

dalamnya menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaan-Nya, hikmah-Nya, pilihan-Nya dan rahmat-Nya. Tidak sekali-sekali Allah menciptakan semuanya sia-sia melainkan dengan sebenarnya agar orang-orang yang berbuat buruk diberi balasannya yang setimpal dan diberikan pahala yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang mukmin menyucikan Allah dari perbuatan yang sia-sia dan penciptaan yang batil (Abdullah, 2008).

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt. tidak menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebab di zaman sekarang yang perkembangan ilmu pengetahuannya sangat pesat, telah banyak membuktikan kebenaran dari firman-firman Allah swt. yang ada pada al-Qur'an. Dulunya manusia tidak mengenal adanya mikroorganisme, namun setelah ditemukannya mikroskop semakin bertambahlah pengetahuan manusia bahwa ada makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun memiliki berbagai peranan dan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.

Seperti halnya mikoriza yang berukuran kecil bahkan tidak kasat mata namun ternyata memiliki manfaat dalam meningkatkan penyerapan unsur hara di dalam tanah sehingga penting bagi pertumbuhan tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan patogen akar, menghasilkan zat pengatur tumbuh nabati dan memperbaiki struktur tanah (Indriyanto, 2008).

## ***B. Tinjauan Umum tentang Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)***

Asosiasi simbiotik antara jamur dan sistem perakaran tanaman tingkat tinggi memiliki istilah umum yaitu mikoriza (jamak mikorizae) yang secara harfiah berarti jamur akar. Jamur akar ditemukan oleh botaniwan Jerman, Frank pada abad yang lalu (1855) di pepohonan hutan seperti pinus tetapi penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa asosiasi simbiotik semacam itu dengan jamur ada dalam kondisi alami di banyak sistem perakaran tanaman budidaya (Rao, 2010).

Mikoriza adalah suatu struktur khas yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas baik pada tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebarannya (Nuhamara, 1994).

Berdasarkan struktur dan cara fungi menginfeksi akar terdapat tiga macam mikoriza yaitu ektomikoriza, endomikoriza dan ektendomikoriza. Ektomikoriza sering disebut juga mikoriza ektotrof, jamurinya seluruhnya menyelubungi masing-masing cabang akar dalam selubung atau mantel hifa. Hifa-hifa itu hanya menembus antarsel korteks akar (interseluler). Ektomikoriza diketahui terdapat pada famili-famili seperti Pinaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Caesalpinoideae dan Tiliaceae. Beberapa genus seperti *Pinus*, *Picea*, *Abies*, *Pseudotsuga*, *Cedrus*, *Larix*, *Quercus*, *Castanea*, *Fagus*, *Nothofagus*, *Betula*, *Alnus*, *Salix*, *Carya* dan *Populus* memiliki infeksi ektomikoriza (Rao, 2010).

Pada umumnya, jamur yang terlibat dalam ektomikoriza termasuk dalam Basidiomycetes yang meliputi famili-famili Amanitaceae, Belotaceae, Cortinariaceae, Russulaceae, Tricholomataceae, Rhizopogonaceae dan Sclerodermataceae. Jamur-jamur ini terdapat dalam genus-genus *Amanita*, *Boletus*, *Cantharellus*, *Cortinarius*, *Entoloma*, *Gomphidius*, *Hebeloma*, *Inocybe*, *Lactarius*, *Paxillus*, *Russula*, *Rhizopogon*, *Scleroderma* dan *Cenococcum*. Banyak diantara jamur-jamur ini menunjukkan inang spektrum luas. Demikian pula inang yang sama mungkin diinfeksi oleh lebih dari satu jamur seperti misalnya *Pinus sylvestris* yang dari perakaran mikorizanya dapat dipisahkan sebanyak 40 spesies jamur (Rao, 2010).




Gambar 2.1 Ektomikoriza (Jabeen, 2012)

Jenis ektomikoriza dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan seperti jamur kuping dan jamur merang. Jenis ini mudah dikenali karena memiliki tubuh buah dan dapat dikonsumsi karena mengandung protein yang tinggi, vitamin, fosfat dan kalsium. Namun ada juga yang mengandung toksik sehingga dapat menyebabkan keracunan bila dikonsumsi (Musfal, 2010).

Menurut Brundett *et al.* (1996) dalam Musfal (2010) karena beragamnya bentuk dan warna cendawan ektomikoriza serta ada beberapa jenis yang beracun maka ektomikoriza juga dapat berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan.

Ektomikoriza merupakan indikator baik tidaknya kondisi hutan. Hutan alam yang telah dikonversi menjadi hutan tanaman atau bentuk konversi lain kondisinya akan menjadi tidak sesuai bagi banyak jenis jamur ektomikoriza terutama karena perubahan iklim mikro di bawah tajuk dan inang yang tidak sesuai. Tumbuhan dengan asosiasi ektomikoriza mendominasi ekosistem hutan alam tropis campuran, sehingga tubuh buah jamur dapat ditemukan di banyak jenis tanah (Karmilasanti, 2016).

Endomikoriza adalah asosiasi simbiosis mutualisme antara jamur tertentu dengan akar tanaman, dimana jamur tumbuh sebagian besar di dalam korteks akar dan menembus akar tanaman inang. Endomikoriza dibedakan atas tiga grup yaitu erikoid mikoriza, orchidaceous mikoriza dan mikoriza vesikular arbuskular (Istigfaiyah, 2018).



Gambar 2.2 Endomikoriza (a) hifa (b) arbuskula (c) vesikula (INVAM, 2016).

Pada endomikoriza, jamurnya tidak membentuk suatu selubung luar tetapi hidup di dalam sel-sel akar (intraseluler) dan membentuk hubungan langsung antar sel-sel akar dan tanah sekitarnya. Endomikoriza hanya dijumpai pada wakil-wakil spesies kebanyakan famili angiospermae. Endomikoriza juga ditemukan pada konifer kecuali Pinaceae dan pada Pteridofita serta Briofita tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, pada endomikoriza hifa jamur memasuki sel-sel



tanaman inang dan karenanya menerobos jaringan inang. Jamur yang terlibat dalam asosiasi endotrofik mungkin termasuk Phycomycetes yaitu memiliki hifa tak bersekat atau termasuk Basidiomycetes atau jamur tak sempurna (memiliki hifa bersekat) (Rao, 2010).

Kelompok mikoriza yang ketiga yaitu ektendomikoriza, yang merupakan bentuk antara intermediat kedua mikoriza yang lain. Ciri-cirinya antara lain adanya selubung akar yang tipis berupa jaringan hifa. Hifa dapat menginfeksi dinding sel korteks dan juga sel-sel korteksnya. Penyebarannya terbatas dalam tanah-tanah hutan sehingga pengetahuan tentang mikoriza ini sangat terbatas (Brundett, 2004).

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan bentuk dari endomikoriza yang terdapat pada perakaran sebagian besar Angiospermae, Pteridofita dan Briofita. CMA membentuk struktur karakteristik khusus yang disebut arbuskel dan vesikel. Arbuskel membantu dalam transfer nutrisi terutama fosfat dari tanah ke sistem perakaran sedangkan vesikel merupakan organ penyimpanan cadangan makanan bagi fungi endomikoriza (Rao, 2010).

Manfaat CMA yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu jenis pupuk hayati yang memiliki peranan diantaranya dapat meningkatkan kesehatan tanah, ramah lingkungan dan dapat meningkatkan status hara tanah serta hasil pertanian. Bagi tanaman inang, adanya asosiasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan tanaman inang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, mikoriza memiliki peran dalam perbaikan struktur tanah, meningkatkan kelarutan hara dan proses pelapukan bahan induk (*biogeo-kemis*).

Sedangkan secara langsung, mikoriza memiliki peran dalam meningkatkan serapan air, hara dan melindungi tanaman dari patogen akar dan unsur toksik, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan kelembaban yang ekstrem, meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan zat pengatur tumbuh lainnya seperti auksin, cytokinin, giberelin dan vitamin terhadap tanaman inangnya (Nuhamara, 1994).


Manfaat CMA bagi ekosistem yang dilaporkan oleh Bolan (1991) dalam Musfal (2010) yaitu CMA menghasilkan enzim fosfatase yang dapat melepaskan unsur P yang terikat oleh unsur Al dan Fe pada lahan masam dan Ca pada lahan berkapur sehingga P dapat tersedia bagi tanaman. CMA juga dapat berperan dalam memperbaiki sifat fisik tanah yaitu membuat tanah menjadi gembur. Menurut Wright dan Uphadhyaya (1998) dalam Musfal (2010) CMA melalui akar eksternalnya dapat menghasilkan senyawa glikoprotein glomalin dan asam-asam organik yang mengikat butir-butir tanah menjadi agregat mikro. Kemudian melalui proses mekanis oleh hifa eksternal, agregat mikro akan membentuk agregat makro yang mudah diserap tanaman.

Pertumbuhan CMA dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu yang berpengaruh terhadap perkembangan spora dan ketahanan enzim spesies mikoriza tertentu, kelembaban atau kadar air tanah, intensitas cahaya, pH tanah, bahan organik, tanaman inang sebab CMA merupakan simbiosis obligat yang membutuhkan tanaman inang sebagai tempat hidupnya, mikroorganisme lain, fungisida yang diberikan pada tanaman, ketersediaan hara dan logam berat (Istigfaiyah, 2018).

Dalam pertumbuhannya CMA sangat membutuhkan kondisi lingkungan yang optimum. Suhu yang optimum bagi CMA akan mempercepat terjadinya perkembangan biakan baik dalam hal menginfeksi akar tanaman inang maupun dalam menghasilkan spora-spora sebagai bagian dari perkembangan berikutnya yang relatif tinggi akan meningkatkan aktivitas cendawan (Delvian, 2006). CMA mampu beradaptasi dan hidup secara optimal pada kisaran suhu 18-35°C. Proses pembentukan CMA melalui tiga tahap yaitu perkecambahan spora di tanah, penetrasi hifa ke dalam sel akar dan perkembangan hifa di dalam korteks akar (Musfati dkk, 2006).

Lingkungan dan faktor biotik memiliki pengaruh terhadap pembentukan CMA dan derajat infeksi dari sel korteks inang. Perbedaan waktu yang diperlukan untuk infeksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kerapatan akar, rata-rata pertumbuhan akar, jumlah spora per unit volume tanah, persentase perkecambahan spora dan rata-rata pertumbuhan hifa. Interaksi antar faktor-faktor biotik memiliki efek yang signifikan dalam merespon pertumbuhan tanaman yang diinokulasi. (Yassir dan Mulyana, 2008).

Berdasarkan jenis spora, ada lima genus CMA yang dikenal yaitu *Glomus*, *Gigaspora*, *Acaulospora*, *Sclerocystis* dan *Endogone*, yang terakhir ini hanya terbatas pada tanaman yang membentuk ekto atau tidak membentuk mikoriza. Jamur-jamur ini merupakan simbiosis obligat dan tidak pernah dipisahkan dalam kultur murni dan hanya dapat dipertahankan pada tanaman sedang tumbuh yang diinokulasikan dengan spora dari salah satu spesies dan potongan-potongan akar beserta tanahnya dikumpulkan untuk tujuan eksperimen (Rao, 2010).



Gambar 2.3 Spora mikoriza (a) *Glomus* sp. (b) *Gigaspora* sp. (c) *Acaulospora* sp. (Istigfaiyah, 2018).

CMA dapat ditemukan dalam berbagai ekosistem, baik ekosistem alami maupun ekosistem yang telah terganggu. CMA memiliki rentang ekologi yang luas dan dapat ditemukan dalam sebagian ekosistem yang meliputi semak, sabana, arid, semi arid, daerah temperate, tropika, di daerah antartika, hutan hujan tropika, padang rumput, ekosistem gambut alami dan gambut yang sudah terbuka. CMA dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, khususnya berhubungan dengan kemampuannya untuk menyediakan hara mineral bagi tanaman, baik berupa hara mikro maupun makro (Kartika, 2006).

CMA secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memperbaiki agregasi tanah. Namun demikian belum terlihat jelas pada tingkat mana mikoriza ini bekerja di lapangan sehingga penentuan waktu pembentukan di lapangan merupakan hal yang penting guna memperoleh manfaat pertumbuhan tanaman. CMA mulai ditemukan pada profil tanah sekitar kedalaman 20 cm tetapi meskipun demikian masih terdapat pada kedalaman 70-100 cm. CMA tersebar secara aktif dan tersebar secara pasif yaitu disebarkan oleh angin, air atau mikroorganisme dalam tanah (Delvian, 2006).

CMA dapat berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman dimana tiap jenis tanaman juga dapat berasosiasi dengan satu atau lebih jenis CMA. Tetapi tidak semua jenis tumbuhan dapat memberikan respon pertumbuhan positif terhadap inokulasi CMA. Konsep ketergantungan tanaman akan CMA adalah relatif dimana tanaman tergantung pada keberadaan CMA untuk mencapai pertumbuhannya. Tanaman yang mempunyai ketergantungan yang tinggi pada keberadaan CMA, biasanya akan menunjukkan pertumbuhan yang nyata terhadap inokulasi CMA dan sebaliknya tidak dapat tumbuh sempurna tanpa adanya asosiasi dengan CMA (Yassir dan Mulyana, 2008).

Perbedaan tempat dan rhizosfer dapat menyebabkan perbedaan keanekaragaman spesies dan populasi CMA. Tanah yang didominasi memiliki kondisi fraksi lempung (*clay*) adalah kondisi yang diduga sesuai untuk perkecambahan spora genus *Glomus* sedangkan pada tanah berpasir ditemukan genus *Gigaspora* dalam jumlah yang tinggi. Pada tanah berpasir pori-pori tanah terbentuk lebih besar daripada tanah lempung sehingga jenis tanah ini sesuai untuk perkembangan spora *Gigaspora* yang berukuran lebih besar daripada spora *Glomus*. (Yassir dan Mulyana, 2008).

Spora CMA bersifat khusus dan diameternya berkisar antara 10 sampai 1000  $\mu\text{m}$ . Warna sporanya beraneka macam mulai dari hialin sampai hitam dan permukaannya mulai dari halus sampai kasar. Kurang lebih ada 150 spesies CMA yang berhasil dikenali namun demikian taksonomi pada spesiesnya masih terus berkembang dan banyak mengalami revisi (Pulungan, 2009).

### ***C. Tinjauan Umum tentang Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*)***

Tingginya harga bahan bakar fosil, meningkatnya permintaan energi dan meningkatnya kekhawatiran tentang implikasi bahan bakar fosil pada iklim global banyak negara di dunia telah menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk mendapat stabilitas sumber energi. Di antara semua tanaman minyak, kelapa sawit memiliki potensi tertinggi dalam produksi biodiesel. Uni Eropa dan Amerika Serikat saat ini merupakan pasar terkemuka dalam pemanfaatan minyak kelapa sawit dan produsennya adalah Malaysia yang merupakan pemimpin dalam produksi biodiesel (Bille, 2016).

Kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting dalam subsektor perkebunan di Indonesia. Luas areal tanaman kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008 berjumlah 7.363.847 ha, sedangkan pada tahun 2014 luas areal kelapa sawit berjumlah 10,9 juta ha dengan produksi 29,3 juta ton CPO (Ditjen Perkebunan, 2014).

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Sebanyak lebih 85% pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Menurut Derom Bangun, ketua GAPKI (Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia), pada tahun-tahun selanjutnya diperkirakan Indonesia bisa menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia (Pahan, 2007).

Kelapa sawit termasuk tanaman monokotil. Batangnya tumbuh lurus, umumnya tidak bercabang dan tidak mempunyai kambium tanaman ini berumah satu atau *monoecious* yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Kedua jenis bunga yang keluar dari ketiak pelepah daun berkembang

terpisah. Bunga dapat menyerbuk bersilang atau menyerbuk sendiri. Tanaman kelapa sawit dapat dibagi menjadi bagian vegetatif dan generatif. Bagian vegetatifnya terdiri atas akar, batang dan daun. Sedangkan bagian generatif yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yaitu bunga dan buah (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Akar tanaman kelapa sawit berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta menjadi salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut yang terdiri dari akar primer, sekunder tersier dan kuartener. Akar primer umumnya berdiameter 6-10 mm keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Akar primer bercabang membentuk akar sekunder yang berdiameter 2-4 mm. Akar sekunder bercabang membentuk akar tersier yang berdiameter 0,7-1,2 mm dan umumnya bercabang lagi membentuk akar kuartener (Pahan, 2007).

Batang kelapa sawit terdiri dari pembuluh-pembuluh yang terikat secara diskrit dalam jaringan parenkim. Meristem pucuk terletak dekat ujung batang dimana pertumbuhan batang sedikit agak membesar. Seperti umumnya tanaman monokotil, penebalan sekunder tidak terjadi pada batang. Batang diselubungi oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11-15 tahun setelah itu bekas pelepah daun mulai rontok. Batang berfungsi sebagai struktur yang mendukung daun, bunga dan buah. Berfungsi sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dan juga sebagai organ penimbunan zat makanan (Pahan, 2007).

Susunan daun kelapa sawit mirip dengan kelapa nyiur yaitu membentuk daun menyirip. Letak daun pada batang membentuk pola tertentu yang disebut filotaksis. Daun terdiri atas tangkai daun (*petiole*) yang pada kedua tepinya terdapat dua baris duri (*spines*). Tangkai daun bersambung dengan tulang daun utama (*rachis*) yang jauh lebih panjang daripada tangkai dan pada kiri kanannya terdapat anak-anak daun (*lidi*) dan helai daun (*lamina*) (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (*monoecious*) yang artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama. Walaupun kadang-kadang ada dijumpai bunga jantan dan betina kelapa sawit pada satu tandan yang sama atau disebut *hermafrodit*. Bunga kelapa sawit merupakan bunga manjemuk yang terdiri dari kumpulan spikelet dan tersusun dalam infloresen yang berbentuk spiral (Pahan, 2007).

Buah kelapa sawit termasuk jenis buah keras (*drupe*) yang menempel dan bergerombol pada tandan buah. Jumlah pertandan dapat mencapai 1.600, berbentuk lonjong sampai membulat. Panjang buah 2-5 cm, beratnya sampai 30 gram. Bagian-bagian buah terdiri atas eksokarp(*exocarp*) atau kulit buah, mesokarp (*mesocarp*) atau sabut dan biji. Eksokarp dan mesokarp disebut perikarp (*pericarp*). Biji terdiri atas endokarp (*endocarp*) atau cangkang dan inti (*kernel*) sedangkan inti sendir terdiri atas *endosperm* atau putih lembaga dan embrio (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Biji kelapa sawit dapat bersifat dorman sampai 6 bulan dalam konsisi utuh (tidak pecah). Kondisi dorman ini dapat dipatahkan dengan pemanasan biji pada



suhu 40°C dan dapat berkecambah setelah 80 hari. Waktu proses perkecambahan berlangsung, embrio akan mengembang, bakal batang dan bakal akar akan tumbuh keluar melalui lubang pada cangkang dan akan berkembang menjadi akar, batang dan daun (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).



(1) (2) (3) (4) (5)

Gambar 2.4 (1) Akar (2) Batang (3) Daun (4) Bunga (5) Buah Kelapa sawit  
(Dokumentasi pribadi, 2019)

Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah (Latin) ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Tanaman kelapa sawit memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Divisi : Embryopita siphonagama

Kelas : Angiospermae

Ordo : Monocotyledonae

Famili : Arecaceae

Subfamili : Cocoideae

Genus : *Elaeis*

Spesies : *Elaeis guineensis*

Kelapa sawit Afrika diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai *Elaeis guineensis* dengan jumlah kromosom  $n = 6$  atau  $2n = 8A + 24C$  (Pahan, 2007).

Nama *Elaeis guineensis* diberikan oleh Jacquin berdasarkan pengamatan pohon-pohon kelapa sawit yang tumbuh di Martinique, kawasan Hindia Barat, Amerika Tengah. Kata *Elaeis* dalam bahasa Yunani berarti minyak, sedangkan kata *guineensis* dipilih berdasarkan keyakinan Jacquin bahwa kelapa sawit berasal dari Guinea (Afrika). Jenis-jenis lain dari marga *Elaeis* adalah *E. Madagascariensis* Becc. dan *E. Melanococca* Gaertn (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Terdapat dua pendapat mengenai daerah asal kelapa sawit. Pendapat pertama menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Afrika sedangkan yang kedua menyatakan kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan. Pendapat pertama didukung oleh alasan-alasan yang sangat kuat. Diantaranya penyelidikan Zeven terhadap fosil tepung sari (*Pollen*) yang terdapat dalam lapisan-lapisan arkeologis dari zaman Miocene maupun lapisan-lapisan yang lebih muda, memberikan indikasi bahwa kelapa sawit sudah tumbuh sejak lama sekali di kawasan Afrika. Pendapat kedua yang menyatakan kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan didukung antara lain oleh Cook yang mengemukakan alasan sebagai berikut: (1) Kelapa sawit tumbuh secara alamiah di pantai Brazil dan, (2) Marga-marga palma lainnya kebanyakan berasal dari Amerika Selatan (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Varietas-varietas kelapa sawit yang telah dicirikan dibedakan menurut tipe buah, bentuk luar, tebal cangkang (tempurung), warna buah dan ciri-ciri lain. Menurut Annet pada tahun 1921 kelapa sawit hanya digolongkan dalam 7 varietas. Menurut warna buahnya, *E. guineensis* dipecah menjadi tiga jenis yang pertama yaitu *Nigrescens* dengan karakteristik warna buah lembayung atau violet

sampai hitam diwaktu muda kemudian menjadi merah kuning atau oranye sesudah matang. Yang kedua yaitu *Virescens* adalah warna buah hijau diwaktu muda kemudian menjadi merah kuning sesudah matang. Dan yang ketiga yaitu *Albescens* yaitu warna buah kuning waktu muda dan pucat tembus cahaya karena mengandung sedikit karoten. Bentuk yang dipakai pada tanaman komersial adalah *Nigrescens* karena jenis ini yang terbaik dari segi produksi maupun kualitasnya sedangkan bentuk lainnya dipakai pada program penelitian (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

#### ***D. Tinjauan Umum tentang Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu***

Kabupaten Pasangkayu yang dulu dikenal dengan Kabupaten Mamuju Utara adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibu kota terletak di Pasangkayu. Kabupaten Mamuju Utara merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 dan pada tahun 2017 berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2017. Luas Wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pasangkayu terdiri atas beberapa kecamatan yaitu kecamatan Sarudu, Bambaيرا, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya, Lariang, Baras, Sarudu, Duripoku, Dapurang dan Bulutaba (Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, 2018).

Nama Pasangkayu berasal dari kata “Vova dan Sanggayu”, menurut bahasa Kaili (Sulawesi Tengah) kata “Vova” berarti sejenis kayu bakau yang

tumbuh di tepi pantait, dan kata “sanggayu” berarti satu batang atau satu pohon (sepohon), sehingga kedua kata tersebut jika digabung memiliki arti “sebatang Kayu” atau “sebatang Pohon Bakau”. Nama awal “Vova Sanggayu” perlahan berubah dan diucapkan dengan kata “Pasanggayu” dan akhirnya berubah menjadi “Pasangkayu”. Nama Pasangkayu merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Kabupaten Mamuju Utara, yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, memperkuat jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat yang sarat dengan kearifan lokal (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016).



Gambar 2.5. Peta Wilayah Kabupaten Pasangkayu (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016).

Kecamatan Bulutaba memiliki luas wilayah 432,65 km<sup>2</sup> atau 43,265 ha, jumlah penduduk mencapai 10.430 jiwa. 5.515 laki-laki dan 4.915 perempuan serta terdiri atas 7 desa yaitu Desa Bukit Harapan, Desa Karave, Desa Kasta

Buana, Desa Lelejae, Desa Lilimori, Desa Ompi dan Desa Summersari. Tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 24,11 yang berarti bahwa rata-rata tiap satu kilometer persegi didiami oleh 24 penduduk. Desa yang terluas di kecamatan Bulutaba adalah desa Bukit Harapan. (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016).

Desa Bukit Harapan memiliki luas wilayah 329,39 km<sup>2</sup> atau 32.939 ha sekitar 76,13% dari luas kecamatan Bulutaba atau 10,82 % dari kabupaten Pasangkayu namun memiliki jumlah penduduk yang paling kecil hanya sekitar 4 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Bukit Harapan memiliki 6 dusun yaitu Matoddopuli, Lembah Harapan, Kampung Baru, Barubu, Salurindu How dan Matari Allo, serta 6 RW dan 12 RT. Adapun batas-batas desa yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan desa Kasta Buana, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Duripoku, sebelah timur berbatasan dengan desa Ompi dan Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Baras, desa Karave dan Desa Lilimori (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016).

Desa Bukit Harapan merupakan desa terluas di kecamatan Bulutaba namun desa ini tidak dijadikan ibukota kecamatan tidak layak dari segi jumlah penduduk prasarana desa disebabkan desa ini merupakan desa yang terakhir dimekarkan. Desa yang dijadikan ibukota kecamatan yaitu desa Lilimori dikarenakan jumlah penduduknya paling besar yaitu 3.143 jiwa sedangkan desa Bukit Harapan hanya 1.280 jiwa yang berarti merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah di kecamatan Bulutaba. Desa Bukit Harapan memiliki 414 rumah tangga dengan rata-rata memiliki 4 orang anggota di setiap rumah tangga.

Desa ini terletak tidak jauh dari desa Lilimori 6 km dan jarak 65 km ke ibukota kabupaten. Desa Bukit Harapan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-500 mdpl dan bukan merupakan daerah pantai melainkan berbukit. Adapun lapangan usaha yang terdapat di desa ini yaitu di sektor perkebunan (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016).

Penduduk yang berada di desa Bukit Harapan didominasi oleh suku Bugis. Sekitar tahun 1980 suku Bugis melakukan migrasi ke tempat-tempat yang menurut mereka cocok untuk perkebunan termasuk di daerah kabupaten Pasangkayu. Semua daerah di kabupaten ini memiliki suku Bugis karena pada saat mereka melakukan migrasi mereka berpisah-pisah dengan alasan mencari tempat yang terbaik menurutnya. Setelah menemukan tempat yang baik bagi mereka, mereka kemudian memanggil keluarga dan sebagian kerabat mereka. Meskipun begitu suku yang dianggap suku asli di daerah ini yaitu suku Kaili Uma (Samad, 2018).


Dalam bidang ekonomi, Pasangkayu bergantung pada sektor pertanian. Kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara dengan 78,32 persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor pertanian, perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar (Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, 2018).

Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa sawit. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari

4.158 pohon yang memproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa sawit. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa sawit dikirim ke ibukota Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya 36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton (Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, 2018).

### E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan teori maka dapat disusun alur kerangka pikir yang diterangkan secara skematik di bawah ini:





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang menggambarkan tentang keragaman jenis mikoriza di perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2019. Pengambilan sampel penelitian dilakukan di desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LKH) Makassar.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel sehingga disebut variabel tunggal. Adapun variabel yang akan diamati yaitu genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit.

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit merupakan jenis fungi yang hidup diperakaran tumbuhan kelapa sawit yang perlu untuk diidentifikasi jenisnya. CMA didapatkan dengan pengambilan sampel tanah di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit pada jarak 100 cm dari batang pohon dan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah kemudian diekstraksi sehingga didapatkan spora CMA untuk diidentifikasi.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode secara sengaja atau *purposive sampling*. Metode ini merupakan upaya pengambilan sampel dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu.

#### **F. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu linggis, sekop kecil, meteran, gunting, soil tester, termometer, gelas beaker ukuran 1000 ml, timbangan digital, hot plate dan stirer, saringan spora, batang pengaduk, botol semprot, objek glass, deck glass, cawan petri, sentrifuge, tabung sentrifuge, mikropipet, pinset spora, mikroskop dissecting, mikroskop compound dan mikroskop camera.

## 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah di sekitar tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*), kantong plastik, air, larutan gula 50%, larutan Meltzer dan larutan PVLG (Polyvenyl lactogliseril).

## G. *Prosedur Kerja*


### 1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu soil tester dan termometer untuk mengukur pH tanah, kelembaban dan suhu, linggis untuk menggali tanah, sekop kecil untuk mengambil tanah, meteran untuk mengukur jarak dari pohon dan kedalaman dari permukaan tanah.


### 2. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel tanah dan akar dilakukan dengan membuat 5 plot untuk pengambilan sampel. Pada setiap plot ditentukan berberapa pohon kelapa sawit yang akan diambil tanahnya. Jarak pengambilan sampel tanah yaitu 100 cm dari pohon dan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Kemudian diambil sampel tanah di sekitar tanaman kelapa sawit lalu dimasukkan ke dalam plastik lalu diberi label. Jumlah sampel yang diambil dari semua titik yaitu sebanyak 20 kantong tanah dari pohon kelapa sawit yang berumur 7 tahun.

Gambaran titik pengambilan sampel



Keterangan:

 : 5 plot pengambilan sampel

⊙ : pohon kelapa sawit

### 3. Ekstraksi spora

Ekstraksi spora dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi antara teknik tuang saring basah Pacioni dan dilanjutkan dengan teknik sentrifugasi dari Brunndert. Tanah yang telah diambil sebelumnya ditimbang menggunakan timbangan digital sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker dengan volume 1000 ml dan diisi air sampai ukuran 1000 ml. Lalu diaduk sampai bercampur kurang lebih selama 1 menit. Selanjutnya didiamkan selama 5 menit sampai tanah mengendap di bagian bawah. Setelah terbentuk endapan kemudian disaring menggunakan saringan nomor mesh 40 dibagian atas, nomor mesh 50 dibagian tengah dan mesh ukuran 325  $\mu\text{m}$  di bagian paling

bawah. Lalu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dengan perlakuan yang sama. Setelah itu diambil saringan paling bawah kemudian dibersihkan hasil saringannya dengan bantuan botol semprot dan dimasukkan pada tabung sentrifuge lalu ditambahkan air sampai ukuran 45 ml. Kemudian disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Setelah itu, tabung sentrifuge diambil dan setengah airnya dibuang lalu ditambahkan larutan gula 50% hingga mencapai 45 ml. Kemudian disentrifuge kembali selama 2 menit dengan kecepatan 1300 rpm. Setelah itu disaring kembali dengan mesh 325  $\mu\text{m}$  sambil dibilas untuk menghilangkan bekas larutan gula, kemudian hasil saringan dimasukkan ke dalam cawan petri (Prayudyaningsih, 2018).

#### 4. Pembuatan preparat spora

Preparat spora dibuat setelah dilakukannya ekstraksi spora. Spora yang didapat dari hasil ekstraksi kemudian dipisahkan menurut morfotipenya. Spora tersebut kemudian dibuatkan preparat dengan cara diambil masing-masing 5 spora dengan morfotipe yang sama diletakkan di atas kaca preparat lalu diberikan larutan PVLG di sebelah kiri. Kemudian diambil 5 spora lagi untuk diletakkan di sisi kanan lalu diberi larutan PVLG dan Melzer dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ditutup dengan deck glass lalu spora dipecahkan dengan hati-hati untuk kemudian diamati di bawah mikroskop (Prayudyaningsih, 2018).

## 5. Pengamatan spora CMA

Pengamatan spora mikoriza dilakukan setelah preparat spora difoto menggunakan mikroskop kamera dan diukur diameternya. Pengamatan spora dilakukan dengan melihat variabel yang diamati yaitu ciri-ciri morfologi spora yang meliputi bentuk, warna, ukuran dan ornamen spora. Pengamatan ciri-ciri mikroskopis yang didapatkan kemudian dicocokkan dengan pedoman identifikasi yang digunakan *International Culture Collection of (Vesikular) Arbuscular Mycorrhiza/INVAM* (<https://invam.wvu.edu/>) untuk menentukan genus CMA yang ditemukan (Sukmawaty dkk, 2016).

## H. Analisis Data

Data berupa keanekaragaman CMA dianalisis secara deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar sedangkan kelimpahan relatif spora dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kelimpahan relatif spora} = \frac{\text{Jumlah spora dalam suatu genus}}{\text{Jumlah spora keseluruhan}} \times 100\%$$

## BAB IV




### HASIL DAN PEMBAHASAN





#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Identifikasi Spora CMA di Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit Harapan






Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis CMA yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah genus *Glomus* dan *Acaulospora*.






Tabel 4.1 Jenis CMA di Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit Harapan

No	Gambar Spora	Ukuran	Karakteristik
1	 Glomus sp. 1	75 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
2	 Glomus sp. 2	67 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat tua, memiliki dudukan hifa, permukaan kasar berbintik dan tidak bereaksi dengan Melzer
3		68 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna kuning kecokelatan, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan kasar berbintik dan tidak bereaksi dengan Melzer

	Glomus sp. 3		
4	 <p>Glomus sp. 4</p>	53 $\mu\text{m}$	Spora oval, berwarna cokelat, lapisan dinding luar tebal dan berwarna lebih tua, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
5	 <p>Glomus sp. 5</p>	74 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna kuning, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
6	 <p>Glomus sp. 6</p>	74 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat kekuningan, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
7	 <p>Glomus sp. 7</p>	51 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat tua, memiliki hifa, permukaan terdapat bintik-bintik, dinding spora tebal dan tidak bereaksi dengan Melzer




8	 <p>Glomus sp. 8</p>	68 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna kuning muda, memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
9	 <p>Glomus sp. 9</p>	88 $\mu\text{m}$	Spora oval, berwarna kuning kecokelatan, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan kasar berbintik dan tidak bereaksi dengan Melzer
10	 <p>Glomus sp. 10</p>	52 $\mu\text{m}$	Spora oval, berwarna cokelat tua, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan kasar berbintik dan tidak bereaksi dengan Melzer
11	 <p>Glomus sp. 11</p>	60 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat, memiliki hifa, permukaan halus namun terdapat ornamen bulat-bulat dan tidak bereaksi dengan Melzer
12	 <p>Acalouspora sp. 1</p>	51 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna cokelat kekuningan, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan bereaksi dengan Melzer yang ditandai dengan spora bagian dalam berwarna lebih tua

13	 <p>Acalouspora sp. 2</p>	48 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna kuning muda, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
14	 <p>Acalouspora sp. 3</p>	60 $\mu\text{m}$	Spora irreguler karena terdapat selaput pembungkus spora yang tebal, berwarna oranye, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus, dan tidak bereaksi dengan Melzer
15	 <p>Acalouspora sp. 4</p>	56 $\mu\text{m}$	Spora irreguler karena terdapat selaput pembungkus spora yang tipis, berwarna oranye, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus, terdapat selaput pembungkus spora yang lebih tipis dan tidak bereaksi dengan Melzer
16	 <p>Acalouspora sp. 5</p>	35 $\mu\text{m}$	Spora irreguler karena terdapat selaput pembungkus spora, berwarna oranye kemerahan, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan halus dan tidak bereaksi dengan Melzer
17	 <p>Acalouspora sp. 6</p>	32 $\mu\text{m}$	Spora bulat, berwarna oranye, tidak memiliki dudukan hifa, permukaan berbintik-bintik, tidak terdapat selaput pembungkus spora dan tidak bereaksi dengan Melzer

## 2. Kelimpahan Relatif Spora

Perbandingan kelimpahan relatif spora antara genus *Glomus* dan *Acaulospora* disajikan pada diagram pie berikut:



Gambar 4.1 Perbandingan kelimpahan relatif spora di Desa Bukit Harapan

### 3. Indikator Lingkungan

Adapun hasil pengukuran suhu, pH dan kelembaban disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil pengukuran indikator lingkungan

Kode Sampel	Suhu	pH	Kelembaban
P1T1	26	6,2	2
P1T2	26	6,4	1,8
P1T3	26	6,2	2
P1T4	26	6,2	2
P2T1	26	6,4	2
P2T2	26	6,4	2
P2T3	26	6,2	2
P2T4	27	6,4	1,9
P3T1	26	6,4	1,8
P3T2	26	6,4	1,8
P3T3	27	7,1	2
P3T4	26	6,8	1,9
P4T1	26	7,2	1,9
P4T2	27	7,0	1,8
P4T3	26	7,0	2
P4T4	26	7,0	2
P5T1	27	7,0	2
P5T2	27	7,2	1,8
P5T3	27	7,0	2
P5T4	27	7,2	1,8

### B. Pembahasan

Mikoriza adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara jamur (mykus) tanah kelompok tertentu dan perakaran (rhiza) tumbuhan tingkat tinggi. Mikoriza memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana atau glukosa dari tanaman. Sebaliknya, mikoriza menyalurkan air dan hara tanah untuk

tumbuhan. Asosiasi ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi tanah dan tanaman inang (Hesti L. dan Tata, 2009).

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan salah satu dari kelompok cendawan yang hidup di dalam tanah. CMA termasuk dalam golongan endomikoriza yang memiliki struktur hifa yang disebut arbuskula. Arbuskula mempunyai peran sebagai tempat kontak dan transfer unsur hara antara cendawan dan tanaman inangnya pada korteks akar (Sukmawaty dkk, 2016).

Spora CMA terbentuk sebagai akibat penggelembungan satu atau lebih dudukan hifa (*subtending hypha*) dalam tanah atau dalam akar (Brundrett *et al*, 1996 dalam Asmarahman dkk, 2017). Betuk spora umumnya bulat sampai lonjong dengan ukuran diameter yang beragam. Setiap spora dibatasi oleh satu atau lebih dinding spora yang memiliki ketebalan masing-masing. Warna spora beragam mulai dari bening, kuning sampai hitam. Spora berisi lemak, sitoplasma dan banyak inti. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan, spora akan berkecambah dengan mengeluarkan hifa yang langsung menembus dinding spora atau membentuk struktus perkecambahan khusus (Nusantara dkk, 2012). Perkembangan CMA diawali sejak berada di dalam tanah dalam bentuk spora hingga dapat menginfeksi akar tanaman (Solaiman dan Hirata, 1995).

Keanekaragaman CMA di dunia tercatat sekitar 250 jenis yang berasosiasi dengan tumbuhan yang tersebar dari daerah tropik sampai subtropik bahkan kutub utara (Schusslerd dan Walker 2010 dalam Wahid 2018).

## **1. Identifikasi Spora CMA dari Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit Harapan**

Morfologi spora CMA adalah karakteristik biologi yang mudah diamati dengan bantuan mikroskop. Spora dapat dipisahkan dari tanah kemudian dikelompokkan berdasarkan karakter morfologinya misalnya ukuran, warna, jumlah dan tebal dinding spora, hiasan dinding spora (ornamen) dan lain sebagainya (Asmarahman dkk, 2017). Spora didapatkan dari hasil penyaringan basah dan sentrifugasi kemudian dipisahkan menurut morfotipe spora. Berdasarkan hasil penelitian morfologinya, spora yang ditemukan pada sampel tanah adalah spora CMA genus *Glomus* dan *Acaulospora*.

Keanekaragaman spora merupakan kekayaan jenis spora hasil identifikasi sampai pada tingkat genus. Identifikasi CMA dilakukan dengan bantuan larutan Melzer. Genus *Glomus* umumnya tidak bereaksi dengan larutan Melzer sedangkan genus *Acaulospora* umumnya bereaksi dengan adanya perubahan warna bagian dalam spora menjadi kuning kemerahan, atau lebih gelap (Ansiga dkk, 2017)

*Glomus* adalah genus mikoriza dari family Glomeraceae. Genus *Glomus* sp. memiliki proses perkembangan spora yang dimulai dari ujung hifa yang membesar hingga ukuran maksimal dan terbetuk spora. Karena sporanya berasal dari perkembangan hifa maka disebut *clamydospora*, kadang hifa bercabang-cabang. Tiap cabang terbentuk *clamydospora* dan membentuk *sporocarp*. Pada saat dewasa spora dipisahkan dari hifa pelekak oleh sebuah sekat. Spora *Glomus*

berbentuk globos, subglobos, ovoid maupun obovoid dengan dinding spora lebih dari satu lapis. Spora ditemukan dalam bentuk agregat lepas (Patriyasari, 2006).

Spora genus *Glomus* yang ditemukan berbentuk bulat dan oval atau lonjong dengan warna yang beragam dari kuning, kuning kecokelatan, cokelat, cokelat kekuningan hingga cokelat tua. Spora yang ditemukan umumnya berbentuk tunggal. Spora yang ditemukan ada yang memiliki dudukan hifa dan ada pula yang tidak memiliki dudukan hifa. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kurnia dkk, 2019) bahwa tidak semua spora yang ditemukan memiliki subtending hifa atau dudukan hifa. Permukaan spora yang ditemukan halus namun ada pula permukaan sporanya terdapat ornamen berbentuk bulat kecil sehingga permukaan spora terlihat kasar. Spora jenis ini juga ditemukan pada penelitian sebelumnya oleh (Yulianto dkk, 2016) yaitu berbentuk bulat besar berwarna kehitaman, permukaan spora agak kasar, dinding spora agak tebal dan tidak bereaksi dengan larutan melzer. Ukuran spora yang ditemukan pun bervariasi mulai dari 40-90  $\mu\text{m}$ .

Spora genus *Glomus* memiliki auksilari yang dikatakan seperti vesikula eksternal dan spora *Glomus* memiliki struktur yang lebih sederhana dari genus-genus lain tetapi *Glomus* mempunyai beberapa lapis dinding spora, spora *Glomus* yang muda kerap mempunyai beberapa lapis dinding luar yang rapuh dan hilang ketika spora menjadi tua. Spora *Glomus* yang belum dewasa memiliki reaksi warna Melzer yang lemah dan tidak terjadi pada spora yang sudah tua (Ginting, 2018).

CMA Glomus mampu meningkatkan pertumbuhan bibit sawit di pembibitan maupun di lapangan (Sundram et al, 2017). Spora dari genus Glomus dapat hidup di kelapa sawit karena CMA ini merupakan salah satu kelompok jamur yang bersifat biotrof obligat yaitu tidak dapat melestarikan pertumbuhan dan reproduksinya bila terpisah dari tanaman inang. Kelapa sawit dapat berfotosintesis sehingga hasil fotosintatnya berupa karbohidrat cair didistribusikan ke organ tubuhnya termasuk akar. Dari akar inilah CMA kemudian mendapatkan aliran energi untuk hidup dan berkembang biak di dalam tanah (Hajoeningtjas, 2009). Hal ini pun berlaku pada genus Acaulospora.

Proses perkembangan spora Acaulospora sp. berawal dari ujung hifa (*Subtending hyphae*) yang membesar seperti spora yang disebut *hyphal terminus* dan *subtending hyphae* akan muncul bulatan kecil yang semakin lama semakin membesar dan terbentuk spora. Dalam perkembangannya *hyphal terminus* akan rusak dan isinya akan masuk ke dalam spora. Rusaknya *hyphal terminus* akan meninggalkan bekas lubang kecil yang disebut *Cycatric* (Puspitasari, 2012).

Menurut (Patriyasari, 2006) spora Acaulospora merupakan spora tunggal di dalam sporokarp, spora melekan secara lateral pada hifa yang ujungnya menggelembung dengan ukuran yang hampir sama dengan spora, bentuk spora globos, subglobos, ellips atau fusiform melebar. Acaulospora merupakan genus CMA yang termasuk dalam family Acaulosporaceae. Genus ini memiliki beberapa ciri khas antara lain memiliki 2 sampai 3 dinding spora, spora terbentuk disisi samping leher *sporiferous saccule*, berwarna hyaline, kuning atau merah kekuningan (Miska dkk, 2016).



Spora Acaulospora yang ditemukan berbentuk bulat dan irreguler dengan dua lapis dinding spora. Warna spora yang ditemukan mulai dari kuning muda, coklat kekuningan, oranye sampai oranye kemerahan. Spora yang ditemukan berbentuk tunggal dan umumnya tidak memiliki dudukan hifa yang jelas seperti pada spora Glomus. Pada beberapa spora ditemukan adanya selaput yang membungkus spora. Selaput pembungkus spora ini juga ditemukan oleh (Sanusi dkk, 2017) dalam meneliti tanaman hortikultura. Permukaan spora ada yang halus namun ada juga spora yang memiliki ornamen pada permukaan spora yang berbentuk bulat kecil sehingga permukaannya terlihat kasar. Jenis ini mirip dengan yang ditemukan oleh (Sunandar, 2016) pada tumbuhan padi varietas siam ketupat yaitu permukaan spora kasar seperti kulit jeruk dengan dinding spora tebal. Ukuran spora yang ditemukan pun bervariasi antara 30-60  $\mu\text{m}$ . Spora Acaulospora sebagian besar tidak bereaksi dengan larutan pewarna Melzer namun ada juga jenis spora yang bereaksi dengan larutan pewarna Melzer.

Genus Acaulospora berkecambah dengan membentuk perisai, memiliki satu cystrix sebagai tanda, bereaksi dengan larutan Melzer yang ditandai dengan perubahan warna menjadi lebih gelap (merah-keunguan), memiliki beraneka ornamen misalnya berbentuk duri pada *A. Spinosa* dan berbentuk tabung pada *A. Tuberculata*, secara khas memiliki struktur dinding yang kompleks, terdiri atas satu dinding luar yang tebal dan satu atau lebih lapisan dinding dalam yang tipis. Lapisan ini hanya dapat dilihat bila dipencet dan diamati di bawah mikroskop compound (Hasyati dkk, 2018).

## **2. Kelimpahan Relatif Spora**

Kelimpahan relatif adalah jumlah genus yang didapat pada lokasi pengamatan dibagi dengan total spora yang ada pada lokasi pengamatan lalu dikali 100%. Data ini menunjukkan besarnya kelimpahan suatu jenis spora dalam suatu lokasi pengamatan. Persentase kelimpahan relatif spora pada sampel tanah akan disajikan pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian spora *Glomus* memiliki kelimpahan relatif tertinggi pada sampel tanah di desa Bukit Harapan yaitu sebesar 83,1% sedangkan *Acaulospora* sebesar 16,9%. Tingginya nilai kelimpahan *Glomus* disebabkan karena genus ini memiliki tingkat penyebaran yang luas dan mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi terhadap berbagai jenis lingkungan dibandingkan dengan jenis CMA lainnya. Salah satu adaptasi yang dilakukan oleh jenis *Glomus* adalah mempunyai perkecambahan spora yang relatif lebih cepat yaitu hanya memerlukan waktu 4-6 hari karena ukuran spora yang lebih kecil menyebabkan fase hidrasi terjadi sangat cepat sehingga aktivitas enzim yang berhubungan dengan proses perkecambahan akan berlangsung lebih cepat (Nuridayanti dkk, 2019). Hal ini juga berkaitan dengan tekstur tanah di tempat pengambilan sampel yang cenderung berliat. Menurut Brundertt dkk. dalam (Sari dan Ermavitalini, 2014) tanah dengan fraksi liat sesuai untuk perkembangan dan pertumbuhan spora *Glomus*. Hal ini berkaitan dengan ukuran spora, spora *Glomus* memiliki ukuran antara 20-200  $\mu\text{m}$  relatif lebih kecil dibandingkan dengan CMA jenis lainnya.

Genus *Acaulospora* lebih sedikit didapatkan daripada genus *Glomus* karena daya saing yang tinggi diantara keduanya. Interaksi kemampuan

beradaptasi yang tinggi memungkinkan untuk genus *Glomus* dapat berkembang biak dengan lebih baik daripada *Acaulospora*. Sehingga sangat mungkin genus *Acaulospora* lebih sedikit ditemukan karena kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan untuk bersporulasi atau karena perkembangannya lebih lambat sehingga dikalahkan oleh genus *Glomus*. Hal ini sejalan dengan pandangan (Songachan et al, 2015) kemunculan satu genus lebih banyak daripada genus lainnya terkait dengan daya saing mereka yang tinggi, interaksi dan kemampuan adaptasi yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk berkembang biak lebih baik daripada yang lainnya.

CMA bersifat musiman sehingga, keberadaannya sangat ditentukan oleh musim. Faktor iklim mempengaruhi spora CMA untuk membentuk spora. Pada musim kemarau CMA aktif untuk membentuk spora baru dan sebaiknya pada musim hujan sporulasi berkurang. Pembentukan spora baru berkurang ketika kelembaban tanah tinggi namun kemampuan untuk berkolonisasi dengan tanaman inang meningkat. Sebaliknya pada kondisi kering sporulasi akan meningkat sehingga persentase kolonisasi menurun (Goltapeh et al, 2008).

### **3. Indikator Lingkungan**

Keberadaan CMA dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban dan pH tanah. Dari hasil pengukuran, desa Bukit Harapan memiliki pH tanah yang netral yaitu antara 6,2, 6,4, 6,8, 7,0 sampai 7,2. Pada kisaran pH 4,4-5,5 jumlah dan jenis mikoriza semakin bertambah hal ini dikarenakan pH yang masam dan ketersediaan nutrisi pada tumbuhan yang masam lebih sedikit dari pada pH tanah yang netral karena unsur hara pada pH masam

hanya sedikit maka disitulah mikoriza berperan dan banyak ditemukan. Umumnya mikoriza lebih tahan terhadap perubahan pH tanah. Akan tetapi perubahan pH pada rhizosfer tanah sangat mempengaruhi kadar Al dalam tanah. Semakin asam pH tanah, kadar Al semakin meningkat yang berdampak pada penurunan jumlah dan jenis mikoriza. Hal ini dikarenakan Al mampu menghambat perkembangan akar akibatnya tumbuhan mudah mengalami cekaman akar dan pertumbuhan terhambat sehingga biomassa dan produktivitasnya menjadi rendah (Sastrahidayat, 2011).

Suhu yang tinggi akan meningkatkan aktifitas cendawan Schreder 1994 dalam Rahmi, (2017) menemukan bahwa infeksi maksimum *Gigaspora* yang diisolasi dari tanah di Florida terjadi di suhu 30-33°C sedangkan menurut (Wahid, 2018) *Glomus* lebih banyak di daerah dingin dengan suhu 20°C. Hasil pengukuran suhu tanah di desa Bukit Harapan yaitu berkisar 26-27°C. Dengan demikian perkembangan CMA dapat terjadi. Menurut Hetrick dalam (Hermawan dkk, 2015) sebagian besar CMA terhambat perkembangannya bila suhu tanah di bawah 5°C dan suhu di atas permukaan tanah 35°C. Apabila suhu tanah 50°C dapat mematikan fungi mikoriza. Suhu yang baik untuk perkembangan CMA adalah 30°C, tetapi untuk kolonisasi miselia yang terbaik adalah pada suhu 28-34°C.

Hasil pengukuran kelembaban tanah di desa Bukit Harapan yaitu kering karena berkisar di angka 1,8, 1,9 sampai 2. Hal ini cocok untuk pertumbuhan CMA karena apabila kelembaban tanah tinggi maka tanah akan semakin padat dan memiliki kandungan air yang banyak sehingga menyebabkan ruang bagi pertumbuhan spora semakin berkurang dan tanah pun akan kekurangan oksigen

karena diisi oleh air (Muzakkir, 2011). Menurut Setiadi dalam (Hermawan dkk, 2015) penurunan konsentrasi oksigen dapat menghambat perkecambahan spora CMA dan kolonisasi akar sehingga perkembangan CMA akan menurun. CMA lebih tahan terhadap kekeringan karena pemakaian air yang lebih ekonomis dan pengaruh tidak langsungnya karena adanya miselin eksternal menyebabkan mikoriza efektif di dalam tanah mengagregasi butir-butir tanah sehingga kemampuan tanah menyimpan air meningkat (Rahmi, 2017).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang ditemukan di perakaran kelapa sawit desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu adalah genus *Glomus* dan *Acaulospora*.
2. Genus *Glomus* memiliki tingkat kelimpahan relatif lebih tinggi yaitu 83,1% dibandingkan dengan genus *Acaulospora* yaitu 16,9%.

#### ***B. Saran***

Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang telah diperoleh dari perakaran kelapa sawit dengan menggunakan pendekatan molekuler.

## KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul Karim*. Bandung: Cordoba, 2015.
- Abdullah bin Muhammad, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Al-Mahali, J dan Jalaluddin as-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Arman, Rossy A., dkk. "Status Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Berbagai Sistem Pengelolaan Dan Umur Tanaman Kelapa Sawit". *E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika*. 4 no. 4 (2015).
- Asmarahman, C., dkk. "Identifikasi Mikroba Potensial Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Lahan Pasca Tambang PT. Holcim Indonesia Tbk. Cibinong, Bogor, Jawa Barat". *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 8 no. 3 (2018) h: 279-285.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara. Nama-Nama Desa, Kelurahan dan Jumlah Dusun/Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014. <https://mamujuutarakab.bps.go.id>. Tanggal akses 12 Maret 2016
- Baker, S.K., dan Cook J.R. *Biological Control of Plant Pathogens*. San Fransisco: WH Freeman and Company, 1974.
- Bille, Hermine Ngalle, dkk. "Brief Review on the Controversies Around Oil Palm (*Elaeis guineensis* Jacq.) Production and Palm Oil Consumption". *International Journal of Regional Development* 3 no. 2 (2016).
- Brundrett, M., N. Bougher, B. Dell, T. Grove dan N. Malajczuk. *Working with Mycorrhizas in Forestry and Agricultural*. Canberra: Australian Center for International Agricultural Research, 1996.
- Delvian. *Peranan Ekologi dan Agronomi Cendawan Mikoriza Arbuskula*. Sumatera Utara: USU Repositor, 2006.
- Dewi, Ni Kadek Sintya, dkk. "Identification of Arbuskular Mycorrhizal Fungi in Rhizosphere Soil of Several Grass Species and Cacao (*Theobroma cacao* L.) Based on Its Spore Morphological Characteristics". *International Journal of Biosciences and Biotechnology*. 11 no. 1 (2014).
- Ditjenbun (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian). Berita Utama: Perkebunan Areal Kelapa Sawit Meningkat. <http://ditjenbun.pertanian.go.id>. Tanggal akses 4 Februari 2019.

- Faiza, Rizka, dkk. "Identifikasi Spora Jamur Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Pada Tanah Tercemar Minyak Bumi di Bojonegoro". *Lentera Bio* 2 no. 1 (2013) h: 7-11.
- Ginting, S.F. "Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) di Bawah Tegakan Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2018.
- Goltapeh EM, YR Danesh, R Prasad, A Varma. "Mychorrizal fungi: What We Know and What Should We Know?". *International journal Mychorriza, State of the Art, Genetics and Molecular Biology*. 1 no. 1 (2008) p: 3-27.
- Hajoeningtjias, O. D. "Ketergantungan Tanaman Terhadap Mikoriza sebagai Kajian Potensi Pupuk Hayati Mikoriza pada Budidaya Tanaman Berkenjutan". *Agritech*. 11 no. 2 (2009) h: 125-136.
- Harahap, FA, dkk. "Pengaruh Pemberian Mikoriza dan Komposisi Media Tanam pada Pembibitan Kelapa Sawit di Pre Nursery". *Jurnal Agroetnologi*. 3 no.1 (2015) h: 390-399.
- Hasbi, R. "Studi Diversitas Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Berbagai Tanaman Budidaya Di Lahan Gambut Pontianak". *Jurnal Agrosains*. 2 no. 1 (2005) h: 46-51.
- Hasyiati, dkk. "Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Beberapa Jenis Pohon di Pegunungan Deudap Pulo Aceh". *Prosding Seminar Nasional Biotik* (2018).
- Hermawan, H., dkk. "Kelimpahan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Tegakan Ekaliptus (*Eucalyptus pellita*) Berdasarkan Tingkat Kedalaman di Lahan Gambut". *Jurnal Hutan Lestari*. 3 no. 1 (2015) h: 124-132.
- Hidayat, C. Studi Biodiversitas FMA pada Tumbuhan Bawah di Tegakan Sengon. *Skripsi*. Departemen Silvicultura Fakultas Kehutanan IPB. 2013
- Husein, E. F., Eri, S., Adrinal dan Yefriwati. "Identifikasi Spora Cendawan Mikoriza (CMA) pada Berbagai Rhizosfer Pisang di Lahan Endemik". *Jurnal Solum V* (2008) h:1829-1994.
- INVAM (International Culture Collection of Vesicular Arbuscular Mychorrhizal Fungi). *Arbuscular Mychorrhizal Fungi*. West Virginia University. <https://invam.wvu.edu/> (2016).
- Indriyanto. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.



- Istigfaiyah, Lily. "Identifikasi dan Karakterisasi Mikoriza pada Tegakan *Gmelina arborea*". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2018.
- Karmilasanti dan Rizki Maharani. "Keanekaragaman Jenis Jamur Ektomikoriza Pada Ekosistem Hutan Dipterokarpa Di KHDTK Labanan, Berau, Kalimantan Timur". *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa* 2 no. 2 (2016) h: 57-66.
- Kartika, Elis. "Isolasi Karakterisasi dan Pengujian Keefektifan Cendawan Mikoriza Arbuskular terhadap Bibit Kelapa Sawit pada Tanah Gambut Bekas Hutan". *Jurnal agronomi* 10 no. 2 (2006) h: 63-70.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2015.
- Kurnia, Gusmiaty dan Sitti Halimah. "Identifikasi dan Karakterisasi Mikoriza pada Tegakan Nyatoh (*Palaquium* sp.). *Jurnal Perennial* 15 no. 1 (2019) h: 51-59.
- Manaroinson, Engelbert dan A.A. Lolong. "Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Berbagai Tekstur Tanah di Lahan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah". *Balai Penelitian Tanaman Palma* 16 no. 2 (2015).
- Margaretta. "Eksplorasi dan Identifikasi Mikoriza Indigen Asal Tanah Bekas Tambang Batubara". *Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati*. 10 no. 5 h: 164-174 (2011).
- Miska, dkk. "Karakterisasi FMA pada Rhizosfer Aren (*Arenga pinnata*) dari Jawa Barat dan Banten". *Jurnal Silvicultura Tropika* 7 no.1 (2016) 18-23.
- Moreira, M., Dilmar, B. Dan Tsai, M. "Biodiversity and Distribution of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in *Araucaria angustifolia* Forest". *Journal Agriculture* 64 no. 4 (2007) p: 393-399.
- Muryati, Sri, dkk. "Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Pada Rhizosfer *Desmodium* sp. Asal PT. Cibaliung Sumberdaya, Banten". *Jurnal Silvicultura Tropika* 7 no. 3 (2016) h: 188-197.
- Musfal. "Potensi Cendawan Mikoriza Arbuskula Untuk Meningkatkan Hasil Tanaman Jagung". *Jurnal Litbang Pertanian* 29 no. 4 (2010).
- Muzakkir. "Hubungan Antara Cendawan Mikoriza Arbuskula Indigeneous dan Sifat Kimia Tanah di Lahan Kritis Tanjung Alai Sumatera Barat". *Jurnal Solum* 8 no. 1 (2011) h: 53-57.
- Nasaruddin. "Kakao, Budidaya dan Beberapa Aspek Fisiologisnya". Yayasan Forest Indonesia dan Cocoa Reserch Group (CRG) Fakultas Pertanian Unhas Makassar, 2009.




- Nicholas et al. Effectiveness and Persistence of Arbuscular Mycorrhiza Fungi on Thepsiology, Nutrien Uptake and Yield of Crimson Seedless Grapevine. *Journal of Agricultural*. 153 (2015) p: 1084-1096.
- Nuhamara, S.T. “Peranan Mikoriza Untuk Reklamasi Lahan Kritis”. Program Pelatihan Biologi dan Bioteknologi Mikoriza, 1994.
- Nuridayanti, S.S., Prasetya, B., Kurniawan, S. “Perbanyakkan Berbagai Jenis Mikoriza Arbuskula di Berbagai Jenis Tanaman Inang”. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 6 no. 2 (2019) h:1375-1385.
- Nusantara, D.A, dkk. “Bekerja dengan Fungi Arbuskula”. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB dan SEAMEO BIOTROP, 2012.
- Omon, R.M . “Pengaruh Dosis Tablet Mikoriza terhadap Pertumbuhan Dua Jenis Meranti Merah Asal Benih dan Stek di HPH PT. ITCIKU, Balikpapan, Kalimantan Timur”. *Info Hutan* 5 no. 4 (2008) h: 329-335.
- Palasta, R. dan Rini M. V. “Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit dengan Aplikasi Fungi Mikoriza Arbuskular dan Beberapa Dosis Pupuk Fosfat”. *Jurnal Agro Industri Perkebunan* 5 no. 2 (2017) h: 97-106.
- Patriyasari, T. “Efektifitas Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas *Scynodon dactylon* yang Diberi Level Salinitas Berbeda”. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Sejarah Kabupaten Pasangkayu. <https://pasangkayukab.go.id>. Tahun akses 2019.
- Penadidik. 13 Negara Penghasil Kelapa Sawit di Dunia. <https://ilmugoeografi.com>. Tanggal akses 5 Mei 2019.
- Pulungan, Ahmad Shafwan S. “Isolasi dan Identifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula Dari Perakaran Tebu (*Sacharum officinarum* L.) di Area Perkebunan Tebu Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang”. *Jurnal Biologi Lingkungan, Industri dan Kesehatan* 1 no. 1 (2009) h: 27-34.
- Purnomo, D.W. “Kefektifan Fungi Mikoriza Arbuskula dalam Meningkatkan Hasil dan Adaptasi Cabai (*Capsicum annum* L.) pada Tanah Bercekan Alumunium”. *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Puspitasari, dkk. “Eksplorasi Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) Indigeneous pada Lahan Jagung di Desa Torjun Sampang Madura”. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. 1 no. 1 (2012).
- Rahmi, Nadia, dkk. “Keanekaragaman Fungi Mikoriza Di Kawasan Hutan Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimun Kabupaten Aceh Besar”. Prosiding Seminar Nasional Biotik, 2017.

- Rao, N.S., Subba. *Mikroorganisme Tanah dan Perumbuhan Tanaman*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Teguh. *Klasifikasi Makhluk Hidup*. Solo: Azka Pressindo, 2017.
- Samad, Abdul. "Strategi Penyelesaian Konflik Terunial Pada Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat". *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2018.
- Samsi, Nur., dkk. "Isolasi dan Identifikasi Morfologi Spora FMA pada Daerah Perakaran Beberapa Tanaman Holtikultura di Lahan Pertanian Desa Sidera. *E Jurnal Agrotekbis* 5 no.2 (2017) h: 204-211.
- Sari, R. R. dan Ermavitalini, D. "Identifikasi Mikoriza dari Lahan Desa Cabbiya Pulau Poteran Sumenep Madura". *Jurnal Sains dan Seni Pomits* 3 no. 2 (2014).
- Sastraidayat, I.R. *Rekayasa Pupuk Hayati Mikoriza dalam Meningkatkan Produksi Pertanian*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan Keserasian Al-Qura'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Setiadi Y dan A Setiawan. "Studi Status Fungi Mikoriza Arbuskula di Areal Rehabilitasi Pasca Penambangan Nikel (Studi Kasus PT INCO Tbk. Sorowako, Sulawesi Selatan)". *Jurnal Silvikultur Tropika* 3 no. 1 (2011) h: 88-95.
- Smith, S. E. Dan Read, D. J. *Mycorrhizal symbiosis*. London: Academic Press, 1997.
- Songachan, L.S., Et al. "Diversity and Species Composition of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Citrus Species". *International Journal of Agricultural Technology* 11 no. 4 (2015) p: 863-873.
- Sukmawaty, Eka, Hafsan dan Asriani. "Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula Dari Perakaran Tanaman Pertanian". *Biogenesis (Jurnal Ilmiah Biologi)* 4 no.1 (2016) h: 16-20.
- Sunandar, Ari. "Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Rhizosfer Tiga Varietas Padi Lokal Kalimantan Barat". *Jurnal Biologi Education* 3 no. 2 (2016) h: 82-86.
- Sundram, S et al. Mycorrhiza in Association with Mycorrhiza Helper Bacteria Suppresses Basal Stem Rot in Oil Palm. *Procedding of International Conference on Mycorrhiza*. 2017.
- Syabhana, S. *Palm Oil and Rubber Plantation Business Prospect*. Bandar Lampung: Politeknik Negeri Lampung, 2007.

- Wirawan, I Wayan Eka Adi, dkk. "Identifikasi Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) dari Rhizosfer Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L.) dan Tomat (*Solanum lycopersicum* L.) serta Perbanyakannya Menggunakan Media Zeolit". *Jurnal Agroteknologi Tropika* 4 no. 4 (2015).
- Umniyatie, Siti dan Victoria Henuhili. "Diversitas Fungi Saprofit pada Tanah Pertanian di Wukirsari, Cangkringan, Sleman Yogyakarta". *Jurnal Sains Dasar* 3 no. 1(2014).
- Yassir, I dan Mulyana O. "Hubungan Potensi Antara Cendawan Mikoriza Arbuskular dan Sifat-Sifat Tanah di Tanah Kritis". *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 3 no.2 (2008) h: 107-115.
- Yulianto, Indra., Bambang Utoyo dan Dewi Riniarti. "Karakteristik Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Beberapa Rhizosfer Tanaman Perkebunan". *Jurnal Agro Industri Perkebunan* 4 no. 2 (2016) h: 97-105.

## LAMPIRAN






**Lampiran 1.** Pengambilan sampel tanah di Desa Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1		Mengukur jarak pengambilan sampel dari pohon
2		Mengukur kedalaman pengambilan sampel
3		Mengukur suhu tanah

4		Mengukur pH dan kelembaban tanah
---	--	----------------------------------

## Lampiran 2. Ekstraksi spora mikoriza

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1		Membuat larutan gula
2		Menimbang sampel tanah dengan timbangan digital sebesar 100 gram
3		Melarutkan tanah dengan air lalu ditunggu hingga tanah mengendap

4		Menyaring tanah dengan saringan spora bertingkat
5		Hasil saringan tanah kemudian disentrifuge
6		Hasil yang didapatkan kemudian di amati di bawah mikroskop
7		Membuat preparat dari spora yang telah didapatkan
8		Mengamati dan memfoto hasil preparat spora menggunakan mikroskop kamera

**Lampiran 3.** Data kelimpahan relatif

Kode Sampel	Jenis Spora	Jumlah
P1T1	Glomus	25
P1T2	Glomus	20
P1T3	Glomus	51
P1T4	Glomus	21
P2T1	Glomus	22
P2T2	Glomus	31
P2T3	Glomus Acaulospora	Glomus = 25 Acaulospora = 18
P2T4	Glomus Acaulospora	Glomus = 59 Acaulospora = 56
P3T1	Glomus Acaulospora	Glomus = 112 Acaulospora = 12
P3T2	Glomus Acaulospora	Glomus = 79 Acaulospora = 3
P3T3	Glomus Acaulospora	Glomus = 153 Acaulospora = 11
P3T4	Glomus Acaulospora	Glomus = 152 Acaulospora = 9
P4T1	Glomus Acaulospora	Glomus = 136 Acaulospora = 31
P4T2	Glomus Acaulospora	Glomus = 130 Acaulospora = 63
P4T3	Glomus Acaulospora	Glomus = 98 Acaulospora = 26
P4T4	Glomus Acaulospora	Glomus = 113 Acaulospora = 37
P5T1	Glomus	16
P5T2	Glomus	32
P5T3	Glomus	22
P5T4	Glomus	17



### Menghitung Kelimpahan Relatif

$$\text{Kelimpahan relatif spora} = \frac{\text{Jumlah spora dalam suatu genus}}{\text{Jumlah spora keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\text{Kelimpahan relatif Glomus (\%)} = \frac{1314}{1580} \times 100\%$$

$$= 83,1 \%$$

$$\text{Kelimpahan relatif Acaulospora (\%)} = \frac{266}{1580} \times 100\%$$

$$= 16,9 \%$$

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap saya Putri Nuragam Muliani biasa disapa Agam. Saya lahir pada tanggal 28 Mei 1997 di Makassar tepatnya di Rumah Sakit Labuang Baji. Saya adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kakak saya bernama Agus Hidayat, adik pertama bernama Nur Qomariah dan adik yang

kedua bernama Ahmad Ihsan Mulya. Kami berempat lahir dari seorang ibu yang bernama Mantasiah dan ayah yang bernama Duani. Kedua orang tua saya asli Sulawesi Selatan namun mereka sekarang berdomisili di Mamuju Utara.

Saya TK di Taman Kanak-Kanak Widya Baras, SD di SDN 018 Bulili dan SMP di SMPN 05 Pasangkayu tepatnya di Mamuju sana, namun untuk beberapa alasan saya memutuskan untuk melanjutkan SMA di Makassar, tepatnya di SMAN 10 Makassar. Diantara alasan saya yaitu agar bisa mandiri dan bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kota mengingat saya dulunya tinggal di daerah yang cukup terpencil dan saya berencana melanjutkan kuliah di Makassar juga. Dan benar saja saya akhirnya kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya lulus di jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.