

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYEBARAN PENYAKIT
KUSTA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 MENGGUNAKAN
REGRESI BINOMIAL NEGATIF**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh:

**HABIBA
60600116019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habiba

NIM : 606001160199

Jurusan : Matematika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab penyebaran Penyakit Kusta di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Menggunakan Regresi Binomial Negatif

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan data, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber cuplikan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Samata-Gowa, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan.

Habiba





NIM: 60600116019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penyebaran Penyakit Kusta di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Menggunakan Regresi Binomial Negatif”, yang disusun oleh Saudari **Habiba**, Nim: **60600116019** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **23 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **14 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 23 Agustus 2021 M
14 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd(.....)	
Sekretaris	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)	
Munaqisy I	: Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si. (.....)	
Munaqisy II	: Rofia Masrifah, S.Pd. I., M.Pd. I (.....)	
Pembimbing I	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si. (.....)	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
Nip. 197194122000031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus
asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir*

(Q.S Yusuf : 87)

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang tuaku yang telah banyak mencurahkan kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materi, kedua adikku, dan teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas doa dan support yang telah diberikan. Kalian alasanku untuk tetap berjuang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, suatu bentuk syukur penulis kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penyebaran Penyakit Kusta Di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Menggunakan Regresi Binomial Negatif”***. Serta, shalawat dan salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat Islam. Shalawat dan salam pula kami haturkan kepada istri-istri beliau, keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in* serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan study (S1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini disusun dengan usaha yang sungguh-sungguh dari penulis, dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Banyak kesulitan yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta kekuatan doa yang tiada hentinya terutama dari kedua orang tua yang merupakan motivator terhebatku yang tiada duanya ayahanda **Syamsul Albar** Ibunda **Fatimah** serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat sel. proses penyusunan skripsi.

Tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar serta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
4. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si**, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Muh. Irwan, S.Si., M.Si**, selaku pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Tim Penguji Bapak **Irwan, S.Si., M.Si** dan Ibu **Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si** selaku Penguji I serta Ibu **Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag** dan Ibu

Rofiah Masrifah, S.Pdi., M.Pdi selaku Penguji II atas bimbingan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman sejawat “TR16ONOMETRI” teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan.
8. Kepada segenap keluarga besar HMJ Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
9. Kepada **Nurliani, Jumriani, Anita, cuaca, rika, Laras dan Refildha** yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada anggota **Ghibers (caca, firda, ilma, darmi dan fitri)** yang telah mengisi hari-hari saya sertaselalu mendukung dan menghibur saya saat lelah.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun itu penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan, pahala dan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Jurusan Matematika serta pembaca pada umumnya.

Samata, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Distribusi Binomial Negatif	7
B. Model Regresi Binomial Negatif	8
C. Regresi Poisson	9

D. Penaksiran Parameter dengan Metode <i>Maximum Likelihood</i>	12
E. Statistik Uji Parameter Regresi Binomial Negatif	17
F. Uji Multikolinearitas	20
G. Overdispersion	21
H. Uji Kesesuaian Model	23
I. Penyakit kusta	23
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data	26
C. Waktu dan Tempat Penelitian	26
D. Variabel dan Definisi oprasional Variabel	26
E. Teknik Analisis Data	27
F. Prosedur Penelitian	28
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil	29
1. Deskriptif Data	29
2. Uji Multikolinearitas	30
3. Uji Overdispersi pada Model Regresi Poisson	37
4. Model Regresi Binomial Negatif	37
B. Pembahasan	41
BAB V	43
PENUTUP	43

A. Kesimpulan43

B. Saran.....43

DAFTAR PUSTAKA.....45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif.....	28
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas.....	35
Tabel 4.3 Kesesuaian Model Regresi Binomial Negatif.....	37
Tabel 4.4 Uji <i>Overall</i> Model Regresi Binomial Negatif.....	38
Tabel 4.5 Uji Parsial Model Regresi Binomial Negatif.....	39



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Jumlah Kasus Kusta Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	29
Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018	30
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	31
Gambar 4.4 Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	32
Gambar 4.5 Persentase Jumlah Tenaga Medis di Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	33
Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	34

DAFTAR SIMBOL

Y	: Variabel respon
X	: Variabel penjelas
x	: Banyaknya percobaan
$Var(Y)$: Variansi (Y)
$E(Y)$: Nilai tengah (Y)
ϕ	: Parameter dispersi
$\hat{\mu}_i$: Nilai ekspektasi
y_i	: Jumlah kejadian
e	: Nilai euler
β_0	: Nilai konstanta
β_j	: Parameter regresi ke-j
$\hat{\beta}_j$: Taksiran parameter ke-j
η	: Penduga linear
D	: Nilai uji Devians
α	: Taraf signifikan
$SE(\beta)$: Standar error dari β
db	: Derajat bebas
$g(.)$: Fungsi link
L	: Likelihood
Γ	: Gamma
W	: Bobot nilai

ABSTRAK

Nama : Habiba
NIM : 60600116019
Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penyebaran Penyakit Kusta di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Menggunakan Regresi Binomial Negatif

Skripsi ini membahas tentang pemodelan regresi binomial negatif untuk menganalisis faktor penyebab penyebaran penyakit pada kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Jumlah penderita kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 terbilang sangat tinggi sebanyak 1031 jiwa. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus penderita kusta. Dalam penelitian ini, jumlah kasus kusta dapat dimodelkan menggunakan analisis regresi poisson. Akan tetapi, pada model tersebut terjadi masalah overdispersi sehingga analisis dilanjutkan menggunakan analisis regresi binomial negatif sehingga diperoleh hasil dengan satu variabel yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah kasus kusta yaitu variabel jumlah penduduk (X_2). Model regresi binomial negatif yang diperoleh untuk jumlah kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

$$(\hat{\mu}_i) = \exp(2,714 + 2,325X_2)$$

Kata Kunci: Kusta, *Overdispersi*, Regresi Binomial Negatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Habiba
NIM : 60600116019
Title : *Analysis of Factors Causing the Spread of Leprosy in South Sulawesi in Using Negative Binomial Regression*

This thesis discusses negative binomial regression modeling to analyze the factors causing the spread of the disease in cases of leprosy in South Sulawesi Province in 2018. The number of people with leprosy cases in South Sulawesi Province in 2018 was very high as many as 1031 people. Therefore, an analysis is needed to find out what factors that significantly influence the number of cases of leprosy patients. In this research study, the number of leprosy cases can be modeled using Poisson regression analysis. However, in this model there is an overdispersion problem so that the analysis is continued using negative binomial regression analysis so that results are obtained with one variable that has a significant effect on the number of leprosy cases, namely the population variable (X_2). The negative binomial regression model obtained for the number of leprosy cases in South Sulawesi Province in 2018 is as follows:

$$(\hat{\mu}_i) = \exp(2,714 + 2,325X_2)$$

Keywords: Leprosy, Overdispersion, Negative Binomial Regression

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan, di mana kesejahteraan memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang salah satunya dari pola hidup. Penting untuk menetapkan pola hidup bersih karena kondisi lingkungan yang berdampak pada kesehatan, begitupun sebaliknya lingkungan yang kotor memungkinkan munculnya bakteri yang dapat membawa penyakit. Kusta merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri jenis *Mycrobacterium Leprae*.

Penyakit kusta dapat dengan mudah menular dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan cairan dari saluran pernapasan (droplet) yang berasal dari ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki jumlah penderita kusta dengan jumlah yang relatif besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 bahwa jumlah penderita penyakit kusta di Sulawesi Selatan sebanyak 1.124 orang sedangkan pada tahun 2018 yaitu 1.031 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah penderita penyakit kusta dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hal tersebut dapat disebabkan karena pola hidup bersih dikalangan masyarakat semakin meningkat ataupun karena faktor yang lainnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lucky Chyntia (2015) dan Sari Putri (2010) diperoleh hasil bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap penyakit kusta antara lain persentase rumah sehat, tingkat kepadatan penduduk dan persentase rumah tangga yang berlokasi di daerah kumuh.

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit kusta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi pemukiman penduduk. Selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan tingkat persentase penduduk miskin, sebab semakin tinggi tingkat persentase penduduk miskin maka peluang untuk memperoleh pola hidup sehat akan semakin kecil, bukan karena ketidak sadaran akan pentingnya pola hidup sehat akan tetapi terkadang perihal ekonomi yang sering menjadi penghalang khususnya bagi masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh hidup yang sehat. Adapun kategori suatu masyarakat dikatakan miskin jika dalam rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi kategori dari badan pusat statistik yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari $8m^2$ per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan $500m^2$, buruh tani, nelayan buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,-

per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, dan tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Selain itu, penyakit kusta sudah ada sejak masa Nabi karena beliau memerintahkan untuk menghindar dari orang yang berpenyakit kusta seperti dalam salah satu sabdanya:

فَرِّمَنِ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفْرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya:

“Menghindarlah kamu dari orang yang terkena judzam (kusta), sebagaimana engkau lari dari singa yang buas.” (HR al- Bukhari)

Sebagaimana hadist diatas bahwa kita diperintahkan untuk menjauh dari orang yang terkena penyakit kusta, diibaratkan berlari dari singa yang buas karena penyakit kusta merupakan salah satu jenis penyakit yang menular. Salah satu cara menghindari penyakit adalah memperhatikan kebersihan. Dalam Islam Kebersihan dianjurkan seperti dalam Q S Al- Mudatsir/ 74:4, yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

“dan bersihkanlah pakaianmu”¹

Ibnu Qatsir menjelaskan bahwa, Allah Swt. memerintahkan kepada umatnya agar mensucikan diri (membersihkan diri) sebelum menunaikan sholat

¹Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al- Kautsar. 2009)

dan atau dalam keadaan berjunub. Sesungguhnya Allah Swt. menginginkan agar senantiasa dalam keadaan suci atau bersih dan menyempurnakan nikmatnya serta bersyukur kepada Allah Swt. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat sebab kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.²

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan baik itu dengan memperhatikan pola hidup sehat, kondisi lingkungan dan lain sebagainya agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang salah satunya yaitu penyakit kusta. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit kusta dapat diketahui dengan statistika, salah satu metodenya adalah menggunakan regresi binomial negatif. Regresi binomial negatif memiliki kegunaan yang sama dengan regresi poisson yaitu untuk menganalisis hubungan antara variable respond dan variable penjelas. Akan tetapi, regresi binomial negatif lebih fleksibel karena regresi binomial negatif tidak mengasumsikan nilai variansi harus sama dengan nilai *mean*. Sehingga analisis yang dapat digunakan untuk membuat model serta mengkaji hubungan antara jumlah penderita penyakit kusta dengan factor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya yaitu analisis regresi binomial negatif.

²Syaamil Qur'an. *Tafsir Iman Ibnu Katsir* (Begawanariyanta.wordpress.com: Miracle The Reference)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model regresi Binomial Negatif pada penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model regresi Binomial Negatif pada jumlah penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya baik dari kelebihan maupun kelemahan menggunakan regresi Binomial Negatif.
2. Dengan diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan penyakit kusta, bisa menjadi salah satu acuan dalam proses pemberantasan penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan oleh instansi yang berkaitan, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar dalam pembahasan tidak terlalu meluas maka dalam penelitian ini di fokuskan hanya pada asumsinya agar tidak terjadi komplikasi pada penderita penyakit kusta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Distribusi Binomial Negatif

Distribusi binomial negatif merupakan salah satu peubah acak diskrit yang terbentuk dari percobaan bernoulli. Dimana pada binomial negatif digunakan untuk memodelkan kejadian dengan jumlah. Berbeda dengan poisson yang memiliki nilai tengah dan varians yang sama sedangkan pada binomial negatif varians lebih besar daripada nilai tengah. Persamaan umum distribusi binomial negatif sebagai berikut:

$$P(Y = k) = \binom{k+r-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^k \quad (2.1)$$

Dimana:

Y = Jumlah kegagalan sebelum r sukses

r = Sukses dalam n usaha bebas

θ = Probabilitas sukses pada tiap percobaan

Dengan nilai tengah *variance* sebagai berikut:

$$E(Y) = \frac{r(1-\theta)}{\theta} = \mu \quad (2.2)$$

$$\text{Var}[Y] = \frac{r(1-\theta)}{\theta^2} = \mu\Phi \quad (2.3)$$

Jika $\Phi > 0$ maka penyebaran lebih besar dari rata-rata atau lebih kecil jika $\Phi < 0$. Dan jika $\Phi = 0$ maka distribusinya menjadi seperti poisson. Ketika hal demikian terjadi, maka modelnya menjadi lebih fleksibel.³

B. Model Regresi Binomial Negatif

Model regresi binomial negatif berasal dari distribusi *poisson-gamma mixture* yang merupakan penerapan dari GLM yang mendeskripsikan hubungan antar variabel, baik variabel dependent maupun variabel independent. Regresi binomial negatif pada umumnya digunakan dalam memodelkan data dengan variabel respon merupakan data count. Hal tersebut merupakan salah satu alternatif dari regresi poisson yang mengalami overdispersi ($\text{var} > \text{mean}$).

Misalkan y_i adalah nilai dari peubah respon untuk pengamatan ke- i dan x_i adalah vektor dari nilai peubah untuk pengamatan ke- i dengan $i = 1, 2, \dots, n$. Model regresi binomial negatif mengasumsikan bahwa peubah respon berganda dapat dituliskan sebagai berikut:⁴

$$\begin{aligned} \ln(\mu_i) &= \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} \varepsilon_i \\ \mu_i &= e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} \varepsilon_i} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Dimana:

³Ronald E Walpole & Raymond H Myers. *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuan* (Bandung: ITB. 1995). h.149-150

⁴Alan Agresti. *An Introduction to Categorical Data Analysis*(Canada: John Wiley and Sons. 2007). h.81

μ_i = nilai ekspektasi dari y_i yang berdistribusi Binomial
Negatif

β_0 = nilai konstanta

$X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$ = nilai variabel independen ke-i

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ = nilai koefisien variabel independen ke-i

ε_i = galat untuk pengamatan ke-i

C. Regresi Poisson

Regresi Poisson merupakan salah satu penerapan dari *Generalisasi Model Linier* (GML) yang menggambarkan hubungan antara variabel terikat Y berupa data diskrit atau data cacahan (*count data*) dengan variabel bebas berupa data diskrit, kontinu, kategorik atau campuran. Jika variabel terikat Y merupakan data diskrit yang berdistribusi Poisson dengan parameter $\mu_i > 0$, dengan μ_i merupakan rata-rata dari variabel terikat Y , maka fungsi masa peluangnya adalah sebagai berikut.⁵

$$f(y_i; \mu_i) = \frac{e^{-\mu_i} \mu_i^{y_i}}{y_i!}; \quad y_i = 0, 1, 2, \dots, n \quad (2.5)$$

Model regresi poisson adalah model regresi nonlinier yang berasal dari distribusi poisson yang merupakan penerapan dari *GLM* yang menggambarkan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen, dengan variabel dependen berupa data diskrit/*count* dengan asumsi $E(y_i) = var(y_i) = \mu_i$ atau

⁵ Noriszura Ismail dan Abdul Aziz Jemain, *Handling Overdispersion with Negative Binomial and Generalized Poisson Regression Models* (Casualty Actuarial Society Forum, Winter 2007), hal.106.

disebut equidispersi. Akan tetapi ada kalanya asumsi *equidispersi* tidak terpenuhi, dimana nilai variansinya lebih besar dari nilai mean (*overdispersi*) yang mengakibatkan model regresi Poisson tidak sesuai dan penduga parameter yang bias.

Generalized Linear Model (GLM) merupakan perluasan dari model regresi umum untuk respon berdistribusi dalam keluarga eksponensial dan modelnya merupakan fungsi dari nilai harapannya. Ada tiga komponen dalam GLM yaitu:⁶

1. *Random component* (komponen acak) yang ditunjukkan dengan peubah respon Y dan peluang distribusinya.
2. *Systematic component* (komponen sistematis) yang ditunjukkan dengan peubah penjelas yang digunakan.
3. *Link function* (fungsi penghubung) ditunjukkan dengan fungsi nilai harapannya sama dengan komponen sistematisnya.

Regresi Poisson termasuk salah satu dari *Generalized Linear Model* (GLM) karena peubah respon memiliki sebaran dalam keluarga eksponensial yaitu sebaran Poisson. Regresi Poisson mengasumsikan bahwa peubah respon yang menyebar Poisson, tidak ada multikolinearitas antar peubah penjelas, dan memiliki ragam yang sama dengan nilai tengahnya. Asumsi multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai korelasi antar peubah penjelas. Jika nilai korelasinya lemah ($r < 0.5$) maka dianggap tidak ada masalah multikolinearitas. Pada GLM terdapat sebuah fungsi yang linear dan menghubungkan nilai tengah peubah respon dengan sebuah peubah penjelas yaitu:

⁶ Alan Agresti, *Categorical Data Analysis* (Canada: John Wiley and Sons, 2002), h.116.

$$g(\mu_i) = \eta_i = x_i^T \beta$$

$$g(\mu_i) = \eta_i = (\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik}) + \varepsilon_i \quad (2.6)$$

Fungsi diatas disebut fungsi penghubung (*link function*). Hubungan antara nilai rata-rata dengan peubah penjelas linear adalah:

$$\mu_i = g^{-1}(\eta_i) = g^{-1}(x_i^T \beta) \quad (2.7)$$

Terdapat dua fungsi penghubung yang biasa digunakan dalam regresi Poisson. Pertama adalah penghubung identitas (*identitylink*). Kedua adalah penghubung log (*log link*). Fungsi penghubung identitas memiliki bentuk:

$$g(\mu_i) = \mu_i = x_i^T \beta \quad (2.8)$$

Dan fungsi penghubung log berbentuk:

$$g(\mu_i) = \ln(\mu_i) = x_i^T \beta \quad (2.9)$$

Fungsi penghubung log adalah fungsi yang lebih cocok digunakan karena fungsi log menjamin bahwa nilai peubah yang diharapkan dari peubah responnya akan bernilai non negatif. Sehingga fungsi penghubung yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi penghubung log. Hubungan antara nilai tengah peubah respon dengan peubah penjelas linear adalah sebagai berikut:

$$\ln(\mu_i) = e^{x_i^T \beta}$$

$$e^{\ln(\mu_i)} = e^{x_i^T \beta}$$

$$\mu_i = e^{x_i^T \beta} \quad (2.10)$$

Sehingga model regresi Poisson dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln(\hat{\mu}_i) &= \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i \\ \hat{\mu}_i &= \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik}) + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (2.11)$$

Dimana:

$\hat{\mu}_i$ = nilai ekspektasi dari y_i yang berdistribusi Poisson

β_0 = nilai konstanta

$X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$ = nilai variabel independen ke- i

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ = nilai koefisien variabel independen ke- i

ε_i = galat untuk pengamatan ke- i

dengan X_{ik} merupakan peubah penjelas ke- k pada pengamatan ke- i dan $i = 1, 2, \dots, n$ dan $\hat{\mu}_i$ adalah nilai tengah banyaknya kejadian.⁷

D. Penaksiran Parameter Dengan Metode *Maximum Likelihood*

Perlu dilakukan penaksiran pada beberapa parameter dalam model regresi binomial negatif yang tidak diketahui. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penaksiran parameter yaitu dengan menggunakan metode *maximum likelihood* (MLE). Langkah-langkah penaksiran parameter menggunakan MLE sebagai berikut:

Misalkan terdapat sampel acak berukuran n yaitu $(y_i, (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}))$

⁷ Alan Agresti, *An Introduction to Categorical Data Analysis* (Canada: John Wiley and Sons, 2007), h.75.

untuk $i = 1, 2, \dots, n$, maka dengan mensubstitusikan $\mu_i = \exp(x_i'\beta)$ ke dalam fungsi probabilitas bersyarat untuk variabel acak Y_i diberikan nilai $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ pada persamaan (2.6) akan diperoleh:

$$f(y_i; \beta, \alpha) = \frac{\Gamma\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right)}{y_i! \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)} \left(\frac{\alpha \exp(x_i'\beta)}{1 + \alpha \exp(x_i'\beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x_i'\beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \quad (2.12)$$

Fungsi *likelihood* diperoleh dari fungsi kepadatan peluang bersama Y_i yang diberikan nilai $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ yang dinotasikan dengan $L(\beta, \alpha)$ yaitu:

$$\begin{aligned} L(\beta, \alpha) &= \prod_{i=1}^n f(y_i; \beta, \alpha) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right)}{y_i! \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)} \left(\frac{\alpha \exp(x_i'\beta)}{1 + \alpha \exp(x_i'\beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x_i'\beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \end{aligned} \quad (2.13)$$

Diketahui bahwa $\frac{\Gamma(y+c)}{\Gamma(c)} = c(c+1)(c+2) \dots (c+y-1)$, sehingga

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)} &= \left(\frac{1}{\alpha}\right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha} + 2\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{\alpha} + y_i - 1\right) \\ &= \left(\frac{\alpha}{\alpha}\right) \left(\frac{1}{\alpha}\right) \cdot \left(\frac{\alpha}{\alpha}\right) \left(\frac{1}{\alpha} + 1\right) \cdot \left(\frac{\alpha}{\alpha}\right) \left(\frac{1}{\alpha} + 2\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{\alpha}{\alpha}\right) \left(\frac{1}{\alpha} + y_i - 1\right) \\ &= \left(\frac{1}{\alpha}\right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right) (1 + \alpha) \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right) (1 + 2\alpha) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right) (1 + (y_i - 1)\alpha) \\ &= \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{y_i} \prod_{r=0}^{y_i-1} (1 + r\alpha) \end{aligned} \quad (2.14)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.14) ke persamaan (2.13), maka fungsi *likelihood* $L(\beta, \alpha)$ menjadi

$$\begin{aligned}
L(\beta, \alpha) &= \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right)}{y_i! \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)} \left(\frac{\alpha \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \\
&= \prod_{i=1}^n \left\{ \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{y_i} \prod_{r=0}^{y_i-1} (1 + \alpha r) \left(\frac{1}{y_i!}\right) \left(\frac{\alpha \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \right\} \\
&= \prod_{i=1}^n \left\{ \prod_{r=0}^{y_i-1} (1 + \alpha r) \left(\frac{1}{y_i!}\right) \left(\frac{\exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \right\} \quad (2.15)
\end{aligned}$$

Selanjutnya, dari fungsi *likelihood* diambil nilai log-nya sehingga diperoleh fungsi log-*likelihood* dari persamaan di atas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
l(\beta, \alpha) &= \ln L(\beta, \alpha) \\
&= \ln \prod_{i=1}^n \left\{ \prod_{r=0}^{y_i-1} (1 + \alpha r) \left(\frac{1}{y_i!}\right) \left(\frac{\exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{y_i} \left(\frac{1}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \left(\sum_{r=0}^{y_i-1} \ln(1 + \alpha r) \right) - \ln(y_i!) \right. \\
&\quad \left. + y_i \ln(\exp(x'_i \beta)) - \left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \ln(1 + \alpha \exp(x'_i \beta)) \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \left(\sum_{r=0}^{y_i-1} \ln(1 + \alpha r) \right) - \ln(y_i!) \right. \\
&\quad \left. + y_i (x'_i \beta) - \left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \ln(1 + \alpha \exp(x'_i \beta)) \right\} \quad (2.16)
\end{aligned}$$

Untuk mencari taksiran dari parameter-parameter yaitu $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$, dan $\hat{\alpha}$, fungsi log-*likelihood* pada persamaan (2.16) diturunkan secara parsial terhadap masing-masing parameter yang bersesuaian kemudian di samadengankan nol, sehingga didapatkan persamaan-persamaan berikut.

- 1) Turunan parsial terhadap β_0

$$\begin{aligned}
\frac{\partial l(\beta, \alpha)}{\partial \beta_0} &= \sum_{i=1}^n \left\{ y_i - \frac{\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i + y_i \alpha \exp(x'_i \beta) - \left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i + y_i \alpha \exp(x'_i \beta) - y_i \alpha \exp(x'_i \beta) - \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i - \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\}
\end{aligned}$$

2) Turunan parsial terhadap β_1

$$\begin{aligned}
\frac{\partial l(\beta, \alpha)}{\partial \beta_1} &= \sum_{i=1}^n \left\{ y_i x_{1i} - \frac{\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha x_{1i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{1i} + y_i x_{1i} \alpha \exp(x'_i \beta) - \left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha x_{1i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{1i} + y_i x_{1i} \alpha \exp(x'_i \beta) - y_i \alpha x_{1i} \exp(x'_i \beta) - x_{1i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{1i} - x_{1i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{x_{1i} (y_i - \exp(x'_i \beta))}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\}
\end{aligned}$$

3) Turunan parsial terhadap β_2

$$\frac{\partial l(\beta, \alpha)}{\partial \beta_2} = \sum_{i=1}^n \left\{ y_i x_{2i} - \frac{\left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha x_{2i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{2i} + y_i x_{2i} \alpha \exp(x'_i \beta) - \left(y_i + \frac{1}{\alpha}\right) \alpha x_{2i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{2i} + y_i x_{2i} \alpha \exp(x'_i \beta) - y_i \alpha x_{2i} \exp(x'_i \beta) - x_{2i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{y_i x_{2i} - x_{2i} \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{x_{2i} (y_i - \exp(x'_i \beta))}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\}
\end{aligned}$$

Karena turunan parsial terhadap $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ memiliki hasil yang similar, maka dengan cara yang serupa untuk $\beta_m, m = 3, 4, \dots, k$ diperoleh:

$$\frac{\partial l(\beta, \alpha)}{\partial \beta_m} = \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{x_{mi} (y_i - \exp(x'_i \beta))}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} = 0 \quad (2.17)$$

4) Turunan parsial terhadap α

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial l(\beta, \alpha)}{\partial \alpha} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{r=0}^{y_i-1} \left(\frac{r}{1 + \alpha r} \right) + \frac{1}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha \exp(x'_i \beta)) \right. \\
&\quad \left. - \left(y_i + \frac{1}{\alpha} \right) \frac{\exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{r=0}^{y_i-1} \left(\frac{r}{1 + \alpha r} \right) + \frac{1}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha \exp(x'_i \beta)) \right. \\
&\quad \left. - \frac{\left(y_i + \frac{1}{\alpha} \right) \exp(x'_i \beta)}{1 + \alpha \exp(x'_i \beta)} \right\} = 0 \quad (2.18)
\end{aligned}$$

Karena persamaan-persamaan di atas tidak linear dalam masing-masing

parameternya, maka untuk mencari nilai dari $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$, dan $\hat{\alpha}$ digunakan metode iterasi Newton-Raphson. Rumus Newton-Raphson sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_{t+1} = \hat{\beta}_t - (H_t)^{-1}G_t \quad (2.19)$$

dengan

$\hat{\beta}_{t+1}$ = vektor estimasi parameter pada iterasi ke $t + 1$

$\hat{\beta}_t$ = vektor estimasi parameter pada iterasi ke t

$(H_t)^{-1}$ = invers dari matriks Heissan yang isi dari matriks merupakan turunan kedua dari $\ln L(\beta)$

G_t = vektor yang berisi turunan pertama dari $\ln L(\beta)$

Langkah iterasi dengan metode Newton-Raphson sebagai berikut:⁸

- 1) Menentukan nilai awal, $t = 0$
- 2) Sehingga $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_0 - (H_0)^{-1}G_t$
- 3) Iterasi dilakukan sampai diperoleh nilai konvergen $\hat{\beta}_{c+1} \cong \hat{\beta}_c$.

E. Statistik Uji Parameter Regresi Binomial Negatif

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengujian pada model regresi binomial negatif antara lain menggunakan uji serentak dan uji parsial. Uji serentak digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama serta digunakan sebagai uji kelayakan model pada regresi binomial negatif.

⁸Widya Wahyuni, *Penaksir Parameter Model Regresi Binomial Negatif pada Kasus Overdispersi* (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hal.25-29.

1. Uji Serentak

Uji serentak bertujuan untuk melihat pengaruh serentak variabel penjelas terhadap variabel respon serta sebagai uji kelayakan model. Adapun langkah- langkah uji serentak sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

Adapun hipotesis- hipotesis untuk uji serentak pada regresi binomial negatif sebagai berikut:

$H_0: \beta_0 = \dots = \beta_5 = 0$ (tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen)

H_1 : paling tidak ada satu j dengan $\beta_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, p$ (paling sedikit ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen)

b. Tingkan Signifikansi

Tingkat signifikansi pada uji serentak dapat dilihat dari nilai α yang diperoleh, dimana nilai α yang digunakan yaitu sebesar 0.05.

c. Statistik Uji

$$\begin{aligned} G &= -2 \log \frac{L_0}{L_1} \\ &= -2(\log L_0 - \log L_1) \end{aligned} \quad (2.20)$$

Dimana:

L_0 = Likelihood tanpa variabel independen

L_0 = Likelihood dengan variabel independen

Pada statistik uji G tabel *c hi-square* dibandingkan dengan derajat bebas atau db (banyaknya variabel), dengan daerah penolakan H_0 apabila $G > \chi^2_{(a,db)}$ atau berdasarkan *p-value* yang dibandingkan dengan nilai α , dengan daerah penolakan $p\text{-value} < \alpha = 0.05$.

2. Uji Parsial

Uji parsial bertujuan untuk melihat pengaruh secara individu antar variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah- langkah uji parsial pada regresi binomial negatif adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

Adapun hipotesis- hipotesis untuk uji parsial pada regresi binomial negatif sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

$H_1: \beta_j \neq 0$ (variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen)

b. Tingkat Signifikansi

Seperti halnya pada uji overall tingkat signifikansi untuk uji parsial dengan memperhatikan nilai α yang diperoleh sebesar 0.05.

c. Statistik Uji

$$W = \left(\frac{\beta_j}{SE(B_j)} \right)^2 \quad (2.21)$$

Dimana:

W = Bobot nilai

β_j = Nilai dugaan parameter β_j

$SE(B_j)$ = Dugaan galat baku β_j

Nilai uji W mengikuti distribusi *chi-square* sehingga dibandingkan dengan *chi-square* tabel $X^2_{(\alpha, db=1)}$ maka kriteria uji untuk pengambilan keputusan dengan taraf nyata (α) adalah tolak H_0 jika nilai $W > X^2_{(\alpha, db=1)}$ dan dapat dilihat berdasarkan $p\text{-value} < \alpha$, dimana nilai $\alpha = 0,05$.

F. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis regresi. Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya hubungan yang tinggi antara variabel independen yang digunakan dalam pemodelan regresi. Multikolinearitas terjadi ketika antar variabel bebas memiliki tingkat koefisien korelasi relatif tinggi. Akibat terjadinya multikolinearitas mengakibatkan adanya kesalahan pada standar estimasi yang kemudian akan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya variabel dependen dalam model. Ketika hal demikian terjadi hipotesis nol akan ditolak, sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid atau akurat untuk menaksir variabel independen.

Deteksi multikolinearitas yang terdapat pada model regresi dapat dilihat dengan menggunakan nilai *variance inflation factors* (VIF), jika nilai VIF suatu

model kurang dari 10, maka model tersebut dikatakan bebas dari kasus multikolinearitas.⁹ Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

a) Hipotesis

H_0 = Tidak terjadi multikolinearitas

H_1 = Terjadi multikolinearitas

b) Taraf Signifikan

$\alpha = 0,05$

c) Daerah Kritis

Tolak H_0 jika nilai $VIF > 10$

d) Statistik Uji

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)} \quad (2.22)$$

dengan R^2 didefinisikan sebagai nilai koefisien determinasi.

G. Overdispersion

Dalam penelitian yang menggunakan analisis data *count*, terdapat asumsi yang harus dipenuhi yaitu equidispersi. Dimana nilai variansi dan mean dari variabel respon harus sama. Namun, seringkali dijumpai suatu keadaan di mana nilai variansi dan mean dari variabel respon tidak sama atau tidak memenuhi

⁹ Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Rajawali Pers. 2017). h.102-103

asumsi equidispersi. Pengujian equidispersi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\emptyset = \frac{\text{nilai deviance}}{df} \quad (2.23)$$

Dimana \emptyset merupakan parameter dispersi dari df merupakan *degree of freedom* atau derajat bebas. Apabila nilai *deviance* dibagi dengan derajat bebas menghasilkan nilai lebih besar dari 1 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kasus overdispersi, akan tetapi, jika nilai yang diperoleh kurang dari satu maka disimpulkan bahwa terjadi kasus equidispersi.¹⁰

Salah satu asumsi yang harus terpenuhi pada regresi binomial negatif yaitu tidak terjadinya kasus overdispersi. Overdispersi terjadi ketika nilai varians yang diperoleh lebih besar dari nilai rata-ratanya, hal tersebut biasanya terjadi dalam analisis data cacah. Ketika terjadi kasus *overdispersion* akan berpengaruh terhadap nilai standar error (*under estimate*) sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak valid. Kasus *overdispersion* dapat dituliskan sebagai berikut:¹¹

$$Var(Y) > E(Y) \quad (2.24)$$

Kasus overdispersi dapat diketahui dengan melihat nilai pearson *chi-square* dan nilai devians dibagi dengan nilai derajat bebas memperoleh nilai yang

¹⁰Damah. "Mengatasi Overdispersi Pada Model Regresi Poisson dengan Generalized Poisson Regression I", (*Jurnal Eksponensial*, Vol. 2 No. 2 November 2011). H.5

¹¹Alan Agresti. *An Introduction to Categorical Data Analysis*(Canada: John Wiley and Sons, Inc. 2007). h.80

lebih besar daripada 1. Adapun bentuk umum persamaan devians sebagai berikut:¹²

$$D = 2 \sum_{i=1}^n [y_i \ln \left(\frac{y_i}{\hat{y}_i} \right) - (y_i - \hat{y}_i)] \quad (2.25)$$

Dimana:

D = nilai devians

y_i = nilai aktual respon amatan ke- i

\hat{y}_i = nilai dugaan respon amatan ke- i

Nilai *pearson Chi-Square* didapatkan dari persamaan sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{\hat{y}_i} \quad (2.26)$$

Dimana:

X^2 = nilai *pearson Chi-Square*

y_i = nilai aktual respon amatan ke- i

\hat{y}_i = nilai dugaan respon amatan ke- i

H. Uji Kesesuaian Model

Kesesuaian model regresi binomial negatif atau disebut juga *goodness of fit* dapat diketahui dari nilai *devians* dan *pearson chi-square* yang dibagi dengan

¹²Pradawati. Dkk. Penerapan Regresi Binomial Negatif untuk Mengatasi Overdispersi Pada Regresi Poisson (Jurnal Matematika Vol.2 No.2. 2013). h.7

derajat bebasnya. Dikatakan memiliki kesesuaian model yang tinggi ketika nilai *goodnes of fit* yang diperoleh mendekati 1. Tingkat kesalahan akan semakin kecil ketika nilai devians dan *pearson chi- square* juga semakin kecil.¹³

I. Penyakit Kusta

Kusta merupakan salah satu jenis penyakit menular menahun yang disebabkan oleh *mycobacterium leprae* (kuman kusta) yang menyerang syaraf tepi, kulit, dan jaringan tubuh lainnya yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan sebagian anggota tubuh penderita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kusta terdiri dua tipe yaitu kusta tipe *pausibaciler* (PB) dan kusta tipe *multibaciler* (MB).

Kelompok yang beresiko tinggi terkena kusta adalah kelompok yang tinggal di daerah endemik dengan kondisi tempat tidur yang tidak memadai, air yang tidak bersih, asupan gizi yang buruk dan adanya penyertaan penyakit lain yang dapat menekan sistem imun.¹⁴

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi timbulnya penyakit kusta ialah:

1. Faktor kuman kusta

Hasil penelitian membuktikan bahwa kuman kusta yang masih utuh (solid) bentuknya, lebih besar kemungkinan menyebabkan penularan daripada kuman yang tidak utuh lagi. Kuman kusta dapat hidup di luar tubuh manusia antara 1-

¹³Ma'sum, Suparti dan Ispriyanti. "Analisis Angka Kematian Ibu Menggunakan Model Regresi Binomial Regresi (Studi Kasus: Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011)". (Semarang: Universitas Diponegoro, Prosiding Seminar Nasional Statistika. ISBN: 978-602-14387-0-1)

¹⁴Lucky Chyntia Juniardi&Mutiah Salamah. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kasus Kusta di Jawa Timur pada Tahun 2013 dengan Geographically Weighted Negative Binomial regression (GWNBR)* (Jurnal Sains dan Seni ITS Vol.4 No.1. 2015). h.1.

9 hari tergantung suhu atau cuaca dan diketahui hanya kuman kusta yang utuh saja dapat menimbulkan penularan.

2. Faktor imunitas

Sebagian manusia kebal terhadap penyakit kusta (95%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 orang yang terpapar, 95 orang tidak menjadi sakit, 3 orang sembuh tanpa obat dan 2 orang menjadi sakit. Hal ini belum mempertimbangkan pengaruh pengobatan.

3. Keadaan lingkungan

Keadaan rumah yang berjejal biasanya berkaitan dengan kemiskinan yang merupakan faktor penyebab tingginya jumlah kusta. Lingkungan yang tidak bersih dengan sanitasi buruk juga merupakan sarana penyebaran kuman *mycobacterium leprae*.¹⁵



¹⁵Mei Rizka Shovalina. *Modeling and Mapping Leprosy Prevalance Disielse Patients In The District/ City Of East Java With Mixed Geographically Weighted Regression Approach*. (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 2016)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian terapan

B. Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

C. Waktu

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai bulan Desember 2020 sampai Juni 2021.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah penderita kusta (Y)
2. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km²) (X_1)
3. Jumlah penduduk (X_2)
4. Persentase jumlah sarana kesehatan (X_3)
5. Persentase jumlah tenaga medis (X_4)
6. Perentase jumlah penduduk miskin (X_5)

Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

1. Jumlah penderita kusta(Y) yaitu banyaknya penderita penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.
2. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km²)(X_1)
Kepadatan penduduk merupakan besaran jumlah kepadatan penduduk per masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dihitung menggunakan rumus jumlah penduduk suatu wilayah (kabupaten/kota) dibagi dengan luas wilayah tersebut (kabupaten/kota) dengan satuan ukur jiwa/km².
3. Jumlah penduduk (X_2) yaitu banyaknya penduduk dalam suatu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.
4. Persentase jumlah sarana kesehatan(X_3) yaitu banyaknya tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmasdes) per masing- masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.
5. Persentase jumlah tenaga medis(X_4) yaitu banyaknya jumlah tenaga kesehatan (Dokter Umum, Bidan Desa) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.
6. Persentase jumlah penduduk miskin(X_5) yaitu persentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *Analisis Regresi Binomial Negative*.

F. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terkait jumlah kasus kusta yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
2. Mendeskripsikan data
3. Melakukan uji multikolinearitas
4. Melakukan uji overdispersi pada model regresi poisson
5. Membentuk model Regresi Binomial Negatif
6. Pengujian signifikansi parameter model Regresi Binomial Negatif
 - a. Uji Serentak parameter model Regresi Binomial Negatif
 - b. Uji Parsial parameter model Regresi Binomial Negatif
7. Memperoleh hasil analisis dengan faktor yang signifikan memengaruhi penyebab penyebaran penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
8. Interpretasi hasil analisis

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil

1. Deskriptif Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang terdiri dari 24 Kabupaten/ Kota sebagai variabel respon (Y) dan enam variabel penjelas diantaranya kepadatan penduduk (X_1), jumlah penduduk (X_2), jumlah sarana kesehatan (X_3), jumlah tenaga medis (X_4), jumlah penduduk miskin (X_5) dan persentase rumah tangga yang menggunakan air layak (X_6). Untuk melihat karakteristik dari masing- masing variabel maka ditampilkan statistika deskriptif yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata- rata	Variansi
Y	1,00	164,00	42,95833	2064,737319
X_1	41,00	8580,00	645,7083	2942597,00
X_2	134280,00	1508154,00	365498,8	84253930000,00
X_3	0,0054	0,0166	0,0092375	0,000008670272
X_4	0,0671	0.638	0,23289583	0,01801612
X_5	4,41	15,48	9,84842917	9,9876303




Sumber: Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

Gambar 4.1 Jumlah penderita penyakit kusta berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 terlihat bahwa rata-rata penderita penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebesar 43 jiwa, dengan nilai variansi yang relatif tinggi sebesar 2064,737319. Hal ini dikarenakan terdapat daerah dengan jumlah kasus kusta mencapai ratusan jiwa namun ada juga daerah dengan jumlah kasus kusta relatif rendah hanya mencapai puluhan.

Jumlah penderita penyakit kusta tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dengan jumlah mencapai 164 jiwa, jumlah tersebut cukup besar

dibanding dengan jumlah kasus kusta di Kabupaten/ Kota lain. Sedangkan untuk jumlah kasus penyakit kusta terendah terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dengan jumlah kasus kusta sebanyak 1 jiwa. Berikut gambar 4.2 menyajikan data kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018.




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.2 Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Berdasarkan kabupaten/kota

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.2 diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 645,7083 jiwa/km². Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kota Makassar

sebanyak 8580 jiwa/km². Lalu dilanjutkan dengan Kota Pare- Pare dengan jumlah kepadatan Penduduk sebesar 1447 jiwa/km². Kemudian kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Luwu Utara sebesar 41 jiwa/km².

Gambar 4.3 menyajikan data jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018.




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.3 diketahui bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 365498,8 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Makassar sebanyak 1508154 jiwa. Kemudian yang paling rendah terdapat di Kepulauan Selayar sebesar 134280 jiwa.

Gambar 4.4 menyajikan data Persentase Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun 2018.




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.4 Persentase Jumlah sarana kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berdasarkan Kabupaten/ Kota

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.4 diketahui bahwa rata-rata persentase jumlah sarana kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,0092375%. Jumlah sarana kesehatan tertinggi yaitu di Kabupaten Palopo sebesar 0.0166%, sedangkan jumlah sarana kesehatan terendah yaitu di Kabupaten Luwu Utara sebesar 0.0054%.

Gambar 4.5 menyajikan data persentase jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.5 Persentase Jumlah Tenaga Medis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berdasarkan Kabupaten/Kota

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.5 diketahui bahwa rata-rata persentase jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.23289583%. persentase jumlah tenaga medis tertinggi yaitu di Kota Pare- Pare sebesar 0.638%, sedangkan persentase jumlah tenaga medis terendah di Kabupaten Gowa yaitu sebesar 0.0671%.

Gambar 4.6 menyajikan data tentang persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.6 diketahui bahwa rata-rata persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9.84842917%. Persentase jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto sebesar 15,48%, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin terendah yaitu di kota Makassar sebesar 4,41%.

2. Uji Multikolinearitas

Sebelum melanjutkan untuk melakukan uji overdispersi pada model regresi poisson, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas seperti berikut:

Tabel 4.2 Nilai VIF Variabel Prediktor

Variabel Prediktor	VIF
X_1	6,634386
X_2	5,409707
X_3	1,450470
X_4	2,372746
X_5	1,595629

Pada tabel 4.2 disajikan nilai VIF dari masing-masing variabel prediktor. Pada pengujian multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF, model regresi dikatakan memiliki masalah multikolinearitas jika nilai VIF seluruh variabel prediktor lebih besar dari 10. Karena nilai VIF dari setiap variabel prediktor yang ditampilkan pada tabel bernilai lebih kecil

dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

3. Uji Overdispersi pada Model Regresi Poisson

Sebelum melanjutkan analisis menggunakan regresi binomial negatif, terlebih dahulu dilakukan uji dispersi pada regresi poisson dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{\text{nilai deviance}}{df} \\ \phi &= \frac{399,5}{18} \\ \phi &= 22,19\end{aligned}\tag{4.1}$$

Berdasarkan hasil diatas, nilai devians yang dibagi dengan nilai derajat bebasnya yaitu 22,19. Dimana jika nilai devians yang dibagi dengan derajat bebasnya lebih dari 1 maka dikatakan overdispersi. Sehingga analisis yang tepat untuk memodelkan faktor- faktor penyebaran penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan adalah menggunakan analisis regresi binomial negatif.

4. Model Regresi Binomial Negatif

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh model regresi binomial negatif sebagai berikut:

$$\ln(\hat{\mu}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

$$(\hat{\mu}) = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5)$$

($\hat{\mu}$)

$$= \exp(3,446 - 0,0002515X_1 + 0,000003175X_2 - 0,9150X_3 + 0,5770X_4 - 0,02386X_5)$$

Untuk menggunakan model tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan uji kesesuaian model.

4.1 Kesesuaian Model Regresi Binomial Negatif

Pemeriksaan kesesuaian model regresi binomial negatif (*goodness of fit*) dapat diketahui dari nilai devians yang dibagi dengan derajat bebasnya, dimana didapat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kesesuaian Model Regresi Binomial Negatif

Model	Devians/df
Regresi Poisson	399,5/18=22,19
Regresi Binomial Negatif	26,5/18=1,477

Dari Tabel 4.3 di atas, diketahui nilai devians untuk model regresi binomial negatif lebih kecil di dibandingkan dengan model regresi poisson. Hal ini menunjukkan model regresi binomial negatif sebagai model terbaik yang digunakan untuk mengatasi kasus *overdispersi* dan untuk menggambarkan pola hubungan antara jumlah kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan variabel independen yaitu tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk, persentase jumlah sarana kesehatan, persentase jumlah tenaga medis dan persentase jumlah penduduk miskin.

4.2 Uji Signifikansi Parameter Regresi Binomial Negatif

Setelah mendapatkan model regresi binomial negatif, selanjutnya dilakukan pengujian secara serentak dan pengujian secara parsial.

4.2.1 Uji Serentak Model

Hasil uji serentak (kelayakan model) dalam regresi binomial negatif dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_5 = 0$ (tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap kasus kusta)

H_1 : paling sedikit ada satu j dengan $\beta_j \neq 0 ; j = 1, 2, \dots, 5$ (paling sedikit ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap kasus kusta)

Tabel 4.4 Uji serentak Model Regresi Binomial Negatif

Likelihood Ratio Chi-Square (G)	db	p-value
14,525	5	0.0126

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, nilai statistik $G = 14,525$ dan p -value = 0,0126, dimana nilai G lebih besar dari nilai $X^2_{(0,05;5)} = 11,0705$ dan p -value lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Sehingga kesimpulan uji *overall* model regresi binomial negatif adalah tolak H_0 yang berarti bahwa paling sedikit terdapat satu parameter yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus kusta.

4.2.2 Uji Parsial Regresi Binomial Negatif

Setelah dilakukan uji serentak, langkah berikutnya adalah uji signifikansi parameter secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

$H_0: \beta_j \neq 0$ (variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen)

Tabel 4.5 Uji Parsial Regresi Binomial Negatif

Variabel	$\hat{\beta}_j$	Std. error	Z_{hitung}	p -value
X_1	-0,0002515	0,0002514	-1	0,31718
X_2	0,000003175	0,000001341	2,367	0,01795
X_3	-91,5	70,44	-1,299	0,19392
X_4	0,577	1,943	0,297	0,76656
X_5	-0,02386	0,06749	-0,354	0,72367

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diketahui bahwa variabel X_2 memiliki nilai Z_{hitung} lebih besar dari nilai $Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ dan p -value lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dan memiliki kontribusi terhadap variabel dependen (jumlah kasus kusta) adalah variabel jumlah penduduk (X_2).

Dari uji parsial diatas diketahui bahwa variabel yang signifikan yaitu variabel X_2 , sehingga pemodelan regresi binomial negatif dilakukan kembali yang hanya mengikutsertakan variabel yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh model regresi binomial negatif sebagai berikut:

$$\ln(\hat{\mu}_j) = \beta_0 + \beta_2 X_2$$

$$(\hat{\mu}_j) = \exp(\beta_0 + \beta_2 x_2)$$

$$(\hat{\mu}_j) = \exp(2,714 + 2,325x_2)$$

Interpretasi pada model regresi binomial negatif yang dihasilkan yaitu ketika ada jumlah penduduk maka jumlah penderita kusta adalah sebanyak $\exp(2,714) = 15,089 = 15$ orang. Setiap bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin menambah resiko seseorang menderita penyakit kusta yaitu sebanyak $\exp(2,325) = 10,226$ sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut maka akan mengakibatkan bertambahnya penderita kusta sebanyak $(10,226-1)100\% = 9,226\%$.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi binomial negatif, diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus kusta di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jumlah penduduk yang di tunjukkan dengan nilai β sebesar 2,325. Hal tersebut berarti semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka rata-rata jumlah kasus kusta akan cenderung meningkat. Berdasarkan analisis statistika deskriptif pada Gambar 4.3 diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Sulaesi Selatan terdapat di Kota Makassar sebanyak 1508154 jiwa. Sehingga resiko untuk terjangkit penyakit kusta lumayan besar karena kota makassar memiliki jumlah yang tinggi.

Hal ini dapat dilihat pada analisis statistika deskriptif pada Gambar 4.1 yang menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan daerah yang juga

memiliki jumlah kasus kusta tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 136 jiwa. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambah jumlah penduduk pada suatu daerah menjadikan daerah tersebut rawan terkena penyakit kusta. Namun tergantung dari masyarakatnya dalam menjaga kebersihan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Model regresi binomial negatif pada data penyakit kusta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$(\hat{\mu}) = \exp(3,446 - 0,0002515X_1 + 0,000003175X_2 - 0,9150X_3 + 0,5770X_4 - 0,02386X_5)$$

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi binomial negatif, diperoleh variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyebaran penyakit kusta di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yaitu variabel jumlah penduduk (X_2).

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan terutama dalam menekan jumlah kasus kusta.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel prediktor lain yang memungkinkan bisa mencegah terjadinya kasus kusta.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memahami teori kesehatan sehingga hasil analisis yang diperoleh parameternya dapat di

interpretasikan dengan lebih baik agar pembaca lebih mudah memahami hasilnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, Alan. *An Introduction to Categorical Data Analysis*(Canada: John Wiley and Sons. 2007). h.80-81
- Agresti, Alan. *Categorical Data Analysis* (Canada: John Wiley and Sons, 2002). h.116.
- Damah. “Mengatasi Overdispersi Pada Model Regresi Poisson dengan Generalized Poisson Regression I”, (*Jurnal Eksponensial*, Vol. 2 No. 2 November 2011). H.5
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al- Kautsar. 2009)
- Gunawan, Imam. *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Rajawali Pers. 2017). h.102-103
<https://dinkes.sulselprov.go.id>
<https://sulsel.bps.go.id>
- Ismail, Noriszura dan Jemain, Abdul Aziz. *Handling Overdispersion with Negative Binomial and Generalized Poisson Regression Models* (Casualty Actuarial Society Forum, Winter 2007). hal.106.
- Juniardi, Lucky Chyntia & Salamah, Mutiah. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kasus Kusta di Jawa Timur pada Tahun 2013 dengan Geographically Weighted Negative Binomial regression (GWNBR)* (Jurnal Sains dan Seni ITS Vol.4 No.1. 2015). h.1
- Ma'sum. Suparti dan Ispriyanti. “*Analisis Angka Kematian Ibu Menggunakan Model Regresi Binomial Regresi (Studi Kasus: Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011)*”.(Semarang: Universitas Diponegoro, Prosiding Seminar Nasional Statistika. ISBN: 978-602-14387-0-1)
- Pradawati. *Dkk.Penerapan Regresi Binomial Negatif untuk Mengatasi Overdispersi Pada Regresi Poisson*(Jurnal Matematika Vol.2 No.2. 2013). h.7
- Shovalina, Mei Rizka. *Modeling and Mapping Leprosy Prevalance Disielse Patients In The District/ City Of East Java With Mixed Geographically Weighted Regression Approach*. (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 2016)
- Syaamil Qur'an. *Tafsir Iman Ibnu Katsir* (Begawanariyanta.wordpress.com: Miracle The Reference)
- Wahyuni, Widya. *Penaksir Parameter Model Regresi Binomial Negatif pada Kasus Overdispersi* (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hal.25-29
- Walpole, Ronald E & Myers, Raymond H. *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuan* (Bandung: ITB. 1995). h.149-150



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN

VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : /val / m / 358_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :


Nama : Habiba
Nim : 60600116019
Judul Karya ilmiah : **“Analisis Faktor- Faktor Penyebab Penyebaran Penyakit Kusta Di Sulawesi Selatan Tahun 2018 Menggunakan Regresi Binomial Negatif “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 09 Juni 2021

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan

Adnan Sauddin, S. Pd., M. S



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

A. Data

Data Jumlah Penderita Kusta

Kabupaten/Kota	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Selayar	16	149	134280	0.0134	0.207	13.13
Bulukumba	124	362	418326	0.0086	0.2768	7.48
Bantaeng	46	471	186612	0.0107	0.1891	9.23
Jeneponto	58	401	361793	0.006	0.11	15.48
Takalar	31	522	295892	0.0067	0.152	9
Gowa	96	404	760607	0.006	0.0671	7.83
Sinjai	85	296	242672	0.0094	0.3618	9.28
Maros	29	216	349822	0.0108	0.2635	10.31
Pangkep	44	299	332674	0.0099	0.1277	15.1
Barru	16	148	173623	0.0086	0.4613	9.04
Bone	164	166	754894	0.0071	0.1665	10.55
Soppeng	35	167	226770	0.0083	0.1935	7.5
Wajo	35	158	396810	0.008	0.1756	7.5
Sidrap	24	159	299123	0.0063	0.1661	5.16
Pinrang	32	191	374583	0.0069	0.1278	8.81
Enrekang	7	115	204827	0.0078	0.1747	12.49
Luwu	23	120	359209	0.0086	0.1127	13.36
Tana Toraja	1	113	232821	0.0124	0.2534	12.75
Luwu Utara	9	41	310470	0.0054	0.1687	13.69
Luwu Timur	8	42	293822	0.0088	0.2059	7.23
Toraja Utara	1	200	229798	0.0139	0.1688	13.37
Makassar	136	8580	1508154	0.0139	0.428	4.41
Pare- Pare	7	1447	143710	0.0076	0.638	5.59
Palopo	4	730	180678	0.0166	0.3935	7.94



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

B. Program dan Output

```

> biba<-read.csv(file.choose())
> biba
  Kabupaten.Kota  Y   X1      X2      X3      X4      X5
1      Selayar    16  149  134280 0.0134 0.2070 13.13
2      Bulukumba 124  362  418326 0.0086 0.2768  7.48
3      Bantaeng   46  471  186612 0.0107 0.1891  9.23
4      Jeneponto  58  401  361793 0.0060 0.1100 15.48
5      Takalar    31  522  295892 0.0067 0.1520  9.00
6      Gowa       96  404  760607 0.0060 0.0671  7.83
7      Sinjai     85  296  242672 0.0094 0.3618  9.28
8      Maros      29  216  349822 0.0108 0.2635 10.31
9      Pangkep    44  299  332674 0.0099 0.1277 15.10
10     Barru      16  148  173623 0.0086 0.4613  9.04
11     Bone      164  166  754894 0.0071 0.1665 10.55
12     Soppeng   35  167  226770 0.0083 0.1935  7.50
13     Wajo      35  158  396810 0.0080 0.1756  7.50
14     Sidrap    24  159  299123 0.0063 0.1661  5.16
15     Pinrang   32  191  374583 0.0069 0.1278  8.81
16     Enrekang  7   115  204827 0.0078 0.1747 12.49
17     Luwu      23  120  359209 0.0086 0.1127 13.36
18     Tana Toraja 1  113  232821 0.0124 0.2534 12.75
19     Luwu Utara  9   41  310470 0.0054 0.1687 13.69
20     Luwu Timur 8   42  293822 0.0088 0.2059  7.23
21     Toraja Utara 1  200  229798 0.0139 0.1688 13.37
22     Makassar 136 8580 1508154 0.0139 0.4280  4.41
23     Pare- Pare 7  1447  143710 0.0076 0.6380  5.59
24     Palopo    4   730  180678 0.0166 0.3935  7.94
> #Analisis Statistika Deskriptif
> library(pastecs)
> stat.desc(biba)
      Kabupaten.Kota      Y      X1      X2
nbr.val      NA 24.000000 2.400000e+01 2.400000e+01 2.4000
00e+01 24.00000000
nbr.null      NA  0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000
00e+00  0.00000000
nbr.na        NA  0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000
00e+00  0.00000000
min           NA  1.000000 4.100000e+01 1.342800e+05 5.4000
00e-03  0.06710000
max           NA 164.000000 8.580000e+03 1.508154e+06 1.6600
00e-02  0.63800000
range         NA 163.000000 8.539000e+03 1.373874e+06 1.1200
00e-02  0.57090000

```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
sum NA 1031.000000 1.549700e+04 8.771970e+06 2.2170
00e-01 5.58950000
median NA 30.000000 1.955000e+02 2.975075e+05 8.6000
00e-03 0.18235000
mean NA 42.958333 6.457083e+02 3.654988e+05 9.2375
00e-03 0.23289583
SE.mean NA 9.275275 3.501546e+02 5.925015e+04 6.0105
02e-04 0.02739839
CI.mean NA 19.187368 7.243499e+02 1.225683e+05 1.2433
67e-03 0.05667788
var NA 2064.737319 2.942597e+06 8.425393e+10 8.6702
72e-06 0.01801612
std.dev NA 45.439381 1.715400e+03 2.902653e+05 2.9445
33e-03 0.13422413
coef.var NA 1.057755 2.656618e+00 7.941621e-01 3.1875
86e-01 0.57632690
```

```
X5
nbr.val 24.0000000
nbr.null 0.0000000
nbr.na 0.0000000
min 4.4100000
max 15.4800000
range 11.0700000
sum 236.2300000
median 9.1350000
mean 9.8429167
SE.mean 0.6450979
CI.mean 1.3344866
var 9.9876303
std.dev 3.1603212
coef.var 0.3210757
```

```
> #Uji Multikolinearitas
> hasil=lm(Y~X1+X2+X3+X4+X5, data=biba)
> hasil
```

```
Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data = databiba)
```

Coefficients:

```
(Intercept) X1 X2 X3 X4 X5
-4.740e+01 -2.225e-02 2.224e-04 -2.828e+02 1.050e+02 1.639e-01
```

```
> library(car)
> vif(hasil)
X1 X2 X3 X4 X5
6.634386 5.409707 1.450470 2.372746 1.595629
```

```
> #Algoritma untuk pendugaan parameter regresi poisson
> modelpoisson<-glm(Y~X1+X2+X3+X4+X5, family = "poisson", data=biba)
> modelpoisson
```

```
Call: glm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, family = "poisson",
data = biba)
```




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
Coefficients:
(Intercept)          X1          X2          X3          X4          X5
2.472e+00 -3.506e-04  3.538e-06 -5.072e+01  1.926e+00  1
.421e-04
```

```
Degrees of Freedom: 23 Total (i.e. Null); 18 Residual
Null Deviance: 979.1
Residual Deviance: 399.5 AIC: 530.5
```

```
> library(MASS)
> library(lmtest)
> #Uji overall
> lrttest(modelpoisson)
Likelihood ratio test
```

```
Model 1: Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5
```

```
Model 2: Y ~ 1
```

```
 #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 6 -259.23
2 1 -549.01 -5 579.56 < 2.2e-16 ***
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> #Uji parsial
> summary(modelpoisson)
```

```
Call:
```

```
glm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, family = "poisson",
     data = biba)
```

```
Deviance Residuals:
```

```
  Min       1Q   Median       3Q      Max
-6.076 -3.636 -1.245  1.125  8.697
```

```
Coefficients:
```

```
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  2.472e+00  2.538e-01  9.740 < 2e-16 ***
X1           -3.506e-04  3.870e-05 -9.058 < 2e-16 ***
X2            3.538e-06  1.990e-07 17.781 < 2e-16 ***
X3           -5.072e+01  1.770e+01 -2.865  0.00416 **
X4            1.926e+00  3.903e-01  4.934  8.06e-07 ***
X5            1.421e-04  1.399e-02  0.010  0.99190
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
```

```
Null deviance: 979.08 on 23 degrees of freedom
Residual deviance: 399.52 on 18 degrees of freedom
AIC: 530.46
```

```
Number of Fisher Scoring iterations: 5
```

```
> #uji overdispersi
> modelpoisson$deviance/modelpoisson$df.residual ##cek overdispersi
[1] 22.19544
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> #Algoritma Untuk Pendugaan parameter Regresi Binomial Negatif
> library(MASS)
> library(lmtest)
> modeInegbin.nb<-glm.nb(Y~X1+X2+X3+X4+X5, data=biba)
> modeInegbin.nb
```

```
Call: glm.nb(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data = biba, ini
t.theta = 1.602946774,
link = log)
```

```
Coefficients:
(Intercept)          X1          X2          X3          X4
           X5
 3.446e+00 -2.515e-04  3.175e-06 -9.150e+01  5.770e-01 -2
.386e-02
```

```
Degrees of Freedom: 23 Total (i.e. Null); 18 Residual
```

```
Null Deviance: 45.96
```

```
Residual Deviance: 26.59 AIC: 228.4
```

```
> #uji kesesuaian model Regresi Binomial Negatif
> modeInegbin.nb$deviance/modeInegbin.nb$df.residual ##nilai devians
/db
```

```
[1] 1.477469
```

```
> #uji overall
```

```
> lrtest(modeInegbin.nb)
```

```
Likelihood ratio test
```

```
Model 1: Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5
```

```
Model 2: Y ~ 1
```

```
 #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 7 -107.21
2 2 -114.47 -5 14.525 0.0126 *
```

```
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> #uji parsial
```

```
> summary(modeInegbin.nb)
```

```
Call:
```

```
glm.nb(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data = biba, init.theta
= 1.602946774,
link = log)
```

```
Deviance Residuals:
```

```
Min      1Q  Median      3Q      Max
-2.1582 -1.0034 -0.3856  0.3626  1.8034
```

```
Coefficients:
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	3.446e+00	1.284e+00	2.684	0.00727 **
X1	-2.515e-04	2.514e-04	-1.000	0.31718
X2	3.175e-06	1.341e-06	2.367	0.01795 *
X3	-9.150e+01	7.044e+01	-1.299	0.19392
X4	5.770e-01	1.943e+00	0.297	0.76656
X5	-2.386e-02	6.749e-02	-0.354	0.72367

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for Negative Binomial(1.6029) family taken to be 1)

Null deviance: 45.964 on 23 degrees of freedom
Residual deviance: 26.594 on 18 degrees of freedom
AIC: 228.42

Number of Fisher Scoring iterations: 1

Theta: 1.603
Std. Err.: 0.477

2 x log-likelihood: -214.424

```
>#Algoritma untuk Pendugaan Parameter Regresi Binomial Negatif yang Signifikan  
> library(MASS)  
> library(lmtest)  
> modelnegbin.nb<-glm.nb(Y~X2, data=biba)  
> modelnegbin.nb
```

```
Call: glm.nb(formula = Y ~ X2, data = biba, init.theta = 1.343047239,  
link = log)
```

```
Coefficients:  
(Intercept) X2  
2.714e+00 2.325e-06
```

```
Degrees of Freedom: 23 Total (i.e. Null); 22 Residual  
Null Deviance: 39.08  
Residual Deviance: 26.73 AIC: 224.8
```

```
> #uji kesesuaian model Regresi Binomial Negatif  
> modelnegbin.nb$deviance/modelnegbin.nb$df.residual ##nilai devians/db  
[1] 1.21518  
> #uji overall
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> lrtest(modelnegbin.nb)
```

```
Likelihood ratio test
```

```
Model 1: Y ~ X2
```

```
Model 2: Y ~ 1
```

```
  #Df  LogLik Df  Chisq Pr(>Chisq)
1     3 -109.38
2     2 -114.47 -1  10.181   0.001419 **
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> #uji parsial
```

```
> summary(modelnegbin.nb)
```

```
Call:
```

```
glm.nb(formula = Y ~ X2, data = biba, init.theta = 1.343047239,  
        link = log)
```

```
Deviance Residuals:
```

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.2340  -1.1467  -0.2146   0.3602   1.6412
```

```
Coefficients:
```

```
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  2.714e+00  2.924e-01   9.282 < 2e-16 ***
X2           2.325e-06  6.241e-07   3.726 0.000195 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
(Dispersion parameter for Negative Binomial(1.343) family taken to be 1)
```

```
Null deviance: 39.077  on 23  degrees of freedom
```

```
Residual deviance: 26.734  on 22  degrees of freedom
```

```
AIC: 224.77
```

```
Number of Fisher Scoring iterations: 1
```

```
      Theta:  1.343
Std. Err.:  0.385
```

```
2 x log-likelihood:  -218.767
```

```
> exp(modelnegbin.nb$coefficients) ###nilai exp (model negbin)
```

```
(Intercept)      X2
15.088544      1.000002
```



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis Habiba lahir di Sinjai pada 18 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Syamsul Albar dan Fatimah. Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2004, penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di salah satu sekolah yang berada di desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar nya pada tahun 2010, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Neg. 4 Sinjai selatan. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikannya di SMA Neg. 1 Tellulimpoe. Dan penulis menyelesaikan pendidikannya di sekolah tingkat menengah pada tahun 2016.

Penulis menempuh pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dengan mengambil Jurusan Matematika. Penulis menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 tahun 12 bulan dan menyandang gelar Sarjana Matematika (S.Mat).