

**ANALISIS NILAI ABSORBANSI DALAM PENENTUAN KADAR
FLAVONOID HASIL EKSTRAKSI DAUN KOPASANDA
(*Chromolaena Odorata*)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NURWAHIDAH
NIM: 60400117066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahidah
NIM : 60400117066
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 17 Agustus 1999
Jurusan : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga, Kelurahan Romang Polong,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
Judul : Analisis Nilai Absorbansi Dalam Penentuan Kadar
Flavonoid Hasil Ekstraksi Daun Kopasanda (*Chromolaena
Odorata*)

Dengan penuh kesadaran menyatakan, bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2021

Penulis



NURWAHIDAH
NIM. 60400117066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Nilai Absorbansi Dalam Penentuan Kadar Flavonoid Hasil Ekstraksi Daun Kopasanda (*Chromolaena Odorata*)**”, yang disusun oleh **Nurwahidah**, NIM: **60400117066** mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal **18 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **9 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan). *

Makassar, 18 Agustus 2021 M

9 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Nurul Fuadi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc	(.....)
Pembimbing II	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

NIP: 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur tak henti-hentinya tercurahkan dari lisan kita kepada Allah swt atas segala nikmat berupa rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Akhirnya skripsi dengan judul “**Analisis Nilai Absorbansi Dalam Penentuan Kadar Flavonoid Hasil Ekstraksi Daun Kopasanda (*Chromolaena Odorata*)**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, **Muhlis Dg Naba** dan **Salmah** dan saudara yang sangat penulis sayangi yaitu **Muhammad Waris** dan **Nurwahid** beserta keluarga besar penulis sebagai sumber penyemangat dan inspirasi penulis. Berkat doa merekalah kemudahan selalui menyertai penulis dan bisa melewati tahap demi tahap hingga sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala hambatan dan tantangan, namun berkat pertolongan dari Allah swt, kerja keras, doa dan segala bantuan dari berbagai pihak baik bantuan secara langsung, materi dan motivasi. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak **Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. Bapak **Ihsan S.Pd., M.Si**, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, yang telah membantu penulis selama masa studi.
4. Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd**, selaku Sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membantu penulis selama masa studi, memberikan motivasi dan masukan.


5. Ibu **Sri Zelviani S.Si., M.Sc**, selaku dosen pembimbing I dan yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis**, selaku Pembimbing II, yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu **Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.**, selaku Penguji I yang telah membantu penulis selama masa studi, memberikan motivasi dan masukan.
8. Bapak **Dr.H.Muh Sadik Sabry, M.Ag.**, selaku penguji II yang senantiasa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini ke tahap penyelesaian.
9. Ibu **Fitriyanti S.Si., M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang senantiasa meluangkan waktunya, dan memberikan motivasi yang membangun.
10. Bapak/Ibu **Dosen dan Staff Jurusan Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi yang telah tulus memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak **Abdul Mun'im, S.T.**, Bapak **Muhtar, S.T., M.T.**, Bapak **Ahmad Yani S.Si.**, dan Ibu **Nurhaisah, S.Si.**, sebagai Laboran di Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing selama praktikum.
12. Bapak dan Ibu **Staf pada bagian administrasi dan akademik** dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu siap dan sabar melayani Penulis dalam pengurusan berkas administrasi maupun akademik.
13. Bapak **Ahmad Yani S.Si** selaku laboran Kimia Anorganik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penelitian.
14. Bapak **Sakius Ruso S.T., M.Si** yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proses penelitian di Politeknik Negeri Ujung Pandang.
15. Kepada tim penelitian **Ahriani, Elis Sultriana** dan **Anita Purnamasari** yang telah bersama-sama menyelesaikan penelitian ini dari awal hingga saat ini.

16. Teman-teman **INTENS17AS** (Angkatan 2017) atas kebersamaannya selama empat tahun ini, telah menjadi sahabat dan keluarga yang hangat, memberi banyak bantuan selama masa studi.
17. **Hildawati, Jihan Aulia Hasim dan Dodi Iskandar** yang senantiasa menjadi teman berbagi dan membantu serta menyemangati penulis selama ini.
18. **Elis Sultriana, Umrah, Nidya Lena Fitriah laksana, Nurhalizah amar, Susi Susanti** yang selalu memberikan semangat dan menjadi saudara selama masa studi.
19. Sahabatku **Nurul Ramadhani, Anggraeni Pebrianti, Nurlaelah, St. Nuraenun Ilahi, Miftah Nursani, Syamsinar Sidik, Eka Arlinda Hafid, Suharti dan Syamsidar** yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
20. Teman-teman **KKN-DK 64** Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
21. Seluruh keluarga besar mahasiswa jurusan Fisika baik senior maupun junior terima kasih banyak untuk doa dan dukungan selama ini.
22. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times. You did it widd.*

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga apa yang dilakukan bernilai ibadah disisi-Nya dan dibalas dengan yang lebih baik, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Gowa, Agustus 2021

Penulis



NURWAHIDAH
NIM. 60400117066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	8
A. Absorbansi	8
B. Spektrum Gelombang Elektromagnetik	12
C. Flavonoid	16
D. Antiinflamasi	20
E. Spektrofotometer UV-Vis.....	23
F. Metode Ekstraksi	31
G. Kopasanda (Chromolaena Odorata L.).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
B. Alat dan Bahan	41
C. Prosedur Kerja	42
D. Analisis Data.....	49
E. Bagan Alir.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Esktraksi Daun Kopasanda.....	52
B. Nilai Absorbansi Daun Kopasanda.....	53
C. Kadar Flavonoid Ekstrak Daun Kopasanda.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIOGRAFI	61
LAMPIRAN ANALISIS DATA	62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Kelompok Gelombang Elektromagnetik	14
2.2	Struktur Dasar Flavonoid	17
2.3	Struktur Kuersetin	18
2.4	Spektrofotometer Uv-Vis	24
2.5	Proses Penyerapan Sinar UV-Vis Oleh Larutan Sampel Dalam Kuvet	30
2.6	Daun Kopasanda	35
3.1	Sampel Daun Segar Kopasanda	43
3.2	Mengeringkan Sampel Tanpa Terkena Sinar Matahari Langsung	44
3.3	Memekatkan Ekstrak Menggunakan Rotavapor	45
3.4	Proses Identifikasi Flavonoid	46
3.5	Hasil Pembacaan Absorbansi Pada Spektrofotometer UV- Vis	49
3.6	Bagan Alir Penelitian	52

DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Panjang Gelombang	14
2.2	Konstanta Dielektrikum Pelarut Organik	33
3.1	Ekstraksi Daun Kopasanda	45
3.2	Uji Flavonoid Sampel Daun Kopasanda	46
3.3	Nilai Absorbansi Larutan Standar	47
3.4	Nilai Absorbansi Ekstrak Daun Kopasanda	49
3.5	Kandungan Flavonoid Total Ekstrak Daun Kopasanda	50
4.1	Hasil Ekstraksi Daun Kopasanda	53
4.2	Hasil Nilai Absorbansi Ekstrak Daun Kopasanda	54
4.3	Hasil Uji Flavonoid Sampel Daun Kopasanda	55
4.4	Hasil Kandungan Flavonoid Total Ekstrak Daun Kopasanda	56

ABSTRAK

NAMA : NURWAHIDAH
NIM : 60400117066
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NILAI ABSORBANSI DALAM
PENENTUAN KADAR FLAVONOID HASIL
EKSTRAKSI DAUN KOPASANDA (*Chromolaena
Odorata*)**

Telah dilakukan penelitian Analisis Nilai Absorbansi Dalam Penentuan Kadar Flavonoid Hasil Ekstraksi Daun Kopasanda (*Chromolaena Odorata*). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai absorbansi ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan untuk menentukan kadar flavonoid ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengukur nilai absorbansi ekstrak daun menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada Panjang gelombang 436 nm untuk menghitung kadar flavonoid yang terkandung pada ekstrak. Nilai absorbansi yang diperoleh pada ekstrak etanol 70% Kopasanda pada daun segar sebesar 0,337 sedangkan untuk ekstrak daun kering Kopasanda sebesar 0,428. Nilai absorbansi yang didapatkan telah memenuhi hukum Lambert-Beer yaitu ($0,2 \leq A < 0,8$). Hasil yang diperoleh dari ekstrak etanol 70% mengandung flavonoid. Flavonoid dihitung menggunakan persamaan regresi linear dari kurva larutan standar kuersetin yang telah diukur sebelumnya. Kadar flavonoid dihitung sebagai kadar flavonoid total pada sampel, sehingga diperoleh kadar total flavonoid untuk ekstrak daun segar Kopasanda sebesar 2,64% dan daun kering Kopasanda sebesar 3,4%.

Kata kunci: *Absorbansi, Flavonoid, Kopasanda, Spektrofotometer UV-Vis*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

NAME : NURWAHIDAH
NIM : 60400117066
TITTLE : ANALISIS NILAI ABSORBANSI DALAM
PENENTUAN KADAR FLAVONOID HASIL
EKSTRAKSI DAUN KOPASANDA (*Chromolaena
Odorata*)

A study was conducted to analyze the absorption value in determining the levels of flavonoids extracted from the leaves of Cubasanda (*Chromolaena Odorata*). This study determined the absorbance value of Kopasanda leaf extract on fresh and dried leaves using UV-Vis spectrophotometer and to determine the flavonoid content of Kopasanda leaf extract in fresh and dried leaves. The method used in this study was to measure the absorbance value of the leaf extract using a UV-Vis spectrophotometer to calculate the levels of flavonoids present in the extract. The absorbance value obtained for the 70% ethanol extract of Kopasanda on fresh leaves was 0.337 while it was for the extract of dried leaves of Kopasanda 0.428. The obtained absorbance value complies with the Lambert-Beer law ($0.2 A < 0.8$). The results obtained from an extract of 70% ethanol contain flavonoid levels. The levels of flavonoids in fresh leaf extract and dried leaves of copasanda were measured using a wavelength of 436 nm. The flavonoids were calculated using the linear regression equation from the previously measured quercetin standard solution curve. The flavonoid content was calculated as the total flavonoid content in the sample, so that the total flavonoid content of the fresh Kopasanda leaf extract was 2.64% and the dried Kopasanda leaf was 3.4%.

Kata kunci: *Absorbance, Flavonoids, Kopasanda, UV-Vis Spectrophotometer*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi keanekaragaman hayati yang tumbuh dan berkembang biak dengan baik di Indonesia tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun untuk dijadikan tanaman hias saja, tapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Berbagai jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat tradisional dapat dengan mudah ditemukan dengan harga yang cukup terjangkau, oleh sebab itu masyarakat semakin banyak yang memanfaatkan obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun pemanfaatan tanaman sebagai ramuan obat tradisional membutuhkan penelitian ilmiah untuk mengetahui kebenaran khasiatnya. Dengan memperoleh data ilmiah yang meyakinkan maka keakuratan penggunaan tumbuhan sebagai obat dapat dijamin.

Berbagai jenis tumbuhan seperti tanaman Kopasanda, daun kelor, cocor bebek, kumis kucing, binahong, daun sirsak dan tumbuhan lainnya mengandung berbagai zat aktif biologis, seperti flavonoid yang bersifat antioksidan, anti-bakteri, anti-virus, anti alergi dan anti-inflamasi dari metabolit sekunder. Efek antioksidan flavonoid disebabkan oleh terperangkapnya radikal bebas dari gugus silikon hidrogen flavonoid melalui donor atom hidrogen. Penelitian ini akan menggunakan daun Kopasanda sebagai sampel dalam menganalisis kandungan flavonoid yang terdapat dalam tanaman tersebut.

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan masyarakat menjadi ramuan obat adalah daun Kopasanda atau oleh masyarakat daerah Makassar disebut dengan nama *Botto'-botto'*. Tumbuhan ini biasa digunakan sebagai obat untuk

luka serta sebagai antioksidan atau zat yang dapat menghambat oksidasi. Daun Kopasanda adalah tumbuhan dalam keluarga Compositae. Daunnya mengandung beberapa senyawa utama, seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin dan steroid. Daun kopasanda disebut juga hama tekelan yang dapat mengganggu kehidupan tanaman lain dis ekitarnya dan menurunkan produktivitas tanah. Daun kopasanda yang dihaluskan memiliki antioksidan karena kandungan flavonoidnya yang tinggi sehingga dapat mencegah proses oksidasi pada luka. Kopasanda berasal dari Negara Amerika bagian Tengah dan Selatan, lalu menyebar ke wilayah tropis seperti Asia. Hama atau gulma ini memiliki ciri-ciri semak berkayu yang dapat berkembang dengan cepat tanpa mengenal musim.

Allah SWT menciptakan tanaman dan menumbuhkannya di bumi untuk membawa kebaikan bagi manusia, karena banyak tumbuhan yang memiliki manfaat besar untuk manusia, salah satunya sebagai pengobatan. Supaya dapat dimanfaatkan menjadi ramuan obat, sebelumnya harus dilakukan sebuah penelitian dan pengkajian agar diketahui secara tepat kegunaan dan kandungan dari tanaman tersebut.

Al-Qur'an telah banyak menyebutkan potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. To-Ha/20:53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. ”Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

ayat tersebut menjelaskan, Dia-lah yang menjadikan bagi kalian bumi yang mudah dimanfaatkan oleh kalian. Dan Dia menjadikan di dalamnya jalan-jalan yang banyak, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan yang berbeda-beda.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menafsirkannya bahwa Dia, yakni Allah swt yang telah membentuk bagimu, wahai Fir'aun dan semua manusia, setengah bagian dari bumi sebagai bentangan kemudian membentuk sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga keseimbangan. Dan Dia juga Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh. Dan menurunkan dari langit air, yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa warna dan manfaatnya.

Islam meyakini bahwa segala ciptaan Allah swt. tidak sia-sia, termasuk semua jenis tumbuhan yang perlu dipelajari. Sehingga setiap penyakit yang diwariskan Allah swt. dapat disembuhkan, dan setiap pengobatan harus sesuai dengan penyakitnya. Memang benar orang yang menderita penyakit tersebut dapat disembuhkan, namun diharapkan para ahli akan mempelajari pengobatan yang cocok dengan penyakit yang akan diobati, sehingga mendorong kesembuhannya. Islam menghormati bentuk pengobatan berdasarkan ilmu pengetahuan, penelitian dan eksperimen ilmiah, sehingga setiap pengobatan harus dilakukan oleh ahlinya. Flavonoid adalah senyawa antibakteri yang bekerja dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri kemudian senyawa intraseluler ikut keluar.

Flavonoid sebagai antiinflamasi berfungsi menghambat aktivitas enzim siklooksigenase (COOX) dan lipooksigenase, menghambat penumpukan sel darah

putih, degranulasi neutrophil serta pembebasan histamin. Peran flavonoid sebagai antivirus pada kandungan rendah akan menyebabkan denaturasi atau pemecahan protein dan pada kandungan tinggi mengakibatkan koagulasi protein sehingga selnya akan mengalami kematian. Flavonoid sebagai antikanker ditandai adanya gugus hidroksi dan rantai samping isoprenil serta adanya getaran.

Alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kadar dan struktur flavonoid secara kuantitatif yaitu menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan mengamati spektrum ultraviolet dan serapan tampak. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur energi relatif, jika energi ditransmisikan, dipantulkan, dan dipancarkan sesuai dengan spektrum panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diserap.

Potensi flavonoid sebagai senyawa yang berfungsi sebagai antiinflamasi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kadar flavonoid dari berbagai jenis ekstrak tumbuhan. Metode ekstraksi yang akan digunakan yaitu metode maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi yang melalui proses perendaman dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa yang akan diambil. Metode ekstraksi maserasi dipilih karena prosedur dan peralatan yang digunakan cukup sederhana dan tidak melalui proses pemanasan sehingga bahan alaminya tidak terurai.

Beberapa penelitian mengenai penentuan kadar flavonoid sebelumnya telah dilakukan oleh Neldawati (2013) dengan menganalisis nilai absorbansi serta penentuan kadar flavonoid tanaman obat daun sirih merah, daun ekornaga, daun sirsak dan daun katuk didapatkan kadar flavonoid rata-rata dari daun sirih merah sebesar 39,3778 $\mu\text{g/ml}$, daun ekornaga sebesar 26,7137 $\mu\text{g/ml}$, daun sirsak sebesar 27,5027 $\mu\text{g/ml}$ dan daun katuk sebesar 13,1101 $\mu\text{g/ml}$.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Iqbal (2016) dengan judul Analisis Nilai Absorbansi Kadar Flavonoid Daun Sirih Merah (*Piper Crocatum*) dan Daun Sirih Hijau (*Piper Betle L*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai absorbansi pada sirih merah dan sirih hijau ketika variasi waktu penyimpanan berada pada suhu 28⁰ C serta kandungan kadar flavonoid pada daun sirih merah lebih besar dibandingkan daun sirih hijau.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhriani (2015) mengenai analisis kadar flavonoid total pada ekstrak daun sirsak (*Annona Muricata L*) dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis mendapatkan hasil dimana kadar flavonoid total dari ekstrak etanol 70% sebesar 2,82 % dan ekstrak nheksan sebesar 4,48 %. Sehingga kadar flavonoid total dari ekstrak daun sirsak (*Annona Muricata L*) sebesar 7,3 %.

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai absorbansi dan kadar flavonoid daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berapa nilai absorbansi ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering menggunakan Spektrofotometer UV-Vis?
- b. Berapa kadar flavonoid ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan nilai absorbansi ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.
- b. Untuk mengetahui kadar flavonoid ekstrak daun Kopasanda pada daun segar dan daun kering.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai saran penelitian ilmu pengetahuan tentang nilai absorbansi dalam penentuan kadar total flavonoid yang terdapat pada ekstrak daun Kopasanda.
- b. Sebagai sumber masukan untuk masyarakat dan umum mengenai manfaat dari kandungan flavonoid yang terdapat pada ekstrak daun Kopasanda.
- c. Sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Daun yang digunakan yaitu daun segar dan daun kering dari Kopasanda.
- b. Daun segar yang digunakan yaitu berwarna hijau dan tidak diserang hama.
- c. Daun kering diperoleh dari daun segar yang dikeringkan selama 2 hari tanpa terkena sinar matahari langsung.
- d. Daun Kopasanda diambil langsung di Kabupaten Gowa.
- e. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode maserasi.
- f. Pelarut yang digunakan adalah etanol 70%.
- g. Metode yang digunakan untuk mengukur absorbansi sampel adalah Spektrofotometer UV-Vis.
- h. Panjang gelombang yang digunakan adalah 436 nm.
- i. Variabel yang diukur adalah nilai absorbansi dan kadar flavonoid total ekstrak daun Kopasanda.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Absorbansi

Ketika radiasi atau sinar putih melewati cairan berwarna, radiasi yang memiliki panjang gelombang tertentu akan diserap sedangkan radiasi lainnya akan dipancarkan. Absorbansi adalah rasio intensitas cahaya yang diserap dengan intensitas cahaya yang datang. Besar absorbansi atau serapan tergantung pada kandungan zat didalamnya. Semakin banyak kandungan zat dalam sampel, molekul yang akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang menyebabkan nilai absorbansi yang dihasilkan lebih besar, dengan kata lain nilai absorbansi setara dengan konsentrasi (Yanlinastuti, 2016).

Jika sebuah molekul bergerak dari tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah, sejumlah energi akan dilepaskan. Energi ini dapat dihamburkan sebagai radiasi, dan dapat dikatakan telah terjadi emisi radiasi. Peristiwa penyerapan energi terjadi apabila molekul terkena radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai sehingga molekul naik ke tingkat yang lebih tinggi (Carbonaro, M, 2005).

Radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diabsorpsi secara selektif dan radiasi lainnya akan ditransmisikan jika radiasi diteruskan melalui larutan yang berwarna. Perbandingan intensitas sinar yang diserap dengan intensitas sinar datang disebut absorbansi. Nilai absorbansi berbanding lurus dengan zat yang terkandung pada sampel. Apabila zat yang terkandung pada suatu sampel semakin banyak maka cahaya yang akan diserap pada panjang gelombang tertentu oleh suatu molekul juga semakin banyak, sehingga nilai absorbansi semakin

besar. Oleh karena itu, nilai absorbansi berbanding lurus dengan zat yang terkandung di dalamnya (Neldawati, 2013).

Grafik yang mengaitkan jumlah cahaya yang diserap dengan frekuensi (panjang gelombang) cahaya tersebut adalah spektrum serapan (bilangan kompleks: spektrum). Spektroskopi juga dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berguna untuk analisis kualitatif. Jumlah cahaya yang diserap pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan jumlah molekul yang menyerap radiasi, sehingga spektroskopi absorpsi juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Dalam molekul, elektron valensi masing-masing atom memainkan peran penting, yang dapat menentukan karakteristik suatu bahan (Carbonaro, M, 2005).

Ketika sinar dengan panjang gelombang bermacam-macam (cahaya polikromatik) menyentuh molekul, yang akan diserap hanya panjang gelombang tertentu saja. Jika molekul menyerap cahaya tampak dan sinar ultraviolet, elektron akan berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi tertentu dari luar. Transfer elektron ini disebut transisi atau perubahan elektronik. Jika cahaya yang di absorpsi adalah sinar infra merah, maka elektron pada atom atau elektron yang terikat pada molekul hanya akan bergetar dan gerak rotasi elektron akan terjadi dengan energi yang lebih rendah. Atas dasar ini, digunakanlah metode spektrofotometri untuk mengukur konsentrasi dalam sampel, dimana molekul-molekul dalam sel sampel disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang tertentu (Carbonaro, M, 2005).

Penyerapan intensitas cahaya oleh suatu medium akan mengurangi intensitas cahaya yang diteruskan. Pada teknik spektroskopi, seberkas sinar tampak dengan panjang gelombang tertentu yang dilewatkan pada suatu sampel akan mengalami penyerapan (absorpsi) yang mengakibatkan intensitas sinar

berkurang. Penyerapan ini terjadi apabila energi radiasi sinar tampak cukup untuk mengeksitasi molekul dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, kemudian jika terdapat sisa energi radiasi, maka akan diteruskan dengan intensitas sinar yang lebih kecil. Secara kuantitatif untuk mempelajari berkas radiasi yang dikenakan pada sampel, dapat dilakukan dengan membandingkan intensitas sinar sebelum melewati sampel (I_e) dengan intensitas sinar setelah melewati sampel (I_b). Pada hukum Lambert-Beer, suatu larutan dianggap sebagai jumlah keseluruhan dari blok-blok tipis atau terdiri dari irisan-irisan tipis yang memiliki luasan dan ketebalan yang sama.

Salah satu sifat dari cahaya adalah dapat dibelokkan atau difraksi. Cahaya akan dibelokkan apabila melewati suatu celah atau kisi. Kisi merupakan sekeping kaca yang memiliki goresan-goresan halus sejajar dengan ukuran yang sama. Terdapat 2 jenis kisi yaitu : kisi transmisi dimana kisi tersebut memungkinkan cahaya untuk melewatinya, sedangkan kisi refleksi adalah kisi yang celahnya memantulkan cahaya. Kisi dapat memiliki 5000 goresan per centimeter, sehingga jarak antara dua celah sangatlah sempit yaitu sekitar 2×10^{-4} cm.

Jika suatu kisi transmisi disinari dari belakang, tiap celah bertindak sebagai suatu sumber cahaya koheren. Pola cahaya yang diamati pada layar dihasilkan dari kombinasi efek interferensi dan difraksi. Tiap celah menghasilkan difraksi, dan berkas difraksi ini berinterferensi dengan berkas yang lain untuk menghasilkan pola akhir. Pola yang terbentuk akibat difraksi dan interferensi ini adalah pola gelap dan terang, pola terang terjadi akibat interferensi maksimum (konstruktif), dan pola gelap akibat interferensi minimum (distruktif) (Halliday dan Resnick, 2011).

Ketika cahaya mengenai sampel maka sebagian cahaya akan diserap, sebagian akan tersebar, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Dalam

spektrofotometri, cahaya datang atau cahaya yang masuk atau mengenai permukaan zat tidak dapat diukur dan cahaya yang melewati zat dapat diukur. Hukum Lambert Beer menyatakan bahwa absorpsi atau serapan akan berbanding lurus dengan ketebalan atau konsentrasi larutan yang disinari. Tingkat transmisi atau absorpsi dapat diukur. Cahaya yang diserap dinyatakan dengan absorptivitas (A) dan cahaya hamburan dinyatakan dengan transmitansi (T) (Carbonaro, M, 2005).

Secara kualitatif, penyerapan cahaya dapat diperoleh dengan mempertimbangkan penyerapan cahaya pada sinar tampak. Ketika cahaya polikromatik yang memiliki spektrum panjang gelombang melewati area dan mengabsorpsi panjang gelombang tertentu, tempat tersebut akan tampak berwarna disebabkan oleh panjang gelombang yang ditransmisikan ke mata yang dapat menentukan warna medium yang akan melengkapi warna yang diserap (Carbonaro, M, 2005).

Transmitansi adalah rasio intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui sampel (I_0) dengan intensitas awal. ϵ adalah koefisien molar atau ekstinsi molar dan absorptivitas molar, dan nilainya dipengaruhi oleh sifat spesifik bahan yang di beri radiasi. Jika konsentrasinya dalam gram per liter, Anda dapat menggunakan "laju absorpsi spesifik" daripada ϵ . Laju absorpsi (a) adalah konstan dan tidak ada hubungannya dengan konsentrasi, ketebalan kuvet, dan intensitas radiasi yang disinari ke kuvet. Pelarut, suhu, panjang gelombang dan struktur molekul mempengaruhi laju penyerapan (Yanlinastuti, 2016).

Kandungan flavonoid pada tanaman herbal bisa ditentukan dengan banyak cara. Metode yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah menggunakan spektrofotometri UV berdasarkan prinsip kalorimetri. Spektrofotometri UV-Vis dapat mengukur penyerapan atau absorptivitas warna.

Kadar kuersetin mula-mula ditentukan sebagai kadar flavonoid total dari sampel yang diuji. Hubungan langsung antara absorbansi dan kandungan analit dapat dihitung berdasarkan pada hukum Lambert-Beer (Yanlinastuti, 2016).

Analisis kadar flavonoid merupakan pengukuran total flavonoid yang terkandung dalam sampel. Analisis kadar flavonoid dilakukan dengan spektrofotometri UV-Vis menggunakan aluminium klorida ($AlCl_3$), standar yang digunakan adalah kuersetin. Kuersetin merupakan salah satu jenis flavonoid yang umum digunakan sebagai standar dalam penentuan kadar flavonoid, yang secara biologis amat kuat, memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-70% dari flavonoid (Kelly, 2011).

B. Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Gelombang merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang bermanfaat untuk mempelajari bidang mekanika, elektromagnetik, akustik, optik, teori kuantum hingga musik. Gelombang didefinisikan sebagai sebuah fenomena gerakan bolak balik sebagai akibat adanya gangguan pada medium udara, air maupun gas yang kemudian merambat pada ruang menstransmisikan energi yang menyertainya. Gelombang bergerak berpindah dari satu tempat ketempat lainnya tanpa diikuti oleh medium perantaranya (Fathuroya, 2017).

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata. Suatu sumber cahaya memancarkan energi, sebagian dari energi ini diubah menjadi cahaya tampak (*visible light*). Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat (v) gelombang elektromagnetik di ruang bebas sama dengan 3×10^8 meter per detik. Jika frekuensi (f) dan panjang gelombang λ , maka berlaku:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2.1)$$

dimana : λ adalah panjang gelombang (m)


v adalah kecepatan cahaya (m/s)

f adalah frekuensi (Hz)

Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 340 nanometer (nm) hingga 700 nanometer (nm), dimana jika diuraikan cahaya ini akan terdiri atas beberapa daerah warna (Muchamad, 2015).

Gelombang elektromagnetik memiliki daerah frekuensi yang sangat besar, yakni $10-10^{22}$ Hz. Gelombang tersebut merambat dengan laju 3×10^8 m/s pada daerah vakum. Setiap gelombang elektromagnetik memiliki sifat dasar yang sama dan laju yang sama. Namun, mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga panjang gelombang yang dimiliki juga berbeda (Wuwung, 2016).

Menurut Saputro, dkk (2013), sumber cahaya memancarkan energi dalam bentuk gelombang yang merupakan bagian dari kelompok gelombang elektromagnetik. Gambar 2.1 menunjukkan sumber cahaya alam dari matahari yang terdiri dari cahaya tidak tampak dan cahaya tampak.



Gambar 2.1 Kelompok Gelombang Elektromagnetik
(Sumber: Saputro, dkk, 2013)

Panjang gelombang tampak berukuran antara 380 μm sampai dengan 780 μm seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Panjang gelombang

Warna	Panjang Gelombang(μm)
Ungu	380 – 420
Nila	420 - 450
Biru	420 – 495
Hijau	495 – 566
Kuning	566 – 589
Jingga	589 – 627
Merah	627 – 780

(Sumber: Saputro, dkk 2013)

Semakin pendek panjang gelombang maka frekuensinya juga semakin tinggi serta daya tembusnya juga semakin besar. Panjang gelombang yang hanya dapat dilihat oleh mata berkisar antara 8000 \AA (merah)–4000 \AA (ungu). Sinar X dan sinar γ merupakan gelombang yang memiliki daya tembus yang sangat besar (Khabasiyah, 2012).

Menurut Faridah (2018), ultraviolet atau ultraungu berarti melebihi ungu. Jadi ultraviolet merupakan radiasi elektromagnetik yang mempunyai frekuensi di luar cahaya tampak. Sehingga, radiasi ultraviolet berada di bawah panjang gelombang cahaya tampak. Manusia tidak bisa melihat cahaya ultraviolet, namun beberapa hewan misalnya lebah dan serangga lainnya bisa melihat cahaya ultra

violet yang dapat membantu mereka mencari nektar pada bunga. Radiasi ultraviolet dibedakan menjadi dua, yaitu hampir UV dengan panjang gelombang 380 nm–200 nm dan UV vakum dengan panjang gelombang 200 nm–10 nm. Sinar Ultraviolet (UV) terbagi menjadi 3 berdasarkan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, sebagai berikut:

1. UV-A, memiliki panjang gelombang 380 nm–315 nm dan disebut juga gelombang panjang (blacklight).
2. UV-B, memiliki panjang gelombang 315 nm–280 nm dan disebut juga gelombang medium (medium wave).
3. UV-C, memiliki panjang gelombang 280 nm–10 nm dan disebut juga gelombang pendek (short wave).

Sinar UV menggunakan cahaya dengan kisaran panjang gelombang 200 nm–400 nm, sedangkan sinar tampak (visible) menggunakan cahaya dengan kisaran panjang gelombang 400 nm–800 nm. Cahaya tampak merupakan cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Energi elektromagnetik dengan spektrum frekuensi yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 380 nm–780 nm disebut cahaya tampak. Spektrum cahaya tampak tidak memiliki batasan yang tepat, panjang gelombang yang dapat diterima oleh mata normal manusia berkisar antara 400 nm–700 nm. Namun, beberapa orang bisa menerima panjang gelombang dalam rentang 380 nm–780 nm. (Dachriyanus, 2014).


C. Flavonoid

Flavonoid merupakan zat polifenol yang memiliki 15 atom karbon dan tersusun dengan konfigurasi C₆-C₃-C₆ dimana dua cincin aromatik dihubungkan oleh 3 atom karbon sehingga membentuk cincin ketiga. Senyawa flavonoid mudah ditemukan pada setiap bagian tumbuhan seperti daun, batang dan akarnya (Robinson, 1995).

Tanaman yang memiliki kandungan senyawa flavonoid sering digunakan dalam pengobatan tradisional karena senyawa memiliki peran ganda pada makhluk hidup. Studi farmakologi pada flavonoid menunjukkan bahwa beberapa flavonoid dapat digunakan sebagai antiinflamasi atau peradangan, antijamur, antihipertensi, diuretik, insektisida, antivirus, efek inhibitor enzim dan antihistamin (Geissman, 1962).

Flavonoid memiliki sifat antioksidan, senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil, karena bersifat sebagai reduktor, flavonoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas. Senyawa flavonoid seperti quersetin, morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006).

Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C₆-C₃-C₆. Artinya kerangka karbonnya terdiri dari dua gugus C₆ (cincin benzene tersubstitusi) disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon.




Gambar 2.2 Struktur Dasar Flavonoid

(Sumber: Robinson, 1995)

Kuersetin adalah suatu senyawa flavonoid dalam sayuran atau buah-buahan yang juga berpotensi sebagai antioksidan. Potensi tersebut ditunjukkan oleh posisi gugus hidroksilnya yang mampu langsung menangkap radikal bebas. Kuersetin memiliki sifat antiradikal paling kuat terhadap radikal hidroksil, peroksil, dan anion superoksida (Winarsi, 2007).

Kuersetin memiliki aktivitas antioksidan yang kuat karena memiliki tiga ciri pada strukturnya, yaitu 3',4'-dihidroksi pada cincin B; 2,3 ikatan rangkap pada cincin C dan sebuah gugus 5-hidroksil pada cincin A. Dilihat dari struktur kimianya, kuersetin memiliki aktivitas kuat sebagai pemberi hidrogen (hydrogen-donating) karena kandungan hidroksilasi yang cukup, yakni 5 gugus OH dan lokasi gugus hidroksilnya terdapat pada sisi aktif (C5, C7, C3' dan C4'). Ketiga ciri ini secara umum ditunjukkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Struktur Kuersetin

(Sumber: Robinson, 1995)

Flavonoid merupakan salah satu komponen khas tumbuhan hijau dan salah satu senyawa aktif yang sedang dipelajari para peneliti dalam pengembangan obat tradisional Indonesia. Mengenai distribusi flavonoid pada tumbuhan, penting bahwa tumbuhan yang secara taksonomi memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan jenis flavonoid yang sama. Oleh karena itu, informasi tanaman yang diteliti biasanya diperoleh dengan melihat literatur flavonoid sebelumnya pada tanaman terkait (misalnya dari famili atau suku yang sama). Dalam tumbuhan flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan dalam bentuk kombinasi glikosida. Aglikon flavonoid (yaitu flavonoid tanpa gula terikat) terdapat dalam berbagai bentuk struktur (Markham, 1988).

Sebagai antioksidan, flavonoid dapat menghambat penggumpalan keping-keping sel darah, merangsang pembentukan nitrit oksida yang dapat melebarkan (relaksasi) pembuluh darah, dan juga menghambat sel kanker. Selain berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, flavonoid juga memiliki sifat sebagai hepatoprotektif, antitrombotik, antiinflamasi, dan antivirus (Winarsi, 2017).

Efek flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat banyak macamnya dan menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid dipakai dalam pengobatan tradisional. Aktivitas antioksidannya mungkin dapat menjelaskan mengapa flavonoid tertentu merupakan komponen aktif tumbuhan yang digunakan secara tradisional untuk mengobati gangguan fungsi hati (Robinson, 1995).

Menurut Iqbal (2016), pada penentuan kadar flavonoid maka menggunakan persamaan regresi dari kurva standar antara absorbansi banding konsentrasi. Persamaan regresi secara sistematis dapat dituliskan:

$$y = mC + n \quad (2.2)$$

Selanjutnya nilai absorbansi disubstitusikan ke dalam persamaan regresi sebagai (y). Sehingga untuk menentukan kadar flavonoid pada sampel herbal dapat digunakan persamaan:

$$\text{Kadar Flavonoid} = \frac{C \times V}{M} \quad (2.3)$$

Keterangan: y = Nilai absorbansi

m = Kelandaian kurva garis lurus

n = Perpotongan kurva dengan ordinat

C = Konsentrasi larutan standar (mg/L)

V = Volume ekstrak sampel (L)

M = Massa ekstrak (mg)

Flavonoid mempunyai aktivitas antara lain sebagai agen antiinflamasi, antioksidan dan antialergi. Selain itu, flavonoid juga memiliki aktivitas sebagai antivirus dan antikarsinogenik. Flavonoid berupa senyawa polifenol, sehingga mempunyai sifat kimia seperti fenol. Adanya gula yang terikat pada aglikon akan menaikkan kepolaritasan dari flavonoid. Senyawa polar akan larut dalam pelarut polar, oleh karena itu glikosida flavonoid larut dalam pelarut polar. Secara umum, glikosida larut dalam air dan alkohol. Bentuk gula dari flavonoid bersifat larut air, sedangkan aglikon flavonoid bersifat lipofilik (Bruneton, 1999).

Metode kuantifikasi flavonoid klasik yang paling banyak digunakan adalah kolorimetri atau spektrofotometri, dengan menggunakan pereaksi $AlCl_3$. Aluminium klorida digunakan sebagai pereaksi pengompleks dengan gugus orto-dihidroksi dan menimbulkan pergeseran khas menuju pita panjang gelombang tinggi yang berguna pada analisis beberapa golongan flavonoid. Pereaksi $AlCl_3$ dan flavonoid akan membentuk kompleks tahan asam antara gugus hidroksi dan keton yang berdekatan. Sedangkan dengan gugus hidroksi pada kedudukan orto, kompleks yang terjadi tidak tahan asam (Robinson, 1995).

D. Antiinflamasi

Antiinflamasi atau antiradang merupakan sifat yang mengurangi radang (inflamasi). Setengah dari obat-obatan pereda nyeri merupakan obat antiinflamasi yang berfungsi mengurangi radang yang terjadi. Obat antiinflamasi yang biasa digunakan dibagi menjadi dua yaitu antiinflamasi steroid dan antiinflamasi nonsteroid, namun kedua golongan tersebut memiliki banyak efek samping seperti golongan steroid yang dapat menyebabkan tukak peptic, penurunan imunitas terhadap infeksi dan bersifat diabetic sedangkan untuk golongan nonsteroid dapat menyebabkan tukak lambung hingga pendarahan, gangguan ginjal dan anemia. Untuk mengurangi dampak tersebut maka banyak dilakukan pengembangan antiinflamasi yang berasal dari bahan alam terutama pada tanaman (Ramadhani, 2016).

Inflamasi atau peradangan adalah respons biologis yang kompleks dari jaringan vaskular terhadap iritan berbahaya (seperti iritan, patogen, atau sel / jaringan yang rusak). Peradangan merupakan prosedur pertahanan tubuh jika terdapat zat asing yang ingin masuk ke dalam tubuh, peradangan juga dapat terjadi akibat kerusakan jaringan yang disebabkan oleh zat kimia, trauma, panas maupun sebab lainnya. Sel yang meradang melepaskan berbagai macam zat

sehingga menyebabkan perubahan luar yang tidak terduga di sekitar sel normal (Mycek, 2001).

Peradangan dimulai ketika sel master melepaskan dan mendegradasi bahan kimia seperti serotonin, histamin dan bahan kimia yang lainnya. Histamin adalah penghubung kimiawi utama peradangan dan dapat dilepaskan oleh trombosit dan basofil. Vasodilatasi pembuluh darah yang menyebabkan permeabilitas kapiler serta peningkatan aliran darah selama peradangan merupakan hasil pelepasan dari histamin (Corwin, 2008).

Terjadinya peradangan adalah reaksi lokal jaringan terhadap rangsangan atau cedera. Jika terjadi luka maka akan merangsang pelepasan bahan kimia tertentu, bahan kimia ini kemudian membuat perubahan jaringan dalam respon inflamasi, termasuk serotonin, histamin, bradikinin, prostaglandin dan leukosit. Pelepasan histamin merupakan penyebab perubahan paling awal, yaitu vasodilatasi arteri kecil, diikuti vasokonstriksi dini dan peningkatan permeabilitas kapiler, yang menyebabkan perubahan distribusi sel darah merah. Sel darah merah akan menggumpal akibat dari pergerakan darah yang melambat sehingga menyebabkan sel darah putih terdorong menjauh. Aliran darah yang semakin lambat semakin banyak sel darah putih yang akan tertarik pada dinding pembuluh darah (Mansjoer, 1999).

Peradangan adalah proses respons terhadap nekrosis serta infeksi. Pada saat proses inflamasi terjadi maka reaksi vaskular dimulai dimana cairan, komponen darah, sel darah putih, dan mediator kimia berada di lokasi terjadinya kerusakan jaringan maupun infeksi. Prosedur inflamasi merupakan mekanisme perlindungan, dimana tubuh manusia dapat mencoba menetralkan dan menghilangkan zat berbahaya di tempat yang terluka dan mempersiapkan

perbaikan jaringan. Lima ciri peradangan yang dikenal sebagai tanda utama peradangan adalah kemerahan (kemerahan), demam (demam), bengkak (edema), nyeri (dolar) dan hilangnya fungsi (Functiolaesa) (Mansjoer, 1999).

Penanganan peradangan meliputi dua aspek, aspek pertama meredakan nyeri yang biasanya bergejala, dan aspek kedua menghentikan proses kerusakan jaringan. Penanganan inflamasi dapat menggunakan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) dan obat steroid yang dapat meredakan inflamasi dengan baik, namun penggunaan jangka panjang akan menimbulkan efek samping. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal, seperti tukak lambung, gangguan fungsi ginjal, dan memicu kehamilan. Penggunaan steroid jangka panjang mengurangi respon kekebalan tubuh terhadap infeksi, osteoporosis, bulan dan tekanan darah tinggi (Corwin, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan, kandungan kimia yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi adalah flavonoid. Flavonoid dapat menghambat enzim siklooksigenase atau lipooginase dan menghambat akumulasi leukosit didaerah luka sehingga dapat menjadi antiinflamasi (Narande, 2013).

E. Spektrofotometer UV-Vis

Ilmu yang mempelajari tentang penggunaan spektrofotometer disebut spektrofotometri. Alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif apabila energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang dinamakan spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang mengukur transmitansi atau absorbansi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Setiap media menyerap panjang gelombang cahaya tertentu, tergantung senyawa atau warna yang terbentuk. (200-350nm) dan komposit cahaya tampak (350-800nm). Penyerapan sinar UV atau VIS (cahaya

tampak) akan menyebabkan perubahan elektron, yaitu elektron akan dipromosikan dari kondisi dasar berenergi rendah ke orbit kondisi tereksitasi dengan energi yang lebih tinggi (Cairns, 2009).

Metode instrumen yang paling sering diterapkan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa (padat dan cair) berdasarkan absorbansi foton adalah spektrofotometer UV-Vis. Biasanya sampel harus diperlakukan atau derivatisasi, misalnya penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan, agar sampel bisa menyerap foton pada daerah UV-Vis dengan panjang gelombang foton 200 nm–700 nm. Pengidentifikasian unsur dilakukan melalui senyawa kompleksnya, Spektrofotometer UV-Vis memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang 180 nm–380 nm pada daerah UV, sedangkan pada daerah visible memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang 380 nm–780 nm. Adapun gambar spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada gambar 2.3 (Warono, 2019).



Gambar 2.4 Spektrofotometer UV-Vis
(Sumber: Sastrohamidjojo, 2007)

Untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya pada panjang gelombang tertentu dengan media kaca atau kuvet digunakan alat

spektrofotometer dengan prinsip kerja yaitu sebagian cahaya akan diserap, dan sisanya akan lewat. Konsentrasi larutan pada tabung reaksi akan sebanding dengan nilai absorbansi yang dihasilkan (Sastrohamidjojo, 2007).

Sinar ultraviolet dan sinar tampak memiliki energi yang bisa memindahkan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Energi tersebut berkisar antara 40 eV–1,8 eV. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2014).

Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer ultraviolet-tampak. Spektroskopi serapan ultraviolet dan cahaya tampak adalah metode tunggal yang paling berguna untuk mengidentifikasi struktur flavonoid. Metode ini bisa digunakan dalam pengujian kuantitatif agar diketahui jumlah kadar flavonoid yang terkandung dalam hasil ekstraksi metanol dengan spektrofotometer UV-Vis yaitu dengan menganalisis nilai absorbansi suatu zat. Flavonoid mengandung sistem aromatik terkonjugasi dan menunjukkan pita serapan yang kuat di wilayah UV-Vis (Sastrohamidjojo, 2007).

Menurut Warono dan Syamsuddin (2013), spektrofotometer secara umum terdiri dari sumber radiasi, monokromator, sel, foto sel, detektor dan tampilan (display).

1. Sumber radiasi memiliki fungsi untuk memberikan energi radiasi pada daerah panjang gelombang yang tepat dalam pengukuran dan mempertahankan intensitas sinar yang tetap terhadap pengukuran. Lampu hidrogen atau detuterium dan lampu filamen merupakan sumber radiasi dalam spektrofotometer UV-Vis. Untuk mendapatkan radiasi pada daerah ultraviolet sampai 350 nm dapat menggunakan lampu hidrogen. Sedangkan pada daerah sinar tampak hingga infra merah dekat dengan

panjang gelombang 350 nm–250 nm dapat menggunakan lampu filamen. Pengukuran spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer yang melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Spektrum UV-Vis sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer.

2. Monokromator memiliki fungsi untuk menghasilkan radiasi monokromatis yang didapatkan dari kuvet berisi sampel dan blanko yang diteruskan secara bersamaan melalui bantuan cermin berputar.
3. Detektor memiliki peran untuk memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Mengukur trasmittansi larutan sampel, dimungkinkan untuk menentukan konsentrasinya dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Spektrofotometer akan mengukur intensitas cahaya melewati sampel, dan membandingkan ke intensitas cahaya sebelum melewati sampel. Rasio disebut transmittansi dan biasanya digunakan dalam presentase.
4. Sel atau kuvet memiliki fungsi sebagai wadah yang akan diukur serapannya. Syarat dari kuvet tersebut yaitu harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap radiasi pada daerah yang digunakan, umumnya kuvet terbuat dari kaca tembus sinar maupun terbuat dari plastik. Adapun untuk bahan kaca silikat biasa tidak bisa digunakan dalam spektroskopi ultraviolet. Hal ini disebabkan karena bahan kaca silikat bisa menyerap

ultraviolet. Berbagai bahan yang digunakan untuk pembuatan kuvet seperti kaca, plastik hingga kuarsa. Bentuk kuvet juga bermacam-macam. Kuvet berbentuk jajaran genjang lebih tepat untuk pengukuran karena cahaya akan jatuh dengan sudut tegak lurus pada permukaan kuvet. Pemeriksaan yang memerlukan UV sebaiknya kuvet dari kwartz. Diameter standar kuvet adalah 1 cm. Berbagai jenis bahan kuvet yang sering digunakan dilaboratorium yaitu kuvet gelas dan kuvet plastik. Kuvet gelas adalah kuvet yang terbuat dari kaca dan dapat digunakan berulang-ulang, namun pada pengukuran di daerah UV hanya dapat digunakan kuvet yang terbuat dari bahan kuarsa, karena kuvet yang terbuat dari kaca tidak dapat mengabsorpsi sinar UV sehingga tidak dapat digunakan pada saat pengukuran di daerah UV.

5. Fotosel memiliki fungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan zat kemudian diubah menjadi energi listrik yang selanjutnya akan disampaikan ke detektor. Material yang dapat menyerap energi dari foton dan mengubahnya dalam bentuk lain (energi listrik) disebut detektor.
6. Display atau tampilan mengubah sinar listrik dari detektor menjadi pembacaan berupa angka atau meter dan sesuai dengan hasil yang dianalisis.

Salah satu metode instrumen yang paling sering diterapkan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa (padat dan cair) berdasarkan absorbansi foton adalah spektrofotometri UV-Vis. Biasanya sampel harus diperlakukan atau derivatisasi, misalnya penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan, agar sampel bisa menyerap foton pada daerah UV-Vis (panjang gelombang foton 200 nm–700 nm). Pengidentifikasian unsur dilakukan melalui senyawa kompleksnya (Irawan, 2019).

Spektrofotometer memiliki 2 tipe yaitu spektrofotometer sinar tunggal dan spektrofotometer sinar ganda. Spektrofotometer sinar tunggal biasanya dipakai untuk kawasan spektrum ultraungu dan cahaya yang terlihat. Spektrofotometer sinar ganda dapat dipergunakan baik dalam kawasan ultraungu dan cahaya yang terlihat maupun dalam kawasan inframerah.

1. Single-Beam instrument dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Pengukuran sampel dan larutan blanko atau standar harus dilakukan secara bergantian dengan sel yang sama.
2. Double beam, spektrofotometer memiliki berkas sinar ganda, sehingga dalam pengukuran absorbansi tidak perlu bergantian antara sampel dan larutan blanko, spektrofotometer double beam memakai absorbansi (A) otomatis sebagai fungsi panjang gelombang

Spektrofotometer UV-Vis memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang 180 nm–380 nm pada daerah UV, sedangkan pada daerah visible memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang 380 nm–780 nm. Sinar ultraviolet dan sinar tampak memiliki energi yang bisa memindahkan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Energi tersebut berkisar antara 40 eV–1,8 eV. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2014).

Dalam spektrum cahaya terdapat warna asli dan warna komplementer, warna asli merupakan warna yang diserap oleh benda, sedangkan warna komplementer merupakan warna yang diteruskan atau warna yang terlihat oleh mata manusia (tampak). Sebagai contoh larutan atau benda akan terlihat berwarna kuning karena menyerap spektrum warna biru. Hal ini menjadi salah satu inti dari


metode spektroskopi sinar tampak, dimana sampel yang akan diuji harus bersifat tembus cahaya dan berwarna. Warna sampel merupakan warna komplementer dari warna yang diserap oleh arutan; spektrum warna yang diserap inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu karakteristik dari sampel (Sopyan, 1999).

Gabungan antara spektrofotometri UV dan visible disebut spektrofotometri UV-Vis. Metode ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Oleh karena itu, metode ini memudahkan dalam penggunaannya untuk sampel berwarna maupun untuk sampel tak berwarna. Spektrofotometri UV-Vis melibatkan spektroskopi dari foton yang berada pada daerah UV-nampak. Sehingga menggunakan cahaya yang terlihat dan berdekatan dekat ultraviolet (UV) dan berdekatan dengan inframerah (NIR) kisaran. Warna bahan kimia yang terlibat secara langsung dipengaruhi oleh penyerapan dalam rentang yang terlihat. Molekul mengalami transisi elektronik di wilayah ini dari spektrum elektromagnetik (Syafei, 2015).

Prinsip kerja spektrofotometer yaitu zat yang akan diperiksa menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Setiap zat memiliki tingkat penyerapan yang unik pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi digunakan untuk mengukur kadar zat yang diteliti. Jumlah cahaya yang diserap suatu zat berbanding lurus dengan kandungan zat tersebut. Untuk memastikan akurasi pengukuran, bandingkan tingkatan yang akan diukur dengan tingkatan yang diketahui (standar) (KEMENKES, 2010).

Dalam spektrofotometer, terdapat sumber cahaya berupa lampu (Tungsten, Deutrium atau Wolfram), kolimator untuk memotong sinar yang menyebar, prisma berfungsi untuk menyeleksi spektrum cahaya atau dapat juga menggunakan grating atau kisi, cuvet untuk wadah sampel sedangkan blanko

sebagai pembanding dan detektor cahaya (fotometer) untuk menangkap cahaya yang ditransmisikan oleh sampel. Cahaya yang diseleksi oleh prisma atau grating dilewatkan pada sampel dan blanko atau sel pembanding kemudian ditangkap oleh fotometer berupa intensitas cahaya. Perbandingan intensitas cahaya yang melewati sampel dan blanko disebut sebagai transmitansi cahaya yang disebutkan pada hukum Lambert-Beer (Khopkar,1990)



Gambar 2.5 Proses Penyerapan Sinar UV-Vis Oleh Larutan Sampel Dalam Kuvet

(Sumber: Indodigital, 2018)

Penetapan untuk sampel yang berupa larutan, gas atau uap dapat menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sampel yang berupa larutan adalah sebagai berikut:

- Sampel harus dilarutkan dengan sempurna.
- Pelarut yang digunakan tidak boleh berwarna dan tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya.
- Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis.

d. Memiliki kemurnian yang tinggi.

Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang transparan pada daerah UV, misalnya air, etanol, metanol dan n-heksana. Konsentrasi sampel juga perlu diperhatikan untuk memperoleh spektrum UV-Vis yang baik. Hubungan antara absorbansi terhadap konsentrasi akan linear ($A \approx C$) jika nilai absorbansi larutan berkisar antara 0,2–0,8 (nm) ($0,2 \leq A < 0,8$), maka dinamakan sebagai daerah berlakunya hukum Lambert-Beer dengan lebar sel 1 cm (Suhartati, 2017).

F. Metode Ekstraksi

Kandungan zat antibakteri dari suatu tanaman dapat diperoleh melalui cara ekstraksi yang berfungsi untuk menarik senyawa kimia dari dalam tanaman. Ekstraksi merupakan metode pemisahan berdasarkan kelarutan suatu zat yang tidak saling campur. Pada dasarnya terdapat dua prosedur untuk membuat sediaan obat pada jenis tumbuhan, yaitu melalui cara ekstraksi dan pemerasan. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar.

Menurut Darwis (2000), ada beberapa metode ekstraksi senyawa organik bahan alam yang umum digunakan, antara lain maserasi, perkolasi, solektasi, destilasi uap dan pengempasan. Metode yang sering digunakan adalah metode maserasi karena metode yang paling sederhana dan mudah. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena melalui perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pengeksrak untuk proses maserasi akan memberikan

efektifitas yang tinggi melalui cara memerhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut.

Menurut Hargono (1986), ada beberapa variasi metode maserasi, antara lain digesti, maserasi melalui pengadukan kontinyu, remaserasi, maserasi melingkar, dan maserasi melingkar bertingkat. Digesti merupakan maserasi menggunakan pemanasan lemah ($40-50^{\circ}\text{C}$). Maserasi pengadukan kontinyu merupakan maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus, misalnya menggunakan shaker, sehingga dapat mengurangi waktu hingga menjadi 6-24 jam. Remaserasi merupakan maserasi yang dilakukan beberapa kali. Maserasi melingkar merupakan maserasi yang cairan pengestrak selalu bergerak dan menyebar. Maserasi melingkar bertingkat merupakan maserasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengestrakan yang sempurna. Lama maserasi memengaruhi kualitas ekstrak yang akan diteliti. Lama maserasi pada umumnya adalah 4-10 hari (Setyaningsih, 2006).

Menurut Voight (1995), maserasi akan lebih efektif jika dilakukan proses pengadukan secara berkala karena keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif. Melalui usaha ini diperoleh suatu keseimbangan konsentrasi bahan ekstraktif yang lebih cepat masuk ke dalam cairan pengestrak. Pelarut organik berdasarkan konstanta dielektrikum dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelarut polar dan non-polar. Konstanta dielektrikum dari beberapa pelarut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Konstanta Dielektrikum Pelarut Organik

Pelarut	Besarnya Konstanta
n-heksana	1,89
Eter	1,90
Chloroform	4,81
Etil asetat	6,02
Etanol	24,30
Metanol	33,60
Air	80,40

(Sumber: Sudarmadji. 1989)

Konstanta dielektrikum dinyatakan sebagai gaya tolak menolak antara dua partikel yang bermuatan listrik dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikurnya maka pelarut bersifat semakin polar. Pelarut polar merupakan pelarut yang memiliki gugus hidrokarbon

Etanol (etil-alkohol) adalah bahan yang memiliki sifat yang tidak beracun, banyak dipakai sebagai pelarut dalam dunia farmasi dan industri makanan dan minuman. Etanol merupakan pelarut polar yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan tidak berasa tetapi memiliki bau yang khas. Etanol dapat melarutkan senyawa alkaloida basa, minyak atsiri, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinin, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Selain itu, etanol dapat mengendapkan bahan obat dan juga dapat menghambat kerja enzim. Keuntungan dari etanol sebagai cairan pengekstrak adalah etanol bersifat lebih selektif, kapang

dan bakteri sulit tumbuh dalam etanol 20%, etanol bersifat tidak beracun, dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan, dengan kadar etanol 70% dapat dihasilkan suatu bahan aktif yang optimal karena bahan pengotor yang ikut dalam cairan pengekstraksiannya hanya dalam skala kecil. Etanol memiliki titik cair $-114,3^{\circ}\text{C}$ dan titik didih $78,4^{\circ}\text{C}$. Berdasarkan penelitian Sidharta dkk. (2007), beberapa rumput laut dari Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diekstrak menggunakan etanol, metanol, benzena, Heksana, dan akuades, menunjukkan bahwa ekstrak rumput laut yang memiliki aktivitas antibakteri paling presisi adalah ekstrak rumput laut menggunakan pengekstrak etanol.

Heksana adalah senyawa hidrokarbon alkana yang memiliki rumus kimia C_6H_{14} (isomer utama n-heksana memiliki rumus $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$). Dalam keadaan standar, senyawa ini berupa cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air atau bersifat non-polar dan mudah menguap. Heksana dihasilkan dari proses penyulingan minyak mentah, memiliki titik cair -95°C dan titik didih 69°C . Tingkat toksisitas dari heksana relatif rendah, walaupun sedikit bersifat anestetik. Menurut penelitian Gunawan dkk. (2008), ekstrak herba meniran (*Phyllanthus niruri* Linn) yang mengandung senyawa terpenoida, memiliki aktivitas antibakteri yang lebih baik menggunakan pengekstrak heksana daripada metanol.

G. Kopasanda (*Chromolaena Odorata* L.)

Menurut Fitrah (2016), Sunda kirinyu atau Kopasanda merupakan tanaman yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan obat oleh masyarakat untuk mengobati luka dan sebagai antioksidan. Daun Kopasanda merupakan tumbuhan dari famili *compositae* yang mengandung beberapa senyawa utama seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin dan steroid. Kandungan minyak atsiri pada daunnya terdiri atas isomer α -pineene, karbuten, kamper, limonene, β -caryophyllene dan miristol alkohol.

Berikut adalah klasifikasi tanaman Kopasanda:

Kingdom : Plantae
Clade : Tracheophytes, Angiospermae, Eudicots, Asterids
Order : Asterales
Family : Asteraceae
Genus : Chromolaena
Species : C. Odorata

Kopasanda dapat menyebabkan diare pada hewan ternak yang tidak sengaja memakannya dan apabila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan keracunan ternak bahkan sampai pada kematian. Kandungan nitratnya yang tinggi (lima sampai enam kali lebih tinggi dari tingkat toksisitasnya) dapat menyebabkan keguguran bahkan kematian ternak, serta dapat meracuni daun dan cabang muda tanaman kebun sehingga tanaman ini sangat merugikan (Akinmoladun, 2007).



Gambar 2.6 Daun Kopasanda
(Sumber: Dokumen pribadi)

Daun Kopasanda disebut gulma tekelan yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain serta menurunkan kesuburan tanah. Hasil ekstrak daun Kopasanda memiliki efek antioksidan karena kandungan flavonoid dan karotenoid yang tinggi dengan aktivitas antioksidan yang dapat menghambat

proses oksidasi. Gulma ini dicirikan oleh semak kayu yang tumbuh cepat. Gulma ini adalah obat kompetitif yang agresif dan mungkin memiliki efek alelopati atau dapat mempengaruhi tumbuhan disekitarnya (Winarno, Hendig, 2017).

Nabi Muhammad bersabda bahwa kesehatan adalah salah satu hak bagi tubuh manusia. Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat beragam, salah satunya melalui pemanfaatan tanaman, selain murah, bahaya yang ditimbulkannya juga sangat kecil (dapat diminimalisir). Maka dari itu, para peneliti mulai tertarik mempelajari tumbuhan obat. Apalagi mengingat Indonesia kaya akan tanaman yang dapat berkhasiat sebagai obat.

Tanaman sebagai komponen pengobatan tradisional sudah ramai digunakan dalam menjaga kesehatan, pengobatan dan keindahan atau kecantikan. Komunitas medis sudah mempelajari banyak obat tradisional dan mendapatkan hasil yang mendukung yaitu tanaman obat mengandung zat bermanfaat secara ilmiah. Tumbuhan adalah makhluk yang disembarkan Tuhan secara luas di muka bumi dan dapat memberi manfaat bagi umat manusia. Terbukti dengan firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syuarā/26:7 sebagai berikut.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 10, ayat ini membuktikan melalui uraiannya-uraiannya keniscayaan dan keesaan Allah swt. Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya tidak berubah. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yan diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga

manusia yang mati dan telah terkubur di bumi. Allah kuasa menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh ditanah yang gersang itu. Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.

Memandang ayat ini, telah dijelaskan tentang banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada umat manusia dengan menumbuhkan tanaman di bumi untuk digunakan secara tepat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa segala sesuatu pada permukaan bumi memiliki kegunaan dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi manusia bisa memanfaatkannya sepenuhnya.

Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu mengabarkan dari Nabi saw bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلِمَهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). (Abu Abdillah Al-Bukhari, 1412 H).

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka akan semakin banyak jenis dan macam penyakit, dan semakin banyak pula obat-obatan baru yang ditemukan. Allah SWT. Oleh karena itu banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat, maka nabi berpesan agar kita berobat jika kita mempunyai penyakit. Menyembuhkan orang yang menderita penyakit memang hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Diharapkan para ahli melakukan penelitian tentang metode pengobatan ini untuk membantu mereka yang menderita penyakit tersebut agar sembuh.

Hadis di atas telah mengajarkan kita bahwa Allah akan memberikan obat untuk semua penyakit yang diderita manusia. Kadang beberapa orang menemukan obatnya, dan beberapa orang tidak menemukan obatnya. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar agar dapat selalu berobat, berikhtiar dan terus berusaha untuk mencari pengobatan ketika penyakitnya berangsur-angsur memburuk.

Islam mengapresiasi pengobatan berbasis sains melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap perawatan untuk mengobati penyakit harus ditangani oleh ahlinya, khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali, mencari dan berbagi ilmu, salah satunya adalah memperoleh penemuan-penemuan pengobatan dan obat melalui penelitian, terlepas dari apakah obat tersebut berasal dari tumbuhan, hewan atau yang lain. Firman Allah Swt dalam Qs. Sad/38:27 yaitu:

كَفَرُوا بَيْنَ الَّذِي ظَنُّوا أَنَّهُ بَطْلٌ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
النَّارِ مَنْ كَفَرُوا لِلَّذِينَ فَوَيْلٌ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Kementerian Agama RI, 2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

ayat tersebut memiliki penjelasan yaitu, tidaklah Kami menciptakan langit, bumi, dan seisinya -berupa berbagai makhluk yang menakjubkan, beraneka ragam, dan penuh ketelitian- untuk sesuatu yang batil dan sia-sia. Dan keyakinan bahwa

mahluk-mahluk ini diciptakan tanpa mengandung hikmah merupakan keyakinan orang-orang kafir. Maka neraka bagi mereka akibat pada hari kiamat kekafiran dan prasangka buruk mereka terhadap Allah Yang Menciptakan mereka.

Kandungan Qs. Sad/38:27 menjelaskan untuk memiliki perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam telah mengajarkan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup dimulai dari diri sendiri seperti hal kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya. Untuk menjaga lingkungan berarti harus mencintai lingkungan dan melestarikannya dan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan seperti melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui kandungan dan manfaat tumbuhan untuk pengobatan.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menafsirkannya bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud di alam raya ini melainkan di sisi Kami-lah sendiri tidak sedikit pun di sisi selain Allah khazanahnya; Kami yang menciptakannya, menguasai dan juga membaginya sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Kami. Kami tidak menurunkannya, yakni menciptakan, menganugerahkan dan memberi mahluk kemampuan untuk menggunakannya melainkan dengan ukuran tertentu sesuai dengan keadaan masing-masing mahluk.

Sesungguhnya Allah swt menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan hamba-Nya dengan manfaat dan kebutuhan tertentu. Sesuatu apapun yang dimanfaatkan tidak diberikan kecuali menurut ukuran yang ditentukan di dalamnya terdapat kecukupan dan manfaat bagi orang yang membutuhkan dan rahmat bagi manusia. Misalnya Allah menurunkan air hujan dengan ukuran yang tertentu agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah daun Kopasanda yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2021 di Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Anorganik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Analitik dan laboratorium Organik Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Alat

- a. Spektrofotometer UV-Vis
- b. Batang Pengaduk
- c. Blender
- d. Bulb
- e. Corong
- f. Gelas kimia
- g. Gelas Ukur
- h. Handscoon
- i. Incubator
- j. Kuvet
- k. Lap halus
- l. Pipet tetes
- m. Pipet volume
- n. Rotavapor
- o. Sendok besi

- p. Timbangan analitik
- q. Vial
- r. Toples

b) Bahan

- a. Aluminium (III) Klorida 10%
- b. Aluminium foil
- c. Daun Kopasanda (*Cormolaena Odorata*)
- d. Aquades
- e. Etanol 70%
- f. Larutan HCL
- g. Logam magnesium
- h. Natrium asetat

C. Prosedur Penelitian

a. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara langsung di Kelurahan Romang Polong Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.

b. Pengolahan Sampel

a) Daun Segar

1. Mengambil dan mengumpulkan daun Kopasanda.
2. Mencuci sampel daun hingga bersih dan menyortir daun.
3. Menghaluskan daun dengan blender hingga dihasilkan sampel daun segar berbentuk pasta.



Gambar 3.1 Sampel Daun Segar
(Sumber: Dokumen pribadi)

b) Daun Kering

1. Mengambil dan mengumpulkan daun Kopasanda.
2. Mencuci sampel daun hingga bersih dan menyortir daun.
3. Mengeringkan daun tanpa terkena sinar matahari langsung selama 3 hari.
4. Menghaluskan daun dengan blender hingga dihasilkan sampel daun kering berbentuk bubuk dan mengayak sampel dengan ayakan 40 mesh.



Gambar 3.2 Mengeringkan Sampel Tanpa Terkena Sinar Matahari Langsung

(Sumber: Dokumen pribadi)

- c. Ekstraksi Sampel dengan Metode Maserasi
 - a) Daun Segar
 1. Mengambil 500 gram sampel pasta daun Kopasanda.
 2. Melakukan maserasi selama 24 jam dengan pelarut etanol 70%.
 3. Menyaring ekstrak menggunakan kain lap halus dan corong untuk memisahkan ekstrak dengan ampas.
 4. Melakukan maserasi ampas dengan menggunakan pelarut etanol 70% selama dua kali pengulangan di hari berikutnya.
 5. Memekatkan ekstrak menggunakan *rotavapor* hingga ekstrak membentuk pasta pekat.



Gambar 3.3 Memekatkan Ekstrak Menggunakan Rotavapor
(Sumber: Dokumen pribadi)

- b) Daun Kering
1. Mengambil 500 gram sampel bubuk daun Kopasanda.
 2. Melakukan maserasi selama 24 jam dengan pelarut etanol 70%.
 3. Menyaring ekstrak menggunakan kain lap halus dan corong untuk memisahkan ekstrak dengan ampas.
 4. Melakukan maserasi ampas dengan menggunakan pelarut etanol 70% selama 3 hari berturut-turut.
 5. Memekatkan ekstrak menggunakan *rotavapor* hingga ekstrak membentuk pasta.

Tabel 3.1 Ekstraksi Sampel Daun Kopasanda

No.	Sampel	Hasil ekstrak (Gambar)
1.	Daun Segar	
2.	Daun Kering	

d. Identifikasi Flavonoid Ekstrak Daun Kopasanda

1. Mengambil 50 mg ekstrak daun segar Kopasanda.
2. Menambahkan bubuk logam magnesium dan 4 tetes HCl pekat.
3. Apabila berubah warna merah magenta atau jingga maka hasilnya menunjukkan adanya flavonoid.
4. Mengulangi langkah 1-2 untuk daun kering.



Gambar 3.4 Proses Identifikasi Flavonoid

(Sumber: Dokumen pribadi)

Tabel 3.2 Uji Flavonoid Pada Sampel Daun Kopasanda

No.	Sampel	Pereaksi	Warna	Hasil
1.	Daun Segar			
2.	Daun Kering			

e. Pembuatan Kurva Nilai Absorbansi Larutan Standar Kuersetin

1. Menggunakan nilai absorbansi larutan standar pada konsentrasi 20, 30, 40, 50, dan 60 yang telah diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 436 nm.
2. Membuat kurva larutan standar untuk mendapatkan persamaan regresi linier.

Tabel 3.3 Nilai absorbansi larutan standar pada panjang gelombang maksimum

No.	Konsentrasi Larutan Standar (ppm)	Absorbansi Larutan standar
1.	20	0,252
2.	30	0,394
3.	40	0,498
4.	50	0,608
5.	60	0,743

f. Penetapan Kadar Flavonoid Ekstrak Daun Kopasanda

1. Menimbang 50 mg ekstrak daun segar Kopasanda.
2. Melarutkan ekstrak ke dalam 10 mL etanol hingga memperoleh konsentrasi sebesar 5000 µg/ml.
3. Mengambil sebanyak 0,5 mL sampel uji dengan menambahkan 1,5 mL etanol, aluminium (III) klorida 0,1 mL, asetat 0,1 mL dan aquades 2,8 mL.
4. Menginkubasi selama 30 menit pada suhu 37⁰C.

5. Mengukur absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 436 nm sebanyak 3 kali pengukuran.
6. Mengulangi langkah 1-5 untuk ekstrak daun kering.



Gambar 3.5 Hasil Pembacaan Absorbansi pada Spektrofotometer UV-Vis
(Sumber: Dokumen pribadi)

Tabel 3.4 Nilai Absorbansi Ekstrak Daun Kopasanda

No.	Sampel	Massa Ekstrak (mg)	Absorbansi Ekstrak
1.	Daun Segar		
2.	Daun Kering		

D. Analisis Data

Pada penentuan kadar flavonoid maka menggunakan persamaan regresi dari kurva standar antara absorbansi banding konsentrasi larutan standar. Secara sistematis dapat dituliskan:

$$y = mC + n \quad (3.1)$$

Selanjutnya nilai absorbansi disubstitusikan ke dalam persamaan regresi sebagai (y). Sehingga untuk menentukan kadar flavonoid pada sampel herbal dapat digunakan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{Kadar Flavonoid} \\ &= \frac{C \times V}{M} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Keterangan: y = Nilai absorbansi

m = Kelandaian kurva garis lurus

n = Perpotongan kurva dengan ordinat


C = Konsentrasi larutan standar (mg/L)

V = Volume ekstrak sampel (L)

M = Massa ekstrak (mg)

Tabel 3.5 Kandungan Flavonoid Total Ekstrak Daun Kopasanda

No.	Sampel	Konsentrasi Ekstrak (mg/L)	Kadar Flavonoid (%)
1.	Daun segar		
2.	Daun kering		

E. Bagan Alir**Gambar 3.6** Bagan Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Anorganik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta Laboratorium Organik dan Laboratorium Analitik Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Kopasanda yang diklasifikasikan antara daun segar dan daun kering. Sampel tersebut dihaluskan menggunakan blender lalu diekstraksi menggunakan metode maserasi. Kemudian hasil ekstrak sampel dilakukan identifikasi flavonoid. Selanjutnya, dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan persamaan 3.1 dan 3.2 dengan menggunakan data absorbansi kuersetin sebagai pembanding untuk memperoleh kadar flavonoid.

A. Ekstraksi Daun Kopasanda



Sampel daun yang digunakan pada penelitian ini adalah daun Kopasanda (*Chromolaena Odorta*) yang diklasifikasi menjadi daun kering dan daun segar. Daun segar adalah daun yang diambil langsung kemudian diolah menjadi ekstrak sedangkan daun kering adalah daun segar yang terlebih dahulu dikeringkan selama 3 hari tanpa terkena sinar matahari langsung. Kedua sampel tersebut kemudian dihaluskan lalu diekstraksi menggunakan metode maserasi agar komponen kimia yang ada di dalam sampel tertarik atau terpisahkan.

Metode maserasi digunakan dalam melakukan ekstraksi pada penelitian ini karena merupakan metode yang cukup sederhana, mudah dan

tanpa melalui proses pemanasan sehingga komponen senyawa kimia dalam sampel dapat diminimalisir kerusakannya. Proses ekstraksi dilakukan dengan merendam sampel yang telah dihaluskan menggunakan pelarut etanol 70% untuk mencari senyawa flavonoid. Pemilihan pelarut ini disebabkan karena senyawa flavonoid umumnya dalam bentuk glikosida yang bersifat polar sehingga harus dilarutkan dengan pelarut yang bersifat polar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah hasil ekstraksi daun kering dan segar Kopasanda:


Tabel 4.1 Hasil Ekstraksi Sampel Daun Kopasanda

No	Sampel	Hasil ekstrak (Gambar)
1.	Daun segar	
2.	Daun kering	

Penentuan kadar flavonoid total dilakukan dengan menggunakan larutan standar kuersetin 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm. Pengukuran absorbansi dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 436 nm. 20 ppm nilai absorbansinya (0,252), 30 ppm nilai absorbansinya (0,394), 40 ppm nilai absorbansinya (0,498), 50 ppm nilai absorbansinya (0,608), dan 60 ppm nilai absorbansinya (0,743). Hasil yang diperoleh dari pengukuran kurva larutan standar yaitu semakin tinggi

konsentrasi, maka semakin tinggi nilai absorbansinya. Menurut literatur, hasil ini menunjukkan hubungan lurus antara absorbansi dan kadar analit. Berikut adalah grafik kurva larutan standar kuersetin.

Grafik 4.1 Kurva Larutan Standar



Pemilihan kuersetin sebagai larutan standar dikarenakan kuersetin merupakan senyawa yang paling luas penyebarannya yang terdapat pada tumbuhan. Kuersetin dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid dan juga karena merupakan salah satu senyawa golongan flavonoid yang dapat bereaksi dengan $AlCl_3$ membentuk senyawa kompleks.

B. Nilai Absorbansi Daun Kopasanda

Pengukuran absorbansi dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis menggunakan alat yang disebut spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 436 nm. Nilai absorbansi berturut-turut yang didapatkan pada ekstrak etanol 70% daun segar Kopasanda sebesar 0,338, 0,337, dan 0,337 sedangkan untuk ekstrak daun kering Kopasanda sebesar 0,427, 0,429 dan 0,428.

Berikut adalah data nilai absorbansi daun segar Kopasanda dan daun kering Kopasanda:

Tabel 4.2 Nilai Absorbansi Ekstrak Daun Kopasanda

No	Sampel	Massa Ekstrak (mg)	Absorbansi Ekstrak	Absorbansi Ekstrak Rata-rata
1.	Daun Segar	50	0.338	0.337
			0.337	
			0.337	
2.	Daun Kering	50	0.427	0.428
			0.429	
			0.428	



Menurut Dirjen POM (2014) range kadar flavonoid total berdasarkan nilai absorbansinya berkisar antara 0,2-0,8. Hasil yang diperoleh dari ekstrak etanol 70% mengandung kadar flavonoid.

C. Kadar Flavonoid Ekstrak Daun Kopasanda

Identifikasi flavonoid dilakukan menggunakan logam Mg dan HCL untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun Kopasanda. Golongan senyawa yang teridentifikasi adalah golongan flavonoid yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna jingga atau merah bata pada ekstrak. Penambahan logam Mg dan HCl pada identifikasi senyawa flavonoid bertujuan untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat dalam struktur flavonoid sehingga terjadi perubahan warna jingga atau merah. Penambahan HCl mengakibatkan terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara logam Mg sebagai pereduksi dengan senyawa flavonoid.

Berikut adalah hasil identifikasi senyawa flavonoid absorbansi daun segar Kopasanda dan daun kering Kopasanda:

Tabel 4.3 Hasil Uji Flavonoid Pada Sampel

No	Sampel	Pereaksi	Warna	Hasil	Gambar
1.	Daun segar	Logam magnesium + HCl	Merah bata	+	
2.	Daun kering	Logam magnesium + HCl	Merah bata	+	

Kadar flavonoid ekstrak daun segar dan daun kering Kopasanda dilakukan pengukuran pada panjang gelombang 436 nm. Flavonoid dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi kuersetin yang telah diukur sebelumnya. Kadar flavonoid dihitung sebagai kadar flavonoid total dalam sampel. Perhitungan ini berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menunjukkan hubungan lurus antara absorbansi dan kadar analit, artinya semakin besar nilai absorbansi ekstrak maka semakin besar pula kadar flavonoid yang terkandung pada ekstrak daun.

Berikut adalah data kandungan flavonoid total ekstrak daun segar Kopasanda dan daun kering Kopasanda:

Tabel 4.4 Kandungan Flavonoid Total Ekstrak Daun Kopasanda

No	Sampel	Massa Ekstrak (mg)	Konsentrasi Ekstrak (mg/L)	Kadar Flavonoid (%)
1.	Daun Segar	50	26,44	2,64
2.	Daun Kering	50	34	3,4

Untuk menghitung kadar total flavonoid, mula-mula absorbansi sampel dihitung rata-ratanya kemudian dimasukkan kedalam persamaan kurva regresi $y = 0,012x + 0,020$ dengan koefisien korelasi sebesar 0,998 yang ditunjukkan pada grafik 4.1 sehingga diperoleh kadar total flavonoid untuk ekstrak etanol daun segar Kopasanda sebesar 26,44 mg/L atau 2,64% dan daun kering Kopasanda sebesar 34 mg/L atau 3,4%. Kadar flavonoid pada ekstrak daun segar lebih sedikit dari ekstrak daun kering.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Hilma pada tahun 2020 dengan judul Penentuan Kandungan Total Fenol Dan Total Flavonoid Ekstrak Daun Kelengkeng (*Dimoncarpus Longan Lour*), kadar flavonoid total masing-masing adalah 21,23 $\mu\text{g}/\text{mg}$ untuk sampel daun segar dan 33,64 $\mu\text{g}/\text{mg}$ untuk sampel daun kering. Ekstrak daun kering memiliki kandungan senyawa flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak daun segar.

Hal tersebut disebabkan karena proses pengeringan dapat membuka dinding sel sampel yang diekstrak sehingga semakin banyak kandungan flavonoid yang terekstrak. Selain itu kadar air dan kelembaban yang masih tinggi di dalam sampel menyebabkan hilangnya senyawa antioksidan melalui proses degradasi enzimatik yang tinggi dalam sampel.

Seperti yang telah diketahui, Allah swt. berkali-kali menegaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya tanpa sia-sia, begitupun pada tumbuh-tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi salah satunya untuk menjaga kesehatan. Daun Kopasanda adalah salah satu tumbuhan baik yang dimaksud karena telah banyak digunakan sebagai obat herbal yang baik untuk mengobati peradangan. Hal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. bagi orang-orang yang berpikir tentang kebesaran Allah swt. atas makhluk ciptaan-Nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada analisis nilai absorbansi dalam penentuan kadar flavonoid hasil ekstraksi daun Kopasanda (*Chromolaena Odorta*), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai absorbansi ekstrak ekstrak daun Kopasanda pada ekstrak daun segar adalah sebesar 0,337, sedangkan untuk ekstrak daun kering adalah sebesar 0,428.
- b. Kadar flavonoid ekstrak daun Kopasanda pada ekstrak daun segar adalah sebesar 26,44 mg/L atau 2,64% dan daun kering sebesar 34 mg/L atau 3,4%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel tanaman yang lain agar dapat dibandingkan antara sampel tanaman yang satu dengan sampel tanaman lainnya sebagai tanaman herbal yang lebih banyak mengandung senyawa flavonoid.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinmoladun, Afolabi C, Ibukun E O, dan Ologe, I A. 2007. *Phytochemical constituents and antioxidant properties of extracts from the leaves of Chromolaena odorata*. Scientific Research and Essay. Vol 2. 2007.
- Bruneton J. 1999. *Pharmacognosy: Phytochemistry Medical Plants. 2nd.ed.* Paris: Intercept Ltd.
- Cairns D. 2009. *Essentials of Pharmaceutical Chemistry Second Edition (Intisari Kimia Farmasi Edisi Kedua)*. Penerjemah: Puspita Rini. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Carbonaro, M. 2005. *Absorption of Quercetin and Rutin in Rat Small Intestine. Annals Nutrition and Metabolism: New York*
- Corwin, E, 2008, *Buku Saku Patofisiologi*, Terjemahan oleh: Subekti, N B., 2009, Jakarta: EGC.
- Dachriyanus. 2014. *Analisis Struktur Senyawa Organik secara Spektroskopi*. Padang: LPTIK.
- Fathuroya, Vivien. 2017. *Fisika Dasar Untuk Ilmu Pangan*. Universitas Barawijaya: Barawijaya Press.
- Fitrah, Muhammad, dkk. 2017. *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Kimia Zat Anti Kanker dari Daun Kopasanda (Chromolaena odorata (L.))*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, April 2017, Hlm. 77-81 Issn 1693-1831.
- Geissman, T. A. 1962. *The Chemistry of Flavonoid Counpound*. Pergamon Press: Oxford.
- Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., 2013. *Fundamentals of Physics 7th Edition*. New York. John Wiley & Sons Inc.
- Iqbal. 2016. *Analisis Nilai Absorbansi Kadar Flavonoid Daun Sirih Merah (Piper Crocatum)*

- Dan Daun Sirih Hijau (Piper Betle L).* Program Studi Fisika Jurusan Fisika FMIPA: Universitas Tadulako. Gravitasi Vol. 15 No. 1.
- Irawan, Anom. 2018. *Kalibrasi Spektrofotometer Sebagai Penjaminan Mutu Hasil Pengukuran Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengujian. Indonesian Journal of Laboratory.*
- Kelly G.S., 2011, *Quercetin, Alternative Medicine Review (AMR).*
- Kemenkes RI. 2010. *Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS.* Jakarta: Balitbang
Kemenkes RI
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* PT. Syaamil Cipta Media Bandung.
- Khabasiyah, Ummu Aiman. 2012. *Aplikasi Model Matematika Radiasi Gelombang Elektromagnetik Ponsel pada Ginjal.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Khopkar, S. M. 1990. *Konsep Dasar Kimia Analitik.* Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mansjoer, Arif, dkk. 1999. *Kapita Selekta Kedokteran.* Jakarta: Fakultas Kedokteran Univ Indonesia.
- Markham, K.R., 1988, *Cara Mengidentifikasi Flavonoid, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata.* ITB: Bandung.
- Muchamad, Pamungkas. 2015. *Perancangan dan Realisasi Alat Pengukur Intensitas Cahaya.* Fakultas Ilmu Terapan: Universitas Telkom
- Mukhriani, Faridha Yenny Nonci, Sitti Munawarah. 2015. *Analisis Kadar Flavonoid Total pada Ekstrak Daun Sirsak (Annona Muricata L.) dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis. JF FIK UINAM 3, no 2.*
- Mycek, Mary J. 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar.* Jakrta: Widya Medika.
- Narande J. M., Anne W., Adithya Y. 2013. *Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Suji Terhadap Edema Kaki Tikus Putih Jantan Galur Wistar. Pharmacon, 2013, 2(3):14-18.*

- Neldawati dkk, 2013. *Analisi Nilai absorbansi dalam penentuan kadar flavonoid untuk berbagai jenis daun tanaman obat*. Padang: pillar of physics Vol 02.
- Ramadhani, Sumiwi, S.A. 2016. *Aktivitas Antiinflamasi Berbagai Tanaman Diduga Berasal dari Flavonoid* [Versi elektronik]: Farmaka
- Robinson, T., 1995. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi, Edisi VI, Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata*, ITB: Bandung.
- Sastrohamidjojo. 2007. *Spektroskopi*. Yogyakarta: Liberty.
- Warono Dwi dan Syamsudin. 2013. Unjuk Kerja Spektrofotometer Untuk Analisa Zat Aktif Ketoprofen. *Jurnal Konversi 2*.
- Selawa, Widya, dkk. 2014. *Kandungan Flavonoid Dan Kapasitas Antioksidan Total Ekstrak Etanol Daun Binahong [Anredera Cordifolia (Ten.) Steenis]*. Manado: Univeristas sam Ratulangi. Vol. 2 No. 01.
- Setyaningsih, D. 2006. *Peranan Aktivitas Enzim β -Glukosidase pada Pembentukan Flavor Vanilla selama Proses Kuring*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana (SPS). IPB. Bogor.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silalahi, Jansen. 2006. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sopyan. 1999. *Analisis Kimia Kuantitatif (terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka) Edisi kelima*. Erlangga: Jakarta
- Suhartati, Tati. 2017. *Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa untuk Penentuan Senyawa Organik*. Lampung: AURA.
- Syafei, Zakirullah. 2015. *Laporan Praktikum Biomedik 3 BM 506 Metabolisme Glukosa, Urea Dan Trigliserida (Teknik Spektrofotometri)*. Univreritas Tadulako: Palu.
- Voight, R., 1995, *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, diterjemahkan oleh Soendari Noerono, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Warono Dwi dan Syamsudin. 2013. *Unjuk Kerja Spektrofotometer Untuk Analisa Zat Aktif Ketoprofen. Jurnal Konversi 2*.


- Winarno H dan Katrin E. 2008. *Aktivitas sitotoksik fraksi ekstrak etil asetat kulit batang mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff) Boerl) terhadap sel kanker manusia*. Majalah Obat Tradisional.
- Winarsi H. 2017. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas: Potensi dan Aplikasi dalam Kesehatan*. Vol. 5, Gaya Baru.
- Wuwung Janny Only dan Benefit S Narasiang. 2016. *Aplikasi Ired (Infra red emitting diode) Wireless Headphone*. *E-journal Teknik Elektro dan Komputer* 5, no. 3.
- Yanlinastuti dan Syamsul Fatimah. 2016. *Pengaruh Konsentrasi Pelarut Untuk Menentukan Kadar Zirkonium Dalam Paduan U-Zr Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. *Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir*.

BIOGRAFI



NURWAHIDAH, dilahirkan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa pada 17 Agustus 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta dari pasangan Muhlis Daeng Naba dan Salmah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Balang-balang pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sungguminasa pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis sangat suka menulis dan nonton drama korea. Impian penulis bisa menerbitkan buku atau novel karya sendiri, jalan-jalan ke korea dan bisa memberangkatkan haji kedua orang tua. Harapan penulis untuk yang akan datang, lulus kuliah dengan gelar S1 Fisika. Setelah lulus, melanjutkan Pendidikan Fisika Medik dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai serta membahagiakan orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



LAMPIRAN 1
ANALISIS DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Perhitungan Konsentrasi Pada Sampel Ekstrak Daun Kopasanda

Persamaan regresi larutan standar (kuersetin)

$$y = mC + n$$

$$y = 0,012C + 0,020$$

a. Daun Segar

$$0,337 \longrightarrow y = 0,012 C + 0,020$$

$$0,337 = 0,012 C + 0,020$$

$$0,012 C = 0,337 - 0,020$$

$$C = \frac{0,137}{0,012}$$

$$C = 26,44 \text{ mg/L}$$

b. Daun Kering

$$0,428 \longrightarrow y = 0,012 C + 0,020$$

$$0,428 = 0,012 C + 0,020$$

$$0,012 C = 0,428 - 0,020$$

$$C = \frac{0,408}{0,012}$$

$$C = 34 \text{ mg/L}$$

2. Perhitungan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Daun Kopasanda

a. Daun Segar

$$\text{Berat Ekstrak (M)} = 50 \text{ mg}$$

$$\text{Konsentrasi Ekstrak (C)} = 26,44 \text{ mg/L}$$

$$\text{Volume Ekstrak} = 0,05 \text{ L}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Flavonoid} &= \frac{C \times V}{M} \\ &= \frac{C \times V}{M} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{26,44 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L}}{50 \text{ mg}} \\ &= 0,0264 \times 100\% \\ &= 2,64 \% \end{aligned}$$

b. Daun Kering

Berat Ekstrak (M) = 50 mg

Konsentrasi Ekstrak (C) = 34 mg/L

Volume Ekstrak = 0,05 L

$$\begin{aligned} \text{Kadar Flavonoid} &= \frac{C \times V}{M} \\ &= \frac{C \times V}{M} \\ &= \frac{34 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L}}{50 \text{ mg}} \\ &= 0,034 \times 100\% \\ &= 3,4 \% \end{aligned}$$



LAMPIRAN 2

PENYIAPAN SAMPEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



Gambar 1. Pengambilan daun sampel



Gambar 2. Pencucian daun sampel



Gambar 3. Menghaluskan sampel



Gambar 4. Sampel halus yang didapatkan



Gambar 5. Mengayak sampel



Gambar 6. Memekatkan sampel



LAMPIRAN 3
IDENTIFIKASI FLAVONOID DAN
PENENTUAN NILAI
ABSORBANSI SAMPEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 1. Uji flavonoid



Gambar 2. Hasil uji flavonoid



Gambar 3. Menimbang sampel



Gambar 4. Penyiapan sampel



Gambar 5. Menginkubasi sampel



Gambar 6. Hasil analisis spektrofotometer UV-Vis