

GAMBARAN POLA MAKAN ANAK STUNTING: *LITERATUR REVIEW*



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

SALLY PURWANTI

70300117048

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sally Purwanti
NIM : 70300117048
Tempat/Tanggal Lahir : Bontotallasa, 26 Juni 1999
Jurusan : S1 Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata Gowa
Judul : Gambaran Pola Makan Anak Stunting: *Literatur Review*

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari karya tulis ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021

Sally Purwanti

Nim: 70300117048

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Pola Makan Anak Stunting: Literatur Review" yang disusun oleh Sally Purwanti NIM: 70300117048 Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 10 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 19 Agustus 2021 M,
10 Muharram 1443 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin., Sp.A., M.Kes	
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	
Munaqisy I	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes	
Munaqisy II	: Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.Ag	
Pembimbing I	: Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes	
Pembimbing II	: Dr. Risnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Syatirah Djalaluddin., Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

M A K A S S A R

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat segala nikmat iman, rahmat, dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gambaran Pola Makan Anak Stunting: *Literatur Review*”. Salam serta shalawat kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya yang seting-tingginya sebagai penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya tercinta. Muh. Darling & Nur Samsi atas didikan, cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, bimbingan dan motivasi, sehingga penulis dapat berada ditahap ini.

Demikian pula Ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Dr. Hasnah S.Kep., Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Dr. Risnah S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ketahap ini.
5. Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Penguji I dan Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Serta kepada saudara, sahabat, teman-teman Leukos17 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memotivasi saya.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mungkin saja dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disadari oleh penulis, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, 28 Februari 2021

Penulis,

Sally Purwanti

70300117048



DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN3

A. Latar Belakang3

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian6

D. Manfaat Penelitian7

E. Kajian Pustaka.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Tinjauan Umum Stunting.....12

1. Defenisi Stunting.....12

2. Tanda Stunting14

3. Penyebab Stunting.....15

4. Faktor yang Mempengaruhi Stunting.....15

5. Penilaian Stunting pada Anak18

6. Pencegahan Stunting19

B. Tinjauan Umum Pola Makan Anak20

1. Defenisi Pola Makan20

2. Pola Pemberian Makan.....22

3. Jenis Makanan24

4. Prinsip Gizi Seimbang.....	25
5. Asupan Zat Gizi Makronutrien	27
C. Teori Keperawatan Terkait Penelitian	33
1. Biografi	33
2. Konsep Teori Madeleine Leininger	34
D. Kerangka Teori.....	37
E. Kerangka Konsep	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Teknik Pengumpulan Data	39
C. Analisa Data	41
D. Rekomendasi	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil	42
B. Pembahasan.....	52
C. Keterbatasan Penelitian.....	60
D. Rekomendasi Peneliti.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Sally Purwanti
NIM : 70300117048
Judul : **Gambaran Pola Makan Anak Stunting: *Literatur Review***

Stunting menjadi salah satu permasalahan dalam proses pertumbuhan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian, dan perkembangan otak yang suboptimal. *Stunting* (Balita Pendek) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat rendahnya asupan gizi seperti vitamin, mineral dan sumber protein hewani. Salah satu penyebab kejadian *stunting* pada anak adalah pola pemberian makan yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran pola makan anak *stunting*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *literatur review* dengan desain *deskriptif naratif*. Kata kunci pencarian literatur penelitian adalah *Dietary habit or stunting child* (Pola makan atau anak *stunting*), *Dietary habit and stunting child* (Pola makan dan anak *stunting*). Yang dilakukan pada empat database: *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar* dan *Demensions*. Didapatkan sebanyak 2.246 artikel. Dan seluruh artikel diseleksi menggunakan instrumen dari *Joanna Briggs Institute*. Setelah dilakukan proses *identification*, *screening* dan *eligibility*, diperoleh 9 artikel yang sesuai kriteria inklusi tujuan penelitian. Berdasarkan 9 penelitian yang telah dianalisis didapatkan kesimpulan bahwa anak *stunting* memiliki gambaran pola makan yang buruk.

Kata Kunci: Pola Makan, Anak *Stunting*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Sally Purwanti
NIM : 70300117048
Title : **Overview of Stunting Child's Diet: *Literatur Review***

Stunting is one of the problems in the growth process because it is associated with an increased risk of morbidity, mortality, and suboptimal brain development. Stunting (Short Toddler) is a chronic malnutrition problem caused by inadequate nutritional intake for a long time due to low intake of nutrients such as vitamins, minerals and sources of animal protein. One of the causes of stunting in children is poor feeding patterns. This study aims to determine the description of the diet of stunted children. This study uses a literature review approach with a descriptive narrative design. The keywords in the research literature search were Dietary habit or stunting child, Dietary habit and stunting child. This was carried out on four databases: PubMed, Science Direct, Google Scholar and Demensions. There were 2,246 articles. And all articles were selected using instruments from the Joanna Briggs Institute. After the identification, screening and eligibility process, 9 articles were obtained conclusion that matched the inclusion criteria for the research objectives.

Keywords: Dietary Habit, Stunting Child



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting menjadi salah satu permasalahan dalam proses pertumbuhan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian, dan perkembangann otak yang suboptimal. Saat ini, Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi yang menimpa masyarakat khususnya anak balita baik laki-laki maupun perempuan. (Anak, Aek and Tobotan, 2020) Di seluruh belahan dunia, ancaman permasalahan gizi didunia terdapat 165 juta anak dengan perawakan pendek, sekitar 45% diantaranya tinggal di negara-negara berkembang dan negara berkonflik 9 juta dari mereka tinggal diindonesia (Syaifah, 2020).

Meurut United Nations Children's Fund (UNICEF, 2020) memperikarakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kurang gizi di Indonesia cukup besar, membuat penanganan juga harus memperhatikan aspek ini. Perwakilan UNICEF Indonesia mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2.000.000 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7.000.000 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah lima tahun bisa meningkat 15% secara global pada tahun 2020 jika tidak ada tindakan (UNICEF, 2020).

Menurut *World Health Organization* (WHO), Terdapat 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia juga tertinggi dibandingkan Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%), Indonesia termasuk dalam 17 negara, di antara 117 negara, yang mempunyai masalah gizi yaitu stunting (WHO. 2018).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tercatat 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia. Saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13% (Riskesdas, 2019).

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2020) menjelaskan bahwa 151.398 anak menderita stunting atau kondisi gagal tumbuh pada tahun 2020. Mereka tersebar pada lima kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, ada lima daerah dengan angka stunting tertinggi yakni di kabupaten Bone 43%, Enrekang 39%, Jeneponto 36 %, Takalar 34 % dan Bantaeng 33% (Dinkes Prov. Sulsel, 2020).

Penelitian dengan metode cross sectionaal dan kuantitatif yang dilakukan oleh Joko tentang korelasi konsumsi makanan dengan keterangan gizi mengindikasikan korelasi yang cukup signifikan. Hasil yang ada mengindikasikan bahwa anak yang memiliki pola konsumsi

makanan yang minim mengarah pada resiko hingga 3 kali lebih banyak terdampak masalah stunting. Penelitian yang dilakukan di negara brazil pun menunjukkan bahwa anak dengan minim konsumsi makanan atau kekurangan gizi dari kandungan protein dibawah standar dapat menyebabkan potensi hingga 1,5 kali terdampak masalah *stunting*. Penelitian ini pun menilai anak yang mendapatkan konsumsi lemak lebih rendah dari kebutuhan berpotensi hingga 2 kali terdampak masalah *stunting* (Brier, 2020).

Selain itu, di dalam Penelitian Waladow, yang menggunakan metode cross sectional, menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang terjadi pada pola konsumsi makanan dan status atau keterangan gizi yang dialami oleh anak dibawah rentang umur 3-5 tahun yang ada pada kawasan kerja puskesmas tompaso, terkait perilaku pemberian asupan makan buruk yang menimbulkan potensi kekurangan gizi. Perilaku konsumsi makanan pada individu dapat berdampak pada status atau keterangan gizi. Keterlibatan ibu turut berdampak signifikan pada masa bertumbuh dan berkembang seorang anak disebabkan perilaku pengasuhan yang baik juga pemenuhan gizi pada anak (Jahja, 2019).

Berdasarkan penelitian Aramico yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, mengindikasikan bahwa perilaku konsumsi yang diberikan seorang ibu ataupun anggota keluarga pada anak usia dibawah lima tahun yang mengalami masalah stunting sejumlah besar dinyatakan minim dari rekomendasi yang

diberikan oleh kementerian kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang di muat di Aceh, mengindikasikan bahwa perilaku konsumsi dari keluarga pada anak yang dinyatakan tidak benar menyebabkan 6,01 kali lebih banyak dalam meningkatkan resiko anak mengalami masalah stunting. (Lina anggraeni dan Adnyani, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan pola makan dengan status gizi terhadap kejadian stunting namun belum ada yang melakukan penelitian tentang gambaran pola makan pada anak stunting dengan metode *literature review* sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian gambaran pola makan anak stunting dengan metode *literatur review* untuk memberikan input kepada perawat khususnya perawat anak dalam pemberian asuhan keperawatan secara profesional dan memberikan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan orang tua anak yang menderita stunting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana Gambaran Pola Makan Anak Stunting?”

C. Tujuan Penelitian

Study ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pola Makan Anak Stunting.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun sebagai bahan pembelajaran dalam bidang kesehatan khususnya di jurusan keperawatan tentang gambaran pola makan anak stunting.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gambaran pola makan anak stunting.

3. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan ibu mengenai gambaran pola makan anak stunting.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

E. Kajian Pustaka

Tabel 1. Kajian Pustaka

NO.	Peneliti	Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Riset
1.	(Lina anggraeni dan Adnyani, 2019)	Jurnal Kesehatan Midwiners lion, Vol. 4, No. 2, September 2019	Pola pemberian makanan pada balita stunting di sawan, kabupaten buleleng	Untuk mengetahui pola pemberian makanan yang diberikan oleh ibu atau keluarga kepada balita di Sawan, Kabupaten Buleleng	Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan crosssectional	Pada anak stunting pemberian makan yang dilakukan oleh keluarga sebagian besar penyusunan menunya tidak bervariasi (64,6%), pengolahan makan dilakukan dengan tidak benar (66,7%), penyajian makanan tidak menarik (62,5%), waktu pemberian makanan dilakukan secara tidak teratur (60,4%), pada saat makan sebagian besar balita tidak didampingi dan diawasi (77,1%) dan balita diberikan makanan selingan sebelum makan (64,6%).	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
2.	(Jahja, 2019)	Jurnal Gizi Indonesia, Vol.1, No.1 2019	Hubungan pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita usia 2-5 Tahun di	Untuk mengetahui hubungan pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita usia 2-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Minggir Kabupaten Sleman.	Penelitian deskriptif korelasi menggunakan pendekatan cross sectional.	Penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden dengan pola pemberian makan pada balita usia 2-5 tahun termasuk dalam kategori baik (82,9%) dan responden dengan pola pemberian makan cukup sebanyak (17,1%), sedangkan kejadian stunting pada balita usia 2-5 tahun yaitu sebanyak (21,4%) balita pendek dan (1,4%) balita sangat pendek. Hasil uji statistik ditunjukkan dengan nilai signficancy ($p = 0,010 < 0,05$)	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting

			wilayah kerja puskesmas Minggir kabupaten sleman			dan correlation coefficient (0,306).	
3.	(Maghfiroh and Andriani, 2020)	Jurnal Ilmu Gizi, Vol 1 No. 1 2020	Gambaran pola pemberian makan, penyakit Infeksi, dan kejadian stunting pada anak balita Di desa mojorejo kecamatan bendosari Kabupaten sukoharjo	Untuk menganalisis gambaran pola pemberian makan dan penyakit infeksi dengan kejadian stunting di Desa Mojorejo.	Penelitian ini yakni observasional dengan rancangan cross sectional.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat gambaran pola pemberian makan dengan kejadian stunting di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Adanya gambaran penyakit infeksi dengan kejadian stunting di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
4.	(Faisal, 2020)	Jurnal Ilmu Gizi, Vol. 1 No. 1 2020 Hal. 37 - 44	Gambaran pola asuh dan pola makan anak usia 2-5 tahun di kelurahan taipa kecamatan	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran pola asuh dan pola makan anak usia 2-5 tahun di Kelurahan Taipa	Penelitian ini menggunakan metode stratified random sampling.	Hasil penelitian menunjukan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak adalah tidak otoriter, tidak demokrasi dan permisif. Bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi adalah beras, sumber protein hewani adalah ikan katombo, telur ayam, sayur yang sering dikonsumsi adalah sayur kelor. Tidak ada	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting

			palu utara	Kecamatan Palu Utara.		buah yang sering dikonsumsi oleh anak.	
5.	(Kabupaten and Tahun, 2020)	Jurnal Kesehatan Indra Husada, Vol 8, No 1 Tahun 2020	Pengaruh pola asuh nutrisi dan perawatan kesehatan Terhadap kejadian stunting usia 2 – 5 tahun di desa Sindang kabupaten indramayu	Untuk mengetahui pengaruh pola asuh nutrisi dan perawatan kesehatan terhadap kejadian stunting pada balita usia 2-5 tahun di Wilayah Desa Sindang Kabupaten Indramayu	Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional .	Hasil penelitian didapatkan pola asuh nutrisi baik 55,3% dan 60,5% pemantauan kesehatan yang baik yang dilakukan oleh orang tua. Terdapat hubungan yang bermakna pola asuh nutrisi terhadap kejadian stunting pada anak usia 2-5 dan hubungan yang bermakna pemantauan kesehatan terhadap kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
6.	(Zahara, 2020)	Wahana Inovasi, Volume 9 No.1 Jan-Juni 2020	Gambaran pola pemberian makan pada anak Paud yang stunting di desa sekip Kecamatan lubuk pakam	Untuk menentukan frekuensi makan di antara anak-anak dengan dikampit di sekip village, distrik pakistan, untuk menilai jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak disektor di sekip village, distrik lubuk	Penelitian observasional dengan penelitian cross sectional	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pola pemberian makan pada anak-anak stunting ini menghasilkan data bahwa anak-anak miskin ini mengalami pola makan yang tidak teratur, yang dapat mengakibatkan pengeraman	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting

				pakam			
7.	(Margawati and Astuti, 2018)	Jurnal Gizi Indonesia, 6 (2), 2018	Pengetahuan ibu, pola makan dan status gizi pada anak stunting usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Semarang	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan ibu, dan hubungan pola makan dengan status gizi pada anak stunting usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Semarang.	Desain penelitian adalah observasional dengan pendekatan belah lintang (cross sectional) dengan metode kuantitatif dan kualitatif.	Ibu dengan anak yang menderita stunting tidak terlalu mengkhawatirkan tentang kondisi anak. Stunting dianggap bukan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan baik. Tidak ada hubungan tingkat kecukupan energi, protein, zat besi, dan seng dengan status gizi pada balita stunting usia 12-60 bulan di Kecamatan Genuk.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
8	(Dranesia, Wanda and Hayati, 2019)	Enfcli, 2019. Volume 04.013	Pressure to eat is the most determinant factor of stunting in children under 5 years of age in Kerinci region, Indonesia	untuk mengetahui faktor-faktor penentu kejadian stunting di wilayah Kerinci.	Desain penelitian cross-sectional	Prevalensi stunting di wilayah Kerinci adalah 46,9%. Menunjukkan adanya hubungan antara kejadian stunting pantangan, makantekanan makan, dan keinginan untuk minum.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
9	(Ismawati et al.,	Enferm Clin,	Nutrition intake and	untuk menganalisis asupan gizi	Penelitian ini menggunakan	Rata-rata asupan energi, protein, kalsium, dan fosfor pada responden adalah 77,23%	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu

	2020)	2020;30(S4):71-74	causative factor of stunting among children aged under-5 years in Lamongan city	dan faktor penyebab stunting pada balita di Kota Lamongan.	analitik observasional dengan studi potong lintang menggunakan kuesioner untuk mengetahui asupan gizi dan faktor penyebab stunting	AKG protein 69,82% AKG, kalsium 79,74% AKG, dan fosfor 68,75% AKG masing-masing. Dari 40 anak stunting menderita penyakit menular selama kurun waktu 3 bulan (67,5%). Pendidikan orang tua (ibu dan ayah) berpendidikan rendah (70% dan 72,5%), dan 65% ibu responden tidak memiliki pekerjaan.	hanya berfokus ke gambaran pola makan anak stunting
--	-------	-------------------	---	--	--	---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Stunting

1. Defenisi Stunting

Stunting (Balita Pendek) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Rahmadhita, 2020).

Stunting adalah kondisi pada anak yang mengalami kegagalan pertumbuhan (tubuh dan otak) akibatnya kekurangan gizi dalam waktu yang lama dan berkepanjangan. Sehingga, tubuh anak lebih pendek dari tubuh anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama terjadi sejak janin masih dalam kandungan ibu sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya dikarenakan rendahnya asupan gizi seperti vitamin, mineral dan sumber protein hewani (Putri and Dewina, 2020).

Stunting didefinisikan sebagai memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia dibandingkan dengan populasi. Stunting dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, gangguan perkembangan otak dan IQ rendah pada anak-anak dan dapat meningkatkan risiko obesitas dan sindrom metabolik selama masa dewasa (Sharif *et al.*, 2020).

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:233 tentang stunting yaitu:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan tafsir (Departemen Agama RI, 2020), Seorang ibu (walaupun ia janda) memiliki kewajiban dalam memberi asi pada anak hingga anaknya memasuki umur dua tahun. Namun apabila terjadi masalah yang menghalangi maka masa penyusuan anak dinilai tidak bermasalah ketika menjadi kurang dari masa yang ditetapkan. Begitupula seorang ayah pun memiliki kewajiban dalam memberikan kecukupan pada sang ibu.

Allah memberikan kewajiban pada seorang ibu dalam memberikan asupan asi pada sang bayi dikarenakan kandungan dalam air susu yang kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya, untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi.

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah swt. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain (Departemen Agama RI, 2020).

2. Tanda Stunting

Menurut (wahida yuliana, 2019) tanda stunting yaitu:

- a. Tinggi badan kurang menurut umur (-2SD)
- b. Pertumbuhan melambat

3. Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, diantaranya praktik pengasuhan gizi yang kurang baik, Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan (Rita Ramayulis, 2018).

4. Faktor yang Mempengaruhi Stunting

- 1) Menurut (Wahida Yuliana, 2019) beberapa faktor yang terkait dengan kejadian stunting berhubungan dengan berbagai macam faktor yaitu :

- a. Pendidikan Orang tua

Latar belakang pendidikan berdampak pada perilaku pemberian asupan makanan menggunakan upaya dalam memilih makanan dari segi kualitas dan standar serta jumlah berdampak pada perilaku pemberian asupan makanan dengan adanya pemilahan dalam segi standar dan jumlah. Pendidikan seorang ayah dinilai menjadi faktor yang berdampak pada kekayaan rumah tangga dan komoditi pasar sebagai bahan konsumsi dan potensi pemilihan bahan yang digunakan sebagai konsumsi rumah tangga. Sementara pendidikan seorang ibujuga berdampak pada tingkat kandungan gizi pada anak yang mana tingkat pendidikan tinggi mengindikasikan tingkat status gizi

pada anak yang lebih baik. Semakin tinggi latar pendidikan orang tua maka semakin baik pula dalam pemilihan bahan makanan yang diberikan pada anak.

b. Pekerjaan orang tua

Pekerjaan orang tua berdampak pada kebutuhan gizi keluarga di mana memiliki korelasi pada pemasukan keluarga yang berdampak pada daya beli dan konsumsi yang mana menjelaskan ketika tingkat pendapatan keluarga terbatas mengindikasikan tingkat daya beli dan konsumsi keluarga yang rendah pula baik dari segi kuantitas dan kualitas bahan makanan begitupun sebaliknya yang mana pendapatan keluarga yang besar turut mendukung pertumbuhan anak sebab keluarga dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anak secara primer, sekunder dan tersier

c. Tinggi badan orang tua

Tinggi tubuh atau badan diartikan sebagai skala atau posisi tubuh saat berdiri dalam posisi vertikal dimana kaki ditempelkan pada dasar tanah atau lantai dengan kepala dan leher yang tegak, dada membusung, perut yang datar serta menarik nafas sesaat. Tinggi tubuh atau badan dapat diberikan ukuran mulai dari ujung kepala atas hingga bagian kaki.

d. Status gizi

Status gizi atau keterangan gizi diartikan sebagai kondisi seorang anak daripada pemberian konsumsi dan pemenuhan asupan makanan pada tubuh yang cukup dan memadai sebagaimana kadar kebutuhan yang diperlukan bagi tubuh.

e. Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejadian *stunting*, karena keadaan sosial ekonomi atau keadaan rumah tangga yang tergolong rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan rendah, kualitas sanitasi dan air minum yang rendah, daya beli yang rendah serta layanan kesehatan yang terbatas, semuanya dapat berkontribusi terkena penyakit dan rendahnya asupan zat gizi sehingga berpeluang untuk terjadinya *stunting*.

2) Menurut (Kemenkes RI, 2018) faktor yang mempengaruhi *stunting*

yaitu :

1. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi kejadian *stunting* karena kondisi sosial ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita

2. Gizi ibu saat hamil

Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan resiko terjadinya stunting.

3. Kesakitan pada bayi

Kesakitan pada bayi yang disebabkan oleh higiene yang buruk (misalnya diare dan kecacingan) dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan.

4. Kurangnya asupan gizi

Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya termasuk resiko terjadinya stunting.

5. Penilaian Stunting pada Anak

Indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*severely stunted*). Yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan diatas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin. Namun, hal ini jarang terjadi di indonesia. Terdapat perbedaan istilah dalam pengukuran balita yaitu PB dan TB, yaitu:

- a. Panjang badan (PB) digunakan untuk mengukur anak usia 0 sampai 24 bulan dan anak dalam posisi telentang. Bila anak usia 0 sampai 24 bulan diukur dengan berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambah 0,7 cm.
- b. Tinggi badan (TB) digunakan untuk mengukur anak usia diatas 24 bulan dan anak diukur dalam posisi berdiri. Bila anak usia lebih dari 24 bulan diukur dengan telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan 0,7 cm (Wahida Yuliana, 2019)

Tabel 2. Kategori dan Ambang Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks PB/U atau TB/U

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) anak 0-60 bulan	Sangat Pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan < -2SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	> 2 SD

Sumber: PMK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

6. Pencegahan Stunting

Stunting bisa dicegah dengan 10 cara berikut (Lia Agustin, 2020)

- 1) Ibu yang tengah hamil mendapatkan tablet guna menambah darah, sekurang-kurangnya 90 tablet dalam masa hamil
- 2) Memberikan asupan makanan tambahan
- 3) Mencukupi keutuhan gizi

- 4) Proses bersalin melalui dokter maupun bidan profesional
- 5) Melakukan IMD
- 6) Memberikan ASI eksklusif terhadap bayi hingga berusia 6 bulan
- 7) Menyediakan asupan makanan yang mendampingi ASI pada bayi berusia diatas 6 bulan hingga 2 tahun
- 8) Imunisasi lengkap dan berikan vitamin A
- 9) Pemantauan balita di posyandu terdekat
- 10) Membiasakan hidup bersih dan sehat

B. Tinjauan Umum Pola Makan Anak

1. Defenisi Pola Makan

Pola makan diartikan sebagai pembiasaan dalam memberikan asupan makanan dari proses secara berulang dan dengan waktu yang lama (Adriani, dkk 2016). Kebutuhan asupan nutrisi anak tidak sama yang mana terdampak pada usia komposisi dalam tubuh, pola perilaku serta masa pertumbuhan yang mana pola makan menyokong masa tumbuh secara normal pada tinggi badan/tubuh (Zahara, no date).

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:172 tentang pola makan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Berdasarkan tafsir (Kementrian Agama RI, 2020), menjelaskan pernyataan dengan kalimat kepada mereka yang beriman untuk makan

melalui rezeki yang baik dan sehat, aman sesuai kebutuhan yang diupayakan pada mereka melalui usaha yang dijalankan secara benar dan halal. Dan beryukurlah kehadiran Allah dalam mengimani bahwa setiap rezeki datangnya dari Allah dan perlu di manfaatkan sesuai dengan apa yang ditentukan. Sesungguhnya ,Allah hanya melarang atas keharaman pada sejumlah hal yakni seperti bangkai, binatang mati tanpa disembelih dengan sah atas dasar agama (Kementrian Agama RI, 2020).

Sebaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-A'Raf/7:31 terkait pola makan yaitu:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Berdasarkan tafsir (Departemen Agama RI, 2020), Allah melalui firmanNya telah memberi aturan terkait urusan dalam hal makan dan minum. Ketika jahiliyah, manusia yang melakukan haji hanya memakan apa yang mengenyangkan namun tidak memakan yang baik dan sehat menambah gizi juga vitamin yang cukup untuk tubuh, dengan turunnya ayat ini, makanan maupun minuman perlu mencukupkan perihal gizi dan masa makan dalam menjaga kesehatan (Departemen Agama RI, 2020).

2. Pola Pemberian Makan

Kebutuhan asupan gizi masing-masing anak tidaklah sama. Umumnya dikarenakan rentang usia dan kebutuhan tubuh, perilaku dan kegiatan sehari-hari dan masa pertumbuhan yang dialami. Asupan makan menyokong laju bertumbuh dan berkembang secara normal pada tinggi dan berat anak. Jadwal pemberian makanan yaitu 3 kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan (diantara 2 kali makanan utama) (Kesehatan *et al.*, 2019).

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:172 tentang pola makan yaitu:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Terjemahnya: Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-A'raf/7:31 terkait pola makan yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

Tabel 6. Pola Pemberian Makan Anak Balita

Usia (Bulan)	ASI	Bentuk Makanan		
		Makanan Lumat	Makanan Lembik	Makanan Keluarga
12-23				
24-59				

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2010

Keterangan :

Usia 12-23 bulan : diberikan ASI dan makanan keluarga

Usia 24-59 bulan : diberikan makanan keluarga

Tabel 7. Takaran Konsumsi Makanan Anak yang Dianjurkan

Usia	Bentuk Makanan	Frekuensi Makan
1-3 Tahun	Makanan keluarga 1 - 1 ½ piring nasi/pengganti 2 - 3 potong lauk hewani 1 - 2 potong lauk nabati ½ mangkuk sayur 2 - 3 potong buah-buahan 1 gelas susu	3 kali sehari
4-6 Tahun	1 - 3 piring nasi/pengganti 2 - 3 potong lauk hewani 1 - 2 potong lauk nabati 1 - 1 ½ mangkuk sayur 2 - 3 potong buah-buahan 1 - 2 gelas susu	3 kali sehari

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2010

Anjuran makan untuk anak sesuai anjuran Kementerian Kesehatan (2010)

:

1. Usia 12 – 24 bulan
 - a. Teruskan pemberian ASI
 - b. Berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak
 - c. Porsi makan sebanyak 1/3 orang dewasa terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah.
 - d. Makanan selingan kaya gizi sebanyak 2 kali sehari diantara waktu makan
 - e. Makanan harus bervariasi
2. Usia lebih dari 24 bulan
 - a. Berikan makanan keluarga 3 kali sehari sebanyak 1/3- 1/2 porsi makan dewasa terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah.

- b. Berikan makanan selingan kaya akan gizi 2 kali sehari diantara waktu makan

3. Jenis Makanan

Umumnya memberikan asupan makanan pada anak usia dibawah lima tahun berguna dalam mencukupi kebutuhan asupan zat gizi pada anak usia dengan rentang 6-12 bulan memerlukan asupan gizi khususnya energi dan sumber protein sebanyak 650 kalori serta 16 gram protein. Asupan gizi air susu ibu (ASI) sebanyak 400 kalori dan 10 gram protein, menjadikan kebutuhan dari MPASI sebanyak 250 kalori dan 8 gram protein, mejadikan kebutuhan dari MP-ASI sebanyak 500 kalori dan 12 gram protein. Dalam pemilihan jenis makanan, biasanya diawali dengan proses pengenalan lebih dulu mengenai jenis makanan yang tidak menyebabkan alergi, umumnya yang mengandung kadar protein paling rendah seperti sereal (beras merah atau beras putih).

Makanan baik umumnya berasal dari bahan yang segar, misalnya tempe, kacang, telur ayam, hati ayam, ikan, sayur mayur, dan buah-buahan. Makanan sesuai berdasarkan pertumbuhan umur anaka adalah antara lain:

1) Makanan lumat

Makanan lumat ialah makanan dengan proses perlu untuk diratakan bentuknya menjadi mudah dan lembut dengan tidak adanya ampas. Umumnya diberikan ketika anak berumur enam hingga sembilan

bulan. Misalnya berupa bubur, susu, bubur sumsum, pisang, saring atau dikerok atau nasi tim saring.

2) Makanan lunak

Makanan lunak diartikan menjadi makanan memasaknya perlu menggunakan banyak kandungan air memiliki tekstur sedikit kasar dibandingkan makanan yang lumat. Umumnya dikonsumsi saat anak memasuki umur delapan hingga sembilan atau 12 bulan. Seperti bubur nasi, bubur ayam, nasi tim dan kentang puri.

3) Makanan padat

Makanan padat adalah makanan lunak yang tidak nampak berair dan biasanya disebut makanan keluarga. Makanan ini mulai dikenali pada anak saat berusia 12-24 bulan. Contoh makanan padat antara lain berupa lontong, nasi, lauk-pauk, sayur bersantan dan buah-buahan.

4. Prinsip Gizi Seimbang

Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari 4 (empat) Pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memonitor berat badan secara teratur (Kesehatan *et al.*, 2019)

Gambar . Pilar Gizi Seimbang



Sumber : Kementerian Kesehatan 2014

4 pilar gizi seimbang yaitu :

1) Mengonsumsi makanan beragam

Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh sehingga harus mengonsumsi berbagai jenis pangan, dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur.

2) Membiasakan perilaku hidup bersih

Dengan membiasakan perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang terpapar sumber infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi anak.

3) Melakukan aktifitas fisik

Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi terutama sumber energi dalam tubuh.

4) Mempertahankan dan memantau berat badan (BB) normal

Pemantauan BB normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari ‘Pola Hidup’ dengan ‘Gizi Seimbang’, sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Bagi bayi dan balita indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan penambahan umur.

5. Asupan Zat Gizi Makronutrien

Asupan zat gizi adalah jumlah zat gizi yang berasal dari konsumsi bahan makanan guna menjalankan fungsi seperti menciptakan energi, merawat jaringan hingga manajemen aktivitas hidupnya. Zat gizi makro berupa karbohidrat, lemak, dan protein menghasilkan energi bagi tubuh melalui proses metabolisme (pembakaran). Sumber energi utama adalah karbohidrat dan lemak, sedangkan protein terutama digunakan sebagai zat pembangun. Bila konsumsi karbohidrat dan lemak kurang untuk memenuhi kebutuhan energi maka digunakan protein (Kesehatan *et al.*, 2019).

1. Karbohidrat

a. Definisi Karbohidrat

Karbohidrat merupakan makronutrien sebagai sumber energi utama bagi manusia. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Karbohidrat

yang penting dalam ilmu gizi dibagi dalam dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks

b. Fungsi Karbohidrat

Karbohidrat memiliki fungsi utama dalam menghadirkan energi untuk tubuh. Satu gram dapat menciptakan sebanyak 4 kalori di samping itu, karbohidrat berfungsi juga dalam:

1) Memberikan perasa manis dalam makanan

Karbohidrat menghadirkan rasa manis dalam makanan, terutama mono serta disakarida. Gula dinilai tidak berasa manis yang sama. Fruktosa di yakini sebagai gula paling manis.

2) Membantu pengeluaran feses

Karbohidrat juga berfungsi dalam mendorong keluarnya feses melalui manajemen peristaltic. Usus yang dilakukan dengan bantuan serat makanan dari selulosa dalam serat makanan.

3) Sebagai cadangan energi

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Sebagian karbohidrat dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah berbentuk glukosa siap pakai untuk keperluan energi yang cepat, sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam otot dan hati dan sebagian sisanya akan diubah menjadi

lemak yang kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan adiposa.

c. Sumber Karbohidrat

Sumber karbohidrat terdapat pada beras, roti, kentang, umbi-umbian, buah gula pasir, labu kuning, makaroni, mie kering, jagung.

d. Kebutuhan karbohidrat

Kebutuhan Karbohidrat adalah 55-75% dari total konsumsi energi, diutamakan berasal dari karbohidrat kompleks dan 10% berasal dari gula sederhana. Karbohidrat kompleks ada dalam gandum, nasi, sereal, oat dan karbohidrat sederhana (gula sederhana) ada dalam fruktosa, glukosa, laktosa, yang ditemukan dalam buah-buahan, gula serta susu dan produk olahannya.

Tabel 8. AKG Karbohidrat di Indonesia

Umur	Laki-Laki (gr)	Perempuan (gr)
0-6 bulan	58	58
7-11 tahun	82	82
1-3 tahun	155	155
4-6 tahun	220	220
7-9 tahun	254	254
10-12 tahun	289	275
13-15 tahun	340	292
16-18 tahun	368	292
19-29 tahun	375	309
30-49 tahun	394	323
50-64 tahun	349	285
65-80 tahun	309	252
>80 tahun	248	232

Sumber: Daftar AKG 2013

2. Protein

a. Definisi Protein

Protein di yakini dari bahasa Yunani proteos, bermakna utama atau didahulukan. Protein mencakup untaian asam amino, saling saling terikat dalam peptida. Protein merupakan zat makronutrien yang menjadi dasar struktur bagi sel tubuh.

b. Fungsi Protein

Protein mempunyai fungsi sebagai pembangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Protein memiliki fungsi lain di dalam tubuh adalah Pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi, dan sumber energi.

c. Sumber Protein

Sumber-sumber protein banyak terkandung di dalam bahan makanan hewani dan nabati yang sering dikonsumsi oleh manusia. Protein hewani tergolong protein berkualitas tinggi, sedangkan protein nabati tergolong terbatas. Asam amino lisin kurang pada golongan sereal dan methionin kurang pada jenis kacang-kacangan. Contoh bahan makanan sumber pada ikan, daging, telur, tempe, tahu dan lain sebagainya.

d. Kebutuhan Protein

Protein dalam tubuh digunakan untuk pertumbuhan otot dan imunitas tubuh. Jumlah protein yang diperlukan oleh tubuh seseorang tergantung dari banyaknya jaringan aktif, makin besar dan berat organ tersebut makin banyak jaringan aktif sehingga makin banyak pula protein yang diperlukan untuk mempertahankan jaringan itu. Kebutuhan protein yang dianjurkan pada anak balita sebesar 1,5-2 g/ kgBB/ hari. Pada umur 3-5 tahun konsumsi protein menjadi 1,57g/ kgBB/ hari.

Tabel 9. AKG Protein di Indonesia

Umur	Laki-Laki (gr)	Perempuan (gr)
0-6 bulan	12	12
7-11 bulan	18	18
1-3 tahun	26	26
4-6 tahun	35	35
7-9 tahun	49	49
10-12 tahun	56	60
13-15 tahun	72	69
16-18 tahun	66	59
19-29 tahun	62	56
30-49 tahun	65	57
50-64 tahun	65	57
65-80 tahun	62	56
>80 tahun	60	55

Sumber: Daftar AKG 2013

3. Lemak

a. Definisi Lemak

Lemak diartikan sebagai senyawa organik meliputi atom karbon (C), hidrogen (H), dan (O). Sumber energi secara padat

dengan dua hal energi yang berasal dari karbohidrat. Selain pada makanan, karbohidrat lebih dalam tubuh akan ditransisikan dalam bentuk lemak yang diletakkan dalam jaringan lemak (*adipose*).

b. Fungsi Lemak

Lemak berfungsi menjadi sumber energi, mengangkut asupan vitamin yang larut pada lemak, menghemat simpanan protein, memudahkan proses sekresi pada lambung hingga mengosongkan lambung. Selain itu lemak juga membantu dalam melumaskan, memelihara suhu tubuh serta melindungi organ pada tubuh.

c. Sumber Lemak

Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung), mentega, margarin, dan lemak hewani (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lain adalah krim, susu, keju, kuning telur serta makanan yang dimasak dengan minyak.

d. Kebutuhan Lemak

Kandungan lemak dapat diamati dari jasmani setiap individu. Tingkat jaringan aktif yang tinggi dan banyak menandakan banyaknya kandungan lemak yang juga dibutuhkan dalam menguatkan jaringan itu. Kebutuhan lemak yang dianjurkan pada balita 15-20%.

Tabel 10. AKG Lemak di Indonesia

Umur	Laki-Laki (gr)	Perempuan (gr)
0-6 bulan	34	34
7-11 bulan	36	36
1-3 tahun	46	44
4-6 tahun	62	62
7-9 tahun	72	72
10-12 tahun	70	67
13-15 tahun	83	71
16-18 tahun	89	71
19-29 tahun	91	75
30-49 tahun	73	60
50-64 tahun	65	53
65-80 tahun	53	43
>80 tahun	42	40

Sumber: Daftar AKG 2013

C. Teori Keperawatan Terkait Penelitian

Pola Makan merupakan kebiasaan makan yang terbentuk dari perilaku makan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Model sistem kebiasaan itu dikemukakan oleh teori Madeleine Leininger “Transkultural Keperawatan” (*transcultural nursing*). (Risnah and Irwan, 2021)

1. Biografi

Madeleine Leininger dilahirkan pada tanggal 13 Juli 1925 di wilayah Sutton, Nebraska. meninggal pada tanggal 10 Agustus 2012, Omaha, Nebraska, Amerika. Madeleine merupakan seorang pengajar, pengarang, pakar teori, administrator, pelaku riset, pengaruh publik, serta pelaku pengembangan konsep pada keperawatan secara transkultural atau secara internasional berdampak besar terhadap upaya

yang berkaitan dengan pasien yang berasal dari kultur yang heterogen. Madeleine hidup dengan keempat saudara lelaki dan perempuan dan merupakan lulusan dari Sutton High School.

2. Konsep Teori Madeleine Leininger

Madeleine Leininger telah menjelaskan esensi fundamental yang disebut “*transcultural nursing*”. Leininger juga menggambarkan bahwa sangat penting dalam memberikan fokus pada penelitian atau sifat caring dalam merawat sejak betapa menjadi hal yang penting untuk memusatkan perhatian atau sifat caring pada perawatan sejak dini, dia juga terkejut melihat perbedaan mencolok dalam pola perilaku anak berdasarkan latar belakang budaya yang berbeda. Model teori ini menggambarkan bagaimana kebiasaan-kebiasan terhadap kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan yaitu:

1) Faktor pendidikan (educational factor)

Latar studi atau pendidikan pada pasien yaitu berupa pengalaman pasien dalam mengenyam perjalanan formal yang paling tinggi saat ini. Semakin tinggi latar pendidikan pasien menunjukkan semakin tinggi pula kepercayaannya disokong bukti kongret dan ilmiah serta dapat belajar perubahan kultur yang relevan dengan status kesehatan yang dialami.

2) Faktor ekonomi (economic factors)

Diartikan sebagai upaya manusia dalam mencukupi apa yang menjadi kebutuhan secara material. Faktor yang turut berdampak pada nilai secara ekonomi yakni laju pendapatan keluarga, asal pendapatanselingan, dan asuransi kesehatan.

3) Faktor peraturan dan kebijakan (political and legal factors)

Kegiatan individu di dalam proses asuhan keperawatan transcultural nursing dipengaruhi oleh peraturan serta kebijakan rumah sakit atau instansi kesehatan yang berlaku dan segala sesuatu.

4) Faktor nilai budaya dan gaya hidup (cultural values and life ways)

Budaya merupakan norma atau tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan petunjuk berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai ialah konsepsi-konsepsi yang abstrak di dalam diri manusia, tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

5) Faktor sosial dan keluarga (kinship and social factors)

Fungsi sosial dan keluarga ialah sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditujukan dalam peningkatan kesehatan dan proses adaptasi. Kemampuan keluarga menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial merupakan bentuk dukungan sosial dan keluarga.

6) Faktor religiusitas dan filosofi (religious and philosophical factors)


Religiusitas memberikan motivasi yang sangat kuat dalam menempatkan kebenaran di atas segalanya atau bahkan di atas kehidupannya sendiri yang dapat menyebabkan seseorang memiliki sifat rendah hati dan membuka diri. Faktor religiusitas dan filosofi yang dapat dikaji antara lain; religiusitas dan filosofi meliputi adanya agama yang dianut, cara pandang terhadap penyakit dan cara pengobatan atau kebiasaan agama yang memberikan efek positif pada kesehatan.

7) Faktor teknologi (technology factors)

Faktor teknologi, menjadi alur informasi dan perantara dengan memberikan data dan informasi serta berdampak pada kapabilitas pola perilaku manusia dalam segi kultur.

Berdasarkan teori yang telah di paparkan diatas, erat kaitannya dengan variabel yang akan di teliti. Dimana pola pemberian makan yang diberikan dalam suatu keluarga berkaitan erat dengan nilai budaya keluarga dan bagaimana pola perilaku hidup sehatnya. Dalam ilmu keperawatan, teori yang mentitik fokuskan budaya dalam intervensi keperawatan dikemukakan oleh Medeleine Leininger yakni teori *transcultural nursing*.

D. Kerangka Teori




Keterangan:

⋯ : Diteliti

□ : Tidak diteliti

→ : Penghubung variabel Independent dan Dependent

E. Kerangka Konsep



Keterangan :

□ : Variabel Independent

○ : Variabel Dependent

⋯ : Variabel Perancu

→ : Penghubung variabel Independent dan Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* (pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit) dengan metode pendekatan *literatur review* yang berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis dari beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas disajikan secara deskriptif melalui menggunakan sejumlah rujukan literatur yang sesuai dengan kasus atau permasalahan dalam tulisan ini yang dilakukan secara terstruktur dan terencana (Davies & Crombie, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature review* untuk mengetahui gambaran pola makan anak stunting.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan desain *literatur review* dan berdasarkan pada instrumen penilaian *Guideline review* dari Joanna Briggs Institute. Pencarian literature melalui beberapa situs/database yaitu: *PubMed, Science Direct, Google Scholar dan Demensions* dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (*Patient, Exposure an Interest, Outcome or responses*) dengan keyword atau kata kunci : *Dietary habit or stunting child* (Pola makan atau anak

stunting), *Dietary habit and stunting child* (Pola makan dan anak stunting).

Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut:

Tabel 16. Kata Kunci Pencarian *Literature* Metode PEO

P	Anak Stunting
E	Gambaran
O	Pola makan

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai berikut : Bagaimana gambaran pola makan anak stunting? dalam memilih literatur peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi :

1. Kriteria Inklusi :

- a. Artikel tahun 2018-2021
- b. Artikel *fulltext* yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu gambaran pola makan anak stunting
- c. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume
- d. Artikel yang menggunakan desain *crosssectional*, *Cohort*, *Case Study*
- e. Artikel yang berbahasa Inggris atau Indonesia

2. Kriteria Eksklusi :

- a. Artikel yang *double* publikasi
- b. Artikel yang memiliki nilai kualitas dibawah 50% berdasarkan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*

C. Analisa Data

Pasca tahapan proses mengumpulkan data dan informasi, data akan dipilih berdasarkan relevansinya dengan menggunakan instrumen *Guideline review dari Joanna Briggs Institute* terhadap isi/masalah yang hendak dikaji. Penyajian masalah akan dibahas secara keseluruhan sehingga data yang terkumpul akan di analisa dengan menggunakan tabel sintesis grid.

D. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis menyediakan pilihan alternatif model untuk memecahkan masalah atau gagasan kreatif yang menjadi jawaban atas isu/masalah sebagai solusi dalam karya tulis yang disusun melalui sebuah kesimpulan juga diberikan sebuah rekomendasi hasil sebagai pemecahan masalah.



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sebanyak 2.246 artikel yang diidentifikasi dari keempat pencarian database yaitu *PubMed*, *Science Direct*, *Google Scholar* dan *Dimensions* yang telah disaring dengan batasan publikasi 4 tahun terakhir (2018-2021). Namun, setelah dilakukan *screening* dari 530 artikel, didapatkan 9 artikel yang relevan yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya dilakukan *screening* untuk menilai kelayakan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 9 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, beberapa artikel dieksklusi (2.237) dikarenakan artikel tidak memenuhi kriteria inklusi penilaian artikel diatas 50% yaitu tidak sesuai dengan standar penilaian dari *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*. (1) Isi artikel tidak relevan (2) Tidak memenuhi kriteria penilaian. Sehingga pada akhirnya didapatkan 9 artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang selanjutnya akan digunakan untuk *litertur review* ini.

Alur telaah jurnal dalam studi literatur ini dilakukan sesuai :

Tabel 17. Pencarian Literatur



Author/Tahun	Persentase skor jurnal	Evaluasi kualitas
(Faisal, 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Mahdaniah.N.P.Ginting and Sinaga, 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Yuliarsih, 2021)	75%/6	Kualitas cukup
(Maghfiroh and Andriani, 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Zahara, 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Risnah <i>et al.</i> , 2021)	75%/6	Kualitas cukup
(Dranesia, Wanda and Hayati, 2019)	75%/6	Kualitas cukup
(Ismawati <i>et al.</i> , 2020)	75%/6	Kualitas cukup
(Khaerunnisa, Nurhayati and Yulia, 2019)	75%/6	Kualitas cukup

Tabel 18. Hasil pengkajian kualitas studi yang direview

Catatan : Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang (<50%)



Tabel 19. Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian

NO	Peneliti	Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Database
1	(Faisal, 2020)	Jurnal Ilmu Gizi, Vol. 1 No. 1 2020 Hal. 37 – 44	Gambaran pola asuh dan pola makan anak usia 2-5 tahun di kelurahan taipa kecamatan palu utara	Untuk mengetahui gambaran pola asuh dan pola makan anak usia 2-5 tahun di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara.	<p>Desain Peneletian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>stratified random sampling</i>.</p> <p>Sampel Penelitian: Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 2-5 tahun sejumlah 77 balita</p> <p>Instrument Peneletian: Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.</p>	Membahas mengenai Anak merupakan salah satu kelompok rawan gizi, pada masa ini terjadi penurunan laju pertumbuhan, menurunnya pertumbuhan diikuti oleh menurunnya nafsu makan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah status gizi diantaranya adalah prevalensi <i>stunting</i> sebesar 40%, prevalensi balita gizi kurang sebesar 25%, prevalensi balita kurus sebesar 15% dan BBLR (Berat Badan lahir Rendah) sebesar 18%. Sementara prevalensi untuk proporsi anak <i>Stunting</i> sebesar 35%, prevalensi balita kurus 12%, dan untuk kasus gizi buruk memiliki prevalensi sebesar 17%. Bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi adalah beras, sumber protein hewani adalah ikan katombo, telur ayam, sayur yang sering dikonsumsi adalah sayur kelor. Tidak ada buah yang sering dikonsumsi oleh anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahan makanan yang sering dikonsumsi adalah beras, ikan	Google Scholar

						katombo, telur ayam, sayur kelor dan tidak diberikan buah.	
2	(Mahdani ah.N.P.Ginting and Sinaga, 2020)	Jurnal Ilmiah Pannmed, Vol. 15 No.3 September – Desember 2020	Kajian pustaka gambaran pola asuh dan Status gizi anak umur 0 - 24 bulan	Untuk mengetahui gambaran pola asuh dan status gizi anak umur 0 - 24 bulan.	<p>Desain Peneletian: Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode pengumpulan data menggunakan database Google Scholar, Garuda dan Arjuna. Peneliti menggunakan 15 artikel yang diterbitkan dari tahun 2015 - 2020 dan terindeks di Sinta, Arjuna, Mendeley, Google Scholar, Scimago, Worldcat, Zotero, Rama repository, DOAJ, IPI, Garuda, Dimensions, Crossref.</p> <p>Sampel Penelitian: Jumlah balita yang menjadi sampel dalam 15 penelitian berjumlah 756 orang.</p> <p>Instrument Peneletian: Observasi</p>	Dimana diperoleh angka persentase atas keterangan atau status gizi pada anak melalui artikel yang dimuat terdapat sekitar 67.5%, memiliki gizi yang kurang 8.4%, dinyatakan pendek 10.4%, dinyatakan kurus 6.7%. Pola pengasuhan pada anak diartikan sebagai hak dalam memberikan ASI yakni sebnayak 68.4% serta anak yang tidak memperoleh asupan ASI sekitar 31.6% minimnya wawasan pengetahuan seorang ibu dalam pemberian makanan selain ASI, dimana ibu yang menyediakan MP ASI pada anak sebanyak 46.6% serta yang tidak menyediakann makanan MP-ASI kepada anak 53.3%.	Google Scholar
3	(Yuliarsih	Cerdika: Jurnal	Gambaran status	Untuk	Desain Peneletian:	Analisis univariat mengindikasikan	Google

	, 2021)	Ilmiah Indonesia, Februari 2020, 1 (2), 130-140	gizi dan pola makan balita Di wilayah kerja puskesmas astanajapura Kabupaten Cirebon	mengetahui pengaruh pola makan terhadap status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Astanajapura Cirebon Kabupaten	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penampang Sampel Penelitian: Sampel dalam penelitian adalah semua anak berusia 1-5 tahun sebanyak 4.231 balita. Instrument Penelitian: Random sampling sederhana dengan analisis data menggunakan analisis univariat.	bahwa sejumlah besar anak dengan usia dibawah lima tahun (61%) mempunyai status atau keterangan gizi yang terbilang baik (70,5%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada balita dengan status gizi buruk, bahwa pola pemberian makan pada anak stunting mengalami pola makan yang tidak teratur. Maksudnya adalah jika pola pemberian makan tidak sesuai dengan empat sehat lima sempurna dan jadwal pemberian makanan yaitu 3 kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan (diantara 2 kali makanan utama) jika tidak sesuai yang diberikan maka asupan nutrisi dan gizi seimbang pada anak tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting.	Scholar
4	(Maghfiroh and Andriani, 2020)	Jurnal Ilmu Gizi, Vol 1 No. 1 2020	Gambaran pola pemberian makan, penyakit Infeksi, dan kejadian stunting pada anak balita Di desa mojorejo kecamatan bendosari	Untuk menganalisis gambaran pola pemberian makan dan penyakit infeksi dengan kejadian <i>stunting</i> di Desa Mojorejo.	Desain Penelitian: Jenis penelitian ini yakni observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel Penelitian: Sampel penelitian ini adalah anak balita umur 1-5 tahun dengan jumlah 72 balita.	Pada anak balita dapat terjadi di akibatkan oleh pola pemberian makan balita yang kurang diperhatikan dan seringkali terkena penyakit infeksi, penyakit infeksi lebih sering menyerang anak balita yang terkena <i>stunting</i> yang di akibatkan asupan didalam tubuh tidak optimal dikarenakan pola pemberian makan yang kurang baik dan tidak	Google Scholar

			Kabupaten sukoharjo		Instrument Peneletian: Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara <i>Probability Sampling</i> dengan menggunakan tipe <i>Simple Random Sampling</i> . Analisis data menggunakan uji Deskriptif.	maksimal serta lingkungan yang kurang dijaga kebersihannya dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit infeksi. Berdasarkan data pada penelitian ini <i>stunting</i> berjumlah 39,32%. Adapun Hasil penelitian menunjukkan terdapat gambaran pola pemberian makan dengan kejadian <i>stunting</i> (asupan nutrisi yang diberikan pada anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang anak). Adanya gambaran penyakit infeksi dengan kejadian <i>stunting</i> (Tubuh anak membutuhkan energi yang lebih jika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung <i>stunting</i>) di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo.	
5	(Zahara, 2020)	Wahana Inovasi, Volume 9 No.1 Jan-Juni 2020	Gambaran pola pemberian makan pada anak Paud yang <i>stunting</i> di desa sekip Kecamatan lubuk pakam	Untuk menentukan frekuensi makan di antara anak-anak dengan dikampit di sekip village, distrik pakistan, untuk menilai jenis makanan yang	Desain Peneletian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan desain penelitian cross sectional Sampel Penelitian: Sampel adalah semua anak berusia 3-5 tahun yang sebanyak 44 anak	penelitian ini mengindikasikan bahwa perilaku memberikan asupan makanan pada anak <i>stunting</i> menghasilkan data bahwa anak-anak mengalami pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan <i>stunting</i> . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada balita dengan status gizi buruk, bahwa pola pemberian makan pada anak <i>stunting</i> mengalami pola makan yang tidak	Google Scholar

				dikonsumsi oleh anak-anak disektor di sekip village, distrik lubuk pakam	Instrument Peneletian: Teknik dengan menggunakan form kuesione FFQ .	teratur. Maksudnya adalah jika pola pemberian makan tidak sesuai dengan empat sehat lima sempurna dan jadwal pemberian makanan yaitu 3 kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan (diantara 2 kali makanan utama) jika tidak sesuai yang diberikan maka asupan nutrisi dan gizi seimbang pada anak tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting.	
6	(Risnah <i>et al.</i> , 2021)	IJCNP, Volume 4 No 1, Februari 2021	Pola Pemberian Makan Pada Balita Stunting Berdasarkan <i>Teori Transcultural Nursing : Literature Review</i>	Untuk menganalisis faktor pemberian makan oleh keluarga pada balita stunting berdasarkan teori <i>transcultural nursing</i> .	Desain Peneletian: Konspetual framework yang berfokus pada variabel penelitian. Sampel Penelitian: - Instrument Penelitian: Joanna Briggs Institute yang memuat daftar periksa dan pedoman critical appraisal.	Disimpulkan bahwa indikator nilai kultur seta pola hidup turut berdampak pada proses memberikan asupan makanan pada anak dengan usia di bawah lima tahun yang terkena stunting.	Google Scholar
7	(Dranesia, Wanda and Hayati, 2019)	Enfcli, 2019. Volume 04.013	Pressure to eat is the most determinant factor ofstunting in children under 5 years of age in	Untuk mengetahui faktor-faktor penentu kejadian stunting di wilayah Kerinci.	Desain Peneletian: Desain penelitian cross-sectional dengan metode cluster random sampling. Sampel Penelitian: Sampel berjumlah	Prevalensi stunting di wilayah Kerinci adalah 46,9%. Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara kejadian stunting dan jenis kelamin, riwayat pemberian ASI eksklusif, pantangan makan, tekanan makan dan	Pudmed

			Kerinci region, Indonesia		290 anak Instrument Penelitian: Analisis data dilakukan melalui chi-square, Mann Whitney, dan regresi logistik.	keinginan untuk minum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat gizi yang buruk dapat mempengaruhi kejadian stunting	
8	(Ismawati et al., 2020)	Enferm Clin, 2020;30(S4):71-74	Nutrition intake and causative factor of stunting among children aged under-5 years in Lamongan city	Untuk menganalisis asupan gizi dan faktor penyebab stunting pada balita di Kota Lamongan.	Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan teknik simple random sampling Sampel Penelitian: Penelitian ini melibatkan 40 anak usia dibawah 5 tahun (24-59 bulan) Instrument Penelitian: studi potong lintang menggunakan kuesioner	Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi dunia, terutama di negara miskin dan berkembang. Hasil rata-rata asupan energi, protein, kalsium, dan fosfor pada responden adalah 77,23% AKG protein 69,82% AKG, kalsium 79,74% AKG, dan fosfor 68,75% AKG masing-masing. Dari 40 anak stunting menderita penyakit menular selama kurun waktu 3 bulan (67,5%). Pendidikan orang tua (ibu dan ayah) berpendidikan rendah (70% dan 72,5%), dan 65% ibu responden tidak memiliki pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang buruk dan zat gizi yang tidak seimbang bisa mengakibatkan terjadinya stunting pada anak.	Scient Direct
9	(Khaerun nisa,	Media Pendidikan, Gizi	Praktik Pemberian Makan Pada Anak	Untuk mengetahui	Desain Penelitian: Metode pada penelitian ini	Hasil pemantauan status gizi tingkat kelurahan sekitar 53 anak atau sebanyak	Dimensions

	Nurhayati and Yulia, 2019)	dan Kuliner. Vol. 8, No. 2, November 2019	<i>Stunting</i> Usia Bawah Dua Tahun Di Kelurahan Cimahi (Feeding Practices Of Toddlers Stunting Under Two Years In Cimahi Village)	gambaran umum mengenai praktik pemberian makan pada Anak <i>stunting</i> Usia Bawah Dua Tahun di Kelurahan Cimahi.	yaitu deskriptif kuantitatif dengan desain <i>Cross-Sectional</i> . Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu <i>purposive sampling</i> Sampel Penelitian: Sampel berjumlah 53 anak Instrument Peneletian: Angket dan pedoman wawancara	7,28% anak balita yang menderita stunting. Merujuk pada hasil penelitian bahwa terdapat sebagian besar dari responden (74,0%) memberikan MP-ASI secara berkesinambungan dimana sikap dan penerapan dalam memberikan makan terhadap anak dinyatakan baik (73,0%) kemudian sejumlah besar responden (80,0%) membuat adaptasi anak pada asupan makanan keluarga.	
--	----------------------------	---	---	--	--	---	--

Dari hasil telaah literatur rievew, terdapat 9 jurnal yang di identifikasi sesuai dengan kriteria penelitian yang meneliti tentang pola makan anak stunting, adapun sub-sub pembahasan yang dapat dibahas dari beberapa jurnal diatas, yaitu:

B. Pembahasan

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2020). Membahas mengenai status gizi anak. Anak merupakan salah satu kelompok rawan gizi, pada masa ini terjadi penurunan laju pertumbuhan, menurunnya pertumbuhan diikuti oleh menurunnya nafsu makan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah status gizi diantaranya adalah prevalensi *stunting* sebesar 40%, prevalensi balita gizi kurang sebesar 25%, prevalensi balita kurus sebesar 15% dan BBLR (Berat Badan lahir Rendah) sebesar 18%. Sementara prevalensi untuk proporsi anak *Stunting* sebesar 35%, prevalensi balita kurus 12%, dan untuk kasus gizi buruk memiliki prevalensi sebesar 17%. Bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi adalah beras, sumber protein hewani adalah ikan katombo, telur ayam, sayur yang sering dikonsumsi adalah sayur kelor. Tidak ada buah yang sering dikonsumsi oleh anak. Jenis penelitian deskriptif. Sampel penelitian sebanyak 77 balita. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *stratified random sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahan makanan yang sering dikonsumsi adalah beras, ikan katombo, telur ayam, sayur kelor dan tidak diberikan buah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Yuliarsih, 2021) Bertujuan untuk mengetahui status gizi anak. Penting sekali orang tua, utama mereka yang mempunyai anak di bawah umur lima tahun karena pada masa anak-anak adalah masa keemasan terkait tumbuh kembangnya terkait asupan nutrisi yang memiliki dampak dari sejumlah faktor yaitu pola asupan makanan. Desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penampang. Populasi dalam penelitian sebanyak 4.231 balita, metode atau teknik dalam proses mengumpulkan sampel yaitu teknik random sampling sederhana. Analisis univariat mengindikasikan bahwa sejumlah besar anak dengan usia dibawah lima tahun (61%) mempunyai status atau keterangan gizi yang terbilang baik (70,5%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada balita dengan status gizi buruk, bahwa pola pemberian makan pada anak stunting mengalami pola makan yang tidak teratur. Maksudnya adalah jika pola pemberian makan tidak sesuai dengan empat sehat lima sempurna dan jadwal pemberian makanan yaitu 3 kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan (diantara 2 kali makanan utama) jika tidak sesuai yang diberikan maka asupan nutrisi dan gizi seimbang pada anak tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting.

Selain itu, penelitian oleh (Mahdaniah.N.P.Ginting and Sinaga, 2020). Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui asupan nutrisi anak. Jenis penelitian kepustakaan (library research). Dimana diperoleh angka persentase atas keterangan atau status gizi pada anak melalui artikel

yang dimuat terdapat sekitar 67.5%, memiliki gizi yang kurang 8.4%, dinyatakan pendek 10.4%, dinyatakan kurus 6.7%. Pola pengasuhan pada anak diartikan sebagai hak dalam memberikan ASI yakni sebanyak 68.4% serta anak yang tidak memperoleh asupan ASI sekitar 31.6% minimnya wawasan pengetahuan seorang ibu dalam pemberian makanan selain ASI, dimana ibu yang menyediakan MP ASI pada anak sebanyak 46.6% serta yang tidak menyediakann makanan MP-ASI kepada anak 53.3%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Dranesia, Wanda and Hayati, 2019). Dengan tujuan untuk mengetahui pola nutrisi anak stunting. Stunting adalah penanda defisiensi nutrisi kronis jangka panjang. Metode penelitian cross-sectional. Sampel berjumlah 290 anak yang dipilih dengan metode cluster random sampling. Analisis data dilakukan melalui chi-square, Mann Whitney, dan regresi logistik. Prevalensi stunting di wilayah Kerinci adalah 46,9%. Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara kejadian stunting dan jenis kelamin, riwayat pemberian ASI eksklusif, pantangan makan, tekanan makan, dan keinginan untuk minum. Hasil analisis regresi logistik multivariat menunjukkan bahwa faktor berhubungan dengan kejadian stunting pada balita adalah jenis kelamin, riwayat pemberian ASI eksklusif, status ekonomi, pembatasan makan, dan tekanan makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat gizi yang buruk dapat mempengaruhi kejadian stunting.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zahara, 2020). Jenis penelitian yang digunakan observasional dengan pendekatan cross-sectional. Yang

memuat desain penelitian pengujian independen terkait variabel. penelitian ini mengindikasikan bahwa perilaku memberikan asupan makanan pada anak stunting menghasilkan data bahwa anak-anak mengalami pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan stunting. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada balita dengan status gizi buruk, bahwa pola pemberian makan pada anak stunting mengalami pola makan yang tidak teratur. Maksudnya adalah jika pola pemberian makan tidak sesuai dengan empat sehat lima sempurna dan jadwal pemberian makanan yaitu 3 kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan (diantara 2 kali makanan utama) jika tidak sesuai yang diberikan maka asupan nutrisi dan gizi seimbang pada anak tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khaerunnisa, Nurhayati and Yulia, 2019) dengan tujuan diketahuinya gambaran dalam praktik pemberian makan pada Anak *stunting*. Hasil pemantauan status gizi tingkat kelurahan sekitar 53 anak atau sebanyak 7,28% anak balita yang menderita stunting. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan desain *Cross-Sectional*. Teknik dalam proses mengumpulkan sampel yakni melalui *purposive sampling*. Teknik dalam mengumpulkan data memanfaatkan instrumen angket dan wawancara. Merujuk pada hasil penelitian bahwa terdapat sebagian besar dari responden (74,0%) memberikan MP-ASI secara berkesinambungan dimana sikap dan penerapan dalam memberikan makan terhadap anak

dinyatakan baik (73,0%) kemudian sejumlah besar responden (80,0%) membuat adaptasi anak pada asupan makanan keluarga.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Risnah *et al* (2021). Dengan tujuan untuk menganalisis faktor pemberian makan oleh keluarga pada anak dengan usia di bawah lima tahun yang menderita stunting dilandaskan pada teori dalam transcultural nursing. Disimpulkan bahwa indikator nilai kultur seta pola hidup turut berdampak pada proses memberikan asupan makanan pada anak dengan usia di bawah lima tahun yang terkena stunting.

Selain itu, Maghfiroh dan Andriani (2020). Mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pola pemberian makan anak Stunting. Berdasarkan data pada penelitian ini *stunting* berjumlah 39,32%. Jenis penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 72 balita. Teknik pengambilan sampel Probability Sampling dengan menggunakan tipe Simple Random Sampling. Analisis data menggunakan uji Deskriptif adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat gambaran pola pemberian makan dengan kejadian stunting (asupan nutrisi yang diberikan pada anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang anak). Adanya gambaran penyakit infeksi dengan kejadian stunting (Tubuh anak membutuhkan energi yang lebih jika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung stunting) di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Demikian pula penelitian oleh (Ismawati *et al.*, 2020). Dengan tujuan untuk asupan gizi anak. Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi dunia, terutama di negara miskin dan berkembang. Metode penelitian analitik observasional dengan studi potong lintang menggunakan kuesioner untuk mengetahui asupan gizi dan faktor penyebab stunting pada anak. Penelitian ini melibatkan 40 anak dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil rata-rata asupan energi, protein, kalsium, dan fosfor pada responden adalah 77,23% AKG protein 69,82% AKG, kalsium 79,74% AKG, dan fosfor 68,75% AKG masing-masing. Dari 40 anak stunting menderita penyakit menular selama kurun waktu 3 bulan (67,5%). Pendidikan orang tua (ibu dan ayah) berpendidikan rendah (70% dan 72,5%), dan 65% ibu responden tidak memiliki pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang buruk dan zat gizi yang tidak seimbang bisa mengakibatkan terjadinya stunting pada anak.

Madeleine Leininger, Pola Makan merupakan kebiasaan makan yang terbentuk dari perilaku makan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Model sistem kebiasaan itu dikemukakan oleh teori Madeleine Leininger “Transkultural Keperawatan” (*transcultural nursing*). Kebiasaan biasa juga disebut dengan nilai budaya seseorang. Pola pemberian makan yang diberikan dalam suatu keluarga selain zat gizi, pemberian makan juga berkaitan dengan nilai budaya keluarga. Jadi berdasarkan artikel diatas teori pakar yang sesuai adalah teori

transcultural nursing atau kebiasaan individu, keluarga atau kelompok dalam mengatur dan memperhatikan pola nutrisi dan gizi seimbang anak. (Risnah, 2021)

Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa pola dan perilaku makan yang buruk dapat menyebabkan kejadian stunting pada anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang memadai (karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air), serta nafsu makan berkurang sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting, yang seringkali tidak disadari, masalah gizi kronis pada anak disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat orang tua/keluarga tidak tahu atau belum sadar untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Riskesdes 2019 mengungkapkan bahwa ada 21,5% anak umur 2-4 tahun dengan konsumsi energi yang rendah dari minimal kebutuhan dalam tubuh serta terdapat 16% yang mendapatkan asupan protein lebih rendah dari minimal kebutuhan. Ketika hal ini terjadi dalam jangka panjang akan menghambat pada masa pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh anak (Aryu Candra, 2020).

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:172 tentang pola makan yaitu:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Terjemahnya: Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu

Berdasarkan tafsir (Kementrian Agama RI, 2020), menjelaskan pernyataan dengan kalimat kepada mereka yang beriman untuk makan melalui rezeki yang baik dan sehat, aman sesuai kebutuhan yang diupayakan pada mereka melalui usaha yang dijalankan secara benar dan halal. Dan beryukurlah kehadiran Allah dalam mengimani bahwa setiap rezeki datangnya dari Allah dan perlu di manfaatkan sesuai dengan apa yang ditentukan. Sesungguhnya ,Allah hanya melarang atas keharaman pada sejumlah hal yakni seperti bangkai, binatang mati tanpa disembelih dengan sah atas dasar agama (Kementrian Agama RI, 2020).

Sebaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-A'Raf/7:31 terkait pola makan yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

Berdasarkan tafsir (Departemen Agama RI, 2020), Allah melalui firmanNya telah memberi aturan terkait urusan dalam hal makan dan minum. Ketika jahiliyah, manusia yang melakukan haji hanya memakan apa yang mengenyangkan namun tidak memakan yang baik dan sehat menambah gizi juga vitamin yang cukup untuk tubuh, dengan turunnya ayat ini, makanan maupun minuman perlu mencukupkan perihal gizi dan masa makan dalam menjaga kesehatan (Departemen Agama RI, 2020).

Beberapa penelitian yang terdapat pada tabel.17 tentang gambaran pola makan anak stunting membuktikan bahwa pola pemberian makan yang buruk bisa mengganggu pertumbuhan anak. Dibuktikan dengan hasil penelitian dari 9 jurnal tersebut semua mendapatkan hasil yang efektif.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini adalah artikel yang digunakan sebagai referensi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusif serta yang memiliki nilai tinggi berdasarkan penilaian *Guideline Review* dari *Joanna Briggs Institute* masih terbatas. Sumber data yang berindeks baik dalam level nasional maupun internasional juga masih sedikit dalam memuat dan membahas terkait gambaran pola makan anak stunting masih kurang dalam hal pencarian literature.

D. Rekomendasi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, baiknya dilakukan penelitian lapangan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih akurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari 9 artikel yang telah dianalisis didapatkan bahwa anak stunting memiliki gambaran pola makan yang buruk.

B. Saran

1. Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, tentang bagaimana gambaran pola makan anak stunting dan menjadi bahan ajar dalam materi terkait pemberian asuhan keperawatan pasien stunting.

2. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan memperdalam dan mengembangkan penelitian ini. Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat dalam mengetahui gambaran pola makan anak stunting.

3. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai gambaran pola makan anak stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P., Aek, S. D. N. and Tobotan, N. (2020) 'Program studi s1 kesehatan masyarakat fakultas kesehatan masyarakat universitas sumatera utara 2020'.
- Aryu Candra (2020) *Oleh: Dr. Aryu Candra MKes(Epid). Ke-1. Semarang.*
- Brier, J. (2020) 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 21(1), pp. 1–9.
- Departemen Agama RI (2020) *Alquranul Karim. Jakarta.*
- Dranesia, A., Wanda, D. and Hayati, H. (2019) 'Pressure to eat is the most determinant factor of stunting in children under 5 years of age in Kerinci region , Indonesia &', *Enfermería Clínica*, (xx). doi: 10.1016/j.enfcli.2019.04.013.
- Faisal, V. (2020) 'Svasta Harena : Jurnal Ilmu Gizi KELURAHAN TAIPA KECAMATAN PALU UTARA DESCRIPTION OF PARENTAL AND CHILDREN ' S FOOD PATTERNS AT AGE 2-5 YEARS IN TAIPA SUB-DISTRICT , NORTH PALU DISTRICT Elvyrah Faisal , Dwi Erma Kusumawati , Aan Happy Desriani Poltekkes K', 1(1).
- Ismawati, R. *et al.* (2020) 'Nutrition intake and causative factor of stunting among children aged under-5 years in Lamongan city &', *Enfermería Clínica*, 30(August 2018), pp. 71–74. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.10.043.
- Jahja, A. S. (2019) 'Hubungan Status Gizi Balita Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia Kejadian Stunting Pada Balita Usia 2-5 Tahun Di Wilayah Kerja'.
- Kabupaten, S. and Tahun, I. (2020) 'No Title', 8(1), pp. 31–42.
- Kemendes RI (2018) 'Aituasi Blita Pendek (Stunting) di Indonesia'.
- Kementrian Agama RI (2020) *Alquranul Karim. Jakarta.*
- Kesehatan, K. *et al.* (2019) *Kementerian kesehatan republik indonesia politeknik kesehatan medan jurusan gizi program studi diploma iii 2019.*
- Khaerunnisa, I., Nurhayati, A. and Yulia, C. (2019) 'PRAKTIK PEMBERIAN MAKAN PADA ANAK STUNTING USIA BAWAH DUA TAHUN DI KELURAHAN CIMAHI (FEEDING PRACTICES OF TODDLERS

STUNTING UNDER TWO YEARS IN CIMAHY VILLAGE)', 8(2), pp. 7–13.

Lia Agustin, dian rahmawati (2020) *cegah stunting dengan stimulasi psikososial dan keragaman pangan*. malang: ae publishing.

Lina anggraeni dan Adnyani (2019) 'Pola pemberian makanan pada balita stunting di Sawan, Kabupaten Buleleng', *Jurnal Kesehatan Midwinerslion*, 4(2), pp. 101–106.

Maghfiroh, D. and Andriani, S. K. (2020) 'Gambaran Pola Pemberian Makan, Penyakit Infeksi, dan Kejadian Stunting pada Anak Balita di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo'. Available at: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82078>.

Mahdaniah.N.P.Ginting and Sinaga, H. T. (2020) 'Kajian pustaka gambaran pola asuh dan status gizi anak umur 0 - 24 bulan', pp. 493–501.

Margawati, A. and Astuti, A. M. (2018) 'Pengetahuan ibu, pola makan dan status gizi pada anak stunting usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Semarang', *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(2), pp. 82–89. doi: 10.14710/jgi.6.2.82-89.

'No Title' (2020).

Putri, N. Y. and Dewina, M. (2020) 'PENGARUH POLA ASUH NUTRISI DAN PERAWATAN KESEHATAN TERHADAP KEJADIAN STUNTING USIA 2 – 5 TAHUN DI DESA SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019', 8(1), p. 12.

Rahmadhita, K. (2020) 'Permasalahan Stunting dan Pencegahannya', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), pp. 225–229. doi: 10.35816/jiskh.v11i1.253.

Risnah *et al.* (2021) 'e-ISSN : 2775-5215 Volume 4 No 1 , Februari 2021 POLA PEMBERIAN MAKAN PADA BALITA STUNTING BERDASARKAN TEORI TRANSCULTURAL NURSING : LITERATURE REVIEW Abstrak Indonesian Journal of Clinical Nutrition Physician . Hal 36-45 | 36 p -ISSN : 2597-4297 e -ISSN', 4(1), pp. 36–45.

Risnah and Irwan, M. (2021) *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan*. Ke-1. Edited by Musdalifah. samata, kabupaten gowa.

Risnah, M. I. (2021) *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan*. Ke-1. Edited by Musdalifah. Samata, kabupaten gowa: Alauddin

university press.

Rita ramayulis, sri iwaningsih (2018) *stop stunting dengan konseling gizi*. jakarta timur: penebar swadaya grup.

Sharif, Y. *et al.* (2020) ‘Association of vitamin D, retinol and zinc deficiencies with stunting in toddlers: findings from a national study in Iran’, *Public Health*, 181, pp. 1–7. doi: 10.1016/j.puhe.2019.10.029.

Wahida Yuliana, bawon nul hakim (2019) *darurat stunting dengan melibatkan keluarga*. sulawesi selatan: yayasan ahmar cendekia indonesia.

Yuliarsih, L. (2021) ‘GAMBARAN STATUS GIZI DAN POLA MAKAN BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019’, 1(2), pp. 130–140.

Zahara, R. (2020) ‘PAUD YANG STUNTING DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM’, 9(1).

Zahara, R. (no date) ‘GAMBARAN POLA PEMBERIAN MAKAN PADA ANAK PAUD YANG STUNTING DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM’, p. 10.



L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran I

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Sectional Cross Deskriptive Study

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

Catat Nomor :

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak dapat dijeaskan
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sample jelas didefenisikan?				
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan?				
3	Apakah metode yang digunakan digambarkan dengan jelas?				
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran?				

5	Apakah faktor perancu didefenisikan?				
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?				
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?				

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik

Peninjau :
 Penulis :
 Tanggal :
 Tahun :
 Catat Nomor :

JURUSAN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

No	Pertanyaan	Jurnal								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Penilaian Keseluruhan : Sertakan Kecualikan Cari Info Lebih Lanjut

Ceklist Telaah Kritis JBI Studi Untuk Cohort

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

Catat Nomor :

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak dapat dijeaskan
1	Apakah kedua kelompok serupa dan direkrut dari populasi yang sama?				
2	Apakah eksposur diukur dengan cara yang sama dan dijelaskan secara rinci?				
3	Apakah paparan diukur dengan cara yang valid ?				
4	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
5	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
6	Apakah rekrutmen peserta dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan sample atau variable atau kriteria inklusi ?				

7	Apakah hasil diukur secara valid ?				
8	Apakah durasi waktu tindak lanjut digunakan cukup lama dan tepat?				
9	Apakah tindak lanjut sudah dilaksanakan dan sesuai, jika tidak, apakah ada alasan yang dijelaskan ?				
10	Apakah strategi untuk mengatasi tindak lanjut yang tidak lengkap ?				
11	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?				

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran III

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Case Study

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia

Peninjau : Tanggal :
Penulis : Tahun :
Catat Nomor :

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak dapat dijeaskan
1	Apakah kasus yang dipilih sesuai berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan ?				
2	Apakah peserta memenuhi syarat dalam studi kasus ?				
3	Apakah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus sesuai ?				
4	Apakah metode yang digunakan jelas digambarkan, apakah validitas dan realibilitasnya jelas ?				
5	Apakah studi kasus diukur dengan cara yang sama?				

6	Apakah faktor perancu diidentifikasi?				
7	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?				
8	Apakah hasil dinilai dalam standar valid untuk kasus?				
9	Apakah periode percobaan dilakukan dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat?				
10	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?				

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Referensi 1 (Kajian Pustaka)

full text (8).pdf (SECURED) - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 43 / 119 100% Tools Fill & Sign Comment

Pola pemberian makan anak harus disesuaikan dengan usia anak supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan (Yustianingrum dan Adriani, 2017). Berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG), umur dikelompokkan menjadi 0-6 bulan, 7-12 bulan, 1-3 tahun, dan 4-6 tahun dengan tidak membedakan jenis kelamin. Takaran konsumsi makanan sehari dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Departemen Kesehatan RI, 2000)

Tabel 2.5 Takaran Konsumsi Makanan Sehari pada Anak

Kelompok Umur	Jenis dan Jumlah Makanan	Frekuensi Makan
0-6 bulan	ASI Eksklusif	Sesering mungkin
6-12 bulan	Makanan lembek	2x sehari 2x selingan
1-3 tahun	Makanan keluarga: 1-1½ piring nasi pengganti 2-3 potong lauk hewani 1-2 potong lauk nabati ½ mangkuk sayur 2-3 potong buah-buahan 1 gelas susu	3x sehari
4-6 tahun	1-3 piring nasi pengganti 2-3 potong lauk hewani 1-2 potong lauk nabati 1-1½ mangkuk sayur 2-3 potong buah-buahan 1-2 gelas susu	3x sehari

Fill & Sign Tools

- Add Text
- Add Checkmark
- Place Initials
- Place Signature

Send or Collect Signatures

Work with Certificates

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Firefox, Chrome, Word, PowerPoint, Excel, VLC, and other applications. System tray shows time 17.06 and date 04/08/2021.

Referensi 2 (Analisis sintesis Grid)

Jurnal 1.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 8 100%

Svasta Harena: Jurnal Ilmu Gizi Vol. 1 No. 1 2020
<http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/SHJIG> Hal. 37 - 44

**GAMBARAN POLA ASUH DAN POLA MAKAN ANAK USIA 2-5 TAHUN DI
KELURAHAN TAIPA KECAMATAN PALU UTARA**

**DESCRIPTION OF PARENTAL AND CHILDREN'S FOOD PATTERNS AT AGE 2-5
YEARS IN TAIPA SUB-DISTRICT, NORTH PALU DISTRICT**

Elvyrah Faisal, Dwi Erma Kusumawati, Aan Happy Desriani
Poltekkes Kemenkes Palu
(virafaisal@yahoo.com, 08114049394)

ABSTRAK

Anak usia 2-5 tahun merupakan salah satu kelompok rawan gizi, pada masa ini terjadi penurunan laju pertumbuhan, menurunnya pertumbuhan diikuti oleh menurunnya nafsu makan. Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa terdapat masalah status gizi di Sulawesi Tengah, diantaranya adalah prevalensi *stunting* sebesar 40%, prevalensi balita gizi kurang sebesar 25%, prevalensi balita kurus sebesar 15% dan BBLR (Berat Badan lahir Rendah) sebesar 18%. Sementara prevalensi untuk proporsi anak *Stunting* di Kota Palu tahun 2013 sebesar 35%, prevalensi balita kurus 12%, dan untuk kasus gizi buruk memiliki prevalensi sebesar 17%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran pola asuh dan pola makan anak usia 2-5 tahun di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 2-5 tahun sejumlah 77 balita. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *stratified random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak adalah tidak otoriter, tidak demokrasi dan permisif. Bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi adalah beras, sumber protein hewani adalah ikan katombo, telur ayam, sayur yang sering dikonsumsi adalah sayur kelor. Tidak ada buah yang sering dikonsumsi oleh anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara yang paling dominan adalah pola asuh demokrasi dimana terdapat 71 orang tua yang menerapkan pola asuh jenis ini dan bahan makanan yang sering dikonsumsi adalah beras, ikan katombo, telur ayam dan sayur kelor.

Kata Kunci: Pola Asuh, Pola Makan

Adobe PDF Pack
Convert files to PDF and easily combine them with other file types with a paid subscription.
Select File to Convert to PDF:
Select File

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10:43
23/07/2021

Referensi 3

Jurnal 2.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open [Navigation icons] 1 / 9 [Zoom: 100%] [Tools] [Fill & Sign] [Comment]

Click on Sign to add text and place signatures on a PDF file.

Nutritional status is a factor that affects the quality of human resources, lack of nutrients during the growth period can have an impact on the delay in physical growth, motor and cognitive development. Parents' upbringing plays an important role in overcoming nutritional problems in children, especially in the parenting style of breastfeeding and feeding patterns. The aim of this research was to know the description of parenting style and nutritional status of children aged 0-24 months. This type of research was library research (library research). The data collection method used Google Scholar, Garuda and Arjuna databases. Researchers used 15 articles published from 2015 - 2020 and indexed in Sinta, Arjuna, Mendeley, Google Scholar, Scimago, Worldcat, Zotero, Rama repository, DOAJ, IPI, Garuda, Dimensions, Crossref. The results of this study obtained the percentage of children's nutritional status in accordance with the articles listed, namely 67.5% good nutrition, 8.4% under nutrition, 10.4% short, 6.7% thin. The pattern of care for children, namely there were children who get breastmilk as much as 68.4% and children who did not get breastmilk as much as 31.6% and the lack of knowledge of mothers in providing complementary foods with breastfeeding, mothers who provide complementary foods to children 46.6% and those who did not provide complementary breastfeeding to children 53.3%.

Keywords: Parenting style; nutritional status

ABSTRAK

Status gizi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, kekurangan zat gizi selama masa pertumbuhan dapat berdampak pada keterlambatan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik dan kognitif. Pola asuh orang tua memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan gizi anak terkhususnya pada pola asuh pemberian ASI dan pola asuh pemberian makan. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran pola asuh dan status gizi anak umur 0 - 24 bulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data menggunakan database Google Scholar, Garuda dan Arjuna. Peneliti menggunakan 15 artikel yang diterbitkan dari tahun 2015 - 2020 dan terindeks di Sinta, Arjuna, Mendeley, Google Scholar, Scimago, Worldcat, Zotero, Rama repository, DOAJ, IPI, Garuda, Dimensions, Crossref. Hasil penelitian ini mendapatkan persentase status gizi anak sesuai dengan artikel yang tercantum yaitu gizi baik sebanyak 67.5%, gizi kurang 8.4%, pendek 10.4%, kurus 6.7%. Pola asuh terhadap anak yaitu terdapat anak yang mendapatkan ASI sebanyak 68.4% dan anak yang tidak mendapatkan ASI sebanyak 31.6% dan kurangnya pengetahuan ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI, ibu yang memberikan MP-ASI kepada anak 46.6% dan yang tidak memberikan MP-ASI kepada anak 53.3%.

Kata kunci: Pola asuh,; status gizi

PENDAHULUAN

pengumpulan data menggunakan database Google Scholar, Garuda dan Arjuna. Peneliti menggunakan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10:44
23/07/2021

Referensi 4

Jurnal 3.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 11 100%

Tools Fill & Sign Comment

Lilis Yuliarsih
AKPER Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia
lilis_yuliarsih@yahoo.co.id

Received: 28-01-2021
Revised : 19-02-2021
Accepted: 24-02-2021

Abstract
Nutritional status is very important to be known by parents, especially those who have children under the age of five years because it is a golden age related to the growth and development of future nutritional status can be influenced by several factors including food consumption patterns. The purpose of this study is to determine the influence of feeding patterns on the nutritional status of toddlers in the working area of astanajapura health center cirebon kabuapten in 2019. The research design used in this study is descriptive quantitative with cross sectional approach. The population in this study is all children aged 1-5 years in the working area of astanajapura health center in 2019 as many as 4231 toddlers, the technique of sampling used is simple random sampling techniques. Data analysis using univariate analysis. Univariate analysis shows that most toddlers (61%) have a good diet and most toddlers have good nutritional status (70.5%). Based on the results of research that shows that there are still toddlers with malnutrition status, it is expected that the Astanajapura Health Center can provide services to the community, especially families who have toddlers by prioritizing primary services in the form of promotion and preventive by conducting health counseling in order to improve the degree of public health, especially in improving the nutritional status of toddlers by lowering and suppressing the incidence of malnutrition or malnutrition.
Keywords: toddlers; diet; nutritional status.

Click on Sign to add text and place signatures on a PDF file.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10.45
23/07/2021

Referensi 5

Jurnal 4.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 5 / 16 100% Tools Fill & Sign Comment

GAMBARAN POLA PEMBERIAN MAKAN, PENYAKIT INFEKSI DAN KEJADIAN *STUNTING* PADA ANAK BALITA DI DESA MOJOREJO KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Abstrak

Stunting pada anak balita dapat terjadi di akibatkan oleh pola pemberian makan balita yang kurang diperhatikan dan seringnya terkena penyakit infeksi, penyakit infeksi lebih sering menyerang anak balita yang terkena *stunting* yang di akibatkan asupan didalam tubuh tidak optimal dikarenakan pola pemberian makan yang kurang baik dan tidak maksimal serta lingkungan yang kurang dijaga kebersihannya dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit infeksi. Berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten Sukoharjo 2017 Desa Mojorejo Kabupaten Sukoharjo data *stunting* berjumlah 39,32%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran pola pemberian makan dan penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* di Desa Mojorejo. Jenis penelitian ini yakni observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah anak balita umur 1-5 tahun dengan jumlah 72 balita. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *Probability Sampling* dengan menggunakan tipe *Simple Random Sampling*. Analisis data menggunakan uji Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat gambaran pola pemberian makan dengan kejadian *stunting* di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Adanya gambaran penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* di Desa Mojorejo Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: Pola Pemberian Makan, Penyakit Infeksi dan *Stunting*.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10:46
23/07/2021

Referensi 6

Jurnal 6.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open [Icons] 1 / 10 100% [Icons] Tools Fill & Sign Comment

e-mail : blestari267@gmail.com
³Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar
e-mail : enysutria@uin-alauddin.ac.id
⁴Dosen Jurusan Keperawatan Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat
e-mail : muhammad.irwan@unsulbar.ac.id

Abstrak

Balita stunting menjadi masalah kesehatan penduduk dunia. Pola pemberian makan yang diberikan dalam keluarga berkaitan erat dengan nilai budaya keluarga dan bagaimana pola perilaku hidup sehatnya. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan menganalisis faktor pemberian makan oleh keluarga pada balita stunting berdasarkan teori *transcultural nursing*. Metode pencarian artikel dalam penelitian menggunakan 4 database yakni Proquest, Pubmed, DOAJ dan Scholar. Cara mencari artikel berkualitas, penulis menggunakan instrumen dari Joanna Briggs Institute yang memuat daftar periksa dan pedoman *critical appraisal*. Menggunakan kata kunci pola pemberian makan, balita stunting dan *transcultural nursing*. Hasilnya yakni pencarian menggunakan database Proquest ditemukan 1 artikel, pencarian menggunakan database Pubmed ditemukan 110 artikel, pencarian menggunakan database DOAJ ditemukan 36 artikel dan pencarian menggunakan database Scholar ditemukan 87 artikel. Secara keseluruhan ditemukan 234 artikel yang akan diseleksi melalui kriteria inklusi dan eksklusi sehingga akan ditemukan kriteria artikel yang akan direview terkait penelitian ini. Artikel yang membahas mengenai pemberian pola makan pada balita stunting ditemukan 188 artikel sedangkan artikel yang membahas tentang teori *transcultural nursing* ditemukan 45 artikel dan artikel yang sesuai dengan judul penelitian ditemukan 10 artikel. Disimpulkan bahwa faktor nilai budaya dan gaya hidup mempengaruhi pola pemberian makan balita stunting.

Kata Kunci: pola pemberian makan, balita stunting, *transcultural nursing*

Abstract

Toddler stunting is a health problem for the world's population. The pattern of offering food that is given in the family is closely related to the cultural values of the family and how the patterns of healthy living behavior. This study aims to analyze dietary factors in toddlers based on transcultural nursing theory. The method used is in the form of searching for articles in research that uses 4 databases namely Proquest, pubmed, DOAJ and Scholar. How to find quality articles, the author uses a *critical appraisal* instrument from the Joanna Briggs Institute which contains

Sign In

Export PDF

Create PDF

Adobe PDF Pack

Convert files to PDF and easily combine them with other file types with a paid subscription.

Select File to Convert to PDF:

Select File

Edit PDF

Send Files

Store Files

13.19
05/08/2021

Referensi 7

Jurnal 5.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 10 100%

Tools Fill & Sign Comment

ABSTRACT

Early childhood is a period where growth is very good in terms of physical motor, emotional, cognitive and psychosocial. early age is the age covering the age of 5 years, this age period is important for the development of a child. This period is so important that it is called the golden age. Editing is an assessment of nutritional status based on indicators of body length compared to age (PB / U) or height versus age (TB / U) where anthropometric measurement results show a z-score <-2 SD (short) and <-3 SD (very short).

The purpose of this study was to determine the frequency of eating among children with stunting in Sekip Village, Lubuk Pakam District, to assess the type of food consumed by children with stunting in Sekip Village, Lubuk Pakam District.

This type of research is observational with a cross-sectional research design, namely the measurement of the related independent variables at the same time.

The results of this study indicate that the pattern of feeding in stunting children results in data that the paud children experience an irregular feeding pattern, which can cause stunting.

Key words: Stunting children, diet

karakteristik sebagai berikut, berkembang konsep diri, munculnya egosentris, rasa ingin tahu, imajinasi, belajar menimbang rasa, dan belajar dari lingkungannya, cara berpikir, kemampuan berbahasa, dan munculnya perilaku (Rusilanti, dkk 2015).

Dalam menentukan makanan anak usia dini perlu diketahui keadaan seorang anak. Anak usia dini yang sedang mengalami masa tumbuh kembang yang amat pesat. Pada masa ini proses perubahan fisik, emosi, dan sosial anak berlangsung sangat cepat. Proses ini dipengaruhi oleh faktor dari diri anak sendiri maupun lingkungannya (Rusilanti, dkk 2015).

Masalah kekurangan gizi sering dialami oleh anak usia 3 -5 tahun, karena pada umumnya sering terjadi masalah makan yang disebabkan anak cenderung memilih makanan yang akan dikonsumsi (Sari, dkk 2016).

Pola makan pada anak usia dini sangat berperan penting dalam proses pertumbuhannya. Jika pola makan tidak tercapai dengan baik pada anak maka pertumbuhan anak akan terganggu, tubuh kurus, pendek bahkan bisa menjadi gizi buruk pada anak (Purwani, dkk 2013).

Masalah gizi, khususnya anak pendek, menghambat perkembangan dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Anak-anak yang pendek mengalami kemungkinan lebih besar

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10:48
23/07/2021

Referensi 8

dranesia2019 (Jurnal 7).pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 6 100% Tools Fill & Sign Comment

Received 13 November 2018; accepted 17 April 2019

Bookmarks

- Pressure to eat is the most determinant factor of stunting in children under 5
 - Introduction
 - Method
 - Results
 - Discussion
 - Characteristic s of children and families and the incidence of
 - Child feeding and child eating behavior related to
 - The factors most associated with the incidence of
 - Conflict of interests

KEYWORDS
Child feeding;
Child eating behaviors;
Malnutrition;
Nutrition;
Stunting

Abstract
Objective: This multivariate study was conducted to identify the determining factors of the stunting incidence in the Kerinci region.
Method: The study design was cross-sectional. The sample comprised 290 children selected by the cluster random sampling method. Data analysis was conducted through chi-square, Mann-Whitney, and logistic regression.
Results: The prevalence of stunting in the Kerinci region was 46.9%. Bivariate analysis showed a relationship between the incidence of stunting and gender ($p=0.019$), history of exclusive breastfeeding ($p=0.038$), eating restriction ($p=0.038$), pressure to eat ($p=0.009$), and desire to drink ($p=0.049$). Somewhat similarly, the results of multivariate logistic regression analysis showed that the factors related to the incidence of stunting in children under five were gender, history of exclusive breastfeeding, economic status, eating restriction, and pressure to eat. That said, the factor most associated with the incidence of stunting was the pressure to eat.
Conclusion: The provision of a nursing care plan for reducing stunting in children can be accomplished by increasing exclusive breastfeeding efforts as well as by focusing on the feeding efforts of parents and improving good eating behaviors in children.
© 2019 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introduction

Stunting is a marker of long-term, chronic nutritional deficiency.¹ However, it is often not recognized by families and health workers.^{2,3} Unresolved stunting in children will have a sustained, adverse impact on the next generation,^{4,5} causing cognitive impairment, learning

* Peer-review of abstracts of the articles is under the responsibility of the Scientific Committee of Universitas Indonesia. Full-text and the content of it is under responsibility of authors of the article.
* Corresponding author.
E-mail address: dessie@ui.ac.id (D. Wanda).

<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.013>
1130-8621/© 2019 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

10.49
23/07/2021

Referensi 9

ismawati2020 (Jurnal 8).pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 4 100%

Tools Fill & Sign Comment

Received 2 October 2019; accepted 17 October 2019

KEYWORDS
Nutrition intake;
Causative factors;
Stunting;
Children

Abstract
Objective: The study aimed to analyze the nutrition intake and causative factor of stunting among children aged under 5 years in Lamongan City.
Methods: This study was using the observational analytic with a cross-sectional study using a questionnaire to define the nutrition intake and causative factor of stunting among children in 4 districts. This study recruited 40 children aged under 5 years (24–59 months) which are selected using simple random sampling techniques from May to June 2019.
Results: The average intake of energy, protein, calcium, and phosphor in respondents was 77.23% RDA, protein 69.82% RDA, calcium 79.74% RDA, and phosphor 68.75% RDA, respectively. Out of 40 stunting children were suffering from infectious disease during period 3 months (67.5%). Parent's education (mothers and fathers) had low education (70% and 72.5%), and 65% of mother's from respondents has no job.
Conclusion: Causative factor of stunting among children aged under 5 years in Lamongan City was less nutritional intake, infection disease, and parents characteristic. The evidence in this research primarily align with common The World Health Organization conceptual framework on childhood stunting.
© 2020 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introduction

Stunting is one of the nutritional problems faced in the world, especially in poor and developing countries. In Indonesia, the stunting rate is quite high, which is around 7.8 million out of 23 million children or around 35.6 percent.¹ Based on data from the Health Office as of August 2018, the prevalence of stunting was around 22 percent in East Java. Around 12 out of 38 districts/cities appears with

* Peer-review under responsibility of the scientific committee of the 1st International Conference on Nutrition and Public Health (ICNPH 2019). Full-text and the content of it is under responsibility of authors of the article.
* Corresponding author.
E-mail address: ritaismawati@unesa.ac.id (R. Ismawati).

<https://doi.org/10.1016/j.enfcti.2019.10.043>
1130-8621/© 2020 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

10.50
23/07/2021

Referensi 10

Jurnal 9.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open 1 / 7 100%

Tools Fill & Sign Comment

Sign In

Export PDF

Create PDF

Adobe PDF Pack
Convert files to PDF and easily combine them with other file types with a paid subscription.

Select File to Convert to PDF:

Select File

Edit PDF

Send Files

Store Files

PRAKTIK PEMBERIAN MAKAN PADA ANAK *STUNTING* USIA BAWAH DUA TAHUN DI KELURAHAN CIMAH

(FEEDING PRACTICES OF TODDLERS *STUNTING* UNDER TWO YEARS IN CIMAH VILLAGE)

Intan Khaerunnisa¹, Ai Nurhayati¹, Cica Yulia¹

Program Studi Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia

intankhairumisa@gmail.com

Abstrak: Hasil pemantauan status gizi tingkat kelurahan di kota Cimahi tahun 2018 pada balita menggunakan indikator panjang badan menurut umur (PB/U) atau dengan tinggi badan menurut umur (TB/U) bahwa prevalensi data yang diperoleh dari puskesmas Cimahi Tengah terdapat 53 anak atau sebanyak 7,28% anak baduta mengalami *stunting*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *stunting* yaitu praktik pemberian makan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai praktik pemberian makan pada Anak *stunting* Usia Bawah Dua Tahun di Kelurahan Cimahi. Metode pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan desain *Cross-Sectional*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang ditentukan berdasarkan tujuan dan ciri-ciri tertentu yakni ibu yang memiliki anak usia bawah dua tahun yang mengalami *stunting* di Kelurahan Cimahi yang berjumlah 53 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen angket dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yakni lebih dari setengah responden (74,0%) melakukan Pemberian MP-ASI yang berkelanjutan, sikap ibu dalam praktik pemberian makan pada anak dinilai baik (73,0%) serta sebagian besar responden (80,0%) melakukan adaptasi anak terhadap makanan keluarga.

Kata Kunci: Praktik Pemberian Makan, Baduta, *Stunting*

Windows Taskbar: 10.39 08/08/2021