

**PENGARUH FREKUENSI PENAMPUNGAN TERHADAP KUALITAS
MAKROSKOPIS SEMEN AYAM KAMPUNG
(*Gallus domesticus*)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh:

**MUH ANUGRAHAHMAD
60700116018**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Anugrah Ahmad
NIM : 60700116018
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang, 9 Juli 1998
Jurusan : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul : Pengaruh Frekuensi Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya Skripsi yang saya tulis adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau *plagiasi* maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samata 27 Januari 2021
Penulis

MUH ANUGRAH AHMAD
60700116018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi saudara Muh Anugrah Ahmad, NIM: 60700116018, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi dengan judul “**Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)**” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengajukan Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Samata, 6 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001


Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.
NIP. 19730828 200604 2 001







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (*Gallus Domesticus*)” yang disusun oleh **Muh Anugrah Ahmad**, NIM: 60700116018, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa 16 Februari 2021 M

04 Rajab 1442 H

Dewan Penguji

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	()
Sekretaris	: Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.	()
Munaqisy I	: Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.	()
Munaqisy II	: Prof.Dr. Arifuddin, M.Ag	()
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	()
Pembimbing II	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.	()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muh Halfah Mustami, M.Pd.
NIP: 1971041 2000031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah karena berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)” yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, doa serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda Drs Ahmad.G dan Ibunda Erniwati serta Kakak-kakakku dan Adikku yang telah memberikan kasih sayang tulus penuh cinta, doa dan perhatian serta dukungan moril juga materil yang sangat berarti bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Dr. Wahyuddin, M.Hum. dan Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan dan Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Bapak Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, selama penulis melaksanakan penelitian. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Ibunda Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P. selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing, memberikan pengalaman dan mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada Tim Penguji yaitu Ibu Rasyidah Mappanganro,S.Pt.,M.P selaku Penguji I dan Bapak Prof.Dr. Arifuddin, M.Ag. selaku Penguji II atas kritik dan sarannya selama proses penulisan skripsi.
8. Para Dosen Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu semangat untuk berbagi ilmu yang bermanfaat kepada kami para mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan.
9. Bapak Muhammad Arsan Jamili, S.Pt., M.Si. selaku Dosen Jurusan Ilmu Peternakan dan Kak Hikmawati, S.Pt. selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan serta Kak Andi Afriana, S.E., selaku Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang selalu memberikan arahan dan bantuan dalam mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Kelas A angkatan 2016 Jurusan Ilmu Peternakan yang menjadi teman seperjuangan untuk sama-sama bertekad bisa mencapai gelar sarjana.
11. Dan terimakasih kepada Ela Sulistiana S.Pt, Yayan Bastyar S.Pt, dan Ratnawati S.Pt yang telah membantu penulis dan memberikan saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini juga terimakasih kepada Jusman selaku rekan tim yang sudah berjuang sama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan bantuan dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah pengawetan telur.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Samata, Januari 2021
Penulis

Muh Anugrah Ahmad
60700116004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Terdahulu.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Integrasi	6
B. Kajian Teoritis.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	28
B. Alat dan Bahan.....	28
C. Prosedur Penelitian	28
D. Variabel Yang Diukur.....	31
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	38
B. Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46
GAMBAR PENELITIAN	48

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Kandungan nutrisi pakan komersial.....	30
2.	Konsistensi, Bau dan Warna semen	35
3.	Volume dan Derajat keasaman (pH)	35



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Organ reproduksi ayam jantan	17
2.	Letak organ testis di dalam rongga tubuh ayam	17
3.	Kandang Ayam	29
4.	Kertas pH	33
5.	Volume semen ayam kampung (<i>Gallus domesticus</i>)	36
6.	Derajat Keasaman (pH) Semen	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Muh Anugrah Ahmad
NIM : 60700116018
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (*Gallus Domesticus*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi penampungan terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung (*Gallus domesticus*). Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dengan 3 kali ulangan dan dengan 5 ekor ayam pada setiap ulangan yaitu P0: Frekuensi penampungan 1 kali per minggu, P1: Frekuensi penampungan 2 kali per minggu, P2: Frekuensi penampungan 3 kali per minggu. Berdasarkan *Analysis of Variance* (ANOVA) frekuensi penampungan 1, 2 dan 3 kali dalam seminggu (P0, P1, P2) tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung meliputi volume semen yang dihasilkan normal, konsistensi kental, pH normal serta warna putih susu dan bau khas (berbau amis).

Kata kunci : Frekuensi Penampungan, Makroskopis, Ayam Kampung.

ABSTRACT

Nama : Muh Anugrah Ahmad
NIM : 60700116018
Jurusan : Animal Science
Judul : **The Effect of The Frequency of Storage on the Macroscopic Quality of Netive Chicken Cement (Gallus Domesticus)**

This study aims to determine the effect of the frequency of storage on the macroscopic quality of chicken semen (*Gallus domesticus*). The research method used was a completely randomized design (CRD) with 3 treatments with 3 repetitions, namely P0: frequency of shelter 1 time per week, P1: frequency of shelter 2 times per week, P2: frequency of storage 3 times per week. Data analysis used Analysis of Variance (ANOVA) with further test of the Least Significant Difference (LSD). Based on the Analysis of Variance (ANOVA), the frequency of storage 1, 2 and 3 times a week (P0, P1, P2) has no significant effect on the macroscopic quality of native chicken semen including normal volume of semen produced, thick consistency, normal pH and milky white color. and a distinctive smell (smells fishy).

Keywords: Shelter Frequency, Macroscopic, Netive Chickens.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam lokal Indonesia yang pada umumnya merupakan keturunan dari ayam Hutan Merah (*Gallus gallus*) (Prawirokusumo, 1978; Ichinoe, 1982; Aini, 1990; Crawford, 1990) terdiri dari banyak strain lokal. Ayam lokal Indonesia yang lazim pula disebut sebagai ayam kampung, ayam buras, atau ayam sayur memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Ayam lokal ini pada umumnya dipelihara secara semi intensif atau ekstensif di pedesaan.

Ayam kampung (*Gallus domesticus*) merupakan salah satu jenis unggas yang paling sering dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, karena mudah didapatkan, memiliki harga jual yang stabil dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ayam kampung (*Gallus domesticus*) juga memiliki banyak kontribusi terhadap pemenuhan protein hewani di Indonesia. Olehnya itu, masyarakat pedesaan memeliharanya sebagai sumber pangan keluarga akan telur dan dagingnya (Iskandar dkk., 2010).

Ayam kampung mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat terutama di pedesaan dijadikan sebagai sumber daging, telur dan sebagai tambahan pendapatan. Pemeliharaan ayam kampung mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan ayam ras yaitu cenderung lebih kuat terhadap penyakit tertentu, mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan pemeliharaan yang relatif mudah. Produk ayam Kampung seperti telur dan daging mempunyai keistimewaan dan sukar digantikan oleh komoditi lain. Namun demikian ayam kampung juga mempunyai beberapa kekurangan

seperti pertumbuhan yang lambat, produksi rendah, masih mempunyai sifat mengeram, lambat dewasa kelamin, lamanya selang waktu bertelur akibat mengasuh anak dan rendahnya mutu genetik perkembangan ayam kampung saat ini ditemukan berbagai hambatan untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung yang relatif rendah. Dalam pembudidayaan ayam kampung, permasalahan yang sering ditemui adalah penyediaan bibit ayam kampung unggul. Dalam pencarian calon bibit unggul, selain didasarkan dari tampilan luarnya, juga dapat dilakukan dengan konsep pemuliaan ternak, sehingga diperoleh bibit unggul, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas ternak (Darwati, 2000).

Dalam al-Quran dijelaskan mengenai ternak yang memiliki beberapa manfaat untuk manusia yakni terdapat pada QS An-Nahl/ 16:5

وَاللّٰنَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Terjemahnya :

Dan Dia telah menciptakan hewan ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan (Kementerian Agama, 2012).

Pemeliharaan ayam kampung (*Gallus domesticus*) dapat dilakukan secara intensif, semi intensif dan ekstensif dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik dari ayam kampung tersebut. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknologi yang ada salah satunya adalah inseminasi buatan (IB). Aplikasi teknologi inseminasi buatan (IB) adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung (Purwanti dkk., 2006).

Keberhasilan inseminasi buatan (IB) dipengaruhi banyak faktor seperti penampungan, penyimpanan, kualitas semen, produktivitas jantan, keterampilan inseminator, waktu inseminasi dan reproduksi yang baik. Penampungan semen bertujuan untuk mendapatkan kualitas semen yang baik dan mendapatkan jumlah (volume) yang banyak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Penampungan semen ayam kampung dilakukan dengan metode pemijatan atau *massage* pada bagian punggung ayam. Penampungan semen yang telah dilakukan dapat dilihat kualitasnya secara makroskopis dan mikroskopis. Kualitas sperma ayam pejantan akan menciptakan bibit DOC yang berkualitas. Kualitas secara makroskopis yang mencakup warna, bau, pH, volume (Rahayu dkk., 2017).

Berdasarkan latar belakang, maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui frekuensi penampungan terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung (*Gallus domesticus*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pengaruh frekuensi penampungan terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung (*Gallus domesticus*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh frekuensi penampungan terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung (*Gallus domesticus*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi pembaca terkait tentang frekuensi penampungan terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung (*Gallus domesticus*) untuk meningkatkan produktivitas.

E. Kajian Terdahulu

Hijriyanto dkk., 2017. Telah melakukan penelitian tentang pengaruh frekuensi penampungan semen terhadap kualitas spermatozoa ayam bangkok. Pengamatan kualitas semen meliputi evaluasi makroskopis (warna, ph, volume, dan konsistensi semen), dan evaluasi mikroskopis (gerakan massa, motilitas, konsentrasi dan abnormalitas) menurut metode BIB Lembang. Data yang diperoleh dianalisis dengan *Analisis of Varian* (ANOVA). Hasil pengamatan kualitas semen ayam bangkok untuk seluruh peubah yang diamati tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap ketiga frekuensi penampungan ($P > 0,05$). Penampungan semen satu kali per minggu, dua kali per minggu, dan tiga kali per minggu menghasilkan kualitas semen ayam bangkok yang sama. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi penampungan semen tidak berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa ayam bangkok.

Pratama, 2011. Telah melakukan penelitian pada sembilan ekor ayam arab silver jantan berumur 33 minggu dengan kisaran bobot badan seragam (Koefisien Keragaman = 9,55 %). Sembilan ekor pejantan ini dibagi menjadi tiga secara acak (A, B, C), dimana tiga ekor mendapat perlakuan penampungan semen satu kali per minggu (A), tiga ekor lainnya dengan penampungan semen dua kali per minggu (B), dan tiga ekor lainnya dengan penampungan semen tiga kali per

minggu (C). Pengamatan meliputi evaluasi makroskopis (warna, pH, volume, dan konsistensi semen), dan evaluasi mikroskopis (gerakan massa, motilitas, abnormalitas, konsentrasi, dan jumlah spermatozoa per ejakulat). Hasil evaluasi semen yang didapatkan yaitu : semen berwarna putih susu dengan konsistensi kental ; pH semen berkisar antara 6,8 – 7,1 ; volume semen berkisar antara 0,08 – 0,09 mL dengan gerakan massa sangat baik (+++) ; motilitas > 70% dengan abnormalitas spermatozoa < 25% ; konsentrasi > 4,5 milyar sel/ mL dan jumlah spermatozoa per ejakulat > 400 juta sel. Hasil tersebut menunjukkan ayam Arab memiliki kualitas semen yang cukup baik dan tidak menunjukkan penurunan kualitas walaupun penampungan semen dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu.

F. Hipotesis

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H₀ = Frekuensi penampungan semen yang berbeda tidak berpengaruh terhadap kualitas makroskopis ayam kampung (*Gallus domesticus*).

H₁ = Frekuensi penampungan semen yang berbeda berpengaruh terhadap kualitas makroskopis ayam kampung (*Gallus domesticus*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kajian Integrasi*

Al-qur'an telah menyebutkan berbagai macam jenis binatang yang yang bermanfaat untuk kelangsungan makhluk hidup. Diantaranya sebagai sumber makanan bagi manusia, sebagai bahan untuk mengkaji ilmu pengetahuan serta dijadikan perumpamaan. Sebagaimana terdapat dalam QS Al- Ra'd ayat 11 sebagai berikut :

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ ۗ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Kementerian Agama, 2012).

Manusia sebagai khalifah diberi kewenangan dan kemampuan mengolah dan mengelola seluruh yg ada di bumi dan di langit, termasuk ternak sebagaimana terdapat pada QS Al-Jatsiyah ayat 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama, 2012).

Amanah diserahkan kepada ahlinya sebagaimana terdapat pada QS Al

Nisa/ 4: 58

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Kementerian Agama, 2012).

Penelitian ini memiliki tujuan terutama untuk kemaslahatan manusia seperti firman-Nya dalam QS Al baqarah/ 2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:n

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama, 2012).

Segala sesuatu diciptakan dengan tidak sia-sia seperti ternak yang diciptakan memiliki banyak manfaat selain untuk dikonsumsi ternak dapat dijadikan sebagai bahan objek penelitian sebagaimana terdapat pada QS An- nuur/ 24:45 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Terjemahnya:

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama, 2012).

QS an-Nahl/16:79

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman (Kementerian Agama, 2012).

Menurut Tafsir Jala lain ayat tersebut mengandung makna bahwa (Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan) terbang (di angkasa bebas) di udara antara langit dan bumi. (Tidak ada yang menahannya) sewaktu ia melipat sayap atau mengembangkannya sehingga ia tidak jatuh ke bawah (selain daripada Allah) yakni dengan kekuasaan-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman) iaitu penciptaan burung itu sehingga dapat terbang dan penciptaan udara sehingga dapat memungkinkan bagi burung untuk terbang mengaranginya dan menahan burung untuk tidak jatuh ke tanah (Jalaluddin, 2019).

Inseminasi buatan merupakan suatu teknologi reproduksi yang digunakan untuk meningkatkan populasi ternak dengan cara memasukkan sperma dalam organ reproduksi dengan tujuan menghasilkan individu baru. Penciptaan makhluk hidup seperti manusia dijelaskan dalam QS al Mu'minun/23:14.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik (Kementerian Agama, 2012).

“Tafsir Ibnu Katsir” menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan hewan dari setetes sperma yang kemudian terjadi pembentukan individu baru. Dalam proses pembentukan individu dalam servix, sperma berproses menjadi segumpal daging yang belum menampakkan suatu bentuk maupun lekuk. Setelah itu segumpal daging berproses menjadi sel tulang pada awal ini ternak dalam servix sudah berkepala, berkaki, sekalipun dilengkapi tulang, otot, dan urat. Pada tahap ini dijelaskan munculnya zat pelindung, zat perekat, dan zat penguat bagi tubuh dalam servix. Setelah itu, maka barulah calon ternak menampakkan bentuknya dengan anatomi yang rumit dan bentuk tubuh yang relatif pantas sebagai bentuk hewan atau ternak. Maha Kebesaran Allah, Pencipta yang paling baik (Al Mubarakfuri, 2010).

B. Kajian Teoritis

1. Teori/Konsep yang Relevan

a. Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)

Perkembangan ayam kampung di Indonesia cukup pesat dan telah banyak dipelihara oleh peternak-peternak maupun masyarakat umum sebagai usaha untuk pemanfaatan pekarangan, pemenuhan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan. Ayam kampung merupakan ternak yang sangat umum dijumpai di Indonesia dan mempunyai potensi yang tinggi sebagai penghasil daging dan telur. Mengingat keanekaragaman hayati dari ternak ayam kampung cukup besar, terbuka peluang untuk melakukan pemuliaan agar dapat dihasilkan parent stock. Salah satu program dalam pemuliaan ayam adalah seleksi ayam pejantan, dapat dilakukan diantaranya dengan menguji kualitas semen ayam

tersebut. Pejantan dengan kualitas semen yang jelek dapat menyebabkan fertilitas telur rendah dan sebaliknya untuk semen kualitas baik, menghasilkan persentase telur fertil yang lebih baik (Solihati dkk., 2006).

Ayam kampung mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan dibandingkan dengan ayam ras, yaitu cenderung lebih kuat terhadap penyakit tertentu, mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan pemeliharaannya relatif mudah. Selain sifat-sifat tersebut ayam kampung juga mempunyai beberapa kekurangan seperti pertumbuhan yang lambat, produksi rendah, masih mempunyai sifat mengeram, lambat dewasa kelamin, selang waktu bertelur yang lama akibat mengasuh anak, rendahnya mutu genetik dan harganya relatif lebih mahal dari hasil ternak unggas lainnya karena permintaan yang tinggi tidak diimbangi oleh peningkatan produksi (Solihati dkk., 2006).

Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan jenis-jenis ternak berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik. Suprijatna dkk.,(2005) mengemukakan taksonomi ayam kampung di dalam dunia hewan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata
Class : Aves
Subclass : Neornithes
Ordo : Galliformes
Genus : *Gallus*
Spesies : *Gallus domesticus*

Ayam kampung memiliki variasi terutama pada pola warna bulu Sartika dkk., (2008), demikian pula pada ayam kedu, selain keragaman warna bulu terdapat keragaman jengger dan warna kulit (Mulyono dkk., 2009). Selanjutnya keragaman warna bulu dan warna kulit juga terdapat pada ayam sentul (Sartika dkk., 2004) dan ayam pelung (Iskandar dan Susanti, 2007).

b. Organ Reproduksi Ayam Jantan

Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi hewan jantan adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup khususnya hewan ternak dalam hal ini sudah memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Alat-alat reproduksi setelah mengalami dewasa kelamin akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Alat reproduksi unggas jantan terdiri atas alat kelamin pokok dan alat kelamin pelengkap. Alat kelamin pokok adalah organ yang langsung membentuk spermatozoa yaitu testis. Alat kelamin pelengkap terdiri atas saluran testis yang menuju kloaka yaitu *epididymis*, *vas deferens* dan *papillae* (Sotiyono., 2001). Sistem reproduksi unggas jantan terdiri dari dua testis bentuknya elips dan berwarna terang, dan menghasilkan sperma yang masing-masing mempunyai sebuah saluran sperma yang bernama *vas deferens* serta sebuah kloaka yang menjadi muara dari sistem reproduksi tersebut (Srigandono, 1997). Unggas jantan berbeda dari ternak piaraan lainnya, karena testis tidak turun dalam skrotum tetapi tetap dalam rongga badan. Testis

menghasilkan sperma untuk membuahi telur yang berasal dari hewan betina. Testis yang berbentuk bulat kacang tersebut besarnya berbeda-beda menurut umur dan besar unggas. Permukaan testis diselaputi oleh suatu jaringan fibrosa yang kuat yang diteruskan kedalam testis membentuk kerangka penunjang tenunan testis (Sarwono, 1993).

Reproduksi ayam pejantan berjumlah sepasang testis, setra duktus *epididymis*, sepasang duktus deferens serta alat kopulasi yang dinamakan *phallus*, organ-organ tersebut terletak pada bagian rongga perut pada ayam pejantan yang dinamakan organ reproduksi. Organ reproduksi memiliki fungsi untuk menghasilkan atau memproduksi spermatozoa untuk menyalurkan kedalam organ reproduksi betina (Toelehere, 1985). Alat reproduksi ayam jantan memiliki fungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut sperma yang hidup, mampu aktif dan berpotensi fertile secara sempurna yang diletakkan didalam saluran reproduksi betina (Tomaszewska dkk., 1991).

Bagian-bagian organ reproduksi pada ayam jantan.

1) Testis

Testis adalah organ reproduksi pada ayam yang berfungsi memproduksi spermatozoa, seminal plasma dan hormon testesteron. Spermatozoa merupakan sel kelamin jantan yang mutlak diperlukan untuk menghasilkan generasi baru melalui fungsinya yaitu membuahi ovum. Seminal plasma merupakan cairan semen yang berguna untuk media transportasi sehingga memudahkan dalam ejakulasi waktu perkawinan dan memberikan pohon spermatozoa baik dalam alat reproduksi jantan maupun setelah berada dalam alat reproduksi betina.

Testosteron merupakan hormon kejantanan yang berfungsi untuk membantu pembentukan spermatozoa dan menumbuhkan sifat kelamin jantan terutama membangkitkan libido seksual (Sutiyono, 2001).

Ayam jantan memiliki sepasang testis yang terletak didalam rongga perut ayam jantan dekat dengan tulang belakang dan terletak diantara paru-paru dan ginjal. Testis pada ayam jantan ini melekat dibagian dorsal dari rongga abdomen dan diantara ligamentum mesorchium, bentuk testis yaitu bulat oval hampir mirip dengan kacang dan warna agak pucak kekuning-kuningan (Yuwanta, 2004).

Testis terdiri dari beberapa saluran, yaitu pipa kecil yang *elastic* serta berkelok-kelok dan juga panjang, bagian ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Pipa kecil ini berkelompok serta dipisahkan oleh selaput halus disekitarnya, yang dinamakan tabung seminiferus (Bahr dan Bakst, 1987).

2) Epididymis

Epididymis pada ayam pejantan memiliki bentuk pipi dengan ukuran pendek yaitu sekitar 3 mm yang terletak di dorsal medialis testis didalam rongga perut ayam jantan, saluran reproduksi ayam jantan tidak memiliki *epididymis* seperti mamalia. Akan tetapi testis terletak pada bagian ekstrimitas *cranialis* dan *caudalis* (Setijanto, 1998). Menurut Ashdown (1980), yang menyatakan bahwa *epididymis* yang dimiliki oleh spesies mamalia terdiri dari *corpus*, *caudal* dan *caput* yang memiliki fungsi alat transportasi mematangkan sperma selama berada pada saluran menuju duktus deferen.

3) Duktus deferen

Duktus deferen merupakan saluran yang terletak pada bagian modio

ventral ginjal dan melekat kuat dibagian zig-zag paralel dengan ureter, selain itu berfungsi sebagai alat transportasi spermatozoa atau semen menuju kloaka dan disimpan sementara selama terjadi ejakulasi pada ayam jantan. (Bahr dan Bakst, 1987)

4) Vas deferens

Saluran deferens dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas yang merupakan muara dari testis sedangkan bagian bawah yang merupakan saluran deferens perpanjangan dari saluran epididimis. Saluran deferens ini bermuara di kloaka pada daerah proktodeum yang bersebelahan dengan urodeum dan koprodeum. Sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan di dalam saluran deferens sebelum diejakulasikan. Sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan pada 65% bagian distal saluran deferens (Yuwanta, 2004).

Vas deferens merupakan saluran yang melengkuk disepanjang modio ventral pada permukaan bagian ginjal. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum semen dikeluarkan atau sebelum ayam jantan mengalami ejakulasi (Bahr dan Bakst, 1987).


5) Phalus

Phalus terdiri atas dua bagian yaitu phalus non protodens dan phallus protudens. phalus non protodens ini terbentuk atas penebaran mucosa corpus phallicum medianium yang berada di protodaeum. Sedangkan phallus protudens merupakan jalur dari dasar protodens yang hanya akan terlihat dalam keadaan ereksi. *Phalus* berfungsi sebagai alat kopulasi (Setijanto, 1998)

Menurut Toelihere (1985), semen adalah sekresi kelamin jantan yang

secara norma diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi. Semen dapat pula ditampung dengan berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan. Fungsi plasma semen adalah sebagai medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi jantan ke dalam saluran reproduksi betina. Menurut Gilbert (1980), spermatozoa pada unggas berbentuk *filiformis*. Kepala spermatozoa terdiri dari nukleous dan bagian atasnya tertutup oleh yang berbentuk kerucut sedikit melengkung. Ekor spermatozoa terdiri dari leher, bagian tengah, bagian utama dan ujung.

Menurut Suprijatna dkk., (2005) bahwa penampungan semen sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Seorang memegang ayam jantan yang akan ditampung semennya dan seorang lagi melakukan pengurutan untuk mengeluarkan semen dari alat kelamin ayam sekaligus menampungnya. Menurut Toelihere (1985), pengurutan dilakukan dari muka ke belakang sambil mengangkat ekor dan mengadakan sedikit tekanan pada bagian akhir *phalux*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan *reflex* ejakulatoris. Volume semen tergantung dari *breed*, spesies dan metode penampungan. Volume semen ayam sangat sedikit tetapi konsentrasinya tinggi. Volume yang ditampung dengan metode pemijatan akan lebih banyak, jika dibandingkan dengan penampungan semen saat perkawinan alami. Volume semen pada saat kawin alami adalah 0,35 mL, sedangkan untuk metode pemijatan adalah 0,88 mL (Parker, 1972).



Gambar 1. Organ Reproduksi Ayam Jantan
 Sumber: [Http://vetmedicinae.com](http://vetmedicinae.com)



Gambar 2. Organ Testis Di Dalam Rongga Tubuh Ayam
 Sumber : [Http://vetmedicinae.com](http://vetmedicinae.com)

c. Penampungan Semen

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi. Semen terdiri dari dua bagian, yaitu spermatozoa atau sel kelamin jantan dan plasma semen yang merupakan suatu cairan semi gelatin. Spermatozoa dihasilkan di dalam testis, sedangkan plasma semen merupakan campuran sekresi yang dibuat oleh epididimis dan

kelenjar kelamin pelengkap. Perbedaan anatomi kelenjar-kelenjar pelengkap pada berbagai jenis hewan akan menyebabkan perbedaan volume dan komposisi semen hewan tersebut (Toelihere, 1993).

Penampungan semen ayam kampung dilakukan menggunakan metode pemijatan atau *massage* pada bagian punggung ayam. Penampungan semen ayam kampung sebaiknya dilakukan oleh 2 orang (Suprijatna dkk., 2005), satu orang memegang ayam dan lainnya melakukan pengurutan dan penampungan semen. Pada saat pengurutan, tangan membentuk sudut 45° dengan tulang punggung pejantan dan pengurutan dilakukan berulang kali sampai pejantan ereksi maksimal yang ditandai dengan naiknya bulu ekor dan keluarnya *papillae* dari kloaka. Semen yang telah keluar harus ditampung dalam cawan petri untuk menghindari terjadinya kontaminasi semen dengan kotoran (Sastrodihardjo dan Resnawati, 1999).

d. Evaluasi Semen

Evaluasi semen dilakukan dengan 2 cara yaitu pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan semen secara makroskopis meliputi volume, warna, bau, konsistensi dan pH. Sedangkan pemeriksaan secara mikroskopis meliputi gerakan massa, konsentrasi, motilitas dan persentase hidup atau mati (Hafez, 2000).

Metode penampungan atau pengoleksian semen untuk pelaksanaan inseminasi buatan terdapat tiga cara, yaitu dengan bantuan vagina buatan, metode pengurutan (*massage*), dan menggunakan elektroejakulator. Metode penampungan semen yang paling sering digunakan pada ayam yaitu dengan

metode pengurutan (*massage*), yaitu melakukan pengurutan pada bagian punggung ayam ke arah belakang hingga ujung kaudal tepat di bawah tulang pubis. Pemijatan ujung kaudal tersebut harus dilakukan secara cepat dan kontinyu dengan tekanan tertentu sampai terjadi ereksi yang ditandai dengan keluarnya papila dari kloaka dan kaki yang meregang. Pejantan dipijat secara ritmik dengan jari tangan hingga ejakulasi terjadi dan efek ejakulatorius berhenti (Toelihere, 1993).

Menurut Etches (1996), teknik penampungan semen yang efektif pada unggas dibedakan berdasarkan bangsa. Penampungan semen lebih efektif dengan menggunakan rangsangan pijatan di daerah abdominal pada bangsa *gallinaceous* seperti ayam dan kalkun, sedangkan pada unggas air (itik, angsa, dan entok) lebih efektif menggunakan cara *intercepting* yaitu menampung semen saat pejantan melakukan kopulasi.

Produksi semen yang didapatkan dengan metode pengurutan sering menghasilkan semen yang berkualitas rendah karena semen yang diejakulasikan sering bercampur dengan urin atau feses sehingga akan merusak spermatozoa. Selain itu, ejakulat yang diperoleh dengan metode pengurutan sering bercampur dengan cairan bening atau disebut transudat kloaka. Cairan ini sulit dihindari pada saat pengoleksian semen dan dapat mengganggu viabilitas spermatozoa (Toelihere, 1985).

e. Spermatozoa

Spermatozoa sebelum mengalami fertilisasi atau pembuahan mengalami perubahan struktur dan fungsinya. Perubahan dan struktur spermatozoa ini mulai

terjadi pada saat spermatogenesis, didalam saluran reproduksi jantan dan saluran reproduksi betina, hingga sampai terjadinya proses fertilisasi didalam ampulla. Perubahan struktur dan fungsi spermatozoa saat didalam saluran reproduksi betina disebut dengan kapasitas spermatozoa yang dilanjutkan dengan reaksi akrosom (Susilawati, 2011).

Menurut Sastrodihardjo dan Resnawati (2003), spermatozoa ayam memiliki nilai konsentrasi berkisar antara 1,75-3 milyar sel/mL sedangkan menurut Toelihere (1993), konsentrasi spermatozoa ayam berkisar antara 0,03-11 milyar sel/mL. Menurut Partodihardjo (1982) bahwa konsentrasi sperma tergantung pada umur, bangsa ternak, bobot badan serta frekuensi penampungan. Gilbert (1980) menyatakan bahwa konsentrasi sperma adalah salah satu karakteristik yang diturunkan.

Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan spermatozoa (sel gamet jantan) yang terjadi hanya ditubuli seminiferi yang terletak di testes. Testes 90% tersusun oleh tubuli seminiferi, sedangkan yang 10% adalah sel interititel dan jaringan ikat Susilawati (2011). Menurut Prasetyaningtias (2001) spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa. Adapun Nobrega *et al.* (2009) menyatakan spermatogenesis adalah proses biologi yang kompleks dari transformasi selular yang menghasilkan sel germinal jantan yang haploid yang berasal dari sel stem spermatogonia yang diploid.

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis terjadi dalam 3 fase yaitu spermatogonial, meiosis dan

spermiogenesis dan butuh waktu 13-14 hari. Spermatogenesis terjadi di epitelium (tubuli) seminiferi di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofisis (pituitari bagian depan). Tubuli seminiferi terdiri dari sel Sertoli dan sel germinalis (Yunanta, 2004). Produksi spermatozoa akan bertambah bersamaan dengan meningkatnya umur, akan tetapi produksi spermatozoa kemudian akan mengalami penurunan sesuai dengan meningkatnya umur. Tiga fase spermatogenesis menurut Dellmann dan Brown (1992) adalah sebagai berikut :

1. Spermatositogenesis

Terjadi pembelahan secara mitosis dan spermatogonia bertambah banyak menjadi spermatosit primer. Pada fase ini spermatogonia mempunyai kemampuan untuk memperbaharui diri sehingga menjadi dasar dalam *spermatogonial stem cell* (Ogawa et al., 1997).

2. Miogenesis

Tahap perubahan dari spermatosit yang haploid menjadi spermatid yang diploid.

3. Spermiogenesis

Proses transformasi spermatid yang bulat menjadi bentuk spermatozoa yang matang.

1) Kualitas Makroskopis Spermatozoa

Salah satu solusi pemecahan masalah dalam rangka pengembangan peternakan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas spermatozoa (Widhyari dkk., 2015).

2) Uji Kualitas Makroskopis Semen

Kualitas sperma ayam pejantan yang baik dibutuhkan untuk menciptakan bibit DOC yang berkualitas. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik sperma ayam pejantan yang baik. Umur ayam pejantan Menurut Johari dkk., (2009) bahwa pada ternak ayam menghasilkan spermatozoa berkualitas ketika sudah mengalami kedewasan seksual. Umur 10-20 bulan pada ayam pejantan mampu menghasilkan semen yang berkualitas. Apabila umur tidak diketahui pada ayam pejantan, maka dapat diprediksi melalui panjang taji untuk menentukan umur.

Kualitas makroskopis spermatozoa terdiri atas warna, bau, volume, konsistensi (kekentalan) dan pH (derajat keasaman). Menurut Rahayu dkk., (2017), kualitas dari semen dapat diketahui melalui pemeriksaan secara makroskopis. Evaluasi visual makroskopis terdiri dari:

a. Volume Semen

Volume Sperma ayam pejantan berkisar antara 0,3-1,5 ml per ejakulat, volume sperma juga biasanya dipengaruhi oleh bangsa, umur ternak, ukuran badan ternak dan nutrisi, frekuensi penampungan. Kualitas dan kuantitas dari sperma ayam kampung dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan seperti kandungan protein dan energi (Johari dkk., 2009).

b. Konsistensi

Kekentalan merupakan salah satu karakteristik semen yang memiliki kaitan dengan kepadatan/konsentrasi sperma di dalamnya. Semakin kental sperma maka semakin tinggi pula konsentrasi spermanya. Langkah yang dilakukan untuk mengamati kekentalan adalah gelas penampung semen diposisikan sejajar dengan

mata kita dengan jarak kurang lebih 30 cm. Gelas penampung kemudian dimiringkan ke arah kiri atau kanan sebesar 45° . Gerakan cairan semen di dalam gelas penampung diamati. Perbandingan cairan yang lambat menandakan bahwa semen tersebut cukup kental. Sebaliknya apabila perpindahan cairan berjalan cepat maka semen tersebut encer. Pengamatan diulangi dengan mengembalikan posisi gelas ke posisi tegak. Semen ayam yang baik pada umumnya merupakan semen semen yang sangat kental sampai kental (Rahayu, dkk., 2017).

c. Warna

Al Mahdi *et al.*, (2014) menyatakan bahwa, warna semen ayam bangkok normal adalah putih susu. Warna dan konsistensi semen ini menentukan konsentrasi sperma, bila semen kental dan berwarna putih pekat maka konsentrasi sperma tinggi, sebaliknya bila semen encer dan berwarna bening maka konsentrasinya rendah.

d. pH

Menurut Hardiyanto (1993), pH semen ayam bervariasi antara 8,5-9. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan kertas pH atau lebih teliti lagi diukur dengan pH meter. Derajat Keasaman semen sangat berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. Semakin rendah nilai pH maka spermatozoa yang hidup akan semakin rendah disebabkan oleh produksi asam laktat dan proses metabolisme spermatozoa. pH sperma ayam pejantan bervariasi antara 8,5-9. pH sperma ayam pejantan dipengaruhi oleh asam laktat yang dihasilkan dari proses metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerobik. Penimbunan asam laktat maka dapat meningkatkan atau menurunkan pH larutan

tersebut (Johari dkk., 2009).

Berikut ini merupakan beberapa karakteristik sperma ayam pejantan yang baik. Umur ayam pejantan DOC yang berkualitas. Umur ayam pejantan yang baik akan menghasilkan spermatozoa yang berkualitas ketika sudah mencapai kedewasaan seksual. Apabila umur pejantan tidak diketahui, maka umur dapat diduga dengan menggunakan panjang taji.

3) Kualitas Mikroskopis Spermatozoa

Kualitas spermatozoa juga dapat dilihat melalui pengamatan kualitas mikroskopis spermatozoa terdiri dari:

a. Motilitas

Motilitas adalah daya gerak individu sperma yang digunakan sebagai ukuran kemampuan sperma untuk membuahi sel telur. Daya gerak maju ini sangat diperlukan pada saat berada di dalam saluran kelamin betina untuk mencapai tempat terjadinya fertilisasi (Danang dkk 2012).

Motilitas spermatozoa (%) penentuan motilitas dilakukan dengan cara meneteskan satu tetes semen pada Object glass lalu ditutup dengan cover glass dan amati di bawah mikroskop gerakan motilitas spermatozoa yang bergerak progresif pada 5 lapang pandang yang berbeda Indrawati dkk (2013). Spermatozoa yang baik adalah yang memiliki motilitas spermatozoa diatas 70 % (Khairi dkk 2016).

b. Konsentrasi spermatozoa (sel/mL)

Konsentrasi semen merupakan jumlah spermatozoa yang terkandung dalam satu mL ejakulasi. Penilaian konsentrasi sangat penting karena digunakan

untuk menentukan jumlah pengenceran semen (Supriatna, 2000). Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan menggunakan *neubauer chamber*. Semen ditetaskan ke dalam kamar hitung pada *neubauer chamber* yang telah ditutup dengan *cover glass*. Penghitungan sel spermatozoa dilakukan pada 5 kotak besar. Jumlah sel spermatozoa yang telah dihitung pada 5 kotak kemudian dikali dengan 10^6 sel/mL (Yudi dkk., 2007).

Konsentrasi semen yaitu jumlah spermatozoa yang terkandung dalam satu mL ejakulasi. Penilaian konsentrasi sangat penting karena digunakan untuk menentukan jumlah pengenceran semen (Supriatna, 2000). Hasil pengamatan konsentrasi spermatozoa pada Supriatna tidak berbeda nyata ($P>0,05$) antara ketiga perlakuan. Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi penampungan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap konsentrasi spermatozoa yang dihasilkan. Rataan konsentrasi semen yang didapat yakni antara 5,75-10,07 miliar sel/mL semen.

c. Viabilitas spermatozoa (%)

Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan dengan menggunakan pewarnaan eosin (Khaeruddin dkk 2015). Sampel semen dan pewarna eosin (1:3) dicampur pada *object glass* dan dibuat preparat ulas tipis pada *object glass* yang lain. Preparat kemudian difiksasi dengan menggunakan hair dryer. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 10 x 40. Spermatozoa yang hidup ditandai dengan bagian kepala berwarna terang, sedangkan yang mati bagian kepala berwarna merah-ungu. Penghitungan dilakukan sebanyak 200 sel spermatozoa dan kemudian hitung persentase sel

spermatozoa yang hidup dan mati (Yudi dkk., 2007).

d. Abnormalitas

Menurut Ihsan (2009), bahwa semen yang dapat dipakai IB abnormalitas spermatozoanya tidak boleh lebih dari 15% dan jika abnormalitas spermatozoa lebih dari 25% akan menurunkan fertilitasnya. Menurut Hafez (2000) bahwa, abnormalitas sperma dikelompokkan menjadi 3 yaitu abnormalitas primer, abnormalitas sekunder dan abnormalitas tersier. Abnormalitas primer terjadi pada testis saat proses spermatogenesis tepatnya di tubuli seminiferi. Abnormalitas primer ditandai oleh kepala yang terlampau kecil (*microcephalic*) atau terlalu besar (*macrocephalic*), kepala yang lebar, ekor atau badan berganda dan lain-lain. Abnormalitas sekunder terjadi di epididimis sewaktu ejakulasi. Abnormalitas sperma ditandai dengan adanya butiran protoplasma pada pangkal ekor sperma.

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Semen

Volume semen yang dihasilkan unggas relatif sedikit dan berbeda-beda menurut bangsa unggas, tetapi memiliki konsentrasi spermatozoa yang cukup tinggi. Menurut Toelihere (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen adalah makanan, nutrisi makanan, suhu dan musim, frekuensi ejakulasi, serta libido dan faktor psikis. Peninggian suhu testis karena infeksi penyakit, luka lokal, demam yang tak kunjung reda karena penyakit dan peninggian suhu udara karena kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan pembentukan dan penurunan produksi spermatozoa. Frekuensi ejakulasi yang terlampau sering dalam satu satuan waktu yang relatif pendek cenderung untuk menurunkan libido, volume semen, dan jumlah spermatozoa per

ejakulat. Rangsangan atau stimulasi yang diberikan pada pejantan untuk mempertinggi libido dapat meninggikan volume semen dan konsentrasi sperma motil per ejakulat (Toelihere, 1993).

Produksi sperma distimulasi oleh peninggian periode siang hari, sedangkan berkurangnya periode siang hari akan berpengaruh sebaliknya (Toelihere, 1993). Semakin lama periode siang hari maka aktivitas reproduksi bekerja semakin lama sehingga akan menghasilkan produksi sperma dalam jumlah yang tinggi. Suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi produksi semen, suhu sampai 30 °C dapat membahayakan produksi sperma. Makanan merupakan faktor yang esensial terhadap produksi semen, kekurangan vitamin A dan vitamin E dalam pakan dapat menghambat produksi semen (Toelihere, 1993).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa dan Laboratorium Processing Semen Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kandang ayam, tempat pakan ayam, tempat minum, timbangan, tali prusit, microtube, kertas pH, mikropipet.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 15 ekor ayam kampung jantan, berumur 10 bulan dengan berat 2,5 kg, aluminium foil, label, *tissue*.

C. Prosedur Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan yang disetiap pengulangan menggunakan 5 ekor ayam kampung. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut:

P0 = Frekuensi penampungan 1 kali per minggu

P1 = Frekuensi penampungan 2 kali per minggu

P2 = Frekuensi penampungan 3 kali per minggu

a) Tahap persiapan

Kandang yang digunakan yaitu kandang baterai dengan model panggung yang terbuat dari bambu dengan ukuran 100 cm × 40 cm × 130 cm untuk memelihara 15 ekor ayam kampung. Kandang di sanitasi 7 hari sebelum memasukkan ayam kedalam kandang.



Gambar 3. Kandang Ayam

b) Tahap pemeliharaan

Ayam pejantan dipelihara selama kurang lebih 3 minggu sebelum semen di tampung dan diberi pakan secara teratur, agar pada saat pengurutan semen yang dihasilkan lebih maksimal.

c) Tahap pemberian pakan

Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari pada pukul 8.00 WITA dan sore hari pada pukul 16.00 WITA . Pemberian air minum dilakukan secara *andlibitum*. Pakan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pakan komersial

siared feed B 214

Tabel 1 . Kandungan Nutrisi Pakan Komersil yang Digunakan pada Penelitian

Kandungan Nutrisi	Komposisi
Kadar Air	Max 13%
Protein	12-14 %
Lemak	Min 3%
Serat	Max 7%
Abu	Max 10%
Kalsium	Min 2 %
Phospor	Min 0,7 %
Lisin	Min 0,7%
Metionin	Min 0,3%
Metionin + sistin	Min 0,5%
Triptofan	Min 0,15%
Afiatoxin total	Max 50 ppb

Sumber: Anging Mammiri *Poultry Shop, Goa*

d) Penampungan semen

Semen dari 15 ekor pejantan ayam kampung dikoleksi per individu dengan menggunakan metode *massage* atau pengurutan pada bagian dorsal atau punggung ayam pejantan. Pada pagihari sebelum penampungan dimulai, bagian belakang ayam sekitar bibir dan bawah kloaka dibersihkan dengan kertas *tissue* yang telah dibasahi dengan NaCl fisiologis. Metode pengurutan menggunakan jemari tangan kanan mengusap punggung sampai pangkal ekor, diteruskan naik sampai ke ekornya. Tangan kanan menggenggam dan sedikit mengangkat pangkal ekor. Perabaan yang dilakukan adalah tekanan tertentu sehingga cairan bening dan diikuti cairan kental putih seperti susu keluar, kemudian ditampung dengan menggunakan tabung skala.

e) Evaluasi spermatozoa

Evaluasi spermatozoa yang diamati yaitu pemeriksaan makroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi warna, bau, volume, konsistensi (kekentalan) dan pH (derajat keasaman) spermatozoa. Sampel yang digunakan sebanyak 15 ekor ayam kampung dengan 3 pengulangan per masing-masing perlakuan

D. Variabel yang Diukur

Menurut Rahayu dkk., (2017), kualitas dari semen dapat diketahui melalui pemeriksaan secara makroskopis. Evaluasi visual makroskopis terdiri dari:

1. Volume Semen

Pada semen ayam kampung yang dihasilkan, setelah dilakukan pemijatan untuk menghasilkan semen, kemudian semen ayam kampung ditampung menggunakan microtube untuk melakukan pengukuran berdasarkan banyaknya semen yang ditampung. Sehingga bisa ditentukan berapa mL semen ayam kampung dalam sekali pemijatan. Volume yang ditampung dengan metode pemijatan akan lebih banyak, jika dibandingkan dengan penampungan semen saat perkawinan alami. Hal ini sesuai dengan pendapat, Parker (1972) yang menyatakan bahwa volume semen pada saat kawin alami adalah 0,35 mL, sedangkan untuk metode pemijatan adalah 0,88 mL.

2. Konsistensi

Konsistensi dengan melihat kekentalan semen pada ayam kampung, yaitu pada saat penampungan semen pada microtube dapat digerakkan untuk melihat kekentalan semen yang sedikit lebih kental dari susu sehingga dapat ditentukan dari melihat apakah semen ayam kampung encer atau kental. Hal ini sesuai

dengan pendapat Zenichiro, dkk (2002) yang menyatakan bahwa semen yang baik derajat kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih kental dari susu, sedangkan yang jelek baik warna maupun kekentalannya sama dengan air kelapa. Sedangkan menurut Sopiyan dkk., (2006) menyatakan bahwa konsistensi diamati dengan melihat kekentalan dari semen ayam. Semen dengan konsistensi kental maka memiliki konsentrasi spermatozoa yang tinggi, sedangkan spermatozoa yang memiliki konsistensi encer maka sperma tersebut memiliki konsentrasi yang rendah. Kemudian ditambahkan oleh.

3. pH

Nilai pH dapat diukur dengan menggunakan kertas pH ataupun pH meter. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kertas pH untuk menentukan derajat keasaman pada semen ayam kampung. Adapun cara yang digunakan yaitu mengambil semen ayam kampung pada *microtube* menggunakan mikropipet kemudian meneteskannya kedalam kertas pH. Pengukuran nilai pH dilakukan untuk mengetahui daya hidup spermatozoa. Hal ini sesuai dengan pendapat, Hardiyanto (1993), pH semen ayam bervariasi antara 8,5–9. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan kertas pH atau lebih teliti lagi diukur dengan pH meter. Derajat Keasaman semen sangat berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. Semakin rendah nilai pH maka spermatozoa yang hidup akan semakin rendah disebabkan oleh produksi asam laktat dan proses metabolisme spermatozoa. Spermatozoa dapat bertahan pada pH terendah dengan kisaran 6,8 (Lake, 1971).



Gambar 4 Kertas pH

4. Warna dan bau

Semen ayam kampung memiliki warna putih pekat dan sedikit yang bening, dan untuk menentukan konsentrasi spermatozoa yaitu dilihat dari warna putih pekat yang menentukan nilai konsentrasi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat, Sopiyan dkk., (2006) yang menyatakan bahwa warna semen berwarna putih bersih dan bening. Warna semen menentukan konsentrasi spermatozoa, apabila spermatozoa berwarna putih pekat maka konsentrasi spermatozoa tinggi, sedangkan apabila semen berwarna bening maka konsentrasinya rendah

Sedangkan bau semen ayam kampung memiliki bau yang khas amis, bau merupakan salah satu kualitas makroskopis spermatozoa.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan *Analysis of Variance* (ANOVA), kemudian jika hasil pengujian menunjukkan perbedaan maka data dianalisis dengan uji lanjutan yaitu dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

keterangan:

Y_{ij} = Hasil observasi perubahan perlakuan ke-i dengan pengulangan ke-j

μ = rata-rata umum

τ_i = pengaruh I (1,2,3,4)

ϵ_{ij} = pengaruh kesalahan percobaan dari pengulangan ke-i dan ke-j (1,2,3,4)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui kualitas makroskopis (volume, konsistensi, pH serta bau dan warna) semen ayam kampung setelah dilakukan penampungan dengan frekuensi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 sebagai berikut :

Tabel 2. Konsistensi, Bau dan Warna Semen Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)

Variabel	Kelompok Perlakuan		
	P0	P1	P2
Konsistensi (kekentalan)	Kental	Kental	Kental
Bau	Amis	Amis	Amis
Warna	Putih susu	Putih susu	Putih susu

Sumber: Laboratorium Processing Semen, Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, 2020

Tabel 3. Volume dan Derajat Keasaman (pH) Semen Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)


Variabel	Kelompok Perlakuan			Nilai P
	P0	P1	P2	
Volume semen (mL)	0.10±	0.12±0.00	0.16±06	0.54
Derajat keasaman (pH)	7.6±00	7.3±42	7.9±37	0.16

Keterangan: P0 (satu kali penampungan per minggu) P1 (dua kali penampungan per minggu) P2 (tiga kali penampungan per minggu)

B. Pembahasan

1. Volume Semen Segar Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)

Volume semen merupakan salah satu faktor untuk melihat kualitas semen secara makroskopis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan perlakuan (P0) satu kali penampungan per minggu, (P1) dua kali penampungan per minggu dan (P2) tiga kali penampungan per minggu, diperoleh hasil yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 5. Volume semen ayam kampung (*Gallus domesticus*)

Gambar 5 menunjukkan, volume semen ayam kampung (*Gallus domesticus*) dengan perlakuan yang berbeda menghasilkan volume yang berbeda-beda. Rataan volume semen pada perlakuan P0, P1 dan P2 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan, rata-rata volume semen ayam kampung (*Gallus domesticus*) pada perlakuan P0 sebanyak 0,10 mL, P1 sebanyak 0,12 mL dan P2 sebanyak 0,16 mL. Hal ini menunjukkan bahwa P2 lebih banyak menghasilkan semen ayam kampung ketika dilakukan penampungan. Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 1) dapat diketahui bahwa frekuensi penampungan semen yang

berbeda tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap volume semen meskipun jarak penampungan antara P0, P1 dan P2 semakin lama menghasilkan volume semen yang meningkat. Menurut Hafez (2008), volume semen ayam kampung dipengaruhi oleh adanya perbedaan bangsa umur, nutrisi pakan, ukuran badan, frekuensi penampungan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini sesuai dengan Kartasudjana (2001), volume semen dari tiap-tiap ternak yang dihasilkan dalam satu hari berbeda-beda. Ditambahkan oleh Pratama (2011), volume semen yang dihasilkan rendah diduga karena ayam belum terbiasa dikoleksi semennya, terlihat bahwa tiga minggu pertama volume semen yang dihasilkan sangat rendah dari ketiga perlakuan, namun setelah minggu ketiga terlihat bahwa volume semen yang dihasilkan terus meningkat sampai minggu ke enam. Peningkatan volume semen ini dapat disebabkan karena seiring bertambahnya waktu, ayam semakin terlatih untuk dikoleksi semennya.

Volume semen pada setiap kali penampungan menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. Pada penampungan pertama (P0), rata-rata volume semen yang dihasilkan sekitar 0,10 mL, penampungan kedua (P1) sekitar 0,12 mL dan penampungan ketiga (P2) sekitar 0,16 mL. Hal ini terjadi karena ayam yang digunakan yakni ayam kampung pejantan muda yang baru pertama kali diambil semennya dan belum pernah dikawinkan secara alami. Rataan volume yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan penelitian Hijriyanto dkk., (2017), menggunakan ayam bangkok dengan penampungan semen satu kali per minggu menghasilkan volume semen sekitar 0,167 ml. Volume semen yang dihasilkan tergantung dari spesies, umur dan teknik pemijatan. Hal ini didukung oleh Woli dkk., (2017), bahwa volume semen ayam Kampung dipengaruhi karena adanya perbedaan bangsa, umur, nutrisi pakan, ukuran badan, frekuensi penampungan

serta faktor-faktor lainnya.

Hal yang mempengaruhi sehingga volume semen segar ayam kampung tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas makroskopis yakni dapat disebabkan oleh kondisi fisiologis normal proses spermatogenesis yang terjadi dan respon yang diberikan ayam pada saat dilakukan teknik *massage* selama koleksi semen (Tarif *et al.*, 2013). Kemudian ditambahkan oleh Donoghue *et al.*, (2000) menyatakan bahwa, volume semen bergantung pada bangsa, individu, umur, pencahayaan, musim dan faktor lingkungan lainnya serta bobot ayam juga dapat mempengaruhi volume semen.

2. Konsistensi Semen Segar Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)

Konsistensi merupakan indikator untuk melihat kekentalan semen termasuk semen ayam kampung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan perlakuan (P0) satu kali penampungan per minggu, (P1) dua kali penampungan per minggu dan (P2) tiga kali penampungan per minggu

Tabel 2 menunjukkan, konsistensi semen ayam kampung (*Gallus domesticus*) yang diperoleh hasil mulai dari P0, P1 dan P2 berturut-turut rata-rata kental. Hal ini menunjukkan, bahwa semen ayam kampung yang telah ditampung masih dalam taraf normal atau baik yang diduga konsentrasi spermanya tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahayu dkk., (2017) menyatakan, bahwa kekentalan merupakan salah satu sifat semen yang memiliki kaitan dengan kepadatan/konsentrasi sperma di dalamnya. Semakin kental sperma maka semakin tinggi pula konsentrasi spermanya. Woli dkk., (2017) mendukung, bahwa konsistensi semen yang kental menunjukkan bahwa semen masih dalam taraf normal dikarenakan kekentalan semen lebih kental dari susu. Ditambah oleh Zenichiro dkk., (2002), bahwa semen yang baik derajat kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih kental dari susu, sedangkan yang jelek baik warna maupun

kekentalannya sama dengan air kelapa. Ditambahkan oleh Pratama (2011) bahwa konsistensi semen antara ayam dengan penampungan semen satu kali, dua kali, dan tiga kali per minggu adalah sama, yaitu dengan konsistensi kental. Selain dari itu Lubis dkk., (2012), konsistensi atau derajat kekentalan dilakukan pada tempat yang terang, dengan cara tabung dimiringkan dan beberapa saat kemudian ditegakkan kembali. Jika semen yang menempel pada bagian tabung turun perlahan-lahan setelah tabung ditegakkan kembali menandakan bahwa semen tersebut mempunyai konsistensi yang kental.

3. Warna dan Bau Semen Ayam Kampung (*Gallus domesticus*)


Warna dan bau semen ayam memiliki karakteristik tersendiri. Warna pada semen ayam kampung setelah dilakukan penampungan dapat dilihat pada Tabel 2. Rataan warna semen setelah penampungan dari P0, P1 dan P2 memiliki warna yang putih susu hal ini menunjukkan bahwa warna tersebut tergolong normal dan berarti konsistensi semen kental. Hal ini sesuai dengan penelitian Woli dkk., (2017) menyatakan, bahwa semen ayam kampung berwarna putih, semen dapat dikatakan normal dikarenakan tidak ada campuran kemerahan dan warna coklat yang menandakan semen terkontaminasi darah. Warna semen segar ayam kampung yang normal adalah putih kental. Hal ini dibenarkan oleh pendapat Sopiyan dkk., (2006). Warna semen menentukan konsentrasi spermatozoa, apabila spermatozoa berwarna putih pekat maka konsentrasi spermatozoa tinggi, sedangkan semen berwarna bening maka memiliki konsentrasi rendah. Didukung pula oleh pendapat Malik *et al.*, (2013). semen ayam berwarna putih pekat dengan konsistensi kental dan hanya sebagian kecil bening dengan konsistensi encer. Ditambahkan oleh Pratama (2011), bahwa semen ayam Arab dengan penampungan semen satu kali, dua kali dan tiga kali per minggu menghasilkan warna putih susu. Kartasudjana (2001) menyatakan,

bahwa bila semen berwarna kemerahan adalah tanda bahwa semen terkontaminasi oleh darah segar, sedang apabila warnanya mendekati coklat dapat merupakan tanda bahwa darah yang mengkontaminasi semen sudah mengalami dekomposisi. Warna kehijauan merupakan tanda adanya bakteri pembusuk dalam semen. Variasi warna semen bisa terjadi antar pejantan dan pada pejantan yang sama dari semen hasil ejakulasi yang berbeda.

Adapun bau yang dihasilkan setelah penampungan semen ayam kampung dengan frekuensi yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa rata-rata bau yang diperoleh baik dari P0, P1 dan P2 yaitu berbau amis yang berarti bau khas dari semen ayam itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratama (2011), bahwa bau semen yang pada ayam memiliki bau khas sperma yaitu berbau amis khas sperma dan disertai bau dari hewan itu sendiri. Kharisudin, (2000) Bau merupakan salah satu kualitas makroskopis spermatozoa. evaluasi makroskopis bau spermatozoa ayam yaitu memiliki bau amis. Bau busuk bisa terjadi apabila semen mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi organ atau saluran reproduksi hewan jantan (Woli dkk 2017). Hal ini sesuai dengan Kartasudjana (2001) yang mengemukakan bahwa semen yang normal umumnya memiliki bau amis khas disertai bau dari hewan itu sendiri

4. Derajat Keasaman (pH) Semen Ayam Kampung

Pada tabel 3 menunjukkan, derajat keasaman diperoleh dengan rata-rata 7 yang menandakan pH ayam kampung setelah dilakukan penampungan baik dari P0, P1 dan P2 ialah normal. Berdasarkan analisis sidik ragam (*Lampiran 2*) menunjukkan, bahwa frekuensi yang berbeda terhadap penampungan semen tidak berpengaruh nyata terhadap pH ayam kampung.



Gambar 6. Derajat Keasaman (pH) Semen

Derajat keasaman (pH) dilakukan dengan cara mencelupkan kertas pH kedalam tabung penampungan semen. pH pada semen ayam kate (*Gallus bantam*) yaitu diperoleh dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan rata-rata Derajat keasaman (pH) semen segar pada perlakuan P0 sebesar 7,6, P1 sebesar 7,3, dan P2 sebesar 7,9. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Hardianto (1993), yang menyatakan bahwa pH semen ayam bervariasi antara 8,5-9. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan kertas pH atau lebih teliti lagi diukur dengan pH meter. Derajat Keasaman semen sangat berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoa. Semakin rendah nilai pH maka spermatozoa yang hidup akan semakin rendah disebabkan oleh produksi asam laktat dan proses metabolisme spermatozoa. Spermatozoa dapat bertahan pada pH terendah dengan kisaran 6,8 (Lake, 1971). Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasudjana (2001) menyatakan, bahwa pH 7 pada semen ayam kampung termasuk pada kisaran pH netral, hal ini masih sesuai bahwa derajat keasaman semen yang pada umumnya pada kisaran pH netral, hal ini masih sesuai dengan Kartasudjana (2001) bahwa derajat keasaman semen yang pada umumnya pada kisaran pH netral Menurut penelitian Pratama (2011). Nilai pH semen yang didapatkan dalam penelitian ini antara ketiga perlakuan relatif sama yaitu berkisar antara 6,8 – 7,1. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nilai pH semen

yang rendah dapat diakibatkan oleh suhu tinggi ketika penyimpanan semen selama perjalanan dari kandang menuju laboratorium pengamatan.

Menurut Johari dkk., (2009) bahwa pH sperma ayam pejantan bervariasi antara 8,5-9. pH sperma ayam pejantan dipengaruhi oleh asam laktat yang dihasilkan dari proses metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerobik. Penimbunan asam laktat maka dapat meningkatkan atau menurunkan pH larutan tersebut.

Hal yang mempengaruhi sehingga derajat keasaman (pH) tidak memberikan pengaruh nyata pada kualitas makroskopis semen ayam kampung yakni adanya proses metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerobik. Hasil akhir dari proses metabolisme spermatozoa tersebut berupa asam laktat. Semakin tinggi asam laktat yang dihasilkan sehingga semakin besar pula penimbunan yang pada akhirnya dapat menyebabkan meningkat ataupun menurunnya derajat keasaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada frekuensi penampungan 1, 2 dan 3 kali dalam seminggu tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas makroskopis semen ayam kampung seperti volume semen yang dihasilkan normal, konsistensi kental, pH normal serta warna putih susu dan bau khas (berbau amis)

B. Saran

Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan beberapa spesies ayam yang berbeda untuk membandingkan kualitas semen setelah dilakukan penampungan semen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. 1990. Indigenous chicken production in South-East Asia. *World's Poultry Science Journal*, 46: 51-57.
- Almahdi, A. B., Ondho, Y.S., and Sutopo. 2014. Comparative Studies of Semen Quality on Different Breed of Chicken in Poultry Breeding Center Temanggung-Central Java. *Journal of Engineering and Science*, 3(2): 94-103.
- Al-Mubarakfuri. 2010. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir. Hal 73-74.
- Ashdown, R.R., and Hancock, J.L. 1980. *Functional Anatomi of Male Reproduction*. In : E.S.E. Hafez (Ed). *Reproduction In Farm Animal*. 4th Ed. Lea and Febiger, Philadelphia. Pp 7-29.
- Bahr, J.M. and Bakst, M.R. 1987. Poultry. In : E.S.E. Hafez (Ed). *Reproduction in Farm Animal*. 6th Ed. Lea and Febiger, Philadelphia. Pp 375-379.
- Crawford, R.D. 1990. Origin and history of poultry species, Pages 1-41, In: *Poultry Breeding and Genetics*, R.D. Crawford (ed.). Elsevier. Amsterdam.
- Danang, D.R., Isnaini. N. dan Trisunuwati. P. 2012. Pengaruh Lama Simpan Semen terhadap Kualitas Spermatozoa Ayam Kampung Dalam Pengencer Ringer's Pada Suhu 40°C. *Ternak Tropika. Jurnal*, 13(1): 47-57..
- Darwati. 2000. Produktivitas Ayam Kampung, Pelung dan Resiprokalnya. *Jurnal penelitian*, 3(4): 259-265
- Dellmann, H.D. and Brown, E.M. 1992. *Histologi Veteriner*. Edisi ke-3. Hartono, R. Penerjemah. Jakarta: UI Press. Terjemahan dari: Text book of veterinery histology.
- Donoghue. A.M., and Wishart, G.J. 2000. *Storage of Poultry Semen*. *Animal Reproductive Science*, 62: 213-232
- Ensminger, M.E 1992. *Poultry Science (Animal Agriculture Series)*. Interstate Publisher, Inc. Danville, Illinois.
- Etches, R. J. 1996. *Reproduction In Poultry*. University Press, Cambridge.
- Gilbert, A. B. 1980. Poultry. In : E.S.E. Hafez (Ed). *Reproduction in farm animals*. 4 th Ed. Lea and Febiger, Philadelphia. Pp 423-446.
- Hafez, E. S. E. 2000. *Reproduction in Farm Animals*. (7th ed) Kiawah Island, south Carolina, USA.
- Hafez, E.S.E. 2008. *Preservation and Cryopreservation of Gametes and Embryos*. In: *Reproduction in Farm Animals*. Hafez, E.S.E. 7th ed. Lippincott

- Williams and Wilkins. Awollers Kluwer Company. Philadelphia: 431-442.
- Hambu, E.K. 2016. Korelasi ukuran testis dengan bobot badan dan konsentrasi spermatozoa pada tiga jenis ayam lokal. Bogor agrikultural
- Hardiyanto. 1993. Pengaruh Semen Ayam Segar Maupun Setelah Diencerkan ... Disimpan Melalui Inseminasi Buatan terhadap Fertilitas dan Kematian Embrio Telur Ayam Kampung. *J. Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*. 3 (4) : 47- 56.
- Hijriyanto, M., Dasrul, dan Thasmi, C. N. 2017. Pengaruh Frekuensi Penampungan Semen Terhadap Kualitas Spermatozoa pada Ayam Bangkok. *Jimvet*, 01(1), 46–53.
- Ichinoe, K. 1982. Introduction. In: Ichinoe (Ed.) *Physiological and Ecological Studies on Jungle Fowls*. Tokyo University of Agriculture. pp. 3-8.
- Ihsan, N. M., 2009. *Bioteknologi Reproduksi Ternak*. Universitas Brawijaya. Malang, 13(1): 47-57
- Indrawati, D., Bebas, W., dan Trilaksana, I. G. N. B. 2013. Motilitas dan Daya Hidup Spermatozoa Ayam Kampung dengan Penambahan Astaxanthin pada Suhu 3–50 C. *Indonesia Medicus Veterinus*, 2(4):445–452.
- Iskandar, S., Kateran, P., Sopiñana, S dan Sudarman, D. 2010. *Usaha Tani Ayam Kampung*. Balai penelitian ternak Ciawi. Bogor.
- Iskandar, S dan Susanti, T. 2007. Karakter dan Manfaat Ayam Peluang di Indonesia *Wartazoa*, 17(3): 128-136.
- Jalaluddin Imam, A.M damn Jalaluddin Imam, A.S. 2010. *Terjemahan Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung
- Johari, S., Ondho, Y. S., Wuwuh, S., Henry, Y. B dan Ratnaningrum. 2009. *Karakteristik dan Kualitas Semen Berbagai Galur Ayam Kedu*. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Diseminarkan dalam Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Semarang.
- Junianto, L., B. Sutiono dan Kismiati, S. 2002. Pengaruh Pengenceran Semen dengan Berbagai Kuning Telur Unggas Terhadap Motilitas dan Daya Hidup Sperma Ayam Kampung. *J. Tropis Animal Development*, 27 (1) : 30-35.
- Kartasudjana. R 2001. Teknik Inseminasi Buatan Pada Ternak. Modul Program Keahlian Pada Ternak Depertemen Pendidikan Nasional Pada Proyek Pengolaan Sistem Standar. Direktorat Pendidikan Jakarta.

- Kementerian Agama RI. 2012. *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Khairi, F. 2016. Evaluasi Produksi dan Kualitas Semen Sapi Simmental Terhadap Tingkat Bobot Badan Berbeda. *Jurnal Peternakan*, 13(2): 54-58.
- Kharisudin. 2000. Pengaruh Kombinasi Beberapa Bahan Pengencer dan Kuning Telur terhadap Mutilitas Spermatozoa Ayam Buras Secara *In-vitro*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
- Kharuddin. 2015. Kualitas dan Fertilitas Spermatozoa Ayam Lokal dalam Pengencer Semen yang Disuplementasi Monosakarida dan Minyak Zaitun. Skripsi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lake, P.E. 1971. *The Male in reproduction*. In : D.J. Bell and B.M. Freeman (Ed). *Physiology and Biochemistry of Domestic Fowl*. Academic Press, London. Pp : 246-267.
- Lubis, T.M, Dasrul, Hamdan dan Fauziah. 2012. Efek Suplementasi Enervon-C dan Santa-e dalam Pakan Terhadap Motilitas Spermatozoa Ayam Kampung. *Jurnal Agripet*, 12(1):34-40.
- Malik, A., Haron, AW., Yusoff, R., Nesa, M., Bukar, M., Kasim, A. 2013. Evaluation of the ejaculate quality of the red jungle fowl, domestic chicken, and bantam chicken in Malaysia. *Turk J Vet Anim Sci*, 37:564-568.
- Mulyono, R.H.T., Sartika dan Nugraha, R.D. 2009. A Study of Morphometric Phenotypic Characteristic of Indonesia Chicken: Kampung, Sentul dan Wareng-Tangerang, Based on Discriminant Analysis Wald Anderson Criteria and Mahalanobis Minimum Distance. *The 1st International Seminar on Animal Industry Faculty of Animal Science*. Bogor Agricultural University. Bogor.
- Nalbandov, A. V. 1990. *Fisiologi Reproduksi Pada Mamalia dan Unggas*. Terjemahan: Srigandono, B. dan Praseno. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nobrega, R.H., Batlouni, S.R., and Franca, L.R. 2009. An overview of functional and stereological evaluation of spermatogenesis and germ cell transplantation in fish. *Fish Physiol. Biochem*, 35:197-206.
- Ogawa, T., Arechaga, J.M., Avarbock, M.R., and Brinster, R.L. 1997. Transplantation of testis germinal cells into mouse seminiferous tubules. *International Journal Development Biology*, 41:111 – 122,
- Parker, J. E., 1972. *Reproductive Physiologi In Poultry*. In : E. S. E. Hafez (Ed). *Reproduction in Farm Animals*. 2nd Ed. Lea and Febiger, Philadelphia.

- Partodihardjo, S. 1982. Ilmu Reproduksi Hewan. Mutiara, Jakarta.
- Pratama, G. S. 2011. Karakteristik Semen Ayam Arab pada Frekuensi Penampungan yang Berbeda. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Prasetyaningtias, W.E. 2001. Studi Histokimia lektin pada Distribusi Glikokonjugat di Epitel Tubuli Seminiferi Testis Babi Rusa Babyrousa Babyrusa. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.
- Prawirokusumo, S. 1978. Problem to improve small scale native chickens management in South-East Asia countries. Proceeding XIII World's Poultry Congress. Japan. pp. 113- 117.
- Purwanti,M., Soriah, I. Krisna, A., Wahyuningsih, R. 2006. Performansi Mutu Ayam Buras Pedaging Hasil Persilangan Ayam Pelung Jantan dengan Ayam Lokal Betina. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 1(1):11-14.
- Rahayu, A., L. P. Wisnu, P.S. Nurkhaffah, A. Fauziyah, dan Annisa, D. N. (2017). Evaluasi Kualitas Spermatozoa Ayam Kampung (*Gallus domesticus*) Setelah Penambahan Pakan Ayam Rempah-Rempah Alami. *Seminar Nasional Peternakan 3*. Universitas Hasanuddin Makassar, 18 September.
- Rosy Qoti, N. 2001. Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Semen Ayam Kampung. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sartika, T., Wati, D. K., Rahayu, H. S. I dan Iskandar, S. 2008. Perbandingan Genetik Eksternal Ayam Wareng dan Ayam Kampung yang dilihat dari Laju Introgresi dan Variabilitas Genetiknya. *JITV*, 13(4): 279-287.
- Sarwono, B. 1993. *Ragam Ayam Piaraan*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sastrodihardjo, MS, Resnawati, MS.1999. *Inseminasi Buatan Ayam Buras*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sastrodiharjo, S. dan H. Resnawati. 2003. Inseminasi Ayam Buras Meningkatkan Produksi Telur Mendukung Pengadaan DOC Unggul. Penebar Swadaya, Yogyakarta.
- Setijanto, H. 1998. Anatomi Unggas. Bahan Pengajaran Anatomi Veteriner II. Laboratorium Anatomi, Bagian Anatomi. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Srigandono, B. 1997. *Produksi Ungga Air*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Solihati, N., Idi, R., Setiawan, R., Asmara, I.Y. dan Sujana, B. I., 2006. Pengaruh Lama Penyimpanan Semen Cair Ayam Buras pada Suhu 5 °C terhadap

- Periode Fertil dan Fertilitas Sperma. *Jurna, Ilmu Ternak*, 6 (1) : 7-11.
- Sopi yana, S. 2006. Analisis Penerapan Aspek Teknis Peternakan pada Berbagai Skala Usaha Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Animal Production*, 8 (3):216-225.
- Sotiyono. 2001. Pengenalan Organ Reproduksi Ayam. Kerjasama antara PT. PERHUTANI (PERSEPRO), KPH Kendal dengan Forum Kelompok Sumber Daya Alam Jawa Tengah Pelestari. Semarang.
- Supriatna, I. 2000. Inseminasi Buatan pada Ayam. Kegiatan Pelatihan Inseminasi Buatan pada Ayam. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suprijatna, E., U. Atmos Marsono dan Kartasudadjana, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Cetakan 1. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Susilawati, 2011. *Spermatologi.. Elektronik Permtama dan Terbesar di Indonesia*. Malang.
- Tarif, A.M., Uddi Bhuiyan, M.M., Ferdousy, R.N., Juyena, N.S., and Mollah, B.R. 2013. *Evaluation of semen quality among four chicken lines*, *J Agri*, 6:7-13.
- Toelihere, M. R. 1985. Fisiologi Reproduksi pada Ternak. Angkasa, Bandung.
- Toelihere, M. R. 1993. Inseminasi Buatan pada Ternak. Angkasa, Bandung.
- Tomaszewska., K. Utama. G. Putu dan Chaniago, D. 1991. *Reproduksi, Tingkah Laku dan Tenak di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Widhyari, S. D., Esfandiari, A. Wijaya, A. Wulansari, R. Widodo, S., Maylina. L. 2015. Tinjauan Penambahan Mineral Zn dalam Pakan Terhadap Kualitas Spermatozoa pada Sapi Frisian Holstein Jantan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20 (1): 72 – 77.
- Woli, S. L., Kusumawati, E. D. dan Krisnaningsih, A. T. N. 2017. Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Ayam Kampung pada Suhu 5⁰C Menggunakan Pengencer dan Lama Simpan yang Berbeda. *Jurnal Sains Peternakan*, 5(2): 138-144.
- Yudi., Arifiantini, I., Purwantara, B. dan Yusuf, T. L. 2007. Karakteristik Semen Segar dan Kualitas Semen Cair Kuda dalam Pengencer Dimitropoulos yang Disuplementasi dengan Fruktosa, Trehalosa dan Rafinosa. *Media Peternakan*, 30(3): 163-172.
- Yuwanta, T. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Kanisius, Yogyakarta.

Zenichiro, K., Herliantien dan Sarastina. 2002. Teknologi Prosesing Semen Beku Pada Sapi. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Malang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Volume semen

Descriptives

Volume Semen (mL)

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P0	1	.100010	.10
P1	2	.1200	.00000	.00000	.1200	.1200	.12	.12
P2	3	.1600	.06000	.03464	.0110	.3090	.10	.22
Total	6	.1367	.04633	.01892	.0880	.1853	.10	.22

Test of Homogeneity of Variances

Volume Semen (mL)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.400 ^a	1	3	.219

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Volume Semen (mL).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL AUDDIN

ANOVA

Volume Semen (mL)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.004	2	.002	.736	.549
Within Groups	.007	3	.002		
Total	.011	5			

Lampiran 2. pH Semen

Descriptives

Sampel

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P0	1	7.600	7.6	7.6
P1	2	7.300	.4243	.3000	3.488	11.112	7.0	7.6
P2	3	7.933	.1155	.0667	7.646	8.220	7.8	8.0
Total	6	7.667	.3724	.1520	7.276	8.057	7.0	8.0

Test of Homogeneity of Variances

Sampel

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
54.150 ^a	1	3	.005

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Sampel.



ANOVA

Sampel

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.487	2	.243	3.532	.163
Within Groups	.207	3	.069		
Total	.693	5			

Gambar penelitian

1. Proses penampungan semen



2. Proses penimbangan ayam kampung



3. Cool boxes




4. Timbangan



5. Kandang ayam






SEARCH RESULTS

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

Pembimbing I

 (A)

Dr. Muhammad NurHidayat, S.Pt., M.P.
NIP: 197509092009121001

Pembimbing II

Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.
NIP: 197308282006042001


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh Anugrah Ahmad
 NIM : 60700116018
 Jurusan : Ilmu Peternakan
 Judul Skripsi : Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (Gallus Domesticus)
 Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.

No	Hari/tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	10 Mei 2020	Konsultasi Judul		
2	15 Mei 2020	Konsultasi 1: Bab 1,2 (Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka)		
3	2 Juni-4 Juni 2020	Konsultasi 2: Perbaikan Bab 1,2,3.		
4	17 Juni 2020	Persiapan Seminar Proposal		
5	21 September 2020	Revisi Proposal Berdasarkan Saran-Saran Penguji Di Seminar		
6	1 Desember 2020	Analisis Data Penelitian dan Interpretasinya		
7	5 Januari 2020	Konsultasi 1: Hasil Pembahasan, Tabel Hasil		
8	18 Januari 2021	Konsultasi 2: Hasil, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka		
9	27 Januari 2021	Persiapan Seminar Hasil Penelitian		
10	2 Februari 2021	Revisi Laporan Seminar Penelitian Berdasarkan Saran-Saran Penguji Di Seminar		
11	16 Februari 2021	Skripsi Lengkap		

Samata 22 Februari 2021

Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


 Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
 NIP.19750909 200912 1 001

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh Anugrah Ahmad
 NIM : 60700116018
 Jurusan : Ilmu Peternakan
 Judul Skripsi : Pengaruh Frekuensi Penampungan Terhadap Kualitas Makroskopis Semen Ayam Kampung (Gallus Domesticus)
 Pembimbing 2 : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.

No	Hari/tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	10 Mei 2020	Konsultasi Judul		
2	13 Mei 2020	Konsultasi 1: Bab 1,2 (Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka)		
3	28 Mei 2020	Konsultasi 2: Perbaikan Bab 1,2,3.		
4	17 Juni 2020	Persiapan Seminar Proposal		
5	19 September 2020	Revisi Proposal Berdasarkan Saran-Saran Penguji Di Seminar		
6	29 September 2020	Analisis Data Penelitian dan Interpresentasinya		
7	3 Januari 2021	Konsultasi 1: Hasil Pembahasan, Tabel Hasil		
8	15 Januari 2021	Konsultasi 2: Hasil, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka		
9	27 Januari 2021	Persiapan Seminar Hasil Penelitian		
10	2 Februari 2021	Revisi Laporan Seminar Penelitian Berdasarkan Saran-Saran Penguji Di Seminar		
11	16 Februari 2021	Skripsi Lengkap		

Samata 22 Februari 2021

Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
 NIP.19750909 200912 1 001



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2810 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan ILMU PETERNAKAN Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **MUH. ANUGRAH AHMAD** NIM : 60700116018 tertanggal 31 October 2019 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Konsentrasi Penampungan Terhadap Motilitas Semen Ayam Kampung"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/RMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag, Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Dr. Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Khaerani Kiramang, S.Pt. MP.** sebagai Pembimbing Kedua,
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 31 October 2019

Dekan,
Kuasa No. B.4138/Un.06/FST/Kp.07.6/10/2019
Tanggal 28 Oktober 2019

Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
NIP. 19720203 200604 2 001

BIOGRAFI



Muh. anugrah ahmad di lahirkan di Ujung pandang suawesi selatan, pada tanggal 09 juli 1998. Anak ke-4 dari 5 bersaudara hasil buah kasih dari pasangan Drs Ahmad G dan Erniwati. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar SD Negeri 58 Tanete dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 14 Bulukumba dan lulus pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Bulukumba dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam (UIN) Alauddin Makassar kejenjang S1 pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi, sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R