

**HUBUNGAN ANTARA PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN
DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH
DI RSUD H. PADJONGA DG NGALLE TAKALAR
TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

NUR INTAN CAHYANI

NIM: 70600117049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2021**

M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Intan Cahyani
NIM : 70600117049
Tempat/Tgl Lahir : Takalar/04 Juni 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN. Bombong Indah Blok C3/1
Judul : Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 18 Agustus 2021

ALAUDDIN

Penyusun

M A K A S S Nur Intan Cahyani
NIM:70600117049

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL: HUBUNGAN ANTARA PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA KEDOKTERAN

MAKASSAR, 28 JUNI 2021

PEMBIMBING 1



(dr. Andi Alifia Ayu Daima, M.Kes)

PEMBIMBING 2



(dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar Tahun 2019", yang disusun oleh Nur Intan Cahyani, NIM 70600117049, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang di selenggarakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran .

Makassar, 18 Agustus 2021

9 Muharram 1443 H

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes

(.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes

(.....)

Pembimbing I : dr. Andi Allfia Ayu Delima, M.Kes

(.....)

Pembimbing II : dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR

(.....)

Penguji I : Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Qadlr Gassing, MS

(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)”**, salam serta shalawat tiada henti dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu menyadari akan adanya tantangan dan hambatan yang dilalui. Semua hal itu dapat dilalui tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi secara terus-menerus. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Irwan, SKM. M.Si dan ibunda Suharnati, atas setiap do'a dan dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada peneliti, serta atas semua bantuan dan dukungan selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhanis, M.A.,Phd. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Rini Fitriani,M.Kes selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah.
4. dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes selaku dosen pembimbing I dan dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan motivasi kepada penulis.
5. Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes. selaku penguji I dan Prof. Dr. H. Qadir Gassing, M.S. selaku penguji II atas kritik, saran arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya yang bermanfaat.

6. Kepada para staf tata usaha dan staf rekam medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar.
7. Kepada saudara(i) kandung dan sepupu tercinta yang selalu siap mendampingi.
8. Kepada seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan banyak masukan yang positif, semangat, motivasi dan setia mendengar keluh kesah peneliti.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Muaffikah Putri, S.Ked., Vivi Aprillia Fadila, Andi Ayu Novitasari, Andi Dian Hajriana yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman EU2TACHIUS yang telah memberi semangat dan saran-saran yang positif kepada peneliti.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat dinilai ibadah disisi Allah SWT, Aamiin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, Juni 2021

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nur Intan Cahyani

NIM: 70600117049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Berat Lahir Rendah.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perokok Pasif dan BBLR.....	28
D. Tinjauan Umum Faktor Risiko BBLR.....	29
E. Kerangka Teori.....	31
F. Kerangka Konsep.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33

B. Populasi dan Sampel.....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
D. Variabel Penelitian.....	34
E. Pengumpulan Data dan Cara Penelitian.....	34
F. Pengelolaan Data.....	34
G. Analisis Data.....	35
H. Etika Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil.....	37
B. Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Defnisi Operasional.....	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur.....	37
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Pekerjaan.....	38
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status ANC.....	38
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Bayi Berat Badan Lahir Rendah.....	39
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Data Berdasarkan Status Perokok Pasif.....	39
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Hubungan Lingkungan Ibu Hamil Yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok dengan BBLR.....	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Hubungan Asal Utama Paparan Asap Rokok di Dalam Rumah dengan BBLR.....	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Hubungan Asal Utama Paparan Asap Rokok di Lingkungan Luar Rumah dengan BBLR.....	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Hubungan Ibu Hamil Yang Terpapar Asap Rokok Dalam Satu Minggu dengan BBLR.....	44
Tabel 4.11 Hasil Uji Hubungan Waktu Ibu Hamil Terpapar Asap Rokok Dalam Satu Hari Dengan BBLR.....	45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	31
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	32



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 2. Lembar Persetujuan Informed Consent

Lampiran 3. Lembar Identitas Responden Penelitian

Lampiran 4. Lembar Kuesioner Perokok Pasif

Lampiran 5. Lembar Observasi Bayi Berat Lahir Rendah

Lampiran 6. SPSS

Lampiran 7. Persuratan

Lampiran 8. Riwayat Hidup Penulis



Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar Tahun 2019

*Nur Intan Cahyani(1), Andi Alifia Ayu Delima(2), Rahadi Arie Hartoko(3),
Rosdianah Rahim(4), Qadir Gaasing(5)*

*Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Abstrak

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah berat bayi saat lahir kurang dari 2500 gram. Bayi berat lahir rendah (BBLR) menjadi penyebab tidak langsung dan berkontribusi sekitar 60% hingga 80% dari semua kematian neonatal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi determinan terjadinya BBLR diantaranya adalah faktor demografi ibu seperti usia ibu, riwayat aborsi dan gaya hidup, pelayanan kesehatan, lingkungan, pekerjaan kebisingan kekerasan, dan trauma ibu. Selain itu terdapat faktor gizi, termasuk asupan protein, zat besi, dan beberapa mikronutrien dan faktor infeksi, termasuk infeksi saluran kemih, vaginosis bakteri, serta penyakit infeksi lainnya selama masa kehamilan. Salah satu faktor penting diantara multifaktor tersebut adalah paparan pralahir terhadap rokok yang berasal dari pasangan atau lingkungan pada ibu hamil (perokok pasif) yang memberikan efek yang kurang baik bagi ibu maupun janinnya. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perokok pasif dalam kehamilan dengan BBLR di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Descriptive correlation* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelasi antara variabel dengan desain pendekatan *retrospektif*, di mana penelitian ini berusaha melihat kebelakang (*Backward looking*). populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan bayi di ruang bersalin di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar dengan jumlah 139 orang ibu yang melahirkan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Sampel penelitian ini berjumlah 60 sampel dan hasilnya diolah menggunakan SPSS dengan uji *Chi square*. Pada penelitian ini diperoleh nilai p 0,021 ($<0,05$) untuk variabel lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok dengan BBLR. Nilai p 0,021 ($<0,05$) untuk variabel asal utama paparan asap rokok di dalam rumah dengan BBLR. Nilai p 0,003 ($<0,05$) untuk variabel asal utama paparan asap rokok di lingkungan luar rumah dengan BBLR. Nilai p 0,019 ($<0,05$) untuk variabel ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu dengan BBLR. Nilai p 0,044 ($<0,05$) untuk variabel frekuensi waktu ibu hamil terpapar asap rokok dalam satu hari dengan BBLR. Maksud dari nilai tersebut adalah adanya hubungan yang signifikan antara perokok pasif pada kehamilan dengan bayi berat lahir rendah.

Kata kunci : Perokok pasif pada kehamilan, BBLR, Usia Ibu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah berat bayi saat lahir kurang dari 2500 gram. Bayi berat lahir rendah (BBLR) menjadi penyebab tidak langsung dan berkontribusi sekitar 60% hingga 80% dari semua kematian neonatal. Prevalensi BBLR global adalah 15,5%, yang berjumlah sekitar 20 juta bayi BBLR yang lahir setiap tahun. Sebanyak 96,5 % di antaranya di negara berkembang (WHO, 2018).

Prevalensi BBLR rendah di dunia adalah 15% dan negara-negara berkembang 13%. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Di Indonesia itu sendiri penyebab langsung kematian bayi disebabkan oleh asfiksia (44-46%), BBLR (15-20%), infeksi (24-25%), trauma persalinan (2-7%), dan cacat bawaan (1-3%). Menurut Profil Kabupaten/Kota tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menunjukkan jumlah bayi lahir hidup sebesar 148.7140, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 123.702 dengan jumlah BBLR yaitu 5.299 kasus (4,28%). Dan tertinggi di Kota Makassar sebesar 690 kasus, Kab. Gowa (342 kasus), Kab. Luwu (288 kasus) dan kasus terendah di Kab. Barru (27 kasus), Kab. Bantaeng (47 kasus) dan Kab. Tana Toraja (65 kasus), Adapun pola penyebab kematian bayi (neonatal dan postneonatal) di Kabupaten Takalar dari tahun 2010-2015 terbanyak disebabkan karena BBLR yaitu 33 kasus (WHO, 2014; DINKES SULSEL, 2017).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi determinan terjadinya BBLR diantaranya adalah faktor demografi ibu seperti usia ibu, riwayat aborsi dan gaya hidup, pelayanan kesehatan, lingkungan, pekerjaan kebisingan kekerasan, dan trauma ibu. Selain itu terdapat faktor gizi, termasuk asupan protein, zat besi, dan beberapa mikronutrien dan faktor infeksi, termasuk infeksi saluran kemih, vaginosis bakteri, serta penyakit infeksi lainnya selama masa kehamilan. Salah satu faktor penting diantara multifaktor tersebut adalah paparan pralahir terhadap rokok yang berasal dari pasangan atau lingkungan pada ibu hamil (perokok pasif) yang memberikan efek yang kurang baik bagi ibu maupun janinnya (Ohlsson *et al.*, 2008).

Paparan terhadap asap rokok pada kehamilan juga dikaitkan dengan risiko sekitar sekitar 22% bayi akan lahir dengan berat lahir rendah (<2500 g). Seperti yang dilaporkan oleh *The Tobacco Atlas and Global Adult Tobacco Survey* (GATS) di Indonesia, prevalensi laki-laki yang merokok sekitar 67% dan prevalensi perokok pasif yang terpapar asap rokok di rumah sekitar 78,4%, sementara itu prevalensi BBLR di Indonesia berdasarkan riskesdas 2013 sekitar 10,2% (WHO, 2013; TCSC, 2010).

Hasil penelitian dari lain dari BMA *TobaccoControl Resource Centre* melaporkan bahwa asap rokok selama kehamilan berisiko melahirkan BBLR sekitar 1,5-9,9 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak terpapar asap rokok (Lestari, 2015).

Paparan asap rokok terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi merupakan masalah yang cukup sulit dihindari di Negara berkembang seperti di Indonesia. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan para perokok tetapi juga berdampak bagi orang yang menghirup asap rokok tersebut (perokok pasif), seperti gangguan kehamilan, BBLR, sampai dengan kematian bayi. Saat ibu hamil merokok ataupun sebagai perokok pasif yang terpapar asap rokok dari suaminya, bahan kimia yang terkandung dalam rokok akan masuk ke janin melalui plasenta (Andriana *et al.* 2014). Paparan asap tembakau mempengaruhi semua tahap reproduksi manusia. Nikotin merupakan zat kimia yang terpenting dalam komponen tembakau. Pada plasenta ibu yang merokok ditemukan sekitar 15 persen konsentrasi nikotin lebih tinggi dalam darah ibu. Karbon monoksida dalam asap dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan bayi, menyebabkan berat lahir rendah. Ibu yang merokok dikaitkan dengan peningkatan risiko kehamilan ektopik, ketuban pecah dini, *abruption plasenta*, *plasenta previa*, keguguran, kelahiran mati, kelahiran prematur, berat lahir rendah, usia gestasi yang kecil, dan anomaly kongenital seperti bibir sumbing. Setelah lahir, risiko sindrom kematian bayi mendadak (SIDS) meningkat diantara keturunan wanita yang merokok selama atau setelah kehamilan (Drope, 2018).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa (4) ayat 9 sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan benar (QS. An-Nisa (4): 9)”.

Ayat diatas menerangkan bahwa kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Disinilah hokum islam menjelaskan apabila orang tua itu meninggalkan keturunannya, atau menelantarkannya, akibat desakan-desakan yang menimbulkan kekhawatiran mereka terhadap kesejahteraannya (Ningsih, 2007). Ayat yang berkenan dengan ahli waris Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas: “bahwa seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah SWT memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah SWT serta membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukan kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya (Ibnu Katsir, 2005).

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Hal ini tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan: ”Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat diatas menerangkan bahwa infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah

kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk ber-buat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.

Pada hakikatnya rokok adalah racun yang memabukkan yang dapat membunuh diri karena sama halnya merokok masuk kedalam kebiasaan. Barangsiapa yang dengan sengaja merusak dirinya berarti dirinya juga merusak hasil hasil ciptaan Allah SWT. tentu dalam hal ini tidak lagi mengakui hasil penciptaan Allah SWT. bukankah ketidak pengakuan tersebut hampir dikategorikan tidak beriman kepada Allah. Sebab hanya yang beriman yang percaya kepada Allah SWT. dan selalu taat kepada-Nya. Atas ayat diatas, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa hukum merokok itu apabila membahayakan pengkonsumsinya adalah haram. Khususnya apabila dokter ahli menetapkan bahaya kemudharatannya (Yunus, 2009).

Al-Qur'an menyebutkan larangan mengkonsumsi yang dilarang Allah sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 menerangkan bahwa dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Merokok secara medis menyebabkan kelemahan fisik penyakit seperti infeksi paru-paru, TBC, saluran pernafasan, dan penyakit lainnya. Al-Qurthubiy menafsirkan ayat diatas menerangkan bahwa makna *tablukah* mencakup semua kebiasaan seperti meninggalkan induk, pergi merantau tanpabekal, dan meninggalkan jihad. Selain itu, berdasar pada ayat di atas, banyak pernyataan ahli medis tentang bahaya rokok yang berisiko terhadap kehilangan nyawa secara perlahan-lahan.

Anak yang mengalami BBLR merupakan salah satu indikator dalam tumbuh kembang anak hingga dewasa dan akan menggambarkan status gizi yang diperoleh janin

selama dalam kandungan. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti “**Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)**”. Karena dengan mengetahui hubungan antara status perokok pasif dengan BBLR, maka dapat dilakukan kegiatan intervensi tepat sasaran yaitu pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi untuk mengurangi insiden terjadinya BBLR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah: Apakah terdapat Hubungan antara perokok pasif pada kehamilan dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara status perokok pasif pada kehamilan dengan BBLR di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara status perokok pasif pada kehamilan dengan BBLR di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

D. *Definisi Operasional dan Kriteria Objektif*

Tabel 1.1. Defnisi Operasional

Variabel	Definisi Operasioanl	Kriteria Objektif
Variabel Independen		
Ibu Hamil Perokok Pasif	Ibu hamil yang tidak merokok tetapi ikut terpapar asap rokok dari perokok aktif baik di lingkungan rumah, di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum.	0 = Tidak terpapar: Apabila tidak terpapar asap rokok dari perokok aktif baik di lingkungan rumah, di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum. 1 =Terpapar: Apabila terpapar asap rokok dari perokok aktif baik di lingkungan rumah, di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum.
Variabel Dependen		
Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Berat badan bayi baru lahir <2500 gram tanpa memandang masa gestasi yang ditimbang dalam satu jam setelah lahir (Proverawati A, 2010).	Ringan : Berat badan lahir rendah <2.500 gram Sedang : Berat badan lahir sangat rendah 1.000-1.500 gram Berat : Berat badan lahir amat sangat rendah <1.000

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

NO	Peneliti	Judul	Jumlah	Hasil
1.	Tiara, Ani (2014)	Pengaruh penyakit penyerta kehamilan ganda dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.	355 kasus	Hasil Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ibu dengan penyakit penyerta kehamilan lebih berisiko melahirkan dengan BBLR 10 kali (CI 95% 6,2-16,6), ibu dengan kehamilan ganda lebih berisiko melahirkan dengan BBLR 15 kali (CI 95% 4,8-45,1).
2.	Hasriyani, dkk (2018)	Berbagai faktor risiko kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi Beberapa Puskesmas Kota Makassar).	138 responden	terdapat variabel yang terbukti sebagai faktor risiko terjadinya BBLR yaitu status gizi, dan adanya penyakit dalam kehamilan. Sedangkan variabel yang tidak terbukti bukan sebagai faktor risiko kejadian BBLR yaitu usia ibu <20 tahun atau >35 tahun, jarak kehamilan, adanya anggota keluarga merokok dalam rumah, status ANC, dan adanya pantangan makan tertentu
3.	Nur Rosmala, dkk (2017)	Analisis Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Rumah	321 Sampel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas (OR = 1,703 pada 95%, CI 0,862-3,363), jarak kehamilan (OR = 3,231 pada

		Sakit Umum Anutapura Palu	95% CI 1,633-6,391), cakupan penimbangan berat badan (OR = 2,519 pada 95% CI 1,261-5,031), cakupan pemeriksaan tekanan darah (OR = 2,692 pada 95% CI 1,397-5,184), dan cakupan pemeriksaan kadar Hb (OR = 3,154 pada 95 % CI 1,451-6,855), merupakan faktor risiko terhadap BBLR
--	--	------------------------------	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara status perokok pasif pada kehamilan dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi status perokok pasif pada kehamilan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar.
- b. Untuk mengidentifikasi status BBLR di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar.
- c. Untuk menganalisis hubungan antara status perokok pasif pada kehamilan dengan bayi berat lahir rendah (BBLR) di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

G. Manfaat Penelitian

i. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah di dapat selama studi khususnya mengenai analisis faktor-faktor kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

ii. Bagi pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang menambah pengetahuan di bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), terkhusus BBLR.

iii. Bagi instansi

Sebagai bahan informasi bagi RSUD H. Padjongan Dg. Ngalle Takalar dan instansi terkait lainnya dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak serta mengarahkan kebijaksanaan perbaikan terhadap faktor-faktor yang berperan dalam kejadian Berat Badan Lahir Rendah.

iv. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi masyarakat, khususnya pada ibu hamil agar mampu mengetahui bahaya paparan asap rokok terhadap kehamilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

1. Berat Badan Lahir Rendah

a. Definisi

Istilah prematur telah diganti menjadi Berat Badan Lahir Rendah oleh WHO sejak 1960, hal ini dikarenakan tidak semua bayi dengan berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir adalah bayi yang premature. Pada Kongres “*European Perinatal Medicine*” ke II di London (1970) dibuat keseragaman definisi, yaitu : Bayi kurang bulan adalah bayi dengan masa kehamilan kurang dari 31 minggu (259 hari), Bayi cukup bulan adalah bayi dengan masa kehamilan mulai 37 minggu sampai 43 minggu (259-293 hari), dan Bayi dengan masa kehamilan mulai 42 minggu atau lebih (294 hari atau lebih) (Walyani, 2014).

Menurut Depkes RI (1996) Bayi Berat Lahir Rendah ialah bayi yang lahir dengan berat lahir 2500 gram atau kurang, dan memperhatikan lamanya kehamilan ibunya. (Walyani, 2014).

b. Klasifikasi BBLR

BBLR diklasifikasikan atas dua bagian yaitu berdasarkan berat badan bayi dan usia kehamilan. Berdasarkan berat badan bayi adalah sebagai berikut:

- a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan berat badan lahir 1.500 – 2.500 gram,
- b. Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.500 gram,
- c. Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.000 gram (Arda, 2015).

Dan BBLR berdasarkan usia kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Prematuritas murni yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan.
- b. Dismaturitas yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan untuk usia kehamilan, yang berada di bawah persentil berat pada kurva pertumbuhan intrauterine. Biasanya disebutkan dengan bayi kecil untuk kehamilan (Arda, 2015).

c. Epidemiologi BBLR

WHO melaporkan Bayi dengan berat <2500 gram berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat yang lahir badan normal (Supiati, 2016).

Adapun presentase BBLR di negara berkembang adalah 16,5% yang dua kali lebih besar dibandingkan dengan negara maju (7%). Di negara-negara berkembang Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan prevalensi BBLR tertinggi (11,1%), setelah India (27,6%), dan Afrika Selatan (13,2%). Selain itu, untuk di negara ASEAN Indonesia menempati urutan kedua dengan prevalensi BBLR tertinggi diantara negara ASEAN lainnya setelah Filipina (21,2%) (Supiati, 2016).

Di Indonesia kematian neonatus terbanyak di Indonesia disebabkan oleh asfiksia (37%), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), ikterus neonatorum (6%), postmatur (3%), dan kelainan kongenital (1%) per 1.000 kelahiran hidup (Ratuain,dkk, 2015). Menurut profil kesehatan Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2015 jumlah bayi lahir hidup sebesar 149.929, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120,293 dengan jumlah BBLR yaitu 9.783 kasus (8,13%) dan tertinggi di kota Makassar sebesar 690 kasus (Dinkes, 2016; Profil Kesehatan Prov.SulSel, 2015).

Untuk kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi-Selatan menempati urutan ke tujuh tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan presentase kejadian BBLR sebesar 12%, dengan Provinsi tertinggi angka

kejadian BBLR yaitu Sulawesi Tengah (16,9%) dan terendah di Sumatra Utara (7,2%) (Dinkes, 2014). Dan berdasarkan data profil kesehatan kota Makassar tahun 2015, angka kejadian BBLR tertinggi terdapat di Puskesmas Kaluku Bodoa yaitu berjumlah 121 kasus (9,46%) dari 1.279 kelahiran hidup (Dinkes Kota Makassar, 2016).

d. Patofisiologi

a. Sebelum bayi lahir

Menurut Sofian (2014) patofisiologi bayi berat badan lahir rendah sebelum bayi lahir yaitu:

- 1) Pada anamnesis sering dijumpai adanya abortus, partus prematurus dan lahir mati.
- 2) Pembesaran uterus tidak sesuai tuanya kehamilan.
- 3) Pergerakan janin yang pertama (quickening) terjadi lebih lambat, gerakan janin lebih lambat walaupun kehamilannya sudah masuk 9 bulan.
- 4) Pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- 5) Sering dijumpai kehamilan dengan oligohidramnion, hyperemesis gravidarum pada hamil lanjut dengan toksemia gravidarum atau perdarahan antepartum (Asmah, 2018).

b. Setelah bayi lahir

- 1) Bayi dengan retardasi pertumbuhan intrauterin secara klasik tampak seperti bayi yang kelaparan. Tanda-tanda bayi ini adalah tengkorak kepala keras, gerakan bayi terbatas, verniks caseosa sedikit atau tidak ada, kulit tipis, kering, berlipat-lipat, mudah diangkat. Abdomen cekung atau rata, jaringan lemak di bawah kulit sedikit, lembek dan berwarna kehijauan (Asmah, 2018).
- 2) Bayi prematur yang lahir sebelum kehamilan 37 minggu. Verniks caseosa ada, jaringan lemak bawah kulit sedikit, tulang tengkorak lunak mudah bergerak, muka seperti boneka (dool-like), abdomen buncit, tali pusat tebal dan segar, menangis

lemah, tonus otot hipotoni, kulit tipis, merah dan transparan (Asmah, 2018).

- 3) Bayi *small for date* sama dengan bayi dengan retradasi pertumbuhan interauterin (Asmah, 2018).
- 4) Bayi prematur kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya, karena itu sangat peka terhadap gangguan pernapasan, infeksi, trauma kelahiran dan hipotermi (Asmah, 2018).

e. Etiologi dan Faktor Risiko BBLR

Menurut teori ada beberapa faktor penyebab Berat Badan Lahir Rendah diantaranya:

1. Faktor Ibu

a. Status gizi ibu hamil

Status gizi sangat berpengaruh terhadap ibu hamil untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Karena apabila status gizi buruk saat sebelum atau selama hamil akan memberikan dampak pada anak, yakni BBLR, dapat juga menghambat pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir akan mudah terkena infeksi, abortus, dan lainnya. Sehingga sebelum atau selama kehamilan, ibu sebaiknya memeriksakan diri secara berkala agar baik ibu maupun janin dapat sehat dan lahir dengan baik (Merzalia, 2012).

b. Umur Ibu

Pada ibu hamil dengan umur ibu <20 tahun, rahim dan panggul sering kali belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya, ibu hamil pada umur itu mungkin akan mengalami persalinan lama atau macet, dan gangguan lainnya karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Sedaangkan pada umur > 35 tahun, kesehatan ibu sudah menurun, akibatnya ibu hamil pada umur itu mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melahirkan anak yang mengalami

cacat bawaan karena beresiko untuk mendapatkan penyakit hipertensi, atau penyakit degeneratif (Sulistiyani, 2014).

Selain itu semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu dalam mengandung, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Usia muda dalam mengandung memerlukan tambahan gizi yang lebih banyak karena selain untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan untuk dirinya juga untuk kebutuhan nutrisi janin yang dikandungnya. Sedangkan umur yang lebih tua dalam mengandung memerlukan energi yang lebih banyak juga karena fungsi organ yang semakin lemah maka diperlukan tambahan energi untuk mendukung kehamilannya yang sedang berlangsung (Muazizah, 2011).

c. Anemia

Anemia pada ibu hamil memiliki prevalensi yang paling tinggi yaitu 48,9%. Kekurangan kadar hemoglobin (Hb) yang kurang dari 11 g/dl mengindikasikan ibu hamil menderita anemia. Pada ibu hamil dengan anemia terjadi gangguan penyaluran oksigen dan zat makanan dari ibu ke plasenta dan janin, yang dimana hal ini dapat mempengaruhi fungsi plasenta. Ketika fungsi plasenta menurun dapat meningkatkan resiko bayi berat badan lahir rendah, dan persalinan kurang bulan. dalam sebuah penelitian dari Tanzania, Kidanto dkk., (2009) melaporkan bahwa insiden persalinan kurang bulan dan berat badan lahir rendah meningkat seiring dengan keparahan anemia (Cunningham dan Garry F, 2017).

d. Pekerjaan

Wanita yang sedang bekerja dalam keadaan hamil memerlukan perlindungan yang lebih khusus di karenakan beberapa hal yaitu yang pertama, pada fase perkembangan embrio rentan terhadap agen toksik dibandingkan ibu yang terpapar. Kedua, pada beberapa jenis pekerjaan yang tidak layak dikerjakan oleh wanita, yang ketiga pada masa kehamilan memungkinkan untuk menurunnya

kapasitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang keempat, wanita cenderung tidak memperhatikan dirinya dibandingkan dengan pria (Sujoso, 2011).

Substansi bahaya di tempat kerja dapat masuk pada pekerja melalui tiga cara yaitu pernafasan, kontak melalui kulit, dan melalui pencernaan. Wanita pekerja yang sedang hamil harus berhati-hati mengenai bahaya pada kesehatan reproduksi. Beberapa bahan kimia dapat beredar dalam darah ibu, melalui plasenta dan menjangkau perkembangan janin. Beberapa agen biologi lainnya seperti bakteri, virus, cacing yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan pada kesehatan wanita dan mengurangi transport makanan ke janin sehingga menyebabkan lahir dengan berat badan lahir rendah (Sujoso, 2011).

e. Pendidikan

Pendidikan ibu menggambarkan pengetahuan ibu tentang kesehatan. Pendidikan yang tinggi memudahkan seseorang dalam menerima informasi lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang pendidikannya rendah. Pengetahuan kesehatan yang tinggi menunjang perilaku hidup sehat dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu selama kehamilan (Festy, 2009).

f. Paritas

Pada umumnya BBLR meningkat sesuai dengan meningkatnya paritas ibu. dimana paritas multipara, yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi dengan berat jenis di atas 2500 gram pada umur kehamilan 37 sampai 42 minggu memiliki risiko 1,32 kali lebih besar untuk terjadi BBLR (Merzalia, 2012).

Paritas yang berisiko yaitu paritas nol yaitu ibu pertama kali hamil dan paritas lebih dari empat. Dimana komplikasi-komplikasi yang akan muncul pada ibu golongan paritas tinggi akan mempengaruhi perkembangan janin. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan plasenta dan sirkulasi darah ke janin, sehingga

pertumbuhan bayi terhambat. keadaan ini jarang terjadi. Serviks inkompeten dapat juga menjadi penyebab abortus selain partus preterm (Merzalia, 2012).

g. Riwayat Melahirkan Bayi BBLR

Menurut penelitian ibu hamil yang memiliki riwayat persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah, memiliki resiko 4,7 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dibanding ibu yang tidak memiliki riwayat persalinan BBLR (Indrasari, 2012).

Penyebab kelahiran bayi BBLR yang telah diketahui dapat diperbaiki dengan perawatan pralahir yang sempurna, pengurangan faktor resiko lainnya serta pembatasan kegiatan dapat membantu mencegah hal tersebut agar tidak melahirkan bayi dengan BBLR lagi (Maryunani, 2013).

2. Faktor Obstetric

a. Kehamilan Ganda

Kehamilan ganda atau gemeli dapat membawa risiko bagi janin, bahaya bagi ibu tidak begitu besar, tetapi wanita dengan kehamilan kembar memerlukan perawatan yang khusus. Pada kehamilan kembar ini, berat badan janin dapat lebih rendah dibandingkan kehamilan tunggal walaupun umur gestasi sama antara ibu yang hamil kembar dengan ibu yang hamil tunggal. Semakin banyak jumlah bayi, maka semakin besar pula derajat reterdasi pertumbuhan. Derajat reterdasi pertumbuhan lebih besar jika dua atau lebih janin berasal dari ovum tunggal daripada jika setiap janin berasal dari ovum yang berbeda (Merzalia, 2012).

b. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi yang dapat atau sering terjadi selama kehamilan ibu ialah ketuban pecah dini (KPD), perdarahan antepartum

(plasenta previa, solusio plasenta), ancaman persalinan premature dan infeksi berat dalam kehamilan (Merzalia, 2012).

- Ketuban pecah dini: merupakan penyebab persalinan prematur dimana ketuban pecah sebelum waktunya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kekuatan membrane atau meningkatnya tekanan intrauterine atau oleh kedua faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan ini dapat disebabkan karena infeksi selama janin berada dalam rahim ibu (Merzalia, 2012).
- Preeklampsia: Preeklampsia adalah suatu kondisi di mana hipertensi atau tekanan darah sistolik / diastolik > 140 mmHg muncul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria 300 mg atau lebih protein urin per 24 jam atau 30 mg / dL (Nuning Saraswati, 2016).

Ibu hamil dengan preeklampsia terjadi penurunan perfusi utero plasenta, hipovolemia, vasospasme, dan kerusakan sel endotel pembuluh darah. kelainan pembuluh darah plasenta pada ibu hamil dengan preeklampsia dapat menyebabkan hipoksia kronis dan gangguan nutrisi janin sehingga sering terjadi retardasi pertumbuhan janin yang dapat berakhir pada berat badan lahir rendah (BBLR) (Lestari *et al.*, 2015).

Preeklampsia dibedakan menjadi dua yaitu preeklampsia ringan dan preeklampsia berat dengan kriteria sebagai berikut :

a. Preeklampsia

- 1) Tekanan darah ≥ 140 mmHg setelah kehamilan 20 minggu.
- 2) Ekskresi protein dalam urin > 300 mg/24 jam atau +1 dipstik, rasio protein: kreatin ≥ 30 mg/mmol.

b. Preeklampsia Berat

Dapat dikategorikan preeklampsia berat jika didapatkan tanda-tanda: tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg, Proteinuria ≥ 5 g/24 jam atau $\geq +2$ dipstik, Ada keterlibatan organ, Hematologi terdapat trombositopenia (< 100.000 /ul), hemolisis mikroangiopati. Pada

Hepar terdapat peningkatan SGOT (serum glutamic axaloacetic transminase) dan SGPT (serum glutamic pyruvic transminase), nyeri epigastri ataa kuadran kanan atas. Kondisi Neurologis : Sakit kepala persisten,skotoma penglihatan , Pada janin didapatkan pertumbuhan janin terhambat atau oligohidramnion Kondisi Paru edema, dan gagal jantung konstif serta pada Ginjal didapatkan oliguria (≤ 500 ml/24 jam), kreatinin $\geq 1,2$ mg/dL (Wibowo *et al.*, 2015).

- Hiperemesis gravidarum : BBLR dapat terjadi pada ibu yang mengalami gangguan/komplikasi selama masa kehamilan seperti hiperemesis gravidarum yaitu komplikasi mual dan muntah pada hamil dan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi, perasaan mual ini disebabkan oleh meningkatnya kadar estrogen. Apabila terjadi terus menerus akan menyebabkan kekurangan asupan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin (Merzalia, 2012).

Tingkatan dan gejala Hiperemis Gravidarum

1) Hiperemis Gravidarum Tingkat I

Hiperemesis gravidarum tingkat I memiliki gejala berupa: mata cekung, turgor kulit kurang, lidah kering, penurunan tekanan darah sistolik, nyeri epigastrium, berat badan menurun, nafsu makan menurun, dan lemah (Fadlun *et al.*, 2011).

2) Hiperemesis gravidarum tingkat II

Hiperemesis gravidarum tingkat II mmiliki gejala berupa: mual dan muntah yang hebat, dehidrasi, aseton dalam uruin, nafas mau aseton, oliguria,konstipasi, mata cekung, ikterik ringan, suhu badan meningkat, lidah kering dan kotor, apatis, nadi cepat dan kecil (Fadlun *et al.*, 2011).

3) Hiperemesis gravidarum tingkat III

Hiperemesis gravidarum tingkat III memiliki gejala berupa: komplikasi fatal enselopati Wernicke seperti (perubahan mental, diplopia, dan nistagmus), keadaan umum jelek: mual muntah

berhenti, kesadaran menurun berupa samnolen higga koma,suhu badan meningkat, dehidrasi, dan hipotensi (Fadlun *et al.*, 2011).

c. Umur Kehamilan

Kehamilan pada usia muda merupakan faktor resiko hal ini dikarenakan belum matangnya organ reproduksi untuk hamil (endometrium belum sempurna) sedangkan pada usia diatas 34 tahun endometrium yang kurang subur serta memperbesar kemungkinan untuk menderita kelainan kongenital, sehingga dapat berakibat terhadap kesehatan ibu dan perkembangan serta pertumbuhan janin dan beresiko untuk mengalami kelahiran prematur (Indrasari, 2012).

3. Faktor Janin dan Plasenta

a. Cacat Bawaan

Cacat bawaan yang terjadi dapat membuat persalinan menjadi premature, keguguran, lahir mati, atau kematian pada bayi setelah persalinan pada minggu pertama. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan atau gaya hidup ibu yang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan serta infeksi sebelum atau pada saat hamil (Merzalia, 2012).

b. Pertumbuhan Janin Terhambat (IUGR)

IUGR dapat terjadi karena pemasokan oksigen dan makanan kurang adekuat dan hal inipun dapat mendorong untuk dilakukannya terminasi kehamilan lebih dini. Terdapat dua bentuk : yaitu janin yang menderita distress yang lama dan janin yang menderita distress sub akut (Merzalia, 2012).

c. Plasenta Previa

Placenta previa dapat terjadi karena adanya partus prematurus karena rangsangan koagulum darah pada serviks, kadar progesteron turun sehingga dapat terjadi his dan hipoksia, hal inilah yang memicu terjadinya bayi dengan berat badan lahir rendah (Juniarti Risna, 2014).

f. Masalah atau Komplikasi BBLR

Masalah yang dapat timbul pada kasus BBLR dapat di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR

Pada Berat Badan Lahir Rendah banyak resiko terjadinya permasalahan pada sistem tubuhnya dikarenakan kondisi tubuh yang tidak stabil. Semakin rendah berat badan bayi maka prognosinya juga akan semakin buruk sehingga perlu mengetahui masalah masalah yang dapat timbul dalam kasus BBLR ini (Proverawati A, 2010). Adapun masalah yang beresiko timbul dalam jangka pendek adalah sebagai berikut :

1) Gangguan Metabolik

a. Hipotermi

Hipotermi ini merupakan masalah yang paling sering terjadi pada Berat Badan Lahir Rendah dikarenakan lemak subkutan yang sangat tipis sehingga suhu tubuh bayi akan mudah untuk dipengaruhi oleh suhu lingkungannya (Prawirohardjo, S. 2008).

Proses kehilangan suhu tubuh bayi ini ada beberapa mekanisme. Pertama melalui proses radiasi yaitu proses kehilangan panas pada bayi melalui proses radiasi adalah kehilangan panas pada bayi saat berdekatan dengan benda padat yang mempunyai temperatur lebih rendah dibandingkan temperatur bayi yang keduanya tidak berkontak secara langsung. Kedua melalui mekanisme konduksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan suatu benda yang dingin. Seperti saat diletakkan di timbangan yang dingin ataupun saat di letakan diatas meja. Ketiga adalah mekanisme konveksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi yang terjadi saat terpapar dengan udara sekitar yang dingin. Dimana bayi yang ditempatkan pada

ruangan yang dingin akan lebih mudah panas. Dan keempat evaporasi yaitu Proses kehilangan panas pada bayi melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah, seperti saat bayi berkeringat ataupun saat setelah mandi (Prawirohardjo, S. 2008).

b. Hipoglikemia

Glukosa darah berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi otak sehingga jika asupan glukosa pada bayi ini kurang makan akan mengakibatkan sel saraf pada otak mati dan akan mempengaruhi kecerdasan bayi kelak. Hipoglikemi ini dapat terjadi akibat kurangnya glukosa tubuh akibat kekurangan cadangan glukosa. Selain itu pada kasus BBLR juga refleks untuk menelan belum sempurna sehingga cenderung akan malas menyusui sedangkan diketahui bahwa BBLR membutuhkan cairan atau asupan nutrisi yang lebih dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal dimana pada normalnya bayi hanya membutuhkan cairan sebesar 120-150 ml/kg/hari atau 1000-1200 kkal/kg/hari dan pada kasus BBLR akan membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak yaitu kebutuhan nutrisi atau cairan normal ditambah dengan 90 – 100 kkal/kgBB/hari (Septira, 2016).

c. Masalah Pemberian ASI

Masalah pemberian ASI pada kasus BBLR terjadi karena ukuran tubuh bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil, dan tidak dapat menghisap. Sehingga, bayi dengan BBLR cenderung akan mendapatkan ASI jika diberikan bantuan, dan cara pemberian ASInya pun harus sedikit dan dengan frekuensi yang sering (Proverawati, A. 2010).

d. Ikterus

Ikterus merupakan timbulnya gejala warna kuning pada kulit, selaput lendir, dan jaringan lain oleh akibat dari tingginya kadar bilirubin di dalam tubuh. Ikterus neonatal merupakan suatu gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir dimana

ikterus neonatal ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu ikterus fisiologis (muncul setelah hari ke dua atau ke tiga setelah kelahiran) dan ikterus patologis (muncul dalam 24 jam pertama setelah lahir) (Proverawati A, 2010).

2) Gangguan Imunitas

a. Gangguan Immunologik

Daya tahan tubuh berkurang terhadap infeksi karena rendahnya kadar Immunoglobulin, maupun gamma globulin. Bayi dengan BBLR relatif masih belum sanggup membentuk antibodi dan daya fagositosis serta reaksi terhadap infeksi belum baik. Karena kekebalan tubuh bayi BBLR belum sempurna, bayi juga dapat terkena infeksi pada proses kelahiran (Proverawati, A. 2010).

b. Penyebab dari kejang ini biasanya adalah infeksi sebelum lahir (prenatal), perdarahan intra kranial, atau karena vitamin B6 yang dikonsumsi oleh ibu. Biasanya bayi yang kejang ini akan dipantau selama 1 x 24 jam dan selalu memantau jalan nafasnya agar tetap dalam kondisi bebas. (Proverawati, A. 2010).

3) Gangguan Pernafasan

Pada gangguan pernafasan ada banyak masalah yang dapat timbul pada kasus BBLR ini yaitu:

a. Sindrom Gangguan Pernafasan

Masalah ini disebabkan oleh perkembangan yang imatur pada sistem pernafasan atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan pada paru – paru. Untuk masalah akibat dari kurangnya jumlah surfaktan ini sering dikenal dengan nama Hyalin Membran Disease (HMD) dimana ini sering terjadi pada kasus bayi yang lahir kurang bulan (Proverawati A, 2010).

Adapun asfiksia yaitu bayi BBLR baik yang kurang, cukup atau lebih bulan dapat mengalami gangguan pernafasan dimana semuanya berdampak pada proses adaptasi pernafasan waktu

lahir sehingga dapat mengalami asfiksia lahir (Proverawati, A. 2010).

b. Apneu Periodik (henti nafas)

Masalah ini kerap terjadi pada bayi prematur karena organ paru – paru dan susunan saraf pusat yang belum sempurna mengakibatkan bayi henti nafas (Proverawati, 2010).

b. Masalah Jangka Panjang pada BBLR

Ada banyak masalah yang akan timbul dalam jangka panjang pada kasus BBLR. Hal ini bisa terjadi jika penanganan saat lahir pada kasus BBLR ini tidak ditangani dengan baik dan benar sesuai prosedur yang semestinya, dampak jangka panjang yang bisa terjadi adalah masalah pada fisik dan psikis pasien. Untuk masalah psikis pasien yang dapat terjadi adalah gangguan perkembangan dan pertumbuhan dimana pasti akan lebih lambat dari bayi yang lahir dengan berat badan lahir normal. Juga terjadi masalah gangguan bicara dan komunikasi, gangguan belajar atau masalah pendidikan, serta gangguan atensi dan hiperaktif. Sedangkan untuk masalah fisik yang dapat terjadi pada kasus BBLR jangka panjang adalah mudahnya orang tersebut terkena suatu penyakit seperti penyakit paru, gangguan pada mata (gangguan penglihatan) dan juga gangguan pada pendengarannya (Proverawati, 2010)

g. Diagnosis BBLR

Diagnosis pasti dari BBLR ini membutuhkan 2 pemeriksaan yaitu pemeriksaan haid pertama, haid terakhir dan juga pemeriksaan berat badan bayi dimana jika didapatkan berat badan bayi kurang dari 2500 gram saat lahir dan usia gestasi baik preterm, aterm maupun posterm maka bayi tersebut dikategorikan ke dalam BBLR (Proverawati A, 2010). Adapun gejala - gejala yang sering muncul adalah berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram, kepala lebih besar dari tubuh, kulit tipis, lemak subkutan tipis, fontanella dan sutura melebar, dan APGAR skor biasanya rendah (Arda, 2015).

h. Penatalaksanaan BBLR

Tatalaksana pada bayi BBLR harus dilaksanakan sedini mungkin sejak bayi masih di NICU, salah satunya dengan memberikan cairan infus glukosa pada saat lahir dengan kecepatan 4 mg/kg/menit dan kecepatan ditingkatkan perhari selama euglikemia terjaga. Hal terpenting dalam perawatan dini bayi BBLR adalah pemberian nutrisi yang adekuat sehingga dapat terjadi peningkatan berat badan pada bayi BBLR (Septira, 2016).

Energy tambahan yang dibutuhkan untuk bayi BBLR adalah 90100 kkal/kg/hari untuk mengejar pertumbuhannya. Pemberian nutrisi dapat dilakukan dengan ASI, susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral yang dapat diberikan adalah glukosa, protein, lipid, dan zat besi. Pemberian nutrisi parenteral dikarenakan imaturitas dari traktus gastrointestinal. Namun, pemberian nutrisi enteral juga penting untuk maturitas system gastrointestinal bayi (Septira, 2016).

Asupan dini tinggi protein dengan memberikan lebih dari 2 g/kg/hari asam amino sejak hari pertama kelahiran dapat mendorong peningkatan berat badan, pertumbuhan, dan meningkatkan sekresi insulin endogen dan gluconeogenesis yang meningkatkan toleransi glukosa dan mencegah hiperglikemia. Asupan asam amino ditingkatkan sampai 3,5-4 g/kg/hari diakhir minggu pertama dan dibarengi dengan emulsi lipid intravena (Septira, 2016).

Kekurangan gizi ibu saat hamil baik itu gizi makro maupun mikro dapat menyebabkan terjadinya BBLR. Defisiensi zat gizi makro defisiensi karena kekurangan energi kronik, jika kekurangan energi kronik ini terjadi selama kehamilan akan menyebabkan janin kekurangan asupan nutrisi yang optimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin akan terganggu (Fajriana A, 2018).

Selain kekurangan gizi makro, defisiensi gizi mikro misalnya kekurangan zat besi (anemia dalam kehamilan) juga dapat berhubungan dengan hambatan pertumbuhan janin karena asupan atau pasokan oksigen kejanin kurang (Fajriana A, 2018).

B. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang sekitar 70-120 mm (bervariasi bergantung negaranya) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujung lainnya. Sedangkan berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, dijelaskan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Aula, 2010).

2. Jenis-jenis Rokok

1. Kawung, Sigeret, dan Cerutu merupakan pembungkus rokok yang bahannya mulai dari daun aren, kertas, dan daun tembakau sebagai bahan pembungkusnya.
2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi dibedakan menjadi tiga, yaitu: Rokok putih yaitu rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, Rokok kretek merupakan rokok yang berbahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus guna mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, Rokok klembak yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan menyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya yaitu: Sigaret kretek tangan (SKT) merupakan rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan ataupun alat bantu sederhana dan Sigaret kretek mesin (SKM) merupakan rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin dengan memasukkan material rokok ke dalam mesin pembuat rokok. Hasil dari mesin

pembuat rokok ini berupa rokok batangan. Mesin pembuat rokok saat ini telah mampu menghasilkan sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Biasanya mesin pembuat rokok dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan, namun dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres yang didalamnya berisi 10 pak.

4. Rokok berdasarkan penggunaan filter dibedakan menjadi: Rokok filter (RF) adalah rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus dan Rokok nonfilter (RNF) merupakan rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus (Aula, 2010)

3. **Kandungan Rokok**

Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat meracuni tubuh, sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker. Secara umum, bahan kimia ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas dan komponen padat atau partikel (Aula, 2010). Beberapa komponen besar yang terdapat dalam rokok yang dapat membahayakan kesehatan diantaranya:

1. Nikotin

Nikotin menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan. Semakin lama, nikotin dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan adnelain, yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras. Artinya, jantung membutuhkan lebih banyak oksigen agar dapat terus memompa.

2. Karbon Monoksida

Karbon monoksida menggantikan sekitar 15% jumlah oksigen, yang biasanya dibawa oleh sel darah merah, sehingga dapat mengurangi suplai oksigen pada jantung (Aula, 2010). Asap rokok mengandung CO dengan konsentrasi lebih dari 20.000 ppm. Konsentrasi CO yang tinggi di dalam

asap rokok yang terisap mengakibatkan kadar COHb di dalam darah meningkat (Aula, 2010).

3. Tar

Pada rokok atau cerutu, tar mengandung bahan kimia yang beracun, yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker (Aula, 2010).

4. Arsenic

Sejenis unsur kimia yang digunakan untuk membunuh serangga yang terdiri dari unsur-unsur Nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat mengganggu saluran pernafasan, bahkan merangsang terjadinya kerusakan dan perubahan kulit tubuh dan Ammonium karbonat, yakni zat yang bias membentuk plak kuning pada permukaan lidah, serta mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat pada permukaan lidah.

5. Phenol dan Acetol

Phenol merupakan campuran yang terdiri dari Kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan arang. Phenol terikat pada protein dan menghalani aktivitas enzim. Acetol adalah Hasil pemanasan aldehyde (sejenis zat tidak berwarna yang bebas bergerak) dan mudah menguap dengan alcohol.

6. *Methyl Chloride*

Methyl chloride adalah campuran dari zat-zata bervalensi satu, yang unsur-unsur utamanya berupa hydrogen dan karbon. Zat ini merupakan compound yang sangat beracun.

7. Methanol

Methanol merupakan sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Methanol dapat menyebabkan kebutaan, bahkan kematian. *Mainstream smoke* atau asap utama, merupakan asap rokok yang diisap oleh perokok aktif sedangkan *Sidestream smoke* atau asap sampingan, merupakan kombinasi dari asap dari ujung rokok yang dibakar dan asap utama yang dihembuskan oleh perokok aktif.

Menurut Sitepoe (dalam Aula, 2010), ada 5 tipe perokok, yaitu:

Pertama, tidak pernah merokok selama hidup. Kedua, perokok ringan, yaitu merokok berselang-seling. Ketiga, perokok sedang, yaitu merokok setiap hari dalam kuantum kecil. Keempat, perokok berat, yakni merokok lebih dari satu bungkus setiap hari. Kelima, berhenti merokok, yaitu semula merokok, kemudian berhenti dan tidak pernah merokok lagi.

Menurut Mu'tadin (dalam Aula, 2010), jika ditinjau dari banyaknya jumlah rokok yang diisap setiap hari, tipe perokok dibagi menjadi tiga.

- a. Perokok sangat berat, yakni perokok yang menghabiskan lebih dari 31 batang rokok tiap hari dengan selang merokok lima menit setelah bangun tidur pada pagi hari.
- b. Perokok berat, yaitu perokok yang menghabiskan 21 hingga 30 batang setiap hari dengan selang waktu merokok berkisar 6 hingga 30 menit setelah bangun tidur pada pagi hari.
- c. Perokok sedang, yakni perokok yang menghabiskan sekitar 10 batang setiap hari dengan selang waktu merokok 60 menit setelah bangun tidur pada pagi hari.

Secara umum, tipe perokok dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif (Aula, 2010).

- a. Perokok aktif (*active smoker*)

Perokok aktif merupakan orang yang memiliki kebiasaan merokok.

- b. Perokok pasif (*passive smoker*)

Perokok pasif merupakan seseorang yang tidak memiliki kebiasaan merokok, namun terpaksa harus menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh orang lain yang kebetulan berada di dekatnya atau disekitarnya. Meskipun perokok pasif tidak merokok, tetapi perokok pasif memiliki risiko yang sama dengan perokok aktif dalam hal terkena penyakit yang disebabkan oleh rokok.

C. Tinjauan Umum tentang Perokok Pasif dan BBLR

Perokok pasif atau juga secondhand smoke atau disebut juga *Environmental Tobacco smoke* merupakan produk yang dilepaskan ke lingkungan sekitarnya ketika

seseorang sedang merokok (Eftekhar *et al.*, 2016). Perokok aktif dan perokok pasif memiliki risiko yang sama karena perokok pasif menghirup kandungan karsinogen (zat yang memudahkan timbulnya kanker yang terdapat dalam asap rokok) dan 4.000 partikel lainnya yang terdapat di asap rokok, sebagaimana yang dihirup oleh perokok aktif (Aula, 2010). Ibu hamil yang merokok baik secara aktif maupun pasif dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin dalam Rahim (Lestari *et al.*, 2015; Eftekhar *et al.*, 2016). Ibu hamil yang tidak merokok dapat terpapar asap rokok melalui tempat kerja, rumah, dan tempat lainnya (Eftekhar *et al.*, 2016).

Paparan asap rokok pasif dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Beberapa senyawa kimia dalam asap rokok dapat melewati plasenta. Misalnya nikotin dalam darah wanita yang terpapar asap rokok dapat mengurangi aliran darah ke janin dan memiliki efek buruk pada paru-paru, jantung fetus, sistem syaraf pusat, dan sistem pencernaan dan juga karbon monoksida yang dapat menyebabkan berat lahir rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya penurunan pasokan oksigen ke janin yang menyebabkan hipoksia pada janin (Eftekhar *et al.*, 2016).

D. Tinjauan Umum tentang Risiko Berat Bayi Lahir Rendah

1. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran bayi dengan umur kehamilan 22 minggu atau lebih (bayi tunggal atau kembar dianggap telah mampu bertahan hidup diluar kandungan) yang pernah dialami ibu. Secara singkat, paritas adalah banyaknya bayi yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik dalam keadaan hidup ataupun lahir mati (Manuaba dalam Amiruddin & Hasmi 2014).

Penelitian yang dilakukan di Karachi menunjukkan bahwa primipara, yaitu golongan ibu dengan paritas 1 dan kelahiran lebih dari 3 berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Paritas yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terganggunya uterus terutama dalam hal fungsi pembuluh darah. Kehamilan yang berulang-ulang akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah uterus. Hal ini akan menyebabkan gangguan

pertumbuhan yang selanjutnya akan berakibat pada lahirnya bayi dengan BBLR (Khan *et al.*, 2016)


2. **Status Gizi**

Ibu hamil dengan status gizi yang baik mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melahirkan bayi yang sehat. Salah satu cara untuk mengetahui status gizi ibu adalah dengan melakukan pengukuran LILA (lingkar lengan atas). Pengukuran LILA dapat digunakan untuk tujuan penapisan status gizi KEK (kurang energi kronis). Ibu hamil KEK merupakan ibu hamil yang memiliki ukuran LILA <23,5 cm. Penapisan KEK dengan ukuran LILA yang rendah mencerminkan kekurangan energy dan protein dalam intake makanan sehari-hari yang biasanya juga diiringi dengan kekurangan zat gizi lain, seperti zat besi. Dapat diasumsikan bahwa ibu hamil yang menderita KEK berpeluang untuk menderita anemia (Utami, 2015).

3. **Pendapatan**

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara pendapatan, khususnya pendapatan keluarga dengan berat bayi lahir rendah. Pendapatan sangat berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil selama hamil. Konsekuensi dari asupan gizi yang tidak memadai selama kehamilan tidak hanya akan berdampak pada status kesehatan ibu namun juga akan berdampak pada bayi yang dapat menyebabkan bayi dalam kandungan mengalami berat bayi lahir rendah (Demelash *et al.*, 2015).

E. Kerangka Teori




Bagan 2.1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep

Berdasarkan Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Descriptive correlation* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelasi antara variabel dengan desain pendekatan *retrospektif*, di mana penelitian ini berusaha melihat kebelakang (*Backward looking*). Dalam penelitian ini menggambarkan korelasi antara ibu hamil perokok pasif dengan bayi berat lahir rendah.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan bayi di ruang bersalin di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar dengan jumlah 139 orang ibu yang melahirkan dari bulan Januari sampai Desember 2019.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan populasi yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu perokok pasif di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Sampel penelitian ini berjumlah 60 sampel

a) Kriteria Inklusi

1. Ibu yang melahirkan bayi hidup dengan BBLR yang lahir di RSUD H. Padjonga Dg, Ngalle Periode Januari-Desember 2019.
2. Ibu yang melahirkan bayi hidup dengan BBLR yang lahir di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Periode Januari-Desember 2019, dengan data rekam medis lengkap.

b) Kriteria Eksklusi

1. Ibu perokok aktif
2. Kejadian ketuban pecah dini

3. Preeklampsia/eklampsia
4. Riwayat hipertensi kehamilan
5. Cacat kongenital
6. Mengonsumsi alkohol dan obat-obatan

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2021.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel dependen dan variabel independent sebagai berikut :

1. Variabel independent

Variabel independent dari penelitian ini adalah Status perokok pasif pada kehamilan yang mempengaruhi BBLR.

2. Variabel dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Berat bayi lahir rendah.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil pengisian kuesioner. Data sekunder didapatkan dari Rekam Medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle. Data yang dikumpulkan meliputi data kasus bayi berat lahir rendah dengan data rekam medis lengkap bulan Januari-Desember 2019.

Peneliti mengumpulkan data dari pengisian kuesioner (data primer) dan data rekam medik (data sekunder) di rumah sakit terkait yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lalu peneliti mengolah data tersebut.

F. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang Dilakukan:

- a. *Editing*: Penulis melakukan pengecekan formulir/kuesioner pengambilan data, apakah sudah lengkap atau tidak.

- b. *Coding*: Penulis melakukan perubahan data dari huruf menjadi data bentuk angka/bilangan. Untuk mempermudah saat analisis data dan mempercepat pada saat entri data.
- c. *Processing*: Penulis mengolah, memproses data dengan menggunakan Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) dan Microsoft Excel untuk memperoleh hasil statistik.
- d. *Cleaning*: Penulis memeriksa kembali data yang telah dimasukkan, apakah sudah benar atau tidak

G. Analisis Data.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan datanya diolah menggunakan program computer Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Adapun data yang dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensinya. Membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Pada tahap ini dilakukan analisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menetapkan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dan dependen digunakan rumus berdasarkan skala pengukuran variabel yang digunakan.

Analisa data yang digunakan adalah chi square dalam uji X² digunakan untuk menguji kebebasan antara dua variabel yang disusun dalam tabel baris dan kolom dengan $\alpha = 0.05$, maknanya hipotesis nol (H₀) ditolak jika p value $< \alpha$ yang artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

H. Etika Penelitian

1. Pada etika penelitian dimulai dengan mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Memberikan penjelasan kepada respon tentang penelitian yang akan dilakukan.
3. Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian serta memberikan lembar persetujuan bersedia sebagai sampel dari penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

a. Usia Responden

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur

Usia Responden	Frekuensi (F)	Persen (%)
< 20	7	11.7
21-35	36	60
> 35	17	28.3
Total	60	100

Sumber: Data Primer

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa variabel usia dikategorikan menjadi usia <20 tahun, usia 20 sampai 35 tahun, dan usia >35 tahun. Responden dengan usia <20 tahun berjumlah 7 orang (11,7%), responden dengan usia 20 sampai 35 tahun berjumlah 36 orang (60%), dan responden dengan usia >35 tahun berjumlah 17 orang (28,3%). Hal ini disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu pada kategori usia 20 sampai 35 tahun dengan persentase sebesar 60%.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Status Pekerjaan

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persen (%)
Bekerja	50	83.3
Tidak Bekerja	10	16.7
Total	60	100

Sumber: Data Primer

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa variabel status pekerjaan dikategorikan menjadi bekerja dan tidak bekerja. Banyaknya responden yang bekerja adalah 50 orang (83,3%) sedangkan banyaknya responden yang tidak bekerja adalah 10 orang (16,7%). Hal ini disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu pada responden yang bekerja dengan persentase sebesar 83,3%.

c. Status ANC

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status ANC

Status ANC	Frekuensi (F)	Persen (%)
Teratur	45	75
Tidak Teratur	15	25
Total	60	100

Sumber: Data Primer

Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa variabel status ANC dikategorikan menjadi teratur dan tidak teratur. Banyaknya responden dengan status ANC teratur adalah 45 orang (75%) sedangkan banyaknya responden dengan status ANC tidak teratur adalah 15 orang (25%). Hal ini disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu pada status ANC teratur dengan persentase sebesar 75%.

d. Bayi berat badan lahir rendah

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Bayi Berat Badan Lahir Rendah

Status	Frekuensi	Persen
BBLR	(F)	(%)
Ringan	52	86.7
Sedang	8	13.3
Berat	0	0
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer

Tabel 4.4 Menunjukkan bahwa variabel status BBLR responden dengan BBLR ringan memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 52 responden (86.7%) sedangkan sisanya dengan BBLR sedang sebanyak 8 responden (13.3%).

2. Analisis Univariat

a. Status Perokok Pasif

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Data Berdasarkan Status Perokok Pasif

Status	Frekuensi	Persen
Perokok Pasif	(F)	(%)
Perokok Pasif	60	100%
Total	60	100

Sumber: Data Primer

Tabel 4.5 Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil yang diteliti berstatus sebagai perokok pasif 60 orang (100%).

b. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persen (%)
PP2 Lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok	Lingkungan Rumah	50	83.3
	Lingkungan Tempat Kerja	10	16.7
PP3 Asal utama paparan asap rokok didalam rumah	Suami	50	83.3
	Anggota Keluarga Lain	10	16.7
PP4 Asal utama paparan asap rokok dilingkungan luar rumah	Orang lain	8	13.3
	Teman Kerja	47	78.3
	Tetangga	5	8.3
PP5 Ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu	>1 kali	45	75.0
	1 Kali	15	25.0
PP6 Frekuensi waktu ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu hari	>15 mnt	57	95.0
	<15 mnt	3	5.0
Jumlah		60	100.0

Sumber: Data Primer

Tabel 4.6 Menunjukkan bahwa karakteristik responden PP2 (Lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok) kategori lingkungan rumah berjumlah 50 responden (83,3%) dan kategori lingkungan tempat kerja berjumlah 10 responden (16,7%). Karakteristik responden PP3 (Asal utama paparan asap rokok didalam rumah) kategori suami berjumlah 50 responden (83,3%) dan kategori anggota keluarga lain berjumlah 10 responden (16,7%). Karakteristik responden PP4 (Asal

utama paparan asap rokok dilingkungan luar rumah) kategori orang lain berjumlah 8 responden (13,3%), kategori teman kerja berjumlah 47 responden (78,3%), kategori tetangga berjumlah 5 responden (8,3%). Karakteristik responden PP5 (Ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu) kategori >1 kali berjumlah 45 responden (75%) dan kategori 1 kali berjumlah 15 responden (25%). Karakteristik responden PP6 (Frekuensi waktu ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu hari) kategori >15 menit berjumlah 57 responden (95%) dan kategori <15 menit berjumlah 3 responden (5%).

3. Analisis Bivariat

Tabel 4.7 Hasil Uji Hubungan Lingkungan Ibu Hamil Yang Paling Sering Terpapar Asap Rokok dengan BBLR

Variabel			BBLR		Jumlah	Nilai p
			Ringan	Sedang		
PP2 Lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok	Lingkungan Rumah	n	46	4	50	0.021
		%	92.0%	8.0%	100.0%	
	Lingkungan Tempat Kerja	n	6	4	10	
		%	60.0%	40.0%	100.0%	
Jumlah		n	52	8	60	
		%	86.7%	13.3%	100.0%	

Berdasarkan Tabel 4.7 Menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP2 (Lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok) kategori lingkungan rumah dengan BBLR ringan adalah 46 responden (92%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (8%) dan untuk variabel PP2 kategori lingkungan tempat kerja dengan BBLR ringan adalah 6 responden (60%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (40%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,021 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP2 dengan BBLR responden.

Tabel 4.8 Hasil Uji Hubungan Asal Utama Paparan Asap Rokok di Dalam Rumah dengan BBLR

Variabel			BBLR		Jumlah	Nilai p
			Ringan	Sedang		
PP3 Asal utama paparan asap rokok didalam rumah	Suami	n	46	4	50	0.021
		%	92.0%	8.0%	100.0%	
	Anggota Keluarga Lain	n	6	4	10	
		%	60.0%	40.0%	100.0%	
Jumlah		n	52	8	60	
		%	86.7%	13.3%	100.0%	

Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP3 (Asal utama paparan asap rokok di dalam rumah) kategori suami dengan BBLR ringan adalah 46 responden (92%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (8%) dan untuk variabel PP3 kategori anggota keluarga lain dengan BBLR ringan adalah 6 responden (60%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (40%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,021 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP3 dengan BBLR responden.

Tabel 4.9 Hasil Uji Hubungan Asal Utama Paparan Asap Rokok di Lingkungan Luar Rumah dengan BBLR

Variabel			BBLR		Jumlah	Nilai p
			Ringan	Sedang		
PP4 Asal utama paparan asap rokok di lingkungan luar rumah	Orang lain	n	4	4	8	0.003
		%	50.0%	50.0%	100.0%	
	Teman Kerja	n	44	3	47	
		%	93.6%	6.4%	100.0%	
	Tetangga	n	4	1	5	
		%	80.0%	20.0%	100.0%	
Jumlah		n	52	8	60	
		%	86.7%	13.3%	100.0%	

Tabel 4.9 Menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP4 (Asal utama paparan asap rokok di lingkungan luar rumah) kategori lingkungan rumah dengan BBLR ringan adalah 4 responden (50%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (50%), untuk variabel PP4 kategori teman kerja dengan BBLR ringan adalah 44 responden (93,6%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 3 responden (6,4%), dan untuk variabel PP4 kategori tetangga dengan BBLR ringan adalah 4 responden (80%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 1 responden (20%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,003 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP4 dengan BBLR responden.

Tabel 4.10 Hasil Uji Hubungan Ibu Hamil Yang Terpapar Asap Rokok Dalam Satu Minggu dengan BBLR

Variabel			BBLR		Jumlah	Nilai p
			Ringan	Sedang		
PP5 Ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu	>1 kali	n	42	3	45	0.019
		%	93.3%	6.7%	100.0%	
	1 kali	n	10	5	15	
		%	66.7%	33.3%	0.0%	
Jumlah	n	52	8	60		
	%	86.7%	13.3%	100.0%		

Tabel 4.10 Menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP5 (Ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu) kategori >1 kali dengan BBLR ringan adalah 42 responden (93,32%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 3 responden (6,7%) dan untuk variabel PP5 kategori 1 kali dengan BBLR ringan adalah 10 responden (66,7%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 5 responden (33,3%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,019 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP5 dengan BBLR responden.

Tabel 4.11 Hasil Uji Hubungan Frekuensi Waktu Ibu Hamil Terpapar Asap Rokok Dalam Satu Hari Dengan BBLR

Variabel			BBLR		Jumlah	Nilai p
			Ringan	Sedang		
PP6 Frekuensi waktu ibu hamil terpapar asap rokok dalam satu hari	<15 mnt	n	1	2	3	0.044
		%	33.3%	66.7%	100.0%	
	>15 mnt	n	51	6	57	
		%	89.5%	10.5%	100.0%	
Jumlah		n	52	8	60	
		%	86.7%	13.3%	100.0%	

Tabel 4.11 Menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP6 (Frekuensi waktu ibu hamil terpapar asap rokok dalam satu hari) kategori <15 menit dengan BBLR ringan adalah 1 responden (33,3%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 2 responden (66,7%) dan untuk variabel PP6 kategori >15 menit dengan BBLR ringan adalah 51 responden (89,5%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 6 responden (10,5%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,044 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP6 dengan BBLR responden.

B. Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah” dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2021 di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian BBLR diantaranya usia ibu hamil, pekerjaan, status ANC, riwayat paritas, penyakit kronis pada ibu, dan paparan zat racun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar dapat dilihat pada tabel 4.1 menunjukkan hasil

distribusi sampel usia pada setiap ibu hamil bahwa usia responden didominasi oleh usia 20-35 tahun karena memiliki frekuensi tertinggi yaitu 36 responden (60%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden pada kelompok kasus merupakan golongan umur yang tidak berisiko. Umur merupakan salah satu faktor risiko terjadinya BBLR. Wanita pada umur muda (kurang dari 20 tahun) memiliki risiko melahirkan bayi BBLR empat kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia reproduktif sehat (20-35 tahun). Hal ini disebabkan karena pada usia remaja perkembangan organ reproduksi masih belum matang sehingga akan menyebabkan kompetisi dalam mendapatkan nutrisi antara ibu yang masih dalam tahap perkembangan dan janinnya. Di samping itu, secara psikologis, wanita di usia remaja belum siap menghadapi tuntutan beban moral, mental, dan emosional yang menyebabkan stress psikologis yang dapat mengganggu perkembangan janin. Kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya kelahiran BBLR sehubungan dengan alat reproduksinya telah mengalami degenerasi dan terjadi gangguan keseimbangan hormonal. Di samping itu, tidak adekuatnya fungsi plasenta menyebabkan kurangnya produksi progesteron dan mempengaruhi iritabilitas uterus, menyebabkan perubahan pada serviks yang pada akhirnya akan memicu kelahiran prematur.

Faktor pekerjaan dapat juga berpengaruh kepada kejadian BBLR. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar dapat dilihat pada tabel 4.2 menunjukkan hasil distribusi sampel pekerjaan responden diperoleh hasil bahwa 50 responden (83.3%) merupakan responden yang sehari-harinya bekerja. Berdasarkan penelitian sebelumnya, bekerja pada masa kehamilan tidak begitu berperan pada berat badan lahir bayi. Namun, pada penelitian Zulardi (2014), BBLR terjadi pada 5.5% ibu hamil yang sebagian besar aktivitas kerjanya dilakukan dengan berdiri. Pekerjaan yang diduga berpengaruh pada berat badan lahir bayi adalah pekerjaan yang sebagian besar aktivitas kerjanya dilakukan dengan berdiri sehingga memberikan beban berlebih pada kandungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel yang bekerja (PNS, guru, wiraswasta, pegawai

swasta, dan buruh) yang berjumlah 50 orang (83.3%) dan yang tidak bekerja sebanyak 10 orang (16.7 %). Pada penelitian ini, pengaruh pekerjaan ibu dengan kejadian BBLR juga termasuk salah satu faktor penyebab BBLR.

Pemeriksaan rutin kehamilan atau ANC juga berpengaruh pada kejadian BBLR. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar dapat dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan hasil distribusi sampel status ANC responden bahwa sebagian besar sampel memeriksakan kehamilannya secara teratur sebanyak 45 orang (75 %) dan yang tidak teratur melakukan ANC sebanyak 15 orang (25 %). Hasil penelitian ini menunjukkan pemeriksaan ANC yang tidak teratur meningkatkan risiko kelahiran bayi BBLR sebesar 6.0 kali. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zulardi (2014) di mana ibu hamil yang tidak rutin melakukan pemeriksaan ANC memiliki risiko lima kali lebih besar melahirkan bayi BBLR daripada ibu hamil yang rutin melakukan pemeriksaan ANC.

1. Berat Badan Bayi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ibu perokok pasif yang melahirkan dengan BBLR kategori ringan sebanyak 52 orang (86.7%), BBLR dengan kategori sedang sebanyak 8 orang (13.3%). Peneliti berasumsi bahwa ibu perokok pasif yang melahirkan bayi berat lahir rendah selama kehamilan tidak teratur memeriksakan kehamilannya selama hamil dan gizi selama hamil juga tidak tercukupi. Jika asupan makanan yang dikonsumsi ibu tidak sesuai dengan ibu selama hamil maka dapat menyebabkan terjadinya kelainan anemia pada bayi. Jika anemia terjadi pada bayi selama kandungan maka berat badan yang akan dilahirkan kurang dari berat badan bayi normal. Terjadinya bayi berat lahir rendah karena adanya komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada ibu dimasa kehamilan diantaranya adalah faktor makanan ibu, jika asupan makanan yang dikonsumsi ibu tidak sesuai dengan kebutuhan selama kehamilan maka dapat menyebabkan berat badan bayi yang akan dilahirkan kurang dari berat badan normal.

Konsumsi makanan yang tepat sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi. Makanan yang mengandung nutrisi tepat bagi pertumbuhan dan kombinasi makanan yang tepat dapat menjamin asupan makanan yang tepat. Selama masa hamil, seluruh kebutuhan nutrisi termasuk protein, vitamin, dan mineral meningkat. Kebutuhan vitamin C dan seng meningkat sekitar 40%. Sedangkan zat besi meningkat 50%. Karena itulah, ibu harus mengonsumsi makanan yang cukup gizi. Ibu hamil juga harus menghindari nikotin, tar, dan karbon monoksida adalah zat kimia yang berhubungan dengan rokok. Jika ibu merokok atau terpapar asap rokok sebelum atau sesudah bayi lahir, maka hal tersebut dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Semakin cepat ibu menghentikan kebiasaan rokok, maka semakin baik kesehatan janin.

2. Perokok Pasif

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 60 orang ibu sebagai perokok pasif (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar didapatkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP2 (Lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok) kategori lingkungan rumah dengan BBLR ringan adalah 46 responden (92%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (8%) dan untuk variabel PP2 kategori lingkungan tempat kerja dengan BBLR ringan adalah 6 responden (60%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (40%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,021 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar didapatkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP3 (Asal utama paparan asap rokok di dalam rumah) kategori suami dengan BBLR ringan adalah 46 responden (92%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (8%) dan untuk variabel PP3 kategori anggota keluarga lain dengan BBLR ringan adalah 6 responden (60%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (40%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,021 yang

lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP3 dengan BBLR responden.

Dari kedua variabel diatas menurut penelitian, paparan asap rokok yang ibu hamil hirup selama di rumah berasal dari suami ibu hamil yang berstatus sebagai perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, lima kali lebih banyak mengandung karbon monoksida, empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin. Wanita yang terpapar asap rokok cenderung lebih sering mengalami gangguan pada kehamilannya karena kandungan zat kimia pada perokok pasif lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Merokok di ruangan tertutup akan meningkatkan konsentrasi partikel asap rokok sebagian diantaranya toksik (racun). Menurut penelitian asap rokok dapat tertinggal lama dalam suatu ruangan, toksin yang terkandung dari asap rokok melekat pada pakaian, tertinggal dalam ruangan, pintu dan perabotan yang ada di sekitarnya selama beberapa minggu dan bulan setelah digunakan untuk merokok. Pada saat pintu dan jendela dibuka atau kipas angin dinyalakan maka toksin akan kembali ke udara di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan wanita dengan suami perokok atau tinggal di lingkungan yang terdapat banyak perokok akan menjadi perokok pasif. Kehadiran perokok menyebabkan *respirable particulates* menjadi 3 hingga 12 kali lebih tinggi di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Jadi dalam penelitian ini seorang suami yang merokok di dalam rumah cenderung meningkatkan risiko terpaparnya asap rokok oleh ibu hamil, terutama pada trimester 2, masa dimana terjadinya proses penyempurnaan organ sehingga jika terpapar asap rokok dapat mengakibatkan gangguan pada kehamilannya (Husaini, 2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar didapatkan bahwa banyaknya responden untuk variabel PP4 (Asal utama paparan asap rokok dilingkungan luar rumah) kategori lingkungan rumah dengan BBLR ringan adalah 4 responden (50%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 4 responden (50%), untuk variabel PP4 kategori teman kerja dengan

BBLR ringan adalah 44 responden (93,6%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 3 responden (6,4%), dan untuk variabel PP4 kategori tetangga dengan BBLR ringan adalah 4 responden (80%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 1 responden (20%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,003 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP4 dengan BBLR responden.

Tidak dapat dihindari ketika paparan asap rokok terjadi pada saat ibu hamil sedang beraktifitas diluar rumah seperti pada hasil penelitian didapatkan bahwa asal utama ibu hamil yang terpapar asap rokok di lingkungan luar rumah yaitu pada teman kerja yaitu 93,6%. Menjadi perokok pasif merupakan hal yang berbahaya karena racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang tak dihisap. Bila ibu hamil yang berada dekat dengan suami atau keluarga bahkan orang lain yang sedang merokok setiap hari (perokok aktif), maka semakin berisiko mengalami gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berhubungan dengan kehamilan. Racun rokok dalam tubuh perokok aktif terfilter melalui ujung rokok yang dihisap, hal ini sangat berbahaya terutama pada kondisi seorang ibu yang sedang hamil. Dampak dari terpaparnya asap rokok pada saat hamil ialah bayi lahir dengan berat lahir rendah, kelahiran prematur, ibu yang terpapar asap rokok selama kehamilan memiliki peluang lebih besar melahirkan bayi berat lahir rendah karena kandungan karbon monoksida dalam rokok yang dapat mengganggu kerja hemoglobin dalam mengikat oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga janin dalam kandungan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi, memperparah asma dan alergi pada bayi juga sindrom kematian bayi mendadak (Amiruddin *et al.*, 2017).

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Telah ditetapkan larangan merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum, maka dari itu akan dikenakan

pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu, Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa. Namun, sanksi yang di tetapkan masih belum di terapkan sehingga belum memberi efek jera bagi perokok, melihat masih banyak orang yang merokok di tempat umum, sedangkan di tempat umum terdapat banyak orang diantaranya ibu hamil yang menyebabkan kemungkinan terpapar asap rokok meningkat. Jadi dalam penelitian ini kemungkinan ibu hamil terpapar asap rokok selain di rumah meningkat pada saat ibu melakukan aktifitas di luar rumah setiap hari terutama pada ibu hamil trimester kedua.

Hasil penelitian yang didapatkan dari ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu yaitu >1 kali dengan BBLR ringan adalah 42 responden (93,32%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 3 responden (6,7%) dan untuk variabel PP5 kategori 1 kali dengan BBLR ringan adalah 10 responden (66,7%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 5 responden (33,3%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,019 yang lebih kecil dari taraf alpha 0,05 sehingga hipotesis H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP5 dengan BBLR responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ibu hamil terpapar asap rokok dengan waktu 15-60 menit dan jumlah paparan asap rokok yang diakibatkan oleh perokok aktif disekitarnya sebanyak lebih dari 1 kali perhari. Dan di tempat umum ibu hamil juga dapat terpapar asap rokok selama 15-60 menit, seperti di cafe, mall, dan angkutan umum.

Hasil penelitian yang didapatkan dari frekuesni waktu ibu hamil terpapar asap rokok dalam satu hari yaitu <15 menit dengan BBLR ringan adalah 1 responden (33,3%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 2 responden (66,7%) dan untuk variabel PP6 kategori >15 menit dengan BBLR ringan adalah 51 responden (89,5%) sedangkan BBLR sedang berjumlah 6 responden (10,5%). Hasil uji hubungan menunjukkan nilai p sebesar 0,044 yang lebih kecil dari taraf

alpha 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PP6 dengan BBLR responden.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan (Cheng, 2015) yang bertujuan untuk menilai distribusi jaringan dan kemampuan nikotin mencapai jaringan dan kemampuannya untuk meningkatkan protein dan DNA pada level paparan tertentu dari sebatang rokok. Penelitian ini menggunakan radioaktif yang berlabel nikotin sebagai tiruan dan sampel dianalisis dengan *accelarator mass spectrometry*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa label nikotin muncul pada liver, paru-paru, testis, otak, dan plasenta. Kadar tertinggi muncul pada plasenta. Level kerusakan jaringan terlihat 15-60 menit setelah paparan dan menurun setelahnya. Seseorang yang dikatakan perokok berat adalah bila mengkonsumsi rokok 21-30 batang sehari dengan waktu 6-30 menit. Perokok sedang menghabiskan rokok 11-21 batang perhari dengan waktu 31-60 menit. Perokok ringan menghabiskan rokok < 10 batang perhari dengan waktu 60 menit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reponden yang terpapar asap rorkok, yakni sebanyak 60 orang (100%), dengan kategori BBLR ringan memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 52 responden (86.7%) sedangkan sisanya dengan BBLR sedang sebanyak 8 responden (13.3%).

Paparan asap rokok pada ibu hamil perokok pasif berasal dari paparan rokok orang lain yang dihirup oleh ibu hamil. Ibu hamil biasanya terpapar asap rokok oleh pasangannya atau rekan kerja. Asap rokok sangat berbahaya bagi perokok pasif dimana asap rokok yang berasal dari perokok aktif yang terhirup 5 kali lebih banyak mengandung gas karbon monoksida dan 4 kali lebih banyak mengandung tar serta nikotin. Tar merupakan salah satu radikal bebas yang terkandung dalam asap rokok yang dapat merusak komponen dari sel di dalam tubuh dan dapat mengganggu elastisitas membran, termasuk selaput ketuban sehingga rentan mengalami ruptur (Venditti, 2010).

Nikotin adalah senyawa alkaloid toksik bersifat adiktif sehingga menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Efek dari penggunaan nikotin

dapat merusak sistem syaraf, mempersempit pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Jumlah nikotin yang masuk ke dalam tubuh tergantung dari jumlah tembakau yang terkandung di dalam rokok, kualitas rokok, menggunakan filter, lama dan dalamnya isapan. Menurut Guan *et al.*, (2009) nikotin dalam asap rokok dapat memacu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin, yang merangsang peningkatan denyut jantung dan tekanan darah sehingga dapat mengubah denyut jantung janin dan aliran darah umbilikal, dan menginduksi hipoksia pada janin.

Karbon monoksida (CO) memiliki afinitas 250 kali lebih besar daripada molekul oksigen (O₂) untuk berikatan dengan Hb sehingga membatasi pelepasan O₂ ke jaringan, dan dapat menyebabkan hipoksia pada janin. Hb dapat terisi oleh karbon monoksida (CO) dalam bentuk COHb, dan akibatnya sel darah merah akan kekurangan oksigen yang akhirnya sel tubuh akan kekurangan oksigen. Selain itu, kandungan nikotin dan karbondioksida dapat menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah, akibatnya aliran darah dari janin melalui tali pusar akan berkurang. Hal ini mengurangi distribusi zat makanan yang dibutuhkan oleh janin dan kemampuan mengikat hemoglobin dalam darah menjadi berkurang sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang (Noriani *et al.*, 2015)

Paparan kronik Pb (timah hitam) berkadar rendah pada asap rokok dapat menyebabkan akumulasi Pb pada tubula renalis, paru-paru, hepatosit, dan jaringan. Sudah banyak diketahui bahwa Pb paling banyak terakumulasi pada tulang. Pb yang terakumulasi pada tulang ibu akan dilepaskan selama waktu kehamilan yang akan menyebabkan paparan Pb pada janin. Peningkatan kadar Pb pada darah ibu hamil dapat menjadi faktor resiko dari terjadinya hipertensi gestasional/preeklampsia, abortus spontan, dan kelahiran prematur. Selain itu, paparan dosis rendah dari Pb juga dapat menyebabkan efek samping pada berat lahir dan gangguan perkembangan pada anak (Magdalena *et al.*, 2013)

Selain paparan Pb, Radikal bebas yang juga terkandung dalam asap rokok sangat berbahaya bagi pertumbuhan janin. Radikal hidroksi dapat menimbulkan reaksi berkesinambungan yang dikenal dengan peroksidasi lipid dan menghasilkan senyawa toksik. Nitrogen dioksida dapat merusak membran memulai proses peroksidasi lipid, sehingga dapat menyebabkan vasokonstriksi.

Hasil akhir dari peroksidasi lipid yang lama bertahan dalam darah adalah *malonialdehyde*. *Malonialdehyd* ini adalah produk akhir dari peroksidasi lipid yang menggambarkan terjadinya stress oksidatif. stress oksidatif pada plasenta dan sistem sirkulasi akan membuat disfungsi dan kerusakan pada sel endotel (Rufaridah, 2012)

BBLR adalah bayi yang lahir rendah berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berhenti merokok atau menghindari ruangan yang penuh asap rokok adalah merupakan salah satu gaya hidup yang perlu diperhatikan dan merupakan awal yang baik bagi bayi. Merokok selama hamil atau terpapar asap rokok selama kehamilan berkaitan dengan keguguran, perdarahan vagina, kelahiran prematur dan BBLR (2000 gram lebih ringan dari bayi bukan perokok). Jika usia ibu di atas 35 tahun ada juga kenaikan berarti dalam risiko bayi menderita malformasi minor dan risiko BBLR, dengan segala bahaya yang menyertai, sebanyak 5 kali lipat dari perokok muda.

Penelitian Rasyid (2012) menunjukkan bahwa keterpaparan asap rokok selama kehamilan berpengaruh signifikan sebesar 4,2 kali lebih berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak terpapar asap rokok. Pengaruh buruk dari asap rokok adalah menyebabkan gangguan pada plasenta. Plasenta memperluas wilayah di dalam rahim untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi pada janin. Hal ini mengakibatkan lapisan plasenta semakin menipis dan kemungkinan letak plasenta menjadi lebih rendah atau plasenta previa. Dalam kehamilan, plasenta akan berfungsi sebagai alat respiratorik, metabolik, nutrisi, endokrin, penyimpanan, transportasi dan pengeluaran dari tubuh ibu ke tubuh janin atau sebaliknya. Jika salah satu atau beberapa fungsi di atas terganggu, maka janin dan plasenta akan bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang terpapar asap rokok, bayinya akan menderita BBLR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status perokok pasif dan status BBLR, jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa total responden dengan status perokok pasif berdasarkan status BBLR

adalah 60 orang (100%) dengan kategori BBLR ringan memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 52 responden (86.7%) sedangkan sisanya dengan BBLR sedang sebanyak 8 responden (13.3%).

Setiap penelitian memiliki keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga ada keterbatasan dalam interaksi secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Oleh karena itu, sangat sulit mencari waktu yang tepat untuk bertemu responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar yaitu “Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan ibu hamil yang paling sering terpapar asap rokok dengan BBLR dengan nilai *p-value* 0,021.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara asal utama paparan asap rokok di dalam rumah dengan BBLR dengan nilai *p-value* 0,021.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara asal utama paparan asap rokok di lingkungan luar rumah dengan BBLR dengan nilai *p-value* 0,003.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara ibu hamil yang terpapar asap rokok dalam satu minggu dengan BBLR dengan nilai *p-value* 0,019.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi waktu ibu hamil terpapar asap rokok dalam satu hari dengan BBLR dengan nilai *p-value* 0,044.

B. Saran

1. Edukasi terhadap suami dan keluarga ibu hamil mengenai bahaya asap rokok yang tidak hanya berdampak kepada perokok aktif tapi juga berdampak pada perokok pasif yaitu ibu hamil dan janinnya.
2. Pemasangan tanda dilarang merokok pada lingkungan kerja untuk melakukan aktivitas merokok di tempat terpisah terutama tidak merokok di dekat ibu hamil.
3. Mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai efek asap rokok terhadap janin dengan jumlah sampel yang representatif, populasi yang lebih luas dan lebih mengontrol variabel perancu.

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Maktabah Syamilah), Jil. II, 364
- Andriana H, Kuo HW. Adverse effects of parental smoking during pregnancy in urban and rural areas. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2014;14(1):1-15.
- Amiruddin, R. Hasmi. (2014). *Determinan Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Trans Info Media.
- Amiruddin, Ridwan. *Status Gizi Ibu Hamil, Rokok, dan Efeknya*. Makasar: Universitas Hassanudin; 2017.
- Arda Darmi, 2015. *Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di Ruang PNC RSUD Kota Makassar*.
- Asma Siti, 2018. *Hubungan Paparan Rokok Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di RSIA Sitti Khadijah III*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar.
- Aula LE, 2010. *Stop Merokok*. Garailmu. Yogyakarta.
- Cunningham dan Garry F, 2017. *Obstetri Williams Edisi 21 Vol 2* [Hartono et al.,trans]. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Demelash H, et al. 2015. *Risk Factors for Low Birth Weight*. *BMC Pregnancy and Childbirth*. Vol.15, p.264.
- Departemen Obstetri dan Ginekologi. 2014. *Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo. Kehamilan Ganda (Lebih Dari Satu Janin atau Multifetus)*
- Dinkes. 2014 “Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014”, Jakarta : Kementerian Republik Indonesia.
- Dinkes.2016 “Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015” Jakarta : Kementerian Republik Indonesia.
- Dinkes Kota Makassar. 2017 “Profil Kesehatan Kota Makassar”, Jakarta : Kementerian Republik Indonesia
- Drope, J, Neil, W 2018, *The Tobacco Atlas*, 6th edition, The American Corner Society, Atlanta.
- Eftekhar, M., Pourmasumi, S., Sabeti, P., & Mirhosseini, F. (2016). Relation of Second Hand Smoker and Effect on Pregnancy Outcome and Newborns Parameters. *Women's Health & Gynecology*, 2(2), 022.
- Fadlun,dkk.2011. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta : Salemba Medika.

- Fajriana Amima, Annas Buanasita, 2018. Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kecamatan Semampir Surabaya. *Media Gizi Indonesia*: 13(1). Diakses pada 23 Oktober 2020 (Smitten, J, 2011).
- Festy,Pipit.2010.Analisis Faktor Resiko pada Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Sumeneb. Surabaya : Program Study Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Guan W, Tithof PK, Elgayyar M, Cho Y, Fisher AB, Peters-Golden M. Polycyclic aromatic hydrocarbons present in cigarette smoke cause endothelial cell apoptosis by a phospholipase A2-dependent mechanism. *J Fed Am Societ Experiment Biol*; 2009: 1463-4 (16).
- Hasriyani, dkk, 2018. Berbagai Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Studi di Beberapa Puskesmas Kota Makassar. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas (JEKK)*, Vol.3, No.2.
- Husaini, Aiman.Tobat Merokok.Bandung: Mizan Medika Utama; 2017.
- Indrasari Nelly, 2012. Faktor Risiko Pada Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Keperawatan*, Volume VIII, No.2.
- Juniarti Risna, 2014. Faktor-Faktor Placenta Yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta Tahun2012-2013. *Naskah Publikasi*, Program Studi Diploma Bidang Pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah: Yogyakarta.
- Kemenkes RI. 2018. Infodatin: Hari Tanpa Tembakau Sedunia.
- Khan A, Farah DN, Riffat. *Frequency And Risk Factors Of Low Birth Weight In Term Pregnancy*. *Pak J Med Sci*, 2016; 32 (1): 138-142.
- Khattar, Divya., Awasthi, S., Dav, V. 2013. Residential Environment Tobacco Smoke Exposure During Pregnancy and Low Birth Weight of Neonatus Case Control Study in a Public Hospital in Lucknow, India. India: Depertemen of Pediatrics and Obstetrics and Gynecology.
- Lee J, Taneja V, Vassalo R. 2012. Cigarette Smoking and Inflammation: Cellular and Molecular Mechanisms. *J Rent Des*, 91(2): 142-149
- Lestari Reny Diah, dkk, 2015. Hubungan Umur, Paritas, dan Preeklampsia Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Dr.H.Moh. Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Dinamika Kesehatan* Vol.6, No.1 Juli.
- Muhammad Bin Abdullah. 2005. Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syaf'i.
- Muhammad Yunus. (2009). Kitab Rokok, Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan. Yogyakarta: CV Kutu Wacana. hlm. 50.

- Merzalia, Nita. 2012. Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2011. Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia.
- Muazizah, 2011. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dengan Berat Bayi Lahir di RS Permata Bunda Kabupaten Grobongan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muryunani, Anik. 2013. Asuhan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah. Jakarta: Trans Info Media.
- Noriani N, Artawan E dan Mangku K. Paparan Asap Rokok dalam Rumah terhadap Risiko Peningkatan Kelahiran Bayi Prematur di Kota Denpasar. Denpasar: Public Health And Preventive Medicine Archive; 2015: 3(1).
- Nuning Saraswati, Mardiana. 2016. *Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil*. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.
- Nur R, Arifuddin A, Novila R. 2016. Analisis Faktor Risiko Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah Di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Preventif.
- Nursusila, Ruslan M., La Ode Ali I. A. 2017. Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
- Ningsih, Yuni Setia. 2007. Birul VS Birul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ohlsson, A., & Shah, P. 2008. *Determinant and Prevention of Low Birth Weight: A Synopsis of The Evidence*. (Institute of Health Economics, 2008).
- Prawirohardjo Sarwono. 2008. Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo Sarwono. 2010. Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Proverawati Atika Dan Cahyo Ismawati. 2010. Berat Badan Lahir Rendah. Yogyakarta: Nuha Media.
- Pogodina, C., dkk. 2009. *Smoke-Free Homes for Smoke Free Babies: The Role of Residential Environmental Tobacco Smoke on Low BirthWeight*. Carolina, USA. Department of Public Health Science, The University of North Carolina.
- Rasyid, Puspita Sukmawaty, dkk. Faktor Resiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2012. Makassar: Bagian Biostatistik dan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin; 2012.

- Sulistiyani Karlina, 2014. Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2012-2014. Laporan skripsi, Pemintan Epidemiologi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supiati.2016. Karakteristik Ibu Kaitannya dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 1(1): 1-99.
- Sujoso,dkk.2011. Tempat Kerja dan Bahaya Reproduksi. Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Septira S. 2016. Nutrisi Bagi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) untuk Mengoptimalkan Tumbuh Kembang. *Jurnal Majority.*; Vol.5 No.3.
- Triana, Anin. 2014. Pengaruh Penyakit Penyerta Kehamilan Ganda dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Program Studi D III Kebidanan Stikes Hang Tuah Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.2, No.5, November.
- TCSC-IAKMI.2010.Bunga Rampai Fakta Tembakau Permasalahannya Di Indonesia 2009. Tobacco Control Support Center (TCSC)-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Jakarta : TCSC-IAKMI;2010.
- Utami, dkk.2015. "Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Kehamilan di Poli Hamil RSD dr. Soegiri Lamongan." *Jurnal Surya*, No.05, April 2015.
- Venditti, L. Thesis: Production Schedulling In Pharmaceutical Industry Roma: Dept. of Computer Science and Automation Roma Tre University; 2010.
- Walker, Cheng (2015). *Pengaruh nikotin selama 1-2 minggu terhadap jumlah sel spermatis primer, spermatid pada mencit.*
- Walyani ES.2014. *Kebidanan Komunitas*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press Elisabeth Siwi Walyani.
- World Health Organization. (2014). *Care of the Preterm and Low Birth Weight Newborn* dalam https://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/prematurity/en/
- World Health Organization. (2018). *Care of the Preterm and Low Birth Weight Newborn* dalam https://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/prematurity/en/
- Zulardi R. Hubungan lingkungan perokok dengan ibu hamil terpapar asap rokok terhadap kejadian bayi berat lahir rendah di Surakarta. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Surakarta; 2014.

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

HUBUNGAN ANTARA PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN DENGAN

BAYI BERAT LAHIR RENDAH YANG DILAHIRKAN

DI RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2019

Saya yang bernama Nur Intan Cahyani Nim 70600117049 adalah mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian, penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Untuk keperluan tersebut dan agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan antara perokok pasif pada kehamilan dengan bayi berat lahir rendah. Saya selaku peneliti mengharapkan partisipasi saudara sebagai responden dalam penelitian ini dan sebagai bukti shahih dalam penelitian.

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat suka rela. Apabila saudara bersedia menjadi responden dalam penelitian saya, maka saudara dipersilahkan menandatangani formulir dibawah ini. Apabila saudara tidak menginginkan menjadi responden dalam penelitian saya, saudara berhak menolak dan tidak ikut serta dalam penelitian ini.

Terima kasih atas partisipasi saudara untuk penelitian ini.

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Telp/Hp :

Setelah saya mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian “Hubungan Antara Status Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar tahun 2019-2020”. Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Takalar, 2021
M A K A S S A R (A R)

Lampiran 3

LEMBAR IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN

Hubungan antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar tahun 2019-2020

Petunjuk pengisian :

Isilah data yang tersedia sesuai dengan identitas responden.

Data Demografi

Nama :
Umur : <20 tahun / 20-35 tahun / >35 tahun
Alamat :
Umur kehamilan saat melahirkan :
Pekerjaan : Bekerja / Tidak Bekerja

Frekuensi ANC

1. Pada saat ibu hamil, apakah ibu pernah memeriksakan kehamilan?
 - a. Ya (jika iya lanjut pertanyaan nomor 2)
 - b. Tidak
2. Berapa kalikah selama kehamilan ibu memeriksakan kehamilan?
 - a. Kehamilan 0 bulan – 3 bulan (..... kali)
 - b. Kehamilan 4 bulan – 6 bulan (..... kali)
 - c. Kehamilan 7 bulan – 9 bulan (..... kali)

Kondisi bayi saat lahir

1. Apakah terdapat cacat bawaan pada bayi ibu saat lahir?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah terdapat kejadian ketuban pecah dini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Riwayat hipertensi pada kehamilan

1. Apakah terdapat riwayat hipertensi pada kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Riwayat konsumsi alkohol

1. Apakah terdapat riwayat mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan selama kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4
Pertanyaan :

Lembar kuesioner perokok pasif

1. Apakah selama hamil ibu pernah terpapar asap rokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Dimana paling sering ibu pernah terpapar asap rokok? (Jawaban bisa lebih dari satu)
 - a. Lingkungan rumah
 - b. Lingkungan tempat kerja
 - c. Tempat-tempat umum
3. Darimana asal utama paparan asap rokok di dalam rumah tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu)
 - a. Suami
 - b. Anggota keluarga lain
 - c. Tamu
4. Dari mana asal utama paparan asap rokok di lingkungan luar rumah? (Jawaban bisa lebih dari satu)
 - a. Tetangga
 - b. Teman kerja
 - c. Orang lain
5. Dalam satu minggu berapa kali ibu terpapar asap rokok selama hamil?
 - a. 1 kali
 - b. >1 kali
6. Dalam satu hari, kira-kira berapa lama (menit) ibu terpapar asap rokok?
 - a. <15 menit
 - b. >15 menit

Lampiran 5

LEMBAR OBSERVASI BAYI BERAT LAHIR RENDAH

PETUNJUK PENGISIAN

1. Beri tanda check list (√) pada kolom yang telah tersedia.

No	Pernyataan	Berat badan bayi (gram)		
		1500-2500 gram	1000-1500 Gram	< 1000 gram
1.	berat badan bayi lahir			

Lampiran 6

Lampiran Hasil Pengelolaan Data SPSS

LAMPIRAN ANALISIS

Crosstabs

Notes		
Output Created		17-JUL-2021 13:34:18
Comments		
Input	Data	D:\Office\SPSS\Data Nur Intan.sav
	Active Dataset	DataSet126
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	60
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES=PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 BY BBLR /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00.06
	Elapsed Time	00:00:00.00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	349496

M A K A S S A R

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PP2 * BBLR	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%
PP3 * BBLR	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%
PP4 * BBLR	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%
PP5 * BBLR	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%
PP6 * BBLR	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%

PP2 * BBLR

Crosstab					
			BBLR		Total
			Ringan	Sedang	
PP2	L.R	Count	46	4	50
		% within PP2	92.0%	8.0%	100.0%
	L.T.K	Count	6	4	10
		% within PP2	60.0%	40.0%	100.0%
Total		Count	52	8	60
		% within PP2	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.385 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	4.875	1	.027		
Likelihood Ratio	5.784	1	.016		
Fisher's Exact Test				.021	.021
N of Valid Cases	60				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.33.

b. Computed only for a 2x2 table

PP3 * BBLR

Crosstab					
			BBLR		Total
			Ringan	Sedang	
PP3	Suami	Count	46	4	50
		% within PP3	92.0%	8.0%	100.0%
	T.K	Count	6	4	10
		% within PP3	60.0%	40.0%	100.0%
Total		Count	52	8	60
		% within PP3	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.385 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	4.875	1	.027		
Likelihood Ratio	5.784	1	.016		
Fisher's Exact Test				.021	.021
N of Valid Cases	60				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.33.

b. Computed only for a 2x2 table

PP4 * BBLR

Crosstab					
			BBLR		Total
			Ringan	Sedang	
PP4	Orang lain	Count	4	4	8
		% within PP4	50.0%	50.0%	100.0%
	T.K	Count	44	3	47
		% within PP4	93.6%	6.4%	100.0%
	Tetangga	Count	4	1	5
		% within PP4	80.0%	20.0%	100.0%
Total		Count	52	8	60
		% within PP4	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.465 ^a	2	.003
Likelihood Ratio	8.713	2	.013
N of Valid Cases	60		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.

PP5 * BBLR

Crosstab					
			BBLR		Total
			Ringan	Sedang	
PP5	>1 kali	Count	42	3	45
		% within PP5	93.3%	6.7%	100.0%
	1 kali	Count	10	5	15
		% within PP5	66.7%	33.3%	100.0%
Total		Count	52	8	60
		% within PP5	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.923 ^a	1	.009		
Continuity Correction ^b	4.808	1	.028		
Likelihood Ratio	5.982	1	.014		
Fisher's Exact Test				.019	.019
N of Valid Cases	60				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

b. Computed only for a 2x2 table

PP6 * BBLR

Crosstab					
			BBLR		Total
			Ringan	Sedang	
PP6	<15 mnt	Count	1	2	3
		% within PP6	33.3%	66.7%	100.0%
	>15 mnt	Count	51	6	57
		% within PP6	89.5%	10.5%	100.0%
Total		Count	52	8	60
		% within PP6	86.7%	13.3%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.773 ^a	1	.005		
Continuity Correction ^b	3.674	1	.055		
Likelihood Ratio	4.941	1	.026		
Fisher's Exact Test				.044	.044
N of Valid Cases	60				
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.					
b. Computed only for a 2x2 table					

FREQUENCIES VARIABLES=Usia Pekerjaan ANC BBLR PP2 PP3 PP4 PP5 PP6
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes		
Output Created		17-JUL-2021 13:38:17
Comments		
Input	Data	D:\Office\SPSS\Data Nur Intan.sav
	Active Dataset	DataSet126
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	60
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Usia Pekerjaan ANC BBLR PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.00

Statistics									
		Usia	Pekerjaan	ANC	BBLR	PP2	PP3	PP4	PP5
N	Valid	60	60	60	60	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Frequency Table

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 tahun	7	11.7	11.7	11.7
	20-35 tahun	36	60.0	60.0	71.7
	> 35 tahun	17	28.3	28.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	50	83.3	83.3	83.3
	Tidak bekerja	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

ANC					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Teratur	45	75.0	75.0	75.0
	Tidak teratur	15	25.0	25.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

BBLR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	52	86.7	86.7	86.7
	Sedang	8	13.3	13.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PP2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L.R	50	83.3	83.3	83.3
	L.T.K	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PP3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Suami	50	83.3	83.3	83.3
	T.K	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PP4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang lain	8	13.3	13.3	13.3
	T.K	47	78.3	78.3	91.7
	Tetangga	5	8.3	8.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PP5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>1 kali	45	75.0	75.0	75.0
	1 kali	15	25.0	25.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PP6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<15 mnt	3	5.0	5.0	5.0
	>15 mnt	57	95.0	95.0	100.0

Total	60	100.0	100.0
-------	----	-------	-------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16465/S.01/PTSP/2021
Lampiran:
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor
: B-2133/FKIK/PP.00.9/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR INTAN CAHYANI**
Nomor Pokok : 70600117049
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan
judul :

*** HUBUNGAN ANTARA STATUS PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN DENGAN BAYI BERAT LAHIR
RENDAH ***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl 21 Juni s/d 21 Juli 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan
barcode .
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Peringgal.

SMAP PTSP 21-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





25/6/21

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 22 Juni 2021

Nomor : 199/IP-DPMPTSPKTRANS/VI/2021
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
 Yth. Direktur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle
 Kab. Takalar
 Di-
 Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel Nomor: 14465/S.01/PTSP/2021 Tanggal 11 Juni 2021 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/200/KKBP/2021 tanggal 21 Juni 2021, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR INTAN CAHYANI
 Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 04 Juni 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
 Alamat : BTN Bombong Indah Blok C3 No. 1 Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

“HUBUNGAN ANTARA PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH”

Yang akan dilaksanakan : 18 Juni s/d 18 Juli 2021
 Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



Sos., M. Si
 Pembina Tk. I
 NIP : 19731220 200003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
5. Pertinggal;



SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 011/445/RSUD-HPDN/PM/VY2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suriati, SKM.M.Kes**
Nip : 19700305199103 2 006
Pangkat / Gol. : Pembina / IV.A
Jabatan : Kasi Penelitian dan Pengembangan
BLUD RSUD H. Padjonga Dg Ngalle

Menerangkan Bahwa :

Nama : **Nur Intan Cahyani**
NPM : 70600117049
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar 04 juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat : BTN Bombong Indah Blok C3 No. 1 Kab. Takalar

Yang tersebut namanya di atas benar diizinkan untuk melaksanakan penelitian dengan judul:
"HUBUNGAN ANTARA PEROKOK PASIF PADA KEHAMILAN DENGAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH", *Terhitung* 18 Juni / 18 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 25 Juni 2021

Kasi Penelitian dan Pengembangan



Suriati
Suriati, SKM.M.Kes

NIP. 19700305199103 2 006



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 04/445/RSUD-HPDN/PM/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUHARMAN, S.Sos., M.Si.**
Nip : 19760922 200604 1 012
Pangkat / Gol. : Pembina /IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat RSUD H. Padjonga Dg
Ngalle

Menerangkan Bahwa :

Nama : **NUR INTAN CAHYANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 04 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa SI Kedokteran Universitas Islam Negeri Makassar
Alamat : Btn Bombong Indah

Yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian dengan judul:
"Hubungan Antara Perokok Pasif Pada Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah".
Terhitung 18 Juni s/d 18 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 29 Juni 2021

Kepala bidang pelayanan masyarakat,


JUHARMAN, S.Sos., M.Si.

Nip: 19760922 200604 1 012

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Nur Intan Cahyani
Nama Panggilan : Intan
NIM : 70600117049
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 04 Juni 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Program Studi Pendidikan Dokter/FKIK
Nama Orangtua :
Ayah : Muhammad Irwan
Ibu : Suharnati
Anak Ke : 2
Alamat : BTN Bombong Indah Blok C3/1 Takalar
Telepon : 085242268986
Email : nurintancahyaniz@gmail.com
Riwayat pendidikan :

- TK Andhika Ar-Rahman
- SDN INPRES PARI'RISI'
- SMP Negeri 2 TAKALAR
- SMA Negeri 1 TAKALAR
- UIN Alauddin Makassar



Pengalaman Organisasi :

- PMR
- OSIS SMP
- OSIS SMA
- HMJK UIN Alauddin Makassar Anggota Divisi Kajian Strategi dan Advokasi

Prestasi yang Pernah Diraih : -