

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN *STUNTING* PADA BALITA
USIA 6 BULAN – 23 BULAN DI PUSKESMAS PEKKAE KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kedokteran
Program Studi Pendidikan Dokter Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH:

NUR ALDA FADILLAH

NIM: 70600117026

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Alda Fadillah
NIM : 70600117026
Tempat/Tgl. Lahir : Barru /17 Juli 1999
Jurusan : Pendidikan Dokter
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Kalumpang, No. 37
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita
Usia 6 Bulan – 23 Bulan Di Puskesmas Pekkae
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun
2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2021



Nur Alda Fadillah

NIM: 70600117026

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL : Analisis Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 Bulan
– 23 Bulan Di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
Tahun 2020

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Seminar Hasil
Karya Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Kedokteran

MAKASSAR, 2 JUNI 2021

PEMBIMBING I



dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes

PEMBIMBING II



dr. Raully Rahmadhani M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 Bulan – 23 Bulan Di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020 “, yang disusun oleh Nur Alda Fadillah, NIM 70600117026, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 18 Agustus 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes (.....)

Sekretaris : dr.Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Pembimbing I : dr.Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes (.....)

Pembimbing II : dr.Rauly Rahmadhani, M.Kes (.....)

Penguji I : Dr.dr.Nadyah Haruna, M.Kes (.....)

Penguji II : Ibrahim Manda, S. Pd.I., M.Pd.I (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes
NIP.198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor Risiko Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 6 Bulan – 23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya, kepada Yth:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes.,Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes selaku dosen pembimbing I dan dr. Raully Rahmadhani, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah sabar membimbing dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk koreksi, kritik serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

5. Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes. selaku penguji kompetensi dan Ibrahim Manda, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku penguji integrasi keilmuan.
6. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga penulis yang telah memberi semangat, nasehat, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya di dalam membesarkan dan mendidik penulis, serta yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, beserta seluruh civitas akademik di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang telah memberi bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau yang telah mengizinkan serta membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf bagian gizi Puskesmas Pekkae dan seluruh kader posyandu wilayah Kecamatan Tanete Rilau yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Barru, 18 Mei 2021




Nur Alda Fadillah
NIM. 70600117026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	12
C. Hipotesis.....	12
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Tujuan Penelitian.....	19
G. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Status Gizi.....	21
B. <i>Stunting</i>	25
C. Kerangka Teori.....	40
D. Kerangka Konsep	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42

A. Jenis dan Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Alur Penelitian	45
G. Instrumen Penelitian.....	46
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	46
I. Penyajian Data	47
J. Etika Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian	48
1. Analisis Univariat.....	49
2. Analisis Bivariat.....	60
C. Pembahasan.....	63
1. Riwayat Pemberian ASI Eksklusif.....	63
2. Riwayat pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)	66
3. Riwayat penyakit infeksi	68
4. Pemberian imunisasi balita	74
5. Tinggi badan ibu	76
6. Pendidikan ibu.....	77
7. Pengetahuan ibu tentang gizi balita.....	79
8. Faktor ekonomi	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN 1	96
LAMPIRAN 2	113
LAMPIRAN 3	146
LAMPIRAN 4	247
LAMPIRAN 5	148
LAMPIRAN 6	149
RIWAYAT HIDUP	150



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	13
Tabel 1.2 Indeks Antropometri	24
Tabel 4.1 Distribusi Pemberian ASI Eksklusif pada balita usia 6-23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	50
Tabel 4.2 Distribusi Usia Pertama Pemberian MP-ASI pada balita usia 6-23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020.....	51
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020.....	52
Tabel 4.4 Distribusi Jenis Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020	53
Tabel 4.5 Distribusi Jumlah Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020.....	55
Tabel 4.6 Distribusi Riwayat Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020.....	56
Tabel 4.7 Distribusi Riwayat Diare dan ISPA Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020.....	57
Tabel 4.8 Distribusi Riwayat Penyakit Infeksi Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020.....	57
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dan Sampel Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020	58
Tabel 4.10 Hasil Analisis Chi-Square <i>Pada</i> Karakteristik Sampel dan Responden Terhadap Kejadian <i>Stunting</i> Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Tahun 2020	60
Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian <i>Stunting</i> di Wilayah Kerja Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	40
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	41
Gambar 3.1 Alur Penelitian	45



**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA
6 BULAN – 23 BULAN DI PUSKESMAS PEKKAE KECAMATAN TANETE
RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020**

*Nur Alda Fadillah¹, Andi Alifia Ayu Delima², Raully Rahmadhani³, Nadyah
Haruna⁴, Ibrahim Manda⁵*

*Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Abstrak

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek menurut umur hingga melampaui defisit -2 SD (Standar Deviasi) dibawah median standar panjang atau tinggi badan menurut umur. Balita pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi jangka panjang atau gizi kronis yang dapat dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin dan masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analitik observasional dengan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yaitu 98 balita dengan ibu dari balita sebagai responden. Data diolah dan dianalisis menggunakan uji *Chi-Square* $p < 0.05$ pada program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pemberian MP-ASI (p -value 0.031; 1.36), riwayat penyakit infeksi (p -value 0.005; 1.41), pengetahuan ibu tentang gizi balita (p -value 0.031; 1.36) dan faktor ekonomi (p -value 0.000; 2.71) terhadap kejadian *stunting*. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pemberian ASI eksklusif, imunisasi balita, tinggi badan ibu dan tingkat pendidikan terakhir ibu terhadap kejadian *stunting* dengan nilai p -value > 0.005 . Faktor yang paling dominan pada hasil penelitian ini adalah faktor ekonomi keluarga.

Kata kunci : Balita, *stunting*, riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, faktor ekonomi keluarga

***THE RISK FACTORS ANALYSIS OF STUNTING ON INFANTS AGED
6 – 23 MONTHS AT PEKKAE HEALTH CENTER OF TANETE RILAU
DISTRICT OF BARRU REGENCY IN 2020***

*Nur Alda Fadillah¹, Andi Alifia Ayu Delima², Raully Rahmadhani³, Nadyah
Haruna⁴, Ibrahim Manda⁵*

*Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health UIN Alauddin
Makassar.*

Abstract

Stunting is the impaired growth and development that children experience from poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychosocial stimulation. Children are defined as stunted if their height-for-age is more than two standard deviations below the WHO Child Growth Standards median. The major cause of stunting is a long-term nutritional problem or chronic malnutrition because of the poor nutritional condition of mothers during pregnancy. In addition, poor nutrition on babies during infant period could also contribute to stunting. The major purpose of this research was to investigate the risk factors of stunting on infants aged 6-23 months at Pekkae health center of Tanete Rilau district of Barru regency. A quantitative approach was adopted in this study by using an analytical observational research method and cross-sectional research design. The sampling technique used in this research was purposive sampling where 98 infants with their mothers were selected as the samples of this study. The data of this research were analysed through Chi-Square test of $p < 0.05$ by using SPSS application program. The findings of this research indicated that there are significant relationships between the history of complementary feeding (p -value 0.031; 1.36), the infection history (p -value 0.005; 1.41), the mothers' knowledge on infants' nutrition (p -value 0.031; 1.36), and the family's economical factor (p -value 0.000; 2.71) on the prevalence of stunting. In contrast, there are no significant relationships between the history of exclusive breastfeeding, childhood immunization, mothers' height, and mothers' education level on the prevalence of stunting with the p -value of > 0.005 . From this research, it was evident that the family's economical factor has been considered to be the dominant factor influencing the high prevalence of stunting on infants.

Key words: Infants, *stunting*, history of complementary feeding, infection history, mothers' education, mothers' knowledge, family's economical factor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat. Terhitung sejak hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai usia 2 tahun atau yang dikenal dengan “periode emas” atau “periode kritis”. Pada masa ini balita sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi pada masa ini, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan terhambat. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan tercepat otak juga terjadi di usia di bawah lima tahun pertama kehidupan. Sehingga, Kualitas anak adalah cerminan dari pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan optimal. Salah satu indikator pertumbuhan adalah tinggi atau panjang badan balita (Nimah Khoirun and Nadhiroh, 2015; Hidayat, 2017; Suryana and Fitri, 2019).

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek menurut umur hingga melampaui defisit -2 SD (Standar Deviasi) dibawah median standar panjang atau tinggi badan menurut umur. Balita pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi jangka panjang atau gizi kronis yang dapat dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin dan masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita (Wellina, Kartasurya and Rahfilludin, 2016; Rambitan, Purba and Kapantow, 2019).

Berdasarkan data UNICEF tahun 2017, terdapat 151 juta (22%) balita mengalami *stunting*. Sedangkan, berdasarkan data WHO tahun 2016, prevalensi balita *stunting* di dunia sebesar 22,9% dan keadaan gizi balita pendek menjadi penyebab 2,2 juta dari sebagian besar balita di dunia yang mengalami *underweight*, *stunting* dan *wasting* berasal dari Benua Afrika dan Asia dan lebih dari setengah balita *stunting* di dunia yang berasal dari Asia 55%, sedangkan 39% tinggal di Afrika. Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia (36%) tertinggi

dibandingkan Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%) (UNICEF, 2017; WHO, 2016).

Indonesia termasuk ke dalam Negara ketiga *stunting* tertinggi di South-East Asian Region setelah Timor Leste dan India, meskipun persentase *stunting* di Indonesia turun dari 37,8 % di tahun 2013 menjadi 27,67 % di tahun 2019, namun angka ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, status gizi balita di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun 2013 hingga 2018, prevalensi *stunting* menurun dari 37,2% menjadi 30,8%, namun angka ini masih terbilang tinggi karena prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Oleh karena itu, persentase balita pendek di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi (WHO, 2019; Riskesdas, 2018).

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Diketahui bahwa prevalensi balita pendek atau sangat pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017 (PSG, 2015; Kemenkes RI, 2018).

Prevalensi balita *stunting* Kabupaten Barru yaitu 33%. Persentase *stunting* di Kabupaten Barru pada tahun 2017 yaitu 9,1%, 2018 yaitu 28,6 %, dan 2019 yaitu 17,4%. Berdasarkan hasil PSG Kabupaten Barru tahun 2019 persentase *stunting* di wilayah kerja puskesmas Pekkae yaitu 42,3% dan pada tahun 2020 berdasarkan perhitungan sementara di bulan januari-juni persentase *stunting* meningkat menjadi 52,4% tertinggi kedua setelah puskesmas Madello yaitu 56,3%. Data awal didapatkan jumlah *stunting* di wilayah kerja puskesmas yang ada di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebanyak 1.613 anak. Balita usia 6-23 bulan yang mengalami *stunting* di puskesmas Pekkae pada bulan januari-oktober sebanyak 328 balita (PSG, 2015; Dinkes Kab. Barru, 2020).

Kejadian *stunting* di Indonesia terjadi dalam rentang periode pemberian makanan pendamping ASI, di mana ASI tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Berdasarkan hasil riset terdahulu bahwa faktor risiko kejadian *stunting* pada usia 0-59 bulan adalah praktik pemberian ASI, praktik pemberian MP-ASI, pendidikan Ibu, faktor ekonomi keluarga, dan penyakit infeksi seperti ISPA, malaria dan diare. Kekurangan nutrisi pada masa periode awal kehidupan akan menghambat pertumbuhan fisik yang optimal dan perkembangan kognitif yang akan berdampak pada masa depan balita (Hagos *et al.*, 2017; Chowdhury *et al.*, 2020).

Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual serta kognitif. Anak yang terkena *stunting* hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan risiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR). Balita yang berusia lebih dari dua tahun yang mengalami *stunting* akan sulit mengejar pertumbuhannya. Karena, usia lebih dari dua tahun cenderung bersifat tidak dapat mengejar pertumbuhannya dan penanganan yang diberikan hanya sebatas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Maka dari itu, peneliti mengambil usia 6-23 bulan untuk melakukan deteksi dini faktor risiko *stunting* agar dapat ditanggulangi atau melakukan penanganan yang cepat dan tepat (Apriluana and Fikawati, 2018).

Pada saat ini prioritas pemerintah dalam mengurangi angka kejadian *stunting* yaitu fokus terhadap 1000 hari awal kehidupan, karena pemberian zat gizi selama seribu hari dimulai dari masa konsepsi hingga anak berumur dua tahun merupakan masa kritis bagi kesehatan, kesejahteraan dan kesuksesan anak pada masa mendatang. Indonesia saat ini ikut serta dalam program (SUN – *Scaling Up Nutrition*) yaitu gerakan yang bertujuan untuk memberikan setiap orang pemenuhan makanan yang bergizi. SUN merupakan sebuah inisiatif untuk mempromosikan platform multisektor

pada masalah gizi, seperti penurunan angka *stunting* dan malnutrisi (Nugraheni *et al.*, 2020). Allah berfirman dalam Q.S al- Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنَبِّذُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir al-Misbah dalam karya *Quraish Shihab* menjelaskan bahwa Kata (الوالدات) *al-walida* dalam al-Qur’an berbeda penggunaan dengan kata (امهات) *ummaha* yang merupakan bentuk jamak dari kata (ام) *umm*. Kata *ummaha* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walida* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun (Shihab, 2012).

Abdul Karim Zaidan mengungkapkan, menyusui bayi di samping menjadi kewajiban para ibu, juga merupakan hak mereka. Sayyid Quthb menambahkan bahwa perintah menyusui selama dua tahun penuh merupakan waktu yang ideal baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa dan mental spiritual anak (Zaydan, dalam Saleh, 2018).

Beberapa ulama menerangkan alasan diwajibkan para ibu menyusui, antara lain :

a. Ahmad Mustafa al-Maraghi

Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rektor Universitas al-Azhar dan mantan qadi al-qudat (hakim agung) di Sudan. Ahmad Mustafa al-Maraghi dilahirkan di sebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi dan wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir al-Qur'an yang ditulisnya selama 10 tahun Al-Maraghi merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat al- Qur'an, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain, yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing seperti, berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwa alasan utama diwajibkannya para ibu menyusui anak-anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi menurut kesepakatan para dokter. Ketika masih dalam kandungan bayi ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Ketika ia telah lahir dan terpisah dari ibunya, maka hanya ASI yang cocok dan paling sesuai dengan proses tumbuh kembangnya (Ahmad Mustofa al-Maraghi, dalam Saleh, 2018; Fithrotin, 2018).

b. Muhammad Sayyid Thanthawi

Muhammad Sayyid Thanthawi adalah salah seorang ulama Mesir yang berpengaruh di masa modern dengan multi disiplin ilmu, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Muhammad Sayyid Thanthawi dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Sulaim al-Syarqiyah, Shahaq, Mesir pada tanggal 14 Jumada al-Ula 1347 H, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 1928 dan wafat pada umur 81 tahun hari rabu tanggal 24 Rabi'ul awal tahun 1431 H yang bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2010. Beliau adalah seorang Imam Besar Masjid Al-Azhar yang menempati jabatan tertinggi Syeikh Besar Al-Azhar di atas Mufti di Dar al-Ifta', sekaligus juga merupakan jabatan tertinggi di Institusi Al-Azhar yang berpusat di Kairo, Mesir. Semasa hidupnya, Muhammad Sayyid Thanthawi telah banyak menghasilkan karya-karya yang sangat berguna bagi khazanah keilmuan Islam, salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Qishshah fi al-Qur'an. Ini adalah buku yang mengutarakan kisah-kisah dalam al-Qur'an serta hikmah dari kisah-kisah tersebut. Alasan Muhammad Sayyid Thanthawi mewajibkan para ibu menyusui atas perintah Allah dalam al-Qur'an karena, air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi dalam fase awal kehidupannya, menjaga kesehatan dan pertumbuhan bayi serta melindunginya dari berbagai macam penyakit (Sayyid Thanthawi, Muhammad, dalam Saleh, 2018; Zuhairi Misrawi, 2017).

c. Imam al-Qurthubi

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajy al-Andalusiy al-Qurtubi al-Mufassir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara. Para ulama mengenal sosok Al-Qurtubi sebagai ulama dari kalangan maliki, juga seorang ahli fikih, ahli hadis dan sebagainya. Hal ini karena beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat. Karya beliau ini meliputi berbagai

bidang, seperti tafsir, hadis, qira'at, dan lain sebagainya, salah satu kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa al-Mubin lima Tadammahu min alSunnah wa ai al-Furqan. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa penetapan al-Qur'an tentang bolehnya bayi disapih setelah dua tahun disusui adalah untuk menghindari konflik dan perselisihan antara orang tua (suami istri). Namun, meski syariat menetapkan dua tahun, bayi boleh disapih sebelum mencapai dua tahun itu, jika ada alasan yang dibenarkan serta dengan kesepakatan dan keridaan suami istri. Tentunya hal tersebut tidak boleh sampai membahayakan kondisi bayi (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtub, 2005; Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, dalam Saleh, 2018).

Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban menyusui bagi ibu terhadap anaknya, maka ayah berkewajiban untuk memberi nafkah (makan dan minum) dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik, sehingga ibu dapat menyusui anaknya secara optimal dan kesehatan diri ibu tetap terjaga (Sayyid Thanthawi, Muhammad, dalam Saleh 2018).

Mengingat begitu pentingnya pemberian ASI bagi bayi sebab tidak ada susu atau minuman dan makanan apapun yang sepadan dengan kebaikan ASI. Bahkan bagi para ibu yang tidak dapat menyusui anaknya sendiri sebab alasan-alasan tertentu, Allah melalui firman-Nya dalam al-Qur'an tidak menganjurkan para orang tua untuk memberikan makanan atau minuman lain sebagai pengganti ASI. Akan tetapi Allah Swt membimbing agar orang tua dapat mencarikan perempuan lain untuk menyusukan anak-anak mereka. Allah berfirman dalam Q.S al-Thalaq (65): 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Terjemahnya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ibnu Katsir yang lahir di desa Mijdal, Bashrah bagian timur pada tahun 700 H/ 1301 M, menerangkan ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, kemudian sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun, seandainya sang ibu menyetujui pembayarannya, maka ia lebih berhak menyusukan anaknya (Ibnu Katsir, 2005).

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu, terkecuali jika terdapat masalah di dalamnya, maka tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun. Namun, ibu yang ditalak itu lebih berhak menyusui bayinya dengan upah yang sepadan dikarenakan kasih sayang dan kelembutan ibu terhadap anaknya itu lebih besar dibanding orang lain, di samping ia termasuk orang yang paling berhak merawat dan menyusui anaknya. Oleh karena itu, seorang ayah tidak boleh menyusukan

bayinya kepada wanita lain ketika sang ibu mau menyusunya sendiri (Wahbah al-Zuhaili dalam Ismail, 2018; Saleh, 2018).

Al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rektor Universitas al-Azhar dan mantan qadi al-qudat (hakim agung) di Sudan. Beliau gemar mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing salah satunya, berkonsultasi kepada dokter medis untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya. Beliau menafsirkan ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa hak menyusui dan pemberian nafkah bagi anak-anak, adalah menjadi tanggung jawab para suami, sedangkan hak menjaga dan merawat mereka menjadi tugas para istri. Sehingga bila suami istri itu saling memahami tugas dan kewajibannya terhadap anak yang dimiliki, maka semua hak anak itu akan terpenuhi dengan baik. Namun, apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena dalam keadaan darurat, maka yang harus diperhatikan dari perempuan itu adalah kesehatan dan akhlaknya. Sebab, air susu perempuan yang diminum oleh bayi itu, selain dapat menumbuhkan daging dan tulang dalam tubuhnya, juga dapat mempengaruhi karakter bayi. Bahkan terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmani (Al-Maraghi, dalam Saleh, 2018).

Berdasarkan Kandungan dari kedua firman Allah di atas, Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal bayi harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Apabila terdapat kesusahan dari ibu kandung balita dalam menyusui, maka penyusuan tersebut dapat diserahkan kepada perempuan lain dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan akhlak si pendonor ASI tersebut. Hal ini harus diperhatikan karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh faktor nutrisi, salah satunya yaitu pemberian ASI eksklusif dan sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung dalam ASI tersebut. Dengan adanya pemberian ASI terutama sampai usia dua tahun dapat mempercepat penurunan angka kematian anak dan sekaligus

meningkatkan status gizi anak. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis faktor risiko kejadian *stunting* pada balita di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020 (Murarkar *et al.*, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini, Apa sajakah faktor risiko terjadinya *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 2020.

C. Hipotesis

A. Hipotesis Nol (H0)

Pemberian ASI eksklusif, riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, riwayat pemberian imunisasi, tinggi badan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi balita dan faktor ekonomi keluarga tidak dapat digunakan sebagai faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan –23 bulan.

B. Hipotesis Alternatif (H1)

Pemberian ASI eksklusif, riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, riwayat pemberian imunisasi, tinggi badan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi balita dan faktor ekonomi keluarga dapat digunakan sebagai faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan –23 bulan.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Data	Hasil Ukur
Variabel Independen					
1.	Riwayat pemberian ASI eksklusif	Riwayat pemberian hanya ASI saja untuk bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan.	Kuesioner	Ordinal	1=Tidak Eksklusif 2=Eksklusif
2.	Pemberian MP-ASI	Perilaku ibu dalam memberikan makanan tambahan lain selain ASI dan obat-obatan. Ditinjau dari waktu pemberian MP-ASI, frekuensi MP-ASI, jumlah MP-ASI yang diberikan dalam tiap kali makan dan bentuk MP-ASI yang diberikan.	Kuesioner	Ordinal	1=Tidak Sesuai (Jika cara pemberian MP-ASI seluruhnya atau salah satunya tidak sesuai) 2=Sesuai (Jika cara pemberian MP-ASI sesuai berdasarkan waktu pemberian, frekuensi,

					jumlah dan bentuk MP-ASI yang diberikan).
3.	Riwayat penyakit infeksi	Anak yang memiliki penyakit infeksi yaitu ISPA atau diare lebih dari 3 kali dalam satu tahun.	Kuesioner	Ordinal	1=Memiliki riwayat penyakit infeksi 2=Tidak memiliki riwayat penyakit infeksi
4.	Pemberian imunisasi balita	Pemberian bahan antigen untuk mendapatkan kekebalan adaptif pada tubuh bayi terhadap agen biologis penyebab penyakit.	Kuesioner	Ordinal	1=Tidak lengkap 2=Lengkap
5.	Tinggi badan ibu	Standar tinggi badan ibu normal menurut kementerian kesehatan RI yaitu 147-183 cm yang diukur pada alat ukur.	Kuesioner	Ordinal	1=Berisiko < 147 2= Normal 147-183 cm

6.	Pendidikan ibu	Jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ibu balita.	Kuesioner	Ordinal	1= Rendah (SD, SMP) 2= Tinggi (SMA/SMK, SI/D3)
7.	Pengetahuan ibu tentang gizi balita	Ibu yang mampu menerapkan pengetahuan gizi dalam pemilihan dan pengolahan pangan sehingga mampu memperhatikan gizi yang baik pada balita.	Kuesioner	Ordinal	1= Rendah 2= Tinggi
8.	Faktor ekonomi Keluarga	Kondisi keuangan keluarga berdasarkan tingkat penghasilan rata-rata perbulan yang diperoleh keluarga sesuai dengan UMR Kabupaten Barru	Kuesioner	Ordinal	1=Rendah (Bila jumlah rata-rata pendapatan keluarga per bulanya Rp. <3.100.000 2=Tinggi(Bila jumlah rata-rata pendapatan keluarga per bulannya Rp. ≥3.100.000

Variabel Dependen					
1.	<i>Stunting</i>	Bayi lahir dengan panjang badan menurut umur < 46,1 cm pada bayi laki-laki dan < 45,4 cm pada bayi perempuan atau <-2 standar deviasi.	KMS Balita	Ordinal	1= <i>Stunting</i> (<-2 SD) 2=Normal (\geq - 2=SD sampai \leq 2 SD)

b. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah status gizi yaitu *stunting* pada balita khususnya usia 6 bulan –23 bulan dengan berfokus pada faktor risiko yang mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian lain. Sejauh penelusuran peneliti ada beberapa penelitian serupa namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang serupa:

- a. Penelitian Nur Hadibah Hanum. 2019. “Hubungan Tinggi Badan Ibu dan Riwayat Pemberian MP-ASI dengan Kejadian *Stunting* pada Balita Usia 24-59 Bulan” desain penelitian ini menggunakan cross sectional. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat hubungan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting*. Ibu pendek yang memiliki tinggi badan < 150 cm mempunyai peluang atau risiko lebih besar melahirkan bayi yang *stunting* sebesar 2,04 kali dibandingkan ibu dengan tinggi badan > 150 cm dan riwayat pemberian MP-ASI dengan status *stunting* pada balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Maron. Nilai Odds Ratio 1,568 menandakan bahwa balita yang diberikan MP-ASI dengan tepat sesuai usia berpeluang 1,568 kali tumbuh tidak *stunting* jika dibandingkan dengan balita yang diberikan MP-ASI tidak tepat.
- b. Penelitian Indah Budiastutik dan Muhammad Zen Rahfiludin. 2019. “Risk Factors of Child *stunting* in Developing Countries”. Review ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko apa saja yang dapat menentukan terjadinya *stunting* anak di Negara berkembang. Berdasarkan hasil literature review menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya *stunting* adalah panjang lahir berisiko 16,43 kali, pendidikan ibu yang rendah berisiko 3,27 kali, serta anak yang tinggal di desa berisiko 2,45 kali, BBLR berisiko 4,5 kali, tidak ANC berisiko 3,4 kali, tidak imunisasi berisiko 6,38 kali, dan tidak ASI Eksklusif berisiko 4,0

kali adalah merupakan faktor risiko *stunting* anak di negara berkembang.

- c. Penelitian Dini Nugraheni,dkk. 2020. “Asi Eksklusif dan Asupan Energi Berhubungan Dengan Kejadian *stunting* Pada Usia 6 – 24 Bulan Di Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat inisiasi menyusui dini (IMD), riwayat ASI eksklusif, riwayat asupan energi, dan riwayat asupan protein dengan kejadian *stunting* pada usia 6 – 24 bulan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi analitik observasional dengan pendekatan Cross-sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan asupan energi yang kurang pada anak usia 6- 24 bulan memiliki risiko sebesar 1,495 kali mengalami *stunting* dan memiliki risiko paling kecil 1,178 kali dan paling besar 1,897 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki asupan energi cukup. Anak yang tidak diberikan ASI eksklusif berisiko 1,282 kali mengalami *stunting* dengan risiko paling kecil 1,076 kali dan paling besar 1,527 kali dibandingkan anak yang diberikan ASI eksklusif.
- d. Penelitian Novia Dewi Anggraini. 2019. “Analisis Faktor Risiko Kejadian *stunting* Pada Anak Usia 12–59 Bulan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian *stunting* antara lain berat bayi lahir kurang dari 2500 gram, anemia pada anak, usia ibu saat melahirkan < 18 tahun, usia ibu saat melahirkan ≥ 35 tahun, pendidikan ibu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor risiko kejadian *stunting* pada anak usia 12-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi berat badan saat lahir, anemia pada anak, usia ibu saat melahirkan dan pendidikan ibu.
- e. Penelitian Gladys Apriluana dan Sandra Fikawati. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian *stunting* pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara”. Desain penelitian ini adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan faktor status gizi dengan berat badan lahir < 2.500 gram berpengaruh terhadap

kejadian *stunting* pada anak dan memiliki risiko mengalami *stunting* sebesar 3,82 kali. Faktor pendidikan ibu rendah memiliki pengaruh secara bermakna terhadap kejadian *stunting* pada anak dan memiliki risiko mengalami *stunting* sebanyak 1,67 kali. Faktor pendapatan rumah tangga yang rendah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita sebesar 2,1 kali. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin rendahnya berat badan lahir (BBLR), tingkat pendidikan ibu, pendapatan rumah tangga dan kurangnya higiene sanitasi rumah maka risiko balita menjadi *stunting* semakin besar.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis riwayat pemberian ASI eksklusif sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- b. Menganalisis riwayat pemberian MP-ASI sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- c. Menganalisis riwayat penyakit infeksi sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- d. Menganalisis pemberian imunisasi balita sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- e. Menganalisis tinggi badan ibu sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- f. Menganalisis pendidikan ibu sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.
- g. Menganalisis pengetahuan ibu tentang gizi sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.

- h. Menganalisis pendapatan ekonomi keluarga sebagai faktor risiko peningkatan kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan pengembangan ilmu secara empiris khususnya mengenai faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah serta menanggulangi kejadian *stunting* pada balita dengan mendeteksi dini faktor risikonya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Status Gizi

1) Definisi status gizi

Status gizi balita merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Perlunya perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak di usia balita didasarkan fakta bahwa kurang gizi pada masa emas atau sering kita sebut dengan *golden period*, ini bersifat *irreversibel* (tidak dapat pulih), sedangkan kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak (Sholikah, Rustiana and Yuniastuti, 2017).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta pengatur proses tubuh. Status antropometri gizi dapat dibagi menjadi beberapa indikator, diantaranya adalah indikator Panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) sehingga dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu sangat pendek, pendek, normal dan tinggi ('Auliya C, Woro KH, Budiono I', 2015; Nindyna Puspasari and Merryana Andriani, 2017).

2) Penilaian status gizi

1. Antropometri

Antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh (Supriasa, Nyoma I.D, Bakri, B. Fajar, 2013).

Beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai parameter antropometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi antara lain : (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017)

a. Berat badan

Pengukuran berat badan untuk mengetahui adanya perubahan status gizi dalam jangka pendek. Berat badan dapat menggambarkan massa tubuh yang berkembang sesuai dengan keadaan. Apabila seorang anak dalam keadaan normal atau sehat, berat badan akan berkembang mengikuti pertumbuhan usia. Sementara itu, apabila seorang anak dalam keadaan tidak sehat, berat badan dapat berkembang lebih cepat atau berkurang dari seharusnya (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

b. Tinggi badan atau panjang badan

Tinggi badan atau panjang badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linier. Pertambahan tinggi badan atau panjang terjadi dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat masalah gizi kronis. Istilah tinggi badan digunakan untuk anak yang diukur dengan cara berdiri, sedangkan panjang badan jika anak diukur dengan berbaring (belum bisa berdiri). Anak berusia 0 – 24 bulan diukur dengan ukuran panjang badan dengan menggunakan alat ukur berupa papan kayu *length board*, sedangkan anak berusia lebih dari 0-24 bulan dengan menggunakan alat *microtoise* (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

c. Lingkar kepala

Lingkar kepala dapat digunakan sebagai pengukuran ukuran pertumbuhan lingkar kepala dan pertumbuhan otak, walaupun tidak sepenuhnya berkorelasi dengan volume otak. Pengukuran lingkar kepala merupakan prediktor terbaik dalam melihat perkembangan

saraf anak dan pertumbuhan global otak dan struktur internal (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

d. Lingkar lengan atas (LILA)

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh oleh cairan tubuh. Ukuran LILA digunakan untuk skrining kekurangan energi kronis yang digunakan untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan BBLR (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

2. Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Pemeriksaan fisik dan riwayat medis merupakan metode klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda secara cepat yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Mengukur status gizi dengan melakukan pemeriksaan bagian-bagian tubuh dengan tujuan untuk mengetahui gejala akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui kegiatan anamnesis, observasi, palpasi, perkusi, dan atau auskultasi (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

3. Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

4. Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan

melihat perubahan struktur dan jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (*epidemi of night blindness*). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap (Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, 2017).

3) Indeks antropometri

Indeks antropometri adalah kombinasi antara beberapa parameter. Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/ TB). Batasan untuk kategori status gizi balita menurut indeks BB/U, TB/U, BB/TB menurut WHO dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Choliq, Nasrullah and Mundakir, 2020).

Tabel 1.2 Indeks Antropometri

Indikator	Status Gizi	Z-score
BB/U	Gizi buruk	< -3,0 SD
	Gizi kurang	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Gizi baik	-2,0 SD s/d 2,0 SD
	Gizi lebih	> 2,0 SD
TB/U	Sangat pendek	<-3,0 SD
	Pendek	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Normal	≥-2,0 SD
BB/TB	Sangat kurus	<-3,0 SD
	Kurus	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Normal	-2,0 SD s/d 2,0 SD
	Gemuk	> 2,0 SD

Sumber : Kepmenkes No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak.

B. *Stunting*

1) Definisi *Stunting*

Stunting (kerdil) adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan kurang atau tidak sesuai jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* pada masa yang akan datang tentu akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).

Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik, keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) pada ambang batas <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek atau *stunting*) dan <-3 (sangat pendek). Masalah balita pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, yang dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin, masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan namun juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung memengaruhi kesehatan (Larasati, Nindya and Arief, 2018; Nugraheni *et al.*, 2020).

2) Epidemiologi *Stunting*

Menurut data UNICEF tahun 2017, terdapat 92 juta (13,5% balita di dunia mengalami *underweight*, 151 juta (22%) balita mengalami *stunting*, dan 51 juta (7,5%) balita mengalami *wasting*. Sebagian besar balita di dunia yang mengalami *underweight*, *stunting* dan *wasting* berasal dari Benua Afrika dan Asia (Hanifah, Djais and Fatimah, 2019).

Berdasarkan data WHO tahun 2016, di wilayah Asia Tenggara prevalensi balita *stunting* mencapai 33,8%. Indonesia termasuk ke dalam Negara nomor ke-3 dengan jumlah *stunting* terbanyak. Prevalensi *stunting* di Indonesia secara nasional tahun 2013 adalah 37,2% (terdiri dari 18,0%

sangat pendek dan 19,2% pendek), terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun, prevalensi balita pendek kembali mengalami peningkatan menjadi 29,6% pada tahun 2017 (WHO, 2016; Indrianti, 2019).

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) Sulawesi Selatan tahun 2015 yang dilakukan di 24 kabupaten/kota menunjukkan bahwa prevalensi balita *stunting* pada tahun 2014 sebesar 34,5%. Mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 34,1%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 34,8%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi Sulawesi Selatan di tahun 2017 masih belum mencapai target MDGs. Prevalensi balita *stunting* terbesar yaitu Kabupaten Jeneponto sebesar 47,3%, disusul Kabupaten Pangkep sebesar 44,3% (68 kasus) dan Kabupaten Maros sebesar 42,3%. Sedangkan, Kabupaten dengan Prevalensi rendah yaitu Kota Pare-pare sebesar 19,6%, disusul oleh Kota Palopo sebesar 19,6% dan Kabupaten Bantaeng sebesar 24%. Berdasarkan data awal dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 Jumlah balita yang mengalami masalah gizi di Kecamatan Mariso sebanyak 190 balita (PSG Seksi Gizi Masyarakat, 2015; Riset, 2020).

3) Faktor Risiko *Stunting*

Menurut UNICEF, pada dasarnya status gizi anak dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung, antara lain :

a. MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu)

1. Definisi MP-ASI

Makan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada anak bersamaan dengan ASI, MP-ASI sendiri bersifat untuk melengkapi ASI, bukan untuk menggantikan ASI dan ASI tetap harus diberikan sampai usia 2 tahun diikuti pemberian MP-ASI pada usia 6 bulan. MP-ASI merupakan proses peralihan dari

asupan yang berbentuk susu ke makanan yang semi padat. Masa peralihan ini yang berlangsung antara 6 bulan sampai 23 bulan merupakan masa rawan pertumbuhan anak karena pada masa inilah awal terjadinya malnutrisi yang dapat berlanjut dan berkontribusi pada tingginya prevalensi malnutrisi dan angka kematian bayi dan anak balita (Sri Sudaryati Nasa, 2015; Prihutama, Rahmadi and Hardaningsih, 2018).

World Health Organization (WHO) bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menegaskan bahwa usia hingga 6 bulan hanya diberikan ASI eksklusif saja. Oleh karena itu, MP-ASI baru bisa diperkenalkan kepada bayi ketika bayi berusia 6 bulan keatas. MP-ASI berguna untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang terkandung didalam ASI. Dengan demikian, cukup jelas bahwa peranan MP-ASI bukan sebagai pengganti ASI tetapi untuk melengkapi atau mendampingi ASI (Lestiarini and Sulistyorini, 2020).

2. Jenis-jenis MP-ASI

a. Makanan Lumat

Makanan lumat adalah makanan yang dihaluskan atau disaring dan bentuknya lebih lembut dan halus tanpa ampas. Makanan lumat diberikan pada anak berusia 6-9 bulan. Contoh makanan lumat antara lain berupa bubur susu, bubur sumsum, pisang dikerok, pepaya saring dan nasi tim saring.

b. Makanan Lunak

Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan banyak air atau teksturnya agak kasar dari makanan lumat. Makanan lunak diberikan pada anak berusia 12 bulan dan berupa bubur nasi, bubur ayam dan nasi tim.

c. Makanan Padat

Makanan padat adalah makanan lunak yang tidak berair dan biasanya disebut makanan keluarga. Makanan padat

mulai dikenalkan pada anak berusia 12-24 bulan. Contoh makanan padat antara lain berupa nasi, laukpauk, sayur bersantan dan buah-buahan.

3. Frekuensi MP-ASI

a. Usia 6 bulan

Banyaknya energi tambahan yang dibutuhkan dari MP-ASI adalah sebanyak 200 kilo kalori per hari. Tahap awal dalam memperkenalkan makanan tambahan pada bayi yaitu diberikan dua kali sehari pada bayi berusia 6 bulan.

b. Usia 6-9 bulan

Banyaknya energi tambahan yang dibutuhkan dari MP-ASI adalah sebanyak 200 kilo kalori per hari. Bayi yang berusia 6-9 bulan porsi kebutuhannya diberikan 2 hingga 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya.

c. Usia 9-12 bulan

Banyaknya energi tambahan yang dibutuhkan dari MP-ASI adalah sebanyak 300 kilo kalori per hari. Berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya.

d. Usia 12-24 bulan

Banyaknya energi tambahan yang dibutuhkan dari MP-ASI adalah sebanyak 550 kilo kalori per hari. Berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya.

4. Jumlah MP-ASI

a. Usia 6 bulan

Berikan dua kali sehari sebanyak 2-3 sendok makan penuh dalam sekali makan sebagai awalan.

b. Usia 6-9 bulan

Berikan 3-6 sendok penuh tiap kali makan atau tingkatkan secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml.

- c. Usia 9-12 bulan

Berikan setengah mangkuk berukuran 250 ml.

- d. Usia 12-24 bulan

Tingkatkan jumlah MP-ASI secara perlahan menjadi tiga seperempat magkuk berukuran 250 ml sekali makan.

5. Tekstur MP-ASI

- a. Usia 6 bulan

Mulai MP-ASI dengan makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental (*puree*) atau sari buah.

- b. Usia 6-9 bulan

Berikan MP-ASI dengan tekstur bubur kental (*puree*) atau makanan yang dilumatkan hingga halus (*mashed*).

- c. Usia 9-12 bulan

Berikanan MP-ASI yang dicincang halus (*minced*), dicincang kasar (*chopped*) atau makanan yang dapat dipegang oleh anak (*finger foods*).

- d. Usia 12-24 bulan

Berikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya.

- e. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi yang berisiko pada usia 2 tahun pertama terhadap kejadian *stunting* adalah penyakit diare dan ISPA. Selain itu, Berdasarkan data diketahui kejadian diare dan ISPA paling banyak terjadi pada balita menurut karakteristik kelompok umur. Diare yang terjadi dalam dua tahun pertama kehidupan dapat berpengaruh terhadap terjadinya retardasi pertumbuhan. Anak yang kurang gizi akan memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit yang rendah sehingga terkena penyakit infeksi seperti diare dan ISPA yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan menghambat pertumbuhan.

Infeksi dapat menurunkan asupan makanan, mengganggu penyerapan zat gizi, menyebabkan hilangnya zat gizi secara langsung, meningkatkan kebutuhan metabolik atau menurunnya proses katabolik zat gizi sehingga akan mempengaruhi pola konsumsi yang selanjutnya akan mempengaruhi status gizi balita. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang maka akan mempengaruhi pertumbuhan linier anak (Dewi and Adhi, 2014).

f. Tinggi badan ibu (Faktor genetik)

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang. Pesan genetik yang diturunkan oleh orang tua dan tersimpan dalam *deoxiribose nucleic acid* (DNA) yang akan menampilkan bentuk fisik dan potensi bayi. Meski faktor genetik merupakan faktor bawaan, namun faktor ini bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tumbuh kembang bayi. Tinggi badan maternal mempengaruhi pertumbuhan linier untuk generasi yang akan datang selama masa periode pertumbuhan (Toliu, Malonda and Kapantow, 2018).

Sifat pendek yang diturunkan orang tua kepada anaknya dikarenakan kondisi tinggi badan mereka yang tergolong pendek juga. Hal ini disebabkan terjadinya suatu keadaan patologis pada kromosom dalam inti sel, akibat kekurangan hormon pertumbuhan. Diperberat dengan konsumsi zat gizi yang tidak adekuat dalam mendukung pertumbuhan sehingga akan berdampak pada kegagalan pertumbuhan atau *stunting* pada keturunan berikutnya (Suca, Fajar and Idris, 2019).

g. Riwayat ASI eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi memberikan kontribusi pada status gizi dan kesehatan bayi. Semua zat gizi yang dibutuhkan bayi pada enam bulan pertama kehidupan dapat terpenuhi dari ASI dan ASI dapat memenuhi setengah dari

kebutuhan zat gizi bayi umur 7-12 bulan. Bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim, selama 6 bulan (Indrianti, 2019; Wowor, Laoh, & Pangemanan, 2013).

Air Susu Ibu (ASI) memiliki banyak kandungan zat gizi dan cairan yang dibutuhkan bayi di 6 bulan pertamanya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Ada 3 jenis ASI yaitu kolostrum, ASI masa peralihan dan ASI mature. Kolostrum adalah ASI keluar pertama kali setelah bayi lahir, berwarna kekuning-kuningan dan sedikit lebih kental. Kandungan ASI antara lain yaitu sel darah putih, zat kekebalan, enzim pencernaan, hormon dan protein yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan hingga bayi berumur 6 bulan. ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, multivitamin, air, kartinin dan mineral secara lengkap yang sangat cocok dan mudah diserap secara sempurna dan sama sekali tidak mengganggu fungsi ginjal bayi yang sedang dalam tahap pertumbuhan (Walyani, 2015; Soetjiningsih, 2012).

ASI dapat menurunkan angka mortalitas dan mordibitas bayi. Kandungan ASI yang kaya dengan zat gizi dapat memperkecil risiko bayi terserang penyakit infeksi, penyakit infeksi dapat meningkatkan risiko malnutrisi, sehingga apabila terjadi dalam jangka panjang dapat mengganggu absorpsi zat gizi, hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya *stunting* pada anak balita. Balita yang mendapatkan ASI akan tetapi juga diberikan susu formula, air putih atau makanan lain juga akan mempengaruhi terjadinya *stunting* karena ASI mengandung banyak nutrisi seperti kalsium yang lebih baik dari susu formula yang bisa mempengaruhi tinggi badan balita dan dapat mencegah balita mengalami *stunting* (Saputri and Viridula, 2018).

h. Imunisasi balita

Imunisasi penting sekali untuk imunitas anak, karena anak yang tidak imunisasi secara lengkap akan sangat mudah terserang penyakit infeksi yang akhirnya akan memperburuk keadaan gizi anak tersebut, sehingga dampak akhir dari permasalahan ini salah satunya adalah terjadinya kegagalan pertumbuhan yang optimal pada anak. Risiko terjangkitnya penyakit infeksi akan lebih tinggi pada balita dengan riwayat imunisasi tidak lengkap atau yang tidak imunisasi sama sekali (Juwita *et al.*, 2019).

Ketika tubuh anak terjangkit penyakit, maka seringkali anak kehilangan nafsu makan. Hal itu menyebabkan berkurangnya asupan zat gizi pada anak karena penolakan tersebut. Selain itu, enzim pencernaan juga akan terganggu, sehingga akan terjadi gangguan pencernaan makanan. Penyerapan makanan yang tidak baik akan menyebabkan gangguan penyerapan gizi, sehingga dapat memperburuk keadaan gizi sang anak. Apabila hal seperti ini dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dikhawatirkan akan terjadi dampak akhir berupa gangguan pertumbuhan pada anak (Juwita *et al.*, 2019).

i. Pendidikan ibu

Pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi pola asuh dan perawatan anak. Selain itu juga berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Penyediaan bahan dan menu makan yang tepat untuk balita dalam upaya peningkatan status gizi akan dapat terwujud bila ibu mempunyai tingkat pengetahuan gizi baik yang dapat diperoleh dengan pendidikan yang tinggi. Ibu dengan pendidikan rendah antara lain akan sulit menyerap informasi gizi sehingga anak dapat berisiko mengalami *stunting* (Azqinar, 2019).

g. Pengetahuan ibu tentang gizi balita

Pengetahuan mengenai gizi merupakan proses awal dalam perubahan perilaku peningkatan status gizi, sehingga pengetahuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perubahan perilaku. Pengetahuan ibu tentang gizi akan menentukan sikap dan perilaku ibu dalam menyediakan makanan untuk anaknya dan dapat menyediakan makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi faktor protektif (Septamarini, Widyastuti and Purwanti, 2019).

h. Faktor ekonomi keluarga

Status ekonomi rendah dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap kejadian kurus dan pendek pada anak. Orang tua dengan pendapatan keluarga yang memadai akan memiliki kemampuan untuk menyediakan semua kebutuhan primer dan sekunder anak. Keluarga dengan status ekonomi yang baik juga memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Anak pada keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung mengonsumsi makanan dalam segi kuantitas, kualitas, serta variasi yang kurang (Setiawan, Machmud and Masrul, 2018).

Ketersediaan pangan dalam keluarga dalam jangka yang lama dapat mempengaruhi konsumsi makanan. Apabila hal ini terjadi terutama pada balita secara terus-menerus akan menyebabkan ketidakcukupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan berdampak negatif pada pertumbuhan balita (Helmiyati, 2019).

4) Pencegahan *Stunting*

Intervensi dalam menanggulangi *stunting* sangat penting dilakukan karena adanya keuntungan ekonomi jika berhasil mengatasi *stunting*. Hasil studi dari Qureshi, et al.(2013) menemukan bahwa program intervensi *stunting* memberikan keuntungan secara ekonomi

dibandingkan dengan total biaya yang harus dikeluarkan. *stunting* telah menjadi prioritas dunia yang telah ditargetkan, baik di MGDs maupun SDGs. Untuk menanggulangi masalah *stunting* perlu dilakukan intervensi agar dapat meningkatkan status gizi pada ibu dan anak dengan melakukan pemenuhan gizi pada 1000 hari awal kehidupan baik ibu maupun bayi. Energi yang dibutuhkan ibu hamil adalah 13% lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Sedangkan, ibu yang menyusui membutuhkan 25% lebih tinggi (Dewey, 2016).

Langkah pertama, meningkatkan optimalisasi praktik pemberian ASI serta promosi ASI eksklusif. ASI eksklusif selama enam bulan memiliki manfaat untuk mereduksi morbiditas dan mortalitas. Asupan gizi terbaik dan paling ideal bagi bayi baru lahir adalah air susu ibu (ASI). Pemberian ASI selama enam bulan pertama tanpa pemberian makanan lain diawali dengan proses inisiasi menyusui dini (IMD). Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya untuk bayi dapat dipenuhi dari ASI. ASI eksklusif selama satu bulan pertama kehidupan menjadi faktor proteksi terhadap penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi pernapasan, serta secara global dapat menurunkan angka kematian. Kolostrum yang terkandung dalam ASI awal mengandung antibodi 10-17 kali daripada ASI mature (Helmyati, 2019).

Kedua, intervensi yang paling efektif untuk mencegah *stunting* selama periode pemberian makanan komplementer adalah dengan meningkatkan kualitas diet anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin beragam sumber makanan yang bersumber dari hewani sangat berkaitan dengan pertumbuhan linier. Selain itu, pemberian sumber makanan komplementer yang diberikan tambahan fortifikasi terbukti dapat meningkatkan asupan zat gizi dan mengurangi *stunting* (Helmyati, 2019).

Dalam upaya mencapai kebutuhan gizi anak di Indonesia, perlu dilakukan upaya promosi sumber makanan lokal yang mudah ditemui dan terjangkau. Promosi makanan sehat dan beragam, berkualitas tinggi,

serta kaya akan zat gizi dalam periode pemberian makanan tambahan usia 6-23 bulan. Hati ayam merupakan salah satu makanan yang dianjurkan sebagai komponen makanan komplementer untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik makro maupun mikronutrient. Hati, selain memiliki harga yang murah, juga menjadi sumber zat besi heme, zink, dan vitamin B12. Salah satu penyebab terjadinya *stunting* adalah kurangnya konsumsi kalsium. Susu merupakan sumber kalsium, fosfor, vitamin D, dan riboflavin. Konsumsi susu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan melalui stimulasi sirkulasi insulin *like growth factor* (IGF-1) (Helmyati, 2019).

Jika dilihat dari kebutuhan gizi, selain konsumsi energi dan protein yang harus memadai, konsumsi mikronutrien juga menjadi faktor pendukung penurunan angka *stunting*, seperti zink, zat besi, yodium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin B kompleks. Pemberian asam lemak dan asam amino esensial juga menjadi faktor promosi pertumbuhan. Mikronutrien ini sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan jaringan otot dan tulang, perkembangan otak, fungsi tubuh, seperti sistem kekebalan, kofaktor enzim, dan sebagainya. Zat gizi ini berasal dari makanan yang beragam, sehingga pengenalan dan pemberian jenis makanan yang beragam sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Suplemen gizi yang berbasis lemak juga berdampak positif pada anak *stunting* parah (*severe stunted*) ketika diberikan pada usia enam bulan selama satu tahun dan efek yang diberikan dapat berlanjut hingga usia tiga tahun (Helmyati, 2019).

Ketiga, *stunting* banyak disebabkan faktor lingkungan, sosioekonomi dan faktor budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan penyakit infeksi dengan mengedukasi cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memastikan ketersediaan air bersih dan menyediakan sabun di setiap rumah. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat juga berperan dalam menanggulangi *stunting* (Helmyati, 2019).

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab angka kesakitan tinggi pada anak *stunting*, salah satunya yaitu diare. Kejadian infeksi secara langsung dan tidak langsung akan berdampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan linier. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan adanya dampak signifikan diare pada tinggi badan 0,38 cm lebih pendek. Anak yang tinggal pada lingkungan yang kurang terawat akan lebih sering terpapar pada mikroba patogen melalui transmisi fecal-oral, di mana sering kali diare tidak terdeteksi. Infeksi cacing yang ditularkan dari tanah dapat dikurangi dengan meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang secara teori mampu mencegah atau menghambat enteropati dan meningkatkan pertumbuhan linier (Helmyati, 2019).

Selain dari ketiga bentuk pencegahan di atas, perlu juga dilakukan imunisasi dasar yang lengkap. Imunisasi dasar anak lengkap dengan tepat waktu merupakan faktor penting dalam pencegahan *stunting* dalam lima tahun pertama kehidupan, pemberian vaksin akan menekankan kebutuhan untuk memperkuat anak sehingga dapat mencegah gangguan pertumbuhan pada anak balita. Pemantauan berkala pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang baik untuk deteksi dini ada tidaknya gangguan pertumbuhan (Faye, Fonn and Levin, 2019; Khairiyah and Fayasari, 2020).

5) Dampak Stunting

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia dua tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi pendek (*stunted*) (Dasman, 2019).

Menurut WHO (*World Health Organization*), dalam jangka pendek *stunting* dapat menyebabkan peningkatan kejadian mortalitas dan

morbiditas, tidak optimalnya perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal, serta peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjang dari *stunting* yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, tidak optimalnya kapasitas belajar dan performa saat masa sekolah, dan tidak maksimalnya produktivitas dan kapasitas kerja. Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal akibat *stunting* pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, diantaranya karena kapasitas kerja yang rendah sehingga pendapat perkapita lebih rendah, produktivitas ekonomi rendah, dan meningkatkan kemiskinan (Dwi *et al.*, 2019; McGovern, M. E., Krishna, A., Aguayo, v. M., and Subramanian, 2017).

Ketika asupan energi tidak mencukupi untuk metabolisme berkelanjutan, akan terjadi penyesuaian fisiologis untuk memastikan organ vital mendapatkan asupan energi yang mencukupi dengan membongkar simpanan gizi dalam tubuh, terutama lemak dan otot. Jika kekurangan makanan terus berlanjut dan terjadi selama periode pertumbuhan, akan terjadi perubahan pada ukuran organ vital, seperti otak, hati, ginjal, usus, dan terutama otot yang akan menetap hingga usia dewasa (Helmyati, 2019).


Anak yang mengalami *stunting* lebih mudah terkena infeksi, terutama pneumonia dan diare, disebabkan imunitas yang rendah. Berdasarkan penelitian anak yang mengalami *stunting* berisiko lebih besar terkena infeksi pernapasan. Anak yang mengalami *stunting* parah lebih berisiko besar terkena infeksi sehingga tiga kali lipat lebih berisiko mengalami kematian karena terkena sepsis, meningitis, tuberkulosis, hepatitis dan selulitis sehingga menunjukkan dampak imunologi menyeluruh pada anak yang pertumbuhan linier yang buruk. Manusia yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah hampir secara keseluruhan memiliki usus yang lebih kecil, yang dikarakteristikan dengan atrofi fili dan inflamasi mukosa, yang juga diasosiasikan dengan

kondisi sanitasi dan higienitas yang buruk (Cumming, O. and Cairncross, 2016).

Anak yang mengalami *stunting* sebelum usia dua tahun diprediksi akan memiliki performa kognitif dan kemampuan psikologis yang buruk pada kehidupan selanjutnya. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya perkembangan otak sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir dan emosi anak. selain itu, anak *stunting* memiliki perkembangan perilaku yang kurang diawal kehidupan (Tassew, Woldehanna, Jere, R., Behrman, Mesele, W., 2017).


Dari segi kesehatan anak yang mengalami *stunting* lebih mudah terkena komplikasi obstetrik, peningkatan risiko overweight, dan obesitas yang dapat mengarah pada tingginya kejadian sindrom metabolik. *stunting* juga dapat menimbulkan perubahan pada peningkatan risiko penyakit degeneratif, seperti hipertensi, CVD, dan diabetes mellitus tipe 2. Berat badan lahir rendah pada anak lebih banyak terjadi pada ibu yang memiliki riwayat *Stunting* dan diturunkan dari generasi sebelumnya. Ibu *Stunting* dapat membatasi aliran darah ke uterus sehingga membatasi pertumbuhan uterus, plasenta, dan fetus. Kejadian ini biasa disebut dengan *intrauterine growth restriction* (IUGR atau retraksi pertumbuhan intrauterine). Hal ini sangat berkaitan dengan banyak efek samping pada janin dan persalinan. Anak dengan IUGR sering kali menderita keterlambatan pertumbuhan neurologi dan intelektual serta kekurangan tinggi badan yang akan bertahan hingga dewasa (Helmyati, 2019).

C. Kerangka Teori




Gambar 2. 1 Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analitik obsevasional dengan desain penelitian *cross-sectional*. Desain ini berarti data yang menyangkut variabel bebas (independen) dan data variabel terikat (dependen) diteliti secara bersamaan sehingga akan memperoleh prevalensi atau efek suatu fenomena dengan melakukan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian untuk menganalisis faktor-faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada bulan Februari – Maret 2021.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 6 bulan – 23 bulan yang berkunjung di posyandu wilayah kerja Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau pada tahun 2020.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi balita usia 6–23 bulan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga tidak semua balita memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 6 bulan – 23 bulan yang berkunjung di posyandu wilayah kerja Puskesmas Pekkae pada tahun 2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Inklusi

1. Balita usia 6 bulan – 23 bulan dengan indeks z-score TB/U < - 2 SD dan indeks z-score TB/U > -2 SD.
2. Balita yang tinggal menetap di wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
3. Balita yang diasuh langsung kedua orang tua atau orang terdekat.

b. Kriteria Eksklusi

1. Balita yang menderita penyakit kongenital dan penyakit kronik.
2. Balita yang sedang mengalami pemulihan dari status gizi buruk.
3. Tempat tinggal yang mengasuh balita sulit dijangkau.

Perhitungan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Berikut rumus dan perhitungannya;

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

keterangan :

n = Jumlah Sampel Keseluruhan.

N = Besar Populasi.

d = Tingkat Signifikan (0,1).

$$n = \frac{1.747}{1 + 1.747 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{1.747}{1 + 1.747}$$

$$n = \frac{1.747}{18.47}$$

$$n = 98$$

Maka, diperoleh hasil jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 98 balita usia 6 bulan – 23 bulan.


D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, KMS dan berbagai sumber lainnya. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan sampel penelitian dengan menggunakan instrumen/alat ukur kuesioner.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada kepala Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian dilakukan pengambilan data dari rekam medis Puskesmas Pekkae bagian gizi dan melakukan wawancara secara langsung maupun melalui telepon kepada responden dengan menggunakan kuesioner.

F. Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu daftar tertulis yang memuat pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai suatu hal tertentu untuk mengumpulkan data melalui proses wawancara dan data rekam medik responden untuk mengetahui faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a) Teknik Pengelolaan

a. Editing (Pemeriksaan data)

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam format pengumpulan data. Peneliti melakukan koreksi pada kelengkapan ataupun kesalahan pencatatan data

b. *Coding* (Pemberian kode)

Kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. *Coding* berguna untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pada entry data.

c. *Transferring* (Memindahkan data)

Proses memindahkan data ke dalam master tabel.

d. *Tabluating* (Menyusun data)

Kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

b) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program komputer *Statistical Package for the Social Sciences* versi 23 (SPSS) dengan cara sebagai berikut :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui interaksi dua variabel, baik berupa komparatif, asosiatif maupun korelatif (Suryono, 2010). Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan dan untuk mengetahui kemaknaan hubungan nilai p yaitu menggunakan analisis *Chi-Square* dan besarnya risiko menggunakan *RP (Ratio Prevalens)*. Semua hipotesis untuk kategori nominal dan ordinal tidak berpasangan menggunakan analisa data uji *Chi-Square* (Sopiyudin, 2014).

I. Penyajian Data

Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel dan gambar.

J. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Pekkae didirikan pada tahun 1971, Namun sebelum berdirinya Puskesmas Pekkae, masyarakat setempat menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang bernama Balai Pengobatan Pekkae, dimana Balai pengobatan tersebut mulai berdiri pada tahun 1960. Balai pengobatan beroperasi sampai pada tahun 1971, Namun setelah melalui pertimbangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka ditingkatkan lah balai pengobatan menjadi Puskesmas Pekkae pada tahun 1971.

Puskesmas Pekkae salah satu puskesmas yang ada di kecamatan Tanete Rilau tepatnya di kelurahan Lalolang. Jaraknya kurang lebih 8 km sebelah utara kota Barru atau kurang lebih 100 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kerja Puskesmas Pekkae mencakup dengan luas wilayahnya kurang lebih 78,90 km² yang secara topografi terdiri dari pegunungan, pantai dan lembah atau daratan, sehingga pencarian penduduk juga bervariasi sesuai kondisi alam. Secara administratif terdiri dari 3 desa dan 2 kelurahan, yaitu : Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Tellumpanua, Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tanggal 18 february sampai dengan 31 maret 2021. Dalam penelitian ini pengambilan sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti mengambil data melalui rekam medik balita yang mengalami pertumbuhan terhambat (*stunting*) pada tahun 2020. Sebanyak 98 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi telah dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner melalui telepon maupun secara langsung oleh ibu atau pengasuh balita.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran distribusi dari setiap variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti meliputi riwayat pemberian ASI eksklusif, riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, imunisasi balita, tinggi badan ibu, pendidikan terakhir ibu, pengetahuan ibu tentang gizi balita dan faktor ekonomi keluarga.

a. Riwayat pemberian ASI eksklusif

Pengukuran riwayat pemberian ASI eksklusif meliputi pemberian kolostrum pada balita, pemberian hanya ASI selama 6 bulan pada balita dan pemberian cairan lain selain ASI selama 6 bulan pada balita.

Berdasarkan pemberian kolostrum pada kelompok *stunting* lebih banyak balita yang mendapatkan kolostrum yaitu sebanyak 61 (71.8%) balita dari 72 balita yang mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak diberikan kolostrum yaitu sebanyak 11 (15.3%) balita. Sedangkan, pemberian kolostrum pada kelompok tidak *stunting* yaitu sebanyak 24 (92,3%) dan hanya 2 (7.7%) balita yang tidak diberikan kolostrum.

Berdasarkan riwayat pemberian ASI eksklusif pada kelompok *stunting* lebih banyak balita yang diberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 43 (59.7%) dibandingkan dengan balita yang tidak diberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 29 (40.3%) balita. Sedangkan, riwayat pemberian ASI eksklusif pada kelompok tidak *stunting* juga lebih banyak yang diberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 18 (69.2%) dibandingkan dengan balita yang tidak diberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 8 (30.8%) balita.

Berdasarkan pemberian cairan selain ASI pada kelompok *stunting* lebih banyak balita yang tidak diberikan cairan selain ASI yaitu sebanyak 43 (59.7%) balita dibandingkan dengan balita yang diberikan cairan selain ASI yaitu sebanyak 29 (40.3%) balita. Cairan selain ASI yang ibu berikan kepada balita pada penelitian ini yaitu, seperti susu formula, madu, air beras dan air gula.

Tabel 4.1 Distribusi Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Pemberian ASI Eksklusif	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Pemberian kolostrum				
Ya	61	71.8	24	92.3
Tidak	11	15.3	2	7.7
Pemberian hanya ASI sampai usia 6 bulan				
Ya	43	59.7	18	69.2
Tidak	29	40.3	8	30.8
Pemberian cairan lain selain ASI				
Ya	29	40.3	8	30.8
Tidak	43	59.7	18	69.2

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

b. Riwayat pemberian MP-ASI

Pengukuran riwayat pemberian MP-ASI meliputi usia pertama pemberian MP-ASI, frekuensi pemberian MP-ASI, jenis MP-ASI dan jumlah MP-ASI yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa lebih banyak usia pertama pemberian MP-ASI ≥ 6 bulan baik pada kelompok *stunting* maupun tidak *stunting*. Pada kelompok *stunting* sebanyak 71 (96.8 %) balita yang diberikan MP-ASI ≥ 6 bulan dan hanya 1 (1.4 %) balita yang diberikan MP-ASI < 6 bulan. Sedangkan, pada kelompok tidak *stunting* semua balita diberikan MP-ASI ≥ 6 yaitu sebanyak 26 (100.0%) balita.

Tabel 4.2 Distribusi Usia Pertama Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Pemberian MP-ASI	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Usia MP-ASI pertama yang diberikan pada balita				
< 6 bulan	1	1.4	0	0.0
≥ 6 bulan	71	98.6	26	100.0

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa frekuensi MP-ASI terbanyak di usia MP-ASI pertama yang diberikan kepada balita 3 kali sehari yaitu sebanyak 43 (59.7%) balita pada kelompok *stunting* dan 2 kali sehari sebanyak 20 (76.9%) pada balita yang tidak *stunting*. Berdasarkan usia 6-8 bulan pemberian MP-ASI, didapatkan bahwa lebih banyak frekuensi MP-ASI diberikan 3 kali sehari yaitu sebanyak 70 (97.2%) pada kelompok *stunting* dan 3 kali sehari pada sebanyak 26 (100.0%) pada kelompok tidak *stunting*.

Berdasarkan usia 9-11 bulan pemberian MP-ASI, didapatkan bahwa frekuensi MP-ASI terbanyak diberikan 3 kali sehari yaitu 72 (100.0%) balita pada kelompok *stunting* dan 3 kali sehari yaitu sebanyak 24 (92.3%) balita pada kelompok tidak *stunting*. Berdasarkan usia 12-23 bulan pemberian MP-ASI didapatkan frekuensi MP-ASI diberikan terbanyak 3 kali sehari yaitu sebanyak 60 (100.0%) balita pada kelompok *stunting* dan 3 kali sehari sebanyak 19 (90.5%) balita pada kelompok tidak *stunting*.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Pemberian MP-ASI	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Frekuensi pemberian MP-ASI				
MP-ASI pertama yang diberikan pada balita				
1 kali sehari	0	00.0	0	00.0
2 kali sehari	29	40.3	20	76.9
3 kali sehari	43	59.7	6	23.1
>3 kali sehari	0	00.0	0	00.0
Usia 6-8 bulan pemberian MP-ASI				
1 kali sehari	0	00.0	0	00.0
2 kali sehari	2	2.8	0	00.0
3 kali sehari	70	97.2	26	100.0
>3 kali sehari	0	00.0	0	00.0
Usia 9-11 bulan pemberian MP-ASI				
1 kali sehari	0	00.0	0	00.0
2 kali sehari	0	00.0	0	00.0
3 kali sehari	72	100.0	24	92.3
>3 kali sehari	0	00.0	2	7.7
Usia 12-23 bulan pemberian MP-ASI				
1 kali sehari	0	00.0	0	00.0
2 kali sehari	0	00.0	0	00.0
3 kali sehari	60	100.0	19	90.5
>3 kali sehari	0	00.0	2	9.5

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Tabel 4.4 Distribusi Jenis Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Pemberian MP-ASI	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Jenis pemberian MP-ASI				
MP-ASI pertama yang diberikan pada balita				
Bubur sereal instan	29	40.3	16	61.5
Nasi tim saring	42	58.3	10	38.5
Bubur nasi	1	1.4	0	00.0
Nasi	0	00.0	0	00.0
Usia 6-8 bulan pemberian MP-ASI				
Bubur sereal instan	9	12.5	10	38.5
Nasi tim saring	54	75.0	14	53.8
Bubur nasi	9	12.5	2	7.7
Nasi	0	00.0	0	00.0
Usia 9-11 bulan pemberian MP-ASI				
Bubur sereal instan	1	1.4	0	00.0
Nasi tim saring	10	13.9	2	7.7
Bubur nasi	17	23.6	24	92.3
Nasi	44	61.1	0	00.0
Usia 12-23 bulan pemberian MP-ASI				
Bubur sereal instan	0	00.0	0	00.0
Nasi tim saring	0	00.0	0	00.0
Bubur nasi	17	28.3	1	4.8
Nasi	43	71.7	20	95.2

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pertama yang diberikan pada balita, didapatkan bahwa jenis MP-ASI terbanyak adakah nasi tim saring yaitu 42 (58.3%) balita pada kelompok *stunting* dan jenis MP-ASI bubur sereal yaitu 16 (61.5%) balita pada kelompok tidak *stunting*. Berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pada usia 6-8 bulan, didapatkan bahwa jenis MP-ASI terbanyak adalah nasi tim saring yaitu 54 (75.0%) balita pada kelompok *stunting* dan jenis MP-ASI nasi tim saring yaitu 14 (53.8%) balita pada kelompok tidak *stunting*.

Berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pada usia 9-11 bulan, didapatkan bahwa jenis MP-ASI terbanyak adalah nasi yaitu 44 (61.1%) balita pada kelompok *stunting* dan jenis MP-ASI bubur nasi yaitu 24 (92.3%) balita pada kelompok tidak *stunting*. Berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pada usia 12-23 bulan, didapatkan bahwa jenis MP-ASI terbanyak adalah nasi yaitu 43 (71.7%) balita pada kelompok *stunting* dan pada kelompok tidak *stunting* jenis MP-ASI terbanyak adalah nasi yaitu 20 (95.2%) balita.

Berdasarkan jumlah pemberian MP-ASI, jumlah terbanyak MP-ASI pertama yang diberikan pada balita adalah 2-3 sendok makan yaitu 61 (84.7%) balita pada kelompok *stunting* dan 17 (65.4%) balita pada kelompok tidak *stunting*. Berdasarkan usia 6-11 bulan pemberian MP-ASI, jumlah terbanyak MP-ASI adalah $\frac{1}{2}$ mangkok kecil atau setara dengan 125 ml yaitu 66 (91.7%) balita pada kelompok *stunting* dan 23 (88.5%) balita pada kelompok balita tidak *stunting*.

Berdasarkan usia 9-11 bulan pemberian MP-ASI, jumlah terbanyak MP-ASI adalah $\frac{1}{2}$ mangkok kecil atau setara dengan 125 ml yaitu 52 (72.2%) balita pada kelompok *stunting* dan 16 (61.5%) balita pada kelompok balita tidak *stunting*. Berdasarkan usia 12-23 bulan pemberian MP-ASI, jumlah terbanyak MP-ASI adalah $\frac{3}{4}$ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml yaitu 46 (76.7%) balita pada kelompok *stunting* dan 19 (90.5%) balita pada kelompok balita tidak *stunting*.

Tabel 4.5 Distribusi Jumlah Pemberian ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Pemberian MP-ASI	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Jumlah pemberian MP-ASI				
MP-ASI pertama yang diberikan pada balita				
2-3 sendok makan	61	84.7	17	65.4
½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml	11	15.3	9	34.6
¾ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml	0	00.0	0	00.0
Usia 6-8 bulan pemberian MP-ASI				
2-3 sendok makan	6	8.3	3	11.5
½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml	66	91.7	23	88.5
¾ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml	0	00.0	0	00.0
Usia 9-11 bulan pemberian MP-ASI				
2-3 sendok makan	0	00.0	0	00.0
½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml	52	72.2	16	61.5
¾ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml	20	27.8	10	38.5
Usia 12-23 bulan pemberian MP-ASI				
2-3 sendok makan	0	00.0	0	00.0
½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml	14	23.3	2	9.5
¾ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml	46	76.7	19	90.5

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Tabel 4.6 Distribusi Riwayat Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Riwayat Pemberian MP-ASI	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Pemberian MP-ASI				
Tidak Sesuai	55	76.4	17	53.8
Sesuai	17	23.6	12	46.2

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan karakteristik riwayat pemberian MP-ASI, menunjukkan bahwa terdapat 55 balita (76.4%) *stunting* yang mempunyai riwayat pemberian MP-ASI yang tidak sesuai dan terdapat 17 balita (23.6%) *stunting* yang mendapatkan MP-ASI yang sesuai ditinjau dari usia pertama pemberian MP-ASI, frekuensi pemberian MP-ASI, jenis pemberian MP-ASI dan jumlah pemberian MP-ASI. Sedangkan, pada kelompok tidak *stunting* balita yang mendapatkan MP-ASI sesuai yaitu sebanyak 12 (46.2%) dan balita yang tidak mendapatkan MP-ASI yang sesuai yaitu sebanyak 17 (53.8%).

c. Riwayat penyakit infeksi

Pengukuran riwayat infeksi meliputi riwayat diare dan ISPA. Pada hasil penelitian ini, didapatkan bahwa sebanyak 38 (52.8%) balita *stunting* yang memiliki riwayat diare, 3 (4.2%) yang memiliki riwayat ISPA, 4 (5.6%) yang memiliki riwayat diare dan ISPA, dan 27 (37.5%) yang tidak memiliki riwayat infeksi. Sedangkan, pada kelompok tidak *stunting* terdapat 6 (23.1%) yang memiliki riwayat diare, 2 (7.7%) yang memiliki riwayat ISPA dan 18 (69.2%) yang tidak memiliki riwayat infeksi.

Tabel 4.7 Distribusi Riwayat Diare dan ISPA Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Riwayat Penyakit Infeksi	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>stunting</i>		Tidak <i>stunting</i>	
	n	%	n	%
Diare	38	52.8	6	23.1
ISPA	3	4.2	2	7.7
Diare dan ISPA	4	5.6	0	0.0
Tidak memiliki riwayat infeksi	27	37.5	18	69.2

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan tabel 4.8, karakteristik riwayat penyakit infeksi menunjukkan bahwa terdapat 45 (62.5%) balita *stunting* yang memiliki penyakit infeksi dan 27 (37.5%) balita yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi. Sedangkan, pada kelompok balita tidak *stunting* terdapat 8 (30.8%) balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi dan 18 (69.2%) balita yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi.

Tabel 4.8 Distribusi Riwayat Penyakit Infeksi Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Riwayat Penyakit Infeksi	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>stunting</i>	
	n	%	n	%
Memiliki Riwayat	45	62.5	8	30.8
Tidak Memiliki Riwayat	27	37.5	18	69.2

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dan Sampel Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru Tahun 2020

Karakteristik	Kejadian <i>Stunting</i>			
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>	
	n	%	n	%
Pemberian Imunisasi Balita				
Tidak Lengkap	1	1.4	0	0.0
Lengkap	71	98.6	26	100.0
Tinggi Badan Ibu				
Berisiko	19	26.4	3	11.5
Normal	53	73.6	23	88.5
Pendidikan Ibu				
Rendah	14	19.4	0	0.0
Tinggi	58	80.6	26	100.0
Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita				
Rendah	55	76.4	14	53.8
Tinggi	17	23.6	12	46.2
Faktor Ekonomi Keluarga				
Rendah	67	93.1	15	57.7
Tinggi	5	6.9	11	42.3

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan Tabel 4.9, karakteristik pemberian imunisasi balita, menunjukkan bahwa terdapat 71 (98.6%) balita *stunting* yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan 1 (1.4%) balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan, pada kelompok balita tidak *stunting* terdapat 26 (100.0%) balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap.

Berdasarkan karakteristik tinggi badan ibu, menunjukkan bahwa pada kelompok balita *stunting* terdapat 53 (73.6%) responden yang memiliki tinggi badan ≥ 147 dan terdapat 19 (26.4%) responden yang memiliki tinggi badan <147 . Sedangkan, pada kelompok balita tidak *stunting* terdapat 23 (88.5%) responden yang memiliki tinggi badan ≥ 147 dan terdapat 3 (11.5%) responden yang memiliki tinggi badan < 147 .

Berdasarkan karakteristik pendidikan ibu, menunjukkan bahwa responden pada kelompok balita *stunting* memiliki tingkat pendidikan tinggi terbanyak yaitu 58 responden (80.6%). Sedangkan, responden pada kelompok balita tidak *stunting* juga memiliki tingkat pendidikan tinggi terbanyak yaitu 26 responden (100.0%).

Berdasarkan karakteristik pengetahuan ibu tentang gizi balita, pada kelompok balita *stunting* terdapat 55 (76.4%) responden yang memiliki pengetahuan rendah dan yang memiliki pengetahuan tinggi terdapat 17 (23.6%) responden. Sedangkan, pada kelompok balita tidak *stunting* terdapat 14 (53.8%) responden memiliki pengetahuan rendah dan terdapat 12 (46.2%) responden memiliki pengetahuan tinggi.

Berdasarkan karakteristik faktor ekonomi keluarga, pada kelompok balita *stunting* terdapat 67 (93.1%) responden yang memiliki ekonomi rendah dan terdapat 5 (6.9%) responden yang memiliki ekonomi tinggi. Sedangkan, pada kelompok balita yang tidak *stunting* terdapat 15 (57.7%) responden yang memiliki ekonomi tinggi dan 11 (42.3%) responden memiliki ekonomi rendah.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.10 Hasil Analisis Chi-Square Pada Karakteristik Sampel dan Responden Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 6–23 Bulan di Puskesmas Pekkae Tahun 2020

Karakteristik	Kejadian <i>Stunting</i>				p-value
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>		
	n	%	n	%	
Riwayat Pemberian ASI					
Tidak Eksklusif	29	40.3	8	30.8	0.391
Eksklusif	43	59.7	18	69.2	
Pemberian MP-ASI					
Tidak Sesuai	55	76.4	17	53.8	0.031
Sesuai	17	23.6	12	46.2	
Riwayat Penyakit Infeksi					
Memiliki Riwayat	45	62.5	8	30.8	0.005
Tidak Memiliki Riwayat	27	37.5	18	69.2	
Pemberian Imunisasi Balita					
Tidak Lengkap	1	1.4	0	0.0	0.546
Lengkap	71	98.6	26	100.0	
Tinggi Badan Ibu					
Berisiko	19	26.4	3	11.5	0.120
Normal	53	73.6	23	88.5	
Pendidikan Ibu					
Rendah	14	19.4	0	0.0	0.015
Tinggi	58	80.6	26	100.0	
Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita					
Rendah	55	76.4	14	53.8	0.031
Tinggi	17	23.6	12	46.2	
Faktor Ekonomi Keluarga					
Rendah	67	93.1	15	57.7	0.000
Tinggi	5	6.9	11	42.3	

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil uji *Chi-Square* antara karakteristik sampel dan responden yaitu riwayat pemberian ASI eksklusif,

riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, imunisasi balita, tinggi badan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi balita dan faktor ekonomi keluarga.

Berdasarkan riwayat pemberian ASI eksklusif, hasil analisis uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.391 lebih dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan riwayat pemberian MP-ASI, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.031 kurang dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik terdapat hubungan yang signifikan antara umur pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan riwayat penyakit infeksi, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.005 kurang dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan pemberian imunisasi balita, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.546 lebih dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara imunisasi balita dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan tinggi badan ibu, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.120 lebih dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan pendidikan ibu, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.103 lebih dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi balita, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.031 kurang dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi balita dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Berdasarkan faktor ekonomi keluarga, hasil uji analisis *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* yaitu sebesar 0.000 kurang dari $\alpha = 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara uji statistik terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi keluarga dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan.

Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru

Karakteristik	RP	95%CI	p-value
Riwayat Pemberian MP-ASI	1.36	0.979-1.888	0.031
Riwayat Penyakit Infeksi	1.41	1.087-1.843	0.005
Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita	1.36	0.979-1.888	0.031
Faktor Ekonomi	2.71	1.255-5.447	0.000

Sumber : Data Primer 2021, Data Sekunder 2020

Berdasarkan tabel 4.11, balita yang mempunyai riwayat pemberian MP-ASI yang tidak sesuai, balita yang mempunyai riwayat penyakit infeksi, responden yang memiliki pengetahuan tentang gizi balita kurang dan faktor ekonomi yang rendah merupakan faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan –23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau. Balita yang mendapatkan MP-ASI yang tidak sesuai berisiko 1.36 lebih besar untuk

mengalami kejadian *stunting* dibandingkan balita yang mendapatkan MP-ASI yang sesuai.

Balita yang mempunyai riwayat penyakit infeksi berisiko 1.41 lebih besar untuk mengalami kejadian *stunting* dibandingkan balita yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi. Balita yang mempunyai ibu dengan pengetahuan tentang gizi balita yang rendah berisiko 1.36 lebih besar untuk mengalami kejadian *stunting* dibandingkan balita yang mempunyai ibu dengan pengetahuan tentang gizi balita yang tinggi.

Balita yang mempunyai ekonomi keluarga yang rendah berisiko 2.71 lebih besar untuk mengalami kejadian *stunting* dibandingkan dengan balita yang mempunyai ekonomi keluarga yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka didapatkan bahwa variabel Faktor ekonomi merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6-23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai RP (*ratio prevalence*) terbesar yaitu 2,71 (95% CI : 1.255-5.447).

C. Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian pada sampel 98 balita yang dicurigai *stunting* di Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru, didapatkan terdapat 72 balita *stunting* dan 26 balita yang tidak mengalami *stunting*. Berdasarkan analisis bivariat, variabel yang terbukti merupakan faktor risiko signifikan terhadap *stunting* adalah riwayat pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, pengetahuan ibu tentang gizi balita dan faktor ekonomi keluarga. Sedangkan, faktor risiko yang tidak signifikan terhadap kejadian *stunting* adalah riwayat pemberian ASI eksklusif, imunisasi balita, tinggi badan ibu (faktor genetik) dan pendidikan ibu.

1. Riwayat Pemberian ASI Eksklusif

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian *stunting* pada balita didapatkan nilai *p-value*

0.391. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsaralatifah (2020) yang melaporkan bahwa tidak terdapat hubungan antara riwayat pemberian asi eksklusif terhadap kejadian *stunting* dengan nilai *p-value* sebesar 1, 000. Hasil penelitian oleh Febi (2020) melaporkan hasil yang serupa bahwa antara variabel ASI eksklusif terhadap kejadian *stunting* didapatkan *p-value* 0,911 dan POR sebesar 1,21. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* (Tsaralatifah, 2020; Febi Damisti, 2020).

Pengukuran riwayat pemberian ASI eksklusif meliputi pemberian kolostrum pada balita, pemberian hanya ASI selama 6 bulan pada balita dan pemberian cairan lain selain ASI selama 6 bulan pada balita. Pemberian kolostrum pada kelompok *stunting* lebih banyak yang mendapatkan kolostrum yaitu sebanyak 61 balita dari 72 balita yang mengalami *stunting* dan mayoritas balita mendapatkan ASI eksklusif baik pada kelompok *stunting* maupun tidak *stunting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita *stunting* yang tidak mendapatkan ASI eksklusif diberikan cairan selain ASI, seperti susu formula, madu, air beras dan air gula.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar anak mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini dikarenakan mayoritas ibu memiliki status pekerjaan sebagai IRT atau tidak mempunyai pekerjaan yang dapat membuat ibu balita susah untuk memberikan ASI eksklusif. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai pendapatan orang tua yang kurang mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehingga kebanyakan

balita tidak diberikan atau dibantu dengan susu formula, melainkan hanya diberikan ASI saja dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi dan akan membantu pertumbuhan serta perkembangan balita terlebih di usia periode emas. Karbohidrat dalam ASI berupa laktosa, yang kandungannya lemaknya berupa polyunsaturated fatty acid (asam lemak tak jenuh ganda). Protein utamanya adalah lactalbumin yang mudah dicerna dan kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Selain itu ASI juga mengandung zat anti – infeksi. ASI memiliki kandungan sIgA yang berfungsi sebagai predominant antibodi, selain itu dalam ASI juga ditemukan IgM dan IgG (Larasati, Nindya and Arief, 2018).

Air Susu Ibu (ASI) yang dikeluarkan ibu saat awal kelahiran atau disebut kolostrum juga memiliki kandungan IgA, IgM dan IgG yang juga sangat tinggi. Kandungan lain dari ASI yang berfungsi sebagai antibodi adalah laktoferin yaitu *iron-binding glycoprotein* yang termasuk dalam kelompok transferin. Senyawa ini memiliki manfaat untuk melawan bakteri, virus dan jamur. Glikoprotein lain yang berfungsi sebagai antibodi adalah lactadherin yang terdapat pada lemak susu. Lactadherin berpindah dari ASI menuju perut bayi dan mencegah infeksi oleh rotaviral pada bayi yang baru lahir (Larasati, Nindya and Arief, 2018).

Kaitan ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* menurut WHO dalam Ni'mah dan Nadhiroh (2015) menyebutkan anak yang tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh akan mempengaruhi imunitas anak terhadap penyakit infeksi. Balita yang tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan terinfeksi penyakit kronis seperti diare dan ISPA yang berulang akan mengakibatkan anak *stunting*. Namun, berbeda dengan penelitian ini, pada hasil penelitian ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi balita untuk terkena infeksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan linier balita yakni seperti higiene atau sanitasi dan faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Hal ini diketahui

dari data yang didapatkan saat meneliti bahwa anak yang diberikan ASI eksklusif maupun tidak ASI eksklusif berisiko mengalami penyakit infeksi atau pernah memiliki riwayat penyakit infeksi (Larasati, Nindya and Arief, 2018).

Hasil penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rambitan, dkk (2019) yang melaporkan bahwa hasil uji statistik dengan *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* 0.017, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6-24 bulan. Penelitian lain juga melaporkan hasil yang berbeda oleh Dini, dkk (2020) yang menyatakan bahwa riwayat ASI eksklusif menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian *stunting* dengan nilai *p-value* sebesar 0.048 (Rambitan et al., 2019; Nugraheni et al., 2020).

2. Riwayat pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel riwayat pemberian MP-ASI terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Any, dkk (2019) berdasarkan uji korelasi *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,002$ yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* pada anak usia 6-24 bulan. Berdasarkan uji risk estimate diperoleh nilai $OR = 4,531$. Nilai $OR > 1$ bersifat risiko, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi pemberian MP ASI yang tidak sesuai standar berisiko 4,5 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan frekuensi pemberian MP ASI yang sesuai standar. Penelitian oleh Wandini, dkk (2020) berdasarkan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0.000 sehingga

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan kejadian *stunting* (Any Virginia, Sugeng Maryanto, 2019; Wandini *et al.*, 2020).

Berdasarkan karakteristik riwayat pemberian MP-ASI, menunjukkan bahwa terdapat 55 balita *stunting* yang mempunyai riwayat pemberian MP-ASI yang tidak sesuai ditinjau dari usia pertama pemberian MP-ASI, frekuensi pemberian MP-ASI, jenis pemberian MP-ASI dan jumlah pemberian MP-ASI. Berdasarkan hasil wawancara terkait frekuensi MP-ASI, dijumpai frekuensi pemberian MP-ASI pertama kali atau pada usia 6 bulan yang diperoleh dari 72 responden sebanyak 43 balita diberikan MP-ASI tidak sesuai standar dengan frekuensi sebanyak 3 kali sehari. Praktik pemberian MP-ASI yang baik dan benar mencakup salah satunya adalah frekuensi pemberian MP-ASI. Frekuensi pemberian MP-ASI pada usia 6 bulan adalah 2-3 sendok makan, karena harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan anak (Any Virginia, Sugeng Maryanto, 2019).

Kemampuan sistem pencernaan bayi pada masa perkembangannya berbeda-beda sehingga bahan makanan untuk bayi disesuaikan dengan umurnya. Pada usia 6 bulan, bentuk makanan harus dalam bentuk bubur lunak sebab enzim yang dimiliki anak untuk menghaluskan makanan masih dalam masa pembentukan. Oleh karena itu, anak yang tidak diberi bentuk sesuai usianya akan mudah terkena diare dan berisiko dehidrasi. Apabila kejadian diare dan dehidrasi terjadi dalam kurung waktu yang lama, maka akan berdampak pada pola pertumbuhan karena infeksi mempunyai kontribusi terhadap penurunan nafsu makan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan linier anak (Nurkomala, 2017; Nur Hadibah Hanum, 2019; Febi Damisti, 2020).

Berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pertama yang diberikan pada balita didapatkan bahwa terdapat 71 balita yang mendapatkan jenis MP-ASI sesuai standar dengan tekstur MP-ASI yang dihaluskan (*puree*) jenis MP-ASI yaitu bubur sereal instan dan nasi tim saring. Pada balita usia 6-

9 bulan didapatkan bahwa sebagian besar responden memberikan jenis MP-ASI yang sesuai yaitu nasi tim saring. Pada usia 9-11 bulan diperoleh dari 72 responden sebanyak 44 balita diberikan jenis MP-ASI yang tidak sesuai standar. Ditemui balita usia 9-11 bulan yang sudah diberikan MP-ASI dengan tekstur makanan biasa atau makanan keluarga yang seharusnya nasi dengan tekstur yang biasa diperkenalkan pada usia 12-23 bulan. Jika nasi diberikan pada balita usia 9-11 bulan, maka saat mengonsumsi makanan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengunyah menjadi partikel yang lebih kecil untuk ditelan karena belum adanya keterampilan untuk “mengunyah” atau gerakan naik turun mandibula dan gigi yang belum tumbuh. Akibat dari hal tersebut anak akan makan dalam jumlah yang lebih sedikit (lama mengunyah) sehingga asupan makanannya akan kurang (Any Virginia, Sugeng Maryanto, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui sebagian besar balita usia 6-8 bulan dan 9-11 bulan menghabiskan $\frac{1}{2}$ mangkok kecil, usia 12-23 bulan jumlah pemberian MP-ASI adalah $\frac{3}{4}$ sampai 1 mangkok kecil berukuran 250 ml. Namun, beberapa responden juga mengaku bahwa balita berusia 12-23 bulan menghabiskan nasi kurang dari $\frac{1}{2}$ mangkok kecil hal ini terjadi karena balita tersebut lebih senang mengonsumsi jajanan. Menurut Mufida dalam jurnal Any Virginia, Sugeng Maryanto (2019) seiring bertambah umur bayi bertambah pula kebutuhan gizinya, agar bayi mendapat energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Any Virginia, Sugeng Maryanto, 2019).

3. Riwayat penyakit infeksi

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel riwayat penyakit infeksi terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.005. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae tahun 2020.

Berdasarkan penelitian ini sebagian besar balita (45 balita) memiliki riwayat penyakit infeksi dalam waktu 10 bulan terakhir yang mengalami *stunting*. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak yang mengalami *stunting* adalah seperti diare, kecacingan, malaria dan ISPA. Ditemukan yang paling berisiko mengalami *stunting* adalah diare, hal ini sesuai dengan penelitian yang didapatkan 45 balita memiliki riwayat penyakit infeksi dan terdapat 42 balita pernah mengalami diare. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barito et al (2017) menunjukkan anak yang menderita diare berisiko 6,3 kali mengalami *stunting*. Penelitian oleh Blessing et al (2017) juga menyatakan bahwa balita yang mengalami diare 2 minggu terakhir menjadi determinan terjadinya *stunting* (Indah Budiastutik and Muhammad Zen Rahfiludin, 2019; Barito et al, 2017; Blessing et al, 2017).

Penyakit diare disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi penyebab diare yaitu kondisi lingkungan, kontaminasi makanan dan minuman, suplai air bersih yang kurang, kemiskinan dan taraf pendidikan yang rendah. Selain itu, pada masa balita anak mulai dikenalkan dengan berbagai macam makanan dan mulai aktif bermain. Tingginya insiden diare salah satunya dapat disebabkan oleh beberapa jenis bakteri seperti *Vibrio cholera*, *Salmonella* sp, *Shigella* sp, *Campylobacter jejuni* dan *Escherichia coli*. Berdasarkan hasil penelitian Bonkougou dkk (2013) dengan subjek anak dibawah lima tahun menemukan *E.coli* patogen menduduki peringkat kedua terjadinya diare yaitu sebesar 24% setelah Rotavirus sebesar 30% dan kemudian diikuti oleh *Salmonella* sp sebesar 9%, *Shigella* sp sebesar 6%, Adenovirus sebesar 5% dan *Campylobacter* sebesar 2%. Pada penelitian ini balita usia 1 tahun ke atas lebih banyak mengalami diare karena pada usia ini balita sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan secara bertahap sehingga apabila diberikan makanan yang tidak tepat dapat menyebabkan sistem pencernaan balita tidak berkembang dengan baik dan bisa menyebabkan diare. Anak pada kelompok umur ini akan lebih

mudah terkena diare akibat infeksi bakteri pada saat bermain di lingkungan kotor serta dengan sanitasi yang kurang baik akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh anak menurun sehingga kondisi fisik tubuhnya juga akan menurun (Citra Ayu Anggreli Dewi Anggraini Maya Savira, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adhi (2016) melaporkan bahwa berdasarkan uji statistik didapatkan nilai *p-value* 0,0039 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit infeksi terhadap kejadian *stunting*. Dalam tiga bulan terakhir, anak yang mengalami *stunting* lebih banyak memiliki riwayat penyakit infeksi dibandingkan dengan balita tidak *stunting*. Seringnya anak balita mengalami penyakit infeksi dalam waktu yang lama tidak hanya mempengaruhi berat badannya akan tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan linier balita (Dewi and adhi, 2016).

Pengaruh infeksi terhadap pertumbuhan linier anak didapat melalui mekanisme dengan terlebih dahulu mempengaruhi status gizi anak yaitu dengan menurunnya asupan makanan, mengganggu penyerapan zat gizi, meningkatkan kebutuhan metabolik atau menurunnya proses katabolik zat gizi sehingga akan berdampak pada pola konsumsi balita. Apabila kondisi ini berlangsung lama maka akan mempengaruhi pertumbuhan linier anak (Supariasa, 2002 dalam Suiroaka et al., 2011).

Pengaruh infeksi juga didapat melalui praktik hygiene yang buruk dapat menyebabkan munculnya bakteri. Bakteri masuk dapat melalui makanan yang biasa disajikan sehingga dapat berdampak kepada asupan yang dikonsumsi oleh balita. Balita yang mengonsumsi makanan sebagai hasil dari praktik hygiene yang buruk dapat meningkatkan risiko anak tersebut terkena penyakit infeksi yang biasa ditandai dengan gangguan nafsu makan, muntah-muntah, ataupun diare. Seorang anak yang terkena diare akan mengalami malabsorpsi zat gizi dan durasi diare yang berlangsung lama (lebih dari empat hari) akan menyebabkan anak kehilangan cairan serta sejumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh anak, bila

tidak segera ditangani dengan asupan yang sesuai maka dapat terjadi gangguan pertumbuhan. Diare yang terjadi dalam dua tahun pertama kehidupan dapat berpengaruh terhadap terjadinya retardasi pertumbuhan (Dewi and Widari, 2018; Aisah, Ngaisyah and Rahmuniyati, 2019).

Salah satu faktor penyebab diare adalah lingkungan yang kurang bersih. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan betapa pentingnya untuk melakukan praktik higiene yang baik agar kebersihan tetap terjaga karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah “kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri“.

Al-Barudi meriwayatkan dalam kitab Ash-Shahaabah dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikhrimah atau Sa'id, dari Ibnu Abas bahwa Tsabit Ibnu Dahdah bertanya kepada Nabi saw. lalu turunlah firman Allah swt. Allah swt memberi tahu tentang haid, apakah wanita setelah haid kondisinya sama seperti sebelum ia haid? Ataukah harus dijauhi secara mutlak sebagaimana yang di lakukan oleh kaum Yahudi? Maka Allah swt, mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran, maka apabila itu adalah kotoran pastilah merupakan suatu hikmah, bahwa Allah swt melarang dari kotoran itu sendiri. Karena itu Allah swt berfirman, “Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haid”, maksudnya tempat keluarnya haid. Yakni, berjima“ di kemaluannya khususnya, karena hal itu haram hukumnya menurut ijma“(Suyuthi, 2008).

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”, menunjukkan harusnya meninggalkan mencumbu bagian yang dekat dengan kemaluan, yaitu bagian di antara pusar dan lutut, sebagaimana Nabi saw. Melakukannya, bila beliau akan mencumbu istrinya pada saat istrinya itu sedang haid, beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain lalu beliau mencumbunya. Batasan waktu menjauhi dan tidak mendekati istri yang haid adalah, “sampai mereka suci”, yaitu, darah mereka telah berhenti, maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. “Apabila mereka telah suci”, maksud nya mereka telah mandi, “maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”, maksudnya yaitu pada kemaluan depan dan bukan lubang bagian belakang (Ina Wati, 2019).

Larangan tersebut merupakan kasih sayang dari Allah Swt, kepada hamba-hamba-Nya dan pemeliharaan dari kotoran, maka Allah berfirman,“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat” yaitu dari dosa-dosa mereka secara terus menerus, “dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”, yaitu yang bersuci dari dosa-dosa dan ini mencakup segala macam bersuci dari yang bersifat matrial seperti dari najis maupun hadats. Merujuk pada ayat di atas, disyariatkannya bersuci secara mutlak, karena Allah Swt, menyukai orang-orang yang suka bersuci. Itulah sebabnya, bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya shalat, thawaf dan bolehnya menyentuh mushaf. Bersuci secara maknawi seperti (mensucikan diri) dari akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah dan perbuatan-perbuatan yang kotor (Abu Fida, 2009).

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, salah satunya mengenai bagaimana manusia menjaga kebersihan, termasuk kebersihan diri dan kebersihan lingkungan.

Stunting pada anak merupakan dampak yang bersifat kronis dari konsumsi diet berkualitas rendah yang terus menerus dan didukung oleh penyakit infeksi dan masalah lingkungan. Dengan praktik higiene yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang penting bagi pertumbuhan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara mencegah kejadian *stunting* dan salah satunya yaitu melakukan praktik higiene yang tepat seperti, mencuci tangan sesuai anjuran WHO (*World health organization*) dengan sabun dan air mengalir, memastikan ketersediaan air bersih dan menyediakan sabun di setiap rumah serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apabila kebersihan tidak terjaga maka akan mudah mikroorganisme berkembang biak. Anak yang tinggal pada lingkungan yang kurang terawat akan lebih sering terpapar pada mikroba patogen melalui transmisi *fecal-oral* dan sering kali diare tidak terdeteksi (Harahap, 2015; Istiana *et al.*, 2020).

Secara umum, lingkungan tempat tinggal balita pada kedua kelompok (*stunting dan tidak stunting*) adalah sama, yang membedakan adalah praktik personal higiene dari masing-masing keluarga, masih banyak keluarga terutama pada kelompok anak *stunting* yang memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal. Mayoritas balita tinggal di daerah yang memiliki kebersihan lingkungan tidak terjaga disertai praktik higiene yang buruk. Hal seperti ini dapat menjadi penyebab balita mudah terpapar oleh mikroorganisme yang akan menyebabkan penyakit infeksi, karena sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Penyebab lainnya dapat disebabkan oleh bakteri yang ada pada makanan dan kualitas udara kurang baik. Oleh Karena itu, diperlukan peran orang tua atau ibu dalam menjaga kebersihan agar daya tahan tubuh anak tetap terjaga dan dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi. Semakin tinggi tingkat kesadaran ibu untuk menjaga kebersihan maka semakin rendah

tingkat paparan mikroorganisme atau infeksius lainnya sehingga dapat mengurangi tingkat kejadian penyakit infeksi pada balita.

4. Pemberian imunisasi balita

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel imunisasi balita terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.546. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dasar balita dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae tahun 2020.

Imunisasi dilakukan dalam bentuk memberikan vaksin dengan upaya menimbulkan antibodi atau kekebalan spesifik yang efektif mencegah penularan penyakit tertentu. Tujuan dasar dari pemberian imunisasi adalah mengurangi risiko morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) anak akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jika imunisasi tidak lengkap, maka bisa saja anak mengalami infeksi yang mengakibatkan pertumbuhannya terhambat, sehingga lama kelamaan bisa menyebabkan terjadinya *stunting*.

Pemberian imunisasi penting untuk mencegah *stunting*. Apabila balita tidak diberikan imunisasi dasar balita maka akan mudah terserang penyakit infeksi, nafsu makan yang kurang dan gangguan absorpsi zat gizi yang akan mengakibatkan kebutuhan zat gizi balita semakin tinggi. Kebutuhan zat gizi makro maupun mikro sangatlah penting pada usia balita 2 tahun pertama kehidupan untuk mendukung fase pertumbuhan yang pesat. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Rahmad (dalam jurnal Febi Damisti, 2019) menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap akan berisiko untuk terjadi gangguan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Anak dengan imunisasi yang tidak lengkap akan mengalami produksi antibodi yang tidak optimal sehingga akan lebih mudah untuk terpapar penyakit infeksi (Febi Damisti, 2020; Rahayu *et al.*, 2020).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada buku KIA mayoritas balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap baik pada kelompok balita *stunting* maupun tidak *stunting*. Hal ini disebabkan bahwa meskipun imunisasi balita lengkap bukan berarti tidak berisiko untuk terjadi *stunting*. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan *stunting* diantaranya pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, faktor ekonomi dan pengetahuan ibu yang dapat mempengaruhi kejadian *stunting* melalui sikap atau perilaku ibu dalam mengasuh anak.

Riwayat imunisasi lengkap tidak termasuk sebagai faktor risiko kejadian *stunting* pada penelitian ini. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swathma, dkk (2016) yang menyebutkan bahwa kelengkapan imunisasi berpengaruh signifikan terhadap kejadian *stunting*. Namun, pada penelitian ini variabel riwayat penyakit infeksi memiliki hubungan yang signifikan, artinya bahwa meskipun balita mayoritas memiliki kelengkapan imunisasi, akan tetapi hampir sebagian besar balita pernah memiliki riwayat penyakit infeksi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penyebab infeksi yang mempengaruhi pertumbuhan linier pada penelitian bukan karena riwayat kelengkapan imunisasinya (Swathma, Lestari and Teguh, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh azriful, dkk (2018) yang mendapatkan *p-value* 0,123 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian *stunting* pada balita. Penelitian lain juga memiliki hasil yang sama dilakukan oleh Febi Damisti Ramdhani (2019) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel imunisasi lengkap dengan kejadian *stunting*. Namun, berbeda dengan penelitian Juwita, dkk. (2019) yang membuktikan bahwa terdapat adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian *stunting* (Azriful, 2018; Juwita *et al.*, 2019; Febi Damisti, 2020).

5. Tinggi badan ibu

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel tinggi badan ibu terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.120. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae tahun 2020.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadibah Hanum (2019) yang mendapatkan bahwa tidak terdapat hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting*. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Siti Nadiah, dkk. (2020) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan orang tua dengan kejadian *stunting* didapatkan *p-value* 0.518 (Nur Hadibah Hanum, 2019; Nadiah et al., 2020).

Tinggi badan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik, makronutrient dan mikronutrien. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang. Pesan genetik yang diturunkan oleh orang tua dan tersimpan dalam *deoxiribose nucleic acid* (DNA) akan menampilkan bentuk fisik dan potensi bayi. Meski faktor genetik merupakan faktor bawaan, namun faktor ini bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tumbuh kembang bayi (Toliu, Malonda and Kapantow, 2018).

Ibu pendek memiliki peluang lebih besar melahirkan bayi yang pendek, karena aliran darah rahim dan pertumbuhan uterus, plasenta dan janin pada ibu hamil pendek terbatas, sehingga bayi yang dilahirkan memiliki perlambatan retardasi pertumbuhan janin yang dikenal dengan IUGR (*Intra Uterine Growth Retardation*). Kejadian ini akan berlangsung di generasi selanjutnya, masalah anak pendek antar generasi tidak bisa dihindari kecuali dengan adanya perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang memadai (Nur Hadibah Hanum, 2019).

Faktor yang melatarbelakangi tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* yaitu karena

dalam penelitian ini mayoritas ibu baik pada kelompok *stunting* maupun tidak *stunting*, memiliki tinggi badan normal atau ≥ 147 cm. Hal ini dapat terjadi apabila orang tua pendek karena adanya masalah nutrisi atau gizi, bukan karena gen dalam kromosom. Tinggi badan maternal dapat mempengaruhi pertumbuhan linier anak selama masa periode pertumbuhan. Pengaruh ini meliputi pengaruh genetik dan non-genetik. Akan tetapi, faktor genetik tidak menjadi satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita. Pertumbuhan dan perkembangan balita yang lambat dapat disebabkan Karena beberapa hal, seperti kurangnya asupan makanan yang bergizi, lingkungan yang buruk, kekurangan gizi saat hamil dan lain sebagainya (Nur Hadibah Hanum, 2019; Nadiah *et al.*, 2020).

6. Pendidikan ibu

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel pendidikan ibu terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.103. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae tahun 2020.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi Wibowo (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna antara pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita didapatkan nilai *p-value* 0.442. Hasil penelitian yang sama oleh Syifa (2016) mengatakan bahwa tingkat pendidikan ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan (Syifa Vaozia, 2013; Adhi Wibowo, 2018).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono & Megatsari (2019) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu balita dengan kejadian *stunting* dengan nilai *p-value* $< 0,00$. Penelitian oleh Apriani Lina (2018) juga melaporkan hasil yang sama bahwa berdasarkan uji hubungan *Chi-Square* didapatkan

hasil nilai ($p=0,001$, $C=0,598$) yang berarti ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada baduta (Laksono and Megatsari, 2019; Apriani Lina, 2018).

Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi perilaku ibu dalam mengelola rumah tangga khususnya pola pemberian makan atau asupan gizi yang tepat. Ibu yang mempunyai pendidikan tinggi, diharapkan mempunyai daya terima yang lebih baik terhadap ilmu yang diterima sehingga diharapkan dapat dipraktikkan pada keluarga. Namun, pendidikan yang rendah tidak menjamin seorang ibu tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai makanan pada keluarga. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dapat mempengaruhi ibu dalam mendapatkan informasi mengenai makanan yang tepat untuk anak. Dalam penelitian ini, pendidikan ibu bukan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya *stunting* karena, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan tamat SMA baik pada kelompok *stunting* maupun tidak *stunting* (Adhi Wibowo, 2018).

Pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses belajar seseorang, responden dengan tinggi tingkat pendidikan tinggi akan mudah dalam menerima ilmu atau informasi khususnya dalam pemilihan pangan sehingga cenderung akan memilih bahan makanan yang lebih baik dalam segi kualitas dan kuantitas. Semakin banyak informasi maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Namun, status pendidikan rendah tidak menjamin seorang ibu tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam pemilihan pangan. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dapat mempengaruhi ibu dalam mendapatkan informasi mengenai pemilihan makanan yang tepat untuk proses tumbuh kembang anak (Adhi Wibowo, 2018; Apriani *et al.*, 2018; Apriluana and Fikawati, 2018).

7. Pengetahuan ibu tentang gizi balita

Berdasarkan hasil penelitian anatara variabel pengetahuan ibu tentang gizi balita terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.015. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi balita terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pekkae tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windi (2018) melaporkan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi yang rendah merupakan faktor risiko terjadinya *stunting* pada balita dengan risiko sebesar 3,801 dengan nilai *p-value* 0,027. Penelitian oleh Tsralatifah (2020) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi ibu dengan kejadian *stunting* pada baduta ($p=0,046$) dengan OR sebesar 0,091. Artinya baduta yang memiliki ibu dengan pengetahuan gizi rendah berisiko 0,091 kali mengalami *stunting* (Windi Haspari, 2018; Tsralatifah, 2020).

Penelitian Ni'mah & Nadhiroh (2015) menghasilkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang gizi berhubungan dengan *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0,015 dan ibu yang memiliki pengetahuan tentang gizi rendah memiliki risiko sebesar 3,877 kali untuk mengalami *stunting* dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik (Ni'mah Khoirun and Nadhiroh, 2015).

Pengetahuan merupakan faktor tidak langsung yang berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun status gizi anak. Pengetahuan gizi ibu akan menentukan sikap atau perilaku ibu dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh balita serta pola makan terkait jumlah, jenis dan frekuensi yang tepat yang akan mempengaruhi asupan makan pada bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Nindyna Puspasari and Merryana Andriani, 2017; Septamarini, dkk., 2019).

Pengetahuan tentang gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan.

Selain itu, budaya juga memiliki peran dalam mempengaruhi pemilihan makanan oleh ibu. Jika seorang ibu memiliki pengetahuan gizi yang kurang maka asupan makanan yang akan diberikan kepada balita juga kurang tepat dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang balita tersebut (Winda Haspari, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat 17 responden yang memiliki pengetahuan tentang gizi balita tinggi, diantaranya 9 responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1, 5 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA dan 3 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP dan terdapat 55 responden yang memiliki pengetahuan tentang gizi balita rendah, diantaranya 14 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD, 12 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP, 16 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA dan 13 responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1. Meskipun sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan tamat SMA. Namun, responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir tamat SMA memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan informasi atau pengetahuan yang diperoleh ibu sangat terbatas karena tingkat pendidikan ibu turut menentukan mudah tidaknya seorang ibu dalam menyerap dan memahami serta memperoleh pengetahuan tentang gizi balita. Pendidikan diperlukan agar seseorang terutama ibu lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi di dalam keluarga dan diharapkan bisa mengambil tindakan yang tepat sesegera mungkin (Winda Haspari, 2019; Septamarni, dkk 2019).

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas bahwa manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi baik itu dari sisi kehalalan maupun kualitas makanan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) :168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Kata طيبا secara bahasa bermakna suci dan bersih. Menurut imam al-Shafi'i, Kata طيبا bermakna sesuatu yang baik dan sehat. Dengan demikian, ayat ini melarang untuk mengonsumsi makanan yang buruk dan tidak sehat walaupun sebenarnya merupakan makanan halal. Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah yang ditunjukkan kepada manusia untuk memilih dan memilah makanan yang hendak dikonsumsi, yaitu makanan tersebut harus bersifat halal. Karena, kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam terutama dalam hal memilih makanannya. Kemudian, makanan tersebut harus baik (thayyib) artinya makanan itu tidak berbahaya bagi tubuh. Manusia juga harus memperhatikan kualitas yang ada pada makanan tersebut, seperti daging yang sudah dikemas, yang kemudian dimakan secara mentah-mentah. Meskipun daging itu halal akan tetapi tidak baik (Shihab, 2012).

Makna thayyib dalam ayat tersebut segala sesuatu yang secara kandungan baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi cukup dan seimbang. Dalam al-Qur'an disebutkan berbagai jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Aneka

macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangan. Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Aman, tuntunan perlunya makanan yang aman adalah berusaha menghindari dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman (Shihab, 2013).

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai salah satu cara mencegah kejadian *stunting* dengan memperhatikan keragaman sumber makanan dan meningkatkan kualitas diet anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin beragam sumber makanan yang bersumber dari hewani sangat berkaitan dengan pertumbuhan linier. Balita yang memiliki akses kurang terhadap pangan jika kualitas dan kuantitas komposisi menu hariannya kurang lengkap serta frekuensi lauk nabati yang lebih dominan, pangan rumah tangga yang memiliki komposisi yang tidak bergizi, tidak berimbang dan tidak bervariasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan kekurangan gizi pada balita.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki pengetahuan yang kurang terhadap gizi balita. Apabila seorang ibu memiliki pengetahuan tentang gizi balita kurang, maka ibu akan mengalami kesulitan dalam memilih dan memilah makanan yang halal lagi baik untuk proses tumbuh kembang balita. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga yang dimiliki oleh keluarga balita akan memiliki akses yang kurang dalam memilih pangan yang bervariasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengetahuan gizi ibu dan pengasuh balita sangat berpengaruh terhadap pilihan makan anak. Kecukupan gizi sangat penting bagi kesehatan balita, dimana seluruh pertumbuhan dan kesehatannya berkaitan erat dengan masukan makanan yang memadai. Pertumbuhan dan perkembangan yang optimal memerlukan makanan yang sesuai dengan balita yang sedang tumbuh. Pengolahan bahan makan untuk balita disesuaikan dengan umurnya. Hal ini dikarenakan setiap balita dalam masa perkembangan kemampuan sistem pencernaannya

berbeda-beda. Upaya untuk mencapai status gizi anak balita yang baik adalah dengan tercukupi kebutuhan gizi.

8. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian antara variabel pengetahuan ibu tentang gizi balita terhadap kejadian *stunting* didapatkan nilai *p-value* 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi dengan kejadian *stunting* pada balita usia 6–23 bulan di wilayah kerja puskesmas Pekkae tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pada kelompok ekonomi rendah menunjukkan balita *stunting* terbanyak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, dkk (2018) melaporkan hasil bahwa didapatkan *p-value* 0.018 yang artinya tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *stunting*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azqinar dan Himayani (2020) melaporkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor ekonomi dengan kejadian *stunting* pada balita dengan nilai *p value* 0,008 ($p < 0,05$) (Setiawan, Machmud and Masrul, 2018; Azqinar and Himayani, 2020).

Penelitian Tsralatifah (2020) melaporkan hasil yang berbeda, yaitu menunjukkan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga bukan menjadi faktor penyebab terjadinya *stunting* ($p > 0,05$) (Tsralatifah, 2020).

Status ekonomi rendah dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap kejadian *stunting* pada anak. *Stunting* yang disebabkan oleh *growth faltering dan catch up growth* yang tidak memadai, mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal. Akan tetapi, jika diberikan dukungan asupan gizi yang adekuat maka pola pertumbuhan normal dapat terkejar (*catch up*). Asupan gizi yang adekuat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan. Hal ini dipengaruhi oleh status ekonomi. Status ekonomi rendah berdampak pada ketidakmampuan untuk mendapat pangan yang

cukup dan berkualitas karena rendahnya kemampuan daya beli. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 67% ayah sampel pada kelompok *stunting* memiliki pekerjaan dengan gaji rendah seperti petani, pedagang, kuli bangunan bahkan ditemukan beberapa responden yang tidak bekerja dan selama pandemi responden mengaku bahwa penghasilan mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hariannya. Berdasarkan pengamatan, lebih dari separuh sampel kelompok *stunting* memiliki tempat tinggal yang kurang layak untuk dijadikan tempat hunian seperti lantai yang belum ditegel, dinding yang terbuat dari kayu, ventilasi yang kurang pada setiap ruangan dan atap rumah yang bocor serta kebersihan rumah yang kurang bersih. Kondisi ekonomi seperti ini membuat balita *stunting* sulit mendapatkan asupan zat gizi yang adekuat sehingga balita tidak mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan.

Berdasarkan hasil penelitian Utami, dkk (2017) melaporkan hal yang sama bahwa pendapatan keluarga mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita. Pendapatan keluarga terkait pemenuhan asupan energi dan protein untuk anak bisa menjadi faktor tidak langsung terkait kejadian *stunting*. Penghasilan keluarga terkait dengan penyediaan makanan keluarga, akses mendapatkan makanan dikeluarga dan distribusi makanan yang memadai untuk keluarga karena, pendapatan keluarga yang rendah akan mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan keluarga. Jika hal tersebut terjadi, maka secara tidak langsung pendapatan keluarga dapat mempengaruhi status gizi anggota keluarga khususnya balita karena asupan yang dikonsumsi tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga anak cenderung mengonsumsi makanan dalam segi kuantitas, kualitas, serta variasi yang kurang. Tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan kurangnya daya beli pangan rumah tangga. Apabila daya beli pangan rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan gizi balita (Utami, dkk 2017; Apriluana and Fikawati, 2018; windi Haspari, 2018; Azqinar and Himayani, 2020).

Stunting yang terjadi pada keluarga yang mempunyai ekonomi rendah disebabkan karena rendahnya pemahaman tentang gizi dan pengelolaan diet serta praktik kebersihan diri. Status ekonomi yang rendah pada kelompok *stunting* juga terjadi akibat praktik higiene dan sanitasi yang rendah. Balita yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang kurang akan lebih mudah terpapar oleh mikroba atau patogen. Praktik personal higiene yang buruk akan menimbulkan risiko tinggi munculnya bakteri. Bakteri-bakteri ini lah yang akan masuk ke tubuh anak melalui makanan yang biasa disajikan di rumah dan dapat berdampak kepada kesehatan anak tersebut, sehingga bila tidak segera ditindaklanjuti dan diimbangi dengan asupan yang sesuai maka akan terjadi gagal tumbuh. Anak yang kurang gizi akan memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit yang rendah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan dampak penyalit infeksi ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan menghambat pertumbuhan badan (Mohammed, S. H, et al, 2019; Aisah, Ngaisyah and Rahmuniyati, 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Riwayat pemberian MP-ASI balita merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=0,031$; RP 1.36).
2. Riwayat penyakit infeksi balita merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=0,005$; RP 1.41).
3. Pendidikan ibu merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=0,015$; RP 1,44).
4. Pengetahuan ibu tentang gizi balita merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=0,031$; 1.36).
5. Faktor ekonomi keluarga merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=0,000$ RP 2.71).
6. Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, imunisasi balita, tinggi badan ibu bukan merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita balita usia 6 bulan – 23 bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau ($p=>0,005$).

B. Saran

1. Bagi instansi kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemantauan secara rutin terhadap pemberian makanan tambahan dan memberikan penyuluhan mengenai *stunting*, serta pelatihan kader posyandu balita tentang dampak yang akan ditimbulkan pada balita yang mengalami *stunting* agar kader lebih terampil dan dapat menyebar luaskan informasi tentang *stunting*.
2. Bagi ibu diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terkhusus pada kesehatan ibu dan anak untuk mencegah terjadinya *stunting*
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang lebih kompleks yang dapat mempengaruhi kejadian *stunting*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida (2009) *Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimayqi, Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir, terj: M. „Abdul Ghoffar*. Edited by Imam Syafi'i. Jakarta.
- Adhi Wibowo, H. kusuma (2018) '*Hubungan Asupan Kalsium Dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Kartasura*' Jurnal Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aisah, S., Ngaisyah, R. D. and Rahmuniyati, M. E. (2019) '*Personal Hygiene Dan Sanitasi Lingkungan Berhubungan dengan Kejadian Stunting di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan*', pp. 49–55. Available at: <http://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/download/182/176>.
- Any Virginia, Sugeng Maryanto, R. M. A. (2019) '*Hubungan Pemberian Mp-Asi dan Usia Pertama Pemberian Mp-Asi Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*' Jurnal Ilmu Kesehatan Univeristas Ngudi Waluyo.
- Apriani, L. et al. (2018) '*Hubungan Karakteristik Ibu, Pelaksanaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Phbs) Dengan Kejadian Stunting (Studi Kasus Pada Baduta 6 - 23 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit Kota Surakarta)*', Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6(4), pp. 198–205.
- Apriluana, G. and Fikawati, S. (2018) '*Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara*', Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 28(4), pp. 247–256. doi: 10.22435/mpk.v28i4.472.
- Azqinar, T. C. (2019) '*Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Way Urang Kabupaten Lampung Selatan*', 4(1), pp. 75–84. Available at: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60613>.

- Azriful, D. (2018) '*Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*'.
- Choliq, I., Nasrullah, D. and Mundakir, M. (2020) '*Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak*', *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 31–40. doi: 10.30651/hm.v1i1.4544.
- Chowdhury, T. R. *et al.* (2020) '*Factors associated with stunting and wasting in children under 2 years in Bangladesh*', *Heliyon*, 6(9), p. e04849. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04849.
- Cumming, O. and Cairncross, S. (2016) '*Can Water, Sanitation, and Hygiene Help Eliminate Stunting? Current Evidence and Policy Implications*', *Maternal and Child Nutrition*, pp. 91–105.
- Citra Ayu Anggreli Dewi Anggraini Maya Savira (2015) '*Gejala Penyerta Pada Balita Diare Dengan Infeksi Enteropathogenic Escherichia Coli (Epec) Di Puskesmas Rawat Inap Kota Pekanbaru Citra*', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 1–20.
- Dasman, H. (2019) '*Empat dampak stunting bagi anak dan negara Indonesia*', *The Conversation (Disipln Ilmiah, gaya Journalistik)*, pp. 22–24. Available at: [http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat dampak stunting bagi anak dan negara Indonesia.pdf](http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat_dampak_stunting_bagi_anak_dan_negara_Indonesia.pdf).
- Dewey, K. G. (2016) '*Reducing Stunting by Improving Maternal, Infant, and Young Child Nutrition in Region Such as South Asia: Evidence Challenges, and Opportunities*', pp. 27–38.
- Dewi, I. A. and Adhi, K. T. (2014) '*Pengaruh Konsumsi Protein Dan Seng Serta Riwayat Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Pendek Pada Anak Balita Umur 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Nusa Penida Iii*', *Gizi Indonesia*, 37(2), pp. 36–46. doi: 10.36457/gizindo.v37i2.161.
- Dewi, N. T. and Widari, D. (2018) '*Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Baduta di Desa Maron Kidul*

- Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*, *Amerta Nutrition*, 2(4), p. 373.
doi: 10.20473/amnt.v2i4.2018.373-381.
- Dwi, A. *et al.* (2019) '*Pengaruh Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar*', *Jurnal Majority*, 8(2), pp. 273–282. Available at: <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2483>.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Barru. *Profil kesehatan Kabupaten Barru 2016*. Dinas Kabupaten Barru. 2017;14-5.
- Febi Damisti (2020) '*Analisis Faktor Risiko Stunting Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Puskesmas Seberang Padang Kota Padang Tahun 2019*', *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas*.
- Fithrotin (2018) '*Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maragh*', *Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 1.
- Hagos, S. *et al.* (2017) '*Spatial heterogeneity and risk factors for stunting among children under age five in Ethiopia: A Bayesian geo-statistical model*', *Plos One*, 12(2), pp. 1–18. doi: 10.1371/journal.pone.0170785.
- Hanifah, R. N., Djais, J. T. B. and Fatimah, S. N. (2019) '*Prevalensi Underweight, Stunting, dan Wasting pada Anak Usia 12-18 Bulan di Kecamatan Jatinangor*', *Jsk*, 5(3), pp. 3–7.
- Harahap, R. Z. (2015) '*Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*', <file:///F:/SKRIPSI/Journal/Deforestasi/42689-ID-etika-islam-dalam-mengelola-lingkungan-hidup.pdf>, 1(1).
- Helmyati, S. (2019) *Stunting Dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, M. S. (2017) '*Prevalensi Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen Karangasem*', *E-Jurnal Medika*, 6(7), pp. 1–5.
- Ibnu Katsir, A. A. F. (2005) *Tafsir Al-Qur'ân Al- 'Azhîm*. terj. M. Abdul Ghafar. 1st edn. Edited by Pustaka Imam Syafi'i. Jakarta.
- Ina Wati (2019) '*Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*', *Ilmu Al-Quran dan*

Tafsir.

- Indah Budiastutik and Muhammad Zen Rahfiludin (2019) '*Faktor Risiko Stunting pada anak di Negara Berkembang*', *Amerta Nutrition*, 3(3), pp. 122–129. doi: 10.2473/amnt.v3i3.2019.122-129.
- Indrianti, A. F. (2019) '*Berat Badan Lahir Dan Pemberian Asi Berhubungan Dengan Stunting Balita Di Jakarta*', *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 1(2), pp. 86–92.
- Istiana, H. *et al.* (2020) '*Konsep Kesehatan Lingkungan Dalam Hukum Kesehatan Dan Perspektif Hukum Islam*', 53(9), pp. 1689–1699.
- Juwita, S. *et al.* (2019) '*Hubungan Jumlah Pendapatan Keluarga dan Kelengkapan Imunisasi Dasar dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Pidie*', *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala*2(4), pp. 1–10.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) '*Buku saku pemantauan status gizi*', pp. 7–11.
- Khairiyah, D. and Fayasari, A. (2020) '*Perilaku higiene dan sanitasi meningkatkan risiko kejadian stunting balita usia 12-59 bulan di Banten*', *Ilmu Gizi Indonesia*, 3(2), p. 123. doi: 10.35842/ilgi.v3i2.137.
- Laksono, A. D. and Megatsari, H. (2019) '*Determinan Balita Stunting di Jawa Timur: Analisis Data Pemantauan Status Gizi 2017*'. doi: 10.31227/osf.io/qh94p.
- Larasati, D. A., Nindya, T. S. and Arief, Y. S. (2018) '*Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat Pemberian ASI Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pujon Kabupaten Malang*', *Amerta Nutrition*, 2(4), p. 392. doi: 10.20473/amnt.v2i4.2018.392-401.
- Lestiarini, S. and Sulistyorini, Y. (2020) '*Perilaku Ibu pada Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) di Kelurahan Pegirian*', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), p. 1. doi: 10.20473/jpk.v8.i1.2020.1-11.

- Mohammed, A. H., Muhammad, F., Pakzad, R., Alizadeh, S. (2019) '*Socioeconomic Inequality in Stunting Among Under-5 Children in Ethiopia :A Decomposition Analysis*', BMC Research Notes, 12: 184. Page: 1 – 5
- Murarkar, S. *et al.* (2020) '*Prevalence and determinants of undernutrition among under-five children residing in urban slums and rural area, Maharashtra, India: a community-based cross-sectional study*', BMC Public Health, 20(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12889-020-09642-0.
- Nadiah, S. *et al.* (2020) '*Tinggi badan orang tua, pola asuh, dan kejadian diare sebagai faktor risiko kejadian stunting pada balita di Kabupaten Bondowoso*', Jurnal Gizi Kesehatan Masyarakat, Repository Universitas Jember', 04(01), pp. 11–18.
- Ni'mah Khoirun and Nadhiroh, S. R. (2015) '*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*', Media Gizi Indonesia, 10(1), pp. 13–19. Availableat:<http://ejournal.unair.ac.id/index.php/MGI/article/view/3117/2264>
- Nindyna Puspasari and Merryana Andriani (2017) '*Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Gizi dan Asupan Makan Balita dengan Status Gizi Balita (BB/U) Usia 12-24 Bulan*', Amerta Nutrition, 1(4), pp. 369–378. doi: 10.20473/amnt.v1.i4.2017.369-378.
- Nugraheni, D. *et al.* (2020) '*Asi Eksklusif Dan Asupan Energi Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Usia 6 – 24 Bulan Di Jawa Tengah*', Journal of Nutrition College, 9(2), pp. 106–113. doi: 10.14710/jnc.v9i2.27126.
- Nur Hadibah Hanum (2019) '*Hubungan Tinggi Badan Ibu dan Riwayat Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan*', Amerta Nutrition, 3(2), pp. 78–84. doi: 10.2473/amnt.v3i2.2019.78-84.
- Nurkomala, S. (2017) '*Praktik Pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) Pada Anak Stunting Dan Tidak Stunting Usia 6-24 Bulan*', Jurnal Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro.
- UNICEF. *Malnutrition in Children*. [Online]; 2017 (diunduh 23 Maret 2019). Tersedia dari: <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition>

- Utami AD, Indarto D, Dewi YLR. (2017) ‘ *The Effect of Nutrient Intake and Socioeconomic Factor Toward Stunting Incidence Among Primary School Students in Surakarta* ’2(1), page: 1–1
- Prihutama, N. Y., Rahmadi, F. A. and Hardaningsih, G. (2018) ‘*Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Anak Usia 2-3 Tahun*’, *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 7(2), pp. 1419–1430.
- Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI (2018) ‘*Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*’, *Kementerian Kesehatan RI*, p. 56. Available at: www.pusdatin.kemkes.go.id.
- PSG Seksi Gizi Masyarakat. LKJ Provisnis Sul-Sel. 2015;1–90.
- Rambitan, W., Purba, R. B. and Kapantow, N. H. (2019) ‘*Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Anak Batita di Wilayah Kerja Puskesmas Kawangkoan Kabupaten Minahasa*’, Available at: fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Winny-Artikel.pdf.
- Rahayu, S. R. I. *et al.* (2020) ‘*Disease With Stunting Incidence In Toddler* ’, 8(2), pp. 1–9
- Riskesdas K. *Hasil Utama Riset Kesehata Dasar* (Riskesdas).2018;44(8):1
- Saputri, R. M. and Viridula, E. Y. (2018) ‘*Status Gizi Dan Riwayat Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting (Nutrition Status And Extrusive Assembly With Stunting)*’, *Jurnal Darul Azhar*, 6(1), pp. 59–68.
- Septamarini, R. G., Widyastuti, N. and Purwanti, R. (2019) ‘*Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Responsive Feeding Dengan Kejadian Stunting Pada Baduta Usia 6-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo, S*’, *Journal of Nutrition College*, 8(1), p. 9.
- Setiawan, E., Machmud, R. and Masrul, M. (2018) ‘*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang*

- Tahun 2018*', Jurnal Kesehatan Andalas, 7(2), p. 275. doi: 10.25077/jka.v7i2.813.
- Shihab, M. Q. (2012) *Tafsir Al-Misbah Cet. V. v.* Edited by Lentera Hati. Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2013) '*Wawasan Al-Qur'an*', Mizan pustaka, pp. 196–199.
- Sholikah, A., Rustiana, E. R. and Yuniastuti, A. (2017) '*Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Pedesaan dan Perkotaan*', Public Health Perspective Journal, 2(1), pp. 9–18.
- Sri Sudaryati Nasa (2015) '*Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi): Pedoman Dan Prinsip Pemberiannya*', Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM.
- Suca, U. A., Fajar, N. A. and Idris, H. (2019) '*Analisis Aspek Biologis dan Psikologis Ibu terhadap Stunting pada Balita dari Keluarga Miskin di Kota Palembang*', Jurnal Kesehatan Vokasional, 4(2), p. 65. doi: 10.22146/jkesvo.45411.
- Suryana, S. and Fitri, Y. (2019) '*Pengaruh Riwayat Pemberian Asi Dan Mp-ASI Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak (Usia 12-24 Bulan) Di Kota Banda Aceh*', Jurnal Penelitian Kesehatan, 6(1), pp. 25–34. doi: 10.22435/sel.v6i1.1723.
- Suyuthi, J. (2008) *Asbabun nuzul : Sebab turunnya ayat al-qur'an / Jalaluddin As-Suyuthi*. 1st edn. Jakarta.
- Syifa Vaozia, N. (2013) '*Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Anak Usia 2-3 Tahun (Studi di Kecamatan Semarang Timur)*', Journal of Nutrition College, 2(4), pp. 523–530. doi: 10.14710/jnc.v2i4.3735.
- Tassew, Woldehanna, Jere, R., Behrman, Mesele, W., and A. (2017) '*The Effect of Early Childhood Stunting on Children's Cognitive Achievements: Evidence from Young Lives Ethiopia*', Ethiopian Journal of Health Development, p. 31 (2).
- Titus Priyo Harjatmo, Holil M. Par'i, S. W. (2017) '*Bahan Ajar Gizi Penilaian Status Gizi*', in. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

- Toliu, S. N. K., Malonda, N. S. and Kapantow, N. H. (2018) '*Hubungan Antara Tinggi Badan Orang Tua Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara* ', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(5), pp. 5–9.
- Tsaratatifah, R. (2020) '*Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Baduta di Kelurahan Ampel Kota Surabaya Determinants of Stunted Children Under Two Years Old in Ampel Village , Surabaya*', (December 2018). doi: 10.20473/amnt.
- Wandini, R. *et al.* (2020) '*Pemberian makanan pendamping asi (MP-ASI) berhubungan dengan kejadian stunting pada balita*'. DOI 10.33024, <Http://Ejurnalmalahayati.Ac.Id/Index.Php/Kebidanan>.
- Wellina, W. F., Kartasurya, M. I. and Rahfilludin, M. Z. (2016) '*Faktor risiko stunting pada anak usia 6 - 12 bulan*', *Jurnal Gizi Indonesia*, 5(1), pp. 55–61.
- Windi Haspari (2018) . '*Hubungan pendapatan Keluarga, Pengetahuan Ibu Tentang Gizi, Tinggi Badan Orang Tua, Dan Tingkat Pendidikan Ayah Dengan Kejadian Stunting*', *Jurnal Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- World Health Organization. *The WHO Child Growth Standards*. [Online]; 2016 (diun. Available from: dari: <https://www.who.int/%0Achildgrowth/en/>
- Zuhairi Misrawi (2017) '*Al-Qur'an kitab toleransi : Tafsir tematik Islam rahmatan lil'alam / Zuhairi Misrawi*', *Pustaka Oasis*

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Saudara (i) Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alda Fadillah

NIM : 70600117026

Sebagai mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Akan melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Risiko Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 6-23 Bulan Di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2020”.

Sehubung dengan hal di atas, saya memohon kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur dan benar. Pengisian kuesioner ini sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Identitas tidak akan dipublikasi dan dijaga kerahasiaanya. Atas partisipasi dan kebijakan yang baik, Saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Dengan ini saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Umur :

Nama anak yang akan diukur :

Nomor Telepon :

Menyatakan setuju dan bersedia untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner dalam penelitian **“Analisis Faktor Risiko *Stunting* Pada Balita Usia 6-23 Bulan Di Puskesmas Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2020”**

Demikian lembar persetujuan saya buat secara sukarela dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN/...../.....
M A K A S S A R Pembuat pernyataan

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN *STUNTING* PADA BALITA USIA 6 - 23 BULAN DI WILAYAH KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU 2020

.....

Nomor responden :

Tanggal wawancara :

Nama pewawancara :

A. Identitas subjek/responden

1. Nama anak :
2. Jenis kelamin : laki-laki / perempuan
3. Umur : tahun bulan
4. Anak ke : dari bersaudara

B. Identitas Ibu

5. Nama Ibu : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
6. Umur Ibu : ALAUDDIN
7. TB Ibu : M A K A S S A R
8. Alamat :
9. No. Telepon :

C. Pengukuran antropometri

1. Tinggi badan anak : cm
2. Berat badan lahir : kg
3. Status gizi anak : (diisi oleh pemeriksa)

D. Riwayat Pemberian ASI Eksklusif

1. Apakah Ibu memberikan kolostrum (ASI yang pertama kali keluar) kepada anak ?

- a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah ibu memberikan ASI saja pada anak usia 0-6 bulan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 3. Apakah ketika anak baru lahir diberikan susu formula, madu, air beras atau air putih?
 - a. Ya, (Tuliskan beberapa)
 - b. Tidak
 4. Berapa lama Ibu pernah memberikan susu formula saat ASI tidak lancar?
 - a. 1 bulan pertama
 - b. 2 bulan
 - c. 4 bulan
 - d. kurang lebih 6 bulan
 5. Apakah saat ini anak masih diberi ASI
 - a. Ya
 - b. Tidak
 6. Pada usia berapa anak berhenti ASI

E. Riwayat Pemberian MP-ASI

1. Mulai usia berapa anak diberikan MP-ASI ?
 - a. < 6 bulan
 - b. ≥ 6 bulan
2. MP-ASI apa yang pertama kali diberikan kepada anak ?
 - Bubur susu
 - bubur sereal instan
 - Nasi tim saring
 - Bubur nasi
 - Nasi
 - Biskuit
 - Kentang

- Daging
 - Buah
 - Air putih
 - Air jeruk
 - Madu
 - Air beras
 - Air gula
3. Berapa kali MP-ASI diberikan pertama kali pada anak ?
- 1 kali sehari
 - 2 kali sehari
 - 3 kali sehari
 - >3 kali sehari
4. Berapa banyak MP-ASI yang ibu berikan kepada anak dalam setiap kali makan?
- 2-3 sendok makan
 - ½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml
 - ¾ sampai 1 mangkok kecil atau setara dengan 175–250 ml
5. MP-ASI apa yang diberikan pada saat anak usia 6-9 bulan ?
- Bubur susu
 - bubur sereal instan
 - Nasi tim saring
 - Bubur nasi
 - Nasi
 - Biskuit
 - Kentang
 - Daging
 - Buah
 - Air putih
 - Air jeruk
 - Madu

- Air beras
 - Air gula
6. Berapa kali MP-ASI diberikan saat anak usia 6-9 bulan ?
- 1 kali sehari
 - 2 kali sehari
 - 3 kali sehari
 - >3 kali sehari
7. Berapa kali ibu memberikan makanan selingan/cemilan kepada anak dalam sehari?
- 1 kali makanan camilan
 - 1-2 kali makanan camilan
 - Lain-lain, sebutkan
8. Makanan selingan/cemilan apa yang biasa ibu berikan kepada anak ibu?
- Buah-buahan
 - Biskuit
 - Jajanan instan
 - Lain-lain,
9. Berapa banyak MP-ASI yang ibu berikan kepada anak dalam setiap kali makan?
- 2-3 sendok makan
 - $\frac{1}{2}$ mangkok kecil atau setara dengan 125ml
 - $\frac{3}{4}$ sampai 1 mangkok kecil atau setara dengan 175–250 ml
10. MP-ASI apa yang diberikan pada saat anak usia 9-12 bulan ?
- Bubur susu
 - bubur sereal instan
 - Nasi tim saring
 - Bubur nasi
 - Nasi
 - Biskuit
 - Kentang

- Daging
- Buah
- Air putih
- Air jeruk
- Madu
- Air beras
- Air gula

11. Berapa kali MP-ASI diberikan saat anak usia 9-12 bulan ?

- 1 kali sehari
- 2 kali sehari
- 3 kali sehari
- >3 kali sehari

12. Berapa kali ibu memberikan makanan selingan/cemilan kepada anak dalam sehari?

- 1 kali makanan camilan
- 1-2 kali makanan camilan
- Lain-lain, sebutkan

13. Makanan selingan/cemilan apa yang biasa ibu berikan kepada anak ibu?

- Buah-buahan
- Biskuit
- Jajanan instan
- Lain-lain,

14. Berapa banyak MP-ASI yang ibu berikan kepada anak dalam setiap kali makan?

- 2-3 sendok makan
- ½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml
- ¾ sampai 1 mangkok kecil atau setara dengan 175–250 ml

15. MP-ASI apa yang diberikan pada saat anak usia 12-24 bulan ?

- Bubur susu
- bubur sereal instan

- Nasi tim saring
- Bubur nasi
- Nasi
- Biskuit
- Kentang
- Daging
- Buah
- Air putih
- Air jeruk
- Madu
- Air beras
- Air gula

16. Berapa kali MP-ASI diberikan saat anak usia 12-24 bulan ?

- 1 kali sehari
- 2 kali sehari
- 3 kali sehari
- >3 kali sehari

17. Berapa kali ibu memberikan makanan selingan/cemilan kepada anak dalam sehari?

- 1 kali makanan camilan
- 1-2 kali makanan camilan
- Lain-lain, sebutkan

18. Makanan selingan/cemilan apa yang biasa ibu berikan kepada anak ibu?

- Buah–buahan
- Biskuit
- Jajanan instan
- Lain-lain,

19. Berapa banyak MP-ASI yang ibu berikan kepada anak dalam setiap kali makan?

- 2-3 sendok makan

- ½ mangkok kecil atau setara dengan 125ml
- ¾ sampai 1 mangkok kecil atau setara dengan 175–250 ml

E. Status sosial ekonomi

1. Jumlah anggota keluarga : orang
2. Jumlah anak balita : orang
3. Pendidikan terakhir Ibu :
 - Tidak Sekolah
 - Tamat SD/ sederajat
 - Tamat SMP/ sederajat
 - Tamat SMA/ sederajat
 - Tamat perguruan tinggi
4. Pekerjaan Ayah :
 - Tidak bekerja
 - Pegawai negeri
 - Pegawai swasta
 - Wiraswasta
 - Lainnya, sebutkan.....
5. Pekerjaan Ibu :
 - Tidak bekerja
 - Pegawai negeri
 - Pegawai swasta
 - Wiraswasta
 - Lainnya, sebutkan.....
6. Anggota keluarga yang bekerja.....orang
7. Total pendapatan keluarga :
 - 1 Pendapatan ayah :.....



- 2 Pendapatan Ibu :.....
- 3 Pendapatan anggota keluarga yang lain, sebutkan :
 - a.
 - b.
 - c.
- 4 Pendapatan total keluarga :

F. Riwayat Penyakit Infeksi

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi balita

1. Apakah anak ibu pernah menderita diare atau mencret pada bulan januari-oktober?
 - 1) Ya
 - 2) Tidak

Jika Iya, Kapan?...

Lingkari salah satu!

 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. 4 kali
 - e. Lebih dari 4 kali...

Jawaban :

1. Ya, Frekuensi diare ≥ 3 kali/hari selama minimal 2 hari, maka menderita diare dalam kurun waktu bulan januari-agustus
 2. Tidak menderita diare dalam kurun waktu bulan januari-agustus.
2. Berapa kali dalam bulan januari-oktober anak ibu terkena diare?
 - a. < 3 kali
 - b. ≥ 3 kali

Jawaban :

- a. Tidak menderita diare
- b. Menderita diare

3. Apakah diare yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu bulan januari-oktober?
 - a. Ya (Menderita diare)
 - b. Tidak (Tidak menderita diare)
4. Apakah anak ibu pernah menderita gejala batuk pada bulan januari-oktober?
 - a. Ya, bagaimana gejala yang terjadi dan berapa lama?.....
 - b. Tidak?

Jawaban : Jika menjawab iya dengan disertai salah satu atau lebih gejala seperti pilek, demam atau sesak nafas \leq 2 minggu maka menderita infeksi saluran pernafasan atas akut.

5. Berapa kali dalam kurun waktu bulan januari-oktober anak ibu menderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA)?
 - a. $<$ 3 kali
 - b. \geq 3 kali

Jawaban :

- a. Pernah menderita ISPA
 - b. Tidak menderita ISPA
6. Apakah gejala ISPA yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu januari-oktober?
 - a. Ya (Menderita ISPA)
 - b. Tidak (Tidak menderita ISPA)
 7. Apakah anak Ibu pernah mengalami gejala seperti sakit perut, gatal di area anus, nafsu makan berkurang, badan kurus, dan ruam pada kulit?
 - a. Ya, sebutkan...
 - b. Tidak


G. Pemberian imunisasi balita

1. Apakah anak ibu diimunisasi?
 - a) Ya
 - b) Tidak


2. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi BCG?
 - a) Ya
 - b) Tidak
3. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi DPT-HB-HIB?
 - a) Ya
 - b) Tidak
4. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi Hepatitis B?
 - a) Ya
 - b) Tidak
5. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi Polio oral?
 - a) Ya
 - b) Tidak
6. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi Campak?
 - a) Ya
 - b) Tidak

H. Pengetahuan Tentang Gizi Ibu Hamil dan Balita

1. Porsi makan ibu ketika hamil sebaiknya lebih banyak dibandingkan ketika tidak hamil
 - a. Tidak tahu
 - b. Benar
2. Kecukupan gizi (kesehatan) ibu ketika hamil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak
 - a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
3. Manfaat makanan bergizi untuk Ibu hamil adalah...
 - a. Memperbaiki keturunan
 - b. Mengurangi kegemukan
 - c. Kesehatan Ibu dan janin
4. Selain makanan, Ibu hamil membutuhkan tambahan zat besi, menurut Ibu sumber zat besi seperti?

- 
- a. Tablet tambah darah
 - b. Vitamin A
 - c. Kalsium
5. Kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi dapat menyebabkan?
- a. Kegemukan
 - b. Hipertensi (Tekanan darah tinggi)
 - c. Anemia (Kekurangan darah)
6. Bila selama hamil ibu mengalami anemia (kurang darah) dapat mengakibatkan berat badan lahir bayi rendah
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
8. Bagi Ibu yang sedang hamil atau menyusui dianjurkan untuk minum susu, sebab susu mengandung...
- a. Vitamin dan mineral
 - b. Vitamin dan kalori
 - c. Kalsium dan protein
9. Garam yang baik dikonsumsi adalah...
- a. Garam biasa
 - b. Garam beryodium
 - c. Garam tidak beryodium
10. Berapa banyak kebutuhan mineral atau air yang harus diminum oleh setiap hari Ibu hamil?
- a. 6 gelas/hari
 - b. 7 gelas/hari
 - c. 8 gelas/hari
11. Seorang ibu yang kekurangan gizi ibu hamil selama masa kehamilan maka bayi yang dikandungnya tidak akan menderita kekurangan gizi
- a. Benar
 - b. Salah


- c. Tidak tahu
12. Gizi yang baik diperlukan ibu hamil agar pertumbuhan janin tidak terlambat dan bisa melahirkan bayi dengan berat normal
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
13. Makanan bergizi hanya terdiri dari nasi dan sayur
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
14. Kekurangan asupan protein tidak berdampak buruk bagi janin dalam kandungan
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
15. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
16. Kekurangan asupan vitamin dan mineral tidak mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
17. Kebutuhan energi trimester III diperlukan untuk pertumbuhan janin dan plasenta
- Benar
 - Salah
 - Tidak tahu
18. Masa kritis (emas) pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sejak dalam kandungan hingga usia?



- a. 2 tahun
 - b. 4 tahun
 - c. 5 tahun
19. Pertumbuhan balita dipantau menggunakan KMS maka pertumbuhan bayi yang normal terdapat pada pita berwarna
- a. Hijau
 - b. Kuning
 - c. Merah
20. Seorang anak dikatakan sehat apabila badannya gemuk/gendut
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
22. Menurut Ibu pengertian ASI eksklusif adalah?
- a. Makanan alamiah bayi sampai usia 2 tahun
 - b. Pemberian ASI + Susu formula sampai usia 6 bulan
 - c. Pemberian hanya ASI saja tanpa makanan lain sampai usia 6 bulan
23. Kapankah seorang bayi harus diberikan ASI untuk pertama kalinya?
- a. Segera setelah bayi lahir atau maksimal 1 jam setelah kelahiran
 - b. Menunggu bayi terus menangis saat kelaparan
 - c. Setelah bayi diberikan susu formula untuk latihan mengisap
24. Manfaat pemberian ASI untuk balita adalah?
- a. Memberi nutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh
 - b. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak
 - c. Semua Benar
25. Setelah pemberian ASI eksklusif, sampai usia berapakah bayi dapat dilanjutkan pemberian ASI?
- a. 2 tahun
 - b. 8 bulan
 - c. 6 bulan
26. Umur berapakah Imunisasi dasar lengkap diberikan kepada bayi?
- a. Tidak tahu

- b. < 1 tahun (kurang dari 1 tahun)
 - c. > 1 tahun (lebih dari satu tahun)
27. Menurut ibu apakah itu kolostrum?
- a. Tidak tahu
 - b. Cairan kuning, kental dan agak lengket yang keluar pertama kali
 - c. Cairan putih yang keluar setiap hari yang diberikan kepada bayi
28. Pada usia berapakah pertama kali sebaiknya anak ibu diberika makan atau minuman selain ASI?
- a. Tidak tahu
 - b. < 6 bulan (kurang dari 6 bulan)
 - c. > 6 bulan (lebih dari 6 bulan)
29. Pada usia 9 bulan anak boleh diberikan makanan seperti orang dewasa
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
30. Apakah ibu tahu makanan yang mengandung zat tenaga (karbohidrat)?.....
- a. Iya,sebutkan contohnya! Minimal 2
 - b. Tidak
31. Apakah ibu tahu makanan yang mengandung zat pembangun (protein)?.....
- a. Iya,sebutkan contohnya! Minimal 2
 - b. Tidak
32. Bahan makanan sumber zat besi adalah hati
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
33. Vitamin D dan kalsium dibutuhkan dalam pertumbuhan karena sehat untuk mata
- a. Tidak tahu

- b. Benar
 - c. Salah
34. Makanan yang banyak mengandung kalsium adalah susu
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah
35. Vitamin A banyak didapat dari sayuran hijau
- a. Tidak tahu
 - b. Benar
 - c. Salah



LAMPIRAN 2

Hasil Olah Data

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Riwayat Pemberian ASI Eksklusif * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Umur Pemberian MP-ASI * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Riwayat Penyakit Infeksi * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Riwayat Imunisasi * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Tinggi Badan Ibu * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Pendidikan Ibu * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Faktor Ekonomi * <i>Stunting</i>	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%

Riwayat Pemberian ASI Eksklusif * *Stunting*

Crosstab					
			<i>Stunting</i>		Total
			<i>Stunting</i>	Normal	
Riwayat Pemberian ASI Eksklusif	Tidak Eksklusif	Count	29	8	37
		Expected Count	27.2	9.8	37.0
		% within Riwayat Pemberian ASI Eksklusif	78.4%	21.6%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	40.3%	30.8%	37.8%
		% of Total	29.6%	8.2%	37.8%
	Eksklusif	Count	43	18	61
		Expected Count	44.8	16.2	61.0
		% within Riwayat Pemberian ASI Eksklusif	70.5%	29.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	59.7%	69.2%	62.2%
		% of Total	43.9%	18.4%	62.2%
Total		Count	72	26	98
		Expected Count	72.0	26.0	98.0

	% within Riwayat Pemberian ASI Eksklusif	73.5%	26.5%	100.
	% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	73.5%	26.5%	100.0%

<i>Chi-Square Tests</i>					
	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	.735 ^a	1	.391		
Continuity Correction ^b	.386	1	.534		
Likelihood Ratio	.749	1	.387		
Fisher's Exact Test				.482	.269
Linier-by-Linier Association	.727	1	.394		
N of Valid Cases	98				

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Pemberian ASI Eksklusif (Tidak Eksklusif / Eksklusif)	1.517	.583	3.950
For cohort <i>Stunting = Stunting</i>	1.112	.879	1.406
For cohort <i>Stunting = Normal</i>	.733	.355	1.514
N of Valid Cases	98		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	.735	1	.391
Mantel-Haenszel	.382	1	.537

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate			
Estimate			1.517
ln(Estimate)			.417
Standardized Error of ln(Estimate)			.488
Asymptotic Significance (2-sided)			.393
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.583
		Upper Bound	3.950
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.540
		Upper Bound	1.374

Riwayat Pemberian MP-ASI * <i>Stunting</i> Crosstabulation					
			<i>Stunting</i>		Total
			<i>Stunting</i>	Normal	
Riwayat Pemberian MP-ASI	Tidak sesuai	Count	55	14	69
		% within Riwayat Pemberian MP-ASI	79.7%	20.3%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	76.4%	53.8%	70.4%
		% of Total	56.1%	14.3%	70.4%
	Sesuai	Count	17	12	29
		% within Riwayat Pemberian MP-ASI	58.6%	41.4%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	23.6%	46.2%	29.6%
		% of Total	17.3%	12.2%	29.6%
Total		Count	72	26	98
		% within Riwayat Pemberian MP-ASI	73.5%	26.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	73.5%	26.5%	100.0%

<i>Chi-Square Tests</i>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	4.659 ^a	1	.031		
Continuity Correction ^b	3.640	1	.056		
Likelihood Ratio	4.450	1	.035		
Fisher's Exact Test				.044	.030
Linier-by-Linier Association	4.612	1	.032		
N of Valid Cases	98				

Directional Measures					
			Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.218	.106	2.004
		Riwayat Pemberian MP-ASI Dependent	.225	.110	2.004
		<i>Stunting</i> Dependent	.211	.103	2.004

Directional Measures			
			Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.045
		Riwayat Pemberian MP-ASI Dependent	.045
		<i>Stunting</i> Dependent	.045

Symmetric Measures						
		Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance	
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.218	.106	2.004	.045	
	Kendall's tau-c	.176	.088	2.004	.045	
	Gamma	.470	.188	2.004	.045	
N of Valid Cases		98				
Risk Estimate						
		Value	95% Confidence Interval			
			Lower	Upper		
Odds Ratio for Riwayat Pemberian MP-ASI (Tidak sesuai / Sesuai)		2.773	1.079		7.124	
For cohort <i>Stunting</i> = <i>Stunting</i>		1.360	.979		1.888	
For cohort <i>Stunting</i> = Normal		.490	.259		.928	
N of Valid Cases		98				

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence			
	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	4.659	1	.031
Mantel-Haenszel	3.603	1	.058

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate			
Estimate		2.773	
ln(Estimate)		1.020	
Standardized Error of ln(Estimate)		.481	
Asymptotic Significance (2-sided)		.034	
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.079
		Upper Bound	7.124
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.076
		Upper Bound	1.964

Crosstab			
Riwayat Penyakit Infeksi	Memiliki Riwayat	Count	53
		Expected Count	53.0
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	54.1%
		% of Total	54.1%
	Tidak Memiliki Riwayat	Count	45
		Expected Count	45.0
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	45.9%
		% of Total	45.9%
Total		Count	98
		Expected Count	98.0
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%

	% of Total	100.0%
--	------------	--------

<i>Chi-Square Tests</i>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	7.745 ^a	1	.005		
Continuity Correction ^b	6.520	1	.011		
Likelihood Ratio	7.841	1	.005		
Fisher's Exact Test				.006	.005
Linier-by-Linier Association	7.666	1	.006		
N of Valid Cases	98				

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Infeksi (Memiliki Riwayat / Tidak Memiliki Riwayat)	3.750	1.436	9.792
For cohort <i>Stunting = Stunting</i>	1.415	1.087	1.843
For cohort <i>Stunting = Normal</i>	.377	.181	.785
N of Valid Cases	98		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence			
	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	7.745	1	.005
Mantel-Haenszel	6.453	1	.011

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate			
Estimate			3.750
ln(Estimate)			1.322
Standardized Error of ln(Estimate)			.490
Asymptotic Significance (2-sided)			.007
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.436
		Upper Bound	9.792
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.362
		Upper Bound	2.282

M A K A S S A R

Riwayat Imunisasi * Stunting

Crosstab

			<i>Stunting</i>		Total
			<i>Stunting</i>	Normal	
Riwayat Imunisasi	Tidak Lengkap	Count	1	0	1
		Expected Count	.7	.3	1.0
		% within Riwayat Imunisasi	100.0%	0.0%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	1.4%	0.0%	1.0%
		% of Total	1.0%	0.0%	1.0%
	Lengkap	Count	71	26	97
		Expected Count	71.3	25.7	97.0
		% within Riwayat Imunisasi	73.2%	26.8%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	98.6%	100.0%	99.0%
		% of Total	72.4%	26.5%	99.0%
Total		Count	72	26	98
		Expected Count	72.0	26.0	98.0
		% within Riwayat Imunisasi	73.5%	26.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%

	% of Total	73.5%	26.5%	100.0%
--	------------	-------	-------	--------



<i>Chi-Square Tests</i>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	.365 ^a	1	.546		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.620	1	.431		
Fisher's Exact Test				1.000	.735
Linier-by-Linier Association	.361	1	.548		
N of Valid Cases	98				

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort <i>Stunting</i> = <i>Stunting</i>	1.366	1.211	1.541
N of Valid Cases	98		

Tests of Conditional Independence			
	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	.365	1	.546
Mantel-Haenszel	.283	1	.595

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate			
Estimate			. ^a
ln(Estimate)			.
Standardized Error of ln(Estimate)			.
Asymptotic Significance (2-sided)			.
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.
		Upper Bound	.
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.
		Upper Bound	.

Tinggi Badan Ibu * Stunting

Crosstab					
			<i>Stunting</i>		Total
			<i>Stunting</i>	Normal	
Tinggi Badan Ibu	Berisiko	Count	19	3	22
		Expected Count	16.2	5.8	22.0
		% within Tinggi Badan Ibu	86.4%	13.6%	100.0%

		% within <i>Stunting</i>	26.4%	11.5%	22.4%
		% of Total	19.4%	3.1%	22.4%
	Normal	Count	53	23	76
		Expected Count	55.8	20.2	76.0
		% within Tinggi Badan Ibu	69.7%	30.3%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	73.6%	88.5%	77.6%
		% of Total	54.1%	23.5%	77.6%
Total		Count	72	26	98
		Expected Count	72.0	26.0	98.0
		% within Tinggi Badan Ibu	73.5%	26.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	73.5%	26.5%	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	2.420 ^a	1	.120		
Continuity Correction ^b	1.642	1	.200		

Likelihood Ratio	2.679	1	.102		
Fisher's Exact Test				.171	.097
Linier-by-Linier Association	2.395	1	.122		
N of Valid Cases	98				



Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Tinggi Badan Ibu (Berisiko / Normal)	2.748	.740	10.210
For cohort <i>Stunting = Stunting</i>	1.238	.991	1.547
For cohort <i>Stunting = Normal</i>	.451	.149	1.361
N of Valid Cases	98		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence

	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	2.420	1	.120
Mantel-Haenszel	1.625	1	.202

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			2.748
ln(Estimate)			1.011
Standardized Error of ln(Estimate)			.670
Asymptotic Significance (2-sided)			.131
	Common Odds Ratio	Lower Bound	.740

Asymptotic 95% Confidence Interval		Upper Bound	10.210
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.301
		Upper Bound	2.323

Pendidikan Ibu * *Stunting*

Pendidikan Ibu * *Stunting* Crosstabulation

			<i>Stunting</i>		Total
			<i>Stunting</i>	Normal	
Pendidikan Ibu	SD	Count	6	0	6
		% within Pendidikan Ibu	100.0%	0.0%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	8.3%	0.0%	6.1%
		% of Total	6.1%	0.0%	6.1%
	SMP	Count	8	0	8
		% within Pendidikan Ibu	100.0%	0.0%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	11.1%	0.0%	8.2%
		% of Total	8.2%	0.0%	8.2%
	SMA	Count	39	16	55
		% within Pendidikan Ibu	70.9%	29.1%	100.0%

		% within <i>Stunting</i>	54.2%	61.5%	56.1%
		% of Total	39.8%	16.3%	56.1%
	D3/S1	Count	19	10	29
		% within Pendidikan Ibu	65.5%	34.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	26.4%	38.5%	29.6%
		% of Total	19.4%	10.2%	29.6%
Total		Count	72	26	98
		% within Pendidikan Ibu	73.5%	26.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	73.5%	26.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.181 ^a	3	.103
Likelihood Ratio	9.704	3	.021
Linier-by-Linier Association	4.890	1	.027
N of Valid Cases	98		

Directional Measures


			Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.192	.080	2.295	.022
		Pendidikan Ibu Dependent	.240	.102	2.295	.022
		<i>Stunting</i> Dependent	.160	.067	2.295	.022

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standardized Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.196	.082	2.295	.022
	Kendall's tau-c	.187	.082	2.295	.022
	Gamma	.425	.162	2.295	.022
	Spearman Correlation	.206	.086	2.062	.042 ^c

Interval by Interval	Pearson's R	.225	.070	2.258	.026 ^c
N of Valid Cases		98			

Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita * Stunting



		<i>Stunting</i>			
		<i>Stunting</i>	Normal	Total	
Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita	Rendah	Count	55	14	69
		Expected Count	50.7	18.3	69.0
		% within Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita	79.7%	20.3%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	76.4%	53.8%	70.4%
		% of Total	56.1%	14.3%	70.4%
	Tinggi	Count	17	12	29
		Expected Count	21.3	7.7	29.0
		% within Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita	58.6%	41.4%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	23.6%	46.2%	29.6%

		% of Total	17.3%	12.2%	29.6%
Total	Count		72	26	98
	Expected Count		72.0	26.0	98.0
	% within Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita		73.5%	26.5%	100.0%
	% within <i>Stunting</i>		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		73.5%	26.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	4.659 ^a	1	.031		
Continuity Correction ^b	3.640	1	.056		
Likelihood Ratio	4.450	1	.035		
Fisher's Exact Test				.044	.030
Linier-by-Linier Association	4.612	1	.032		
N of Valid Cases	98				

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita (Rendah / Tinggi)	2.773	1.079	7.124
For cohort <i>Stunting = Stunting</i>	1.360	.979	1.888
For cohort <i>Stunting = Normal</i>	.490	.259	.928
N of Valid Cases	98		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Tests of Conditional Independence			
	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	4.659	1	.031
Mantel-Haenszel	3.603	1	.058

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate			
Estimate			2.773
ln(Estimate)			1.020
Standardized Error of ln(Estimate)			.481
Asymptotic Significance (2-sided)			.034
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.079
		Upper Bound	7.124
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.076
		Upper Bound	1.964

Faktor Ekonomi * *Stunting*

Crosstab

		<i>Stunting</i>		Total	
		<i>Stunting</i>	Normal		
Faktor Ekonomi	Rendah	Count	67	15	82
		Expected Count	60.2	21.8	82.0
		% within Faktor Ekonomi	81.7%	18.3%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	93.1%	57.7%	83.7%
		% of Total	68.4%	15.3%	83.7%
	Tinggi	Count	5	11	16
		Expected Count	11.8	4.2	16.0
		% within Faktor Ekonomi	31.3%	68.8%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	6.9%	42.3%	16.3%
		% of Total	5.1%	11.2%	16.3%
Total		Count	72	26	98
		Expected Count	72.0	26.0	98.0
		% within Faktor Ekonomi	73.5%	26.5%	100.0%
		% within <i>Stunting</i>	100.0%	100.0%	100.0%

	% of Total	73.5%	26.5%	100.0%
--	------------	-------	-------	--------

<i>Chi-Square Tests</i>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-Square</i>	17.486 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.994	1	.000		
Likelihood Ratio	15.486	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linier-by-Linier Association	17.308	1	.000		
N of Valid Cases	98				

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Faktor Ekonomi (Rendah / Tinggi)	9.827	2.971	32.503
For cohort <i>Stunting</i> = <i>Stunting</i>	2.615	1.255	5.447
For cohort <i>Stunting</i> = Normal	.266	.151	.468
N of Valid Cases	98		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	<i>Chi-Squared</i>	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tests of Conditional Independence

	<i>Chi-Squared</i>	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	17.486	1	.000
Mantel-Haenszel	14.841	1	.000

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			9.827
ln(Estimate)			2.285
Standardized Error of ln(Estimate)			.610
Asymptotic Significance (2-sided)			.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	2.971
		Upper Bound	32.503
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	1.089
		Upper Bound	3.481

LAMPIRAN 3

Surat Pengantar Izin Penelitian dari FKIK UIN Alauddin Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-372/FKIK/PP.00.9/2/2021

Gowa, 08 Februari 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Alda Fadillah

NIM : 70600117026

Program Studi : Pendidikan Dokter

Judul Penelitian : Analisis Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 Bulan –
23 Bulan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru Tahun 2020

Dosen Pembimbing : 1. dr. Andi Alifia Ayu Delima M.Kes

2. dr. Raully Ramadhani, M.Kes

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Semy Nastily Handayany

Tembusan :

- Dekan FKIK (sebagai laporan)

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Izin Penelitian Kabupaten Barru



PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 17 Februari 2021

Nomor : 077/IP/DPMPSTPK/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Pekkae Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala DPMPSTPK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 11048/S.01/PTSP/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (I) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NUR ALDA FADILLAH
Nomor Pokok : 70600117026
Program Study : Pendidikan Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Padaelo Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 6 BULAN-23 BULAN DI PUSKESMAS PEKKAE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya. Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kasi Pelayanan,

SARMIATI BURHANUDDIN, SH, M.Pd
Pangkat: Penata Tk. I III/d
NIP. 19761112200502 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bapedda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru;
4. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN 5

Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Puskesmas Pekkae



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE



Jl. Sultan Hassanudin No. 52 Pekkae Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tlp : 0427 - 2323276

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 112/PKM-PKE/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TASWI, S. Farm,Apt
Nip : 19700413 199103 1 006
Pangkat / Golongan : Pembina/ VI a
Jabatan : Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae
Unit Kerja : UPTD Kes.Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR ALDA FADILLAH
No Pokok : 70600117026
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Padaelo Kel. Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
Tempat Penelitian : UPTD Kes. Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru

Benar, telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Pekkae pada Tanggal 17 Februari sampai dengan 31 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkae, 1 April 2021
Kepala UPTD Kesehatan
Puskesmas Pekkae

H. TASWI, S. Farm, Apt
NIP: 19700413 199103 1 006

LAMPIRAN 6

Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Nur Alda Fadillah
2. NIM : 70600117026
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Kalumpang, No. 37
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Harda
 - b. Ibu : Nur Asiza

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Attaufiq Pekkae
2. SMP : SMPN 01 Tanete Rilau
3. SMA : SMAN 2 Labakkang Boarding School
4. Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar