


**HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP GANGGUAN
FAAL PARU (RESTRIKTIF DAN OBSTRUKTIF) PADA PEMULUNG DI
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) TAMANGAPA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH. FAJAR PAHRIR

70200117068

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fajar Pahrir
NIM : 70200117068
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 25 April 1999
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perum.Green Cakra Residence, Blok K3/32, Taeng
Judul : Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif dan Obstruktif) Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penyusun,



Muh. Fajar Pahrir

NIM. 70200117068

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif dan Obstruktif) Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021**”, yang disusun oleh **Muh. Fajar Pahrir, NIM: 70200117068**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 bertepatan dengan 03 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 14 Agustus 2021 M
05 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Syamsul Alam, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nildawati, SKM., M.Epid	(.....)
Penguji II	: Dr. Zulhas'ari Mustafa., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul **“Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif dan Obstruktif) pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021”** dapat terselesaikan. Shalawat dan taslim juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis secara pribadi telah mendapatkan banyak bimbingan serta bantuan secara moril dan materil.

Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Pahrir Taherong dan Ibunda Ramlah A. Pawelangi tercinta yang selama ini tak lelah merawat dan membesarkan saya hingga saat ini, serta dukungan dan doa yang senantiasa diberikan.

Selain itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Ibu Emmi Bujawati, SKM., M. Kes dan Bapak Syamsul Alam, SKM., M. Kes selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nildawati, SKM., M. Epid dan Bapak Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag selaku penguji yang telah memberikan saran maupun arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Para dosen dan staff jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Para dosen dan staff Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak membantu khususnya dalam berbagai urusan administrasi.
8. Para staff Puskesmas Tamangapa yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian.
9. Para staff Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tamangapa yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian.
10. Saudaraku tercinta, Ferawati Taherong, Irfandi, Rahayu Pratiwi, Muh. Rifaldi, Nur Fadillah Pahrir, dan Nur Jannah Pahrir yang senantiasa memberikan motivasi dan doa.
11. Teman-teman angkatan 2017 Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi 2017, tanpa terkecuali yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Gowa, Maret 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis	8
F. Definisi Operasional.....	13
G. Kajian Pustaka.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Gangguan Faal Paru	22
1. Definisi paru	22
2. Cara kerja sistem pernapasan	23
3. Volume dan kapasitas pernapasan paru.....	25
4. Gangguan faal paru.....	26
5. Prosedur pengukuran spirometri.....	27
6. Prosedur pengukuran antropometri	28
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan faal paru	29
B. Tinjauan Tentang Sampah.....	35
1. Definisi sampah	35
2. Pengaruh sampah terhadap kesehatan	36
3. Tempat Pembuangan Akhir Sampah	37
C. Kerangka Teori.....	41
D. Kerangka Konsep	42
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
A. Rancangan Penelitian	43
B. Waktu dan tempat penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran umum lokasi penelitian	48
2. Hasil analisis univariat.....	50
3. Hasil analisis bivariat.....	60
B. Pembahasan.....	68
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
A. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	14
Tabel 2.1 Kategori IMT	30
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan Tamangapa	49
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi	51
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Faal Paru	59
Tabel 4.4 Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Gangguan Faal Paru	60
Tabel 4.5 Hubungan Status Gizi Terhadap Gangguan Faal Paru.....	61
Tabel 4.6 Hubungan Durasi Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru.....	62
Tabel 4.7 Hubungan Masa Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru.....	63
Tabel 4.8 Hubungan Kebiasaan Merokok Terhadap Gangguan Faal Paru	64
Tabel 4.9 Hubungan Penggunaan Masker Terhadap Gangguan Faal Paru.....	65
Tabel 4.10 Hubungan Riwayat Penyakit Paru Terhadap Gangguan Faal Paru.....	66
Tabel 4.11 Hubungan Riwayat Pemkes Terhadap Gangguan Faal Paru	67


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Diagram 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Durasi Kerja	51
Diagram 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	52
Diagram 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok.....	52
Diagram 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Perokok.....	53
Diagram 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Masker.....	54
Diagram 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Masker yang Digunakan.	54
Diagram 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Paru	55
Diagram 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Pemkes	56
Diagram 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Melakukan Pemeriksaan Kesehatan.....	57
Diagram 4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Terakhir Melakukan Pemeriksaan Kesehatan.....	58
Diagram 4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Keluhan atau Gejala yang Dialami saat bekerja.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Pernapasan Manusia.....	24
Gambar 2.2 Tempat Pembuangan Akhir Sampah.....	37
Gambar 3.1 Desain <i>Cross-sectional</i>	43
Gambar 4.1 Peta Keluharan Tamangapa.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Naskah Persetujuan Menjadi Subyek Penelitian
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Master Tabel
Lampiran 4	Output SPSS
Lampiran 5	Surat Keterangan Kode Etik
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 7	Uji <i>Similarity</i>
Lampiran 8	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 9	Riwayat Hidup Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Muh. Fajar Pahrir
NIM : 70200117068
Judul : Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif dan Obstruktif) Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021

Proses penguraian sampah berupa gas Amonia (NH₃), gas Hidrogen sulfida (H₂S) dan gas lainnya akan terlepas ke udara yang dapat memberikan dampak kesehatan salah satunya gangguan faal paru utamanya bagi para pemulung yang sangat berisiko terhadap pajanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, status gizi, durasi kerja, masa kerja, kebiasaan merokok, penggunaan masker, riwayat penyakit paru, dan riwayat pemeriksaan kesehatan) terhadap gangguan faal paru pada pemulung Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dengan metode *cross sectional study*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi berusia 18-30 tahun, tinggal di Kelurahan Tamangapa dan tidak sedang sakit flu pada saat pengukuran.

Hasil uji *Chi-square* diperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara durasi kerja (P=0.015), masa kerja (P=0.001), dan penggunaan masker (P=0.000) terhadap gangguan faal paru. Tidak ditemukan hubungan antara jenis kelamin (P=0.475), status gizi normal dan kurang (P=0.813) status gizi normal dan lebih (P=0.840), kebiasaan merokok (P=0.766), riwayat penyakit paru (P=0.239), riwayat pemeriksaan kesehatan (P=0.277) terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Peneliti merekomendasikan adanya peningkatan kesadaran pemulung akan bahaya paparan gas toksik dari sampah dan perhatian lebih pemerintah setempat terhadap kesehatan faal paru pemulung dengan memberlakukan kebijakan atau program kesehatan sebagai bentuk pencegahan dan peningkatan kesehatan pemulung.

Kata kunci : Gangguan faal paru; karakteristik individu; pemulung

Daftar pustaka: 61 referensi (2007-2021)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan bahan atau material bekas yang tidak lagi dibutuhkan, digunakan, ataupun dimanfaatkan yang berasal dari kegiatan manusia baik yang berbentuk organik maupun non organik. Pengolahan sampah yang tidak pada aturannya dapat menimbulkan permasalahan pada lingkungan hidup dan juga pada kesehatan manusia. Hasil kegiatan industri hingga rumah tangga yang menyebabkan pencemaran lingkungan, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan manusia. Pengolahan sampah yang memadai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga baik untuk pemeliharaan lingkungan.

Permasalahan sampah yang mencemari lingkungan dan menyebabkan masalah kesehatan telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30: 41 yang berbunyi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan bumi yang diakibatkan oleh ulah manusia akan berdampak pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Layaknya sampah yang tidak diolah dengan baik, tentu akan berdampak pada kesehatan manusia yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Perusakan yang dimaksud dapat berupa pencemaran alam sehingga tidak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan, juga termasuk al-fasad yaitu perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Alusi, dan Tafsir Ibnu Katsir sepakat memaknai kata 'darat' dalam ayat ini sebagai perkampungan atau desa yang terdapat di darat atau di padang pasir. Sementara 'laut' yang dimaksud adalah desa atau kota yang berada di pinggir laut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia melakukan penyelewengan terhadap tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan tidak memelihara lingkungan, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan alam semesta.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah adalah dengan cara menyediakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). TPA Sampah adalah tempat ditampungnya limbah yang berasal dari aktivitas manusia. Sampah yang bertumpuk tidak hanya menimbulkan efek yang biasanya langsung terasa, seperti bau tak sedap, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas udara di sekitarnya. Upaya penanganan sampah dengan menyediakan TPA masih menjadi permasalahan utama di wilayah perkotaan salah satunya Makassar yang di akibatkan tingginya urbanisasi dan perkembangan manusia di Kota Makassar

memunculkan banyak masalah salah satunya dari segi sampah yang terus melonjak di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah (Abdillah, Maddatuang, & Uca, 2019).

TPA Sampah Tamangapa yang terletak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala telah ada dan beroperasi sejak tahun 1995. Keberadaan TPAS tentu saja berpotensi menimbulkan risiko pada lingkungan di sekitar TPA Tamangapa seperti pertumbuhan penyakit, pencemaran udara, bau kurang sedap, kebisingan, hingga dampak sosial. Permasalahan lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan menyasar warga yang tinggal di sekitar TPA. Kondisi di tempat kerja yang penuh dengan polutan, gas, uap dan, zat lainnya seringkali menyebabkan penyakit pernafasan dan seringkali disertai dengan penurunan fungsi paru-paru.

Pemulung sangat erat kaitannya dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang dimana tempat tersebut merupakan lokasi mereka bekerja dengan cara mencari dan memungut barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lalu mendistribusikannya kepada pelaku usaha yang akan mengubah barang bekas tersebut menjadi lebih bermanfaat atau nilai dengan daur ulang. Pemulung memiliki risiko tinggi terkena penyakit karena efek paparan dengan sampah secara langsung (Prinata, Nurjazuli, & Yunita, 2017).

Proses penguraian sampah berupa gas Amonia (NH_3), gas Hidrogen sulfida (H_2S) dan gas lainnya akan terlepas ke udara. Dalam skala besar, gas ini adalah salah satu faktor penurunan kualitas udara, serta menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak baik bagi kesehatan (Sanie, Susanto, & Harahap, 2019). Gas

ini bisa memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan apabila secara kontinu terpapar dalam jangka waktu yang lama sehingga membawa dampak berupa gangguan pernapasan, sakit kepala, hingga batuk kronis yang sifatnya permanen (Hartini, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kulkarni, dkk (2019) pada pengepul sampah di Kota Pune, India yang menemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada nilai FVC, FEV1, hingga rasio FEV1 dan FVC jika dibandingkan dengan nilai normal. Hal tersebut dikaitkan dengan paparan konsentrasi partikel debu yang tinggi, organisme mikroba di udara, hingga partikel gas yang menyebabkan kerusakan kronis fungsi paru karena tingkat endotoksin yang tinggi pada pengepul sampah (Kulkarni, et.al, 2019)

International Labour Organization (ILO) menunjukkan data bahwa terdapat 2,78 juta pekerja merenggang nyawa setiap tahun karena kecelakaan saat bekerja dan penyakit akibat kerja yang tersebar di seluruh dunia dan 86,3% diantaranya mengakibatkan kematian pada pekerja. Penyebab kematian terkait penyakit akibat kerja adalah kanker yang menyumbang 34%, kecelakaan lalu lintas 25%, penyakit pernafasan sebesar 21%, penyakit kardiovaskular sebesar 15%, dan faktor lain menyumbang sebesar 5%. Di Indonesia sendiri, sekitar 27,18% pekerja di sektor lainnya yang berusia diatas 15 tahun mempunyai keluhan kesehatan (ILO, 2018).

Pajanan bioaerosol merupakan faktor risiko gangguan fungsi paru dapat mengakibatkan peningkatan gangguan pernapasan dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (Neghab, et al, 2013). WHO memprediksi bahwa pada tahun 2030, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) akan menjadi penyebab kematian ketiga di

dunia (WHO, 2019). Di Indonesia, prevalensi pasien PPOK cukup tinggi yaitu sebesar 3,7% atau sekitar 9,2 juta penduduk (Riskesmas, 2013). Sedangkan, hasil dari Riset Kesehatan Dasar (2018), Prevalensi ISPA di Indonesia mencapai 4,4% dan Asma mencapai 2,4% dengan Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi tertinggi ketiga untuk bagian Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Berdasarkan data Puskesmas Tamangapa, penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) menempati posisi pertama dari 10 penyakit tertinggi dengan total kasus pada tahun 2020 sebanyak 1.634 dan menempati urutan pertama dalam 3 tahun terakhir. Adapun hasil studi pendahuluan yang dilakukan di TPAS Tamangapa dengan cara wawancara langsung terhadap 10 orang warga yang bertempat tinggal di sekitaran TPAS, 6 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan seperti batuk-batuk, mata perih, dan sesak napas. Hasil studi pendahuluan ini mengindikasikan adanya efek pajanan gas yang terhirup oleh mereka dengan gejala yang kemungkinan adanya penurunan faal paru.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan Salhah (2015), terdapat hubungan yang erat antara lama bekerja dengan gangguan faal paru pada pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bukit Pinang, Samarinda namun belum meneliti lebih lanjut karakteristik lainnya seperti usia, jenis kelamin, status gizi, kebiasaan merokok, penggunaan masker, serta riwayat penyakit paru, riwayat pemeriksaan kesehatan dan hubungannya dengan gangguan faal paru pada pemulung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif Dan Obstruktif) pada Pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
2. Apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
3. Apakah terdapat hubungan antara durasi kerja dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
4. Apakah terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
5. Apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
6. Apakah terdapat hubungan antara penggunaan masker dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
7. Apakah terdapat hubungan antara riwayat penyakit paru dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar?
8. Apakah terdapat hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan dengan gangguan faal paru pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara karakteristik individu dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- b. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- c. Mengetahui hubungan antara durasi kerja dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- d. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- e. Mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- f. Mengetahui hubungan antara penggunaan masker dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- g. Mengetahui hubungan antara riwayat penyakit paru dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- h. Mengetahui hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan dengan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021

D. Manfaat

1. Akademik

Meningkatkan bahan pustaka dan pengembangan keilmuan bagi sivitas akademika khususnya mengenai hubungan karakteristik individu dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2021.

2. Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang hubungan karakteristik individu dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2021.

3. IPTEK

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi mengenai hubungan karakteristik individu dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar tahun 2021.

E. Hipotesis

1. Hipotesis Null (Ho)

- a. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- b. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- c. Tidak ada hubungan antara durasi kerja dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021

- d. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- e. Tidak ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- f. Tidak ada hubungan antara penggunaan masker dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- g. Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit paru dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- h. Tidak ada hubungan antara pemeriksaan kesehatan dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- b. Ada hubungan antara status gizi dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- c. Ada hubungan antara durasi kerja dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- d. Ada hubungan antara masa kerja dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- e. Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- f. Ada hubungan antara penggunaan masker dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021

- g. Ada hubungan antara riwayat penyakit paru dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021
- h. Ada hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan dengan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar tahun 2021

F. Definisi Operasional

1. Jenis Kelamin

Identitas biologis yang dimiliki oleh seseorang dan diukur menggunakan kuesioner.

Kriteria objektif:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

2. Status gizi

Suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dinilai dengan menentukan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rumus $IMT = \frac{BB}{TB^2}$ dengan golongan kurus, normal, dan obesitas berdasarkan ketetapan Kemenkes RI (2018) yang diukur menggunakan timbangan berat badan, *Stadiometer*, dan kuesioner.

Kriteria objektif :

- a. Normal, jika $IMT \geq 18,5 - 25,0$
- b. Kurang, jika $IMT < 18,5$
- c. Lebih, jika $IMT \geq 25,1$

3. Durasi kerja

Lama waktu yang harus dilakukan pekerja di lingkungan kerja per harinya berdasarkan ketetapan dari PERMENAKER TRANS NO.PER.13/MEN/X/2011 yang diukur menggunakan kuesioner.

Kriteria objektif :

- a. Risiko tinggi apabila jam kerja > 8 jam/ hari
- b. Risiko rendah apabila jam kerja ≤ 8 jam/hari

4. Masa kerja

Rentan waktu yang telah dilalui pekerja dari awal bekerja yang diukur menggunakan kuesioner.

Kriteria objektif :

- a. Risiko tinggi apabila telah bekerja > 5 tahun
- b. Risiko rendah apabila telah bekerja ≤ 5 tahun

(Putri, Joko, & Dangiran, 2017)

5. Kebiasaan merokok

Kegiatan membakar dan menghisap batang rokok ditinjau dari jumlah batang rokok yang dihisap per hari.

Kriteria objektif :

- a. Ya, apabila pernah memiliki kebiasaan merokok
- b. Tidak, apabila tidak pernah memiliki kebiasaan merokok

6. Penggunaan masker

Meminimalkan potensi gas berbahaya dari sampah dengan menggunakan alat pelindung pernapasan berupa masker yang diukur menggunakan kuesioner.

Kriteria objektif :

- a. Ya, apabila rutin menggunakan alat pelindung pernapasan berupa masker saat bekerja
- b. Tidak, apabila tidak rutin menggunakan alat pelindung pernapasan berupa masker saat bekerja

(Putri, Joko, & Dangiran, 2017)

7. Riwayat penyakit paru

Keadaan dimana responden pernah atau tidak pernah mengalami penyakit paru semasa hidupnya yang diukur menggunakan kuesioner.

- a. Ada, apabila pernah menderita penyakit paru semasa hidupnya
- b. Tidak ada, apabila tidak pernah menderita penyakit paru semasa hidupnya

(Alfiani, 2016)

8. Riwayat pemeriksaan kesehatan

Keadaan dimana responden melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan/gangguan kesehatan yang diukur menggunakan kuesioner.

- a. Ada, apabila melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan ketika terdapat keluhan atau gejala gangguan paru
- b. Tidak ada, apabila tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan ketika terdapat keluhan atau gejala gangguan paru

9. Gangguan faal paru

Berupa penurunan fungsi paru yang dilihat dari hasil pengukuran spirometri fungsi paru baik fungsi obstruktif atau restriktif yang diukur menggunakan *spirometer*.

Kriteria objektif :

- a. Normal jika nilai $FVC \geq 80\%$, dan nilai $FEV1 \geq 70\%$.
- b. Abnormal jika terjadi gangguan restriktif dengan nilai $FVC < 80\%$, atau terjadi gangguan obstruktif dengan nilai $FEV1/FVC < 70\%$.

(Thufeilsya et al, 2014)

G. Kajian Pustaka

Tabel. 1.1

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI				HASIL PENELITIAN
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL	INSTRUMEN	
1.	Paparan Debu Terhirup dan Gangguan Fungsi Paru pada Pedagang Tetap di Terminal Kota Tegal (Ranindyta Elda Cintya, Budiyo, Tri Joko, 2020)	Terdapat 35 responden yang merupakan pedagang tetap yang masih aktif berjualan di Terminal Kota Tegal dengan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Paparan debu terhirup dan gangguan fungsi paru	Kuesioner, spirometri, dan <i>Personal Dust Sampler</i>	Terdapat hubungan yang signifikan antara paparan debu terhirup terhadap gangguan faal paru.
2.	Hubungan Paparan Debu dengan Kapasitas Fungsi Paru Perajin Batu Paras Di Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar (Putu Wulan Putri Amerta, I Made Ady Wirawan, 2020)	Terdapat 60 responden yang merupakan pengrajin batu paras dengan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>total sampling</i>	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Paparan debu batu paras, umur, jenis kelamin, masa kerja, status gizi (IMT), penggunaan alat pelindung diri (APD), durasi kerja, kebiasaan merokok, dan kapasitas fungsi paru	Kuesioner, <i>microtoise</i> , timbangan, spirometri	Paparan debu berhubungan signifikan dengan kapasitas fungsi paru perajin batu paras di Desa Ketewel.

	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
3.	Gangguan Respirasi dan Faal Paru pada Pemulung di Bantar Gebang, Bekasi (Dita Kurnia Sanie, Agus Dwi Susanto, Fahrial Harahap, 2019)	Terdapat 100 responden yang merupakan pemulung yang tinggal di kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara <i>consecutive sampling</i> .	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional study</i>	Jenis kelamin, usia, status gizi, pendidikan, riwayat merokok, jarak rumah, masa kerja, lama pajanan, penggunaan APD dengan gangguan paru	Kuesioner, timbangan, alat ukur tinggi, dan spirometri	Terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan respirasi dan faal paru.
4.	<i>Analysis Of Factors Related To Lung Dysfunction Among Coal Mining Workers In Coal Processing Plant</i> (Ratna Yuliawati, Risma Arum Lintar, Ainur Rachman, Marjan Wahyuni, 2019)	Terdapat 20 orang responden yang merupakan pekerja pertambangan batu bara. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara <i>total sampling</i>	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Kebiasaan merokok, penggunaan masker, durasi kerja, dan banyak debu terhirup dengan gangguan fungsi paru	Kuisisioner, Spirometri, dan <i>Personal Dust Sampler (PDS)</i>	Terdapat hubungan antara penggunaan masker, kebiasaan merokok, dan durasi kerja dengan gangguan fungsi paru.

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
5.	<i>Effects of Occupational Exposures on the Lung Functions and Quality of Life of Garbage Collectors in the Urban Area</i> (Madhur S. Kulkarni dan Deepali P. Pingale, 2019)	Populasi seluruh pengepul sampah di daerah Pune India. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling, dimana terdapat 110 sampel yang terpilih, dengan 55 kasus, dan 55 kontrol.	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional study</i>	Masa kerja, durasi kerja, dan usia dengan kapasitas vital paru	Kuesioner dan spirometri	Terdapat hubungan antara kualitas hidup dengan fungsi paru
6.	Pengaruh Paparan Gas Hidrogen Sulfida (H ₂ S) terhadap Keluhan Saluran Pernafasan pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjungpinang (Veronika Amelia Simbolon, Nurmaini, Wirsal Hasan, 2018)	Terdapat 27 responden yang merupakan pemulung di TPA Ganet Tanjungpinang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara <i>total sampling</i>	Kuantitatif/Analitik deskriptif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Usia, jenis kelamin, berat badan responden, konsentrasi H ₂ S, waktu paparan, durasi paparan, <i>intake</i> dan kebiasaan merokok dengan keluhan saluran pernapasan	Kuesioner dan alat pengukur hidrogen sulfida	Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, konsentrasi Hidrogen Sulfida, dan <i>intake</i> terhadap keluhan saluran pernapasan.

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
7.	<i>Dose-response of Cotton Dust Exposure with Lung Function among Textile Workers: Multi Tex Study in Karachi, Pakistan</i> (Naureen Akber Ali, Asaad Ahmed Nafees, Zafar Fatmi, Syed Iqbal Azam, 2018)	Terdapat 310 responden yang merupakan pekerja tekstil yang terpilih menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	Kuantitatif/ Deskriptif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Debu kapas dan fungsi paru	Kuesioner, spirometri, dan <i>UCB-PATS (University of California, Berkeley-Particle, and Temperature Monitoring System)</i>	Terdapat hubungan yang bermakna antara debu kapas dan fungsi paru.
8.	<i>“The Prevalence Of Respiratory Symptoms Among Workers In A Domestic Waste Collection Center In Klang Valley, Malaysia”</i> (Zaleha M.I, Vikneswaran S., Diana M., Intan M., Humadevi S, 2018)	Terdapat 130 responden yang merupakan pemulung yang berada di Klang Valley. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>	Kuantitatif/analitik observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional study</i>	Usia, jenis kelamin, etnis, status pendidikan, status perkawinan, usia mulai bekerja, masa kerja, durasi kerja, shift, kebiasaan merokok, jumlah cuti (hari), penggunaan masker dengan gejala pernapasan.	Kuesioner	Terdapat hubungan yang signifikan antara usia pekerja, usia mulai bekerja, dan cuti (hari) dengan gejala gangguan pernapasan.

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
9.	<i>Effects Of Dust Exposure On The Respiratory Health Symptoms And Pulmonary Functions Of Street Sweepers</i> (Raheleh Hashemi Habybabady, Hannaneh Nasibi Sis, Fatemeh Paridokht, Fatemeh Ramrudinasab, Ali Behmadi, Bentolhoda Khosravi, Mahdi Mohammadi, 2018)	Populasi penelitian seluruh penyapu jalanan di Zaedan dengan masa kerja diatas lima tahun dan memiliki salah satu riwayat asma, COPD, tbc, saluran pernapasan kronik dan akut, kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes. Adapun penakiran sampel menggunakan simple random sampling, dengan banyak sampel sebesar 84 subjek kasus, dan 80 kontrol tanpa paparan yang diambil dari pekerja kantoran sekitaran Zaedan.	Kuantitatif/analitik observasional/ kohort retrospektif	Paparan debu dengan gangguan pernapasan dan fungsi paru	Kuisisioner dan spirometri	Frekuensi gejala pernapasan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok yang terpapar daripada kelompok kontrol. Secara khusus, batuk adalah keluhan yang paling umum. Volume paru secara signifikan lebih sedikit pada kelompok yang terpapar daripada pada kelompok kontrol.

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
10.	<i>Study of lung function in granite workers based on duration of exposure</i> (Chandrashekar Nandini, Kambli Malleshappa, Bhadresh C Vastrad, Syeda Nafees, 2018)	Menggunakan teknik total sampling, dengan populasi sebanyak 100 orang pekerja yang dibagi menjadi 2 kelompok dimana kelompok pertama yang masa kerja selama 5-9 tahun, dan kelompok kedua dengan masa kerja diatas 10 tahun	Kuantitatif/analitik dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Masa kerja dan fungsi paru	Kuesioner dan spirometri	Semakin lama masa kerja maka semakin tinggi risiko gangguan fungsi paru pekerja tambang batu granit.
11.	<i>Environmental exposures and systemic hypertension are risk factors for decline in lung function</i> (Catherine H Miele, 2018)	Sampel dalam penelitian sebanyak 3048 orang dewasa yang diambil dengan teknik <i>stratified sampling</i> di 4 lokasi berbeda di Peru.	Kualitatif/ Anlitik dengan pendekatan <i>cohort</i>	Faktor biologi, sosial ekonomi, dan lingkungan dengan penurunan fungsi paru	Kuisisioner dan spirometri	Urbanisasi, hidup di ketinggian, hipertensi memiliki hubungan dengan gangguan fungsi paru dan terjadi penurunan di populasi dengan tingkat kebiasaan merokok rendah.

NO	JUDUL/NAMA PENELITI/TAHUN	METODOLOGI			HASIL PENELITIAN	
		SUBJEK	JENIS PENDEKATAN	VARIABEL		INSTRUMEN
12.	<i>Respiratory Symptoms and Lung Function among Greek Cotton Industry Workers: A Cross-Sectional Study</i> (Loannis D Anyfantis, Georgios Rachiotis, Christos Hadjichristodoulou, Konstantinos I Gourgoulisanis, 2017)	Sampel dalam penelitian ini adalah 256 pekerja di industri kapas dan 148 pekerja di bagian administrasi sebagai kelompok kontrol.	Kuantitatif/ Deskriptif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Paparan debu kapas dan gangguan faal paru	Kuesioner	Paparan debu kapas di tempat kerja dikaitkan dengan peningkatan prevalensi gejala pernafasan dan pola obstruktif pada tes fungsi paru.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel dan lokasi penelitian. Variabel yang akan diteliti berfokus pada 9 karakteristik individu yang mencakup usia, jenis kelamin, status gizi, durasi kerja, masa kerja, penggunaan masker, kebiasaan merokok, riwayat penyakit pernapasan, dan riwayat pemeriksaan kesehatan terhadap gangguan fungsi paru pemulung. Pada penelitian sebelumnya juga belum ada penelitian terkait yang berlokasi di TPA sampah Tamangapa, sedangkan lingkungan kerja sangat berisiko terhadap kesehatan para pemulung di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gangguan Faal Paru

1. Definisi Paru

Paru-paru merupakan organ yang digunakan sebagai penyaring partikel atau gas beracun (toksik) yang ikut serta dalam udara yang dihirup untuk melindungi proses pertukaran gas pada permukaan alveolus. Orang dewasa bernapas sekitar 14 kali per menit, yaitu sekitar setengah liter udara yang dihirup per menit, yang berarti 7 liter udara pernapasan atau 420 liter pernapasan dapat dihirup setiap 24 jam, atau sekitar 10 meter kubik pernapasan dalam 24 jam dihitung pada saat beristirahat. Sedangkan pada saat bekerja, frekuensi dan kedalaman pernapasan akan meningkat untuk memenuhi suplai oksigen yang digunakan tubuh manusia melalui kerja otot (Harrianto, 2008).

Paru-paru manusia berada pada rongga dada dengan model kerucut di atas tulang iga pertama yang berada diujung dan diafragma berada di dasarnya. Paru-paru terbagi atas bagian kanan dan kiri. Di paru bagian kanan memiliki tiga lobus, sedangkan paru bagian kiri memiliki dua lobus. Setiap paru selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-bagian, dan ada yang disebut segmen bronkopulmonalis dengan jumlah sekitar sepuluh unit terkecil. Ruang antara paru-paru kiri dan kanan disebut mediastinum (Evelyn, 2009).

Setiap detik, manusia pasti membutuhkan udara dalam kehidupannya. Manusia pada umumnya tidak akan mampu mempertahankan hidupnya tanpa

udara lebih dari tiga menit. Hal ini dikarenakan udara berbentuk gas yang berada dimana-mana sehingga tidak dapat dilihat ataupun dipikirkan. Tampak bahwa penyakit yang konstatir kebanyakan tergolong penyakit saluran pernapasan, karena udara memasuki tubuh lewat saluran pernapasan (Soemirat, 2011).


2. Cara kerja sistem pernapasan

Peranan baku paru-paru adalah untuk proses perpindahan gas antara darah dan atmosfer. Tujuan perpindahan gas adalah untuk memasok oksigen ke jaringan dan melepaskan karbon dioksida. Permintaan oksigen dan karbondioksida akan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat aktivitas dan laju metabolisme seseorang, namun kita harus terus bernafas agar oksigen dan karbondioksida dapat disuplai secara normal (Julianti, 2013). Berdasarkan Alsagaff dan Mukti (2015) mekanisme respirasi dibagi atas inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan inspirasi adalah gerakan masuknya udara kedalam paru-paru, sedangkan pernapasan ekspirasi adalah gerakan keluarnya udara dari dalam paru-paru. Otot-otot pernafasan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Otot inspirasi memiliki beberapa bagian yang terdiri dari otot interkostalis eksterna, sternokleidomastoideus, skalenus, dan diafragma.
- b. Otot-otot ekspirasi terdiri atas rektus abdominis dan interkostalis internus.

Gambar 2.1

Sistem pernapasan manusia



Sumber : Tu et al, 2013

Sistem pernafasan terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru dan pleura. Udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan melewati tenggorokan lalu masuk ke laring lalu trakea, yang selanjutnya terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Saat udara sampai di paru-paru, bronkus akan membentuk cabang yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat kantung udara kecil yang disebut alveolus yang dimana tempat ini merupakan Pertukaran Gas terjadi di alveolus, tempat oksigen (O_2) berdifusi ke dalam kapiler paru-paru ditukar dengan karbon dioksida (CO_2). Oksigen di udara yang kita hirup akan diserap oleh sel darah merah di pembuluh darah di dinding alveolus, kemudian diangkut setelah melewati jantung dan masuk ke seluruh tubuh. Darah kotor atau darah vena dengan kandungan karbondioksida yang tinggi tetapi kandungan oksigen yang rendah melewati vena pulmonalis dan dinding tipis

alveoli kembali dan kemudian melepaskan karbondioksida bersamaan dengan udara yang kita hembuskan (Evelyn, 2009) dan (Tu et al, 2013)

3. Volume dan kapasitas pernapasan paru

Berdasarkan Bakhtiar (2016) dalam keadaan statis, volume dan kapasitas paru terdiri dari :

- a. *Tidal Volume* (TV) merupakan besaran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat diam atau bernapas secara normal dengan jumlah 0,5 liter.
- b. *Inspiratory Reserve Volume* (IRV) yang merupakan besaran maksimum udara yang terhirup masuk ke paru-paru setelah inspirasi biasa dengan jumlah 3,3 liter.
- c. *Expiratory Reserve Volume* (ERV) adalah besaran udara yang dapat dihembuskan paru-paru setelah pernapasan normal dengan jumlah 1 liter.
- d. *Residual Volume* (RV) adalah besaran udara yang tersisa di paru-paru setelah pernafasan maksimum. Saat diletakkan di air, volume residu ini menyebabkan paru-paru mengapung. Volume residu digunakan sebagai udara cadangan dan mencegah perubahan ekstrim pada kondisi udara di alveoli. Jika nilai FRC diketahui maka RV dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: $RV = FRC - ERV$. Besarnya volume residu sebanyak 1,2 liter.
- e. *Inspiratory Capacity* (IC) adalah besaran udara yang bisa dihirup secara maksimum yang merupakan gabungan antara volume tidal dan volume cadangan inspirasi dengan besar 3,8 liter.
- f. *Functional Residual Capacity* (FRC) adalah besaran udara yang tersisa di dalam paru pada akhir ekspirasi normal yang juga merupakan gabungan antara volume cadangan ekspirasi dan volume residu dengan besar 2,2 liter.

- g. *Vital Capacity* (VC) adalah besaran udara yang bisa dihembuskan maksimum setelah inspirasi maksimal, yaitu gabungan antara volume cadangan inspirasi (IRV), volume tidal (TV) dan volume cadangan ekspirasi (ERV) dengan besar 4,8 liter.
- h. *Forced Vital Capacity* (FVC) memiliki kesamaan dengan VC yang membedakan dilakukan dengan ekspirasi yang cepat dan kuat.
- i. *Total Lung Capacity* (TLC) adalah besaran udara total yang masih tersisa di dalam paru saat dilakukan inspirasi secara maksimal, yakni gabungan antara IRV, TV dan FRC dengan jumlah 6 liter.

4. Gangguan faal paru

Diagnosis penyakit paru perlu ditentukan kondisi fungsionalnya selain menilai kondisi organ paru itu sendiri. Dengan memahami status fungsi paru-paru, maka dapat segera dilakukan berbagai tindakan kesehatan dan juga Perkembangan penyakit akan diketahui. Oleh karena itu, tes fungsi paru-paru saat ini diklasifikasikan sebagai tes rutin.

Gangguan faal paru merupakan berkurangnya pasokan udara yang masuk kedalam paru diluar dari keadaan normal. Gangguan utama pada ventilasi paru terbagi atas:

- a. Restriksi, yaitu terjadinya gangguan pengembangan paru dengan parameter yaitu kapasitas vital dan kapasitas vital paksa. Gangguan restriksi terjadi apabila nilai FVC < 80%
- b. Obstruksi, yaitu penyempitan saluran napas dan aliran pernapasan ekspirasi yang lambat dan menunjukkan penurunan aliran udara dari saluran pernapasan

bagian atas ke bronkiolus dengan diameter kurang dari 2 mm. Parameter nilai obstruksi diperoleh dengan membandingkan nilai FEV1 dengan FVC yang hasilnya $< 70\%$ (Thufeilsya et al, 2014)

5. Prosedur kerja pemeriksaan spirometri

a. Persiapan

1) Alat dan bahan

- Spirometer yang telah di kalibrasi
- *Mouth piece* sekali pakai

2) Responden

- Tidak merokok minimal 2 jam sebelum pemeriksaan
- Tidak makan terlalu kenyang pada saat pemeriksaan
- Tidak berpakaian terlalu ketat

3) Ruangan dan tindakan

- Ruang yang digunakan memiliki sistem ventilasi yang baik
- Suhu ruangan tidak kurang dari 17 derajat celcius atau lebih dari 40 derajat celcius
- Pemeriksaan pada responden yang dicurigai menderita infeksi saluran napas dilakukan pada urutan terakhir dan tindakan antiseptik pada alat
- Lakukan pengukuran tinggi badan, kemudian tentukan besar nilai dugaan sesuai dengan standar *Pneumobile Project Indonesia*

b. Langkah kerja

- 1) Pilih pemeriksaan FVC pada spirometri
- 2) Menerangkan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada responden

- 3) Pastikan bibir responden melingkupi sekeliling *mouth piece* sehingga tidak ada kebocoran
- 4) Instruksikan responden menghirup udara semaksimal mungkin dengan cepat kemudian sesegera mungkin udara dikeluarkan melalui *mouth piece* dengan tenaga maksimal hingga udara dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya
- 5) Nilai FEV1 ditentukan dari FVC dalam 1 detik pertama (otomatis)
6. Prosedur kerja pemeriksaan antropometri
 - a. Penimbangan berat badan
 - 1) Persiapan
 - Letakkan timbangan di tempat yang datar
 - Responden yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki, jaket, serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci, dompet, dan lainnya.
 - 2) Langkah kerja
 - Posisikan responden di atas timbangan
 - Perhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang, tidak menumpu pada salah satu kaki, sikap tenang, dan pandangan lurus kedepan
 - Baca dan tulis berat badan pada status
 - b. Pengukuran tinggi badan
 - 1) Persiapan
 - Letakkan *stadiometer* di lantai dan dinding yang rata

- Responden yang akan diukur tinggi badannya diminta untuk membuka alas kaki serta topi, ikat rambut, dan lainnya.

2) Langkah kerja

- Posisikan responden diatas basis *stadiometer*
- Perhatikan posisi kaki responden agar tidak bertumpu sikap badan tegap dengan tumit, punggung, bahu, kepala menyentuh dinding, dan pandangan lurus kedepan
- Baca hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tiang vertikal *stadiometer* dengan cara melihat hasil pengukuran di bawah lengan pengukur.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan faal paru

a. Jenis kelamin

Jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap fungsi paru karena berhubungan dengan faktor fisiologis seseorang. Jumlah kapasitas volume paru-paru berbeda antara pria dan wanita, dimana volume dan kapasitas paru-paru wanita sekitar 20-25% lebih kecil dibandingkan pria. Kapasitas vital rata-rata pria dewasa adalah sekitar 4,8 liter, dan kapasitas vital rata-rata wanita dewasa adalah 3,1 liter (Suroto, Jayanti, & Ovia, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andhika & Agung (2016) yang meneliti terkait keluhan gangguan pernapasan pada pemulung TPA Mirican, Ponorogo memperoleh hasil dimana seluruh pemulung wanita mengalami gangguan faal paru, sedangkan berbeda halnya dengan pemulung laki-laki yang hanya sebagian mengalami gangguan faal paru.

b. Status gizi

Status gizi memiliki pengaruh terhadap kapasitas vital paru seseorang. Orang yang bertubuh tinggi dan kurus cenderung memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada mereka yang gemuk. Ini karena diafragma perut pada orang yang mengalami obesitas tertimbun oleh lemak yang akan menyebabkan otot-otot terkompresi dan dengan demikian mencegah paru-paru mengembang secara normal. 80% otot diafragma terletak di perut bagian bawah, sehingga adanya lemak akan mempengaruhi pengembangan dan pengempisan otot pernafasan karena tertutup (Khumaidah dalam Pradana, 2018). Status gizi seseorang dapat dikelompokkan dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Pengukuran tersebut hanya boleh dilakukan untuk orang yang berusia ≥ 18 tahun yang dimana tidak diperkenankan untuk bayi, ibu hamil, remaja, hingga atlet (Almaitseir dalam Pradana, 2018)

Tabel 2.1. Kategori IMT

Kategori	IMT	
Kurus	Kurus tingkat berat	<17,0
	Kurus tingkat ringan	17,0 -18,5
Normal		>18,5 – 25,1
Gemuk	Gemuk tingkat ringan	>25,1 – 27,0
	Obesitas	>27,0

Sumber : Almaitseir dalam Pradana, 2018

Status gizi yang baik tentu didukung dengan pola makan yang baik pula.

Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Istilah Tayyiban mengacu pada jenis dan tata cara makanan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa makanan yang kita makan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar yaitu pangan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan manusia, sikap terhadap kehidupan, jiwa, kehalusan atau kekasaran budi seseorang (Hardisman, 2010).

c. Riwayat penyakit paru

Teori mengungkapkan bahwa orang dengan penyakit paru-paru sebelumnya akan lebih rentan dan kerap mengalami ketidaknyamanan saat bernapas daripada orang yang tidak memiliki riwayat penyakit paru-paru. Hal ini disebabkan anggota tubuh yang sebelumnya terkena penyakit akan mengalami penurunan daya tahan terhadap penyakit tersebut (Pratama, 2019).

Dalam beberapa penelitian, orang dengan riwayat penyakit paru-paru ditemukan erat kaitannya dengan terjadinya disfungsi atau gangguan faal paru. Pada penelitian Sudjono dalam Marpaung (2012) mendapatkan bahwa riwayat penyakit dapat meningkatkan resiko hingga 2 kali lipat lebih besar untuk terhadap gangguan fungsi paru.

d. Kebiasaan merokok

Kebiasaan menghisap rokok dapat mengakibatkan perubahan morfologi dan fungsi saluran pernapasan hingga jaringan paru-paru berupa pembesaran sel (hipertrofi) mukosa dan bertambah banyaknya kelenjar mukus (Depkes RI, 2003 dalam Pratama, 2019). Fungsi paru-paru orang dewasa non-perokok akan mengalami penurunan sekitar 20-30 ml per tahun, sedangkan pada orang dewasa perokok mengalami penurunan yang lebih besar yaitu sekitar 30-40 ml per tahun.

Merokok merupakan sesuatu hal yang wajar bagi masyarakat saat ini. Kandungan senyawa berbahaya dalam rokok memiliki dampak negatif terhadap kondisi paru seseorang. Senyawa yang terkandung dalam rokok dapat mengendap dalam paru-paru sehingga menimbulkan perbuahan fisiologi paru. Semakin lama kebiasaan merokok maka semakin banyak deposit di paru-paru. Hal ini dapat menyebabkan saluran udara keluar dan masuk ke dalam nafas dan menjadi sempit (Handari, Sugiharto, & Pawenang, 2018).

Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan khususnya pada fungsi paru. Mengenai hal ini, Allah telah menjelaskan di dalam QS. Yunus/10:44 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun melainkan memberikan petunjuk menuju jalan kebenaran dan melarang ke jalan kesesatan serta memberi kebebasan kepada manusia untuk

menentukan pilihan, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kejahatan dan mengabaikan kebenaran. Dimana dalam hal ini kebiasaan merokok merupakan salah satu bentuk ke-dzoliman terhadap diri sendiri karena dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan kita sendiri.

e. Masa kerja

Menurut Singga, (2014). Masa kerja diartikan sebagai jangka waktu responden sejak awal masuk hingga bekerja. Polutan di udara yang menyebabkan bau kurang sedap dapat berpengaruh pada kualitas pernapasan. Selain itu, proses penguraian limbah secara alami dapat menyebabkan mikroorganisme terbawa udara. Mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui udara (*airborne disease*), termasuk penyakit saluran pernafasan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan banyaknya mikroorganisme yang dipercaya dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan pada pemulung (Putri et al, 2017). Adapun ketentuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Keimigrasian tahun 2011 tentang nilai batas faktor fisik dan faktor kimia di tempat kerja yang memenuhi persyaratan, sebesar 0,25 mg/m³. Jika seorang pekerja memiliki masa kerja ≥ 5 tahun dan terpapar selama 10 jam sehari, kemungkinan mengalami potensi bahaya yang dapat menyebabkan fungsi paru-paru tidak normal. (Handari, Sugiharto, & Pawenang, 2018).

Dalam penelitian Singga (2014), seseorang yang terpapar gas-gas berbahaya minimal satu tahun akan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya gangguan penurunan fungsi paru akibat pajanan gas-gas yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah. Sedangkan dalam penelitian Putri et al

(2017), terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan fungsi paru pemulung. Dimana pemulung dengan masa kerja > 5 tahun lebih banyak mengalami gangguan fungsi paru.

f. Durasi kerja

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 mengenai Nilai Ambang Batas Faktor Fisik dan Kimia di lingkungan kerja, NAB didefinisikan sebagai standar faktor risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja sebagai ukuran atau *time weighted average* yang bisa diterima pekerja tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Standar yang ditentukan untuk waktu kerja adalah tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (Salhah, 2015).

Apsari, dkk (2018) dalam penelitiannya pada pekerja pertambangan pasir dan batu menunjukkan hasil bahwa pekerja dengan lama paparan > 8 jam memiliki peluang untuk mengalami gangguan fungsi paru 5,238 kali lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang memiliki lama paparan ≤ 8 jam. Semakin lama pemulung bekerja tiap harinya, maka semakin tinggi risiko paparan gas berbahaya yang ditimbulkan oleh sampah dan menjadi faktor gangguan faal paru (Pratama, 2019).

g. Penggunaan masker

Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sebagai upaya proteksi dari bahaya atau kecelakaan kerja pada seorang pekerja. Salah satu APD (Alat Pelindung Diri) untuk sistem pernapasan adalah masker. Menurut Carlisle (2000) dalam Putra (2014) masker merupakan alat yang sangat baik digunakan untuk proteksi diri dari pajanan debu yang dapat terhirup masuk ke paru-paru. APD

cocok untuk pekerja yang terpapar debu konsentrasi tinggi di lingkungan kerja yaitu masker yang berfungsi menahan masuknya debu, uap, gas, atau polusi udara yang berbahaya, korosif, atau bersifat racun di tempat kerja.

Pemulung di TPA berhubungan langsung dengan sampah, bau, gas, dan debu yang dihasilkan oleh pembusukan sampah, truk sampah, dan TPA yang merupakan pencemaran udara. Hasil penelitian dari Putri, et al (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan masker terhadap gangguan pernapasan pada pemulung di TPA Jatibarang.

h. Riwayat pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan berkala merupakan salah satu langkah pencegahan terhadap penyakit guna mempertahankan kondisi kesehatan serta untuk menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sedini mungkin. Menurut Notoatmodjo (2009) dalam Regganis (2012), pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala (misalnya setahun sekali) merupakan hal yang krusial sebagai upaya pencegahan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala sangatlah penting, terutama bagi pekerja yang mungkin terpapar bahan kimia, zat beracun, debu, dan paparan lainnya di tempat kerja.

B. Tinjauan Tentang Sampah

1. Definisi sampah

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan sampah sesuatu tidak dipakai, tidak disukai atau yang telah dibuang dari kegiatan manusia. Berdasarkan tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber, sampah bisa berasal dari perkantoran, rumah tangga, hingga fasilitas umum lainnya.

2. Pengaruh sampah terhadap kesehatan

Menurut Soemirat (2011) efek sampah terhadap kesehatan individu dikelompokkan menjadi dampak secara *direct* dan *indirect*. Dampak secara langsung (*direct*) adalah dampak yang diakibatkan oleh kontak secara langsung dengan sampah tersebut. Misalnya sampah yang sifatnya toksik, korosif, karsinogenik, teratogenik, dan sebagainya pada tubuh manusia. Contoh lainnya seperti sampah mengandung patogen yang apabila masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sampah tersebut umumnya bersumber dari kegiatan di rumah tangga maupun industri.

Pembusukan limbah biasanya terjadi dalam keadaan aerobik, kemudian keadaan fakultatif dan anaerobik terjadi saat oksigen habis. Penguraian anaerobik akan menghasilkan lindi atau cairan gas. Cairan yang mengandung padatan tersuspensi sangat halus dan merupakan hasil dekomposisi mikroba, biasanya terdiri dari Kalsium, Magnesium, Natrium, Kalium, Besi, Klorida, Sulfat, Fosfat, Seng, Nikel, H₂O, Amonia, Hidrogen Sulfida, Asam organik dan Hidrogen. Dalam cairan ini bisa pula didapatkan mikroba patogen, logam berat, dan zat lainnya yang berbahaya tergantung dari kualitas sampahnya. Dampak tidak langsung (*indirect*) juga berupa penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti lalat atau tikus yang hidup di dalam tumpukan tersebut.

3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Gambar 2.2

TPAS Tamangapa Kota Makassar



Sumber : Data primer, 2021

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan dalam TPA berupa sistem terbuka (*open dumping*) yang merupakan sistem penempatan tertentu hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Sistem penampungan sampah yang terbuka tentunya memiliki dampak berupa risiko paparan gas-gas yang dikeluarkan oleh sampah-sampah tersebut dapat tersebar secara bebas di udara. Adapun gas-gas berbahaya yang dihasilkan oleh TPAS menurut Soemirat (2011) adalah :

a. Hidrogen Sulfida (H₂S)

Gas ini memiliki bau khas seperti telur busuk. Gas ini tergolong *assifaction* karena efek utamanya adalah melumpuhkan pusat pernapasan. Hidrogen sulfida juga merusak logam dan dapat mengubah warna berbagai material menjadi hitam. Umumnya gas ini terkumpul di lapisan udara bagian bawah, dan sering ditemukan di sumur, selokan, dan seringkali dengan gas

beracun lainnya seperti metana dan karbon dioksida yang dikarenakan sifatnya yang lebih berat dibandingkan udara. Gas Hidrogen Sulfida tidak menyebabkan permasalahan apabila pada konsentrasi yang rendah apalagi tidak terpapar sama sekali. Hidrogen Sulfida secara alami ditemukan di gunung berapi dan penguraian bahan organik.

Gas Hidrogen Sulfida yang hampir sama beracunnya dengan hidrogen sianida (HCN) begitu beracun dan lebih mematikan dibandingkan karbon monoksida (CO). Gas ini sering digunakan untuk mengeksekusi tahanan di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Pada dasarnya gas ini masuk melalui sistem pernafasan dan diserap masuk kedalam kulit walaupun sangat kecil dari total paparan. Alasan mengapa gas ini masuk melalui saluran pernafasan adalah karena partikel gas yang kecil sehingga lebih mudah masuk ke sistem pernafasan dan dapat diabsorpsi kedalam darah.

Jika konsentrasi hidrogen sulfida di udara yang dihirup < 100 ppm, maka efeknya hanya berupa pendeteksian bau kurang sedap oleh indra penciuman. Namun berbeda ketika konsentrasinya telah mencapai di atas 100 ppm, efek yang ditimbulkan penciuman yang akan melemah hingga kehilangan daya penciuman. Hal ini mengindikasikan bahwasanya, seseorang tidak dapat mengetahui tanda bahaya adanya gas ini melalui penciuman sehingga tanpa disadari Hidrogen Sulfida telah terhirup ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah secara cepat. Dalam kasus ini, antibodi akan bekerja secara cepat dengan mengoksidasi H₂S menjadi senyawa yang aman. Namun lain halnya jika kadar H₂S yang dihirup terlampau banyak atau melebihi batas normal mengakibatkan tubuh tidak

dapat menguraikan semua gas ini yang pada akhirnya akan menyebar dan mengalami perkembangan di dalam aliran darah dan terjadi keracunan. Keracunan ini melumpuhkan saraf-saraf pada otak pusat yang fungsinya mengendalikan otot paru-paru yang pada akhirnya menyebabkan organ paru tidak lagi beroperasi. Kegagalan paru-paru untuk bekerja dengan baik dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Asam lemah di paru-paru juga dapat terbentuk apabila tercampur dengan air sehingga dapat mengikis pembuluh darah hingga mengakibatkan cairan di pembuluh darah bocor hingga ke jaringan sekitarnya dan pada akhirnya mengakibatkan pembengkakan paru-paru yang berefek pada kesulitan bernapas.

b. Gas Karbon Monoksida

Karbon monoksida (CO) memiliki karakteristik yang tidak berwarna dan tidak berbau. Efek kesehatannya disebabkan karena CO dapat mengubah oksigen yang digabungkan dengan hemoglobin (Hb) menjadi karbon-hemoglobin (COHb). Karbon monoksida dikategorikan berkonsentrasi tinggi apabila mencapai 10 ppm, yang berarti akan terdapat 2% COHb dalam darah pada keadaan seimbang. Gejala yang dirasakan apabila terpapar gas ini berupa rasa pusing, konsentrasi berkurang, transformasi fungsi paru-paru dan jantung, kelainan susunan saraf pusat, kesulitan bernapas, hingga pingsan apabila mencapai konsentrasi 250 ppm, dan parahnya mengakibatkan kematian pada konsentrasi 750 ppm.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL AUDDIN
M A K A S S A R


c. Gas Karbon dioksida


Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen dan sebuah atom karbon yang disimbolkan dengan CO₂. Gas ini sangat diperlukan di bumi dikarenakan tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat dalam proses pemenuhan nutrisi dengan bantuan sinar matahari (fotosintesis). Gas CO₂ dalam kadar yang tinggi memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Udara pernapasan yang mengandung 3% gas tersebut menyebabkan dispnea (sesak napas) dan pusing, sedangkan kadarnya di udara sebesar 10% mengakibatkan gangguan penglihatan, tinnitus, tremor dan pingsan setelah satu menit berada di udara dengan kandungan CO₂ demikian.

d. Gas Metan

Gas metan merupakan gas yang terbentuk melalui proses penguraian sampah organik secara anaerobik, serta merupakan penyumbang gas organik yang jika dibandingkan dengan gas CO₂, metana memiliki pengaruh 20-30 kali lipat lebih besar. Gas metana memiliki unsur kimia CH₄. Gas metan merupakan komponen utama biogas yang tidak berwarna dan tidak berbau pada suhu ruangan dan tekanan standar. Gas ini sangat mudah terbakar, tetapi konsentrasinya di udara hanya 5-15%. Pada saat yang sama, metana cair hanya dapat terbakar jika terkena tekanan tinggi sekitar 4-5 atmosfer. Kandungan yang tinggi akan menurunkan konsentrasi oksigen di atmosfer, jika kandungan di udara kurang dari 19,5%, akibatnya asupan oksigen yang tidak mencukupi dalam tubuh akan menyebabkan asfiksia atau hilangnya kesadaran pada makhluk hidup.

C. Kerangka Teori






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR

Sumber: Soemirat (2011), Evelyn (2009), Bakhtiar (2016), Notoadmojo (2010), Pradana (2017)

D. Kerangka Konsep

Variabel Independen
Jenis kelamin
Status gizi
Durasi kerja



: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III


METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional menggunakan rancangan *cross sectional study*. Penelitian *cross sectional* atau potong lintang adalah jenis penelitian yang digunakan untuk melihat dinamika korelasi antar faktor risiko dengan output yang ditimbulkan melalui sebuah pendekatan, observasi atau pengumpulan data satu kali saja di waktu yang bersamaan (*point time approach*).

Gambar 3.1

Alur *cross-sectional study*



Sumber : Kemenkes, 2017

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal penelitian terhitung dari bulan Januari 2021, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di bulan Juni 2021, hingga pengolahan data pada bulan Juni-Juli 2021.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemulung yang ada di TPA Sampah Tamangapa Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel diambil menggunakan *purposive sampling*. Dikarenakan populasi pemulung TPA Tamangapa Kota Makassar tidak diketahui pasti jumlahnya, maka digunakan rumus Lemeshow untuk mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai berikut:

$$n = \frac{Z\alpha^2 \times P \times Q}{L^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0,5 \times 0,5}{(0.1)^2}$$

$$n = 96,4$$

$$n = 96 \text{ (pembulatan)}$$

Pada saat dilakukan penelitian, jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi hanya sebanyak 74 orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berusia 18-30 tahun
- b. Tinggal di Kelurahan Tamangapa
- c. Tidak sedang sakit flu pada saat dilakukan pengukuran

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, adapun instrument yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Timbangan berat badan yang akan digunakan untuk mengukur berat badan responden yang akan dikalibrasi terlebih dahulu.
2. *Stadiometer* yang akan digunakan untuk mengukur tinggi badan subjek dan juga akan dikalibrasi terlebih dahulu
3. *Spirometer* yang digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru subjek yang juga telah melewati proses kalibrasi
4. Kuesioner angket yang merupakan pendukung yang akan digunakan dalam proses wawancara dengan responden

E. Teknik Pengumpulan Data


1. Data sekunder

Data sekunder di dapatkan dari Puskesmas Tamangapa Kota Makassar mengenai data 10 besar penyakit tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa

2. Data primer

Teknik pengumpulan data secara primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner, pengukuran fungsi paru dengan

alat *spirometer*, timbangan berat badan, dan *microtoise* untuk pengukuran tinggi badan. Adapun tahapan atau alur dalam penelitian ini sebagai berikut:



F. Teknik Analisis Data

1. Analisis univariat

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase dari masing-masing yang diteliti baik variabel bebas maupun terikat. Analisis univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna, peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, dan diagram.

2. Analisis bivariat

Analisis bivariat ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan uji perbedaan proporsi menggunakan uji statistik *Chi Square* pada derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi. Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Dalam studi *cross sectional* (Potong lintang) digunakan nilai PR (*prevalence ratio*) sebagai ukuran asosiasi untuk merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara *exposure* atau faktor risiko dan kejadian penyakit untuk mengetahui etiologi penyakit tersebut dengan interpretasi:

- a. $PR = 1$, berarti variabel yang diduga sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek (netral).
- b. $PR > 1$, berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko timbulnya penyakit
- c. $PR < 1$, berarti variabel tersebut merupakan faktor protektif yang justru mengurangi kejadian penyakit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Kondisi geografis

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan luas wilayah sebesar 6062 Ha². Dari segi geografis, Kelurahan Tamangapa terdiri dari batas-batas wilayah sebagai berikut:


Sebelah barat : Kelurahan Bangkala

Sebelah utara : Kelurahan Manggala

Sebelah timur : Kabupaten Maros

Sebelah selatan : Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Gambar 4.1
Peta Kelurahan Tamangapa



Sumber: Data sekunder, 2020

b. Kondisi demografi

Kelurahan Tamangapa memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.960 jiwa per Juli 2020 yang terdiri dari 5482 jiwa laki-laki dan 5478 jiwa perempuan. Adapun jumlah rumah di Kelurahan Tamangapa sebanyak 4152 dengan 5164 kepala keluarga. Wilayah kerja Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 RW dan 40 RT dengan kepadatan penduduk sebanyak 1813/ Ha².

c. Sosial budaya

Penduduk Kelurahan Tamangapa sebagian besar berasal dari Etnis Makassar dengan mayoritas pemeluk Agama Islam. Adapun untuk mata pencaharian masyarakat, sebagian besar adalah Petani dan Peternak.

d. Sarana dan prasarana pemerintahan

Tabel 4.1
Sarana Prasarana Pemerintahan Kelurahan Tamaangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Jenis sarana/prasarana	Sarana/prasarana	Jumlah
Kantor lurah	-	1
Kesehatan	Puskesmas	1
	Posyandu mandiri	1
	Posyandu sementara	6
	TK/TPA/PAUD	5
Pendidikan	Sekolah Dasar	5
	Pesantren Tahfiz Qur'an	1
	SLTP/MTs	2
	SLTA/MA	2
Peribadahan	Masjid	20
	Mushollah	2
Rumah Potong Hewan (RPH)	-	1
Pabrik Pengolahan Kulit	-	1
Tempat Pembuangan Akhir Sampah	-	1
<i>Emergency Care Center</i>	-	1

Sumber : Data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 4.1, mengenai sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan Tamangapa menunjukkan bahwa terdapat kantor kelurahan, 8 sarana kesehatan, 11 sarana pendidikan, 22 sarana peribadahan, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti Rumah Potong Hewan, Pabrik Pengolahan Kulit, Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dan *Emergency Care Center* yang masing-masing sebanyak 1 buah.

2. Hasil Analisis Univariat

a. Karakteristik Individu

1) Jenis kelamin




Diagram 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemulung di TPAS
Tamangapa Kota Makassar
(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.1, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, terdapat 39 responden (52.7%) yang berjenis kelamin laki-laki.

2) Status gizi

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Pada Pemulung di TPAS
Tamangapa Kota Makassar

Status Gizi	Rentang IMT	n	%
Kurang	16 – 18.45	11	14.9
Normal	19.06 – 25.09	35	47.3
Lebih	25.31 – 35.34	28	37.8
Total		74	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 35 responden (47.3%) yang memiliki status gizi normal dengan rentang IMT 19,06-25,09, dan sebanyak 28 responden (37.8%) berada pada kategori gizi lebih dengan rentang IMT sebesar 25,31 – 35,34.

3) Durasi kerja




Diagram 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Durasi Kerja Pada Pemulung di TPAS
Tamangapa Kota Makassar
 (Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.2, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 53 responden (71.6%) yang bekerja > 8 jam dalam sehari.

4) Masa kerja




Diagram 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.3, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 54 responden (73%) telah bekerja sebagai pemulung selama > 5 tahun.

5) Kebiasaan merokok




Diagram 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.4, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 50 responden (67.6%) bukan perokok.

6) Kategori perokok




Diagram 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Perokok Pada Pemulung di
TPAS Tamangapa Kota Makassar
(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.5, dapat diketahui bahwa dari total 24 responden yang merokok, sebanyak 14 responden (58.4%) yang tergolong perokok kategori sedang sedangkan sebanyak 5 responden (20.8%) tergolong dalam perokok ringan dan berat,

7) Penggunaan masker




Diagram 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Masker Pada Pemulung di
TPAS Tamangapa Kota Makassar

(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.6, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 49 responden (66.2%) tidak menggunakan masker pada saat bekerja.

8) Jenis masker yang digunakan




Diagram 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Masker yang Digunakan Pada
Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.7, dapat diketahui bahwa dari total 25 responden yang menggunakan masker pada saat bekerja, terdapat 17 responden (68%) menggunakan masker medis pada saat bekerja

9) Riwayat penyakit paru




Diagram 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Paru Pada Pemulung
di TPAS Tamangapa Kota Makassar
(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.8, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 66 responden (89.2%) tidak memiliki riwayat penyakit paru atau pernapasan.

10) Riwayat pemeriksaan kesehatan




Diagram 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Pemeriksaan Kesehatan Pada
Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar
(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.9, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 59 responden (79.7%) tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6 bulan terakhir.

11) Tempat melakukan pemeriksaan kesehatan




Diagram 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar
(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.10 dapat diketahui bahwa dari total 15 responden yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir, sebanyak 10 responden (66,7%) melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit

12) Waktu terakhir kali melakukan pemeriksaan kesehatan





Diagram 4.11

Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Terakhir Pemeriksaan Kesehatan Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

(Sumber : Data primer, 2021)

Berdasarkan diagram 4.11, dapat diketahui bahwa dari total 59 responden yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir, sebanyak 32 responden (54,2%) melakukan pemeriksaan kesehatan dalam diatas 3 tahun terakhir dan 5 responden (8,5%) melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 2 tahun terakhir.

13) Keluhan yang dirasakan

**Diagram 4.12****Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Pemeriksaan Kesehatan Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar***(Sumber : Data primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.12, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 29.2% selalu mengalami keluhan batuk-batuk, dan 6,1% mengalami keluhan mata perih.

b. Pengukuran Faal Paru

Tabel 4.3**Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pengukuran Faal Paru Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar**

Hasil Pengukuran Faal Paru	n	%
Ada gangguan		
Restriksi	8	10.8
Obstruksi	25	33.8
Kombinasi	13	17.6
Normal	28	37.8
Total	74	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa dari total 74 responden, sebanyak 46 responden (62.2%) mengalami gangguan faal paru yang terdiri dari 8 responden (10.8%) yang mengalami gangguan restriksi, 25 responden (33.8%) mengalami gangguan obstruksi, dan 13 lainnya (17.6%) mengalami gangguan kombinasi (restriksi dan obstruksi). Adapun 28 responden (37.8) yang hasil pengukurannya tidak mengalami gangguan faal paru (normal).

3. Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan jenis kelamin terhadap gangguan faal paru

Tabel 4.4
Analisis Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Gangguan Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Jenis kelamin	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Perempuan	20	57.1	15	42.9	35	100	0.546	1
Laki-laki	26	66.7	13	33.3	39	100		
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, mengenai hubungan antara jenis kelamin responden dan gangguan faal paru menunjukkan bahwa, dari total 39 responden yang berjenis kelamin laki-laki, 26 diantaranya (66.7%) mengalami gangguan faal paru, sedangkan dari total 35 responden yang berjenis kelamin perempuan, 20 diantaranya (57.1%) mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.546. Dikarenakan nilai $P > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan gangguan faal paru pemulung di TPAS

Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1 yang berarti jenis kelamin bukan merupakan faktor risiko.

b. Hubungan status gizi terhadap gangguan faal paru

Tabel 4.5
Analisis Hubungan Status Gizi Terhadap Gangguan Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Status gizi	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Kurang	8	72.8	3	27.2	11	100	0.813	1
Lebih	16	57.1	12	42.9	28	100	0.840	1
Normal	22	62.9	13	37.1	35	100	Pembandingan	
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, mengenai hubungan antara status gizi responden dan gangguan faal paru yang dimana kategori gizi normal sebagai kategori pembandingan antara status gizi kurang dan lebih menunjukkan bahwa, dari total 11 responden yang memiliki status gizi kurang, 8 diantaranya (72.8%) mengalami gangguan faal paru, sedangkan dari total 28 responden dengan status gizi yang lebih, 16 diantaranya (57.1%) mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P untuk status gizi normal dan kurang sebesar 0.813 dan untuk status gizi normal dan lebih sebesar 0.840. Dikarenakan nilai $P > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi kurang maupun lebih terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) untuk kategori gizi normal kurang dan normal lebih didapatkan sebesar 1 yang berarti status gizi kurang maupun lebih bukan faktor

risiko terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar.

c. Hubungan durasi kerja terhadap gangguan faal paru

Tabel 4.6
Analisis Hubungan Durasi Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Durasi kerja	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Risiko tinggi	38	71.7	15	28.3	53	100		
Risiko rendah	8	38.1	13	61.9	21	100	0.015	1.9
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.6, mengenai hubungan antara durasi kerja pemulung dalam sehari dan gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari total 53 responden yang bekerja > 8 jam per hari (Risiko tinggi), 38 diantaranya (71.7%) mengalami gangguan faal paru, sedangkan dari total 21 responden yang bekerja ≤ 8 jam dalam sehari (Risiko rendah), 8 diantaranya (38.1%) mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.015. Dikarenakan nilai $P < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara durasi kerja dan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1,9 yang berarti durasi kerja merupakan faktor risiko dengan pemulung yang memiliki durasi kerja > 8 jam dalam sehari (Risiko tinggi) berisiko 1,9 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang bekerja ≤ 8 jam dalam sehari (Risiko rendah).

d. Hubungan masa kerja dan gangguan faal paru

Tabel 4.7
Analisis Hubungan Masa Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru pada
Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Masa kerja	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Risiko tinggi	40	74.1	14	25.9	54	100		
Risiko rendah	6	30	14	70	20	100	0.001	2.5
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.7, mengenai hubungan antara masa kerja dan gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari total 54 responden yang telah bekerja sebagai pemulung lebih dari 5 tahun (Risiko tinggi), 40 diantaranya (74.1%) mengalami gangguan faal paru, dan dari total 20 responden bekerja kurang dari 5 tahun (Risiko rendah), 6 diantaranya (30%) yang mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.001. Dikarenakan nilai $P < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 2,5 yang berarti masa kerja merupakan faktor risiko dengan pemulung yang memiliki masa kerja > 5 tahun (Risiko tinggi) berisiko 2,5 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang bekerja masih kurang dari 5 tahun (Risiko rendah).

e. Hubungan kebiasaan merokok dan gangguan faal paru

Tabel 4.8
Analisis Hubungan Kebiasaan Merokok Terhadap Gangguan Faal Paru
pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Kebiasaan merokok	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Ya	16	66.7	8	33.3	24	100		
Tidak	30	60	20	40	50	100	0.766	1
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.8, mengenai hubungan kebiasaan merokok dan gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari total 24 responden yang merokok, 16 diantaranya (66.7%) yang mengalami gangguan faal paru. Adapun untuk responden yang tidak merokok atau telah berhenti merokok sebanyak 50 responden, 30 responden (60%) yang mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.766. Karena nilai $P > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dan gangguan faal paru pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1 yang berarti kebiasaan merokok bukan merupakan faktor risiko.

f. Hubungan penggunaan masker dan gangguan faal paru

Tabel 4.9
Analisis Hubungan Penggunaan Masker Terhadap Gangguan Faal Paru
Pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Penggunaan masker	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Ya	6	24	19	76	25	100		
Tidak	40	81.6	9	18.4	49	100	0.000	0.3
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.9, mengenai hubungan penggunaan masker terhadap gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari 25 responden yang menggunakan masker pada saat bekerja, 6 diantaranya (24%) mengalami gangguan faal paru. Adapun 49 responden yang tidak menggunakan masker pada saat bekerja, 40 diantaranya (81.6%) mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.000. Dikarenakan nilai $P < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan masker dan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 0,3 yang berarti penggunaan masker merupakan faktor protektif atau yang berarti pemulung yang menggunakan masker saat bekerja dapat mengurangi dampak gangguan faal paru.

g. Hubungan riwayat penyakit paru dan gangguan faal paru

Tabel 4.10
Analisis Hubungan Riwayat Penyakit Paru Terhadap Gangguan Faal Paru
pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Riwayat penyakit paru	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Ada	7	87.5	1	12.5	8	100		
Tidak ada	39	59.1	27	33.9	66	100	0.239	1.5
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.10, mengenai hubungan riwayat penyakit paru terhadap gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari total 8 responden yang memiliki riwayat penyakit paru, 7 diantaranya (87.5%) mengalami gangguan faal paru, sedangkan dari 66 responden yang tidak memiliki riwayat penyakit paru, sebanyak 39 responden (59.1%) yang mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.239. Dikarenakan nilai $P > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit paru dan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1,5 yang berarti riwayat penyakit paru merupakan faktor risiko dengan pemulung yang memiliki riwayat penyakit paru, berisiko 1,5 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang tidak memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya.

h. Hubungan riwayat pemeriksaan kesehatan dan gangguan faal paru

Tabel 4.11
Analisis Hubungan Riwayat Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Gangguan
Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

Riwayat pemkes	Pengukuran faal paru				N	%	P Value	PR
	Abnormal		Normal					
	n	%	n	%				
Ada	7	46.7	8	53.3	15	100		
Tidak ada	39	66.1	20	33.9	59	100	0.277	0.7
Total	46	62.2	28	37.8	74	100		

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.11, mengenai hubungan riwayat pemeriksaan kesehatan terhadap gangguan faal paru menunjukkan bahwa dari total 15 responden yang melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir, 7 diantaranya (46.7%) mengalami gangguan faal paru, sedangkan dari 59 responden yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir, terdapat 39 responden (66.1%) yang mengalami gangguan faal paru.

Hasil analisis *Chi-square* diperoleh nilai P sebesar 0.277. Dikarenakan nilai $P > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan masker dan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 0,7 yang berarti riwayat pemeriksaan kesehatan merupakan faktor protektif yang berarti pemulung yang melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir dapat mengurangi dampak gangguan faal paru.

B. Pembahasan

1. Hubungan jenis kelamin terhadap gangguan faal paru

Berdasarkan metode morfometrik standar, laki-laki memiliki paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga dari segi fisiologi jumlah bronkus, luas permukaan alveoli, dan saluran napas laki-laki lebih banyak jumlahnya dan lebih besar dibandingkan perempuan (Townsend, Miller, & Prakash, 2012). Perbedaan fisiologi tubuh laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan kapasitas paru. Pada umumnya laki-laki memiliki kapasitas paru 4,6 L sedangkan perempuan memiliki kapasitas paru sebesar 3,1 L (Nugraha, 2014) dalam (Pradana, 2018). Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa dari 39 pemulung yang berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 66,7% yang mengalami gangguan faal paru, sedikit lebih tinggi dibandingkan pemulung perempuan. Volume paru laki-laki yang lebih besar akan lebih banyak menerima asupan H₂S melalui proses inhalasi dibandingkan perempuan (Ramdan, Adawiyah, & Firdaus, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanie, et al (2019) bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan gangguan faal paru pada pemulung di Bantar Gebang, Bekasi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, et al (2017) mengenai keluhan pernapasan pada pemulung di TPA Jatibaran, Semarang yang tidak memiliki hubungan dengan jenis kelamin dengan nilai P sebesar 0,163. Dugaan adanya kebiasaan yang sama antara pemulung laki-laki dan pemulung perempuan yang bekerja pada zona aktif dengan tingkat kadar debu dan dekomposisi sampah yang tinggi

mengakibatkan adanya risiko yang sama baik pada pemulung laki-laki ataupun pemulung perempuan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muhammad, et al (2021) yang menemukan adanya hubungan antara jenis kelamin dan gangguan faal paru pada pengepul sampah di Kano Metropolis, Nigeria yang diindikasikan karena adanya perbedaan anatomi dan fisiologi antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang mengalami gangguan faal paru, ada sebanyak 66,7% pemulung laki-laki yang mengalami gangguan faal paru dan sebanyak 57,1% perempuan yang mengalami gangguan faal paru dengan nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1 yang berarti jenis kelamin bukan merupakan faktor risiko. Walaupun tidak terdapat perbedaan kejadian gangguan faal paru yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, tingginya kejadian gangguan faal paru pada pemulung laki-laki dalam penelitian ini diindikasikan karena faktor lain seperti kebiasaan merokok pemulung laki-laki yang sebagian besar yaitu 61,53% merupakan perokok aktif. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara jenis kelamin dan gangguan faal paru dengan lebih memperhatikan *confounding* (variabel pengganggu) yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

2. Hubungan antara status gizi terhadap gangguan faal paru

Status gizi dalam penelitian ini adalah kategori berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) pemulung yang diukur berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Status gizi memiliki pengaruh terhadap gangguan faal paru dikarenakan

seseorang yang memiliki status gizi yang baik akan memiliki dampak terhadap pengembangan paru yang baik pula (Afiani et al, 2016)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Afiani, et al (2016) dan Handari, et al (2018) yang juga menemukan tidak ada hubungan antara status gizi dan gangguan faal paru dengan nilai P sebesar 1,000. Status gizi dapat dimaknai sebagai kondisi tubuh berdasarkan konsumsi makanan dan zat-zat gizi yang dimana salah satu dampak dari kekurangan gizi adalah penurunan imunitas tubuh dan kemampuan tubuh dalam mendetoksifikasi benda asing seperti halnya debu masuk kedalam tubuh (Handari, et al, 2018). Tidak adanya hubungan antara status gizi dengan gangguan faal paru pada penelitian ini diindikasikan karena sebagian besar pemulung memiliki status gizi yang baik (normal) yaitu sebesar 47,3%. Selain itu, nilai rata-rata IMT (Indeks Massa Tubuh) pemulung TPA Tamangapa sebesar 23,59 yang berarti bahwa masih dalam batas normal dan jauh dari garis gizi kurang ataupun kategori obesitas.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, menunjukkan bahwa dari 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru sebesar 61,5% pemulung yang memiliki status gizi yang tidak normal (kurang atau lebih) sedikit lebih rendah dibandingkan persentase yang mengalami gangguan faal paru dan memiliki status gizi normal yaitu sebesar 62,9%. nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1 yang berarti status gizi bukan faktor risiko. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa status gizi bukan menjadi salah satu penentu adanya gangguan faal paru pada pemulung TPA Tamangapa, walaupun begitu masih banyak pemulung memiliki status gizi yang lebih (tidak normal) yang perlu diperhatikan.

3. Hubungan antara durasi kerja terhadap gangguan faal paru

Durasi kerja dalam penelitian ini diartikan sebagai seberapa lama pemulung bekerja dalam sehari dalam hitungan jam. Durasi kerja menjadi salah satu faktor penurunan kapasitas paru-paru, hal ini disebabkan akumulatif polutan yang masuk pada saat bekerja yang dimana semakin lama seseorang terpapar yang disebabkan polutan yang ada di lingkungan kerja, maka semakin besar pula risiko orang tersebut mengalami masalah kesehatan (Alam, Jayadipraja, & Surya, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tualeka, et al (2019) yang berjudul ‘*Association between Duration Working with Lung Distruption Condition using Pulmonary Vital Capacity (PVC) test on Lathe Worker at Yogyakarta*’ yang juga menemukan hasil adanya hubungan yang signifikan antara durasi kerja dan gangguan faal paru dengan *prevalence risk* sebesar 1,6 atau yang bermakna seseorang yang bekerja lebih dari 8 jam per hari berisiko 1,6 kali mengalami gangguan faal paru. Hasil tersebut hampir sama dengan penelitian ini, yang dimana nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 1,9 yang berarti durasi kerja merupakan faktor risiko dengan pemulung yang memiliki durasi kerja > 8 jam dalam sehari berisiko 1,9 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang bekerja \leq 8 jam dalam sehari. Namun, Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zaleha, et al (2018) yang tidak menemukan hubungan antara durasi kerja dan keluhan gangguan pernapasan pada pekerja di *Domestic Waste Collection Center, Malaysia*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian dari Simbolon, et al (2018) yang mendapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara durasi kerja (lama paparan) terhadap keluhan saluran pernapasan

pada pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjungpinang dengan hasil Responden yang terpapar Hidrogen Sulfida (H_2S) dengan waktu paparan < 8 jam lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan pemulung dengan waktu paparan ≥ 8 jam.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pemulung (71.6%) bekerja diatas dari 8 jam dalam sehari. Berdasarkan hasil pengamatan, Pemulung TPAS Tamangapa sebagian besar mulai bekerja pada pagi hari hingga malam hari, dengan rata-rata jam kerja selama 12 jam. Pemulung TPAS Tamangapa juga sebagian besar bekerja setiap hari tanpa jeda yang artinya jumlah hari kerja dalam seminggu mencapai 7 hari dengan kata lain rata-rata jumlah jam kerja pemulung melebihi standar atau Nilai Ambang Batas normal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Prinsip bahwa semakin banyak barang bekas yang dikumpulkan, maka semakin banyak penghasilan yang didapatkan merupakan salah satu indikasi lebihnya durasi kerja pemulung TPAS Tamangapa dari batas normal. Hasil tabulasi silang menunjukkan, dari total 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru, sebanyak 38 pemulung (71.7%) yang bekerja di atas dari 8 jam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa durasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap paparan gas hasil dekomposisi sampah yang dihirup oleh pemulung saat bekerja yang berdampak pada adanya gangguan vital paru. Oleh karena itu, perlu adanya jam istirahat yang cukup bagi pemulung dengan mengurangi jam kerja dalam sehari atau jumlah hari kerja dalam seminggu untuk mengurangi dampak paparan gas berbahaya pada saat bekerja.

4. Hubungan antara masa kerja terhadap gangguan faal paru

Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya responden telah bekerja sebagai pemulung yang dihitung berdasarkan tahun. Secara keseluruhan, pekerja pada sektor persampahan termasuk pemulung sangatlah rentan terhadap risiko kesehatan, salah satunya adalah penyakit pernapasan kronis akibat paparan debu dan racun dari senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembusukan sampah (Al-Khatib et al, 2020). Waktu dan lamanya pajanan adalah faktor yang mempengaruhi parahnya tingkat kontaminasi bahan kimia apabila dihirup oleh manusia (Ayathollah Ahmed, Alchamdani, 2021).

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Abou-ElWafa, et al (2014) yang menemukan hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap nilai FEV1/FVC pada pengepul sampah di Mansoura, Mesir dengan pengepul sampah yang telah bekerja diatas 15 tahun lebih berisiko mengalami gangguan faal paru. Dalam penelitian Abou-ElWafa, et al (2014) juga menemukan bahwa pengepul sampah merupakan kelompok yang paling banyak terpajan gangguan pernapasan dibandingkan dengan penyapu jalan dikarenakan risiko pekerjaan pengepul sampah yang lebih mudah terpajan dengan debu dan bioaerosol. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Singga (2014) yang menunjukkan adanya hubungan antara masa kerja terhadap gangguan kesehatan pada pemulung di TPA Alak, Kupang dengan nilai P sebesar 0,002. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Putri, et al (2017) yang juga menemukan hasil yang sama bahwa terdapat hubungan antara masa kerja terhadap keluhan gangguan pernapasan pada pemulung di TPA Jatibarang, dengan 86% pemulung yang memiliki masa kerja >

5 tahun mengalami gangguan pernapasan. Nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 2,5 yang berarti masa kerja merupakan faktor risiko dengan pemulung yang memiliki masa kerja > 5 tahun berisiko 2,5 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang bekerja masih kurang dari 5 tahun. Adanya aktivitas pengolahan sampah oleh truk-truk pengangkut menyebabkan debu melayang di udara dalam waktu yang lama dengan risiko pemulung dapat menghirup debu yang bertebaran di udara dan masuk ke mulut atau saluran pernapasan melalui inhalasi sehingga menyebabkan adanya penimbunan debu pada saluran pernapasan dan timbul gejala seperti batuk, sesak napas, dan nyeri dada (Putri et al, 2017). Hal ini berkaitan erat dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, dimana sebagian besar pemulung TPAS Tamangapa mengalami keluhan atau gejala seperti batuk (29.3%), flu (23.2%) dan sesak napas (15.9%) dan gejala lainnya seperti sesak napas, mata perih, nyeri dada, dan sakit tenggorokan. Njoku, et al (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Health and Enviromental Risk of Residents Living Close to a Landfill: A Case Study of Thohoyandou Landfiil, Limpopo Province, South Africa*" menemukan hasil sebanyak 78% masyarakat yang tinggal di sekitar TPA menunjukkan kontaminasi yang serius seperti flu, iritasi mata, dan rasa lemas.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, dari 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru, 40 diantaranya (74.1%) telah bekerja sebagai pemulung di atas 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masa kerja merupakan salah satu faktor risiko yang berperan besar terhadap adanya gangguan faal paru pada pemulung TPAS Tamangapa, yang berarti semakin lama masa kerja maka semakin tinggi

pula risiko gangguan faal paru akibat paparan gas berbahaya dari dekomposisi sampah TPAS Tamangapa. Penelitian Nandini, et al (2018) yang berjudul ‘*Study of Lung Function in Granite Workers Based on Duration of Exposure*’ menyimpulkan bahwa semakin tinggi masa kerja, maka semakin tinggi pajanan dan dengan demikian gangguan paru-paru juga meningkat.

Pemulung TPAS Tamangapa yang telah bekerja selama bertahun-tahun adalah salah satu bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Ajaran islam, seorang muslim yang mencari nafkah dengan jerih payah sendiri merupakan hal yang mulia dan memiliki keistimewaan di mata Allah SWT. Bekerja dengan tangan sendiri tanpa mengharap pemberian orang lain merupakan bentuk kehormatan diri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa AS yang pernah bekerja selama 8 tahun sebagai buruh padahal beliau merupakan utusan Allah yang memiliki keistimewaan. Hal ini lebih jelasnya dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرَجِهِ
وَوَطْعَامِ بَطْنِهِ

Artinya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“*Sesungguhnya Nabi Musa as. mempekerjakan dirinya sebagai buruh selama delapan tahun atau sepuluh tahun untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan (halal) bagi perutnya.*” (HR. Ibnu Majah)

M A K A S S A R

5. Hubungan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan faal paru

Kebiasaan merokok dalam penelitian ini adalah perilaku menghisap rokok (perokok aktif) oleh pemulung dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku merokok dapat menyebabkan perubahan anatomi, fungsi saluran napas, dan pada jaringan paru. Perubahan struktur saluran napas pada perokok mengakibatkan adanya perubahan pada fungsi paru dan perubahan klinis lainnya yang menjadi penyebab utama gangguan obstruksi (Wulandari et al, 2015)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhika dan Agung (2016) yang juga tidak menemukan hubungan antara kebiasaan merokok dan gangguan pernapasan pada pemulung di TPA Mirican Ponorogo dengan nilai P sebesar 1,000. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sanie et al (2019) yang menemukan tidak adanya hubungan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan faal paru dengan nilai P sebesar 0,779. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Sanie, et al (2019) yaitu sebagian besar pemulung yang mengalami gangguan faal paru adalah pemulung yang tidak merokok yang pada penelitian ini sebesar 60%. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Athanasiou, et al (2010) yang justru menemukan hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan faal paru pada penelitiannya yang berjudul ‘*Respiratory Health of Municipal Solid Waste Workers*’. Dalam penelitian Athanasiou, et al (2010), kebiasaan merokok dianggap sebagai *confounding variable* (variabel perancu) dalam penyebab gangguan faal paru karena pajanan lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, didapatkan bahwa dari total 74 responden, 50 orang diantaranya tidak memiliki kebiasaan merokok yang sebagian besar adalah pemulung perempuan. Lebih banyaknya responden yang tidak memiliki kebiasaan merokok dalam penelitian ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya hubungan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan faal paru pada pemulung. Walaupun begitu sebagian besar pemulung yang memiliki kebiasaan merokok mengalami gangguan faal paru yaitu sebesar 66,7%. Tingginya kejadian gangguan faal paru pada pemulung yang merokok dapat ditinjau dari kategori perokok yang dimana sebagian besar (58,4%) merupakan perokok dengan kategori sedang yang dimana menghisap sebanyak 10-20 batang rokok dalam sehari. Dalam penelitian ini ditemukan 12 dari 24 pemulung yang merokok mengalami gangguan faal paru jenis obstruksi dan 3 orang mengalami gangguan kombinasi. Penelitian Kumar, et al (2020) menemukan bahwa sebanyak 75% (12 dari 16) pekerja di Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang merokok memiliki gangguan kombinasi (restriksi dan obstruksi).

6. Hubungan antara penggunaan masker terhadap gangguan faal paru

Penggunaan masker yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan masker secara rutin oleh pemulung dari awal bekerja. Paparan polutan udara seperti debu, racun, bio-aerosol dari di lingkungan kerja merupakan salah satu permasalahan utama bagi para pekerja dibidang kebersihan yang berpotensi besar memberikan risiko kesehatan yang besar apabila tidak diwadahi oleh Alat Pelindung Diri (APD) (Roopa et al., 2012).

Penelitian ini selaras dengan penelitian Pratama (2019) dan Putri, et al (2017) yang juga menemukan adanya hubungan antara penggunaan alat pelindung pernapasan terhadap gangguan faal paru. Pemulung yang tiap harinya harus berhadapan dengan sampah memiliki risiko terhadap kesehatan kerja salah satunya adalah gangguan pernapasan. Penggunaan masker pada saat bekerja merupakan upaya dalam melindungi pernapasan dari bahaya ataupun penyakit dikarenakan kontak dengan bahaya kimia, fisika, biologi, hingga fisik walaupun tidak ada jaminan terhindar dari gangguan pernapasan yang sifatnya multifaktor (Putri, et al, 2017). Penelitian Gwisai et al (2014) menemukan bahwa keluhan atau gejala utama yang dirasakan oleh pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di *Municipal Landfill Site* Lobatse Botswana adalah gangguan pernapasan yang diidikasikan pemulung yang tidak menggunakan masker pada saat bekerja. Paparan limbah kimiawi dari sampah meningkatkan risiko masalah respirasi seperti batuk, kondisi kerja yang buruk, namun kurangnya penggunaan APD oleh pemulung merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap efek kesehatan yang ditimbulkan (Kumar et al, 2020). Berdasarkan hasil pengamatan, kebanyakan pemulung TPAS Tamangapa mulai rutin menggunakan masker pada saat pandemi Covid-19 sedangkan mereka telah bekerja jauh dari sebelum adanya pandemi. Responden yang rutin menggunakan masker ketika adanya pandemi Covid-19, dianggap tidak menggunakan masker saat bekerja pada penelitian ini.

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa dari 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru, hanya 6 diantaranya yang teridentifikasi rutin atau memiliki kebiasaan menggunakan masker pada saat bekerja. Selebihnya,

sebanyak 40 pemulung teridentifikasi tidak memiliki kebiasaan menggunakan masker pada saat bekerja dengan alasan merasa tidak nyaman dan terganggu. Dari 25 pemulung yang menggunakan masker pada saat bekerja, sebanyak 19 orang (76%) yang tidak mengalami gangguan faal paru. Ditinjau dari jenis masker yang digunakan, sebagian besar pemulung menggunakan masker medis, namun dalam penelitian ini cenderung tidak mendapatkan perbedaan efisiensi jenis masker yang digunakan untuk meminimalisir dampak gangguan faal paru karena penggunaan masker medis ataupun non medis sama-sama mendapatkan 3 pemulung yang mengalami gangguan faal paru dengan 2 orang yang mengalami gangguan obstruktif dan 1 lainnya mengalami gangguan kombinasi. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa jenis masker apapun, baik itu medis ataupun non medis memiliki tingkat efisiensi yang sama dalam mengurangi dampak gangguan faal paru. Walaupun begitu pemulung tetap dianjurkan untuk menggunakan masker yang terstandar yaitu memiliki 3 lapisan penyaring. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 0,3 yang berarti penggunaan masker merupakan faktor protektif atau yang berarti pemulung yang menggunakan masker saat bekerja dapat mengurangi dampak gangguan faal paru dibandingkan dengan pemulung yang tidak menggunakan masker pada saat bekerja. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan masker adalah salah satu faktor yang memiliki kontribusi terhadap pencegahan gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar. Oleh karena itu, penggunaan masker sangatlah penting untuk pencegahan paparan gas-gas berbahaya dan debu pada saat bekerja

dan dapat mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan yaitu gangguan faal paru.

Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) adalah sebuah bentuk pencegahan terhadap risiko penyakit atau kecelakaan yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Penggunaan masker pada pemulung adalah salah satu bentuk proteksi bahaya gas-gas yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah dan partikel-partikel berbahaya seperti debu yang dalam penelitian ini mencegah gangguan faal paru. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam tafsir Jalalain memaknai (Dan belanjakanlah di jalan Allah), artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya (dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu), maksudnya dirimu. Sedangkan ba sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan sana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik), artinya akan memberi pahala mereka. Sedangkan dalam tafsir oleh Kementerian Agama adalah Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fi sabilillah dan dilarang menjatuhkan dirinya

ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya. Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka. Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal infaq fi sabilillah orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah.

Penggalan kalimat “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” menjadi hujjah atau dalil fundamental untuk mengharamkan segala tindakan yang membiarkan adanya sebuah bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Begitupun jika dimaknai dengan penggunaan masker pada pemulung yang dapat menghindari adanya sebuah bahaya yang diharamkan apabila dibiarkan begitu saja.

7. Hubungan antara riwayat penyakit paru terhadap gangguan faal paru

Riwayat penyakit paru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidaknya pemulung mengalami penyakit yang berhubungan paru-paru atau sistem pernapasan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Suroto, et al (2016) yang juga menemukan tidak adanya hubungan antara riwayat penyakit paru terhadap gangguan faal paru dengan nilai P sebesar 0,974. Tidak adanya hubungan antara riwayat penyakit paru dan gangguan faal paru dalam penelitian ini kemungkinan besar disebabkan kurangnya responden yang mengalami riwayat penyakit paru dibandingkan dengan yang tidak terdapat riwayat penyakit paru yang diakibatkan keterbatasan diagnosis. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi

mengenai ada atau tidaknya riwayat penyakit paru yang dialami oleh responden melalui pengakuan responden itu sendiri yang didasarkan oleh diagnosis dokter atau tenaga kesehatan. Kurangnya pemulung yang memiliki riwayat penyakit paru dalam penelitian ini kemungkinan besar disebabkan masih rendahnya kesadaran para pemulung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dibuktikan dengan sebesar 84% pemulung yang mengaku tidak memiliki riwayat penyakit paru tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir dengan 46,96% diantaranya yang bahkan tidak pernah lagi melakukan medical check up dalam 3 tahun terakhir. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Afiani, et al (2016) yang dimana menemukan adanya hubungan antara riwayat penyakit paru terhadap gangguan faal paru dengan nilai P sebesar 0,003. Walaupun tidak adanya hubungan antara riwayat penyakit paru dan gangguan faal paru dalam penelitian ini, namun riwayat penyakit paru merupakan faktor risiko dari gangguan faal paru yang dalam penelitian ini pemulung yang memiliki riwayat penyakit paru, berisiko 1,5 kali lebih besar dibandingkan pemulung yang tidak memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit paru cenderung akan mengalami pengurangan ventilasi perfusi sehingga alveolus akan terlalu sedikit mengalami pertukaran udara yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen dalam darah (Afiani et al, 2016). Berdasarkan hasil tabulasi silang, dari total 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru, sebanyak 39 responden yang merasa tidak memiliki riwayat penyakit paru, dan hanya 7 pemulung yang mengalami riwayat penyakit paru seperti asma, pneumonia, dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dengan

lama riwayat diatas 10 tahun. Adapun jenis pengobatan yang dilakukan oleh pemulung yang punya riwayat penyakit paru adalah dengan pengobatan medis.

8. Hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan terhadap gangguan faal paru

Riwayat pemeriksaan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah riwayat pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dalam 6 bulan terakhir sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap berbagai macam penyakit yang kemungkinan diderita. Tidak adanya hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan dan gangguan faal paru dalam penelitian ini diindikasikan kurangnya responden yang memiliki riwayat pemkes 6 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, menunjukkan bahwa dari total 46 pemulung yang mengalami gangguan faal paru, 39 diantaranya (66,1%) tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir, dan sebanyak 7 pemulung (46,7%) yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa ada sebanyak 30 pemulung mengalami gejala atau keluhan pernapasan namun tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dikarenakan alasan gejala yang dirasakan tidak terlalu parah dan juga adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemulung mengurungkan niatnya untuk memeriksakan kesehatan di Fasyankes terdekat. Adapun nilai PR (CI=95%) didapatkan sebesar 0,7 yang berarti riwayat pemeriksaan kesehatan merupakan faktor protektif yang berarti pemulung yang melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir dapat mengurangi dampak gangguan faal paru. Penerapan strategi

pengendalian di tingkat awal merupakan hal yang krusial untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dibawah program pemantauan kesehatan kerja dan pengawasan rutin (Roopa et al, 2013).

Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dari total 15 pemulung yang melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir sebanyak 10 pemulung (66,67%) yang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan sebanyak 5 pemulung (33,3%) yang melakukan *medical check up* di puskesmas. Sedangkan, dari 39 pemulung yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan terakhir, mayoritas responden yaitu sebanyak 32 pemulung (54,24%) melakukan pemeriksaan kesehatan lebih dari 3 tahun. Melirik pada *Health Belief Model (HBM)*, pemulung memiliki persepsi terkait definisi sehat dan sakit akan mempengaruhi perilakunya dalam mencari pengobatan. Jika badan sakit namun masih sanggup berdiri atau berjalan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bekerja dan menyembuhkan penyakit dengan pengobatan mandiri seperti mengonsumsi obat yang dibeli (Seppina et al, 2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik individu terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.546$).
2. Tidak ada hubungan antara status gizi terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=1.000$).
3. Ada hubungan antara durasi kerja terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.015$).
4. Ada hubungan antara masa kerja terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.001$).
5. Tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.766$).
6. Ada hubungan antara penggunaan masker terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.000$).
7. Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit paru terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.239$).
8. Tidak ada hubungan antara riwayat pemeriksaan kesehatan terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Kota Makassar ($P=0.277$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik individu terhadap gangguan faal paru pada pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar, terdapat beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pemulung sebaiknya lebih meningkatkan pencegahan gangguan faal paru dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker medis yang memenuhi syarat yaitu berbahan 3 lapis agar menghindari paparan gas-gas berbahaya atau debu pada saat bekerja.
2. Pemulung sebaiknya mengurangi jam kerja dalam sehari atau jumlah hari kerja dalam seminggu dan beristirahat beberapa jam di tempat yang jauh dari sumber sampah untuk menghindari paparan gas yang dihasilkan oleh sampah dan rajin mengonsumsi air putih dan ramuan herbal seperti jahe untuk proses detoksifikasi terhadap polutan yang masuk ke dalam tubuh.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPAS Tamangapa sebaiknya membuat kebijakan kepada pemulung yang bekerja di TPAS Tamangapa terkait waktu kerja yang dipekenankan utamanya penghentian aktifitas pekerjaan pada malam hari yang bertujuan untuk melindungi pemulung dari bahaya kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat terjadi.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPAS Tamangapa sebaiknya membuat sebuah rambu larangan tempat beristirahat yang terlalu dekat dengan sumber sampah untuk menimalisir pajanan.
5. Puskesmas Tamangapa sebaiknya memberlakukan program pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali kepada pemulung TPAS Tamangapa

sebagai bentuk pencegahan tingkat awal atas berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Selain itu dengan program penyuluhan kesehatan khususnya penggunaan masker untuk meningkatkan kesadaran pemulung atau pekerja lainnya di TPAS Tamangapa tentang pentingnya penggunaan APD untuk pencegahan bahaya di lingkungan kerja.

6. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebaiknya kembali mengaktifkan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada dalam kawasan TPAS Tamangapa sebagai salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan khusus masyarakat sekitaran TPAS maupun yang bekerja di TPAS.
7. Disarankan kepada peneliti selanjutnya bisa lebih spesifik meneliti dan membahas mengenai masalah kesehatan ataupun bahaya-bahaya lainnya yang ada di TPAS Tamangapa khususnya mengenai masalah kesehatan paru-paru atau pernapasan sebagai pengembangan atau tindak lanjut dari penelitian ini. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini agar menambahkan variabel-variabel lainnya seperti tempat istirahat, aktifitas kerja malam hari, dan tempat tinggal atau bermukim yang berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini sangat perlu untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Maddatuang, & Uca. (2019). Studi Karakteristik Kehidupan Sosial dan Ekonomi Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Enviromental Science*, 2(1), 15–29.
- Abou-elwafa, H. S., & El-bestar, S. F. (2014). Respiratory Disorders Among Municipal SolidWaste Collectors in Mansoura, Egypt: A Comparative Study. *Archives of Environmental & Occupational Health*, 69(2), 100–106.
- Afiani, E. E., Jayanti, S., & Widjasena, B. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Fungsi Paru pada Pekerja di Unit Boiler Industri Tekstil X Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 372–382.
- Alam, P., Jayadipraja, E. A., & Surya, R. A. (2021). The Relationship between Work Duration and the Use of Personal Protective Equipment with Lung Capacity Disorders The Relationship between Work Duration and the Use of Personal Protective Equipment with Lung Capacity Disorders, (August 2019).
- Ali, N. A., Nafees, A. A., Fatmi, Z., & Azam, S. I. (2018). Dose-response of cotton dust exposure with lung function among textile workers: MultiTex study in Karachi, Pakistan. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 9(3), 120–128. <https://doi.org/10.15171/ijoem.2018.1191>
- Al-Khatib, I. A., Al-Sari, M. I., & Kontogianni, S. (2020). Assessment of Occupational Health and Safety among Scavengers in Gaza Strip, Palestine. *Journal of Environmental and Public Health*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/3780431>
- Algasaff, H., & Mukti, A. (2015). *Anatomi dan Fisiologi paru* (4th ed.). Airlangga University Press.
- Andhika, R. A., & Agung, T. E. (2016). Pengaruh Paparan CH₄ dan H₂S Terhadap Keluhan Gangguan Pernapasan Pemulung di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 1(1), 1–14.

- Anyfantis, I. D., Rachiotis, G., Hadjichristodoulou, C., & Gourgoulisanis, K. I. (2017). Respiratory symptoms and lung function among greek cotton industry workers: A cross-sectional study. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 8(1), 32–38. <https://doi.org/10.15171/ijoem.2017.888>
- Apsari, L., Budiyo, & Onny, S. (2018). Hubungan Paparan Debu Terhirup Dengan Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Pertambangan Pasir Dan Batu Perusahaan X Rowosari Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 463–475.
- Athanasiou, M., Makrynos, G., & Dounias, G. (2010). Respiratory health of municipal solid waste workers. *Occupational Medicine*, 60(8), 618–623. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq127>
- Ayathollah Ahmed, Alchamdani, A. W. (2021). Analisis kadar hidrogen sulfida dan keluhan pernapasan pada pemulung di tpa puuwatu kota kendari, 22, 1–15.
- Amerta, P. W. P., & Wirawan, I. M. A. (2020). Hubungan Paparan Debu Dengan Kapasitas Fungsi Paru Perajin Batu Paras Di Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. *Archive of Community Health*, 7(1), 87–95. <https://doi.org/10.24843/ach.2020.v07.i01.p09>
- Bakhtiar, A., & Amran, W. S. (2016). Faal Paru Statis, 2(3), 91–98.
- Cintya, R. E., Budiyo, & Joko, T. (2020). Paparan Debu Terhirup dan Gangguan Fungsi Paru pada Pedagang Tetap di Terminal Kota Tegal. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(3), 189–194. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.3.189-194>
- Evelyn, C. (2009). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: Gramedia.
- Fitriana, R., & Siwiendrayani, A. (2019). Kualitas Udara dan Keluhan Sesak Napas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 3(3), 357–368.
- Gwisai, R. D., Areola, O., & Segosebe, E. (2014). Respiratory And Occupational Health Problems Of Scavengers And Landfill Employees In A Municipal Landfill Site In Lobatse, Botswana. *Journal of Sustainable Development in Afrika*, 16(1), 37–55.
- Handari, M. C., Sugiharto, & Pawenang, E. T. (2018). Karakteristik Pekerja dengan Kejadian Gangguan Fungsi Paru pada Pekerja Dipo Lokomotif. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 84–94.
- Hardisman. (2010). *Pengaturan Makanan Dalam Kajian*. Universitas Andalas.

- Hartini, E., & Kumalasari, R. J. (2015). Faktor Risiko Paparan Gas Amonia Dan Hidrogen Sulfida Terhadap Keluhan Gangguan Kesehatan Pada Pemulung Di TPA Jatibarang Kota Semarang. *Jurnal Visikes*, 14(1), 63–72.
- Harrianto, R. (2008). *Kesehatan Kerja*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hashemi Habybabady, R., Nasibi Sis, H., Paridokht, F., Ramrudinasab, F., Behmadi, A., Khosravi, B., & Mohammadi, M. (2018). Effects of dust exposure on the respiratory health symptoms and pulmonary functions of street sweepers. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 25(6), 76–84. <https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.6.8>
- International Labour Organization (ILO). (2018). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas. Jakarta
- Julianti, N. (2013). Perbandingan Kapasitas Vital Paru pada Atlet Pria Cabang Olahraga & Lari Cepat Persiapan Olahraga Provinsi 2013 di Bandar Lampung. *Majority Journal*, 2(5), 113–118.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Metodologi Penelitian* (Oktober 20). Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia
- Kulkarni, S. M., & Deepali, P. P. (2019). Effects of Occupational Exposures on the Lung Functions and Quality of Life of Garbage Collectors in the Urban Area. *Indian Journal of Occupational and Enviromental Medicine*, 23(2), 102–105.
- Kumar, S., Bathma, V., Dixit, A. K., & Parashar, L. (2020). Assessment of Respiratory Health of Landfill Workers and Its Correlation with Their Knowledge and Use of Personal Protective Equipments. *National Journal of Community Medicine*, 11(1), 53–56. <https://doi.org/10.1234/njcm.20190329093802>
- Marpaung, Y. M. (2012). *Pengaruh Pajanan Debu Respirable PM 2.5 Terhadap Kerja Gangguan Fungsi Paru Pedagang Tetap di Terminal Terpadu Kota*

Depok Tahun 2012. Universitas Indonesia.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31038.41286>

- Miele, C. H., Grigsby, M. R., Siddharthan, T., Gilman, R. H., Miranda, J. J., Bernabe-ortiz, A., Checkley, W. (2018). Environmental exposures and systemic hypertension are risk factors for decline in lung function, 1–8. <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210477>
- Muhammad, Y., Ahmad, R. Y., Dambatta, A. S., & Abubakar, Y. (2020). Evaluation of Respiratory Health among Refuse Management and Sanitation Board Workers in Kano Metropolis. *Nigerian Journal of Basic and Clinical Sciences*, 17(2), 1–5. <https://doi.org/10.4103/njbcs.njbcs>
- Nandini, C., Malleshappa, K., Vastrad, B., & Nafees, S. (2018). Study of lung function in granite workers based on duration of exposure. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 8(9), 1374. <https://doi.org/10.5455/njppp.2018.8.0619608062018>
- Neghab, M., Khodaparast, KF Hassanzadeh, J., & Ahmadzadeh, F. (2013). Assessment of respiratory symptoms and lung functional impairments among a group of garbage collectors. *Int J Occup Hyg*, 5.
- Njoku, P. O., Edokpayi, J. N., & Odiyo, J. O. (2019). Health and environmental risks of residents living close to a landfill: A case study of thohoyandou landfill, Limpopo province, South Africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(12), 10–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph16122125>
- Pradana, V. A. (2017). *Gambaran Gangguan Fungsi Paru Pada Pemulung yang Bekerja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari Kabupaten Jember. Universitas Jember.*
- Pratama, E. I. (2019). *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Keluhan Gangguan Pernafasan Pada Pemulung di TPA Winongo Kota Madiun. Stikes Bhakti Husada Mulia.*
- Prinata, M. ., Nurjazuli, & Yunita, N. A. . (2017). Analisis Perbedaan Fungsi Paru pada Pemulung Berdasarkan Kadar Debu Total di TPS Sampah Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(5), 733–743.
- Putra, N. D. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kapasitas Vital Paru Pada Pekerja Bengkel Las Di Kelurahan Cirendeu Tahun 2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Putri, R. T., Joko, T., & Dangiran, H. L. (2017). Hubungan Karakteristik Pemulung Dan Penggunaan Alat Pelindung Pernapasan Dengan Keluhan

Gangguan Pernapasan Pada Pemulung Di Tpa Jatibarang, Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(5), 838–849.

Ramdan, I. M., Adawiyah, R., & Firdaus, A. R. (2018). Analisis Risiko Paparan Sulfur Dioksida(SO₂) Terhadap Risiko Non Karsinogenik Pada Pekerja Penyapu Jalan di Kota Samarinda. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 4(5), 255. <https://doi.org/10.35963/hmjk.v4i5.98>

Rengganis, S. A. (2013). *Analisis Implementasi Pemeriksaan Kesehatan pada Karyawan di Bagian Produksi PT Frisian Flag Indonesia Tahun 2012. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*

Roopa, S., Padmavathi, R., Akolkar, A., Sankar, S., Ravishankar, P., Vijayalakshmi, T, Kalpana, B. (2012). Respiratory functions of conservancy workers working in solid waste management sector of Chennai, India. *F1000Research*, (May), 1–9. <https://doi.org/10.3410/f1000research.1-67.v1>

Salhah, N. (2015). *Hubungan Lama Bekerja dengan Gangguan Fungsi Paru Pada Pemulung di RT.14 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Samarinda. Stikes Muhammadiyah Samarinda.* <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>

Sanie, D. K., Susanto, D. A., & Harahap, F. (2019). Gangguan Respirasi dan Faal Paru pada Pemulung di Bantar Gebang, Bekasi. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 39(2), 70–78.

Seppina, D. S., Hilal, N., & Iw, H. R. (2017). Kesehatan Di Tpa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. *Jurnal Link*, 13(1), 13–19.

Singga, A. (2014). Gangguan Kesehatan Pada Pemulung Di TPA Alak Kota Kupang. *Jurnal MKMI*, 30–35.

Simbolon, V. A., Nurmaini, & Hasan, W. (2018). Pengaruh Paparan Gas Hidrogen Sulfida (H₂S) terhadap Keluhan Saluran Pernafasan pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 18(1), 42–49.

Soemirat, J. (2011). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Suroto, S., Jayanti, S., & Oviara, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kapasitas Vital Paru Pada Pekerja Industri Pengolahan Kayu Di Pt. X Jeparo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(1), 267–276.

Townsend, E. A., Miller, V. M., & Prakash, Y. S. (2012). *Sex differences and sex steroids in lung health and disease. Endocrine Reviews* (Vol. 33).

<https://doi.org/10.1210/er.2010-0031>

- Thufeilsyah, F., Uyainah, A., & Amin, Z. (2014). Spirometry. *Na J Chest Crit and Emerg Med* /, 1(1), 35–38.
- Tu, J., Inthavong, K., & Ahmadi, G. (2013). The Human Respiratory System. *Research Gate*, (January), 19–44. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4488-2_2
- Tualeka, A. R., Kalamillah, H., & Meidikayanti, W. (2019). Association between duration working with lung disruption condition using pulmonary vital capacity (PVC) test on lathe worker at Yogyakarta, Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 13(2), 384–388. <https://doi.org/10.5958/0973-9130.2019.00150.6>
- Wulandari, R., Setiani, O., & Dewanti, N. (2015). Hubungan Masa Kerja Terhadap Gangguan Fungsi Paru Pada Petugas Penyapu Jalan Di Protokol 3, 4 Dan 6 Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3), 797–806.
- WHO. (2019). Chronic Respiratory Diseases: Burden of COPD. Available from URL: <https://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/>. Diakses pada 17 September 2019.
- Yulaekah, S. (2007). *Paparan Debu Terhirup Dan Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Industri Batu Kapur (Studi Di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)*. Universitas Diponegoro.
- Yuliawati, R., Lintar, R. A., Rachman, A., & Wahyuni, M. (2019). Analysis of factors related to lung dysfunction among coal mining workers in coal processing plant. *Journal of Public Health in Africa*, 10(S1), 90–92. <https://doi.org/10.4081/jphia.2019.1195>
- Zaleha, M. ., Vikneswaran, S., Diana, M., Intan, M., & Humadevi, S. (2018). The Prevalence Of Respiratory Symptoms Among Workers In A Domestic Waste Collection Center In Klang Valley, Malaysia. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*, 4(2), 145–154.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN S

TAJIB SUBYEK PENELITIAN

Assalamualikum wr.wb

Saya Fajar, NIM :70200117068 mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Karakteristik Individu terhadap Gangguan Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik individu (Jenis kelamin, status gizi, penggunaan masker, durasi kerja, masa kerja, riwayat penyakit paru, dan riwayat pemkes) terhadap gangguan faal paru.

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara(i) agar bersedia mengisi lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak menolak jika tidak bersedia menjadi informan. Namun sangat kami harapkan kesediaan anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para informan jika bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas informan.
- keikutsertaan secara sukarela. informan dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.
- Pengisian kuesioner di lakukan kepada informan sekitar 10-15 menit untuk mengetahui karakteristik individu
- Pengukuran berat badan, tinggi badan, dan spirometri sekitar 5 menit

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila

terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 083 853 758 994 Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 15 April
2021

(responden)

Penanggung jawab : Emmi Bujawati, SKM., M,Kes
Peneliti utama : Muh. Fajar Pahrir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP GANGGUAN FAAL PARU (RESTRIKTIF DAN OBSTRUKTIF) PADA PEMULUNG DI TPAS TAMANGAPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

Nomor :

Tanggal :

No.	I. Identitas Responden	
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	Usia	
4.	Jenis Kelamin	

No.	II. Pengukuran antropometri	
1.	Tinggi badan (m)	
2.	Berat badan (kg)	
3.	IMT	
4.	Status gizi	a. Kurus b. Normal c. Lebih

No.	III. Durasi kerja dan masa kerja	
1.	Berapa jam anda bekerja dalam sehari?	a. > 8 jam b. ≤ 8 jam
2.	Berapa hari anda bekerja dalam seminggu? hari
3.	Berapa tahun anda telah bekerja?	a. > 5 tahun b. ≤ 5 tahun

No	IV. Kebiasaan merokok	
1.	Apakah anda pernah merokok?	a. Ya b. Tidak (ke IV.4) c. Sudah berhenti (ke IV.3)
2.	Usia pertama kali merokok	

3.	Berapa batang rokok yang dihisap per hari/minggu	Satuan : a. Batang/hari b. batang/minggu Jumlah :
3.	Usia berhenti merokok	
4.	Apakah ada anggota keluarga (serumah) yang merokok?	a. Ya b. Tidak (Ke V)
5.	Seberapa sering orang lain merokok di dekat anda dalam ruangan tertutup?	a. Ya, setiap hari b. Ya, tidak setiap hari c. Tidak pernah sama sekali
No	V. Penggunaan masker	
1.	Apakah anda menggunakan masker pada saat bekerja?	a. Ya b. Tidak (ke VI)
2.	Sudah berapa lama anda menggunakan masker saat bekerja? Bulan/Tahun
3.	Jenis masker yang digunakan saat bekerja	a. Medis b. Non medis

No	VI. Riwayat penyakit paru	
1.	Apakah anda pernah menderita penyakit paru sebelumnya?	a. Ya b. Tidak (ke VII)
2.	Penyakit paru yang diderita	a. Asma b. Pneumonia c. ISPA d. Bronkitis e. TB Paru f. PPOK g. Lainnya.
3.	Lama menderita penyakit paru Bulan/tahun
4.	Jenis pengobatan yang dilakukan	a. Medis b. Tradisional

No	VII. Riwayat pemeriksaan kesehatan	
1.	Apakah dalam 6 bulan terakhir anda pernah memeriksakan kesehatan?	a. Ya b. Tidak (ke VII.4)
2.	Dimana anda melakukan pemeriksaan kesehatan?	a. Rumah sakit b. Puskesmas c. Klinik

		d. Lainnya (sebutkan)
3.	Keluhan atau gejala yang dirasakan	a. Flu b. Batuk c. Nyeri dada d. Sakit tenggorokan e. Sesak napas f. Lainnya (sebutkan)
4.	Kapan terakhir anda melakukan pemeriksaan kesehatan?	a. 1 tahun terakhir b. 2 tahun terakhir c. 3 tahun terakhir d. > 3 tahun terakhir
5.	Apakah ada keluhan yang anda rasakan, namun tidak memeriksakan kesehatan?	a. Ya (ke VII.3) b. Tidak

No.	VIII. Pengukuran faal paru	
1.	Nilai FVC	
2.	Nilai FEV1	
3.	Hasil pengukuran	a. Normal b. Gangguan restriktif c. Gangguan obstruktif

Lampiran 3

Master Tabel

Nama	Usia	JK	TB	BB	IMT	SG	USG	P3.1	P3.2	P3.3	P4	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P5.1	P5.2	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P7.1	P7.2	P7.3	P7.4	P7.5	FVC	FEV1	GP	HP
Sholihin	25	2	168	75	27	3	2	1	7	1	2	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	2	0	Flu, Batu	2	1	100.00	46.77	1	3
Syakir	23	2	166	77	32	3	2	1	7	1	2	14 tahun	5 batang	1	2	1	0	1	1	10 tahun	1	1	2	Flu, batu	0	0	114.00	42.39	1	3
Hariz	25	2	168	82	29	3	2	1	7	1	1	13 tahun	45 batang	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	3	2	174.00	36.02	1	3
Syanifud	30	2	164	50	21	2	1	2	7	1	1	8 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	4	2	86.00	70.19	2	1
Hartati	20	1	149	42	19	2	1	2	7	1	2	0	0	1	3	2	1	2	0	0	0	1	2	Batuk	0	0	116.00	84.00	2	1
Suriyanti	22	1	156	41	17	1	2	1	7	1	2	0	0	1	3	1	0	2	0	0	0	2	0	Flu, batu	1	1	82.00	25.88	1	3
Ira Dg Nj	30	1	162	69	30	3	2	1	7	2	2	0	0	1	2	1	0	1	2	3 tahun	1	1	2	Flu, batu	0	0	88.00	28.57	1	3
Sali	27	1	151	58	20	2	1	1	7	2	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	92.00	40.10	1	3	
Nurhaya	24	1	169	81	32	3	2	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	10.00	46.60	1	4	
Yusuf	23	2	162	56	22	2	1	1	7	1	1	14 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	92.00	47.42	1	3	
Akhsa	24	2	187	79	23	2	1	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	2	Flu, sesa	0	0	61.00	100.00	1	2
Muslimi	30	2	160	67	26	3	2	2	7	2	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	100.00	51.04	1	3	
Syamir	30	2	157	58	24	2	1	1	7	1	1	13 tahun	15 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	Flu	3	1	104.00	51.33	1	3
Usman	24	2	158	55	22	2	1	2	7	1	1	14 tahun	15 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	Flu	4	1	168.00	80.91	2	1
Amir	29	2	160	52	20	2	1	1	7	1	1	13 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Sesak n	1	1	169.00	38.40	1	3
Teddy	27	2	164	60	22	2	1	1	7	1	1	20 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	0	128.00	94.01	2	1	
Putri	18	1	158	40	16	1	2	2	5	2	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	1	2	Sesak n	0	0	94.00	40.45	1	3
Ical	30	2	158	79	32	3	2	2	7	1	1	12 tahun	5 batang	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	Batuk	4	1	80.00	64.00	1	4
Miskin	30	2	158	67	27	3	2	1	7	1	1	18 tahun	2 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Batuk da	4	1	115.00	85.20	2	1
Jumadin	28	2	161	59	23	2	1	1	7	1	1	20 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Batuk	4	1	76.00	56.76	1	4
Yasriant	29	2	163	75	28	3	2	1	7	1	1	20 tahun	12 batang	0	0	2	2	2	0	0	1	2	0	Flu	4	1	114.00	45.45	1	3
Yani	27	1	153	69	29	3	2	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	1	Batuk	0	0	136.00	79.39	2	1
Aid Aziz	30	2	158	88	35	3	2	1	7	1	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Batuk, n	4	1	164.00	73.48	2	1
Sri	22	1	157	48	20	2	1	1	7	2	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	2	0	Flu, batu	4	1	162.00	77.45	2	1
Rahmat	26	1	153	45	19	2	1	2	7	2	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	2	87.00	100.00	2	1	
Syahrin	30	2	164	77	29	3	2	2	7	2	1	18 Tahun	30 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	4	0	122.00	90.10	2	1	
Halia	53	1	155	52	21	2	1	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	2	0	Batuk	1	1	162.00	90.64	2	1
Ramil	25	2	167	90	32	3	2	2	7	2	2	12 tahun	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	2	90.00	78.81	2	1	
Allian	30	2	164	65	24	2	1	1	7	1	1	15 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Sesak n	3	1	96.00	59.75	1	3
Kasmi	20	1	151	45	20	2	1	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Nyeri da	1	1	61.00	56.52	1	4
Anto	19	2	159	53	21	2	1	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	100.00	94.68	2	1	
Anjas	23	2	161	57	22	2	1	1	7	1	1	14 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	71.00	100.00	1	2	
Wahyu	20	2	159	47	18	1	2	2	7	2	1	15 tahun	15 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	4	2	88.00	100.00	2	1	
Nia	30	1	148	51	23	2	1	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	2	95.00	53.65	1	3	
Durasi	30	2	162	63	24	2	1	1	7	1	2	0	0	1	2	2	2	1	3	0	0	2	0	1	2	114.00	100.00	2	1	
Samiang	25	1	154	38	16	1	2	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	2	0	Sakit ter	4	1	23.00	100.00	1	2
Faisal	21	2	169	50	18	1	2	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	34.00	100.00	1	2	
Matia	24	1	154	46	19	2	1	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	1	2	Flu	0	1	144.00	64.71	1	3
Asseng	25	1	148	58	26	3	2	1	7	2	2	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	1	2	Flu	0	1	82.00	77.45	2	1
Basse	29	1	154	75	31	3	2	1	7	1	2	0	0	1	2	2	2	2	0	0	0	2	0	Batuk, N	1	1	112.00	55.98	1	3
Sarmi	24	1	153	48	20	2	1	2	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	2	0	Flu, Batu	4	1	74.00	51.63	1	4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Sjamsul	30	2	175	77	25	2	1	1	7	1	2	0	0	1	0	1	3	0	0	2	0	0	4	2	80,00	66,29	1	4				
Haerudd	30	2	170	64	22	2	1	1	7	1	2	15 tahun	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	Flu, batu	4	1	74,00	54,24	1	4			
Aziz	28	2	171	71	24	2	1	1	7	1	1	0	1 batang	0	0	1	0	2	0	0	2	0	Flu, batu	2	1	93,00	60,54	1	3			
Satria	29	1	141	56	28	3	2	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	2	0	Flu	3	2	118,00	66,88	1	3			
Hariz	30	2	166	72	26	3	2	1	7	1	1	22 tahun	8 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	1	2	Sakit ter	0	0	114,00	99,25	2	1		
Fatimah	25	1	141	51	26	3	2	1	7	1	2	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	1	2	Flu, batu	0	0	101,00	100,00	2	1		
Nursia	27	1	153	60	26	3	2	1	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	4	2	0	0	15,00	79,34	1	2			
Mawar	21	1	154	51	21	2	1	2	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	Flu, Batu	1	1	75,00	73,63	1	2		
Tinggi	30	2	165	53	19	2	1	1	7	1	1	10 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	4	2	0	0	72,00	54,05	1	4			
Eda	22	1	158	45	18	1	2	2	7	1	2	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	1	1	0	Sakit ter	1	1	101,00	100,00	2	1	
Irmawati	23	1	155	57	24	2	1	2	7	2	2	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	4	2	0	0	100,00	96,00	2	1			
Darma	29	1	153	70	30	3	2	2	7	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	3	2	0	0	72,00	36,02	1	4			
Menang	30	2	161	47	18	2	1	1	7	1	1	14 tahun	30 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	4	1	0	Sesak n.	4	1	119,00	50,40	1	3	
Hasriani	30	1	160	65	26	3	2	2	7	1	2	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	2	0	0	Flu, batu	3	1	104,00	33,10	1	3	
Eka	27	1	155	54	22	2	1	2	7	2	2	0	0	1	1	2	1	1	1	12 tahun	1	1	2	Sesak n.	0	0	78,00	63,67	1	4		
Samri	26	1	156	52	21	2	1	2	7	2	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	1	1	Flu	0	2	151,00	89,15	2	1		
Junaidi	21	2	163	68	26	3	2	2	4	2	2	0	0	1	2	2	1	2	0	0	0	4	2	0	0	89,00	100,00	2	1			
Wahid	29	2	161	80	31	3	2	1	5	1	1	15 tahun	30 batang	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	Flu, batu	1	1	132,00	100,00	2	1	
Ardi	30	2	178	72	23	2	1	1	7	1	1	9 tahun	30 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	3	1	0	Flu, batu	3	1	121,00	69,42	1	3	
Raihan	18	2	165	61	22	2	1	1	7	2	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	1	0	Nyeri da	2	1	101,00	53,12	1	3	
Selvi	22	1	153	41	18	1	2	2	7	2	2	0	0	1	2	2	2	2	0	0	0	1	2	0	0	96,00	88,00	2	1			
Nisa	18	1	150	46	20	2	1	2	5	2	2	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0	1	2	0	0	132,00	85,00	2	1			
Wardi	20	2	166	45	17	1	2	1	7	1	1	18 tahun	5 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	4	2	0	0	86,00	32,10	1	3			
Zulhan	19	2	169	72	25	3	2	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	3	2	0	0	55,00	31,12	1	4			
Jumri	30	2	162	62	24	2	1	1	7	1	1	15 tahun	10 batang	0	0	1	0	1	3	15 tahun	0	1	1	0	Batuk,	0	0	113,00	29,00	1	3	
Haerati	30	1	150	67	30	3	2	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	0	21,00	100,00	1	2			
Ismawati	28	1	148	56	26	3	2	1	7	2	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	2	2	0	0	99,00	86,10	2	1			
Irna	22	1	161	50	19	2	1	1	7	2	2	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	4	2	0	0	81,00	94,00	2	1			
Risma	27	1	153	42	18	1	2	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	4	1	0	Sesak n.	4	1	45,00	42,39	1	4	
Imron	24	2	165	77	27	3	2	1	7	1	2	0	0	2	2	1	0	1	3	19 tahun	0	2	0	0	Mata pe	2	1	26,00	87,00	1	2	
Lamri	30	2	162	42	16	1	2	1	7	1	1	20 tahun	15 batang	0	0	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	Mata pe	4	1	119,00	56,70	1	3
Ramlah	29	1	153	68	29	3	2	1	7	2	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	Flu	0	2	92,00	88,45	2	1	
Laila	23	1	159	44	18	1	2	1	7	1	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	Batuk, s	4	1	57,00	33,16	1	4	

Keterangan Tabel :

- JK (Jenis Kelamin) : 1 (Perempuan) 2 (laki-laki)
SG (Status Gizi) : 1 (normal) 2 (kurang) 3 (lebih)
USG (Ukuran Status Gizi) : 1 (normal) 2 (tidak normal)
P3.1 (Durasi Kerja) : 1 (> 8 jam) 2 (\leq 8 jam)
P3.2 (Jumlah hari kerja dalam seminggu)
P3.3 (Masa kerja) : 1 (> 5 tahun) 2 (\leq 5 tahun)
P4 (Kebiasaan merokok) : 1 (pernah merokok) 2 (tidak pernah merokok)
P4.1 (usia pertama kali merokok)
P4.2 (jumlah rokok yang dihisap)
P4.3 (Anggota keluarga yang merokok) : 1 (ada) 2 (tidak ada)
P4.4 (Frekuensi menjadi perokok pasif) : 1 (Ya, setiap hari), 2 (Ya, tidak setiap hari) 3 (Tidak pernah sama sekali)
P5.1 (Penggunaan masker) : 1 (Menggunakan) 2 (Tidak menggunakan)
P5.2 (Jenis masker yang digunakan) : 1 (Medis) 2 (Non medis)
P6.1 (Riwayat penyakit paru) : 1 (Ada) 2 (Tidak ada)
P6.2 (Jenis penyakit paru yang di derita)
P6.3 (Lama menderita penyakit paru)
P6.4 (Jenis pengobatan yang dilakukan) : 1 (Medis) 2 (Non Medis)
P7.1 (Riwayat pemkes 6 bulan terakhir) : 1 (Ada) 2 (Tidak ada)
P7.2 (Tempat melakukan pemkes) : 1 (RS) 2 (PKM)
P7.3 (Gejala yang dirasakan) : 1 (Flu) 2 (Batuk) 3 (Nyeri dada) 4 (Sakit tenggorokan) 5 (Sesak napas)
P7.4 (Waktu terakhir melakukan pemkes) : 1 (1 tahun terakhir) 2 (2 tahun terakhir) 3 (3 tahun terakhir) 4 (>3 tahun terakhir)
P7.5 (Apakah ada gejala namun tidak melakukan pemkes) : 1 (Ya) 2 (Tidak)
FVC : Nilai FVC
FEV1 : Nilai FEV1
GP (Gangguan paru) : 1 (Ada Gangguan) 2 (Tidak ada gangguan)
HP (Hasil pengukuran) : 1 (Normal) 2 (Restriktif) 3 (Obstruktif) 4 (Kombinasi)

Lampiran 4

Output SPSS

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	35	47.3	47.3	47.3
	Laki-laki	39	52.7	52.7	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Status Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	11	14.9	14.9	14.9
	Normal	35	47.3	47.3	62.2
	Lebih	28	37.8	37.8	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Berapa jam anda bekerja dalam sehari

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>8 Jam	53	71.6	71.6	71.6
	<= 8 Jam	21	28.4	28.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Berapa tahun anda telah bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>5 tahun	54	73.0	73.0	73.0
	<= 5 tahun	20	27.0	27.0	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Kebiasaan Merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	24	32.4	32.4	32.4
	Tidak	50	67.6	67.6	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Kategori perokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	5	6.8	6.8	6.8
	Sedang	14	18.9	18.9	25.7
	Berat	5	6.8	6.8	32.4
	Bukan perokok	50	67.6	67.6	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Apakah anda menggunakan masker pada saat bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	49	66.2	66.2	66.2
	Ya	25	33.8	33.8	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Jenis masker yang digunakan saat bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	49	66.2	66.2	66.2
	Medis	17	23.0	23.0	89.2
	Non medis	8	10.8	10.8	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

M A K A S S A R

Apakah anda pernah menderita penyakit paru/pernapasan sebelumnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	8	10.8	10.8	10.8
	Tidak	66	89.2	89.2	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Apakah dalam 6 bulan terakhir anda pernah memeriksakan kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	15	20.3	20.3	20.3
	Tidak	59	79.7	79.7	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Keluhan atau gejala yang dirasakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	29	39.2	39.2	39.2
	Batuk	6	8.1	8.1	47.3
	Batuk dan mata perih	1	1.4	1.4	48.6
	Batuk, Mata perih, Nyeri dada	1	1.4	1.4	50.0
	Batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan, dan sesak napas	1	1.4	1.4	51.4
	Batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, mata perih	1	1.4	1.4	52.7
	Flu	8	10.8	10.8	63.5
	Flu, batuk	5	6.8	6.8	70.3
	Flu, Batuk	1	1.4	1.4	71.6
	Flu, Batuk, Nyeri dada	1	1.4	1.4	73.0
	Flu, batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan	2	2.7	2.7	75.7

Flu, batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan, sesak napas	1	1.4	1.4	77.0
Flu, batuk, nyeri dada, sesak napas	1	1.4	1.4	78.4
Flu, batuk, sesak napas	1	1.4	1.4	79.7
Flu, Batuk, Sesak napas	1	1.4	1.4	81.1
Flu, sesak napas, nyeri dada	1	1.4	1.4	82.4
Mata perih	1	1.4	1.4	83.8
Mata perih, sakit tenggorokan	1	1.4	1.4	85.1
Nyeri dada, sakit tenggorokan	2	2.7	2.7	87.8
Sakit tenggoroka, nyeri dada	1	1.4	1.4	89.2
Sakit tenggorokan	2	2.7	2.7	91.9
Sesak napas	5	6.8	6.8	98.6
Sesak napas, Nyeri dada, mata perih	1	1.4	1.4	100.0
Total	74	100.0	100.0	

Ada gangguan atau tidak ada gangguan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada gangguan	46	62.2	62.2	62.2
	Tidak ada gangguan	28	37.8	37.8	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hasil pengukuran spirometer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	28	37.8	37.8	37.8
	Restriktif	8	10.8	10.8	48.6
	Obstruktif	25	33.8	33.8	82.4
	Kombinasi	13	17.6	17.6	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

**Jenis Kelamin * Ada gangguan atau tidak ada gangguan
Crosstabulation**

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Jenis Kelamin	Perempuan	20	15	35
	Laki-laki	26	13	39
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.711 ^a	1	.399		
Continuity Correction ^b	.364	1	.546		
Likelihood Ratio	.712	1	.399		
Fisher's Exact Test				.475	.273
Linear-by-Linear Association	.702	1	.402		
N of Valid Cases	74				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.24.

b. Computed only for a 2x2 table

**Ukuran status gizi * Ada gangguan atau tidak ada gangguan
Crosstabulation**

Status Gizi * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total	
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan		
Status Gizi	Kurang	Count	8	3	11
		Expected Count	7.2	3.8	11.0
		% of Total	17.4%	6.5%	23.9%
	Normal	Count	22	13	35
		Expected Count	22.8	12.2	35.0
		% of Total	47.8%	28.3%	76.1%
Total		Count	30	16	46

Expected Count	30.0	16.0	46.0
% of Total	65.2%	34.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.359 ^a	1	.549		
Continuity Correction ^b	.056	1	.813		
Likelihood Ratio	.370	1	.543		
Fisher's Exact Test				.722	.415
Linear-by-Linear Association	.352	1	.553		
N of Valid Cases	46				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.83.

b. Computed only for a 2x2 table

Status Gizi * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan			
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	Total	
Status Gizi	Lebih	Count	16	12	28
		Expected Count	16.9	11.1	28.0
		% of Total	25.4%	19.0%	44.4%
	Normal	Count	22	13	35
		Expected Count	21.1	13.9	35.0
		% of Total	34.9%	20.6%	55.6%
Total	Count	38	25	63	
	Expected Count	38.0	25.0	63.0	
	% of Total	60.3%	39.7%	100.0%	

M A K A S S A R

Status Gizi * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total	
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan		
Status Gizi	Lebih	Count	16	12	28
		Expected Count	16.9	11.1	28.0
		% of Total	25.4%	19.0%	44.4%
	Normal	Count	22	13	35
		Expected Count	21.1	13.9	35.0
		% of Total	34.9%	20.6%	55.6%
Total	Count	38	25	63	
	Expected Count	38.0	25.0	63.0	
	% of Total	60.3%	39.7%	100.0%	

Berapa jam anda bekerja dalam sehari * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Berapa jam anda bekerja dalam sehari	>8 Jam	38	15	53
	<= 8 Jam	8	13	21
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.220 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	5.862	1	.015		
Likelihood Ratio	7.100	1	.008		
Fisher's Exact Test				.015	.008
Linear-by-Linear Association	7.123	1	.008		
N of Valid Cases	74				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.95.

b. Computed only for a 2x2 table

Berapa tahun anda telah bekerja * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Berapa tahun anda telah bekerja	>5 tahun	40	14	54
	<= 5 tahun	6	14	20
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.053 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	10.252	1	.001		
Likelihood Ratio	11.922	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	11.890	1	.001		
N of Valid Cases	74				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.57.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebiasaan Merokok * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Kebiasaan Merokok	Ya	16	8	24
	Tidak	30	20	50
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.306 ^a	1	.580		
Continuity Correction ^b	.089	1	.766		
Likelihood Ratio	.309	1	.578		
Fisher's Exact Test				.619	.386
Linear-by-Linear Association	.302	1	.582		
N of Valid Cases	74				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Apakah anda menggunakan masker pada saat bekerja * Ada gangguan atau tidak ada gangguan Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Apakah anda menggunakan masker pada saat bekerja	Tidak	40	9	49
	Ya	6	19	25
Total		46	28	74

UNIVERSITAS ISI AM NEGERI

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	23.377 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.991	1	.000		
Likelihood Ratio	23.871	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	23.061	1	.000		
N of Valid Cases	74				

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.46.
- b. Computed only for a 2x2 table

Apakah anda pernah menderita penyakit paru/pernapasan sebelumnya * Ada gangguan atau tidak ada gangguan
Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Apakah anda pernah menderita penyakit paru/pernapasan sebelumnya	Ya	7	1	8
	Tidak	39	27	66
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.448 ^a	1	.118		
Continuity Correction ^b	1.389	1	.239		
Likelihood Ratio	2.833	1	.092		
Fisher's Exact Test				.245	.117
Linear-by-Linear Association	2.415	1	.120		
N of Valid Cases	74				

- a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.03.
- b. Computed only for a 2x2 table

Apakah dalam 6 bulan terakhir anda pernah memeriksakan kesehatan * Ada gangguan atau tidak ada gangguan
Crosstabulation

Count

		Ada gangguan atau tidak ada gangguan		Total
		Ada gangguan	Tidak ada gangguan	
Apakah dalam 6 bulan terakhir anda pernah memeriksakan kesehatan	Ya	7	8	15
	Tidak	39	20	59
Total		46	28	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.921 ^a	1	.166		
Continuity Correction ^b	1.183	1	.277		
Likelihood Ratio	1.873	1	.171		
Fisher's Exact Test				.234	.139
Linear-by-Linear Association	1.895	1	.169		
N of Valid Cases	74				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.68.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 5

Keterangan Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.078/KEPK/FKIK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muh. Fajar Pahrir
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru (Restriktif dan Obstruktif)
pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021"**

*"The Relationship Of Individual Characteristics To Lung Function Disorders On Scaravengers In Tpas
Tamangapa Makassar 2021 2021"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022.

This declaration of ethics applies during the period June 01, 2021 until June 01, 2022.

June 01, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 6

Surat Keterangan Telah Meneliti



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MANGGALA
KELURAHAN TAMANGAPA
Jl. Tamangapa Raya No.262 A Tlp.(0411) 495556 Makassar



SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 /349/ TMP /VI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHL FAJAR PAHRIR**
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/UIN Alauddin Makassar
NIM : 70200117068/ Kesehatan Makassar
Alamat : Jl. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Kegiatan /Judul : " **HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP GANGGUAN FAAL PARU (RESTRIKTIF & OBSTRUKTIF) PADA PEMULUNG DI TPAS TAMANGAPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2021** "

Benar nama di atas telah melakukan penelitian di Wilayah Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, sejak Bulan Juni s/d Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 7

Uji Similarity

Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Gangguan Faal Paru pada Pemulung di TPAS Tamangapa Kota Makassar

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
2	www.scribd.com Internet Source	1 %
3	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1 %
4	jurnalrespirologi.org Internet Source	1 %
5	Valentina Valentina, Erlindai Erlindai. "PENGGUNAAN VIDEO EDUKASI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KULIT PADA PEMULUNG", Jurnal Kesehatan, 2021 Publication	1 %
6	123dok.com Internet Source	1 %
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
8	fkm.uho.ac.id Internet Source	



Lampiran 8

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Studi pendahuluan



Gambar 2. Proses wawancara



Gambar 3. Pengukuran Antropometri

M A K A S S A R



Gambar 4. Pengukuran spirometri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 9

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muh. Fajar Pahrir yang akrab disapa Fajar lahir di Palopo, 25 April 1999 dan merupakan anak ke-5 dari 7 bersaudara, cinta dari pasangan Ibunda Ramlah A.Pawelangi dan Ayahanda Pahrir Taherong. Penulis mengawali pendidikan sejak tahun 2006 di MI Datok Sulaiman Kota Palopo, melanjutkan studi jenjang menengah pertama di SMPN 8 Kota Palopo pada tahun 2011-2014, lalu jenjang menengah atas di SMAN 1 Kota Palopo tahun 2014-2017 hingga sampai saat ini telah menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Kesehatan Masyarakat konsentrasi Epidemiologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R