

**DETERMINASI KAPASITAS PENGINDUKSI POLIPLIOD  
BIO-CATHARANTHINE DENGAN ANALISIS FLOW  
CYTOMETRY PADA DENGGEN (*Dillenia serrata*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**ALIFAH ZUL AMNAH**  
**NIM. 60300116007**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Zul Amnah  
NIM : 60300116007  
Tempat/Tgl. Lahir : Malimpung, 02 Juli 1998  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Puri Pallangga Mas 2, Blok L/2  
Judul : Determinasi Kapasitas Penginduksi Poliploid Bio-catharanhtine dengan Analisis Flow Cytometry pada Dengen (*Dillenia serrata*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong-Gowa, 1 September 2021

Penyusun,




Alifah Zul Amnah  
NIM: 60300116007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **ALIFAH ZUL AMNAH**, NIM: 60300116007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul, “*DETERMINASI KAPASITAS PENGINDUKSI POLIPLOID BIO-CATHARANTHINE DENGAN ANALISIS FLOW CYTOMETRY PADA DENGGEN (Dillenia serrata)*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Romangpolong-Gowa, 30 Agustus 2021



Isna Kasdianah AZIZ, S.Si., M.Sc.  
Pembimbing II



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si  
Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Determinasi Kapasitas Penginduksi Poliploid Bio-Catharanthine dengan Analisis flow Cytometry pada Dungen (*Dillenia serrata*)", yang disusun oleh Alifah Zul Amnah, NIM: 60300116007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, pada tanggal 19 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Romangpolong,-Gowa, 30 Agustus 2021

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd


Sekretaris : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.

Munaqisy I : Ir. Rinaldi Sjahril, M.Agr., Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Cut Muthiadhin S.Si., M.Si.

Pembimbing II: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc.



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

NIP. 19740412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling berkesan bagi penulis selain memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan berkat dan karuniaNya, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran serta telah memberikan ketetapanNya terhadap penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Determinasi Kapasitas Penginduksi Poliploid dengan Analisis Flow Cytometry pada Tanaman Dengan (*Dillenia serrata*)**”. Shalawat besertasalam pada Nabi Muhammad saw. semoga senantiasa tercurahkan pada Baginda Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi satu dari beberapa syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa jika tidak ada partisipasi dan bantuan dari semua pihak yang terkait skripsi ini pasti tidak dapat diselesaikan seperti yang diharapkan oleh penulis. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak dan tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak SYAMSUL ALAM dan Mama MULIATI dserta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi doa dan segala bentuk perhatian kepada penulis selama ini. Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknlokogi.
3. Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi yang sangat membantu peneliti selama kuliah di Kampus ini.
4. Dr. Masriany, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddn Makassar.
5. Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddn Makassar.
6. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan begitu sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahan dan masukan kepada penulis sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


8. Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan begitu sabar dalam memberikan motivasi, bimbingan, arahan, serta semangat dan masukan kepada penulis sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ir. Rinaldi Sjahril, M.Agr., Ph.D., selaku Dosen Penguji pada bidang akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun kepada peneliti.
10. Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag. selaku Dosen Penguji dalam bidang keagamaan yang telah memberi begitu banyak saran serta masukan yang begitu bermanfaat untuk peneliti dan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak/ibu Dosen, yang telah banyak memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di kampus dan juga ucapan terima kasih kepada Sumiati, S.Pd.I selaku staf pada prodi Jurusan Biologi yang telah dengan ikhlas selalu membantu penulis.
12. Kepala Laboratorium serta seluruh laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UINAM yang telah banyak membantu dan memberikan arahan selama penulis kuliah di kampus ini.
13. Hajrah, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Mentoring Tahsin Qira'atul Qur'an yang dengan begitu sabar mengajari dan membimbing penulis dalam membaca Al-Qur'an yang lebih baik lagi.
14. Tim PLOIDI yang sangat luar biasa, Fanny dan Isna yang telah menemani penulis dan berjuang bersama-sama dari awal. Dengan berbagai macam drama-drama yang terjadi serta suka duka selama penelitian.
15. Rahma Biologi 2018, terimakasih banyak telah banyak membantu peneliti dalam pengadaan sampel.
16. Ani, Ade, Uci, Mawa dan Unnul terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuannya yang tidak akan pernah ternilai harganya.
17. Saudara-saudari seperjuanganku "IMMUNO6LOBULIN" angkatan yang akrab dipanggil IG angkatan 2016 Jurusan Biologi, terima kasih telah melukis beribu kisah dan kenangan yang sangat berharga kepada penulis. Saudara-saudari tak sedarah.
18. Ayyung dan Tiara, terima kasih untuk dukungan, semangat dan Do'anya untuk penulis.
19. Kak Kasman, Kak Alir dan Ibu Asti, terimakasih banyak yang telah membantu penulis selama penelitian.
20. Rahul Roy Ashar, terima kasih telah menemani, membantu dan selalu memerikan dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis penelitian dan mengerjakan skripsi.
21. Dan juga terima kasih kepada semua kalangan terkait yang tidak bisa penulis sebut satu persatu untuk do'a, kritik, dukungan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis sangat memahami bahwa isi dari skripsi ini sangat tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik

dan saran yang sangat membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca.


Romangpolong-Gowa, 1 September 2021

Penulis



Alifah Zul Amnah

NIM: 60300116007



## DAFTAR ISI


SAMPUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	16
A. Tinjauan Ayat yang Relevan.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Buah Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> ).....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kromosom Tumbuhan.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Poliploidi..Error! Bookmark not defined.	26
E. Tinjauan Umum Flow Cytometry.....	32
F. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
C. Variabel Penelitian.....	35

D. Definisi Operasional Variabel .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	36
1. Alat .....	36
2. Bahan .....	37
F. Prosedur Kerja .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1.</b> Analisis derajat ploidy pada tanaman Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> ) berdasarkan analisi flow cytometry .....	39
<b>Tabel 4.2.</b> Hasil derajat ploidy tanaman dengon ( <i>Dillenia serrata</i> ) .....	43




## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Buah dengan ( <i>Dillenia serrata</i> ) yang belum mekar .....	23
<b>Gambar 2.2</b> Buah dengan ( <i>Dillenia serrata</i> ) yang sudah mekar .....	23
<b>Gambar 4.1</b> Histogram Flow Cytometry Tanaman Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> ) (Konsentrasi Bio-Catharanthine Kontrol) .....	40
<b>Gambar 4.2</b> Histogram Flow Cytometry Tanaman Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> ) (Konsentrasi Bio-Catharanthine 0,5%) .....	41
<b>Gambar 4.3</b> Histogram Flow Cytometry Tanaman Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> ) (Konsentrasi Bio-Catharanthine 0,15%) .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I.</b> Penyemaian Tanaman.....	60
<b>Lampiran II.</b> Preparasi Kromosom.....	61
<b>Lampiran III.</b> Analisis Flow Cytometry.....	63



## ABSTRAK

**Name** : Alifah Zul Amnah  
**NIM** : 60300116007  
**Judul Skripsi** : **Determinasi Kapasitas Pengindukai Poliploid Bio-catharanthine dengan Analisis Flow Cytometry pada Dengen (*Dillenia serrata*)**

---

---

Induksi poliploidi adalah salah satu jenis mutasi buatan yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah set kromosom pada organisme. Penggandaan kromosom bisa dilakukan dengan penggunaan senyawa kimia tertentu, seperti kolkisin, bio-catharanthine dan orizalin. Bio-catharanthine adalah hasil dari ekstraksi daun tanaman tapak dara (*Catharantus roseus* [L]. G. Don.) yang dapat menyebabkan terjadinya penggandaan kromosom pada berbagai jenis tanaman tertentu karena mampu membuat aktifitas dari pembelahan sel (antimiotik) terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui induksi poliploidi tanaman Dengen (*Dillenia serrata*) dengan menggunakan bio-catharanthine dan untuk mengetahui karakteristik tanaman dengan (*Dillenia serrata*) yang telah diinduksi dengan metode analisis flow cytometry. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *squash* (Pemencetan) akar pada tanaman hasil induksi pada konsentrasi bio-catharanthine 0%, 0,05%, 0,1% dan 0,15% dengan waktu perendaman 3, 6, 12 dan 24 jam dan uji Analisis Flow Cytometry dengan menggunakan konsentrasi bio-catharanthine 0%, 0,05% dan 0,15% dengan waktu 24 jam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pada tanaman kontrol didapatkan hasil  $2n=2x$  (diploid), pada konsentrasi 0,05%  $2n= x + 2x$  dan pada konsentrasi 0,15%  $2n= x+2x$  dan hasil preparasi kromosom didapatkan hasil yang tidak jelas.

**Kata Kunci:** Bio-catharanthine, Dengen (*Dillenia serrata*), Flow cytometry, Poliploid.

## ABSTRACT

**Name** : Alifah Zul Amnah  
**NIM** : 60300116007  
**Judul Skripsi** : Determination of the polyploidy-inducing capacity of biocatharantin by flow cytometry analysis in dengen (*Dillenia serrata*)

---

---

Polyploidy induction is one of the type of artificial mutations that result in increased number of chromosome sets in organisms. Chromosomal doubling can be done with the use of certain chemical compounds, such as colchicine, bio-catharantine and orizalin. Bio-catharantine is the result of extracting the leaves of the madagascar periwinkle plant (*Catharantus roseus* [L]. G. Don.) which can cause doubling of chromosomes in certain types of plants because it is able to inhibit the activity of cell division (antimytotic). The purpose of this study was to determine the polyploidy induction of Dengen (*Dillenia serrata*) using bio-catharantine and to determine the characteristics of Dengen (*Dillenia serrata*) plants induced by flow cytometry analysis. The research method used is the squash method using concentrations of 0%, 0.05%, 0.1% and 0.15% bio-catharantine with immersion times of 3,6,12 and 24 hours and Flow cytometry analysis on concentrations of bio-catharantine 0%, 0.05% and 0.15% with a time of 24 hours. The results showed, the control plants obtained results of  $2n=2x$  (diploid), at a concentration of 0.05%  $2n= x + 2x$  and at a concentration of 0.15%  $2n= x+2x$  and the results of chromosomal preparation obtained showed unclear results.

**Keywords:** Bio-catharantine, Dengen (*Dillenia serrata*), Flow cytometry, Polyploidy.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini baik itu manusia tumbuhan maupun hewan. Penciptaan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari kekuasaanNya dan KeagunganNya. Seperti halnya Allah swt. menciptakan beraneka ragam jenis tumbuhan. Dari keanekaragaman itulah Allah swt. menunjukkan kebesarannya melalui perbedaan baik dari segi morfologi, anatomi maupun fisiologi dari tumbuhan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah swt dalam QS Thaha/ 20: 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّى (٥٣)

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama RI, 2015)

Menurut tafsir al-Misbah diatas menjelaskan bahwa Dialah Allah yang telah memberikan rahmat serta nikmat pemeliharaan dan nikmat kehidupan kepada seluruh hamba-Nya. Dan dengan kekuasaan yang dimiliki-Nya Dia menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan Dia pula yang telah membukakan bagimu jalan yang kamu lewati serta Dia menurunkan air dari langit (hujan) ke bumi lalu dengan air itu terbentuklah sungai yang banyak dan luas, lalu kemudian dengan air itu Allah swt. Tumbuhkan beranekaragam dan berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam

baik dari segi manfaat, warna serta rasa yang dimiliki. Serta memiliki warna yang berbeda ada yang bewarna hitam serta berwarna putih dan ada yang memiliki rasa pahit dan manis (Shihab, 2010).

Berdasarkan ayat serta tafsir di atas yang telah menjelaskan bahwasanya Allah swt. telah mengatur semua yang terjadi di bumi ini dan menciptakan segala sesuatunya baik itu manusia, hewan serta tumbuhan dan yang lainnya. Diantara segala ciptaan-Nya salah satu yang paling unik yaitu tumbuhan karena Allah swt. menciptakan tumbuhan dengan segala macam bentuk serta memiliki jenis yang beragam dan manfaat yang berbeda. Diantara tumbuh-tumbuhan tersebut terdapat buah yang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh buah tersebut adalah buah Dengan (*Dillenia serrata*).

Negara Indonesia adalah salah satu Negara dengan iklim tropis yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan merupakan salah satu Negara dari tujuh Negara megabiodiveristy dengan urutan kedua setelah Negara Brazil karena kekayaan hayatinya. Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak dikembangkan ilmu yang menggunakan tumbuhan untuk obat (Febriana dan Ersam,2016)

Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah swt dalam QS asy- Syu'araa'/ 26: 7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. (٧)

Terjemahannya:

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut tafsir Ibnu-Katsir diatas menjelaskan bahwa “Tidaklah mereka pandangi kepada bumi, berapa banyaknya Kami tumbuhkan padanya tumbuhan aneka warna dari pengawinan yang indah?"Alangkah kasar jiwa kalau manusia hanya tahu memakan hasil bumi saja, tetapi tidak mau tahu betapa asal tumbuh makanan itu? Semuanya terjadi “min kulli zaujin karimin”, dari perkawinan atau perkelaminan jantan dan betina. Orang Arab menanam korma. Korma yang subur adalah oculasi korma tampang yang jantan dengan korma tampang betina, Kadang-kadang buah-buahan sebagai mangga dan rambutan, atau buah-buahan yang lain yang mulanya berbunga, beribu-ribu bunga mekar muncul dari celah dahan: separuh rontok ke bumi dan separuh menjadi buah. Diciptakan Tuhan berbagai makhluk untuk mempertemukan si jantan dengan si betina kembang itu. karena dia tidak dapat ziarah-menziarahi. Kumbang, rama-rama, lebah dan bahkan angin, mempertemukan zat kejantanan dengan zat kebetinaan. Setelah bertemu gugurlah satu kembang ke bumi, atau separuh kembang ke bumi, dan yang tinggal melanjutkan hidup buat mengarangkan buah. Itulah pengawinan atau perkawinan yang indah dengan pengetahuan yang dangkal kita telah tahu bahwa lahirnya manusia ke dunia ialah karena pertemuan kelamin laki-laki dengan perempuan. Dengan pengetahuan yang dangkal pula kita telah tahu bahwa berkembangnya binatang ternak kita karena pertemuan si jantan dengan si betina. Tetapi kalau kita telah berilmu lebih maju, akan tahulah kita bahwa buah korma, buah mempelam dan mangga dan beratus jenis buah-buahan yang lain adalah tercipta dalam rangka pertemuan “zaujin karimin”, pertemuan jantan dan betina yang indah dan mulia.dan pengetahuan ini kelak akan

dapat lebih tinggi lagi, bahwasanya seluruh Alam Raya ini, terkandunglah sesuatu kekuatan besar, gabungan tenaga dan benda. Kekuatan besar itulah Elektrisita. Barulah kekuatan itu menjadi kenyataan bila bertemu negatif dengan positif, betina dengan jantan, yang menerima dengan yang memberi. Kekuatan itulah yang menimbulkan atom. Dan atom itulah soal dari segala kejadian dan itu semua diatur dengan satu peraturan oleh Pengatur Tunggal. Baik kejadian kamu, ataupun kebangkitan kamu kelak adalah laksana nafas yang satu saja."Oleh sebab itu apabila manusia sudi, janganlah hanya laksana burung merak mengigal melihat indahnyanya bulu diri, lalu timbul kesombongan. Manusia sekali-kali harus melepaskan perhatiannya dan perhatiannya dari semata-mata diri, dan terus renung keadaan yang berada di sekelilingnya. Apalah artinya tubuh insan yang kecil ini di hadapan tenaga-tenaga dan peraturan yang ada di kelilingnya? Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwasanya hidup di dunia bukanlah semata-mata untuk sandang untuk pangan, tetapi yang terutama sekali ialah berfikir, merenung dan meninjau" (Al-Imam, 2002).

Tanaman Dengan (*Dillenia serrrata*) merupakan salah satu tanaman lokal yang berasal dari Sulawesi Selatan. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan yaitu buah, dimana memiliki ciri khusus yaitu buahnya berbentuk seperti mahkota yang berwarna kuning, buahnya setengah mirip dengan daun telinga bila dibelah, dulunya masyarakat setempat menggunakan buah dengan (*Dillenia serrrata*) ini untuk memberi rasa asam dimakanan mereka. Namun, seiring perkembangan waktu buah ini ini telah diteliti dan hasil penelitian menunjukkan bahwa buah dengan (*Dillenia serrrata*) mengandung vitamin C lebih dari 84%, jadi sekarang untuk

mengkonsumsinya masyarakat mengolahnya menjadi jus (Illing dkk., 2017) (Ilma, 2012).

Tanaman dengan adalah tanaman berhabitus pohon yang memiliki ukuran sedang dengan keanekaragaman spesies yang tinggi terutama di daerah tropis yang penyalurannya dari Madgaskar ke Australia dan tanaman dengan ini adalah salah satu komponen yang ada dalam vegetasi hutan tropis di dataran rendah. Buah Jongi (Dengen) memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi yaitu sekitar 84% (Hasniarti, 2012; Illing dkk., 2017) (Irnawati, dkk., 2017) menambahkan bahwa buah jongi (Dengen) juga memiliki kandungan betakaroten, vitamin C dan senyawa asam sitrat. Buah dengan ini juga memiliki kandungan senyawa metabolik sekunder yaitu senyawa triterpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol (Gandhi and Mehta, 2013; Bandara, et. al., 2015; Illing, dkk., 2017).

Menurut Illing, dkk., (2017) Irnawati, dkk., (2017) tanaman Dengan (*Dillenia serrata*) memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dimana berperan sebagai antioksidan yang kuat yang dapat melindungi sel-sel dari agen-agen penyebab kanker juga dapat meningkatkan daya serap atas kalsium (Hasanah, 2018), selain itu juga ekstrak etanol buah Dengan (*Dillenia serrata*) mengandung senyawa flavonoid yang memiliki manfaat sebagai anti oksidan, anti kanker dan anti mikroba (Dewi, dkk., 2018). Alkaloid yang memiliki manfaat dalam bidang kesehatan yaitu untuk melawan infeksi mikrobial, memacu sistem saraf, menurunkan atau menaikkan tekanan darah (Widi dan Indriani 2006). Beberapa senyawa polifenol mempunyai aktivitas anti hipertensi dan saponin berfungsi sebagai anti virus dan anti bakteri

(Fiana dan Oktaria 2016). Selain itu secara empiris tanaman ini dimanfaatkan masyarakat sebagai obat sariawan, muntah darah, demam dan obat luka.

Tanaman dengan (*Dillenia serrata*) memiliki buah yang belum banyak dibudidayakan karena tanaman ini merupakan jenis tanaman yang tumbuh liar di alam dan masyarakat belum memanfaatkannya dengan maksimal, karena rasa dari buah dengan ini sangat masam masyarakat lokal pun masih jarang yang ingin menikmatinya buah dengan ini. Selain itu buah dengan (*Dillenia serrata*) juga merupakan buah yang cepat busuk dan hal itu dapat menyebabkan kandungan gizi pada buah berkurang dan akan mempengaruhi harga jual pada buah, maka dari itu perlu dilakukan induksi poliploid untuk memperbaiki genetik tanaman (Natalius, 2012).

Perbaikan dan peningkatan keragaman genetik tanaman dengan (*Dillenia serrata*) dengan dilakukan induksi poliploid. Tanaman poliploid adalah jenis tanaman yang set kromosom dalam sel-sel nya terdiri dari tiga atau lebih set kromosom. Tanaman poliploid memiliki sifat umum yaitu tanaman menjadi lebih kekar, bagian tanaman lebih besar meliputi akar, batang, daun, bunga dan buah (Escandón, et. al., 2006). Salah satu contoh, kentang tetraploid dan gandum heksaploid berukuran lebih besar daripada leluhurnya yang diploid (Alam, et. al., 2011; (Sissons and Hare, 2002). Induksi poliploid dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman, karena hasil panen menjadi lebih tinggi (Alam, et. al., 2017).

Poliploid merupakan salah satu metode penggandaan jumlah kromosom agar dapat menghasilkan organisme yang memiliki set kromosom yang berlipat ganda.

Induksi poliploidi menggunakan bio-chataranhtine adalah salah satu cara yang digunakan dalam perbaikan genetik tanaman, penggunaan bio-chataranhtine dalam penelitian masih sangat jarang digunakan. Hal ini terjadi karena jenis penginduksi ini terbilang baru. Selain itu bio-chataranhtine termasuk relatif murah serta bahan penginduksinya termasuk ramah lingkungan, karena diekstrak langsung dari tanaman tapak dara (*Cathrantus roseus*).

Perendaman biji dalam larutan penginduksi seperti oryzalin, kolkisin dan bio-catharanthine pada saat proses perkecambahan diharapkan agar larutan penginduksi dapat terserap dan tersebar dengan baik pada saat fase pembelahan sel semakin besar. Tetapi berdasarkan hasil penelitian (Handayani, dkk., 2017) didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa perkecambahan dari jambu biji menjadi terhambat dan memerlukan waktu lebih lama, serta pertumbuhan pada tunas tanaman jambu biji menjadi terhambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu perkecambahan tanaman jambu biji menjadi lebih lama dan terjadi penghambatan pertumbuhan tunas.

Proses penghambatan dan perkecambahan serta pertumbuhan dari tanaman dengan perlakuan larutan penginduksi dalam hal ini oryzalin terjadi karena adanya gangguan selama proses pembelahan sel pada tanaman. Penambahan larutan penginduksi seperti oryzalin dapat menyebabkan terhambatnya proses pembelahan sel dan proses pemanjangan sel, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada bagian morfologi organel sel seperti badan golgi dan retikulum endoplasma, selain itu proses perkembangan pada sel menjadi abnormal, terjadi kerusakan pada sel

maupun jaringan sehingga membutuhkan waktu lama agar tumbuhan dapat tumbuh normal (Langhans, et. al., 2009). Sehingga semakin tinggi konsentrasi larutan penginduksi oryzalin yang digunakan, semakin banyak juga sel yang dapat terpapar dan mengalami kegagalan dalam proses pembelahan sel serta mengalami kerusakan pada selnya (Handayani, dkk., 2017).

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya tanaman buah dengan (*Dillenia serrata*) memiliki kandungan vitamin C yang tinggi serta memiliki manfaat lain, buah dengan (*Dillenia serrata*) juga merupakan tanaman lokal dari Sulawesi selatan yang keberadaannya saat ini sangat jarang ditemukan dan dijual dipasaran karena selain rasanya yang tidak disukai banyak orang buah ini juga mudah busuk jika sudah matang maka perlu dilakukan induksi poliploidi pada tanaman untuk memperluas keragaman genetik tanaman dengan cara penggandaan kromosom dan potensinya untuk mendapatkan tanaman poliploid.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah dengan (*Dillenia serrata*) dapat diinduksi dengan bio-catharanthine?
- 2 Bagaimana karakteristik kromosom tanaman (*Dillenia serrata*) yang diinduksi bio-catharanthine dengan analisis flow cytometry?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan biji dan akar tanaman dari tanaman dengan (*Dillenia serrata*) yang diperoleh langsung dari Dusun Mario Baru, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Benih diuji vitabilitasnya dengan merendamnya dalam air dan hanya biji yang tenggelam yang digunakan.

2. Pada penelitian kali ini digunakan bio-catharantine untuk induksi poliploidi, penggunaan biocatharantin dipilih karena harganya relatif murah dan penggunaannya masih jarang serta penggunaannya lebih aman.

3. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Juli 2021, di Laboratorium Biosains dan Bioteknologi Reproduksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dan laboratorium Genetika dan Biologi Molekuler, Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### **D. Kajian Pustaka**

1. Sastriyani, dkk., (2011) Pemberian Kolkisin dengan Lama Perendaman Berbeda Pada Induksi Poliploid Tanaman Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.). Pada penelitian dengan menggunakan lama waktu perendaman menggunakan kecambah tanaman pacar air (*Impatiens balsamina* L.) dengan konsentrasi kolkisin yang digunakan yaitu 0.01%, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pada waktu perendaman berapakah kolkisin dapat menginduksi kecambah tanaman pacar air.

Adapun waktu perendaman yang digunakan adalah 24 jam, 12 jam, 6 jam dan 4 jam. Pada pengamatan jumlah kromosom menggunakan metode *squashing* (pemnecetan) ujung akar dengan menggunakan jenis pewarna yaitu aceto orcein. Untuk pengamatan pada bagian morfologi dilakukan dengan mengamati berbagai parameter diantaranya waktu pembungaan, diameter bunga, lebar daun, panjang daun, tinggi tanaman lingkaran dan batang. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu pada konsentrasi kolkisin 0,01% dapat menggandakan kromosom pada pacar air. Sedangkan pada pengamatan bagian morfologi didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa tanaman yang diberi perlakuan kolkisin memiliki batang dan daun yang jauh lebih besar dibandingkan kontrol. Selain itu pada pembungaan didapatkan waktu lebih cepat dibandingkan kontrol. Adapun jumlah kromosom pada tanaman tetraploid  $2n=2x+4x$  dan tanaman  $2n=2x=12$ .

2. Aristya (2014) dengan judul (Optimalisasi Induksi Poliploid pada Tanaman Stroberi (*Fragaria* spp. “Festival” dan “California”). Stroberi jenis (*Fragaria* spp.) adalah salah satu jenis tanaman dari familia *Rosaceae* yang sudah banyak dikembangkan dan dibudidayakan di berbagai negara didunia salah satunya Indonesia. Adapun beberapa jenis stroberi yang sudah dikenal luas dan telah banyak berkembang di masyarakat dan sudah menjadi salah satu buah yang sering dikonsumsi masyarakat. Poliploid merupakan organisme yang memiliki set kromosom lebih dari dua pasang, tanaman poliploid pada umumnya memiliki jumlah set kromosom lebih banyak dibandingkan dengan tanaman diploid sehingga itulah yang menyebabkan tanaman dengan set kromosom lebih dari dua kelihatan lebih besar

dan lebih kekar. Poliploidi juga dapat dilakukan dengan cara buatan cara ini bias dilakukan dengan cara meniru peristiwa ploidi yang terjadi di alam ataupun dapat dilakukan dengan cara mutagen. Adapun beberapa sifat dari tanaman poliploid diantaranya. Sifat umum dari tanaman poliploidi seperti buah, bunga, daun batang, dan akar menjadi lebih besar dan tanaman lebih kekar, sehingga seluruh sifat yang kurang baik dari tanaman akan terlihat baik tanpa merubah hasilnya. Kolkisin adalah satu larutan yang digunakan dalam induksi poliploidi yang dapat menyebabkan mutasi gen sehingga menyebabkan terjadinya ploidi. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menentukan bagaimana kondisi yang optimal untuk menginduksi tanaman stroberi kultivar Festival dan California yang dapat digunakan dalam perbaikan genetic dan mutu tanaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *squashing* dengan percobaan factorial dengan beberapa konsentrasi variasi kolkisi yaitu 1%, 0,1%, 0,05% dan 0,01% dan kontrol. Dengan menggunakan waktu lama perendaman yang digunakan yaitu 36, 24, 12, 6 dan 3 jam. Didapatkan hasil bahwa pada kultivar kultivar California pada konsentrasi 1% dengan waktu perendaman selama 36 jam dengan jumlah kromosom  $2n = 7n = 42$ . Selain itu untuk Festival pada konsentrasi 0,05% dengan waktu perendaman selama 36 jam yaitu jumlah kromosom  $2n = 8n = 56$  kromosom.

3. Friska dan Daryono, (2017) Derajat Ploidi Jahe Merah (*Zingiber officinale* Roxb.var.*rubrum* Rosc.) hasil induksi dengan Kolkisin. Jahe merah adalah salah satu jenis tanaman dari familia temu-temuan yang sering digunakan dalam campuran pembuatan obat tradisional serta digunakan dalam pembuatan bumbu masakan,

minuman penyegar, manisan serta biasanya digunakan dalam bahan komoditan ekspor non migas. Rimpang tanaman jahe bermanfaat dalam bidang kesehatan serta kebugaran untuk tubuh dan sering dijadikan campuran dalam bahan masakan. Tanaman jahe memiliki rasa yang cukup pedas karena pada tanaman ini mengandung senyawa yang disebut keton "Gingerol". Pada penelitian ini memiliki tujuan agar didapatkan jenis tanaman poliploid pada tanaman jahe merah dengan mengamati bagian fenotip seperti rimpang, daun dan batang dengan menggunakan induksi kolkisin. Penelitian ini kali ini digunakan metode eksperimental dengan RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan menggunakan pola faktorial dan menggunakan dua faktor dimana menggunakan konsentrasi kolkisin (0,2%, 0,1% dan 0,05%) dengan lama waktu perendaman (24, 12 dan jam). Pengamatan derajat ploidi digunakan teknik flow cytometry untuk melihat perubahan derajat ploidi serta perubahan set kromosom. Hasil pada pengamatan ini selanjutnya dianalisis menggunakan ANOVA (*Analysis of Variance*) serta pengolahan data dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji F dimana taraf  $\alpha=5\%$ . Jika pada saat pengolahan data menunjukkan perbedaan nyata maka dilanjutkan untuk uji DMRT (*Duncan Multiple Range Test*). Hasil pada penelitian ini menunjukkan jika derajat ploidi jahe merah dengan menggunakan induksi kolkisin pada lama waktu perendaman 12 jam dengan konsentrasi 0,05% (perlakuan KW12) terjadi peningkatan derajat ploidi dari  $2n$  (diploid) menjadi mixoploid ( $2x+4x$ ).

4. Ermayanti, dkk., (2018) Induksi Poliploidi pada Tanaman Talas (*Colocasia esculenta* (L.) Schott) Kultivar Kaliurang dengan Perlakuan Kolkisin secara *In Vitro*.

Untuk perbaikan pada genetik tanaman serta untuk meningkatkan karakter unggul dan meningkatkan produktivitas dari tanaman talas Kaliurang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan induksi poliploid. Talas jenis Kaliurang diploid memiliki keunggulan seperti tahan terhadap hama dan penyakit hawar. Diharapkan jenis tanaman poliploid dapat menambah sifat unggul dari tanaman talas kaliurang seperti dapat meningkatkan produktivitas dari talas. Tujuan dari penelitian ini ialah dapat diperoleh metode untuk induksi poliploid yang paling baik serta efisien untuk talas Kaliurang dengan menggunakan kolkisin secara *in vitro*. Planlet dari jenis talas Kaliurang aseptik direndam menggunakan larutan penginduksi jenis kolkisin dengan konsentrasi 0,2% 0,1% dan 0,05% dengan lama waktu perendaman 3 hari, 2 hari dan 1 satu hari. Untuk perlakuan kontrol tunas dari tanaman talas tidak direndam menggunakan larutan kolkisin. Setiap perlakuan digunakan 12 tunas sebagai ulangan. Setelah direndam, tunas kemudian ditanam menggunakan media MS dengan menambahkan 2mg/L adenin, 2 mg/L BAP dan 1mg/L tiamin. Untuk presentasi jumlah tanaman yang tumbuh serta pertumbuhan pada tunas diamati 8 minggu sekali serta untuk pengamatan tingkat ploidi tanaman menggunakan analisis flow cytometry yaitu tunas yang berumur 9 minggu setelah tanam (MST). Untuk hasil penelitian. Untuk hasil penelitian didapatkan hasil dari lama waktu perendaman dan variasi jumlah konsentrasi presentasi tunas yang hidup bervariasi. Hasil analisis flow cytometry dengan lama waktu perendaman selama 1 hari dengan konsentrasi kolkisin 0,05% dapat menginduksi tunas tetraploid sebesar 14,3%. Untuk hasil yang efisien yaitu pada waktu perendaman 3 hari dengan

konsentrasi 0,2% didapatkan hasil 57,1% tunas tetraploid dengan nilai efisiensi induksi tetraploid sebesar 33.3%. Analisa flow cytometry didapatkan hasil penggandaan kromosom dari diploid menjadi tetraploid dengan perhitungan jumlah kromosom.

5. Rahmi, dkk., (2019) Induksi Poliploidi Tanaman Kangkung (*Ipomoea aquatica* Forssk.) Kultivar Salina *In Vitro* dengan Oryzalin. Tanaman kangkung merupakan jenis sayuran yang sangat digemari hampir seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Morfologi dari tanaman kangkung yang memiliki ukuran yang kecil sehingga diperlukan perbaikan agar memiliki ukuran yang lebih besar agar produktivitasnya meningkat. Adapun salah satu upaya yang baik dilakukan yaitu dengan melakukan induksi poliploidi. Pada penelitian ini dijelaskan teknik induksi tetraploid pada kangkung secara *in vitro*. Buku tunas *in vitro* kecambah *in vitro* dan pucuk tunas *in vitro* yang direndam menggunakan media MS dan larutan kolkisin dengan konsentrasi 5, 3,75, 1,25, 2,  $\mu\text{M}$  dan 0 dengan variasi lama waktu perendaman 24, 8 dan 4 jam. Pada variasi konsentrasi 5  $\mu\text{M}$  dengan lama waktu perendaman 24 jam banyak tunas yang tidak tumbuh sampai subkultur ke-3. Untuk pertumbuhan tunas pada waktu perendaman 8 jam dan perlakuan konsentrasi oryzalin 1,5  $\mu\text{M}$  dan untuk lama waktu perendaman 4 jam dengan konsentrasi perendaman 2,50  $\mu\text{M}$  dari inokulum kecambah, perlakuan 4 jam konsentrasi oryzalin 3,75  $\mu\text{M}$  dari inokulum pucuk tunas dan perlakuan lama perendaman 4 jam dan konsentrasi oryzalin 1,25  $\mu\text{M}$  dari inokulum buku tunas kemudian dibandingkan dengan perlakuan oryzalin. Untuk analisis *flow cytometry* dilakukan pada 41 sampel tunas dan daun hasil

perlakuan oryzalin didapatkan hasil 48,78% diploid, 14,3% tetraploid dan 36,59% mixoploid. Efisiensi induksi tetraploid mencapai 60%, diperoleh pada kombinasi lama waktu preinduksi 8 jam dan perlakuan konsentrasi oryzalin 1,25  $\mu$ M dari inokulum kecambah. Untuk tunas tetraploid sebaiknya diperbanyak, dibibitkan dan diaklimatisasi serta untuk diuji agronomi agar dapat dilakukan pembuktian produktivitas untuk tanaman kangkung tetraploid.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil induksi poliploid tanaman dengan (*Dillenia serrata*) dengan menggunakan bio-catharanthine.
2. Untuk mengetahui karakteristik kromosom dari dengan (*Dillenia serrata*) yang diinduksi dengan analisis flow cytometry

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi tentang jumlah konsentrasi biocatharantin (%) yang baik digunakan dalam penginduksian poliploid pada buah dengan (*Dillenia serrata*) dengan analisis flow cytometry
2. Untuk perbaikan genetik dan untuk meningkatkan produktivitas dan karakter unggul dari buah dengan (*Dillenia serrata*)

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Ayat yang Relevan

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/ 2: 22 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (٢٢)

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui (Kementerian Agama, 2015).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah tersebut menjelaskan bahwa Sesungguhnya hanya Dialah yang mempersiapkan bumi dengan kekuasaan-Nya, membentangkan permukaannya agar mudah untuk ditempati dan didayagunakan. Dia menjadikan langit, benda-benda dan planetnya seperti bangunan yang kokoh. Dia juga memberikan kepada kalian sumber kehidupan dan segala nikmat, yaitu air. Dia menurunkan air dari langit dan menjadikannya sebagai sebab tumbuhnya tanaman dan pepohonan yang berbuah yang dapat kalian ambil manfaatnya. Dengan demikian, tidaklah benar kalian berpandangan bahwa Allah memiliki sekutu yang kalian sembah seperti menyembah Allah, sebab tiada sekutu bagi-Nya. Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya. Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut (Shihab, 2010).

Para ahli genetika berpendapat, bahwa pada asal makhluk hidup ada kehidupan. Setiap yang tumbuh, dari jenis biji maupun benih, mempunyai kehidupan yang tersimpan. Sebab, kalau saja ia dimandulkan dengan buatan, tetu ia tidak akan tumbuh. Ia tidak menjadikan makhluk hidup, kecuali tubuh yang tumbuh dan makan dengan sendirinya. Martabat kehidupan ini, menurut mereka paling rendah. Lebih tinggi dari martabat ini adalah makhluk yang mempunyai indra, kemampuan, kehendak, ilmu, akal, kebijaksanaan dan aturan. Martabat kehidupan paling tinggi adalah kehidupan Al-Khaliq sumber segala kehidupan, kebijaksanaan dan aturan di dalam alam ini.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-an'am/ 6: 95 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآتَىٰ تَوْفَكُونَ (٩٥)﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, Maka mengapa kamu masih berpaling (Kementerian Agama, 2015).

Berdasarkan Tafsir Al-Maraghi tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menumbuhkan apa yang kalian tanam, berupa benih tanaman yang dituai dan biji buah, juga membelah dengan menghubungkan sebab dan musabab, seperti menjadikan benih dan biji di dalam tanah, serta menyirami tanah dengan air. Ayat ini menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan, kehalusan buatan dan keindahan kebijaksanaan Allah. Dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbatang atau yang berbatang, sedang ia maakn dan tumbuh, dari yang mati, yakni tidak makan dan

tidak tumbuh seperti tanah, biji, benih dan lain-lain dari jenis biji-bijian dan mengeluarkan hewan dari telur dan mani. Dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti mengeluarkan biji dan benih dari tumbuh-tumbuhan, telur dan nutfah dari hewan. Az-Zajjaj mengatakan, Dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang hijau segar dari biji yang kering dan mengeluarkan yang kering dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tumbuh. Menurut Ibnu Abbas, dia mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir seperti Ibrahim dari Azar dan orang kafir dari orang mukmin seperti putra Nuh. Dr. At-Taqi Abdul Aziz Ismail Pasya mengatakan, ia seperti menjadikan nutfah dari hewan. Akan tetapi, nutfah adalah hewan-hewan yang hidup. Penafsiran ini sesuai dengan ayat yang mulia ini. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah sebagaimana yang tampak sekarang. Bahwa yang hidup itu, tumbuh dengan memakan benda-benda yang mati. Yang kecil, umpamanya tubuhnya menjadi besar karena minum susu atau lainnya, sedangkan makanan adalah sesuatu yang mati. Tidak diragukan lagi, bahwa kemampuan mengubah untuk mengubah sesuatu yang mati yang dimakan menjadi unsur dan materi dari bagian tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi tumbuh, merupakan ciri terpenting yang membedakan tubuh yang hidup dengan tubuh yang mati. Para ahli kehewan telah menulis, bahwa kambing umpamanya memakan tumbuh – tumbuhan dan mengubahnya menjadi dagingnya. Ini merupakan ciri terpenting yang menunjukkan bahwa ia hidup. Demikian pula anak kecil, minum susu yang mati dan mengubahnya menjadi tubuh yang hidup. Adapun mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ialah benda-benda yang dikeluarkan oleh tubuh seperti susu, “Jika anda mau, termasuk juga daging hewan

dan tumbuh-tumbuhan. Susu yang mengalir tidak mengandung sesuatu yang hidup. Berbeda dengan nutfah di dalamnya terkandung hewan-hewan yang hidup dan ia keluar dari hewan yang hidup. Demikianlah, yang hidup tumbuh dari yang mati dan yang mati keluar dari yang hidup. Allah swt. lebih tahu akan maksudnya”. Itulah Tuhan yang berifat dengan kekuasaan dan kebijaksanaan yang sempurna oleh Allah swt. yang menciptakan segala sesuatu dan hanya dia yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian mengapa kalian bisa dipalingkan dari ibadah kepada-Nya, lalu kalian mempersekutukan-Nya dengan yang tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun untuk melakukan semua itu, seperti menumbuhkan biji dan benih serta menjadikan pohon kurma dan tangkai gandum (Al-Maragi, 1992).

Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut Allah swt. telah menciptakan bumi dan menjadikannya hamparan dan langit sebagai atap dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit, lalu menumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan yang bermanfaat untuk kita. Salah satu buah-buahan yang diciptakan oleh-Nya yaitu buah dengan (*Dillenia serrata*) yang menjadi salah satu buah yang Sulawesi selatan tepatnya di daerah Luwu Timur yang keberadaanya masih jarang diketahui.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Buah Dengan (*Dillenia serrata*)**

Salah satu tumbuhan dari famili Dilleniaceae yang masih jarang diketahui manfaat dan potensinya secara ilmiah yaitu *Dillenia serrata* Thunbr. atau yang biasa disebut dengan buah dengan. Dengan adalah salah satu buah endemik dari Sulawesi Selatan. Buah dengan (*Dillenia serrata*) tersebar luas di Kabupaten Luwu.

Tumbuhan dengan ini biasanya tumbuh liar di hutan dan pekarangan masyarakat. Ciri khas yang dimiliki dari buah dengan (*Dillenia serrata*) ini adalah cita rasa asam yang menyegarkan dan memiliki warna buah yang menarik. Selain itu, kulit kayu dari buah dengan biasanya digunakan dalam pengobatan tradisional seperti obat muntah darah sedangkan buahnya hanya untuk dimakan (Reny dan Nur, 2015).

Tanaman dari genus *Dillenia* juga dikenal dalam bahasi Indonesia dengan nama simpur atau di Malaysia dikenal dengan nama simpoh. Genus dari tanaman ini terdiri dari 60 species diseluruh dunia dan hanya terdapat 5 species yang tersebar di Sulawesi (Kader dan Zeinab, 2015). Dari 5 jenis species yang tersebar di Sulawesi 4 diantaranya termasuk dalam buah endemic diantaranya yaitu, *Dillenia serrata*, *Dillenia ochreatea*, *Dillenia talaudensis* dan *Dillenia celebica* (Mead, 2014). Menurut, Kader dan Zeinab (2015) tanaman jenis *Dillenia* memiliki nilai medis yang baik serta banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat.

Tanaman dengan memiliki kemampuan menyimpan karbon yang relative tinggi dalam tingkat 20 tahun yaitu lebih dari 30 Kg C/ tanaman, selain itu tanaman ini juga dapat direkomendasikan sebagai salah satu tanaman yang dapat digunakan dalam program reboisasi hutan dan penanaman (Rindyastuti, 2017).

Buah dengan (*Dillenia serrata*) merupakan buah yang tumbuh banyak di wilayah Luwu. Ukuran dan bentuk serta rasa buah dengan (*Dillenia serrata*) mirip dengan buah jeruk. Jika buah ini sudah matang, maka kulit dari buah akan membuka dengansendirinya layaknya kelopak bunga. Meskipun buah ini sudah matang, buah

dengen (*Dillenia serrata*) tetap saja memiliki rasa yang masam jika dikonsumsi secara langsung (Illing, dkk., 2017).

Tumbuhan ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh dan hidup vertahun-tahun. Habitat dari pohon buah (*Dillenia serrata*) ini biasanya di Hutan. Buah dengan merupakan nama untuk daerah Sulawesi selatan, sedangkan untuk nama ilmiah dari buah ini yaitu buah simpur. Buah dengan (*Dillenia serrata*) ini memiliki kandungan asam sitrat yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan rasanya menjadi masam. Secara kimia, jika buah ini dihancurkan serta dicampur dengan air, maka asam tersebut akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asamnya bermuatan negative (Hasniarti, 2012).

Tanaman buah dengan (*Dillenia serrata*) dapat tumbuh tinggi hingga mencapai 30 meter dengan diameter batang dapat mencapai 70 cm. Daun tunggal, lonjong sampai lanset, panjang 20 – 45 cm dan lebar 8 - 19 cm, tangkai daun bersayap, berdaun kelopak 5. Perbungaan tandan dengan 2 - 6 bunga, tanpa daun mahkota, garis tengah bunga sekitar 7,5 cm. menyerupai buah jeruk, tidak pecah, bulat agak gepeng, bergaris tengah sekitar 6 cm, daun buah (karpela) tertutup oleh daun-daun kelopak. Karpel masak berukuran 25 mm x 16 mm, berbiji sampai lima. Biji hitam, tanpa arilus. Jenis pohon ini berkerabat dekat dengan Rerer (*Dillenia celebica*) (Illing, dkk., 2017).

Buah dengan (*Dillenia serrata*) ini belum bisa ditanam dan belum dapat dibudidayakan secara resmi karena keberadaannya yang tumbuh di alam liar dan belum banyak digunakan oleh masyarakat, karena memiliki rasa yang begitu masam

sehingga membuat masyarakat lokal pun jarang ada yang mau menikmati buah dengan (*Dillenia serrata*) tersebut. Pemanfaatan dari buah dengan (*Dillenia serrata*) juga belum optimal karena tidak semua masyarakat mampu menikmatinya hanya beberapa masyarakat lokal saja yang mampu menikmati. Hal ini dikarenakan buah ini cepat membusuk (Natalius, 2012).

Adapun klasifikasi buah dengan adalah sebagai berikut:

Regnum : Plantae  
Divisio : Tracheophyta  
Classis : Magnoliopsida  
Ordo : Dilleniales  
Familia : Dilleniaceae  
Genus : *Dillenia* .  
Species : *Dillenia serrata*(Illing, dkk., 2017).



**Gambar 2.1** Buah Dengen yang belum mekar (Pelima, 2019).



**Gambar 2.2** Buah Dengen yang sudah mekar (Dokumrntasi pribadi, 2021).

### ***C. Tinjauan Umum tentang Kromosom Tumbuhan***

Kromosom merupakan sekumpulan benang-benang yang terdapat pada inti sel yang memiliki fungsi sebagai pembawa DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang merupakan pembawa sifat bawaan dan berisi tentang sebagian besar informasi untuk aktivitas regulasi sel (Francis, 2007). Kromosom sendiri baru akan terlihat lebih jelas pada saat sel sedang aktif membelah (Zamariola, et. al., 2014). Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda (Chung, et. al., 2012; Draghia, et. al., 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Chromosome Count Database (CCB), jumlah set kromosom pada tanaman *Dillenia serrata* yang memiliki kekerabatan dekat (filogeni) dengan tipe set kromosom pada tanaman *Dillenia indica* yaitu  $n = 28$  dan  $2n = 56$  (diploid).

Kromosom sendiri dapat terlihat jika dapat berikatan dengan pewarna tertentu selama siklus pembelahan mitosis. Pada saat fase metafase bentuk dan jumlah kromosom dapat dilihat dengan jelas. Kromosom tersebut akan diturunkan atau diwariskan tanpa adanya modifikasi, baik dalam jumlah maupun bentuk yang diindikasikan dengan  $2n$  (Sumner, 1983).

Semua makhluk hidup eukariotik memiliki jumlah kromosom tertentu dalam setiap inti sel dan di dalam setiap kromosom terdapat satu molekul DNA linier yang sangat panjang yang mewakili ribuan gen, unit yang menentukan sifat yang diwarisi oleh induknya. Setiap kromosom terduplikasi terdiri atas dua kromatid saudara yang mengandung salinan molekul DNA yang identik. Kromosom memiliki 'pinggang'

yang ramping pada daerah khusus yang disebut dengan sentromer. Pertelaan lengkap semua pasangan kromatid yang dimiliki oleh suatu sel disebut dengan kariotipe. Kariotipe biasanya dipersiapkan dengan pemotongan masing-masing pasangan kromatid dan mengaturnya dalam deretan menurut ukurannya (Joko, 2008).

Menurut Suryo (1995) pengamatan kromosom bisa dilakukan pada saat sel membelah. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembelahan meiosis dan mitosis. Pembelahan mitosis sendiri terdiri dari beberapa fase pembelahan, diantaranya yaitu fase Interfase, di fase inti sel tampak keruh, mulai tampak benang-benang kromatin yang halus dan sel belum memperlihatkan kegiatan membelah. Profase, pada fase ini ciri-ciri yang ditunjukkan yaitu benang-benang kromatin akan semakin pendek dan melakukan penebalan sehingga dapat terbentuk kromosom. Setiap kromosom akan membelah, memanjang dan anakan kromosom disebut kromatid. Dinding sel mulai menghilang dan sentriol membelah. Fase Metafase, pada fase ini dapat ditandai dengan kromosom akan berada tepat ditengah sel. Fase Anafase, pada fase ini dapat ditandai dengan sentriol yang membelah dan kedua kromatid akan memisahkan diri dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Fase Telofase, pada fase ini setiap kutub sel terbentuk stel kromosom yang identik. Serabut gelendong inti lenyap dan dinding inti terbentuk lagi. Kemudian plasma sel terbagi menjadi dua bagian yang disebut sitokinese. Sitokinese pada tumbuhan ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah ditengah-tengah sel.

Berdasarkan fase pembelahan, kromosom hanya dapat dilihat dengan jelas pada tahap metafase yaitu fase dimana kromosom berada di bagian tengah sel atau

prometafase (metafase awal) karena pada prometafase ukuran kromosom jauh lebih panjang dan struktur kromosom tampak lebih jelas dibanding pada metafase. Pada fase ini mudah untuk menghitung banyaknya kromosom dan mempelajari Kromatid, Sentromer, Lengan pendek, Lengan panjang dan morfologinya, karena kromosom-kromosom telah menebal dan menempatkan diri pada bidang tengah (Suryo, 1995).

#### ***D. Tinjauan Umum tentang Poliploidi***

Poliploidisasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan tanaman poliploid yang digunakan dalam berbagai tujuan tertentu diantaranya untuk pemuliaan tanaman dan perbaikan genetik tanaman seperti meningkatkan produktivitas tanaman, meningkatkan kualitas buah, dan kualitas bunga pada tanaman hias. Induksi tanaman poliploid bisa dilakukan dengan cara pengaplikasian bahan kimia yang biasa dikenal sebagai antimitotik atau senyawa mutagen, sehingga dapat mempengaruhi pembelahan sel yang mengakibatkan penggandaan jumlah kromosom. Senyawa kimia yang biasanya atau paling umum digunakan yaitu kolkisin dan orizalin. Kolkisin sendiri telah banyak digunakan dan berhasil pengaplikasiannya pada berbagai jenis tanaman untuk mendapatkan hasil tanaman poliploid seperti pada tanaman *Artemisia annua*, *Gladiolus* spp., Nambangan, pisang, kapas, jeruk pamelon dan talas kultivar redbud dan Kaliurang (Ermayanti, dkk., 2019).

Ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil dari produksi tanaman, serta meningkatkan biomassa tanaman dapat dilakukan dengan induksi poliploidi. Tanaman poliploid dapat dilakukan

dengan berbagai cara diantaranya dengan pemberian senyawa kimia tertentu yang dapat menyebabkan aktifitas sel terhambat (antimitosis)(Widoretno, 2016), menunjukkan bahwa tanaman poliploid seperti tetraploid yang diinduksi memiliki kelebihan berupa morfologi tanaman yang ukurannya lebih besar ukurannya dibandingkan dengan tanaman normal yang diploid (2n). (Liu, et. al., 2011) menemukan keunggulan lainnya dari tanaman tetraploid yaitu memiliki ketahanan terhadap cekaman lingkungan tertentu. Jati tetraploid hasil induksi in vitro lebih tahan kering dibanding yang diploid (Rahmi, dkk., 2019).

Tanaman poliploid dapat dihasilkan melalui induksi dengan senyawa kimia yang dapat menghambat pembentukan gelendong dalam mitosis seperti kolkisin, oryzalin atau trifluralin pada biak tunas pada kultur jaringan. Pada penggandaan kromosom tanaman dapat dilakukan dengan induksi kimia menggunakan senyawa anti mitosis seperti kolkisin. Pengaplikasian kolkisin secara in vivo dapat dilakukan dengan cara merendam bibit, biji, akar tanaman atau kecambah; maupun dengan penetasan kolkisin pada pucuk kecambah atau bibit (Rahmi, dkk., 2019).

Menurut (Chen et. al., 2006), kolkisin dapat menyebabkan efek samping pada tanaman yang diberi perlakuan. Efek tersebut berupa morfologi abnormal selama proses mutagenesis seperti daun yang menebal, tanaman lebih pendek dari pada tanaman kontrol, warna daun lebih hijau, ukuran bunga lebih besar dari pada tanaman kontrol, bentuk daun berbeda dengan tanaman kontrol, batang lebih tebal dari pada control permukaan dan daun lebih kasar.

Tanaman poliploid merupakan tanaman yang set kromosomnya lebih dari satu pasang (diploid). Poliploidi itu sendiri dapat terjadi secara alami maupun secara buatan yaitu dengan diinduksikan dengan bahan kimia antimitotik, antara lain dengan trifularin, orizalin, kolkisin, bio-chataranhtine dan amiprofos metil. Kolkisin ( $C_{22}H_{25}O_6N$ ) adalah suatu alkaloid yang diisolasi dari tumbuhan *Colchicum autumnale* dan mampu menginduksi poliploidisasi tidak hanya pada sel tumbuhan melainkan juga pada sel hewan. Zat ini paling banyak digunakan karena mudah larut dalam air dan efektif menginduksi poliploid (Ermayanti, dkk., 2018).

Induksi poliploidi pada tanaman menggunakan senyawa kolkisin telah banyak dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mendapatkan sumber tetua varietas unggul dan meningkatkan kualitas buah seperti pada melon Simadu (Zhang, et. al., 2010) dan jeruk Siam Simadu (Yulianti, dkk., 2015). Selain itu juga untuk meningkatkan produktivitas seperti pada tanaman garut (Sukamto, dkk., 2015) dan cabai (Syaifudin, dkk., 2013). Induksi poliploidi juga dilakukan pada tanaman hias untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bunga, seperti pada mawar (Sarasan, et. al., 2001) dan pacar air (Sastriyani, dkk., 2011).

Kolkhisin biasanya diberikan pada bagian tanaman yang sedang melakukan pembelahan yakni pada titik tumbuh vegetative misalnya pada benih, kecambah dan ujung batang tanaman. Kolkhisin menghambat tahap metafase, mencegah polimerisasi tubulin menjadi mikrotubulin, mencegah tubulin tersebut menjadi serat benang fungsional (benang gelendong) sehingga tahap anaphase untuk pemisahan kromosom tidak terjadi. Tanpa adanya benang gelendong tersebut, dinding pemisah

gagal terbentuk sehingga kromosom dan duplikatnya tetap berada di dalam sel yang sama. Akibatnya pembelahan sel tidak berlangsung, sehingga pembelahannya dimulai dengan sel diploid diakhiri dengan terbentuknya sel tetraploid ( Sastriyani, dkk., 2011).

Poliploidi terdiri dari dua jenis yakni, jenis yang pertama adalah autopoliploidi yang berarti penggandaan kromosom terjadi karena penggabungan dari jenis genom yang sama. Jenis ploidi yang dapat dihasilkan yakni aneuploidi (Kromosom abnormal) seperti dalam bentuk pentaploid, triploid dan tetra ploid. Jenis yang kedua yaitu alopoliploidi yang merupakan penggabungan dari jenis genom-genom yang tidak sama. Jenis ploidi ini banyak dilakukan pada dua kelompok jenis tanaman yang berbeda dan digabungkan, dan hasil dari kedua jenis tanaman yang digabungkan yaitu organisme alopoliploidi dengan jumlah kromosom  $2x + 2y$  (Kadi, 2007).

Autopoliploid merupakan jenis sel yang memiliki genom lebih dari dua, dimana memiliki set kromosom homolog dan genomnya identik, karena pada dasarnya hanya berasal dari satu jenis. Autopoliploidi terjadi karena penggandaan kromosom yang komplemen secara langsung. Selain itu autopoliploidi dapat terjadi karena induksi poliploidi menggunakan kolkisin dan dapat secara alami, tetapi secara alami masih sangat jarang ditemukan. Menurut Vandepoele, et. al., (2003) autopolyploid biasanya berasal dari persilangan intraspecies yang disertai dengan tergandakannya kromosom, dimana gamet tidak mengalami reduksi dan kromosomnya membentuk multivalent pada saat pembelahan mpembelahan miosis,

dengan pewarisan yang multisomik. Adapun beberapa jenis tanaman yang tergolong dalam autoploid alami yakni kacang tanah, ubi jalar, kentang, orchardgrass dan alfalfa (Kadi, 2007).

Adapun beberapa ciri-ciri autoploid yang berbeda dengan diploid yakni, terjadi penambahan pada ukuran bunga dan daun serta batang terlihat lebih tebal, ukuran volume dari sel yang lebih besar serta nucleus yang besar, laju pertumbuhan pada tumbuhan autoploid lebih lambat dibanding diploid, yang menyebabkan pembungaannya juga terlanjut, terjadi perubahan dari komposisi kimia yang meliputi perubahan dan peningkatan protein, karbohidrat alkaloid dan vitamin, poliploid tidak seimbang terutama pada pentaploid dan triploid, pembelahan meiosis tidak teratur dengan terbentuknya multivalent sebagai penyebab sterilitas (Sparrow and Nauman, 1976), juga menyatakan jika autoploid berperan dalam peningkatan ukuran sel meristematis namun jumlah dari sel tetap (Kadi, 2007).

Allopolyploid merupakan keadaan dimana sel memiliki dua atau lebih genom dari genom normal  $2n=2x$ , dimana set kromosomnya tidak sama. Allopolyploid terbentuk dari hibridasi antar spesies atau genus yang berbeda genom. Tanaman F1 nya akan mandul karena tidak memiliki atau hanya terdapat beberapa kromosom yang sama. Jika terjadi penggandaan kromosom alami atau yang diinduksi, maka tanaman menjadi fertile. Adapun beberapa jenis tanaman yang termasuk allopolyploid alami yakni terigu, gandum, tembakau, tebu, kapas dan kubis (Kadi, 2007).

Haploid merupakan keadaan suatu organisme dimana tidak memiliki pasangan kromosom karena hanya memiliki genom tunggal. Jenis kromosom yang

haploid dapat digandakan dan dapat menghasilkan individu yang memiliki homozigot yang baru. Sel haploid dapat ditemukan pada gamet yang dapat menghasilkan sifat diploid dimana jika sel gamet jantan membuahi sel gamet betina maka akan melebur dan akan berkembang menjadi zigot yang memiliki sifat diploid. Kromosom diploid yaitu keadaan dimana kondisinya berbanding terbalik dengan kromosom haploid dimana pada kromosom diploidi terdiri dari dua set kromosom ( $2n$ ). Keadaan kromosom diploid seringkali dijumpai pada organisme multiseluler. Adapun contoh dari organisme diploid yaitu jenis tanaman paku yang memiliki kromosom somatic sekitar 58 (Wulansari dan Wijaya, 2015).

Bio-catharanthine merupakan produk yang dapat digunakan dalam menggandakan kromosom dan merupakan salah satu produk yang di ekstrak dari tanaman tapak dara (*Catharanthus roseus*) yang ditemukan oleh Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Tapak dara (*Catharanthus roseus*) memiliki kandungan senyawa vinblastine, vindoline, vincristine, dan chataranthine (Liu, et. al., 2014; Karimi and Raofie, 2019 ) yang dapat digunakan untuk agen antimiosis yang dapat menggandakan kromosom (Moudi, et. al., 2013 ; Dall'Acqua, 2014; Alam, et. al.,2017). Adapun beberapa pengaplikasiannya dapat menghasilkan tanaman poliploid dengan ukuran buah, bunga, daun, batang dan akar yang lebih kuat dan besar, dan dapat menghasilkan jumlah produksi yang lebih tinggi, serta lebih tahan dari kekeringan dan pathogen (Aziz, et. al., 2021).

Tanaman mixolpoid adalah jenis tanaman yang didalam selnya terdapat dua set kromosom yang berbeda atau jenis tanaman yang didalam jaringannya

mengandung dua tingkat ploidy yaitu diploid serta tetraploid (Omidbaigi, et.al., 2010). Mixoploid dapat terbentuk disebabkan karena pada saat proses induksi oryzalin tidak sepenuhnya mencapai semua sel-sel yang masih aktif membelah (Carvalho and Otoni, 2005).

#### ***E. Tinjauan Umum Flow cytometri***


Flow cytometry merupakan teknik yang menggunakan perangkat penahanan optik-elektronik yang dapat menganalisis karakteristik fisik dan kimia partikel mikroskopis dalam suspensi dalam media cair. Flow cytometer, berbeda dari mikroskop itu menghasilkan gambar partikel, menghitung seperangkat parameter dari partikel dalam suspense. Balok cahaya dengan panjang gelombang tunggal diarahkan ke arah aliran kontinu partikel tersuspensi yang ditandai dengan noda kimia fluoresen. Setiap partikel yang berada dalam suspensi yang melewati berkas cahaya ini menyebarkan cahaya dalam bentuk yang berbeda dan akan ditangkap oleh sensor online dengan sinar cahaya dan tegak lurus terhadapnya (Waller, et. al., 2001).

Partikel-partikel mikroskopis ini terkonjugasi dengan zat-zat fluoresen yang, saat bersemangat, pancarkan frekuensi yang lebih rendah dari sumber cahaya. Dipancarkan cahaya ditangkap oleh detektor dan dianalisis kemudian sesuai dengan fluktuasi kecerahan setiap detektor atau emisi fluoresensi (Loken, 1997). Itu hasilnya adalah pembentukan gambar waktu nyata dari setiap sel fluoresensi, dispersi dan transmisi cahaya (Telford, 2015).

Komponen utama dari flow cytometer berupa ruang aliran, sumber cahaya, Sebuah detektor dan konverter analogikal digital yang dapat menghasilkan parameter ukuran neon, kompleksitas dan sinyal, sistem amplifikasi sinyal linier atau logaritmik; dan komputer untuk analisis sinyal (Kurec, 2014).

Flow cytometry umumnya digunakan dalam diagnosis infeksi dan neoplasikpenyakit, fenotip seluler, studi siklus seluler, konten normal atau abnormal DNA, analisis kromosom, transplantasi organ, studi imunodefisiensi, hewan dan fisiologi dan farmakologi vegetal (Curtis, 2011).

Deteksi tingkat ploidi yang paling praktis yaitu dilakukan dengan menggunakan alat flositometer. Alat ini pada mulanya digunakan untuk analisis sel darah, kemudian berkembang untuk analisis organel-organel sel seperti nukleus, mitokondria bahkan kromosom. Di bidang botani alat ini sering digunakan untuk mengukur kandungan DNA sehingga merepresentasikan tingkat ploidi sel tanaman. Berbagai aplikasi teknologi flow cytometri telah dilaporkan antara lain untuk deteksi tingkat ploidi tanaman, dan untuk penelitian yang lebih detail seperti analisis komposisi berbagai komponen senyawa kimia pada jaringan tanaman, komponen dinding sel tanaman hingga seleksi untuk pemetaan genom secara fisik, distribusi inti sel pada saat mitosis dan lain-lain (Ochatt, 2008).

**F. Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pada penelitian ini digunakan variasi jumlah konsentrasi (0%; 0,05%; dan 0,15% ) dan dengan lama waktu perendaman 24jam untuk mengetahui determinasi kapasitas penginduksi poliploid bio-catharanthine dengan analisis flow cytometry pada buah dengan (*Dillenia serrata*) dan preparasi kromosom konsentrasi (0%, 0,05%, 0,1% dan 0,15%) dengan waktu perendaman 3, 6, 12 dan 24 jam.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Juli 2021 dan adapun lokasi pengambilan sampel buah dengan (*Dillenia serrata*) yaitu di Dusun Mario Baru, Desa Mario, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan lokasi untuk melakukan penelitian yaitu di Laboratorium Bio-Sains dan Bioteknologi Reproduksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Makassar dan Laboratorium Genetika dan Biologi Molekuler, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Adapun variabel dari penelitian ini yaitu digunakan variable tunggal dimana kapasitas penginduksi poliploid biocatharantin dengan analisis flow cytometry.

#### ***D. Definisi Operasional Variabel***

1. Induksi poliploidi merupakan salah satu metode untuk memperluas keragaman genetik. Pada penelitian kali ini menggunakan biocatharntin sebagai penginduksi, perkecambahan tanaman menggunakan media tissue basah, pembuatan preparat menggunakan metode squash.

2. Konsentrasi bio catharantin (0%; 0,05%; dan 0,15% ) dan waktu perendaman 24jam untuk mengetahui determinasi kapasitas penginduksi poliploid biocatharantin dengan analisis flow cytometry pada buah dengan (*Dillenia serrata*) dan preparasi kromosom konsentrasi (0%, 0,05%, 0,1% dan 0,15%) dengan waktu perendaman 3, 6, 12 dan 24 jam.

3. Analisis jumlah kromosom menggunakan metode Flow cytometry yang dimana merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis set kromosom pada sampel tanaman Dengan yang sudah di induksi dengan biochatarantin. Sel dilabel fluoresen, dilewatkan celah sempit, dan ditembak sinar.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

##### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu set alat flow cytometry, timbangan analitik, erlenmeyer, gelas ukur, gelas beaker, pipet tetes, pipet hisap, oven, mikroskop, lemari es, kaca preparat, kuas halus, pinset, cawan petri, botol flakon, tisu, kertas label, silet, mikropipet, botol gelap, botol selai, batang

pengaduk, pembakar spirtus, handphone, deck glass, *pot tray*, talang agar-agar, alat penyemprot dan *rockwool*

## 2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, biji buah dengan (*Dillenia serrata*), larutan bio catharantin, air, water one, asam asetat glacial, asam klorida (HCl), aseto orcein, gliserin, aquadest, glove, masker, Nucleic extraction buffer, Staining buffer, kuteks, media tanam kompos, tanah dan sekam (1:1:1), *cocopeat* dan plastik

## F. Prosedur Kerja

### 1. Proses Perkecambahan dan Teknik Poliplodisasi dengan Biocatharantin

Biji buah degen (*Dillenia serrata*) yang telah dibersihkan kemudian direndam dalam air selama 6 jam untuk proses imbibisi dan dikecambahkan dengan tissue basah di dalam cawan petri. Kecambah yang telah tumbuh dengan ukuran  $\pm 1$  cm di rendam dalam larutan biocatharantin dengan konsentrasi 0%; 0,05%; 0,1%; dan 0,15% dengan lama perendaman 3, 6, 12, dan 24 (sebagai uji pendahuluan) (Sastriyani, dkk., 2011).

Pembuatan Preparat menggunakan Metode Squash dilakukan dengan cara yaitu ujung akar yang sudah diberi perlakuan bio catharantin, dipotong 3-5 mm pada waktu jam pembelahan mitosis tumbuhan ( 08.00–10.00 ) setiap tanaman memiliki waktu pembelahan yang berbeda-beda, dimasukkan dalam botol falcon menggunakan kuas, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit asam asetat glacial 45% sampai

akar terendam dan difiksasi dalam lemari es bersuhu 5°C selama 15 menit kemudian pipet dan buang asam fiksasil, lalu dicuci dengan akuades tiga kali. Selanjutnya ditambhkn HCl sedikit demi sedikit kemudian maserasi 3 menit dalam oven bersuhu 55°C, tergantung besarnya ujung akar dan hingga akar transparan, lalu dicuci dengan akuades tiga kali. Selanjutnya ditambahkan aceto orcein 3 tetes pada akar dan tunggu selama 10 menit. Diambil ujung akar dengan kuas diletakkan di atas gelas benda dan dipotong hingga tersisa 1-2 mm lap sisa aceto orcein menggunakan tissue lalu ditetesi gliserin, ditutup dengan gelas penutup, kemudian pinggir *deckglass* diberi kuteks dan *di-squash* (pemencetan) (Aristya dan Riza, 2014).

## 2. Pengamatan tingkat Ploidi tanaman

Sampel daun segar dari tanaman dengan perlakuan biocatharantin dan control dengan waktu perendamaan 24 jam diambil sekitar 0,5 cm<sup>2</sup> dimasukkan ke dalam cawan petri. Kemudian ditambahkan 100 mikroliter ekstraktion buffer, kemudian daun dari tanaman tersebut dicacah menggunakan silet yang tajam selama 30 detik (untuk satu silet hanya dapat digunakan untuk 5-10 sampel). Setelah itu inkubasi sampel selama 5 menit (termasuk uji terbaik untuk setiap jenis spesies). Setelah sampel di inkubasi saring ekstraktion buffer, dan kemudian tambahkan 1600 mikroliter buffer pewarnaan kedalam tube, kemudian inkubasi sampel selama 30 sampai 60 detik diruang gelap, setelah itu sampel dimasukkan ke dalam alat flow cytometry, kemudian hasil akan muncul dilayar dalam bentuk histogram.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian


Pengamatan kromosom pada tanaman dengan (*Dillenia serrata*) dilakukan dengan analisis Histogram derajat ploidi menggunakan flow cytometry tanaman dengan diiundiksi dengan konsentrasi 0,05%, 0,15% dan control menggunakan aquadest, adapun lama perendaman yang diujikan yaitu selama 24 jam. Berikut adalah hasil pengamatan derajat ploidi tanaman dengan (*Dillenia serrata*) :

**Tabel 4.1** Analisis derajat ploidi pada tanaman Dengan (*Dillenia serrata*) berdasarkan analisis Flow Cytometry


No	Sampel	Jumlah Sel	Rata-rata x	CV-x%	Kategori
1.	Kontrol Daun tanaman Dengan ( <i>Dillenia serrata</i> )	1930	187,15	10,7	$2n = 2x$ (Diploid)
2.	0,5% Daun tanaman Dengan ( <i>Dillenia serrata</i> )	3532	158,82	15,82	$2n = x + 2x$ (Mixoploid)
3.	0,15% Daun tanaman Dengan ( <i>Dillenia serrata</i> )	759 3961	124,85 172,19	4,38 12,18	$2n = x + 2x$ (Mixoploid)



**Gambar 4.1** Histogram flow cytometri tanaman dengan (*Dillenia serrata*) (Kontrol)



**Gambar 4.2** Histogram flow cytometry tanaman dengan (*Dillenia serrata*) (konsentrasi biocatharantin 0,05%)



**Gambar 4.3** Histogram flow cytometry tanaman dengan (*Dillenia serrata*) (konsentrasi biocatharantin 0,15%)

**Tabel 4.2** Hasil derajat ploidi tanaman dengan (*Dillenia serrata*)

No	Tanaman	Konsentrasi	Derajat Ploidi
1	Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> )	Kontrol	$2n = 2x$ (Diploid)
2	Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> )	0,05 %	$2n = x + 2x$ (Mixoploid)
3	Dengen ( <i>Dillenia serrata</i> )	0,15 %	$2n = x + 2x$ (Mixoploid)

### B. Pembahasan

Poliploidisasi atau Induksi poliploidi adalah salah satu dari jenis mutasi buatan yang mengakibatkan terjadinya penambahan dalam jumlah set kromosom pada organisme. Penggandaan kromosom bisa dilakukan dengan penggunaan senyawa kimia tertentu, seperti kolkisin dan orizalin (Kerdsuwan and Te-chato, 2012).

Penggandaan kromosom dapat dilakukan dengan mutasi yang dapat menghasilkan peristiwa poliploidi. Poliploidi dapat dilakukan dengan menggunakan kolkisin yang berfungsi untuk antimitosis. Umumnya jumlah kromosom yang dimiliki tumbuhan yaitu diploid, tetapi ada beberapa tanaman yang memiliki jumlah kromosom tetraploid, triploid dan haploid. Adapun perubahan jumlah set kromosom ini sering disebut poliploidi. Induksi poliploidi berperan penting untuk menghasilkan keragaman pada fenotip dan genetik dari tanaman, selain itu juga berpengaruh pada evolusi tanaman (Dewi dan Pharmawati, 2018).

Metode poliploidisasi ini telah banyak digunakan pada beragam jenis tanaman dengan beberapa tujuan tertentu diantaranya dapat digunakan sebagai tetua yang dapat menghasilkan jenis tanaman triploid tanpa biji dan untuk meningkatkan kualitas dari buah misalnya buah melon (Zhang, et. al., 2010), pisang (Kanchanapoom and Koarapatchaikul, 2012), jeruk pamelon (Grosser, et. al., 2010), semangka (Noh, et. al., 2012) dan jeruk mandarin (Aleza, et. al., 2009).

Adapun manfaat lain dari poliploidisasi yaitu agar dapat meningkatkan jumlah dari biomassa dan fitokimia dari tanaman-tanaman obat diantaranya *Centella asiatica* (L.) Urban (Kaensaksiri, et. al., 2011) dan *Artemisia annua* (Banyai, et. al., 2010). Poliploidisasi juga banyak digunakan pada jenis tanaman hias yang untuk membuat ukuran dari tanaman lebih besar serta membuat warna dari bunga seperti pada anggrek (Miguel and Leonhardt, 2011) dan mawar (Kermani, et.al., 2003). Selain itu induksi poliploid juga digunakan pada jenis tanaman pangan, adapun beberapa manfaat dan tujuan dari induksi poliploid yaitu agar dapat meningkatkan hasil dari produksi panen karena poliploid (tetraploid atau triploid) diketahui dapat menghasilkan bunga, umbi dan ukuran buah yang lebih besar dari tanaman diploidnya (Suryo, 2007).

Bio-chataranhtine adalah hasil dari ekstraksi daun tanaman tapak dara (*Catharanthus roseus* [L]. G. Don.) yang dapat menyebabkan terjadinya penggadandaan kromosom pada berbagai jenis tanaman tertentu karena mampu membuat aktifitas dari pembelahan sel (antimiotik) terhambat. Adapun jenis senyawa yang terdapat pada tanaman tapak dara (*Catharantus roseus* [L]. G. Don.)

yaitu vinblastin dan vinkristin telah diteliti dan terbukti dapat menggandakan kromosom. Penggunaan bio-chataranhtine dalam penelitian ini digunakan karena penggunaannya masih jarang digunakan, selain itu juga penggunaannya aman karena terbuat dari ekstrak tanaman tapak dara (*Catharantus roseus*), bio-chataranhtine juga digunakan karena harganya yang relatif murah, hal ini sejalan dengan (Dooghe, et. al., 2011) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan orizalin yang digunakan dalam induksi poliploidi pada tanaman talas bantul (*Colacasia esculenta*) yang berfungsi sebagai senyawa antimiotik dapat menjadi pilihan lain selain menggunakan kolkisin yang memiliki sifat yang lebih toksik dan memiliki bahaya untuk kesehatan manusia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses penyemaian dan perekecambahan, dimana biji awaalnya direndam di air dan disemai pada media tanam setelah akar tanaman muncul, akar tanaman direndam dengan larutan bio-catharanthine sebagai larutan penginduksi setelah itu dilakukan analisis flow cytometry, didapatkan hasil mixoploid pada kedua sampel yang digunakan. Perendaman menggunakan larutan bio-catharanthine pada saat proses perkecambahan diharapkan agar larutan penginduksi akan lebih banyak terserap dan tersebar pada jaringan yang sedang aktif membelah.

Dalam penelitian induksi poliploidi ini adapun jenis pengimduksi poliploidi yang digunakan yaitu bio-chataranhtine dengan konsentarsi 0,05% dan 0,15% dengan menggunakan aquadest sebagai kontrol dan digunakan perendaman 24 jam.

Tanaman dengan (*Dillenia serrata*) merupakan jenis tanaman dari familia Dilleniaceae yang masih jarang diketahui manfaat dan potensinya secara ilmiah.

Dengen (*Dillenia serrata*) merupakan salah satu buah endemik dari Sulawesi Selatan, buah ini tersebar luas di Kabupaten Luwu, tumbuhan ini juga tumbuh liar di hutan dan pekarangan masyarakat. Tanaman dengan berkembang biak dengan menggunakan biji (*semen*) hal ini bisa membantu dalam hal bidang molekuler dan salah satunya berupa penggandaan ploidi, fungsi dari penggandaan ploidi adalah untuk meningkatkan mutu dari tanaman tersebut baik untuk ketahanan fisik maupun struktur morfologi. Induksi poliploidi sering dilakukan pada tanaman-tanaman bertipe herba dimana tanaman ini merupakan jenis tanaman yang sering digunakan masyarakat diantaranya kangkung, bayam dan pacar air. Metode induksi poliploidi yang paling sering digunakan adalah jenis induksi kolkisin dan oryzalin, sedangkan untuk tipe bio-chataranhtine jarang digunakan karena tergolong induksi yang baru, bio-chataranhtine diproduksi dari jenis tanaman tapak dara (*Catharantus roseus*) yang diharapkan mampu menggandakan ploidi pada tanaman.

Analisis ploidi pada tanaman dengan (*Dillenia serrata*) menggunakan larutan bio-catharanthine yang berfungsi sebagai antimiotic dan cairan penginduksi, *nucleic ekstraktion buffer* berfungsi untuk menjaga agar struktur pada DNA tetap terjaga selama proses pemurnian dan proses lisis. Serta *staining buffer* berfungsi untuk mewarnai sel dan asam nukleat, *staining buffer* ini memiliki emisi maksimum 461 nm.

Analisis ploidi pada tanaman dengan dilakukan menggunakan alat flow cytometry tipe PARTEC CyFlow Space, yang dihubungkan dengan satu set PC (Personal Computer). Analisis flow cytometry merupakan suatu analisis pendeteksi

yang melibatkan pendaran cahaya dalam menganalisa materi. Ada dua tipe berkas pendaran yang membaca materi yang diujikan yaitu FSC (Forward Scatter) yaitu jenis pendaran yang berasal dari depan untuk menganalisa keseluruhan sel bagian eksternal sedangkan jenis lain adalah SSC (Side Scatter) yaitu jenis pendaran yang melewati materi dari samping, fungsinya untuk menganalisa bagian dalam (internal) materi yang terlewat seperti sel darah putih yang bergranulosit. Hasil pendaran akan dibaca pada layar computer dalam bentuk histogram yang menunjukkan banyaknya materi serta kualitas dari materi tersebut meliputi, mean x (rata-rata kandungan DNA), coefficient of variation (CV-x%) yang menandakan tingkat keragaman (standar defiasi) validasi mendekati nilai rata-rata. Analisis dilakukan dengan mengamati channel yaitu daerah relative pada bagian mean x yang terdapat peak. Sedangkan peak merupakan nilai relative tertinggi yang menunjukkan derajat ploidi yang dituju.

Adapun hasil analisis flowcytometri pada tanaman dengan (*Dillenia serrata*) menunjukkan hasil yang dipaparkan dalam model histogram seperti 4.1, 4.2 dan 4.3. histogram di atas menggabungkan pola kromosom/DNA yang berpendar dari hasil flowcytometry dengan peak untuk kontrol berada pada nilai 200 dan termasuk dalam tipe diploid ( $2n = 2x$ ) hasil untuk tanaman dengan yang diinduksi dengan bio-chataranhtine 0,05% memiliki rentang peak relative diangka 200 dan memperlihatkan data antara yaitu mixoploid ( $2n = x + 2x$ ), untuk hasil induksi bioctahrantin 0,15% didapatkan hasil serupa dengan konsentrasi 0,05 % dimana peak berada dinilai 200 dan termasuk mixoploid ( $2n = x + 2x$ ) hasil ini menunjukkan bahwa induksi bio-chataranhtine memiliki pengaruh dalam hal perubahan ploidi pada

tanaman dengan (*Dillenia serrata*) walaupun tanpa peningkatan derajat ploidi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lotfi, et. al., 2003) yang menunjukkan hasil tanaman yang telah di induksi mengalami perubahan menjadi mixoploid yaitu ploid mixoploid yang mengandung sel haploid dan diploid. Menurut (Yuyu, 2014) pada pisang mas lumut mixoploid terlihat anakan yang tumbuh lebih sedikit, tangkai dari daun lebih mudah patah dan daun yang tumbuh merunduk, diameter serta tinggi batang semu lebih besar buah lebih besar dan lebar dibandingkan dengan tanaman diploid. Hal tersebut terjadi dikarenakan senyawa oryzalin dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada benang spindle pada tahap metaphase pada pembelahan mitosis, sehingga sel yang seharusnya membelah dua tidak mengalami pembelahan, akibatnya ukuran sel menjadi besar dan kromosom menjadi ganda (Van Duren, et. al., 1996). Menurut (Poerba, dkk., 2017) tanaman mixoploid menunjukkan bahwa pada saat penginduksian tidak semua sel di dalam jaringan meristematik tumbuhan yang terpapar oleh zat penginduksi mengalami peningkatan pada jumlah kromosomnya. Kimera (mixoploid) dapat dihilangkan dengan terus- menerus melakukan subkultur hingga didapatkan hasil tanaman yang solid atau tanaman mutan yang utuh. Konsentrasi induksi ploidi pada tanaman selama penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap perbedaan dari beberapa konsentrasi dan hasil ploidi yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan Muarifin dan Daryono (2015), yang menyatakan bahwa penggunaan bio-chataranhtine pada induksi poliploidi dapat menginduksi tanaman kacang tanah pada konsentrasi 0,1%-0,15% dengan lama perendaman 24 jam. Hal ini terlihat pada karakter fenotip kacang

tanah dimana hasil poliploidisasi menunjukkan hasil yang berbeda dari tanaman kontrol kacang tanah. Adapun hasil tingkat ploidi menggunakan flow cytometry menunjukkan induksi poliploidi biocatharantin dengan menggunakan konsentrasi 0,1% dapat menggandakan kromosom menjadi tetraploid ( $2n=4x$ ). Pada sampel kontrol didapatkan jumlah sel 1930, dengan rata-rata (mean x) 187,15 dan nilai CV-x% 10,7. Pada sampel 0,05% didapatkan jumlah sel 3532 dengan rata-rata (mean x) 158,82 dan nilai CV-x% 15,82 serta pada sampel 0,15% didapatkan jumlah sel pada peak 1 759 dan peak 2 3961 dengan rata-rata (mean x) pada peak 1 124,85 dan peak 2 172,19 dan nilai CV-x% pada peak 1 4,38 dan pada peak 2 12,18. Analisis ploidy pada tanaman dengan didapatkan nilai mean x dan CV-x% berbeda baik dari kontrol, induksi 0,5% dan Induksi 0,15%. Nilai mean x atau rata-rata kandungan DNA merupakan nilai penting untuk melihat peak yang dituju semakin tinggi mean x maka semakin akurat data derajat ploidi yang dihasilkan, ketika nilai mean x mengalami peningkatan maka derajat ploidi ikut mengalami peningkatan. Sedangkan coefition of variation (CV-x%) yang menyatakan tingkat keragaman materi yang terbaca pada hasil histogram semakin tinggi CV-x% maka data hasil mean x kurang bagus atau nilai validasinya berkurang karena keakuratan tidak mendekati nilai rata-rata. Jadi, dalam analisis flow cytometry nilai CV-x% sebaiknya memiliki nilai yang rendah sehingga validasi data mendekati nilai rata-rata. Pada penelitian ini dari hasil flow cytometry menunjukkan ploidi jenis mixoploid dimana terdapat dua channel yang didalam menunjukkan masing-masing peak. Channel menunjukkan rentan mean x yang menjadi acuan analisa ploidi dimana histogram tersebut terdapat relative

ketinggian (peak). Peak merupakan nilai relative tertinggi yang terdapat pada channel yang fungsinya sebagai penanda ploidi dalam rentan mean x. Selain itu pada pengamatan dengan menggunakan metode squashing (pemencetan) didapatkan hasil kromosom kacang tanah yang teramati dengan jumlah  $2n=4x=40$ . Dalam proses induksi poliploidi lama waktu perendaman sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan, hal ini sejalan dengan (Wulansari, dkk., 2016) yang menyatakan bahwa pada perlakuan induksi menggunakan orizalin semakin tinggi konsentrasi yang digunakan cenderung menghambat laju pertumbuhan serta pada saat pembentukan tunas. Peningkatan jumlah konsentrasi orizalin yang digunakan akan dapat menurunkan jumlah tunas majemuk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan, adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu pada analisis flow cytometri yang dilakukan menggunakan bio-chataranhtine dengan konsentrasi 0,05% dan 0,15% memiliki pengaruh dalam perubahan jumlah set kromosom pada tanaman dengan (*Dillenia serrata*) walaupun tidak terjadi peningkatan dalam set kromosom dari kromosom normalnya. Dan dengan menggunakan lama waktu perendaman 24 jam juga memiliki pengaruh dalam analisis flow cytometry. Serta adapun hasil pada pengamatan kromosom menggunakan metode squash dengan menggunakan konsentrasi 0,05%, 0,1% dan 0,15% serta 0% sebagai kontrol menggunakan aquadest dengan lama waktu perendaman 3, 6, 12 dan 24 jam, didaptkam hasil kromosom tidak terlihat jelas pada preparat yang telah dibuat.

#### ***B. Saran***

Adapun saran dalam penelitian ini sebaiknya menghitung dan mengamati jumlah set kromosom agar didapatkan data yang maksimal, selain itu sebaiknya diadakan pengulangan untuk didapatkan hasil yang akurat, sedangkan untuk penelitian berikutnya yang sejalan sebaiknya menggunakan konsentrasi dengan tingkatan yang berbeda dan yang lebih tinggi dan menggunakan waktu perendaman

yang bervariasi, selain itu juga mengamati pertumbuhan khususnya pada bagian morfologi dan anatomi serta harus mempersiapkan banyak sampel.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M.M., Karim, R.M., Aziz, A.M., Hossain, M.M., Ahmed, B., Mandal, A. "Induction and Evaluation of Polyploidy in Some Local Potato Varieties of Bangladesh". *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences ( JBES )* no. 2 (2011): p. 16–21.
- Alam M.M., Naeem M., Khan M.M.A., Uddin M. "Vincristine and Vinblastine Anticancer Catharanthus Alkaloids: Pharmacological Applications and Strategies for Yield Improvement". *New York: Springer, Cham.* (2017): p. 277–307.
- Aleza, P., Juarez, J., Ollitrault, P., Navarro. L. "Production of Tetraploid Plants of Non Apomictic Citrus Genotypes." *Plant Cell Reports.* 28 no. 12 (2009): p. 1837–46.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Juz 7.* Bandung: Sinar Baru al-Gasindo, 2002.
- Al- Maraghi, Ahmad Mushthafa, Tafsir al- Maraghi, Jilid VII. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Hababi. 1992,
- Aristya, G.R. "Optimalisasi Induksi Poliloid Pada Tanaman Stroberi (*Fragaria Spp* "Festival" Dan "California."". *Jurnal Penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah DIY.* 6 no. 10(2014): h. 77-87.
- Aziz, I.R., Muthiadin, C., Hajrah., Alir, R.F., Suryafly, F.D., Amnah, A.Z., Hermawan, I.A., Mustami, M.K., Mahfut., Upreti, B.M. "Polyploidy Induction of Rutaceae through Bio-catharanthine Treatment." *Biota.* 10 no. 10 (2021): p. 14-23.
- Bandara, C.J., Wickramasinghe, A., Bandara, B.M.R., Karunaratne, D.N., Wijensundara, D.S.A., Karunaratne, V. "Chemistry and Bioactivity of Compounds of Genus *Schumacheria* and Its Close Chemotaxonomic Relationship to the Genus *Dillenia*." *Journal of Cemical and Pharmaceutical Research.* 7no. 10(2015): p. 586–92.
- Banyai, W., Sangthong, R., Karaket, N., Inthima, P., Masahiro, M., Supaibulwatana, K. "Overproduction of Artemisinin in Tetraploid *Artemisia Annu* L." *Plant Biotechnology.* 27 no. 5 (2010): p. 427–33,
- Begum, F. "Augmented Production of Vincristine in Induced Tetraploids of *Agrobacterium* Transformed Shooty Teratomas of *Catharanthus*

- roseus*. "Medicinal Plants-International Journal of Phytomedicines and Related Industries. 3 no. 1 (2011): p. 59–64.
- Carvalho, J.F.R., and Otoni, W.C et al. "In Vitro induction of polyploidy in annatto (*Bixa orellana*)." *Plant Cell Tissue Organ Cult.* 80 no. 1 (2005): p. 69-75.
- Chen, Shao-hua Zeng Æ. Chuan-wu, et al. *In Vitro Induction , Regeneration and Analysis of Autotetraploids Derived from Protoplasts and Callus Treated with Colchicine in Citrus*. 2006, pp. 85–93, doi:10.1007/s11240-006-9142-y.
- Chung, K.S., Hipp, A.L., Roalson, E.H."Chromosome Numbwr Evolves Independently of Genome Size in a Clade with Nonlocalized Centromeres ( *Carex* : *Cyperaceae* )." *The Society for the Study of Evolution*. 66 no. 9 (2012): p. 2708-2722.
- Draghia, L., Chelariu, E.L., Sirbu, C., Branza, M., Michulschi, S.C."Analysis of Chromosome Number in Some Allium and Silene Wild Species with Ornamental Use." *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*. 41 no. 1(2013): p. 294–300.
- Dall'Acqua, S. "Natural products as antimitotic agents." *Current Topics in Medicinal Chemistry*. 14 no. 20 (2014): p. 2272–2285.
- Dewi, I.A.R.P. dan Pharmawati, M. "Penggandaan Kromosom Marigold ( *Tagetes Erecta* L . ) Dengan Perlakuan Kolkisin." *Majalah Ilmiah Biologi Biosfera*. 35 no. 3 (2018): p. 153–157.
- Dewi, S.R., Ulya, N., Argo, B.D. "Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak *Pleurotus ostreatus*". *Rona Teknik Pertanian*. 11 no. 1 (2018): p. 1–11.
- Ermayanti, T.M., Wijayanta, A.N., Ratnadewi, D. "Induksi Poliploidi Pada Tanaman Talas ( *Colocasia esculenta* ( L . ) Schott ) Kultivar Kaliurang Dengan Perlakuan Kolkisin Secara In Vitro ( *In Vitro Polyploid Induction on Taro ( Colocasia esculenta* ( L . ) Schott ) Cultivar Kaliurang with Colchicine Treatm." *Jurnal Biologi Indonesia*. 14 no. 1(2018): h. 91–102.
- Ermayanti, T.M., Rantau, D.E., Wulansari, A., Martin, A.F., Hafizh. E.A. "Variasi Jumlah Kromosom Talas Bentul ( *Colocasia esculenta* ( L . ) Schott ) In Vitro Hasil Perlakuan Orizalin ( *Variation in Chromosome Number of In Vitro Taro Bentul ( Colocasia esculenta* ( L . ) Schott ) after Oryzalin Treatment )." *Jurnal Biologi Indonesea*. 15 no. 1(2019): h. 53–64.
- Escandón, A.S., Hagiwara, J.C., Alderete, L.M. "A New Variety of *Bacopa Monnieri*

Obtained by in Vitro Polyploidization." *Electronic Journal of Biotechnology*. 9 no. 3 (2006): p. 181-186.

Febriana, I., dan Ersam, T. "Senyawa Sikloartobiloksanton Dari Kulit Akar *Arthocarpus elasticus*". *Jurnal Sains dan Seni ITS*. 5 no. 2(2016): h. 80–84.

Fiana, N. dan Oktaria, D. "Pengaruh Kandungan Saponin Dalam Daging Buah Mahkota Dewa ( *Phaleria macrocarpa* ) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah *The Effect of Saponin in Mahkota Dewa Mesocarp Fruit ( Phaleria Macrocarpa ) to Decrease Blood Glucose Levels*. *Majority*. 5 no. 4 (2016): h. 128-132.

Francis, D. "The Plant Cell Cycle – 15 Years On." *New Phytologist*.(2007): p. 261–278.

Friska, M. dan Daryono, B.D."Derajat Ploidi Jahe Merah ( *Zingiber officinale* Roxb . Var . Rubrum Rosc .) Hasil Induksi Dengan Kolkisin." *Biogenesis*. 5 no. 1(2017): h. 49–54.

Gandhi, D. and Mehta, P. "*Dillenia indica* Linn. and *Dillenia pentagyna* Roxb.: Pharmacognostic, Phytochemical" *Jurnal of Applied Pharmaceutical Science*. 3 no. 11 (2013): p. 134–42.

Grosser, J.W., Kainth, D., Dutt, M. "Production of Colchicine-Induced Autotetraploids in Pummelo (*Citrus grandis* Osbeck) through Indirect Organogenesis." *HortScience*, 49 no. 7(2014): p. 944–48,

Handayani, T., Witjaksono. Nugraheni, K.U. "Induksi Tetraploid Pada Tanaman Jambu Biji Merah ( *Psidium guajava* L .) Secara In Vitro ( *In Vitro Induction of Tetraploid in Guava ( Psidium guajava L .)*)." *Jurnal biologi Indonesia*. 13 no. 2 (2017): h. 271–278.

Hasniarti. "Studi Pembuatan Permen Buah Dengan (*Dillenia serrata* Thumb.)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian UNHAS, 2012.

<http://ccdb.tau.ac.il/search/Dillenia/>

Illing, I., Lydiana, M., Jelita. "Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Buah Dengan (*Dillenia serrata*)."*Prosiding Seminar Nasional*. 4 no. 1 (2017):h. 260–266.

Ilma, N."Studi Pembuatan Dodol Buah dengan (*Dillenia serrata*). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian UNHAS, 2012.

Irnawati., Purba, M., Mujadilah, R., Sarmayanti. "Penetapan Kadar Vitamin C dan

Uji Aktifitas Antioksidan Sari Buah Songi ( *Dillenia serrata* Thumb .) terhadap Radikal DPPH (*Diphenylpicrylhydrazyl*). *Pharmakon Jurnal Ilmiah farmasi*. 6 no. 2(2017): h. 40–44.

- Kadi, A. "Manipulasi Popliploidi untuk Memperoleh Jenis Baru Yang Unggul". *Oseana*. 32 no. 4 (2007): h. 1-11.
- Kader, E.M.A., dan Zeinab, T. "Phytochemical and cytotoxicity Investigation of *Dillenia indica* L." *World Journal of Pharmaceutical Research*. 4 no. 10 (2015): p. 334-348.
- Kaensaksiri, T., Soontornchainaksaeng, P., Soonthornchareonnon, N., Prathanturug, S. "In Vitro Induction of Polyploidy in *Centella asiatica* (L.) Urban." *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 107 no. 2(2011): p. 187–194.
- Kanchanapoom, K., and Koarapatchaikul, K. "In Vitro Induction of Tetraploid Plants from Callus Cultures of Diploid Bananas (*Musa acuminata*, AA Group) 'Kluai Leb Mu Nang' and 'Kluai Sa.'" *Euphytica*. 183 no. 1(2012): p. 111–117.
- Karimi, M., and Raofie, F. "Micronization of Vincristine Extracted from *Catharanthus roseus* by Expansion of Supercritical Fluid Solution". *The Journal of Supercritical Fluids*. 146 (2019): p. 172–179.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. Bandung:Sygma, 2012
- Kerdsuwan, N., and Te-chato, S. "Effects of Colchicine on Survival Rate , Morphological , Physiological and Cytological Characters of Chang Daeng Orchid ( *Rhynchostylis gigantean* Var . Rubrum Sagarik ) In Vitro". *Journal of Agricultural Technology*. 8 no. 4(2012): p. 1451–1460.
- Kermani, M.J., Sarasan V., Robert, A.V., Yokoya, K., Wentworth, J., Sieber, V.K. "Oryzalin-Induced Chromosome Doubling in Rosa and Its Effect on Plant Morphology and Pollen Viability." *Theoretical and Applied Genetics*. 107 no. 7(2003): p. 1195–1200.
- Langhans, M., Niemes, S., Pimpl, P., Robinson, D.G. "Oryzalin bodies: in addition to its anti-microtubule properties, the dinitroaniline herbicide oryzalin causes nodulation on the endoplasmic reticulum". *Protoplasma*. 236 (2009): 73-84.
- Liu, J., Zhu, J., Tang, L., Wen, W., Lv, S., Yu, R. "Enhancement of Vindoline and Vinblastine Production in Suspension-Cultured Cells of *Catharanthus roseus* by Artemisinic Acid Elicitation". *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 30 no. 1 (2014): p. 175–180.

- Liu, S., Chen, S., Chen, Y., Guan, Z., Yin, D., Chen, F. "In Vitro Induced Tetraploid of *Dendranthema nankingense* (Nakai) Tzvel. Shows an Improved Level of Abiotic Stress Tolerance." *Scientia Horticulturae*. 127 no. 3 (2011): p. 411–19.
- Lotfi, M., Alan, A.R., Henning, M.J., Jahn, M.M., Earle, E.D. "Production of Haploid and Doubled Haploid Plants of Melon (*Cucumis melo* L.) for Use in Breeding for Multiple Virus Resistance." *Plant Cell Reports*. 21 no. 11(2003): p. 1121–28.
- Miguel, T.P., and Leonhardt, K.W. "In Vitro Polyploid Induction of Orchids Using Oryzalin." *Scientia Horticulturae*. 130 no. 1 (2011): p. 314–319.
- Mead, D. "Types of Dillenia on Sulawesi." *Sulang language data and Working Paper*. no. 27 (2014).
- Muarifin, A.D., dan Daryono, B.S. "Karakterisasi Fenotip dan Ploidi Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* 'Talam') Hasil Induksi Biocatharantine." *Skripsi*. 2015.
- Moudi, M., Go, R., Yien, C. Y. S., Nazre, M. Vinca Alkaloids. *International Journal of Preventive Medicine*, 4 no. 11 (2013): p. 1231–1235.
- Noh, J., Sheikh, S., Chon, H.G., Seong, M.H., Lim, J.H., Lee, G., Jung, G.T., Kim, J.M., Ju, H.J., Huh, Y.C. "Screening Different Methods of Tetraploid Induction in Watermelon (*Citrullus lanatus* (Thumb.) Manst. and Nakai)." *Horticulture Environment and Biotechnology*, 53 no. 6(2012): p. 521–529.
- Ochatt, S.J. "Flow Cytometry in Plant Breeding". *Review Article*. no. 8 (2008): p. 581–598
- Omidbaigi, R., M. et al. Induction and identification of Poliploidi in basil (*Ocimum basilicum* L.) Medical Plant by Colchicine Treatment. *Internasional Journal of Plant Production*. 2010.. 4(2): 87-98.
- Omidbaigi, R., Mirzaee, M., Hassani, M.E., Moghadam, M.S. "Induction and identification of polyploidy in basil (*Ocimum basilicum* L.) medicinal plant by colchicine treatment. *International Journal of Plant Production*. 4 no. 2 (2010): p. 87–98.
- Pelima, J.N.M. "Potensi Buah Jongi ( *Dillenia serrata* Thumb. ) sebagai Sumber Pangan Fungsional Berbasis Lokal. *Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Kristen Tentena*. (2019) h. 125–29.
- Poerba, Y.S., Handayani, T., Witjaksono. "Karakterisasi Pisang Rejang tetraploid hasil induksi dengan oryzalin." *Berita Biologi*. 16 no. 1 (2017): h. 85-93.
- Rahmi, P., Witjaksono., Ratnadewi, D. "Induksi Poliploidi Tanaman Kangkung (

- Ipomoea aquatica* Forssk.) Kultivar Salina In Vitro Dengan Oryzalin. *Jurnal Biologi Indonesia*. 15 no. 1 (2019): p. 1–8.
- Reny, S., dan Nur, S. "Identifikasi Komponen Kimia Dan Uji Daya Antioksidan Ekstrak Buah Dengan (*Dillenia serrata* Thumb.)." *JF FIK UINAM*. 3 no. 4(2015): p. 162–69.
- Rindyastuti, R. "Carbon Storage of medium-sized tree: a case study on *Dillenia* collection in Purwodadi Botanic Garden. *Journal of Biological Research*. 22 no. 2 (2017).
- Sarasan, V., Roberts, A.V., Rout, G.R. "Methyl Laurate and 6-Benzyladenine Promote the Germination of Somatic Embryos of a Hybrid Rose." *Plant Cell Reports*. 20 no. 3(2001): p. 183–186.
- Sastriyani, N.M., Pharmawati, M., Adriani, N.P. Pemberian Kolkisin dengan Lama Perendaman Berbeda pada Induksi Poliploidi Tanaman Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.)." *Jurnal Biologi*. 15 no. 1 (2011): h. 9–14.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- Sissons, M. J., dan Hare, R.A. "Tetraploid Wheat - A Resource for Genetic Improvement of Durum Wheat Quality." *Cereal Chemistry*. 79, no. 1(2002): p. 78–84.
- Sparrow, A.H., and Nauman, A.F. "Evolution of Genome Size by DNA Doublings." *Science*. 192 no. 4239(1976): p. 524–529.
- Sukamto, L.A., Ahmad, F., Wawo, A.H. "Pengaruh Oryzalin Terhadap Tingkat Ploidi Tanaman Garut (*Maranta arundinacea* L.)." *Buletin Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat*. 21 no. 2(2015): p. 93–102.
- Sumner, A.T. "*Chromosome Organization and Function*." Blackwell. 1983.
- Suryo. *Sitogenetika*. Gadjah Mada University. 2007.
- Syaifudin, A., Ratnasari, E., Isnawati. "Pengaruh Pemberian Berbagai Konsentrasi Kolkhisin Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai (*Capsicum annum*) Varietas Lado F1." *LenteraBio*. 2 no. 2(2013): h. 167–171.
- Uswatun, H. "Penentuan Kadar Vitamin C Pada Mangga Kweni Dengan Menggunakan Metode Iodometri". *Jurnal keluarga Sehat Sejahtera*. 16 no. 1(2018): h. 90–96.

- Vandepoele, K., Simillion, C., Peer, Y.V. "Evidence That Rice and Other Cereals Are Ancient Aneuploids." *Plant Cell*. 15 no. 9(2003): p. 2192–2202.
- Waller, A., Pipkorn, D., Sutton, K.L. Linderman, J.J., Omman, G.M. "Validation of Flow Cytometric Competitive Binding Protocols and Characterization of Fluorescently Labeled Ligands." *Cytometry*. 45 no. 2(2001): p. 102–114.
- Widi, R.K., dan Indriati, T. "Penjaringan Dan Identifikasi Senyawa Alkaloid Dalam Batang Kayu Kuning (*Arcangelisia flava* Merr. ) ( *Screening and Identification of Alkaloid Compounds in Kayu Kuning Stem ( Arcangelisia flava* Merr. )).*Jurnal Ilmu Dasar*. 8 no. 1(2007): h. 24–29.
- Widoretno, W. "In Vitro Induction and Characterization of Tetraploid Patchouli (*Pogostemon cablin* Benth.) Plant." *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 125 no. 2 (2016): p. 261–267.
- Wulansari, A., Martin, A.F., Ermayanti, T.M. "Induksi tanaman Poliploid tanaman talas (*Colocasia esculenta* L.) dengan perlakuan Oryzalin secara in vitro." *Jurnal Biologi Indonesia*. 12 no. 2 (2016): h. 297-395.
- Wulandari, A.S. dan Wijaya, T.R. "Analysis of Teak (*Tectona grandis* L.) Chromosome By Staining Method Analisis Kromosom Tanaman Jati (*Tectona grandis* Lf) Dengan Metode Pewarnaan." *Jurnal Silvikultur Tropika*. 6 no. 1 (2015): p. 49–54.
- Yulianti, F., Purwito, A., Husni, A., Dinarti, D. "Induksi Tetraploid Tunas Pucuk Jeruk Siam Simadu (*Citrus nobilis* Lour. ) Menggunakan Kolkisin Secara In Vitro In Vitro Induction of Tetraploid in Simadu Tangerine (*Citrus nobilis* Lour. ) Shoot-Tip Using Colchicine." *Jurnal Agronomi Indonesia*. 43 no. 1(2015): h. 66–71.
- Zamariola, L., Tiang, C.L., De Storme, N., Pawlowski, W., Geelen, D. "Chromosome Segregation in Plant Meiosis." *Frontiers in Plant Science*. 5.
- Zhang, W., Hao, H., Ma, L., Zhao, C., Yu, X. "Tetraploid Muskmelon Alters Morphological Characteristics and Improves Fruit Quality." *Scientia Horticulturae*. 125 no. 3 (2010): p. 396–400.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Penyemaian tanaman

Gambar



Sampel Dengan

Gambar



Sampel Dengan



Biji Dengan



Persiapan media tanam



Proses penyemaian



Penyiraman tanaman



Tanaman dengan



Media tanam tissue dan tanah


## Lampiran II. Preparasi kromosom

Gambar



Biocatharanthine

Gambar



Kaca preparat



Botol gelap, botol vial, HCL dan AAG




Water one dan Aquadest

ALAUDDIN  
MAKASSAR



Gelas Ukur



Memimbang Biocatharantin



Membuat larutan biocatharantin



Perendaman tanaman



Preparasi kromosom




Perendaman dengan orcein



Maserasi sampel




Pemencetan (*Squashing*)




Preparat dengan



Pengamatan mikroskop



Hasil pengamatan perbesaran 100



Hasil pengamatan mikroskop

### Lampiran III. Analisis Flow cytometry

Gambar



Sampel Tanaman

Gambar




Alat Pemetong



Pembakar Spirtus



Cairan warna



Buffer ekstraksi



Alat Flow Cytometry



Proses Pemotongan daun




Penambahan Bufer ekstraksi



Pencacahan



Masukkan sampel ke tube





Pemberian Cairan warna



Sampel setelah pewarnaan



Memasukkan sampel ke alat FCM



Proses perendaman sampel



## RIWAYAT HIDUP



**Alifah Zul Amnah** lahir di Malimpung, pada tanggal 02 Juli 1998 dari orang tua bernama bapak Syamsul Alam dan Ibu Muliati sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis berasal dari desa Malimpung, kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 123 Malimpung lulus pada tahun 2010 lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Patampanua yang lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 5 Pinrang dan lulus pada tahun 2016 serta pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Biologi dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021.

Berangkat dari ketekunan dan mimpi yang besar penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinasi Kapasitas Penginduksi Poliploid Bio-Catharanthine dengan Analisis Flow Cytometry pada Dungen (*Dillenia serrata*)”. Dengan harapan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca di bidang genetika tumbuhan, terkhusus kromosom tumbuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R