


**VARIASI pH DAN LAMA PERENDAMAN BELIMBING WULUH  
(*Averrhoa bilimbi* L.) TERHADAP REDUKSI FORMALIN  
PADA IKAN ASIN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**SILKA EZSANITA**

60500117016

**JURUSAN KIMIA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silka Ezsanita  
NIM : 60500117016  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bontobulaeng, 21 Oktober 1999  
Jurusan : Kimia  
Judul : Variasi pH dan Lama Perendaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Reduksi Formalin pada Ikan Asin.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2021

Penyusun



Silka Ezsanita  
NIM : 60500117016

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Variasi pH dan Lama Perendaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Reduksi Formalin pada Ikan Asin"** yang disusun oleh **Silka Ezsanita, NIM: 60500117016**, mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqassyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 bertepatan dengan 17 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia.

Samata-Gowa, Kamis, 26 Agustus 2021 M  
17 Muharram 1443 H

### DEWAN PENGUJI

**Ketua** : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.

(.....)

**Sekretaris** : Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si

(.....)

**Munaqys 1** : Dra. Sitti Chadijah, M.Si.

(.....)

**Munaqys 2** : Dr. Aan Farhani Lc., M.Ag.

(.....)

**Pembimbing 1** : Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si

(.....)

**Pembimbing 2** : Firnanelty, S.Si., M.Si.

(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



**Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**  
NIP. 19710412 200003 1 001

(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penelitian penyusunan skripsi Saudari Silka Ezsanita, NIM 60500117016 Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Variasi pH dan Lama Perendaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Reduksi Formalin pada Ikan Asin” memandang bahwa skripsi penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si.

Firnanelty, S.Si., M.Si.

NIP. 19701024 199903 2 001

NIP. 19910214 201903 2 019

ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Variasi pH dan Lama Perendaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Reduksi Formalin pada Ikan Asin**. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi ummat manusia.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan akan tetapi semuanya dapat dilalui karena adanya dukungan, motivasi serta do'a dari berbagai pihak, terkhusus kedua orang tua saya bapak Abd. Majid dan Ibu Emmi atas kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih yang sangat tulus juga penulis haturkan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku Dosen Pembimbing I serta Penasehat Akademik yang tak hentinya memberi arahan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Firnanelty, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta semangat selama penyusunan skripsi ini.
6. Dra. Sitti Chadijah, M.Si. selaku penguji I yang senantiasa memberi masukan dan kritik dalam melengkapi skripsi ini.
7. Bapak Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag. selaku penguji II yang senantiasa memberi masukan dan kritik dalam melengkapi skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia atas segala ilmu yang telah diberikan selama menempuh pendidikan.
9. Laboran Jurusan Kimia yang senantiasa memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan.
10. Teman-teman dan orang-orang baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi isi, maupun tampilan dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang berhubungan dengan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas perhatian semuanya, penulis ucapkan terima kasih.

Gowa, Agustus 2021

Penulis



Silka Ezsanita

NIM: 60500117016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Pangan .....	7
B. Ikan Asin .....	10
C. Formalin .....	13
D. Belimbing Wuluh ( <i>Averrhoa bilimbi</i> L.).....	15
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kadar Formalin .....	18
F. Analisis Formalin Pada Bahan Pangan .....	20
G. <i>Spektrofotometri Ultraviolet-Visible</i> (UV-Vis).....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Tempat .....	26
B. Alat dan Bahan .....	26
1. Alat .....	26
2. Bahan .....	26
C. Prosedur Kerja .....	26
1. Pembuatan Ikan Asin .....	26
2. Preparasi .....	27
3. Pembuatan Kurva Baku Standar .....	27
4. Uji Kadar Formalin pada Ikan Asin dengan <i>Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis)</i> .....	28
5. Reduksi Formalin pada Ikan Asin .....	28
6. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
B. Pembahasan .....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>47</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Reaksi Protein dengan Formalin .....	8
Gambar 2.2 Reaksi <i>methylene</i> Membentuk Formalin dengan Asam Amino .....	8
Gambar 2.3 Ikan Asin .....	11
Gambar 2.4 Belimbing Wuluh ( <i>Averrhoa bilimbi</i> L.).....	16
Gambar 2.5 Reaksi Formalin dengan Asam Kromatofat .....	20
Gambar 2.6 Reaksi Formalin dengan Schiff .....	21
Gambar 2.7 Reaksi Formalin dengan Nash.....	21
Gambar 2.8 <i>Spektrofotometer Ultraviolet-Visible</i> (UV-Vis).....	23
Gambar 4.1 Ikan Asin Berformalin.....	30
Gambar 4.2 Kurva Baku Formalin.....	36
Gambar 4.3 Reaksi Formalin dengan Asam Kromatofat .....	38
Gambar 4.4 Reaksi Esterifikasi.....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Ikan Asin.....	12
Tabel 2.2 Struktur dan Karakteristik Formaldehid .....	14
Tabel 2.3 Komposisi Buah Belimbing Wuluh ( <i>Averrhoa bilimbi</i> L.).....	17
Tabel 2.4 Kandungan Asam Organik Buah Belimbing Wuluh ( <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) .....	18
Tabel 2.3 Komposisi Buah Belimbing Wuluh ( <i>Averrhoa bilimbi</i> L.).....	17
Tabel 4.1 Absorbansi Deret Standar Formalin.....	30
Tabel 4.2 Kadar Formalin Ikan Asin.....	31
Tabel 4.3 Reduksi Kadar Formalin Variasi pH.....	31
Tabel 4.3 Reduksi Kadar Formalin Variasi Lama Perendaman.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian .....	47
Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja .....	48
Lampiran 3. Perhitungan Pembuatan Larutan .....	55
Lampiran 4. Perhitungan Pembuatan Deret Standar .....	57
Lampiran 5. Perhitungan Kadar Formalin Ikan Asin .....	63
Lampiran 6. Perhitungan Kadar Formalin Ikan Asin Variasi pH dan Lama Perendaman .....	64
Lampiran 7. Perhitungan Persentase Penurunan Kadar Formalin Variasi pH dan Lama Perendaman .....	69
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian .....	70



## ABSTRAK

**Nama : Silka Ezsanita**  
**NIM : 60500117016**  
**Jurusan : Kimia**  
**Fakultas : Sains dan Teknologi**  
**Judul : Variasi pH dan Lama Perendaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Reduksi Formalin pada Ikan Asin**

---

---

Ikan asin merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Namun produsen ikan asin banyak menyalahgunakan proses pengawetan ikan asin menggunakan pengawet yang tidak diperbolehkan pemerintah seperti formalin. Salah satu cara mereduksi kandungan formalin dalam ikan asin adalah dengan menggunakan belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan variasi pH dan lama perendaman belimbing wuluh sehingga diperoleh kadar terbaik dalam mereduksi formalin pada ikan asin. Metode yang digunakan dalam analisis formalin adalah metode asam kromatofat. Tahapan dalam penelitian ini yaitu melakukan variasi pH yaitu pH 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 dan 2,5 sedangkan variasi lama perendamannya yaitu 10,15, 20, 25 dan 30 menit. Hasil analisis kadar formalin menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 520 nm menghasilkan pH dan waktu terbaik dalam menurunkan kadar formalin masing-masing sebesar 76,73% pada pH 2,0 dan 83,02% selama 10 menit perendaman belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

**Kata Kunci:** Ikan Asin, Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.), Formalin, Asam Kromatofat, Spektrofotometri UV-Vis

## ABSTRACT

**Name** : Silka Ezsanita  
**NIM** : 60500117016  
**Majors** : Chemistry  
**Faculty** : Science and Technology  
**Topic** : Variations pH And Duration Of Immersion Starfruit (*Averrhoa Bilimbi L.*) On Formalin Reduction In Salted Fish

---

---

Salted fish is one of the foods consumed by many people. However, many salted fish producers abuse its preservation process using preservatives that are not allowed by the government, such as formalin. One way to reduce the formalin content in salted fish is starfruit (*Averrhoa Bilimbi L.*). The purpose of this study was to determine the effect of pH and duration of immersion in starfruit in reducing formalin in salted fish. The method used in the analysis of formalin is chromatophoric acid method. The steps in this research are to variations pH is 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 dan 2,5 and duration of immersion used is 10,15,20,25 dan 30 minutes. The result of analysis of formalin levels using the spectrophotometric UV-Vis method at wavelength of 520 nm result in the best pH and duration reducing formalin levels of 76,73% at pH 2,0 and 83,02% for 10 minutes of immersion in starfruit (*Averrhoa Bilimbi L.*)

**Keywords:** Salted fish, Starfruit (*Averrhoa Bilimbi L.*), formalin, chromatophoric acid, spectrophotometer UV-Vis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup tinggi tidak disertai dengan kualitas indeks seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, tenaga kerja dan dukungan dari lingkungan. Saat ini, pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih sangat rendah sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Satiti, 2019: 78). Komponen penting dalam faktor kesehatan adalah komposisi gizi yang harus dikonsumsi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) nomor 28 tahun 2019 mengenai angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yaitu protein sekitar 10-15%, lemak 10-25% dan karbohidrat 60-75%. Status gizi antar individu berbeda satu sama lain bergantung dari kebutuhan dan asupan gizinya, jika keduanya seimbang maka akan menghasilkan gizi yang baik. Sumber gizi berasal dari makanan (Yaco, dkk, 2018: 102).

Kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan halal telah dijelaskan dalam firman Allah swt. Pada Q.S al-Baqarah/2: 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang begitu nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang bermanfaat untuk kebaikan

manusia sendiri. Makanan yang halal dan *thoyyib* dapat diartikan bahwa makanan tersebut diperoleh secara benar dari segi hukum syariat Islam dan hukum negara serta dapat memberikan manfaat bagi manusia dan tidak memberikan *mudhorot* atau kerugian bagi kesehatan manusia (Shihab, 2002: 390).

Keadaan saat ini banyak terjadi permasalahan pada bahan pangan yang dikonsumsi, antara lain kasus-kasus tentang penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan atau bahan yang diperbolehkan tetapi melebihi batas yang ditentukan. Produk pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah sumber protein hewani. Tetapi masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan yang dikonsumsi telah terkontaminasi bahan berbahaya (Wikanta, 2011: 77). Jenis produk pangan yang dimaksud misalnya bakso, tahu, mie basah (Hastutui, 2010: 132) dan produk ikan asin (Zazili, 2016: 394).

Ikan asin merupakan ikan segar yang berasal dari hasil tangkapan laut yang kemudian dilakukan proses pengasinan dengan penambahan garam dan pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Cara pengolahan ini dipilih karena lebih murah, mudah dan tanpa menggunakan teknologi modern. Pengawetan ikan asin dilakukan agar ikan asin lebih tahan lama dan awet (Suluh, dkk, 2013: 70). Alasan pengawetan ikan karena ikan memiliki kadar air yang tinggi, teksturnya lunak, pH netral dan kandungan gizi yang tinggi sehingga bakteri mudah mengalami pertumbuhan, tetapi ikan asin yang disimpan terlalu lama bisa menyebabkan pembusukan sehingga banyak produsen menggunakan bahan-bahan kimia dalam pengawetannya (Marpaung, 2015: 145).

Penyalahgunaan bahan-bahan kimia seperti bahan pewarna dan pengawet sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) perlu diwaspadai oleh masyarakat utamanya

dalam memilih makanan ataupun minuman. Tujuan penggunaan BTP tersebut agar produsen mendapatkan banyak keuntungan karena produk olahannya lebih tahan lama, lebih menarik dan lebih ekonomis. Namun, produsen tidak menyadari masalah kesehatan yang akan ditimbulkan sangat buruk, contohnya keracunan makanan dan akumulasi atau tumpukan bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Salah satu jenis pengawet yang sering digunakan adalah formalin (Sikanna, 2016: 86).

Formalin merupakan bahan yang dilarang oleh pemerintah untuk digunakan dalam mengawetkan makanan. Hal ini terdapat pada PERMENKES RI nomor 722/MenKes/Per/IX/88 pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa yang tidak diperbolehkan penggunaannya diantaranya bahan pengawet seperti boraks dan formalin. Bahaya dari penggunaan formalin yaitu berpotensi terjadinya mual-mual, kanker, merusak hati, limpa, ginjal serta otak (Farid, 2014: 3-4). Dalam tubuh manusia, formalin dapat bereaksi dengan senyawa kimia lain, diantaranya dengan protein dan DNA. Pada konsentrasi tinggi (40%), formalin akan mengeraskan jaringan dan mengendapkan protein. Pengerasan jaringan bahan makanan akan menyulitkan pencernaan dan penyerapan zat gizi oleh tubuh, sehingga kebutuhan gizi menjadi salah satu penyebab kekurangan gizi sekunder dan menjadi bahan asing sehingga menimbulkan suatu respon imun tubuh (Wikanta, dkk, 76-77: 2011).

Realita masyarakat masih banyak yang belum bisa terhindar dari penggunaan bahan makanan yang mengandung formalin. Bahan makanan yang mengandung formalin sangat membahayakan bukan hanya akibat paparan langsung antara formalin dengan bahan makanan, tetapi dapat merusak zat gizi bahan makanan (Suntoro dalam Wikanta, dkk, 2011: 76). Meskipun produsen sudah mengetahui formalin berbahaya jika digunakan sebagai pengawet makanan, tetapi penggunaannya

masih terus meningkat karena harganya yang murah dibandingkan pengawet lainnya dan ketersediaannya yang banyak dipasaran (Hastuti, 2010: 132), sehingga bahan makanan yang mengandung formalin perlu dilakukan pengolahan sebelum dikonsumsi misalnya penggunaan perendaman dengan air panas. Perendaman menyebabkan molekul formalin akan mudah lepas dari suatu bahan dan menguap karena titik didihnya yang lebih rendah dari air, yaitu 96°C (Oktaviani, 2018: 9). Adapun cara lain yang biasa digunakan yaitu penggunaan garam (Sebayang, dkk, 2020: 587), bahan alam berupa jeruk nipis (*Citrus aurantiifolia*) dan belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.), yang berfungsi untuk menurunkan kadar formalin pada makanan (Wikanta, 2011: 77).

Buah belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) memiliki berbagai macam kandungan nutrisi seperti asam amino, antioksidan serta asam-asam organik seperti asam oksalat, asam askorbat (vitamin C) dan asam sitrat yang menyebabkan rasa asam pada buah belimbing wuluh (Robiyah dalam Cahyani, 2018: 7). pH belimbing wuluh berkisar antara 2-4 yang menunjukkan tingkat keasamannya. Keasaman asam sitrat yang terdapat pada belimbing wuluh didapat dari gugus karboksil, jika asam karboksilat ini direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan reaksi esterifikasi yang dapat menurunkan kadar formalin pada suatu makanan (Wikanta, 2011: 77).

Rahmawati (2018) menemukan senyawa bioaktif pada belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yaitu asam sitrat dengan konsentrasi 50% mampu mengurangi kandungan formalin pada tahu sebesar 98,04%. Hal ini didukung oleh penelitian Wikanta (2011) bahwa penambahan perasan belimbing wuluh konsentrasi 80% mampu menurunkan kadar formalin sebesar 99,07%.

Selain tahu dan udang, pangan lain yang ditemukan menggunakan formalin yaitu ikan asin, seperti temuan Zakaria (2014) dan Mawar (2017) di kota Makassar, ikan asin mengandung formalin dengan persentase masing-masing 25% dan 75%. Ane, dkk (2016) juga menemukan bahwa ikan asin yang dijual di pasar tradisional kota Makassar tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah ditetapkan karena 100% sampel yang diteliti positif mengandung formalin, sehingga dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan kadar formalin dalam makanan yaitu temperatur, perendaman dan waktu (Farid, 2014: 76).

Fadhilah, dkk (2010) meneliti penurunan kadar formalin pada usus ayam menggunakan ekstrak belimbing wuluh dengan konsentrasi 20% dengan lama perebusan 30 menit dapat menurunkan kadar formalin sebesar 77,00%. Pada penelitian Farid (2014) ditemukan bahwa suhu terbaik dalam menurunkan kadar formalin adalah suhu 70°C dan lama perendaman terbaik selama 25 menit.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan penggunaan belimbing wuluh dan lama perendaman terbukti mampu menurunkan kadar formalin pada makanan. Namun, penelitian mengenai hal tersebut masih kurang diteliti terhadap sampel ikan asin, sehingga dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH dan lama perendaman belimbing wuluh dalam menurunkan kadar formalin pada ikan asin.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa pH belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin pada ikan asin ?

2. Berapa waktu perendaman ikan asin menggunakan belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pH belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin pada ikan asin.
2. Mengetahui waktu perendaman ikan asin menggunakan belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara menurunkan formalin pada ikan asin dengan belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.).
2. Membantu peneliti sains dalam pengembangan bahwa dengan variasi pH dan lama perendaman belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) mampu menurunkan kadar formalin pada ikan asin.
3. Memperoleh data pH dan lama perendaman terbaik dalam menurunkan kadar formalin pada ikan asin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**


#### ***A. Pangan***

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melanjutkan kehidupan yang berasal dari sumber air dan hayati yang dikemas baik secara olahan maupun tidak diolah untuk dikonsumsi manusia yang meliputi bahan tambahan pangan ataupun bahan lainnya yang digunakan untuk persiapan, pengolahan dan pembuatan makanan ataupun minuman (Fauzi, dkk, 2019: 1-2). Pangan sangat dibutuhkan oleh tubuh karena memiliki fungsi yaitu untuk pertumbuhan, perkembangan, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, yang dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh yang meliputi lemak, serat, mineral, kalori, vitamin, air dan protein (Purnama, dkk, 2019: 51).

Protein merupakan komponen makro molekul utama yang dibutuhkan oleh tubuh, fungsi dari protein untuk membentuk jaringan tubuh, membuat air susu, enzim, hormon, mengganti sel-sel yang rusak, menjaga keseimbangan asam atau basa cairan tubuh dan sebagai energi. Sumber protein di alam dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (misalnya kacang-kacangan) dan sumber hewani yang berasal dari protein hewan (misal susu, ikan, telur, hati, keju dan ayam). Protein mampu terikat dengan formalin pada makanan (Wardani, dkk, 2020: 59).

Formalin mempunyai kemampuan untuk mengawetkan makanan karena memiliki gugus aldehida yang bersifat mudah bereaksi dengan protein membentuk senyawa metilen (-NCHOH). Mekanisme formaldehid sebagai pengawet dikarenakan

bergabungnya formaldehid dengan asam amino bebas dari protoplasma sel atau mengkoagulasikan protein. Ketika makanan berprotein disiram atau direndam larutan berformalin, maka gugus aldehid dari formalin akan mengikat unsur protein. Protein yang terikat tersebut tidak dapat digunakan oleh bakteri pembusuk, sehingga makanan berformalin menjadi lebih awet. Selain itu, protein dengan unsur metilen tidak dapat dicerna (Widayono, 2018: 15).



**Gambar 2.1** Reaksi protein dengan formalin  
**Sumber :** Hartin, dkk (2018)

Bahan pangan secara alami akan mengalami pembusukan. Menurut Muntikah dkk (2017: 37-38) berdasarkan mudahnya terjadi kerusakan, makanan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Makanan tidak mudah rusak, yaitu makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, misalnya beras.
2. Makanan yang agak mudah rusak, yaitu makanan yang memiliki jangka waktu terbatas dalam penyimpanannya, misalnya umbi-umbian.
3. Makanan mudah rusak, yaitu makanan yang cepat rusak apabila tidak dilakukan pengolahan seperti pengawetan, misalnya daging, susu dan ikan.

Secara umum, masa simpan suatu makanan akan bertahan lama apabila memiliki kadar air yang rendah. Semakin tinggi kadar airnya maka makanan tersebut akan cepat rusak/ bakteri akan mudah menyerang.

Menurut Muntikah dkk, (2017: 38-41) bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan yaitu :

1. Kerusakan mikrobiologis

Kerusakan mikrobiologis dapat terjadi pada bahan mentah, pangan setengah jadi dan pangan hasil olahan yang disebabkan oleh mikroba seperti kapang, bakteri dan ragi/khmar. Cara perusakannya dengan menghidrolisa atau mendegradasi makromolekul menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Misalnya karbohidrat menjadi gula sederhana dengan jumlah atom yang lebih rendah.

2. Kerusakan mekanis

Kerusakan mekanis terjadi akibat benturan-benturan, misal benturan antar bahan itu sendiri atau benturan alat dengan bahannya sehingga diperlukan kehati-hatian saat menyiapkan atau memegang suatu produk.

3. Kerusakan fisik dan kimia

Kerusakan fisik disebabkan oleh perlakuan-perlakuan fisik. Misal pada saat pendinginan telur pecah karena rusaknya bahan yang dibekukan karena sel-selnya pecah, pada penggorengan atau pembakaran yang terlalu lama sehingga gosong. Contoh lainnya yaitu penggunaan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan terhadap kandungan vitaminnya.

4. Kerusakan biologis

Kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan oleh fisiologis, serangga dan binatang pengerat (rodentia). Kerusakan biologis meliputi kerusakan yang disebabkan reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan kerusakan.

Berbagai macam kerusakan yang terjadi pada bahan pangan sehingga diperlukan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk memperpanjang daya awet makanan. Menurut Zazili, dkk (2016: 395) BTP terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. BTP yang dengan sengaja ditambahkan pada makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut. Tujuan penambahannya yaitu untuk mempertahankan kesegaran, cita rasa dan membantu pengolahan. Contohnya bahan pengawet, pewarna dan peneras.

Beberapa pengawet makanan aman dikonsumsi, terutama jika penggunaannya dalam batas aman yang dianjurkan, contohnya asam sorbat, asam benzoat, nisin, nitrit dan sulfat dan garamnya. Bahan pengawet yang dilarang dalam penggunaannya seperti formalin, boraks, *rhodamin b* dan *metil yellow*, karena bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia.

2. BTP yang tidak sengaja ditambahkan yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan dan pengemasan. Contohnya residu pestisida.

### **B. Ikan Asin**

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat karena nilai gizi yang cukup tinggi. Ikan menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah swt. Untuk kelangsungan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nahl/16: 14 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُورًا وَتَرَى الْفُلَّكَ  
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah swt. Telah menundukkan laut yang tampak ganas menjadi tempat bagi manusia untuk mencari rezeki sehingga manusia bisa memakan dari kekayaan laut yang berupa daging segar. salah satu daging segar hasil laut adalah ikan. Ikan dapat dijadikan berbagai olahan seperti olahan ikan asin. Memakan ikan hukumnya halal, meskipun tanpa disembelih dengan cara islami. Namun, karena ikan disifati sebagai daging yang segar, untuk mengingatkan bahwa sebaiknya daging ikan haruslah dimakan segera (Shihab, 2002: 210).



**Gambar 2.3** Ikan Asin  
**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Ikan asin merupakan hasil perikanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, namun bersifat mudah mengalami pembusukan atau kemunduran mutu apabila disimpan terlalu lama sehingga diperlukan suatu penanganan yang tepat dan benar dalam menjaga kualitas sebelum didistribusikan dipasaran hingga sampai ditangan konsumen, salah satu cara yang digunakan adalah

proses pengawetan untuk memperpanjang daya awet ikan. Pengawetan ikan secara tradisional dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah pengasinan (Muniarti dalam Fatimah, dkk, 2017: 23).

Metode pengasinan merupakan metode yang paling sering digunakan karena bersifat sederhana dan murah dibandingkan dengan metode lain. Prinsip pengawetan ini adalah dengan penambahan garam dan pengeringan yang hasil produksinya disebut ikan asin. Penambahan garam yang cukup dapat mencegah terjadinya autolisis yaitu kerusakan pada ikan yang disebabkan enzim-enzim yang dimiliki oleh ikan, dan mencegah pembusukan oleh jasad renik. Daya pengawetan garam ini disebabkan karena garam memiliki tekanan osmotik yang tinggi sehingga kandungan garam bisa menarik kandungan air dan mikroorganisme pada daging ikan sehingga sel mengalami plasmolisis dan mati (Hendrik, 2010: 83-84).

Kandungan gizi pada ikan asin dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1** Kandungan Gizi Ikan Asin

<b>Bahan Pangan</b>	<b>Ikan Asin Kering</b>
Kalori (kal)	193
Protein (g)	42
Lemak (g)	1,5
Karbohidrat (g)	0
Kalsium (mg)	200
Pospor (mg)	300
Besi (g)	2,5
Nilai Vitamin A (SI)	150
Nilai Vitamin B1 (mg)	0,04
Nilai Vitamin C (mg)	0
Air (g)	40

*Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (2010)*

Penambahan garam mengakibatkan terjadinya denaturasi protein dan enzim sehingga daging ikan mengkerut, akibatnya air akan terperas keluar sehingga kadar air akan berkurang (Tuyu, dkk, 20). Selain garam ikan asin akan menjadi awet karena proses pengeringan. Pengeringan adalah metode menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan dengan cara menguapkan air tersebut sehingga jasad renik tidak akan tumbuh sehingga proses pembusukan dapat dicegah. Dalam pembuatan ikan asin secara tradisional, biasanya memanfaatkan sinar matahari dalam proses pengeringan ikan (Marpaung, 2015: 146).

Ikan asin berkualitas baik memang menjadi salah satu syarat agar ikan asin aman dikonsumsi masyarakat. Cara menilai kualitas ikan asin sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pengujian berupa pengujian fisik, mikrobiologi dan kimia. Ciri-ciri ikan asin tanpa formalin dan berformalin dapat dideteksi dengan panca indera. Ciri dari ikan tanpa formalin yaitu tekstur lemas, berbau amis, empuk dan aroma khas, warna buram/alami, lama kering dan digoreng renyah, empuk, lalat mau hinggap, cepat terkena jamur dan hanya tahan 1 minggu. Sedangkan ciri-ciri ikan asin berformalin yaitu warna lebih cerah, tidak berbau amis, tidak dikerumuni lalat dan tidak rusak lebih dari 1 bulan pada suhu kamar (25°C) (Antoni, 2010: 14).

### **C. Formalin**

Formalin di dalam perdagangan, tersedia dalam bentuk larutan formaldehid 37% dalam air. Formaldehid merupakan bentuk aldehid yang paling sederhana ( $H_2CO$ ). Larutan ini mempunyai sifat tidak berwarna atau hampir tidak berwarna seperti air, sedikit asam, baunya sangat menusuk dan korosif. Formaldehid termasuk reduktor kuat yang bereaksi kuat dengan bahan pengoksidasi dan berbagai senyawa organik. Formalin termasuk senyawa reaktif yang dapat berikatan dengan senyawa

pada bahan makanan contohnya protein, lemak dan karbohidrat (BPOM, 2008: 1).

Formalin memiliki unsur aldehida yang mudah terikat dengan protein. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Samsudin (2018) pengawet formalin memiliki unsur aldehida yang bersifat mudah bereaksi dengan protein, jadi ketika formalin disiramkan pada tahu akan mengikat unsur protein mulai dari permukaan tahu sampai meresap ke dalam. Matinya protein pada tahu ketika terikat dengan formalin, maka tahu akan terasa kenyal ketika ditekan dan juga tahu tidak akan diserang bakteri pembusuk sehingga lebih awet.

Formaldehid memiliki struktur dan karakteristik sebagai berikut :

**Tabel 2.2** Struktur dan Karakteristik Formaldehid

Nama	Formaldehid
Struktur	$\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
Rumus kimia	H <sub>2</sub> CO
Berat Molekul	30,03
Titik leleh	-118°C
Titik didih	-21°C
Densitas	155,1 K (-118,0°C)
Tekanan uap (Pa, 25°C)	516000
Kelarutan (mg/liter, 25°C)	400000-550000

*Sumber : Liteplo, dkk (2002)*

Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan merupakan cara yang sering digunakan produsen untuk mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan formalin merupakan bahan pengawet ilegal yang mudah didapat dan

sangat murah (Novitasari, dkk, 2016: 7). Pada umumnya digunakan formalin untuk memperpanjang masa simpan dari makanan karena senyawa antimikroba yang dapat membunuh bakteri dan virus. Selain itu, dengan menambahkan formalin membuat tekstur makanan menjadi keras sehingga tampilannya lebih menarik (Samsudin, 2018: 89).

Makanan yang mengandung formalin dalam kadar paling rendah pun akan berdampak bagi kesehatan, formalin yang masuk ke dalam tubuh secara rutin akan mengakibatkan penumpukan pada tubuh yang menyebabkan penyakit seperti nekrosis, kelainan pada hati, ginjal, jantung dan otak, penciutan selaput lender dan mengakibatkan kegiatan sel berhenti. Formalin yang dikonsumsi pada dosis rendah menyebabkan sakit perut disertai muntah-muntah dan kegagalan peredaran darah. Sedangkan konsumsi formalin dengan dosis tinggi mengakibatkan muntah darah, kejang-kejang, muntah darah dan bersifat karsinogenik yaitu menyebabkan timbulnya kanker (Farid, 2014: 24).

Formalin biasanya digunakan sebagai bahan baku industri lem, desinfektan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, pembasmi serangga, pembersih lantai dan pengawet mayat (Wahyuningrum, 2019: 18). Menurut *International Programme on Chemical Safety* (IPCS) ambang batas formalin adalah 0,1 mg/liter atau 0,2 mg/hari dalam air minum dan 1 mg/liter dalam makanan (Rahman, dkk, 2019: 333).

#### **D. Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)**

Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) merupakan jenis tanaman tropis yang banyak dikembangkan di Indonesia yang biasanya dipelihara di pekarangan dan dapat berbuah sepanjang tahun (Sumardilan, 2015: 71). Belimbing wuluh tidak termasuk

dalam tanaman musiman, buahnya berbentuk lonjong, memiliki kulit mengkilap yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Tanaman ini banyak digunakan sebagai pangan fungsional karena memiliki komponen farmakoseutika yaitu senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan, antibakteri dan *buffer* (Insani, dkk, 2019: 47-48).



**Gambar 2.4** Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)

**Sumber:** Lisnawati (2014)

Menurut Abraham (2016: 72), klasifikasi ilmiah tanaman belimbing wuluh yaitu :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Oxalidales
Famili	: Oxalidaceae
Genus	: Averrhoa
Spesies	: <i>Averrhoa bilimbi</i> L.

Pohon belimbing wuluh bisa tumbuh dengan ketinggian 10 m dengan batang yang tidak begitu besar, memiliki tekstur yang kasar dan percabangan sedikit. Bentuk daunnya berupa daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, berbentuk bulat telur sampai jorong, ujung runcing,

pangkal membulat, tepi rata, panjang 2-10 cm, lebarnya 1-3 cm, berwarna hijau dan permukaan bawah hijau muda (Prayoga, dkk, 2020: 5-6).

Bunga pada belimbing wuluh berupa malai, bunganya kecil, berkelompok, keluar langsung pada batang dan cabang-cabangnya yang besar, bunga kecil berbentuk bintang dan warnanya ungu kemerahan. Buahnya berbentuk lonjong dengan panjang 4-10 cm, berwarna hijau muda dan ketika matang berwarna kuning atau kuning pucat. Daging buahnya terasa asam dan berair serta memiliki biji seperti bulat telur. Perbanyakkan buah belimbing dilakukan dengan biji (Prayoga, 2020: 6).

Komposisi dan kandungan asam organik dalam buah belimbing wuluh sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Komposisi Buah Belimbing Wuluh

<b>Komposisi Kimia</b>	<b>Kadar</b>
Kelembapan	94,1 g
Energi	21 kal
Protein	0,7 g
Lemak	0,2 g
Karbohidrat	4,7 g
Serat	0,6 g
Abu	0,3 g
Kalsium	7 mg
Fosfor	11 mg
Zat Besi	0,4 mg
Sodium	4 mg
Potasium	148 mg
Vitamin A	145 I.U
Thiamin	0,01 mg
Ribovlavin	0,03 mg
Asam Askorbat	9 mg

*Sumber : Subhadrabandhu (2001)*

**Tabel 2.4** Kandungan Asam Organik Buah Belimbing Wuluh

<b>Asam Organik</b>	<b>Jumlah (meq asam/100 g total padatan)</b>
Asam asetat	1,6-1,9
Asam Sitrat	92,6-133,8
Asam Format	0,4-1,2
Asam Laktat	0,4-1,2
Asam Oksalat	5,5-8,9

*Sumber : Subhadrabandhu (2001)*

Belimbing wuluh memiliki banyak manfaat untuk kesehatan diantaranya mengobati berbagai jenis penyakit seperti rematik, batuk, gondongan, darah tinggi, diabetes, sariawan, sakit perut dan memperbaiki fungsi pencernaan serta manfaat dalam menurunkan kadar formalin pada suatu makanan atau bahan pangan (Sumardilan, dkk, 2015: 71).

Buah belimbing wuluh memiliki pH 2-4 (Samsudin, 2018: 94) dengan beberapa kandungan kimia terutama kandungan asam sitrat yang termasuk asam organik lemah. Selain itu juga mengandung banyak senyawa kimia seperti vitamin C, tannin, saponin, sulfur, kalsium oksalat, glukosid, kalium sitrat dan flavonoid yang sangat penting (Wikanta, 2011: 34).

#### ***E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kadar Formalin pada Bahan Pangan***

Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar formalin pada bahan pangan sebagai berikut :

##### **1. Suhu**

Suhu dapat mengurangi kadar formalin pada makanan, hal ini disebabkan karena ketika bahan pangan yang berformalin direndam dalam air dengan

menggunakan beberapa variasi suhu, maka formalin akan menguap, proses ini disebabkan karena formalin juga bersifat volatil yaitu larutan yang mudah menguap (Farid, 2014: 72). Senyawa metilen yang dihasilkan dari reaksi formalin dengan protein dapat kembali menjadi formalin dan protein dengan tambahan energi yaitu berupa panas atau kalor (Widayono, 2018: 15).

## 2. Perendaman

Grace dalam Farid (2014: 73) menegaskan bahwa kadar formalin bisa diturunkan dengan cara perendaman dengan air, pada proses perendaman ini kadar formalin akan banyak larut dalam air dan hanya sedikit yang tertinggal dalam suatu bahan pangan karena formalin bersifat larut dalam air dan air dapat melarutkan senyawa-senyawa organik yang mempunyai gugus karboksil/amino dan gugus fungsional polar.

## 3. Waktu

Waktu menjadi salah satu faktor dalam menurunkan kadar formalin pada bahan pangan. Indri (2018: 5) bahwa waktu kontak antara formalin dengan bahan alam (sebagai pereduksi) mampu menurunkan kadar formalin yang semakin besar.

## 4. *Power of Hydrogen* (pH)

Formalin mengandung gugus aldehid, Riawan dalam Samsudin (2018: 94) mengemukakan bahwa pemisahan aldehid dalam suatu campuran misalnya formalin dapat dilakukan dengan asam misalnya belimbing wuluh (*Aveerhoa bilimbi* L.). Dari penelitian menunjukkan bahwa jika asam karboksilat bereaksi dengan gugus alkohol akan menghasilkan reaksi esterifikasi sehingga berpengaruh terhadap kandungan formalin.


## F. Analisis Formalin dalam Bahan Pangan

Menurut Ichya'udin (2014: 24-27), bahwa analisis formalin dapat dideteksi dengan banyak metode antara lain dengan metode asam kromatofat, reagensia schiff, pereaksi nash dan uji organoleptik yang diklasifikasikan sebagai berikut :

### 1. Reagensia Asam Kromatofat

Asam kromatofat merupakan salah satu pereaksi yang sering digunakan dalam pengujian formaldehid karena kelebihanannya yang dapat bereaksi secara selektif dengan persenyawaan formalin. Adapun kelemahannya yaitu biasanya menggunakan asam sulfat yang sangat berbahaya dan bersifat korosif. Senyawa formalin yang ditambahkan asam kromatofat dengan asam sulfat yang disertai pemanasan akan berwarna violet. Reaksi asam kromatofat mengikuti prinsip kondensasi senyawa fenol dengan formaldehida membentuk suatu senyawa yang berwarna yaitu (3,4,5,6-dibenzoxantylum). Pewarnaan ini terjadi karena terbentuknya gugus kromofor yang terbentuk dan gugus oksonium yang stabil karena mesomeri. Senyawa itu juga mempunyai ikatan terkonjugasi yang berselang-seling pada seluruh bagian senyawa tersebut sehingga memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron yang mengakibatkan senyawa semakin stabil.

Reaksi formalin dengan asam kromatofat sebagai berikut :




**Gambar 2.5** Reaksi Formalin dengan Asam Kromatofat

**Sumber:** Rahman (2014)

## 2. Metode Reagensia Schiff


Metode schiff merupakan salah satu metode untuk mendeteksi senyawa organik aldehida dan biasanya juga digunakan untuk pewarnaan jaringan biologi. Cara penggunaannya yaitu sampel ditambahkan reagen schiff dan akan terjadi perubahan warna menjadi magenta ketika terdeteksi adanya aldehida dalam bahan tersebut. Reaksi antara formalin dengan schiff yaitu :



**Gambar 2.6** Reaksi Formalin dengan Schiff  
**Sumber:** Ichya'udin (2014)

## 3. Pereaksi Nash

Pereaksi Nash merupakan salah satu metode yang banyak juga digunakan dalam mendeteksi keberadaan formalin. Cara penggunaannya yaitu pereaksi nash ditambahkan dalam sampel dan menghasilkan kuning yang kemudian diukur dengan panjang gelombang 415 nm. Reaksi antara pereaksi nash dan formalin yaitu :



**Gambar 2.7** Reaksi Formalin dengan Pereaksi Nash  
**Sumber:** Ichya'udin (2014)

#### 4. Uji organoleptik

Uji organoleptik yaitu suatu penilaian suatu sampel dengan menggunakan panca indra melalui syaraf sensorik. Salah satu cara penilaian organoleptic adalah dengan menggunakan uji hedonik. Uji hedonik adalah penilaian panelis tentang suka atau tidak suka, dapat menerima atau tidak dapat menerima terhadap suatu produk yang diuji.

Menurut Farid (2014: 37), bahwa kriteria yang dapat digunakan dalam uji organoleptik sebagai berikut :

##### a. Aroma

Aroma suatu produk dapat dinilai dengan cara pembauan. Aroma produk daging olahan dapat dipengaruhi oleh jenis, lam dan suhu pemasakan, selain itu aroma produk olahan dapat juga dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ditambahkan selama pembuatan dan pemasakan terutama bumbunya.

##### b. Warna

Warna merupakan salah satu yang menjadi daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk. Warna pada produk makanan merupakan faktor penentu kerusakan serta petunjuk tingkat mutu dan pedoman proses pengolahan.

##### c. Tekstur

Tekstur suatu bahan pangan dapat dipengaruhi oleh kadar air dan kandungan lemak. Teksturnya biasanya terasa halus atau kasar pada saat disentuh oleh jari dan menjadi salah satu daya tarik konsumen dalam memilih suatu bahan pangan.

#### d. Penampakan umum

Penampakan umum merupakan pertimbangan terakhir konsumen dalam memilih suatu bahan pangan. Penampakan umum ini tidak dapat dipisahkan dari penilaian aroma, warna dan tekstur.

#### G. Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis)

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu metode yang paling bermanfaat untuk analisis kuantitatif. Karakteristik yang penting terkait dengan spektrofotometri UV-Vis ini adalah penggunaannya luas. Kebanyakan spesies anorganik, organik dan biokimia mampu menyerap radiasi UV-vis, sehingga memenuhi syarat untuk dianalisis secara senyawa yang mengandung gugus-gugus penyerap (Sastrohamidjojo, 2018: 72-73).



**Gambar 2.8** Spektrofotometer UV-Vis

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media (larutan) maka sebagian cahaya diserap, sebagian dipantulkan dan sebagian lagi dipancarkan. Pengukuran kuantitatif dilaksanakan dengan cara komparatif menggunakan kurva kalibrasi dari hubungan konsentrasi deret larutan alat untuk analisa suatu unsur yang berkadar rendah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Penentuan secara kualitatif berdasarkan puncak-

puncak yang dihasilkan spektrum dari suatu unsur tertentu pada panjang gelombang tertentu, sedangkan penentuan secara kuantitatif berdasarkan nilai absorbansi yang dihasilkan dari spektrum dengan adanya senyawa pengompleks sesuai unsur yang dianalisisnya (Yunlinastuti, 2016: 23).

Prinsip dasar spektrofotometer adalah hukum *Lambert-Beer* yaitu bila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui suatu media yang transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media larutan yang digunakan (Yunlinastuti, 2016: 23). Absorbansi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perekam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda. Semakin banyak sinar diabsorpsi oleh sampel organik pada panjang gelombang tertentu, semakin tinggi absorbansi yang dinyatakan dengan hukum *Lambert-Beer* (Suhartati, 2017: 11).

Hukum *Lambert-Beer* yaitu :

$$A = \log \left( \frac{I_0}{I} \right) = a \cdot b \cdot c$$

Keterangan :

$I_0$  : Intensitas sinar sebelum melalui sampel

$I$  : Intensitas sinar setelah melalui sampel

$A$  : Absorbansi

$a$  : Absorptivitas ( $\text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}$ )

$b$  : Lebar sel yang dilalui sinar (cm)

$c$  : Konsentrasi (mol/L)

Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, sedangkan sinar tampak memiliki panjang gelombang 400-750 nm. Spektrofotometer

dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorpsi energi. Absorpsi sampel diukur dengan berbagai panjang gelombang untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda (Suhartati, 2017: 3).



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-juli 2021 di Laboratorium Kimia Analitik dan Riset Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Spektrofotometer UV-Vis Varian *cary50*, pH meter merek *Lutron*, neraca analitik *Kern*, *hot plate*, labu ukur 1000 mL, 100 mL, dan 10 mL, gelas kimia 100 mL dan 250 mL, gelas ukur 100 mL, pipet skala 5 mL dan 10 mL, tabung reaksi, corong, batang pengaduk, *blender*, pisau, dan kain blacu.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades ( $H_2O$ ), asam kromatofat ( $C_{10}H_6Na_2O_8S_2 \cdot 2H_2O$ ) 0,5%, asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 60%, belimbing wuluh (*Aerrhoa bilimbi L.*), formalin ( $CH_2OH$ ) 37%, ikan asin dan kertas saring whatman No.42.

#### **C. Prosedur Kerja**

##### **1. Pembuatan Ikan Asin Berformalin (Modifikasi Farid, 2014: 43)**

Ikan segar dengan berat 300 g dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu, direndam dalam larutan garam 100 mL. Larutan garam dibuat dengan mencampurkan air bersih dengan garam dapur menggunakan perbandingan

2:1 (berat ikan dan berat garam), kemudian ditambahkan formalin 100 ppm pada saat perendaman. Setelah itu ditutup rapat, pastikan organ ikan terendam semua, ikan direndam selama 24 jam. Selanjutnya, diangkat dan dijemur sampai kering pada terik matahari selama 10 jam dan dilakukan selama 2 hari.

## **2. Preparasi**

### **a. Sampel Ikan Asin**

Sampel ikan asin berformalin yang telah dibuat dihaluskan dengan *blender*. Kemudian disimpan dalam wadah dan ditutup rapat.

### **b. Larutan Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)**

Buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) yang digunakan yaitu ukuran  $\pm 5-6$  cm dan warna yang relatif sama. Buah belimbing wuluh dicuci bersih dengan air mengalir. Kemudian dihaluskan dan disaring untuk mendapatkan filtrat. Selanjutnya, ditampung dalam wadah dan ditutup rapat (Rahmawati, 2018: 91).

## **3. Identifikasi Kadar Formalin**

### **a. Pembuatan Larutan Induk 1000 ppm**

Larutan formalin p.a dipipet sebanyak 0,27 mL dan dimasukkan dalam labu takar 100 mL. Kemudian akuades ditambahkan sampai tanda batas dan dihomogenkan.

### **b. Pembuatan Larutan Baku 100 ppm**

Larutan induk formalin 1000 ppm dipipet sebanyak 10 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL, lalu akuades ditambahkan sampai tanda batas dan dihomogenkan.

### **c. Pengukuran Larutan Standar**

Larutan standar 20 ppm dibuat dari formalin 100 ppm dengan dipipet sebanyak 20 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL. Akuades ditambahkan sampai tanda batas dan dihomogenkan. Lalu dibuat larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 0; 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 ppm. Setelah itu, diambil 2 mL dari masing-masing konsentrasi kemudian di masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label. Kemudian, ditambahkan asam kromatofat 0,5% dalam asam sulfat 60% sebanyak 2 mL pada masing-masing tabung reaksi dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 95°C. Absorbannya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 520 nm.

### **d. Analisis Kadar Formalin pada Ikan Asin**

Sampel ikan asin halus ditimbang sebanyak 1 g, kemudian ditambahkan akuades sebanyak 20 mL. Homogenkan lalu disaring. Kemudian, diambil filtrat sebanyak 10 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL. Dihimpitkan dengan akuades. Setelah itu, diambil filtrat sebanyak 2 mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan asam kromatofat 0,5% dalam asam sulfat 60% sebanyak 2 mL selanjutnya dipanaskan selama 15 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 520 nm. Data dimasukkan pada persamaan garis linear dari kurva standar, maka akan diperoleh kadar formalin sampel hasil perlakuan (Male, 2017: 7).

### **e. Reduksi Formalin pada Ikan Asin (Modifikasi Farid, 2014: 84)**

#### **1. Variasi pH**

Ikan asin berformalin yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 3 g, kemudian direndam dengan larutan belimbing wuluh pH 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 dan

2,5 selama 15 menit. Selanjutnya ikan asin disaring dan dikeringkan. Ikan asin dari proses pengeringan dianalisis kadar formalinnya.

## **2. Variasi Lama Perendaman**

Ikan asin yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 3 g, kemudian direndam dengan larutan belimbing wuluh pH terbaik dalam menurunkan kadar formalin dengan waktu 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. Selanjutnya ikan asin disaring dan dikeringkan. Kemudian, ikan asin dari proses pengeringan dianalisis kadar formalinnya.

## **3. Analisis Data**

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai bentuk yakni dikelompokkan menjadi tiga, yaitu data dalam bentuk teks, penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Setelah itu dibahas secara deskriptif (Widayono, 2018: 24).

Data absorban yang diperoleh dari pengukuran larutan standar menggunakan spektrofotometer UV-Vis kemudian dibuat kurva standar berdasarkan regresi linear yang menyatakan hubungan antara konsentrasi formalin sebagai sumbu x dan absorban formalin sebagai sumbu y, maka diperoleh persamaan  $y = bx + a$ . Selanjutnya, data absorban sampel dimasukkan ke dalam persamaan  $y = bx + a$  sehingga diperoleh kadar formalin ikan asin (Farid, 2014: 84).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Ikan Asin Berformalin

Ikan asin berformalin yang dihasilkan berwarna putih, lebih cerah, tidak berbau amis dan tidak dikerumuni lalat. Dari 300 gram yang dibuat ikan asin berformalin, diperoleh 197 gram setelah pengeringan pada gambar 4.1.



**Gambar 4.1** Ikan Asin Berformalin

#### 2. Kurva Standar Formalin

Pengujian kadar formalin yang terdapat pada ikan asin dengan metode Spektrofotometer UV-Vis. Pengujian tersebut diawali dengan pengukuran absorban larutan deret standar formalin dengan konsentrasi 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 ppm. Data absorban deret standar dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Absorban Deret Standar Formalin

No.	Deret Standar Formalin (ppm)	Absorban
1.	1	0,0885
2.	1,5	0,1269
3.	2	0,1594

4.	2,5	0,1909
5.	3	0,2321

### 3. Kadar Formalin pada Ikan Asin

Hasil absorban larutan sampel ikan asin untuk analisis formalin dengan metode Spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Kadar Formalin Ikan Asin

No.	Sampel	Absorban	Kadar Formalin (ppm)	
			Awal	Awal x FP (10x)
1.	Ikan Asin	0,2200	2,8163	28,163

### 4. Reduksi Kadar Formalin dengan Variasi pH

Ikan asin berformalin direndam dalam larutan belimbing wuluh dengan variasi pH 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 dan 2,5 selama 15 menit. Hasil dari ikan asin berformalin yang telah dikeringkan dianalisis dengan metode Spektrofotometer UV-Vis. Hasil absorban larutan sampel dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3** Reduksi Kadar Formalin Variasi pH

No.	Variasi pH	Absorban	Kadar Formalin (ppm)		Persen Penurunan (%)
			Awal	Awal x FP (10x)	
1.	2,0	0,0564	0,6552	6,552	76,73
2.	2,1	0,0592	0,6922	6,922	75,42
3.	2,2	0,0700	0,8348	8,348	70,35
4.	2,3	0,0767	0,9233	9,233	67,21
5.	2,4	0,0851	1,0343	10,343	63,27
6.	2,5	0,0932	1,1413	11,413	59,47

## 5. Reduksi Kadar Formalin Ikan Asin Variasi Lama Perendaman

Ikan asin berformalin direndam dalam larutan belimbing wuluh pH 2,0 dengan variasi lama perendaman selama 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. Hasil dari ikan asin berformalin yang telah dikeringkan dianalisis dengan metode Spektrofotometer UV-Vis. Hasil absorban larutan sampel dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.3** Reduksi Kadar Formalin Variasi Lama Perendaman

No.	Variasi Lama Perendaman (Menit)	Absorban	Kadar Formalin (ppm)		Persen Penurunan (%)
			Awal	Awal xFP (10x)	
1.	10	0,0430	0,4782	4,782	83,02
2.	15	0,0577	0,6723	6,723	76,12
3.	20	0,0593	0,6935	6,935	75,37
4.	25	0,0646	0,7635	7,635	72,88
5.	30	0,0785	0,9471	9,471	66,37

### B. Pembahasan

#### 1. Ikan Asin Berformalin

Pembuatan ikan asin dapat dilakukan dengan metode penggaraman yang menggunakan garam sebagai media pengawet. Teknik penggaraman yang lebih dikenal dengan istilah pengasinan di kalangan masyarakat lebih sering digunakan karena biayanya yang relatif murah dan lebih sederhana sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, serta hasil olahan yang lebih tahan lama sehingga dapat didistribusikan ke tempat jauh tanpa adanya perlakuan khusus pada produk. Teknik penggaraman dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu penggaraman kering (*dry salting*), penggaraman basah (*wet salting*) dan penggaraman basah kering (*kench*

*salting*). Pada penelitian ini teknik pembuatan ikan asin dilakukan dengan penggaraman basah (*wet salting*) (Budiman, 2004: 7-8).

Penggaraman ikan asin dengan cara basah bertujuan untuk mengetahui konsentrasi garam yang ditambahkan pada ikan dan larutan garam yang dicampurkan akan menyerap secara merata masuk ke dalam pori-pori kulit ikan. Penggaraman basah juga lebih efektif digunakan ketika ikan akan ditambahkan larutan lain seperti formalin (Farid, 2014: 51). Parameter kualitas produk ikan asin yang dihasilkan dari penggaraman basah memiliki rasa, tekstur dan aroma yang lebih baik dari penggaraman lainnya karena kadar garam ditambahkan dapat disesuaikan sesuai keinginan produsen. Penggaraman basah memiliki sifat biologis yang oksidasi lemaknya bisa dihindari, konsentrasi larutan garam mudah diatur serta penetrasi garam bisa merata. Apabila konsentrasi dari larutan garam menurun maka bisa ditambahkan lagi garam ke dalam larutan (Rahmani, dkk., 2017: 143).

Proses pembuatan ikan asin dilakukan dengan cara ikan dicuci bersih bagian dalam dan luarnya untuk membuang kotoran yang menempel pada ikan, lalu dipisahkan tulang dan daging ikan. Daging ikan lalu ditimbang untuk mendapatkan bobotnya dan didapatkan bahwa bobot ikan yang digunakan adalah 300 gram. Daging ikan dicampurkan dengan larutan garam untuk merendam ikan. Penggunaan garam pada proses perendaman karena garam bersifat sebagai pengawet alami dan dapat mencegah autolisis, yaitu terjadinya kerusakan ikan akibat enzim-enzim atau jasad renik yang terdapat pada ikan. Larutan garam dibuat dengan mencampurkan air bersih dan garam dapur dengan perbandingan 1:2 (berat garam dan berat ikan asin) bertujuan untuk menjaga agar ikan tidak terlalu asin sehingga kualitas rasanya tetap terjaga, jumlah air yang ditambahkan sebanyak 100 mL dalam 150 gram garam.

Selanjutnya mencampurkan larutan formalin dengan konsentrasi 100 ppm (Farid, 2014: 52).

Penggunaan formalin 100 ppm bertujuan agar ikan asin lebih mudah dideteksi dan memberikan perbedaan yang signifikan pada tekstur, warna dan aroma pada ikan. Ketika ikan asin disiram atau direndam larutan formalin, maka gugus aldehid dari formalin akan mengikat unsur protein. Protein yang terikat tersebut tidak dapat digunakan oleh bakteri pembusuk, sehingga makanan berformalin menjadi lebih awet (Widayono, 2018: 15). Selanjutnya ikan ditutup rapat dan pastikan semua organ ikan terendam agar larutan formalin dan ikan akan lebih mudah meresap, ikan direndam selama 24 jam. Pada saat penggaraman berlangsung terjadi penetrasi garam masuk ke tubuh ikan dan keluarnya cairan dari tubuh ikan karena adanya perbedaan konsentrasi. Cairan tersebut akan cepat melarutkan kristal garam atau pengenceran larutan garam, bersamaan dengan keluarnya cairan dari tubuh ikan, partikel garam akan masuk ke dalam tubuh ikan. Proses ini berlangsung sampai terjadi keseimbangan konsentrasi garam di luar dan dalam daging ikan. Konsentrasi garam yang tinggi dapat mencegah autolisis dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain karena adanya garam, ikan asin lebih awet karena pengeringan (Kaimudin, 2014: 77).

Setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, ikan lalu diangkat dan ditiriskan untuk mengurangi kadar air pada dagingnya. Kemudian, ikan dijemur sampai kering pada terik matahari selama 10 jam dan dilakukan selama 2 hari. Tujuan pengeringan untuk menghilangkan sebagian air yang terdapat pada ikan sehingga ikan tidak busuk dan lebih awet (Kaimudin, 2014: 77).

Sebelum dilakukan analisis kadar formalin, dilakukan preparasi terlebih dahulu pada sampel untuk mempermudah proses analisis. Proses preparasi sampel,

ikan asin yang telah ditambahkan formalin dihaluskan untuk mendapatkan ikan asin yang halus untuk memudahkan proses pelarutannya dalam pelarut (aquades). Disimpan dalam wadah dan ditutup rapat agar terhindar dari zat pengotor yang nantinya akan mempengaruhi analisis formalin.


Preparasi selanjutnya pada buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). Buah belimbing wuluh yang digunakan yaitu ukuran dan warna yang relatif sama, lalu dicuci bersih bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada buah belimbing wuluh. Belimbing wuluh dihaluskan untuk menghasilkan filtrat dan disaring menggunakan kain blacu untuk memisahkan antara filtrat dan residunya. Ditampung dalam wadah yang nantinya akan digunakan dalam analisis reduksi kadar formalin pada ikan asin.

## **2. Kurva Standar Formalin**

Pembuatan standar formalin dilakukan untuk dapat mengetahui hubungan konsentrasi dengan absorban yang dihasilkan dari suatu larutan standar. Kurva baku dibuat dari beberapa deretan larutan standar yang masih dalam batas linieritas sehingga mudah diregresilinearkan menurut hukum *Lambert-Beer* yaitu  $A = a b c$ . Hukum dari *Lambert-Beer* ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh suatu larutan zat penyerap berbanding lurus dengan konsentrasi suatu larutan. Kurva baku formalin dibuat dengan beberapa variasi konsentrasi. Konsentrasi formalin yang digunakan yaitu 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 ppm yang dibuat dari formalin 37% dengan cara diencerkan berdasarkan konsentrasi deret standar yang akan dibuat. Pada pembuatan larutan standar diperlukan ketelitian yang tinggi agar hasil yang didapatkan maksimal (Antoni, 2010: 15).

Pembuatan deret standar dibuat dengan menggunakan pereaksi asam kromatofat 0,5% karena mampu bereaksi dengan formalin secara cepat, terlebih jika ditambahkan asam sulfat 60% yang memberikan suasana asam dalam larutan maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Asam kromatofat merupakan salah satu pereaksi yang sering digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena harganya yang murah serta mudah mendeteksi keberadaan formalin pada suatu bahan pangan. Pengukuran absorbansi larutan deret standar formalin menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 520 nm (Male, 2017: 7). Hasil dari pengukuran deret standar 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 ppm menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan maka absorbansinya juga akan semakin besar.

Hal ini sesuai dengan hukum *Lambeert-Beer* dimana konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansinya. Dari hasil absorbansi larutan standar tersebut, kemudian dibuat regresi linear yang menunjukkan hubungan konsentrasi dengan absorbansi larutan, sehingga bisa diperoleh persamaan regresi yang nantinya digunakan dalam mengukur konsentrasi dari sampel. Pada Gambar 4.2 dapat dilihat grafik yang dihasilkan dari kurva standar formalin.



**Gambar 4.2** Kurva Larutan Standar


Grafik larutan standar formalin di atas dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi larutan standar maka nilai serapan akan semakin besar pula. Dalam hal ini, kurva baku yang dihasilkan sudah memenuhi hukum *Lambeert-Beer* dan kurva yang didapatkan dari pengukuran larutan standar formalin tersebut cukup baik, karena menghasilkan nilai regresi yang hampir mendekati 1 yaitu  $R = 0,9953$  dengan persamaan regresi yaitu  $y = 0,0757x + 0,0068$ . Nilai  $y$  adalah absorban dari formalin dan  $x$  adalah konsentrasi dari formalin. Dari persamaan yang diperoleh inilah yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari sampel dengan memasukkan nilai absorban ke persamaan tersebut, sehingga dapat diperoleh kadar formalin dari sampel yang dianalisis.

### **3. Kadar Formalin Ikan Asin**

Sampel ikan asin ditimbang untuk mengetahui bobot dan ditambahkan akuades untuk mendapatkan filtrat ikan asin. Dihomogenkan untuk mencampurkan kedua bahan, menyaring untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Melakukan pengenceran pada sampel ikan asin untuk memperoleh larutan yang konsentrasinya lebih rendah dengan memipet filtrat sebanyak 10 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL dan dihimpitkan dengan akuades. Penambahan akuades mengakibatkan konsentrasi berubah dan volume diperbesar tetapi jumlah mol terlarut tetap.

Filtrat ikan asin ditambahkan asam kromatofat dalam asam sulfat. Asam kromatofat digunakan untuk mengetahui keberadaan formalin pada ikan asin. Formalin bereaksi dengan asam kromatofat menghasilkan suatu senyawa kompleks berwarna keunguan. Reaksinya bisa dipercepat dengan penambahan asam sulfat. Formalin ini sangat reaktif terhadap asam kromatofat sehingga formalin bisa bereaksi baik dengan asam kromatofat dalam suasana asam yang dapat menghasilkan senyawa

3,4,5,6-dibenzoxanthylum. Senyawa ini dapat ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu, hal ini disebabkan terbentuknya gugus kromofor dan gugus oksonium yang stabil karena mesomeri. Efek mesomeri merupakan efek konjugasi suatu ikatan yang berselang-seling sehingga menyebabkan delokalisasi elektron pada senyawa tersebut sehingga senyawa yang terbentuk jauh lebih stabil (Ichya'uddin, 2014: 55).




**Gambar 4.3** Reaksi Formalin dengan Asam Kromatofat

Analisis kadar formalin yang telah dilakukan pada sampel ikan asin dengan menggunakan pereaksi asam kromatofat menghasilkan bahwa ikan asin yang diberi formalin konsentrasi 100 ppm, setelah dianalisis menghasilkan larutan berwarna ungu yang cukup pekat, hal ini menunjukkan bahwa kadar formalin pada ikan asin tersebut cukup tinggi. Adapun kadar awal formalin ikan asin sebesar 2,8163 ppm dan setelah diencerkan sebanyak 10 kali adalah 28,163 ppm yang menunjukkan kadar formalin ikan asin sesungguhnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa formalin yang ditambahkan sebesar 100 ppm pada ikan, tidak semua formalin dapat terikat dalam daging ikan, sehingga kadar formalin yang ada pada ikan asin yaitu 28,163 ppm. Jadi formalin yang tidak terpakai yaitu 71,837 ppm. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnaningtyas (2012) bahwa formalin kebanyakan larut dalam air dibanding terikat pada ikan asin serta sifat volatil formalin yang menyebabkan terjadi penguapan sehingga dapat terbuang ketika dipanaskan.

#### 4. Reduksi Kadar Formalin dengan Variasi pH

Perendaman dalam larutan belimbing wuluh dengan variasi pH dapat menjadi alternatif dalam mengurangi formalin pada bahan pangan. Pada pengukuran pH awal belimbing wuluh dalam volume 50 mL memiliki kadar asam dengan nilai pH 2,0. Hal ini sesuai dengan penelitian Samsudin (2018: 94) bahwa pH dari belimbing wuluh sebesar 2-4. Penelitian ini memvariasikan nilai pH yaitu 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 dan 2,5 dan dilakukan perendaman ikan asin selama 15 menit dan dianalisis kadar formalinnya. Hasil yang didapatkan bahwa variasi pH pada belimbing wuluh mampu menurunkan kadar formalin ikan asin. Hal ini disebabkan karena pemisahan aldehid yang terdapat pada formalin dapat dilakukan dengan asam (Wikanta, 2011: 76) dan menurut (Samsudin, 2018: 94) kandungan asam sitrat pada belimbing wuluh mampu menurunkan kadar formalin pada bahan pangan. Asam sitrat merupakan senyawa asam organik lemah. Keasaman asam sitrat didapat dari tiga gugus karboksil  $-COOH$  yang dapat melepas proton dalam larutan yakni tiap molekul mengandung tiga gugus karboksil dengan 1 gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon yang ada ditengah.

Asam karboksilat adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus fungsional karboksil ( $-COOH$ ). Pelarut air sebagian molekulnya akan terionisasi dengan cara melepas suatu atom H menjadi  $H^+$ . Jika asam karboksilat bereaksi dengan alkohol akan membentuk ester yang disebut reaksi esterifikasi. Reaksi itulah menunjukkan kandungan formalin pada ikan asin akan mengalami penurunan setelah dilakukan perendaman dengan belimbing wuluh dibandingkan tanpa proses pengolahan atau perlakuan (Samsudin, 2018: 94).



**Gambar 4.4** Reaksi Esterifikasi

Variasi pH dengan selisih angka yang dekat mampu menghasilkan penurunan kadar formalin pada ikan asin dengan selisih yang cukup dekat pula, persen penurunan dengan selisih yang jauh hanya 12%.

Semua variasi pH yang digunakan, pH 2,0 mampu menurunkan kadar formalin ikan asin diantara variasi pH lainnya, konsentrasi awal formalin ikan asin yaitu 28,163 ppm menjadi 6,552 ppm persentase penurunannya yaitu 76,73%. Menurut Rahmawati (2018: 42) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah kelarutan, luas permukaan kontak, konsentrasi, katalisator dan temperatur. Larutan dengan konsentrasi besar (pekat) memiliki partikel lebih rapat, jika dibandingkan larutan encer. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas permukaan, sehingga tumbukan antar suatu molekul sering terjadi dan reaksi yang berlangsung akan semakin cepat, sehingga pH 2,0 yang memiliki larutan belimbing wuluh 100% mampu mereduksi formalin lebih tinggi.

### 5. Reduksi Kadar Formalin dengan Variasi pH

Proses pengurangan kadar formalin dengan pH terbaik yaitu pH 2,0 dengan variasi lama perendaman yang berbeda yaitu selama 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman ikan asin menggunakan belimbing wuluh pH terbaik dengan variasi waktu mampu menurunkan kadar formalin pada ikan asin dengan persentase penurunan dengan selisih yang cukup dekat. Dari hasil absorbansi dari masing-masing waktu perendaman menunjukkan bahwa lama

perendaman 10 menit dengan nilai absorban 4,782 ppm yang merupakan hasil absorban terendah dengan persentase penurunan sebesar 83,02%. Waktu 10 menit sudah cukup untuk mengoptimalkan laju reaksi dengan formalin pada ikan asin diantara variasi waktu lainnya.

Pembebasan formalin pada bahan pangan perlu dilakukan sebelum dikonsumsi salah satunya dengan menggunakan bahan alam berupa belimbing wuluh. Dari penelitian menunjukkan bahwa dengan perlakuan perendaman ikan asin berformalin tidak dapat dihilangkan 100% tetapi mampu menurunkan kadar formalin hingga 83,02% dalam ikan asin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuktikan bahwa tanaman belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) mampu menurunkan kadar formalin pada ikan asin. Allah swt. Menciptakan tanaman di bumi yang memberikan banyak manfaat bagi manusia, yang dijelaskan dalam firman Allah swt. Qs. Asy-Syu'ara/ 26: 7 sebagai berikut:


أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2019).

Menurut tafsir Sayyid Quhtb (1992: 325) bahwa kalimat “dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi...” sebetulnya mengarah bahwa bumi tidak hanya difokuskan pada satu perhatian saja, tapi banyak hal-hal lain yang mesti diperhatikan termasuk manfaat diciptakannya. Kemudian kalimat “... berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik ?” menjelaskan bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang mulia itu beserta dengan kehidupan yang berlangsung semuanya adalah bersumber dari Allah Yang Maha Mulia. Hal ini

membuat kita harus menerima segala ciptaan Allah dengan membuatnya mulia, memerhatikan serta memperhitungkan mengapa semuanya diciptakan, bukan bersifat remeh, lalai bahkan menghina ciptaan-Nya. Jika dikaji dalam ilmu kimia maka dapat dilihat bahwa buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) memiliki banyak manfaat. Dari penelitian ini buah belimbing wuluh dapat digunakan sebagai tambahan dalam mengolah bahan pangan yang mengandung formalin contohnya pada ikan asin sebelum dikonsumsi.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. pH belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin pada ikan asin yaitu pH 2,0 dengan persentase penurunannya sebesar 76,73%.
2. Waktu perendaman pada ikan asin menggunakan belimbing wuluh (*Averrhoa blimbi* L.) yang mempunyai kemampuan terbaik dalam mereduksi formalin yaitu selama 10 menit dengan persentase penurunannya sebesar 83,02%.

### **B. Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti menggunakan bahan alam yang mempunyai pH <2 dengan waktu perendaman <10 menit sebagai perbandingan dengan hasil penelitian ini dalam perolehan reduksi formalin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abraham, Chinju Merin. "Antibacterial effects of *Averhoa Bilimbi* L., Fruit Extracts". *ResearchJournal of Biological Science* 5, no.8 (2016): h. 72-74.

Ane, dkk. "Kandungan Formalin pada Ikan Asin yang Dijual di Pasar Tradisional Kota Makassar Studi Kasus: Pasar Terong, Pa'baeng-baeng dan Toddopuli". *Higiene* 2, no.2 (2016): h. 108-113.

Antoni, Syahrial. "Analisa Kandungan Formalin pada Ikan Asin dengan Metode Spektrofotometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan provinsi DIY. *Data Kandungan Gizi Bahan Pangan dan Hasil Olahannya*. Yogyakarta, 2010.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Formalin (Larutan Formaldehid)*. Jakarta: Percetakan Negara, 2008.

Budiman, Muhammad Syarif. *Teknik Penggaraman dan Pengeringan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah, 2004.

Cahyani, Herlina Nur. "Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Total Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* Sp dan Kadar Protein pada Daging Ayam". *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Fadhilah, dkk. "Penurunan Kadar Formalin pada Usus Ayam Menggunakan Ekstrak Belimbing Wuluh". *MIPA* 1, no.1 (2010): h. 1-10.

Farid, Moh. "Pengaruh Suhu dan Lama Perendaman dalam Pelarut Air Terhadap Kadar Formalin Ikan Asin Belanak (*Mugil cephalus*). *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Fatimah, dkk. "Analisis Formalin pada Ikan Asin Di Pasar Giwangan dan Pasar Beringharjo Yogyakarta". *Analitik* 2, no.1 (2017): h. 22-28.

Fauzi, dkk. "Pemetaan Ketahanan Pangan pada Badan Koordinasi Wilayah I Jawa Barat". *Industri Pertanian* 1, no.1 (2019): h. 1-10.

Hartin, dkk. "Analisis Korelasi Formalin dan Protein pada Udang Kelong (*Penaeus indicus*) dan Udang Putih (*Litopenaeus vannamei*)". *Sains* 3, no.1 (2018): h. 1-8.

Hastuti, Sri. "Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Formaldehid pada Ikan Teri di Madura". *Agrointek* 4, no.1 (2010): h. 132-137.


- Hendrik. “Analisis Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara”. *Perikana dan Kelautan* 15, no.1 (2010): h. 83-88.
- Ichya’uddin, M. “Analisis Kadar Formalin dan Uji Organoleptik Ikan Asin Di Beberapa Pasar Tradisional Di Kabupaten Tuban”. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Indri, Melita Hilda. “Penurunan Kadar Formalin pada Tahu dengan Menggunakan Jeruk Nipis (*Citrus aurantiifolia* s.) Berdasarkan Variasi Konsentrasi dan Lama Perendaman”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.
- Insan, dkk. “Penggunaan Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Sebagai Produk Pengolahan Pangan”. *Pendidikan Tata Boga dan Teknologi* 1, no.1 (2019): h. 47-55.
- Kaimudin, Marni. “Pengaruh Penambahan Bumbu Terhadap Mutu Ikan Asin Kering”. *Sains* 10, no.2 (2014): h. 76-82.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2019.
- Liem, W.Y. “Analisis Ekonomi Pemasaran Ikan Asin di Wilayah Kota Bogor”. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Institut Teknologi Bandung, 2000.
- Liteplo, dkk. “Concise Internasional Chemical Assesment Document 40 Formaldehyde”. *World Helath Organization*, 2002.
- Male, dkk. “Analisis Kandungan Formalin pada Mie Basah pada Beberapa Lokasi di Kota Ambon”. *Kementerian Perindustrian RI* 13, no.2 (2017): h. 5-10.
- Marpaung, Ridawati. “Kajian Mikrobiologi pada Produk Ikan Asin Kering Yang Dipasarkan Di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kota Jambi”. *Ilmiah* 15, no. 3 (2015): h. 145-151.
- Mawar. “Identifikasi Formalin pada Ikan Asin Yang Diperjualbelikan Di Pasar Daya Makassar”. *Media Analis Kesehatan* 8, no.2 (2017): h. 67-71.
- Novitasari, dkk. “Pengaruh Penambahan Konsentrasi Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Udang Vannami (*Letapenaeus vannamei*) dengan Spektrofotometer Visible”. *Sains* 6,no.11 (2016): h. 7-14.
- Oktaviani, Ira. “Pengaruh Perendaman Air Panas Terhadap Kadar Formalin dan Protein pada Ikan Teri”. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal* 3, no.1(2018): h. 9-15.
- Prayoga, dkk. *Copyright Ekstrak Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.)*. Surabaya: Penerbit CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- Purnama, dkk. "Perbandingan Kadar Protein Susu Cair UHT *full cream* pada Penyimpanan Suhu Kamar dan Suhu Lemari Pendingin dengan Variasi Lama Penyimpanan dengan Metode Kjeldhal". *Analisis Farmasi* 4, no.1 (2019): h. 50-58.
- Qutb, Sayyid. "*Tafsir Fi Zhilail-Al-Qur'an*". Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah. "*Tafsir Fi Zhilail-Al-Qur'an* Jilid 2". Depok: Gema Insani, 1992.
- Rahman, dkk. "Analisis Kandungan Formalin pada Cabe Merah Giling Yang Dijual Di Pasar Tradisional Kota Jambi". *Ilmiah Ibnu Sina* 4, no.2 (2019): h. 331-340.
- Rahmani, dkk. "Pengaruh Metode Penggaraman Basah Terhadap Karakteristik Produk Ikan Asin Gabus (*Ophiocephalus striatus*)". *Teknologi Pertanian* 8, no.3 (2017): h.142-152.
- Rahmawati. "Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* (Linn)) Terhadap Kadar Formalin dalam Tahu". *Skripsi*. Fakultas Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018".
- Ratnaningtyas, Rully Rista. "Pirolisis Pembuatan Asam Cair Dari Bonggol Jagung Sebagai Pengawet Alami Pengganti Formalin". *Skripsi*. Fakultas Teknis Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Samsudin, Rinza Rahmawati. "Bioaktif Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* (Linn)) Terhadap Kadar Formalin dalam Tahu". *Medical Laboratory* 1, no.2 (2018): h.88-97.
- Sastrohamidjojo, Hardjono. *Dasar-Dasar Spektroskopi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Satiti, Sonyaruri. "Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Untuk Menyongsong Bonus Demokrasi". *Kependudukan Indonesia* 14, no.1 (2019): h.77-92.
- Sebayang, dkk. "Pemberian Larutan Garam Terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Tahu". *Keerawatan Silampari* 3, no.2 (2020): h. 587-596.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*, vol.7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sikanna, Rismawaty. "Analisis Kualitatif Kandungan Formalin pada Tahu Yang Dijual Di Beberapa Pasar di Kota Palu". *Kovalen* 2, no.2 (2016): h. 85-90.
- Subhadrabandhu, S. *Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific*. Thailand and Bangkok: Department of Horticulture, 2001.
- Suhartati, Tati. *Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Suluh, dkk. "Sanitasi Tempat Pembuatan Ikan Asin dan Kualitas Bakteriologis Ikan Asin di Kelurahan Oesapa Kota Kupang Tahun 2013". *Oehonis* 1, no.1 (2016): h. 70-77.

- Sumardilan, dkk. "Karakteristik Fisis, pH, dan Organoleptik Sari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan Penambahan Pengawet Sintesis dan Pengawet Alami". *Photon* 5, no.2 (2015): h. 71-79.
- Susanti, dkk. "Profil Protein Susu dan Produk Olahannya". *MIPA* 39, no.2 (2016): h. 98-106.
- Tuyu, dkk. "Studi Lama Pengeringan Ikan Selar (*Selaroides* sp) Asin Dihubungkan dengan Kadar Air dan Nilai Organoleptik". *Media Teknologi Hasil Perikanan* 2, no.2 (2014): h.20-26.
- Wahyuningrum, Nanda Sri. "Analisis Kandungan Formalin Dalam Bakmi Basah Yang Beredar Di Kota Surakarta". *Farmasindo* 3, no.1 (2019): h. 18-22.
- Wardani, dkk. "Identifikasi Formalin pada Ikan Asin Yang Dijual Di Kawasan Pantai Teluk Penyuh Kabupaten Cilacap". *Kesmas* 10, no.1 (2016): h. 15-24.
- Widayono, Ulfa Yuli. "Analisa Penurunan Kadar Formalin pada Tahu Berformalin dengan Variasi Temperatur Yang Dijual Di Pasar Aksara Medan". *Skripsi*. Jurusan Analisis Kesehatan Politenik Kesehatan Kemenkes RI Medan, 2018.
- Wikanta, dkk. "Pengaruh Penambahan Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* (Linn) dan Perebusan Terhadap Kadar Residu Formalin dan Profil Protein Udang Putih (*Letapenaeus vannamel*) Berformalin Serta Pemanfaatannya Sebagai Sumber Pendidikan Gizi dan Keamanan Pangan pada Masyarakat". *Ilmu Kesehatan* 1, no.1 (2011): h. 76-84.
- Wikanta, Wiwi. "Pengaruh Penambahan Perasan Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Kadar Residu Formalin dan Profil Protein Udang Putih (*Letapenaeus vannamel*) Berformalin". *Penelitian Hayati* 6, no.3 (2011): h. 33-39.
- Yaco, dkk. "Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar pada Siswa Di SMK Negeri 1 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar". *Kesehatan Masyarakat* 4, no.2 (2018): h.102-112.
- Yanlinastuti, Syamsul. "Pengaruh Konsentrasi Pelarut Untuk Menentukan Kadar Zirkonium dalam Paduan U-Zr dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis". *MIPA* 8, no.13 (2016): h.22-33.
- Yaskun, dkk. "Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan dan Masyarakat di Kabupaten Lamongan". *Studi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 1 (2017): h. 257-264.
- Zakaria, dkk. "Analisis Kandungan Formalin pada Ikan Asin Katamba (*Lethrinus lentjan*) yang Beredar Di Kota Makassar". *Chemica* 15, no. 2 (2014): h. 16-23.


## LAMPIRAN

### Lampiran I. Alur Penelitian




## Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja

### 1. Pembuatan Ikan Asin Berformalin




## 2. Preparasi

### a. Ikan Asin




### b. Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)



### 3. Identifikasi Kadar Formalin


#### a. Pembuatan Larutan Induk 1000 ppm




#### b. Pembuatan Larutan Baku 100 ppm




### c. Pengukuran Larutan Standar




**d. Analisis Kadar Formalin pada Ikan Asin**


**a. Reduksi Formalin pada Ikan Asin (Modifikasi Farid, 2014: 84)**

**1. Variasi pH**



**2. Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Kadar Formalin pada Ikan Asin**



**b. Analisis Data**

### Lampiran 3. Perhitungan Pembuatan Larutan

#### 1. Pembuatan Larutan Asam Sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 60% dalam 100 mL

Diketahui :

$$M_1 = 97\%$$

$$M_2 = 60\%$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 97\% = 100 \text{ mL} \cdot 60\%$$

$$V_1 = \frac{6000}{97}$$

$$V_1 = 61,85 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), maka diencerkan larutan asam sulfat 97% sebanyak 61,85 mL dalam 100 mL akuades.

#### 2. Pembuatan Asam Kromatofat ( $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{Na}_2\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 0,5% dalam 100 mL

Asam Sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 60%

Diketahui :

$$\% = 0,5\%$$

$$V = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$b \dots ?$$

Penyelesaian :

$$\% = \frac{b}{v} \times 100$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{0,5}{100} \times 100 \\ &= 0,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat asam kromatofat ( $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 0,5%, maka dilarutkan asam kromatofat sebanyak 0,5 gram dalam asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 60%.



## Lampiran 4. Perhitungan Pembuatan Deret Standar

### 3. Pembuatan Larutan Formalin

#### a. Pembuatan Larutan Induk Formalin 1000 ppm dalam 100 mL

Diketahui :

$$C_1 = 37\%$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1000 \text{ ppm} \\ &= 100 \text{ mg/L} \\ &= 1 \text{ g/1000 mL} \\ &= 0,1 \text{ g/100 mL} \\ &= 0,1\% \end{aligned}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 37\% = 100 \text{ mL} \cdot 0,1\%$$

$$V_1 = \frac{10}{37}$$

$$V_1 = 0,27 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan induk formalin 1000 ppm maka diencerkan formalin p.a 37% sebanyak 0,27 mL dalam akuades 100 mL.

#### b. Pembuatan Larutan Standar 100 ppm dalam 100 mL

Diketahui :

$$C_1 = 1000 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 100 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 1000 \text{ ppm} = 100 \text{ mL} \cdot 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{10.000}{1000}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 100 ppm maka diencerkan larutan formalin 1000 ppm sebanyak 10 mL dalam akuades 100 mL.

**c. Pembuatan Larutan Standar 20 ppm dalam 100 mL**

Diketahui :

$$C_1 = 100 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 20 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 100 \text{ ppm} = 100 \text{ mL} \cdot 20 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{2000}{100}$$

$$V_1 = 20 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 20 ppm maka diencerkan larutan formalin 1000 ppm sebanyak 20 mL dalam akuades 100 mL.

#### 4. Pembuatan Deret Standar Formalin

##### a. Deret 1 ppm

$$C_1 = 20 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 1 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 20 \text{ ppm} = 100 \cdot 1 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{100}{20}$$

$$V_1 = 5 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 1 ppm maka diencerkan larutan formalin 20 ppm sebanyak 5 mL dalam akuades 50 mL.

##### b. Deret 1,5 ppm

$$C_1 = 20 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 1,5 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 20 \text{ ppm} = 100 \cdot 1,5 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{75}{20}$$

$$V_1 = 7,5 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 1,5 ppm maka diencerkan larutan formalin 20 ppm sebanyak 7,5 mL dalam akuades 50 mL.

**c. Deret 2 ppm**

$$C_1 = 20 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 2 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 20 \text{ ppm} = 100 \cdot 2 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{200}{20}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 2 ppm maka diencerkan larutan formalin 20 ppm sebanyak 10 mL dalam akuades 50 mL.

**d. Deret 2,5 ppm**

$$C_1 = 20 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 2,5 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 20 \text{ ppm} = 100 \cdot 2,5 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{250}{20}$$

$$V_1 = 12,5 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 2,5 ppm maka diencerkan larutan formalin 20 ppm sebanyak 12,5 mL dalam akuades 50 mL.

**e. Deret 3 ppm**

$$C_1 = 20 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 3 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 20 \text{ ppm} = 100 \cdot 3 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{300}{20}$$

$$V_1 = 15 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 3 ppm maka diencerkan larutan formalin 20 ppm sebanyak 15 mL dalam akuades 50 mL.

**d. Pembuatan Larutan Formalin 100 ppm dalam 100 mL dari larutan 1000**

**ppm Untuk Perendaman Ikan**

$$C_1 = 1000 \text{ ppm}$$

$$C_2 = 100 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$V_1 \dots ?$$

Penyelesaian :

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$V_1 \cdot 1000 \text{ ppm} = 100 \cdot 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{10.000}{1000}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL}$$

Jadi, untuk membuat larutan formalin 100 ppm maka diencerkan larutan formalin 1000 ppm sebanyak 10 mL dalam akuades 100 mL.



### Lampiran 5. Perhitungan Kadar Formalin Ikan Asin

Penentuan konsentrasi kadar formalin yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linear.

$$Y = 0,0757 x + 0,0068$$

$$Y = bx + a$$

a. Kadar formalin ikan asin


$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,2200-0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,2132}{0,0757} \right)$$

$$x = 2,8163 \times 10$$

$$x = 28,163$$



**Lampiran 6. Pembuatan Larutan Belimbing Wuluh Variasi pH dan Perhitungan Kadar Formalin Variasi pH**

a. Pembuatan Larutan Belimbing Wuluh Variasi pH

No.	Variasi pH	Perbandingan (Belimbing Wuluh : Akuades)
1.	2,0	1 : 0
2.	2,1	1 : 1
3.	2,2	1 : 2
4.	2,3	1 : 3
5.	2,4	1 : 4
6.	2,5	1 : 5

b. Perhitungan Kadar Formalin Ikan Asin Variasi pH

Penentuan konsentrasi kadar formalin yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linear untuk Variasi pH.

$$Y = 0,0757 x + 0,0068$$

$$Y = bx + a$$

a. pH 2,0

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0564 - 0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0496}{0,0757} \right)$$

$$x = 0,6552 \times 10$$

$$x = 6,552$$

b. pH 2,1

$$x = \left(\frac{y-a}{b}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0592-0,0068}{0,0757}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0524}{0,0757}\right)$$

$$x = 0,6922 \times 10$$

$$x = 6,922$$

c. pH 2,2

$$x = \left(\frac{y-a}{b}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0700-0,0068}{0,0757}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0632}{0,0757}\right)$$

$$x = 0,8348 \times 10$$

$$x = 8,348$$

d. pH 2,3

$$x = \left(\frac{y-a}{b}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0767-0,0068}{0,0757}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0699}{0,0757}\right)$$

$$x = 0,9233 \times 10$$

$$x = 9,233$$

e. pH 2,4

$$x = \left(\frac{y-a}{b}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0851-0,0068}{0,0757}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0783}{0,0757}\right)$$

$$x = 1,0343 \times 10$$

$$x = 10,343$$

f. pH 2,5


$$x = \left(\frac{y-a}{b}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0932-0,0068}{0,0757}\right)$$

$$x = \left(\frac{0,0864}{0,0757}\right)$$

$$x = 1,1413 \times 10$$

$$x = 11,413$$



### Lampiran 7. Perhitungan Kadar Formalin Variasi Lama Perendaman

Penentuan konsentrasi kadar formalin yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linear.

$$Y = 0,0757 x + 0,0068$$

$$Y = bx + a$$

a. 10 Menit

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0430-0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0362}{0,0757} \right)$$

$$x = 0,4782$$

$$x = 4,782$$

b. 15 Menit

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0577-0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0509}{0,0757} \right)$$

$$x = 0,6723 \times 10$$

$$x = 6,723$$

c. 20 Menit

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0593-0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0525}{0,0757} \right)$$



$$x = 0,6935 \times 10$$

$$x = 6,935$$

d. 25 Menit

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0646 - 0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0578}{0,0757} \right)$$

$$x = 0,7635 \times 10$$

$$x = 7,635$$

c. 30 Menit

$$x = \left( \frac{y-a}{b} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0785 - 0,0068}{0,0757} \right)$$

$$x = \left( \frac{0,0717}{0,0757} \right)$$

$$x = 0,9471 \times 10$$

$$x = 9,471$$



**Lampiran 8. Persentase Penurunan Kadar Formalin Ikan Asin Variasi pH dan  
Lama Perendaman**

a. Variasi pH (pH 2,0)

Dik : Konsentrasi awal formalin = 28,163

Konsentrasi akhir formalin = 6,552

Dit : % Penurunan ... ?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \% \text{ Penurunan} &= \frac{\text{Konsentrasi awal formalin} - \text{konsentrasi akhir formalin}}{\text{Konsentrasi awal formalin}} \times 100\% \\ &= \frac{28,163 - 6,552}{28,163} \times 100\% \\ &= 76,73 \% \end{aligned}$$

b. Variasi Lama Perendaman (10 Menit)

Dik : Konsentrasi awal formalin = 28,163

Konsentrasi akhir formalin = 4,782

Dit : % Penurunan ... ?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \% \text{ Penurunan} &= \frac{\text{Konsentrasi awal formalin} - \text{konsentrasi akhir formalin}}{\text{Konsentrasi awal formalin}} \times 100\% \\ &= \frac{28,163 - 4,782}{28,163} \times 100\% \\ &= 83,02 \% \end{aligned}$$

## DOKUMENTASI

### a. Pembuatan Asam Sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 60% dalam 100 mL



Memipet asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )



Memasukkan ke dalam labu takar



Menambahkan aquades ( $\text{H}_2\text{O}$ )

### b. Pembuatan Asam Kromatofat 0,5%



Menimbang 0,5 gr asam kromatofat



Menambahkan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  60%

### c. Pembuatan formalin 100 ppm dalam 100 mL



Dipipet 10 mL dari Formalin 1000 ppm



Dihimpitkan hingga tanda batas

## d. Pembuatan Ikan Asin Berformalin



Dicuci bersih ikan



Dipotong kecil-kecil



Ditimbang



Dibuat larutan garam



Ditambahkan pada ikan asin



Ditambahkan formalin



Direndam selama 24 jam



Dijemur



Hasil Ikan Asin

## e. Pembuatan Deret Standar



Larutan formalin  
1000 ppm



Larutan formalin  
20 ppm



Deret standar

## f. Uji Kadar Formalin



Menimbang sampel



Menambahkan H<sub>2</sub>O



Menyaring



Memipet sampel sebanyak  
2 mL



Menambahkan 2 mL  
asam kromatofat 0,5%  
dalam H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 60%



Memanaskan hingga  
berwarna ungu

g. Uji Pengaruh pH Terhadap Kadar Formalin pada Ikan Asin



Ditimbang ikan asin  
berformalin



Direndam dalam variasi  
pH



Dijemur



Dianalisis kadar  
formalinnya



Dianalisa dengan  
spektrofotometer UV-Vis

#### h. Uji Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Kadar Formalin pada Ikan Asin



Ditimbang ikan asin berformalin



Direndam dalam variasi waktu



Dijemur



Dianalisis kadar formalinnya



Dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis

## RIWAYAT HIDUP



Silka Ezsanita atau bisa dipanggil Silka, lahir di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 Oktober 1999, beliau adalah anak pertama dari pasangan bahagia Abd.Majid dan Emmi. Pada tahun 2005 menempuh pendidikan MI Serre. Setelah menamatkan SD, lanjut pada tahun 2011 di tingkat SMP di SMP Negeri 15 Bulukumba dan melanjutkannya di bangku SMA pada tahun 2014 di SMA Negeri 10 Bulukumba serta melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar jurusan Kimia Sains Fakultas Sains dan Teknologi. Pengalaman organisasi yang telah diikuti selama perkuliahan yaitu menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) Kimia periode 2020 dan pengurus komunitas bahasa “Mabbicara”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR  
MAKASSAR