

**ANALISIS SURVIVAL FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
LAJU KESEMBUHAN PASIEN PENDERITA DIARE DI RSUD H.
PADJONGA DG. NGALLE DENGAN REGRESI COX**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika (S.Mat) pada Program Studi Matematika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh:

ZAWIL QURBA
NIM : 60600115044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : Zawil Qurba

NIM : 60600115044

Jurusan : Matematika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Diare Di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dengan Regresi Cox.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan data, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber cuplikan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

M A K A S S A R

Samata-Gowa, Maret 2020
Yang membuat pernyataan

Zawil Qurba
NIM 60600115044

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis Survival Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Diare di RSUD H.Padjonga Dg.Ngalle dengan Regresi COX”, yang disusun oleh Saudara **Zawil Qurba**, Nim: **60600115044** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **20 Februari 2020 M**, bertepatan dengan **26 Jumadil akhir 1441 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S,Mat).

Makassar, 04 Agustus 2020 M
14 Zulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Wahidah Alwi S.Si.,M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibbas, S.Si.,M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irwan, S.Si.,M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd.,M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Irwan, S.Si.,M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adiatma, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh;
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami., M.Pd.
Nip: 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(QS. Ibrahim/14:7)

“Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain”

-Steve Jobs

“Orang yang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski bisa membalas dendam”

-Imam Husain

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan. Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasihku kepada: Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku Kedua saudaraku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku Dosen-dosen yang senantiasa membimbing Teman-teman PR15MA yang selalu memotivasi Almamaterku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum wr. wb

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kebesaran Allah swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Diare dengan Regresi Cox**“. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Muhammad SAW, beserta sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana S-1 (Sarjana Matematika) pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak dapat melakukannya sendiri melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibundaku yang tersayang **Hj. St. Saliati**, Saudara-saudaraku yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu, serta suamiku yang telah memberikan do'a dan dorongan moral maupun material serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada punulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A,Ph.D.** rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami,S.Ag.,M.Pd.**, dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si.,M.Si.**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu **Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.**, Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak **Muh. Irwan, S.Si., M.Si.**, Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Adiatma, S.Pd., M.Si.**, Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Irwan, S.Si., M.Si.**, Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.**, Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membagi ilmunya kepada penulis.
11. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan doa dorongan moral yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi “**PR15MA**” Matematika 2015, yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
13. Kepada semua pihak yang memberikan nasehat serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan, pahala dan rahmat dari Allah swt. Skripsi ini, tentunya jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya manusia tak luput dari kesalahan dan khilaf. Maka dari itu, saya

selaku penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik para pembaca. Olehnya itu, dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa hanya kepada Allah SWT jualah saya menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan rahmat dan ridho dari-Nya.Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Jurusan Matematika serta pembaca pada umunya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Makassar, Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI


SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SIMBOL	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Analisis Survival.....	9
B. Data Tersensor.....	9
C. Fungsi Densitas Peluang	11

D. Fungsi Survival.....	12
E. Fungsi Hazard.....	13
F. Distribusi Weibull	14
G. Regresi Cox Proportional Hazard.....	14
H. Estimasi Parameter.....	16
I. Pengujian Parameter.....	18
J. Hazard Ratio	19
K. Pengertian Diare	20
L. Etiologi Diare.....	20
M. Klasifikasi Diare	21
N. Gejala Diare.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Waktu dan Tempat Penelitian	22
C. Subyek Penelitian.....	22
D. Variabel Penelitian.....	22
E. Definisi Operasional Variabel	22
F. Jenis dan Sumber Data.....	23
G. Prosedur Penelitian	23
I. Kerangka Penelitian.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil.....	27

B. Pembahasan Penelitian	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Rekam Medik Pasien Penderita Diare.....	27
Tabel 4.2 Distribusi Variabel Independen Kategorik pada Data Pasien Penderita Penyakit Diare.....	31
Tabel 4.3 Tabel 4.3 Statistik Data Kuantitatif.....	32
Tabel 4.4 Nilai p-value Global Test.....	32
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Serentak untuk Semua Peubah.....	33
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Parsial untuk Semua Peubah.....	34
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Parameter Model Cox Proportional Hazard Terbaik...	36
Tabel 4.8 Nilai <i>Hazard Ratio</i>	36



DAFTAR SIMBOL

B	: Bilangan Riil
$f(t)$: Fungsi densitas
T	: Peubah acak malar
t	: Waktu
Δt	: Delta t
P	: Probabilitas atau Peluang
S	: Survival
h	: Hazard
Γ	: Gamma
n	: Bilangan bulat
∞	: Bilangan tak terhingga
e	: Bilangan euler
μ	: Nilai harapan
σ^2	: Nilai Variansi
λ	: Parameter <i>scale</i>
γ	: Parameter <i>shape</i>
Y	: Variabel terikat
X	: Variabel bebas
α	: Intersep
β	: Koefisien regresi
ε	: Nilai kesalahan
\hat{Y}	: Nilai penduga bagi variabel Y
b_0	: dugaan parameter konstanta
i	: Subscript untuk observasi

x : kovariat

L : *Likelihood*

e^β : Hazard *ratio*

Π : himpunan



ABSTRAK

Nama : Zawil Qurba
NIM : 60600115044
Judul : Analisis Survival Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju
Kesembuhan Pasien Penderita Diare Di RSUD H. Padjonga
Dg. Ngalle Dengan Regresi Cox

Diare merupakan suatu penyakit yang diandai dengan perubahan bentuk tinja yang cair, hal ini terjadi karena kandungan air di dalam tinja lebih dari 200 gram. Karena penyebarannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian, maka penelitian ini akan memodelkan waktu *survival*. Metode yang digunakan adalah *hazard proportional cox* atau biasa disebut metode regresi *cox*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasien penderita diare di RSUD Takalar. Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien penderita diare adalah usia, muntah, dehidrasi dan suhu badan masing-masing sebesar 0,15, -0,44, -0,45, -0,74. Dari nilai *hazard ratio* untuk usia disimpulkan bahwa laju kesembuhan pasien penderita diare dengan usia diatas 5 tahun lebih cepat 116% dibanding pasien dibawah 5 tahun. Pasien dengan frekuensi muntah yang besar, suhu badan yang tinggi dan mengalami dehidrasi memiliki kesempatan sembuh lebih kecil.

Kata Kunci : Analisis Survival, Cox PH, Hazard Ratio, Diare.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang utama bagi kehidupan manusia salah satunya adalah kesehatan. Gaya dan pola hidup yang tidak sehat bisa berakibat fatal karena penyakit bisa menyerang siapapun dan dimanapun. Saat ini banyak penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman serta faktor lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Lingkungan yang tidak bersih dan tercemar bisa mendatangkan berbagai penyakit, misalnya Diare.

Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan seringnya buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dan bentuknya yang cair, hal ini terjadi karena kandungan air di dalam tinja lebih dari 200 gram. Diare adalah penyakit mematikan dan berbahaya yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). *World Health Organization* (WHO) mencatat lebih dari 700.000 anak yang meninggal setiap tahun di dunia. Di Indonesia sendiri ada sekitar 29.000 pasien Diare yang meninggal dengan usia kurang dari 5 Tahun.¹ Penanganan yang lambat akan menyebabkan komplikasi diantaranya adalah gangguan keseimbangan cairan dan gangguan organ-organ tubuh. Angka kematian akibat diare yang meningkat setiap tahun biasanya disebabkan oleh *rotavirus* (virus yang menginfeksi usus) dan berbagai bakteri serta parasit.

¹Ilham Setiawan dan Luh Seri Ani, *Kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tembuku I Kabupaten Bangli Tahun 2016*, (Bali: *E-Journal Medika*, VOL.6 No. 5, 2016), Hal.13.

Diare menjadi berbahaya jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Pengetahuan dan peran ibu juga adalah hal yang paling diutamakan.

Pada Tahun 2013, hasil Riskesdas kejadian diare pada kelompok balita di Indonesia adalah 10% dan 8% diantaranya terdapat di Sulawesi Selatan. Hasil riset ini menjadikan Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat dengan jumlah kasus pada Tahun 2011 sebanyak 39.740 kasus, tahun 2012 sebanyak 29.265 kasus, tahun 2013 sebanyak 28.908 kasus, tahun 2014 sebanyak 26.485 kasus.² Beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak penyakit diare. Salah satu daerah dengan jumlah pasien diare tertinggi adalah kabupaten Takalar.

Penyakit Diare di Kabupaten Takalar merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Pada Tahun 2012 sebanyak 15.329 (131,3%) kasus yang ditangani dari 11.678 perkiraan, Tahun 2013 sebanyak 15.272 (127,2%) kasus yang ditangani dari 12.010 perkiraan, Tahun 2014 sebanyak 8.945 (73,7%) kasus.³

Penyakit diare yang menyerang anak dibawah umur 5 Tahun dapat dicegah dimulai dari pola hidup yang bersih dan sanitasi yang baik. Salah satu cara memberikan sanitasi yang baik pada balita, yaitu melalui ASI. ASI mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang belum diproduksi oleh bayi. Zat tersebut akan melindungi bayi dari berbagai macam infeksi. Al-Quran juga

²Humrah,dkk, *Gambaran Pengetahuan Ibu Balita Dalam Penanganan Awal Balita Diare di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa Tahun 2017*, (Makassar: Jurnal Bidan "Midwife-Journal" Vol. 5 No. 01, 2018) hal.2.

³*Profil Kesehatan Takalar Tahun 2014*, (Takalar:Dinas Kesehatan Takalar, 2015). Hal.20

telah menjelaskan beberapa konsep untuk mencegahnya dengan cara spritual, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْنَ ضِعْفَ أَوْ لَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادْتُمْ
 أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua Tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua Tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah(1): 233)⁴

Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini merupakan tuntunan dari Allah kepada para orang tua khususnya ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan penyusuan selama minimal 6 bulan. Allah mewajibkan ibu memberikan ASI kepada anaknya sebab ASI sangat berpengaruh dalam perkembangan anak dan dalam memenuhi gizi anak.⁵ Dari ayat tersebut dijelaskan secara tersirat bahwa salah satu cara pencegahan diare yang dapat

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Mizan BunayaKreativa, Bandung, 2012, hal. 581.

⁵Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004) hal. 7808

dilakukan adalah melalui ASI. ASI memiliki banyak manfaat. ASI mengandung antibodi imunoglobulin A (IgA) yang bisa mencegah patogen-patogen tidak masuk ke dalam tubuh. ASI berguna dalam meningkatkan imunitas anak. Sebanyak 1,5 juta anak di dunia meninggal karena diare pada Tahun 2004, 80% diantaranya adalah anak dibawah usia 2 Tahun. Di negara berkembang, morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) balita yang mengalami kekurangan asupan ASI meningkat.

Selain ASI, Islam juga memerintahkan kepada kita agar menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih bisa menghindarkan kita dari diare. Sebagaimana dengan hadits yang berbunyi kebersihan sebagian dari iman. Ketika kita menjaga kebersihan lingkungan maka kadar imannya ditingkatkan dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang konsep bersih dari makanan. Makanan yang jatuh itu kotor dan rentan terhadap kuman dan virus. Makanan yang jatuh harus dibuang agar kita terhindar dari diare.

Pasien penderita diare memiliki rentang waktu sembuh yang berbeda-beda, ada yang kurang dari 2 minggu adapula bahkan lebih dari 2 minggu, tergantung dari jenis diare yang dialami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan laju kesembuhan pasien yaitu faktor penderita, lingkungan dan virus. Karena laju kesembuhan pasien berbeda-beda, maka akan dilakukan pemodelan antara waktu survival dengan faktor penduga. Analisis yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien adalah analisis survival.

Analisis survival merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data tentang waktu bertahan hidup. Beberapa teori yang pernah membahas tentang analisis survival diantaranya yaitu *Kaplan-meier* dan regresi *cox*. Model regresi *cox proportional hazard* menjelaskan tentang pengaruh independen dalam suatu kejadian dimana faktor yang ingin diketahui yaitu ketahanan hidup pasien penderita Diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Auzan dengan menggunakan analisis Regresi Cox *Proportional Hazard* dengan pendekatan parameter *Breslow, Efron, dan Exact* untuk menganalisis pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, faktor yang mempengaruhi secara nyata adalah suhu, hemoglobin dan trombosit.⁶ Suci Eka Purnamasari dengan kasus penyakit diare dengan menggunakan regresi *cox proportional hazard* dan model log linear menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien rawat inap diare adalah usia dan dehidrasi.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini diterapkan metode regresi *cox* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien penderita diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang

⁶ Cynthia Hazirah Imanina, *Analisis Survival Terhadap Pasien Penyakit Ginjal Kronis dengan Menggunakan Cox Regression*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 9.

⁷ Reza Yusuf Bahtiar, *Analisis Lama Waktu Kesembuhan Pasien Diare dengan Pendekatan Efron Metode Regresi Cox Proportional Hazard*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 6

berpengaruh secara signifikan terhadap laju kesembuhan pasien penderita Diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap laju kesembuhan pasien penderita Diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat memperluas wawasan, penguasaan materi, pengaplikasian ilmu matematika yang telah diterima serta pengalaman yang berharga dalam bidang penelitian.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan tambahan informasi, bahan referensi serta sebagai salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi tentang regresi Cox di perpustakaan.

4. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk dijadikan tolak ukur dalam upaya pencegahan penyakit diare dan dalam menangani pasien yang di rawat inap.

E. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada 2 hal, yaitu:

1. Dikhususkan untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien penderita diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.
2. Data pada penelitian ini berasal dari data rekam medik pasien diare di RSUD H. Padjonga dg. Ngalle Tahun 2015-2016.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi rancangan ini, maka dapat dilihat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori dan konsep yang menjadi acuan dan pembahasan masalah yang akan diteliti dan memuat pembahasan materi tentang Analisis Regresi Cox.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, sumber data serta prosedur penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil dan pembahasan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Survival

Analisis survival adalah suatu metode statistik yang menggunakan data waktu antar kejadian. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan waktu survival, diantaranya yaitu waktu awal kejadian, kejadian khusus dan skala pengukuran yang jelas.⁸

Dalam analisis survival terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data lengkap, terjadi apabila semua individu yang diamati selama penelitian mengalami kejadian yang diinginkan (kegagalan). Ini disebut juga data tak tersensor.
2. Data tidak lengkap, terjadi apabila tidak semua individu yang diamati selama penelitian mengalami kejadian yang diinginkan sehingga sebagian waktu survival yang sebenarnya tidak diketahui. Ini disebut juga data tersensor.

B. Data Tersensor

Data yang tidak dapat diamati secara utuh karena subyek yang diteliti tidak lengkap disebut data tersensor yang disebabkan oleh:⁹

1. *Termination of the study*, yaitu ketika pengamatan terpaksa diberhentikan karena kematain atau hal lain.

⁸Alifa Silfi Mufidah dan Purhadi, *Analisis Survival Pada Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Haji Surabaya Menggunakan Model Regresi Weibull*, (Surabaya: Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 5 No. 2, 2016), hal. 1.

⁹Anita Maryama, *Model Regresi Satisfied Cox dan Extended Cox Untuk Mengatasi Non Proportional hazard*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016). hal. 8.

2. *Lost of follow up*, yaitu ketika objek menolak ikut serta atau pindah ataupun meninggal.
3. *Withdraws from the study*, yaitu ketika pengamatan dihentikan karena alasan lain.

Tipe penyensoran yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sensor Kiri

Sensor kiri terjadi jika subjek tidak teramati pada awal pengamatan, tetapi kejadian telah teramati sebelum penelitian berakhir.

2. Sensor Kanan

Sensor kanan terjadi jika subjek dapat teramati namun belum mengalami kejadian.

3. Sensor Interval

Sensor interval terjadi jika subjek dapat teramati dalam satu selang waktu tertentu.

Tipe data tersensor terbagi atas:

1. Tersensor Tipe I

Penelitian berakhir jika waktu pengamatan yang telah ditentukan tercapai. Penyensoran tunggal terjadi jika pengamatan setiap unit sama.

Penyensoran ganda terjadi jika pengamatan setiap unit berbeda.

2. Tersensor Tipe II

Penelitian berakhir jika beberapa kegagalan yang telah ditentukan tercapai. Data tersensor tipe ini sering digunakan pada data uji hidup.

3. Tersensor Tipe III

Penelitian ini terjadi jika setiap individu masuk ke dalam penelitian pada waktu yang berlainan.

C. Fungsi Densitas Peluang

Definisi 1.1

T adalah suatu peubah acak malar atau peubah acak yang berlangsung terus-menerus jika ada suatu fungsi tidak negatif f , yang terdefinisi untuk semua bilangan riil $t \in R$ dengan sifat

$$P(T \in B) = \int_B f(t) dt. \quad (2.1)$$

Untuk sembarang himpunan bilangan riil B .

Fungsi f ini dinamakan fungsi densitas peluang dari peubah acak malar T .

Definisi 1.2

Fungsi $f(t)$ adalah fungsi densitas peluang peubah acak malar T , yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan riil R , bila memenuhi:

$$1) \quad f(t) \geq 0, t \in R \quad (2.2a)$$

$$2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1 \quad (2.2b)$$

$$3) \quad p(a < T < b) = \int_a^b f(t) dt \quad (2.2c)$$

D. Fungsi Survival

Fungsi *survival* adalah fungsi yang menyatakan peluang suatu individu dapat bertahan hidup lebih dari waktu t . Jika T adalah variabel

random positif pada interval $[0, \infty]$ yang menunjukkan waktu individu sampai mengalami kejadian pada populasi, maka $S(t)$ dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :¹⁰

$$\begin{aligned} S(t) &= P(T \geq t) \\ &= \int_t^{\infty} f(x) dx \end{aligned} \quad (2.3)$$

Berdasarkan definisi fungsi distribusi kumulatif dari T , fungsi *survival* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S(t) &= P(T \geq t) \\ &= 1 - P(T \leq t) \\ &= 1 - F(t) \\ F(t) &= 1 - S(t) \\ \frac{d(F(t))}{dt} &= \frac{d(1 - S(t))}{dt} \\ f(t) &= -\frac{d(S(t))}{dt} \\ &= -S'(t) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Hubungan kepadatan peluang, fungsi distribusi kumulatif dari T dengan fungsi *survival*, yaitu:

$$f(t) = F'(t) = -S'(t) \quad (2.5)$$

¹⁰Indah Dewi Fitriani, 2018, "Analisis Regresi Coc Proportional hazard pada Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Studi Mahasiswa SI FMIPA Universitas Islam Indonesia

E. Fungsi Hazard

Fungsi *hazard* merupakan peluang kegagalan suatu individu pada selang waktu yang singkat $[t + \Delta t]$ untuk bertahan sampai waktu yang telah ditetapkan yaitu t .¹²

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t} = \frac{f(t)}{S(t)}. \quad (2.6)$$

Maka diperoleh hubungan:

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{f(t)}{S(t)} \\ &= \frac{-S'(t)}{S(t)} \\ &= \frac{d(-\ln S(t))}{dt}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Fungsi kumulatif *hazard*:

$$\begin{aligned} H(t) &= \int_0^t h(u) du \\ &= \int_0^t \frac{f(u)}{S(u)} du \\ &= \int_0^t \frac{d(-\ln S(u))}{du} du \\ &= (-\ln S(t) - (-\ln S(0))) \\ &= (-\ln S(t) - (-\ln 1)) \\ &= -\ln S(t) \end{aligned} \quad (2.8)$$

¹²Al Muqarram, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Regresi Cox (Studi Kasus: RSUD Labuang Baji)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), Hal. 14.

F. Distribusi Weibull

Fungsi *survival* untuk regresi *weibull* adalah:¹³

$$S(t | X) = \exp\left(-\left(f_{\lambda}(X; \beta)t\right)^{\alpha}\right), \quad (2.9)$$

Atau dapat ditulis

$$S(t | X) = \exp\left[-\exp\left(\frac{y - X\beta}{\sigma}\right)\right], \quad (2.10)$$

yang disebut fungsi *survival* distribusi *Extreme Value*, dengan parameter lokasi

$\mu = -X\beta$ dan parameter skala $\sigma = \frac{1}{\alpha}$. Estimasi parameter menggunakan

fungsi *likelihood* sebagai berikut:

$$L(\beta; \sigma) = \prod_{i=1}^n f(t_i, \theta | X_i)^{\delta_i} S(t_i, \theta | X_i)^{1-\delta_i} \quad (2.11)$$

G. Regresi Cox *Proportional hazard*

Asumsi pada regresi *Cox* adalah *proportional hazard* dua individu yang saling berbeda konstan. Persamaan regresi *Cox* berdistribusi semiparametrik karena tidak memerlukan distribusi khusus yang mendasari waktu *survival* untuk mengestimasi parameter regresi *Cox* tanpa harus menentukan fungsi *hazard* dasar.⁷

Jenis-jenis pengecekan asumsi *Proportional Hazard*, yaitu sebagai berikut :

1. Garis *survival* pada kurva *kaplan-meier* tidak saling berpotongan.
2. Garis *survival* pada *ln-ln survival* tidak saling berpotongan.

¹³Siti Alfiatur Rohmaniah dan Danardono, *Pemodelan Regresi Cox dan Regresi Weibull Waktu Sembuh Diare Pada Balita*, (Lamongan: Jurnal UJMC, Vol. 2 No.1), hal.51

3. Uji *Global Test*

Penelitian ini menggunakan pengecekan asumsi dengan uji *global test*. Awalnya pemodelan ini digunakan pada cabang statistika khususnya dibidang biologis dan organisme untuk menganalisis kematian seseorang. Namun seiring berkembangnya sistem teknologi, pemodelan ini banyak dimanfaatkan diberbagai bidang, diantaranya bidang kedokteran dan sains. Pada model *Cox* dapat dilihat hubungan antarvariabel bebas terhadap variabel terikat yaitu waktu *survival* melalui fungsi *hazardnya*.

Resiko kematian atau kegagalan individu pada waktu tertentu berdasarkan pada nilai x_1, x_2, \dots, x_p dari p variable bebas X_1, X_2, \dots, X_p . Himpunan nilai variabel bebas model *Cox* dipresentasikan oleh vektor x , sehingga $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$. Diasumsikan X merupakan variabel independen terhadap waktu. Rumus untuk model *Cox* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} h(t, X) &= h_0(t) \exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \\ &= h_0(t) \exp\left(\sum_i^p \beta_i X_i\right), \end{aligned} \quad (2.12)$$

dengan:

$h(t, X)$: Resiko kematian individu pada waktu t dengan karakteristik

X

$h_0(t)$: Fungsi *hazard* dasar

β_i : Parameter dari model regresi, dengan $i = 1, 2, \dots, p$

X_i : Nilai dari variabel independen dengan $i = 1, 2, \dots, p$

Variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_p) dikatakan memenuhi asumsi *proportional hazard* apabila nilai *hazard ratio* konstan sepanjang waktu. Meskipun dalam Persamaan *Cox proportional hazard* tidak diketahui bentuk fungsi $h_0(t)$, tetapi nilai parameter β dapat ditaksir. Penaksiran ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar efek dari variabel-variabel independen.¹⁰

H. Estimasi Parameter

Estimasi adalah menduga suatu karakteristik atau ciri dari populasi. Untuk menduga atau melakukan estimasi parameter, umumnya digunakan metode *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*. Jika terdapat n ukuran sampel dan diantaranya terdapat r amatan yang tidak tersensor dan $n-r$ amatan yang tersensor, maka urutan r waktu tahan hidup dinotasikan $t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(r)}$ dengan t_j adalah urutan waktu tahan hidup ke- j .¹⁴

Fungsi *likelihood* untuk regresi *Cox proportional hazard* adalah sebagai berikut:

$$L(\beta) = \prod_{j=1}^r \frac{\exp(\beta x_{(j)})}{\sum_{i \in R(t_j)} \exp(\beta' x_i)}, \quad (2.13)$$

dengan:

$L(\beta)$: penduga kemungkinan maksimum dari parameter β

$x_{(j)}$: Vektor variabel dari individu yang gagal pada saat waktu ke- j .

¹⁴Nurul Zulkhaila, *Analisis Model Persamaan Regresi Cox Proportional hazard Pada Data Status Gizi Balita Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekurangan Gizi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 24-25

$R(t_j)$: Himpunan individu yang masih hidup pada waktu ke- j .

x_i : Vektor variabel individu yang masih hidup dan merupakan elemen dari $R(t_j)$

β : Parameter dari model regresi yang akan diestimasi

Jika terdapat data yang terdiri dari n waktu tahan hidup yang dinotasikan t_1, t_2, \dots, t_n dan δ_i adalah nilai indikator kejadian sebagai berikut:¹⁵

$$\delta_i = \begin{cases} 0, & \text{individu yang tersensor} \\ 1, & \text{individu tidak tersensor} \end{cases} \text{ dengan } t_i = 1, 2, \dots, n$$

Maka fungsi *likelihood* Persamaan (2.13) dapat dinyatakan dalam

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{\exp(\beta' x_{(i)})}{\sum_{i \in R(t_i)} \exp(\beta' x_{(i)})} \right]^{\delta_i}, \quad (2.14)$$

Penduga dari β_i dinyatakan dengan $\hat{\beta}_i$. Dimana

$$\frac{\partial L(\beta)}{\partial \beta_i} = 0 \quad i=q, \dots, p \quad (2.15)$$

variansinya adalah:

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \left[-\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} L(\beta) \right]^{-1} \quad (2.16)$$

standar errornya adalah:

$$SE(\hat{\beta}) = \sqrt{\text{var}(\hat{\beta})}. \quad (2.17)$$

¹⁵Etri Amiani, *Analisis Data Ketahanan Hidup dengan Model Regresi Proporsional hazard*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hal.56

I. Pengujian Parameter

Beberapa cara dalam menguji signifikansi parameter adalah sebagai berikut:

1. Uji Serentak

Setelah model didapatkan, untuk mengetahui variabel independen berpengaruh secara signifikan apa tidak maka digunakan uji serentak yang dinotasikan dengan G. Statistik uji ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas p . Hipotesis yang digunakan yaitu:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_k \neq 0, \text{ dengan } k=1,2,3,4,5,6,7$$

Penolakan H_0 jika $G \geq \chi^2_{(\alpha, db=p)}$ atau $p - \text{value} \leq \alpha$ artinya minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap waktu *survival*.

Untuk menghitung nilai G, yaitu dengan rumus:

$$G = -2 \left[\ln L(0) - \ln L(\hat{\beta}_k) \right], \quad (2.18)$$

dimana:

$\ln L(0)$: *Log likelihood* dari model tanpa peubah bebas (model nol).

$\ln L(\hat{\beta}_k)$: *Log likelihood* dari model dengan peubah bebas.

2. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang tidak signifikan di dalam model. Jika variabel bebas ada yang tidak signifikan, maka perlu dilakukan reduksi terhadap peubah bebas tersebut. Hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0 : \beta_k = 0$, dengan $k=1,2,\dots,p$ (variabel bebas k tidak berpengaruh terhadap waktu *survival*)

$H_1 : \beta_k \neq 0$, dengan $k=1,2,\dots,p$ (variabel bebas k berpengaruh terhadap waktu *survival*)

Penolakan H_0 jika $W > \chi^2_{(1;db=p)}$ atau p-value $< \alpha$ yang artinya bahwa peubah bebas berpengaruh terhadap waktu *survival*.

Untuk menghitung nilai W yaitu:

$$W = \left| \frac{\overline{\beta}_k}{SE(\hat{\beta}_k)} \right|^2, \quad (2.19)$$

dimana:

$\hat{\beta}_k$: koefisien penduga parameter

$SE \hat{\beta}_k$: standar error penduga parameter $\hat{\beta}$

J. Hazard Ratio

Hazard ratio didefinisikan sebagai perbandingan kelajuan untuk satu individu dengan kelajuan untuk sekelompok individu berdasarkan nilai-nilai X mereka masing-masing. Misal X adalah peubah independen dua kategori, yaitu 0 dan 1. Hubungan antara peubah X dengan $h(t)$ dinyatakan dengan $h_0(t|x) = h_0(t)e^{\hat{\beta}x}$, maka: ¹⁴

$$HR = \frac{h_0(t)}{h_0(t)e^{\hat{\beta}}} = e^{-\hat{\beta}} \quad (2.20)$$

Nilai tersebut mempunyai arti bahwa tingkat kecepatan terjadinya *failure event* pada individu dengan kategori $x=0$ adalah sebesar $e^{-\hat{\beta}}$ kali individu dengan kategori $x=1$.

K. Pengertian Diare

Diare merupakan proses keluarnya tinja atau feses yang tidak normal, hal ini ditandai dengan peningkatan volume, keenceran, serta frekuensi proses buang air besar yang lebih dari tiga kali dalam sehari. Pada keadaan normal makanan yang ada di lambung dicerna menjadi bubur kimus kemudian diteruskan ke usus halus untuk diuraikan oleh enzim pencernaan. Setelah zat gizi diresorpsi ke dalam darah, sisa kimus dan sisa makanan yang sulit dicerna akan diteruskan ke usus besar.

L. Etiologi Diare

Penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi:¹⁶

- a. Faktor infeksi (enternal dan parenteral).
- b. Faktor malabsorpsi
- c. Faktor makanan yang basi dan beracun.
- d. Faktor psikologis yaitu rasa takut dan cemas.
- e. Faktor pendidikan maksudnya yaitu kurangnya pengetahuan atas morbiditas balita.
- f. Faktor umur artinya penyakit diare rentan terkena terhadap balita dibandingkan dengan orang dewasa.

¹⁶ Sitohang dan Sarimawati, *Hubungan PHBS dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung Tahun 2016*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016), hal. 22.

g. Faktor lingkungan.

h. Faktor gizi.

M. Klasifikasi Diare

Diare terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Penyebab yang ditimbulkan diare ini adalah dehidrasi.
2. Disentri, yaitu diare yang tinjanya disertai dengan darah. Penyebab yang ditimbulkan diare ini adalah penurunan berat badan.
3. Diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Penyebab yang ditimbulkan diare ini adalah penurunan berat badan.

N. Gejala Diare

Gejala Diare pada balita yaitu:¹⁷

1. Lemah
2. Malas minum
3. Balita menjadi gelisah
4. Suhu badan yang tinggi
5. Tinja yang berlendir dan mencair
6. Gangguan gizi
7. Muntaber
8. Penurunan kadar gula darah
9. Dehidrasi.

¹⁷Umiati, *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Diare pada Baalita di Wilayah Kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolalo Tahun 2009,2010, Universitas Muhammadiyah Surkarta.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2019 di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah data pasien penderita diare yang dirawat inap di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. T = Lama rawat inap
2. X_1 = Jenis Kelamin (0=Laki-laki, 1=Perempuan)
3. X_2 = Usia (0 jika < 5 Tahun dan 1 jika ≥ 5 Tahun)
4. X_3 = Muntah (0=Tidak, 1= Ya)
5. X_4 = Dehidrasi (0=Tidak, 1=Ya)
6. X_5 = Suhu badan (0= $36,5^{\circ}C - 37,5^{\circ}C$; 1= $> 37,5^{\circ}C$)

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lama rawat inap pasien (hari) adalah waktu survival yang dihitung berdasarkan lamanya pasien dirawat inap di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle hingga pasien diperbolehkan pulang.
2. Jenis kelamin adalah ciri khusus yang dimiliki pasien penderita penyakit diare yang dimiliki sejak lahir.
3. Usia pasien penderita penyakit diare dimulai dari waktu kelahiran hidup pertama hingga pada penelitian berlangsung berdasarkan status yang tercantum pada rekam medis.
4. Muntah adalah keluarnya kembali makanan dan minuman secara paksa yang telah masuk ke dalam perut melalui mulut.
5. Dehidrasi adalah suatu keadaan dimana pasien penderita penyakit diare kehilangan banyak cairan.
6. Suhu badan pasien penderita penyakit diare merupakan ukuran dari kemampuan tubuh menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas.

F. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari rekam medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.


G. Prosedur Penelitian


Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pasien penderita penyakit diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle.

2. Menganalisis karakteristik pasien penderita diare dengan membuat deskriptif dari waktu *survival* dan variabel prediktor.
3. Menguji asumsi proportional, apabila tidak sesuai maka dilakukan tahap kedua yaitu uji distribusi.
4. Menghitung nilai estimasi parameter.
5. Melakukan pemilihan model regresi *cox proportional hazard*.
6. Menguji signifikansi parameter dengan cara uji *partial likelihood ratio*.
7. Melakukan uji asumsi proportional, apabila variabel bebas memenuhi asumsi *proportional hazard* maka model akhir regresi cox disebut model *cox proportional hazard*. Apabila variabel bebas tidak memenuhi asumsi *proportional hazard* maka model akhir regresi cox disebut model *cox non proportional hazard*. Terdapat perbedaan fungsi *hazard* antar individu dalam model *Cox non proportional hazard*. Untuk mengatasinya, maka yang harus dilakukan adalah mengeluarkan variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi *proportional hazard* dari model dengan menggunakan model *Cox stratified*.
8. Melakukan interpretasi model regresi *cox proportional hazard* yang telah terbentuk.
9. Menarik kesimpulan dari hasil secara keseluruhan analisis data yang telah diolah.

I. Kerangka Penelitian





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data rekam medik pasien penderita diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar. Ada sebanyak 357 data seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Data Rekam Medik Pasien Penderita Diare

No.	JK	Usia	Muntah	Suhu Badan	Dehidrasi	WaktuSurv.	Status
1	0	0	1	1	0	6	1
2	0	1	0	0	1	1	1
3	0	0	0	0	1	6	1
4	1	1	1	1	0	5	1
5	1	1	1	1	0	4	1
6	1	0	0	1	1	5	1
7	0	0	0	1	0	4	1
8	0	0	0	1	0	3	1
9	0	0	1	1	1	3	1
10	0	0	0	1	0	5	1
11	0	0	1	1	0	5	1
12	1	0	0	1	0	5	1
13	0	0	1	0	0	3	1
14	0	0	1	1	1	5	1
15	1	0	0	1	0	3	1
16	0	0	1	1	0	4	1
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
356	1	0	1	1	0	4	1
357	1	0	0	1	0	3	1

Sumber :Data Primer Rekam Medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar


2. Distribusi Frekuensi Data

Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas tertentu yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Berikut adalah distribusi data variabel independen yang digunakan dalam penelitian:

1) Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa dari 357 pasien diare, 61% diantaranya berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 216 anak. Sedangkan pasien berjenis kelamin perempuan sebanyak 39% yaitu sebanyak 141 anak.


Gambar 4.1 Diagram Pie Penderita Diare Berdasarkan Jenis Kelamin



2) Usia

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa dari 357 pasien diare, 87% diantaranya adalah pasien berusia kurang dari 5 tahun, yaitu sebanyak 311 anak. Sedangkan pasien berusia lebih dari 5 tahun sebanyak 13% yaitu sebanyak 46 anak.


Gambar 4.2 Diagram Pie Penderita Diare Berdasarkan Usia



3) Muntah

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa pasien diare yang mengalami kejadian muntah lebih banyak 75% dari pasien yang tidak mengalami muntah, yaitu sebanyak 266 anak. Sedangkan pasien yang tidak muntah sebanyak 25% yaitu sebanyak 91 anak.

Gambar 4.3 Diagram Pie Penderita Diare Berdasarkan Muntah




4) Suhu Badan

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa pasien diare dengan suhu badan yang tinggi lebih banyak 78% dari pasien dengan suhu badan yang

rendah, yaitu sebanyak 277 anak. Sedangkan pasien dengan suhu badan yang rendah sebanyak 22% yaitu sebanyak 80 anak.


Gambar 4.4 Diagram Pie Penderita Diare Berdasarkan Suhu Badan



5) Dehidrasi

Berdasarkan gambar 4.5 diketahui bahwa pasien diare yang tidak mengalami dehidrasi lebih banyak 72% dari pasien yang mengalami dehidrasi, yaitu sebanyak 258 anak. Sedangkan pasien yang mengalami dehidrasi sebanyak 28% yaitu sebanyak 99 anak.

Gambar 4.5 Diagram Pie Penderita Diare Berdasarkan Dehidrasi



Tabel 4.2 Distribusi Variabel Independen Kategorik pada Data Pasien Penderita Penyakit Diare

	Kategori	Frekuensi
Jenis_Kelamin	0=Laki-Laki	216
	1=Perempuan	141
Usia	0 < 5 Tahun	311
	1 ≥ 5 Tahun	46
Muntah	0= Tidak	91
	1= Ya	266
Suhu_Badan	0 = 36,5°C - 37,5°C	80
	1 > 37,5°C	277
Dehidrasi	0=Tidak	258
	1=Ya	99

Sumber :Data Primer Rekam Medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar.

Pada Tabel 4.2 di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 216 orang penderita penyakit diare adalah laki-laki dan 141 orang adalah perempuan. Rentang usia penderita terbanyak adalah usia kurang dari 5 tahun, yaitu sebanyak 311 orang dan 46 orang dengan usia lebih dari 5 tahun. Dari 357 pasien, 266 orang diantaranya tidak mengalami muntah. Suhu badan penderita penyakit diare di atas suhu 37,5°C sebanyak 277 orang. Untuk kategori dehidrasi pada pasien penderita penyakit diare ada sebanyak 258 orang yang mengalami dehidrasi.

B. Pembahasan

Hasil yang telah diperoleh akan dibahas pada bagian ini mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien diare dan penerapan metode regresi *cox proportionsl hazard*.

1. Eksplorasi Data Kuantitatif

Eksplorasi data kuantitatif digunakan untuk mengetahui gambaran data dari masing-masing variabel independent yang bersifat kuantitatif. Berikut

adalah gambaran dari masing-masing variabel kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3 Statistik Data Kuantitatif

Variabel	Mean	St.Dev	Min	Max
Waktu Survival	3	1,59377	1	10

Sumber :Olahan data menggunakan ms. Excel

Pada Tabel 4.3 tersebut nampak bahwa rata-rata statistik untuk waktu survivalnya yaitu 3 hari, median 4 hari dan standar deviasi 1,5938 hari, lama waktu survival terpendek yaitu 1 hari dan terlama yaitu selama 10 hari.

2. Uji Asumsi *Proportional Hazard*

Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi *cox proportional hazard* yaitu asumsi *proportional hazard*. Asumsi *proportional hazard* berarti bahwa rasio fungsi *hazard* dari dua individu konstan dari waktu ke waktu atau sama dengan pernyataan bahwa fungsi *hazard* suatu individu terhadap individu yang lain adalah proporsional. Pengujian asumsi *proportional hazard* dalam penelitian ini menggunakan uji *global test* atau *Goodness Of Fit (GOF)*. Dari hasil *output*, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Nilai *p-value Global Test*

Variabel	<i>P-Value</i>
X_1	0,8118
X_2	0,6874
X_3	0,0836
X_4	0,4098
X_5	0,4347

Sumber :Olahan X_2 data menggunakan R

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa dari hasil *global test* untuk setiap peubah, masing-masing peubah memiliki nilai *p-value* $>0,05$, maka dapat disimpulkan asumsi *PH* terpenuhi untuk semua peubah-peubah bebas.

3. Estimasi Parameter Regresi *Cox Proportional Hazard*

Setelah mengetahui variabel-variabel yang telah memenuhi asumsi *proportional hazard*, selanjutnya dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan metode *Maksimum Likelihood Estimation (MLE)*. Pada pengujian parameter meliputi pengujian serentak dan pengujian parsial. Dari hasil *output* dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Serentak untuk Semua Peubah

<i>Likelihood Partial Test</i>	<i>P-Value</i>
49,89	0,001

Sumber :Olahan data menggunakan R

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.5 diasumsikan bahwa nilai *Likelihood Partial Test* sebesar 49,89, dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 $< 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa minimal ada salah satu peubah yang signifikan. Karena minimal ada satu, maka dilanjutkan dengan melakukan uji parsial. Pengujian *overall* ini merupakan pengujian serentak semua parameter dalam model regresi *cox proportional hazard* yang terbentuk. Hipotesis yang digunakan untuk pengujian secara serentak adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$ (secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

H_1 : minimal ada satu $\beta_j \neq 0$, untuk $j = 1, 2, \dots, p$ (minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen)

Perhitungan statistik uji G sebagai berikut :

$$\begin{aligned} G &= -2[\ln L_R - \ln L_f] \\ &= -2[-1745,2 - (-1720,3)] \\ &= 49,8 \end{aligned} \quad (4.1)$$

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Parsial untuk Semua Peubah

Variabel	Coef.	Exp (Coef.)	SE (Coef.)	Z	P-Value	Keputusan
X_1	0,17	1,19	0,11	1,57	0,12	Gagal Tolak H_0
X_2	0,15	1,17	0,06	2,38	0,02	Tolak H_0
X_3	-0,44	0,65	0,13	-3,45	0,00057	Tolak H_0
X_4	-0,42	0,65	0,12	-3,39	0,00068	Tolak H_0
X_5	-0,74	0,48	0,14	-5,44	0,0000005	Tolak H_0

Sumber : Olahan data menggunakan R

$$h(t, X) = h_0(t) \exp(0,17X_1 + 0,15X_2 - 0,44X_3 - 0,42X_4 - 0,74X_5) \quad (4.2)$$

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian parsial, terlihat bahwa peubah yang memiliki $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, yaitu variabel X_2 , X_3 , X_4 , X_5 . Uji parsial untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk uji parsial adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_j = 0$, dengan $j = 1, 2, \dots, p$ (variabel bebas j tidak berpengaruh terhadap waktu *survival*)

$H_1: \beta_j \neq 0$, dengan $j = 1, 2, \dots, p$ (variabel bebas j berpengaruh terhadap waktu *survival*)

Daerah penolakan dari uji parsial ini adalah tolak H_0 jika $|Z| > Z_{\alpha/2}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Jika H_0 ditolak maka $\beta_j \neq 0$, berarti menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap waktu *survival* atau variabel dependennya. Merujuk pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa diperoleh keputusan tolak H_0 untuk variabel X_2 (Usia), X_3 (Muntah), X_4 (Suhu Badan), X_5 (Dehidrasi) yang artinya variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laju kesembuhan pasien penderita penyakit Diare di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle. Sedangkan untuk variabel independen X_1 (Jenis Kelamin) diperoleh keputusan gagal tolak H_0 yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel.

4. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan variabel yang masuk atau keluar dari model dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu seleksi *forward*, eliminasi *backward*, dan prosedur *stepwise*. Pada penelitian ini digunakan metode eliminasi *backward*. Eliminasi *backward* ini dihentikan apabila semua variabel yang masuk ke dalam model sudah signifikan. Hasil estimasi parameter dari pemodelan terbaik regresi *cox proportional hazard* dengan menggunakan metode eliminasi *backward* dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Parameter Model *Cox Proportional Hazard* Terbaik

Variabel	Coef	Exp(Coef)	SE(Coef)	Z	P-Value	Keputusan
X_2	0,15	1,16	0,07	2,24	0,03	Tolak H_0
X_3	-0,44	0,64	0,13	-3,46	0,0005	Tolak H_0
X_4	-0,45	0,64	0,12	-3,67	0,0002	Tolak H_0
X_5	-0,74	0,48	0,14	-5,54	0,00000	Tolak H_0

Sumber :Olahan data menggunakan R

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.6 di atas, maka didapatkan model akhir atau model terbaik sebagai berikut :

$$h(t,X) = h_0(t)exp(0,15X_2 - 0,44X_3 - 0,45X_4 - 0,74X_5) \quad (4.3)$$

5. Hazard Ratio

Untuk mengetahui laju kesembuhan pasien penderita diare dapat dilihat dengan mencari nilai *hazard rasio* dari peubah-peubah yang masuk dalam model terbaik. Berikut ini hasil *hazard ratio*:

Tabel 4.8 Nilai Hazard Ratio

Variabel	Coef	Hazard Ratio
X_2	0,15	0,86
X_3	-0,44	1,55
X_4	-0,45	1,56
X_5	-0,74	2,09

Sumber :Olahan data menggunakan R

Berdasarkan tabel 4.7, nilai *hazard ratio* tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko (kegagalan) yang dapat dilihat dari perbandingan antar individu.

6. Interpretasi Model Regresi *Cox Proportional Hazard*

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metode eliminasi *backward* didapatkan model terbaik regresi *cox proportional hazard* sebagai berikut :

$$h(t,X) = h_0(t) \exp(0,15X_2 - 0,44X_3 - 0,45X_4 - 0,74X_5) \quad (4.4)$$

Pada persamaan (4.4) di atas terdapat nilai $\exp(\beta_j)$ yang menunjukkan nilai risiko kegagalan (*hazard ratio*) dari masing-masing variabel independen. *Hazard ratio* dari masing-masing variabel independen tersebut dapat diinterpretasikan dengan merujuk pada nilai *Coef.* dan $\exp(\text{Coef.})$ pada tabel 4.8 sebagai berikut :

- a. Pada variabel usia memiliki pengaruh positif. Nilai *hazard ratio* ini menyatakan bahwa pasien yang berusia lebih dari 5 tahun semakin menambah peluang pasien untuk sembuh, yaitu sebesar 86%.
- b. Pada variabel muntah memiliki pengaruh negatif. Nilai *hazard ratio* ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya kadar muntah, maka pasien memiliki risiko kematian lebih besar sebesar 155%.
- c. Pada variabel suhu badan memiliki pengaruh negatif. Nilai *hazard ratio* ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya tingkat suhu badan, maka pasien memiliki risiko kematian lebih besar sebesar 156%.

- d. Pada variabel dehidrasi memiliki pengaruh negatif. Nilai *hazard ratio* ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya tingkat dehidrasi, maka pasien memiliki risiko kematian lebih besar sebesar 209%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka didapatkan beberapa kesimpulan berikut :

1. Penduga model regresi *cox proportional hazard* dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi laju kesembuhan pasien penyakit diare adalah sebagai berikut :

$$h(t,X) = h_0(t) \exp(0,15X_2 - 0,44X_3 - 0,45X_4 - 0,74X_5)$$

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien penyakit Diare menurut penelitian yang telah dilakukan adalah usia, muntah, suhu badan dan dehidrasi.
3. *Hazard ratio* dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap laju kesembuhan pasien penyakit Diare adalah :
 - a. Usia pasien penyakit diare lebih dari 5 tahun lebih cepat sembuh dibandingkan pasien yang berusia kurang dari 5 tahun.
 - b. Pasien yang mengalami muntah lebih lama sembuh dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami muntah.
 - c. Pasien dengan suhu badan yang tinggi lebih lama sembuh dibandingkan dengan pasien dengan suhu badan yang rendah.
 - d. Pasien yang mengalami dehidrasi lebih lama sembuh dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami dehidrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya dengan metode dan kasus yang sama, diharapkan peneliti menambah variabel-variabel independen lainnya.
2. Analisis ini dapat digunakan sebagai referensi pada bidang ilmu kesehatan terutama pada penyakit diare. Namun harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Alifa Silfi Mufidah. Puhadi. 2016. *Analisis Survival Pada Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Haji Surabaya Menggunakan Model Regresi Weibull*. Surabaya: Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 5 No. 2.
- Amiani, Etri. 2018. *Analisis Data Ketahanan Hidup dengan Model Regresi Proportional hazard*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Dewi Fitriani, Indah. 2018. *Analisis Regresi Coc Proportional hazard pada Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Studi Mahasiswa S1 FMIPA Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan.
- Fahmi Utami, Nurfadhila. 2017. *Analisis Survival dengan Pemodelan Regresi Cox Proporsional Hazard (Kasus: Pasien Rawat Inap DBD di RSUD Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Hazirah Imanina, Cynthia. 2018. *Analisis Survival Terhadap Pasien Penyakit Ginjal Kronis dengan Menggunakan Cox Regression*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Humrah,dkk. 2018. *Gambaran Pengetahuan Ibu Balita Dalam Penanganan Awal Balita Diare di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa Tahun 2017*. Makassar: Jurnal Bidan "Midwife-Journal" Vol. 5 No. 01, 2018
- Kementerian Agama R.I.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2012. Bandung : PT. Mizan Bunaya Kreativa.
- Maryama, Anita. 2016. *Model Regresi Satisfied Cox dan Extended Cox Untuk Mengatasi Non Proportional hazard*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
- Muqarram, Al. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Regresi Cox (Studi Kasus: RSUD Labuang Baji)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Profil Kesehatan Takalar Tahun 2014*. 2015. Takalar: Dinas Kesehatan Takalar, 2015.
- Rohmaniah, Siti Alfiatur. Danardono. 2018. *Pemodelan Regresi Cox dan Regresi Weibull Waktu Sembuh Diare Pada Balita*. Lamongan: Jurnal UJMC, Vol. 2 No.1.
- Setiawan, Ilham. Seri Ani, Luh. 2016. *Kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tembuku I Kabupaten Bangli Tahun 2016*. Bali: E-Journal Medika, VOL.6 No. 5, 2016.

- Sitohang, Sarimawati. 2016. *Hubungan PHBS dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung Tahun 2016*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Umiati. 2010. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Diare pada Baalita di Wilayah Kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolalo Tahun 2009*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusuf Bahtiar, Reza. 2018. *Analisis Lama Waktu Kesembuhan Pasien Diare dengan Pendekatan Efron Metode Regresi Cox Proportional Hazard*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Zukhaila, Nurul . 2016. *Analisis Model Persamaan Regresi Cox Proportional hazard Pada Data Status Gizi Balita Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekurangan Gizi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

