

**ANALISIS KADAR MERKURI (Hg) PADA SEDIAAN KRIM PEMUTIH
YANG BEREDAR DI PASARAN KOTA MAKASSAR DENGAN
MENGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh

**ANDI IMA KUSUMAWATI MARDIN
70100108010**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2012
Penulis

Andi Ima Kusumawati Mardin
70100108010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis Kadar Merkuri (Hg) pada Sediaan Krim Pemutih yang Beredar Di Pasaran Kota Makassar dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom yang disusun oleh Andi Ima Kusumawati Mardin, NIM: 70100108010, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 bertepatan dengan 6 Ramadhan 1433 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Makassar, 26 Juli 2012 M
06 Ramadhan 1433 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr.dr. H.Rasjidin Abdullah, MPH.,MH. Kes** (.....)
Sekretaris : (.....)
Pembimbing I : **Haeria, S.Si.,M.Si** (.....)
Pembimbing II : **Isriany Ismail, S.Si, M.Si., Apt** (.....)
Penguji I : **Gemy Nastity Handayani, S.Si, M. Si, Apt.** (.....)
Penguji II : **Drs.H.Muhammad Kurdi, M.HI** (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr.dr. H.Rasjidin Abdullah, MPH.,MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang pantas diucapkan oleh lisan seorang hamba kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan pertolongan-Nya skripsi dengan judul “Analisis Kadar Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih yang Beredar Di Pasaran Kota Makassar Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom” dapat kami selesaikan sesuai dengan rencana. Dialah Dzat yang memberikan kita karunia, rahmat, banyak nikmat yang tak pernah pudar yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, sang *khatamulanbiya'*, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh menapaki risalahnya yang paripurna hingga akhir zaman. *Ammaba'du.*

Skripsi dengan judul “Analisis Kadar Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih yang Beredar Di Pasaran Kota Makassar Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H.Andi Mardin,S.Pd.,M.Si. dan Ibunda Hj.Nurhayati,S.Pd, serta adik tersayang Andi Irmawati Mardin yang terus

menerus memberikan doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para staf pada fakultas kesehatan.
4. Ibu Haeria S.Si.,M.Si Selaku Pembimbing pertama dan Isriany Ismail S.Si, M.Si, Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Gemy Nastity Handayany,S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan fikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
6. Bapak Drs.H.Muhammad Kurdi,M.HI Selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa - apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
7. Ibu Dra.Hj.Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. sebagai Kepala Lab.Terpadu UIN Alauddin, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan sekaligus

pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.

8. Bapak,Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kakak Awaluddin IP sebagai Analis di Laboratorium Riset dan kakak Anna sebagai Laboran di Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
10. A.Welatemmasonge Yafid atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008, Kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa jurusan farmasi atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangatlah diperlukan, mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Amin, ya Robbal Alamin!

Makassar, Juli 2012


Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Uraian Kulit.....	6
1. Anatomi Kulit	6
2. Fisiologi Kulit	10
B. Uraian Kosmetik Perawatan	15
C. Uraian Merkuri	17
D. Uraian Spektrofotometer Serapan Atom	23
E. Uraian Bahan	34
F. Tinjauan Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Alat dan Bahan.....	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Analisis Kandungan Hg dalam Sampel	45
1. Pengambilan Sampel.....	45
2. Uji Kualitatif	45

3. Uji Kuantitatif.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
<i>A. Hasil</i>	48
<i>B. Pembahasan</i>	49
BAB V PENUTUP.....	56
<i>A. Kesimpulan</i>	56
<i>B. Saran</i>	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data pengujian kualitatif logam merkuri dengan pereaksi FeCl_3	47
2. Kadar Merkuri (Hg) dalam sampel sediaan krim pemutih	48
3. Data pengukuran standar merkuri (Hg).....	76
4. Data pengukuran logam merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih..	77



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Struktur kulit	6
2. Peralatan Spektrofotometer Serapan Atom	26
3. Skema kerja pembuatan kurva baku	60
4. Skema kerja analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih secara spektrofotometer serapan atom.....	61
5. Kurva baku logam merkuri (Hg)	76
6. Persentasi kadar merkuri (Hg) dalam sampel krim pemutih	77
7. Sampel krim pemutih yang diperoleh dari beberapa pasar di kota Makassar.....	78
8. Hasil penimbangan sampel dan proses ekstraksi sampel	78
9. Pengujian kualitatif dan penentuan kadar dengan SSA	78

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Skema Kerja pembuatan kurva baku	60
2. Skema kerja analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih secara spektrofotometer serapan atom	61
3. Perhitungan bahan	62
4. Perhitungan kadar merkuri (Hg) dalam sampel krim pemutih	63
5. Pengukuran standar merkuri	64
6. Pengukuran logam merkuri dalam sediaan sampel krim pemutih	76
7. Foto Pengujian kualitatif dan kuantitatif dengan SSA	78



ABSTRAK

Nama : Andi Ima Kusumawati Mardin
NIM : 70100108010
Jurusan : Farmasi
Judul : “Analisis Kadar Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih yang Beredar Di Pasaran Kota Makassar Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom”

Telah dilakukan penelitian tentang analisis kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran Kota Makassar dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran kota Makassar dan bagaimana keamanan sediaan krim pemutih yang sesuai dengan PERMENKES dan Badan POM serta pandangan Islam mengenai penggunaan merkuri dalam sediaan krim pemutih. Dalam penelitian ini menggunakan lima sampel krim pemutih yang diambil dari beberapa pasar di kota Makassar yang diperoleh secara acak. Pengukuran kadar merkuri dalam sampel menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 253,7 nm, sampel dilarutkan dengan cara dekstruksi basah untuk menghilangkan zat-zat organiknya sebelum dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya logam merkuri (Hg) yang terkandung dalam krim pemutih dengan kadar masing-masing adalah sampel A yaitu 1,875%, sampel B yaitu 1,015%, sampel C yaitu 1,355%, sampel D yaitu 1,395% dan sampel E yaitu 0,695%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya logam merkuri (Hg) yang terkandung dalam sampel menandakan bahwa krim pemutih yang digunakan sebagai sampel penelitian ini tidak aman untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam PERMENKES tahun 1998 dan Keputusan Badan POM tentang kosmetik, dan menurut pandangan Islam penggunaan merkuri dalam sediaan krim pemutih dilarang karena dapat berakibat buruk bagi manusia.

ABSTRACT

Name : Andi Ima Kusumawati Mardin
No.Reg.Student : 70100108010
Study Program : Farmasi
Title : “Analysis of Mercury (Hg) in preparation Lightening Cream on the market Makassar Using Atomic Absorption Spectrophotometric Method”

The research analysis of mercury (Hg) in the preparation of bleaching creams on the market Makassar using Atomic Absorption Spectrophotometric method. The purpose of this study to determine levels of mercury (Hg) in the preparation of bleaching creams on the market town of Makassar and how the security preparations in accordance with the whitening cream PERMENKES and POM and the Islamic view regarding the use of mercury in the preparation of bleaching creams. In this study using five samples of whitening creams are drawn from several markets in the city of Makassar is obtained randomly. In this study using an atomic absorption spectrophotometer, the sample is dissolved by wet destruksi to remove organic substances prior to analysis using atomic absorption spectrophotometer. The results indicate the presence of metallic mercury (Hg) contained in the bleaching cream with each level of sample A which is 1.875%, sample B is 1.015%, sample C is 1.355%, sample D 1.395% and sample E is 0.695%. From these results it can be concluded that the presence of metallic mercury (Hg) contained in the sample indicates that the bleaching creams are used as the sample is not safe for use as contained in the Health Minister in 1998 and POM Decisions about cosmetics and according to Islamic point of view the use of mercury in the preparation of bleaching cream is prohibited because it can be bad for humans..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk pemutih wajah ramai diperbincangkan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar aman untuk digunakan. Penelitian yang dilakukan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) pada bulan April tahun 2002 terhadap 27 produk pemutih wajah dan anti kerut yang beredar di pasaran, ternyata kebanyakan dari produk tersebut masih dalam kategori obat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari 20 merk yang dijadikan sampel yang diteliti menunjukkan ada lima merk kosmetik pemutih wajah yang telah terdaftar tetapi masih mengandung merkuri, meskipun kadarnya kecil. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI (BALITBANG DEPKES RI) telah melakukan penelitian kandungan merkuri dalam rambut pemakai krim pemutih kulit dan diperoleh kadar merkuri dengan jumlah relatif tinggi (Rina.M,2007; 96-97).

Merkuri merupakan bahan aktif yang ditambahkan dalam krim pemutih yang dapat menghambat pembentukan melanin pada kulit. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, bahan tersebut memiliki efek toksik yang berbahaya. Pemakaian merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai

hal (reaksi negatif), mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi pada kulit, serta pemakaian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kerusakan permanen pada otak dan gangguan perkembangan janin (Rina.M,2007;97).

Penggunaan merkuri pada produk krim pemutih wajah dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Logam ini dapat terakumulasi pada organ tubuh, dan merupakan salah satu logam berat yang sangat beracun. Pengaruh utama yang ditimbulkan oleh merkuri di dalam tubuh adalah menghalangi kerja enzim dan merusak selaput dinding sel. Keadaan ini disebabkan karena kemampuan merkuri dalam membentuk ikatan kuat dengan gugus yang mengandung belerang (sulfur) yang terdapat di dalam enzim atau dinding sel. Merkuri yang terkandung dalam krim pemutih dapat masuk ke dalam tubuh dengan jalan terserap melalui kulit. Pemakaian krim pemutih yang mengandung merkuri akan menjadikan kulit putih mulus, namun kemudian akan mengendap di bawah kulit dan setelah bertahun-tahun kulit akan menjadi biru kehitaman bahkan dapat memicu timbulnya kanker. Mengingat bahaya logam toksik dalam tubuh maka perlu dilakukan penelitian logam toksik dalam krim pemutih wajah. Krim yang banyak beredar dipasaran dijual dengan harga terjangkau oleh masyarakat luas dan memberikan efek memutihkan yang cepat. Tetapi krim tersebut biasanya tidak mencantumkan kandungan bahan kimia, penandaan, peringatan, efek samping, tanggal kedaluwarsa (Azhara,2011;56-57).

Bertahun-tahun lamanya *ammoniated mercury* 1-5 persen dalam ointment direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pereduksi (pemucat) warna kulit. Penggunaan kosmetik pemutih kulit yang berisi merkuri di Indonesia meningkat dan populer di kalangan keturunan Cina. Kosmetik pemutih ini datang dari Cina dan disebut *pearl cream* (krim mutiara), digunakan sebagai *foundation* atau *night cream*. Daya pemutihnya terhadap kulit sangat kuat. Tetapi pemerintah Indonesia terpaksa melarang peredaran kosmetik pemutih berisi merkuri tersebut karena ternyata toksisitasnya terhadap organ-organ tubuh seperti ginjal, saraf dan sebagainya, sangat besar (Iswari,2007;47).

Masyarakat umumnya menggunakan produk kosmetik tanpa mengetahui terlebih dahulu kandungan dan efek samping dari produk tersebut, karena masyarakat cenderung melihat efeknya yang secara cepat dapat memberikan hasil seperti memutihkan kulit. Oleh karena itu, oknum-oknum tertentu membuat suatu produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang memberikan efek yang instan namun berbahaya dan dapat memberikan efek yang toksik apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti logam merkuri.

Analisis logam merkuri dalam krim pemutih ini menggunakan alat ukur spektrofotometer serapan atom dengan pertimbangan bahwa alat ini merupakan alat yang dapat mengukur kadar logam dalam jumlah yang sangat kecil dengan hasil yang akurat, menggunakan lampu katoda Hg berongga

sehingga akan memancarkan energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom.

Berdasarkan alasan tersebut maka dilakukan penelitian terhadap logam Hg pada beberapa produk kosmetik krim pemutih wajah yang ada di pasaran yang beredar di Makassar dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sediaan krim pemutih yang beredar di pasar tradisional kota Makassar mengandung logam merkuri (Hg)?
2. Berapa kadar Merkuri (Hg) yang terkandung dalam sediaan Krim Pemutih yang beredar di pasar tradisional kota Makassar dan bagaimana keamanan sediaan krim pemutih yang sesuai dengan PERMENKES dan Badan POM?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran kota Makassar mengandung merkuri (Hg).
2. Mengetahui kadar merkuri yang terkandung dalam sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran kota Makassar.
3. Mengetahui pandangan Islam terhadap penggunaan sediaan krim pemutih.

D. *Manfaat Penelitian*

Dari penelitian yang dilakukan akan diperoleh data dan informasi kadar logam berat Merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih yang beredar di pasaran sekitar kota Makassar yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pemilihan kosmetik khususnya krim pemutih dan kepada pemerintah sebagai masukan bagi pengambil keputusan suatu instansi/institusi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan izin produk.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Kulit

1. Anatomi Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang telah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar (Iswari,2007;11).



Gambar 1. Struktur Kulit (Syaifuddin,1997;37)

Secara garis besar, kulit dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu :

a. Epidermis

Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang menarik karena kosmetik dipakai pada lapisan ini, meskipun ada beberapa jenis kosmetik yang digunakan sampai ke dermis, namun tetap penampilan epidermis yang menjadi tujuan utama. Pada epidermis terdapat 4 lapisan, yaitu (Balsam M.S,1972;365):

1) Lapisan tanduk (stratum korneum)

Terdiri atas beberapa lapis sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak memiliki proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian terdiri dari keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit akan melepaskan diri untuk beregenerasi. Permukaan stratum korneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembab tipis yang bersifat asam, disebut mantel asam kulit.

2) Lapisan jernih (stratum lucidum)

Terletak tepat di bawah stratum korneum, merupakan lapisan yang tipis, jernih, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan kaki.

3) Lapisan berbutir-butir (stratum granulosum)

Tersusun oleh sel-sel keratinosit, berbutir kasar, berinti mengkerut.

4) Lapisan malphigi (stratum spinulosum)

Memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filament-filament kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limpha masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini.

5) Lapisan basal (stratum germinativum)

Adalah lapisan terbawah epidermis. Didalam lapisan ini juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrite-dendritenya.

b. Dermis (Korium, kulit jangat)

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang berada dalam substansi dasar yang bersifat koloid. Serabut kolagen dapat mencapai 72 persen dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak.

Didalam lapisan dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak di bawah kulit (subkutis/hypodermis).

c. Subkutis

Lapisan ini merupakan kelanjutan dari lapisan dermis. Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel-sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah.

Fungsi Biologis Kulit

a. Fungsi Proteksi

Kulit melindungi bagian dalam tubuh manusia terhadap gangguan fisik maupun mekanik.

b. Fungsi Termoregulasi

Kulit mengatur suhu tubuh melalui mekanisme dilatasi dan konstriksi pembuluh kapiler dan melalui perspirasi yang keduanya.

c. Fungsi Persepsi Sensoris

Kulit bertanggungjawab sebagai indera terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu, dan nyeri melalui beberapa reseptor. Rangsangan dari luar diterima oleh reseptor-reseptor tersebut dan diteruskan ke sistem saraf pusat dan selanjutnya diinterpretasikan oleh korteks serebri.

d. Fungsi Absorpsi

Beberapa bahan dapat diabsorpsi kulit masuk ke dalam tubuh melalui 2 jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjar sebacea. Material yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorpsi disbanding air dan material yang larut dalam air (Schwartz,ebook).

2. Fisiologi Kulit

a. Pernafasan kulit

Sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya, kulit juga bernafas (respirasi), menyerap oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Namun, respirasi kulit sangatlah lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah, dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan luar (udara). Begitu pula dengan karbondioksida yang dikeluarkan, lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan yang diembuskan langsung ke udara (Iswari, 2007; 18).

Meskipun pengambilan oksigen oleh kulit hanya 1,5 persen dari yang dilakukan oleh paru-paru, dan kulit hanya membutuhkan 7 persen dari kebutuhan oksigen tubuh (4 persen untuk epidermis dan 3 persen untuk dermis), pernafasan kulit tetap merupakan proses fisiologis kulit yang penting.

Bahan-bahan yang menstimulasi pernafasan kulit adalah ekstrak ragi, ekstrak placenta, asam panthotenat, asam boraks, vitamin A & D, air mawar, hidrokortison, neomycin, bacitracin dan pasta zinc. Sementara bahan-bahan yang menekan atau mengurangi pernafasan kulit adalah bahan pengawet, bahan antiseptik, asam lemak, fluorida, butil alkohol, ammoniated mercury, asam benzoate, asam salisilat, sulfur, coal tar (Iswari, 2007; 19).

b. Mantel asam kulit

Marchionini (1929) menemukan bahwa stratum corneum dilapisi oleh suatu lapisan tipis lembab yang bersifat asam, sehingga ia menamakannya sebagai “mantel asam kulit” dan memiliki tingkat keasaman (pH) berkisar antara 4,5 sampai 6,5.

Ada tiga fungsi pokok mantel asam kulit, yaitu

- 1) Sebagai penyangga (buffer) yang berusaha menetralkan bahan kimia yang terlalu asam atau terlalu alkalis yang masuk ke kulit.
- 2) Membunuh dengan sifat asamnya atau setidaknya menekan pertumbuhan mikroorganisme yang membahayakan kulit.
- 3) Dengan sifat lembabnya sedikit banyak mencegah kekeringan kulit.

Karena itu hendaknya pH kosmetik diusahakan sama atau mendekati pH fisiologis mantel asam kulit, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kosmetik demikian disebut kosmetik dengan “*pH-balanced*”.

c. Mantel lemak kulit

Sebum dipermukaan kulit merupakan lapisan lemak yang sebagian besar berasal dari kelenjar sebacea dan sebagian kecil berasal dari lemak sel-sel epidermis disebut “mantel lemak kulit”, yang terdiri atas trigliserida, asam-asam lemak, squalene, wax, kolesterol dan ester-esternya, fosfolida, dan parafin. Bahan utama

dalam lemak kelenjar sebacea adalah squalene, sedangkan lemak epidermis adalah kolestrol.

d. Sistem pengaturan air kulit

Permeabilitas kulit terhadap air sangat terbatas. *Barrier* yang mengatur keluarnya air dari kulit dan masuknya air ke dalam kulit tidak terletak langsung di bawah permukaan kulit, tetapi ada di bawah lapisan stratum corneum yang diberi nama *barrier Rein*.

Untuk fungsi fisiologisnya, kulit memerlukan lemak dan air, keduanya berhubungan secara erat. Lapisan lemak di permukaan kulit dan bahan-bahan dalam stratum corneum yang bersifat higroskopis, dapat menyerap air, dan berada dalam hubungan yang fungsional, disebut *Natural Moisturizing Factor* (NMF). Kemampuan stratum corneum untuk mengikat air sangat penting bagi fleksibilitas dan pelenturan kulit (Iswari,2007;23).

e. Permeabilitas dan penetrasi kulit

Reaksi positif kulit terhadap pemakaian kosmetik merupakan hal yang sangat diinginkan oleh pembuat dan pemakai kosmetik. Untuk dapat memberikan reaksi, kulit harus sedikit banyak dipenetrasi oleh kosmetik.

Beberapa faktor di kulit yang mempengaruhi penetrasi adalah kelembaban kulit, keadaan kulit: apakah normal atau mengalami modifikasi, apakah kulit gundul atau banyak

rambutnya, usia, jenis kelamin, dan kecepatan metabolisme bahan itu di dalam kulit (Iswari,2007;25).

Warna Kulit

Warna kulit terutama ditentukan oleh oxyhemoglobin yang berwarna merah, hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, melanin yang berwarna coklat, keratohyalin yang memberikan penampakan opaque pada kulit, serta lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Kurang penting adalah carotene, suatu pigmen warna kuning yang sedikit sekali jumlah dan efeknya, serta eleidin dalam stratum lucidum yang hanya terlihat pada kulit yang menebal dari telapak kaki bagian tumit.

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit itu, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Jumlah, tipe, ukuran dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras/bangsa di dunia.

Mekanisme Pigmentasi

Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan basal (*stratum germinativum*). Melalui juluran lengan-lengannya yang dinamakan dendrite, melanosit memberikan melanosom kepada sejumlah sel-sel keratinosit disekelilingnya.

Melanosom di dalam keratinosit akhirnya mengalami degradasi. Melanosom yang terbentuk dari gabungan beberapa partikel dan besarnya kurang dari 1 mikron akan mengalami degradasi. Ini terdapat pada ras Eropa, Mongoloid dan Indian Amerika. Melanosom yang besarnya lebih dari 1 mikron dan tunggal, tidak mengalami degradasi, misalnya terdapat pada ras Negro dan Aborigin. Ukuran melanosom di pengaruhi oleh faktor genetic dan non-genetik, misalnya penyinaran oleh sinar matahari (Ultraviolet) (Iswari,2007;28).

Telah dibuktikan adanya korelasi antara warna kulit dan besarnya melanosom. Kulit hitam memiliki melanosom besar, tunggal, padat dengan melanin, sedangkan melanosom pada orang kulit putih tersusun dari partikel kecil yang bergabung dan tidak padat dengan melanin.

Bila terjadi penyinaran kulit oleh sinar matahari, maka terjadi reaksi fisiologis kulit, kulit yang terpapar sinar matahari selama antara 6-20 jam akan menghasilkan eritema yang cepat atau lambat akan menimbulkan pencoklatan kulit (*tanning*). Hal ini disebabkan oleh sinar ultraviolet A (UV-A) dengan panjang gelombang 290-320 nm dan sinar yang terlihat (*visible light*) dengan panjang gelombang 320-700 nm.

Efek sinar matahari terhadap kulit dapat dihindari jika kulit dilindungi dengan menggunakan kosmetik pelindung kulit (Iswari,2007;30).

B. Uraian Kosmetik Perawatan

Sejak berabad-abad yang lalu, Kosmetik telah digunakan dan dikenal masyarakat. Hasil riset serta penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan adanya pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatic, yang dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini. Hal ini menunjukkan perkembangan kosmetik di masa itu (Azhara,2011;13).

Sejak abad ke-19, kosmetik mulai mendapatkan perhatian, yaitu kosmetik tidak hanya untuk kecantikan saja, melainkan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industry baru dimulai pada abad ke-20 (Wall Jellinek,1970). Kosmetik menjadi sebuah alat usaha, bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi, kosmetik menjadi sebuah perpaduan antara kosmetik dan obat (*Pharmaceutical*) atau yang sering disebut kosmetik medis (*cosmetics*).

Sejak 40 tahun terakhir, industry kosmetik semakin meningkat. Industri kimia memberi banyak bahan dasar dan bahan aktif kosmetik. Kualitas dan kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit terus meningkat. Banyak para dokter yang terjun langsung dan meningkatkan perhatian terhadap ilmu kecantikan kulit (*cosmetodermatology*), serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan para ahli kosmetik dan ahli kecantikan. Misalnya, dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi, dan penyusunan formula berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan (Azhara,2011;19).

Komposisi utama dari kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti : bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, farmasi, kimia teknik dan lainnya (Wasitaatmadja,1997;37).

Krim merupakan suatu sediaan berbentuk setengah padat mengandung satu atau lebih bahan kosmetik terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, berupa emulsi kental mengandung tidak kurang 60 % air ditujukan untuk pemakaian luar. Yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau (*water in oil*, W/O) seperti penyegar kulit dan minyak dalam air (*oil in water*, O/W) seperti susu pembersih (Dirjen POM,1979;8).

Kualitas krim meliputi :

- a. Mudah dioleskan merata pada kulit.
- b. Mudah dicuci bersih dari daerah lekatan.
- c. Tidak menodai pakaian.
- d. Tidak berbau tengik.
- e. Bebas partikulat keras dan tajam.
- f. Tidak mengiritasi kulit.

Adapun bahan dasar krim misalnya dalam krim pelembab adalah : mineral oil, lanolin, paraffin wax, olive oil, dan bahan tambahan lainnya (Syamsuni,2006;102).

Pada penggolongan kosmetik, krim wajah termasuk dalam kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetic*) yang mempunyai tujuan untuk melembabkan kulit serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Namun tidak untuk diagnosis, pengobatan serta pencegahan penyakit.

Kosmetik Pemutih Kulit Mengandung Merkuri

Ammoniated mercury 1-5 % direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat. Karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan sebagainya sangat kuat maka dilarang pemakaiannya didalam sediaan kosmetik. Ada dua jenis reaksi negatif yang terlihat : reaksi iritasi dan reaksi alergi berupa perubahan warna kulit (Iswari,2007;47).

C. Uraian Merkuri (Hg)

Logam berat adalah unsure logam yang mempunyai berat jenis atau densitas lebih dari 5 g/cm^3 . Diantara unsur logam berat, Hg mempunyai densitas $13,55 \text{ g/cm}^3$ dan bersifat paling toksik, lalu diikuti Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, dan Zn. Beberapa logam berat tergolong dalam bahan B₃ yaitu bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Zat kimia B₃ yang berasal dari logam dapat berupa senyawa logam (anorganik) atau

senyawa organik. Menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) beberapa logam berat masuk dalam 20 besar zat kimia B₃, antara lain : Arsenic (As), timah (Pb), merkuri (Hg), Cadmium (Cd), dan Chromium (Cr) (Priyanto,2010;112).

Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh serta besarnya dosis paparan. Efek toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan alergi, bersifat mutagen, teratogen, atau karsinogen bagi manusia maupun hewan (Wahyu Widowati.Dkk,2008;2).

Tingkat toksisitas logam berat terhadap hewan air, mulai dari yang paling toksik, adalah Hg, Cd, Zn, Pb, Cr, Ni, dan Co. sementara itu tingkat toksisitas terhadap manusia dari yang paling toksik adalah Hg, Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, dan Zn (Wahyu Widowati.Dkk,2008;2).

Merkuri (Hg) adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah menguap pada suhu ruangan. Hg akan memadat pada tekanan 7.640 Atm. Merkuri (Hg) dapat larut dalam asam sulfat atau asam nitrit, tetapi tahan terhadap basa. Hg memiliki nomor atom 80, berat atom 200,59 g/mol, titik lebur -38,9° C, dan titik didih 356,6° C. (Wahyu Widowati,dkk,2008;127)

Kelimpahan Hg di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Merkuri jarang didapatkan dalam bentuk bebas di alam, tetapi berupa bijih *cinnabar* (HgS). Untuk mendapatkan Hg dari

cinnabar, dilakukan pemanasan bijih cinnabar di udara sehingga menghasilkan logam Hg. (Wahyu Widowati,dkk,2008;127)

Sebagai unsur, merkuri (Hg) berbentuk cair keperakan pada suhu kamar. Merkuri membentuk berbagai persenyawaan baik anorganik seperti oksida, klorida, dan nitrat) maupun organik. Merkuri dapat menjadi senyawa anorganik melalui oksidasi dan kembali menjadi unsur merkuri (Hg) melalui reduksi. Merkuri anorganik menjadi merkuri organik melalui kerja bakteri *anaerobic* tertentu dan senyawa ini secara lambat berdegradasi menjadi merkuri anorganik. Ada tiga bentuk merkuri yang toksik terhadap manusia ialah merkuri elemen (merkuri murni), bentuk garam inorganic Hg dapat berbentuk merkuri (Hg^{2+}) dan berbentuk merkuro (Hg^+), dimana bentuk garam merkuri lebih toksik dari pada merkuro (Darmono,2001;148).

Logam merkuri (Hg), mempunyai nama kimia hydragyrum yang berarti cair. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg. Pada periodika unsur kimia Hg menempati urutan (NA) 80 dan mempunyai bobot atom (BA 200,59). Merkuri telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradapan. Logam ini dihasilkan dari bijih sinabar, HgS, yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% - 4%.

Merkuri yang telah dilepaskan kemudian dikondensasi, sehingga diperoleh logam cair murni. Logam cair inilah yang kemudian digunakan oleh manusia untuk bermacam-macam keperluan.

Komponen merkuri organik digunakan untuk obat diuretika sampai bertahun-tahun dan merkuri juga digunakan sebagai bahan untuk kosmetika (Darmono,2001,;148).

Secara umum merkuri memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Palar,2008;96) :

1. Berwujud cair pada suhu kamar (25°C) dengan titik beku paling rendah - 39° C.
2. Masih berwujud cair pada suhu 396° C . Pada temperatur 396° C ini telah terjadi pemuaiian secara menyeluruh.
3. Merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain.
4. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri sebagai logam yang sangat baik untuk menghantarkan daya listrik.
5. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk alloy yang disebut juga dengan amalgam.
6. Merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal (logam) maupun dalam bentuk persenyawaan

Merkuri atau air raksa (Hg) muncul di lingkungan secara alamiah dan berada dalam beberapa bentuk yang pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 3 bentuk utama yaitu (Wahyu Widowati,dkk,2008;129) :

1. Merkuri metal (Hg) merupakan logam berwarna putih, berkilau dan pada suhu kamar berada dalam bentuk cairan.

2. Senyawa merkuri anorganik terjadi ketika merkuri dikombinasikan dengan elemen lain seperti klorin (Cl), sulfur atau oksigen. Senyawa-senyawa ini biasa disebut garam-garam merkuri. Senyawa merkuri anorganik berbentuk bubuk putih atau kristal, kecuali merkuri sulfida (HgS) yang biasa disebut Chinabar adalah berwarna merah dan akan menjadi hitam setelah terkena sinar matahari. Senyawa Hg anorganik digunakan sebagai fungisida. Garam-garam merkuri anorganik termasuk amoniak mercurik klorida dan merkuri iodide digunakan untuk cream pemutih kulit. Merkuri chlorida (HgCl₂) adalah sebagai antiseptic atau disinfektan. Pada waktu lampau, merkurous klorid digunakan dalam dunia kedokteran untuk obat penjahar (urus-urus), obat cacing dan bahan penambal gigi. Senyawa kimia lain yang mengandung merkuri masih digunakan sebagai anti bakteri. Produk ini termasuk mercurochrome (mengandung 2% merkuri sulfida) dan merkuri oksida digunakan untuk zat warna pada cat, sedangkan merkuri sulfida digunakan pula sebagai pewarna merah pada tattoo. Merkuri klorida juga digunakan sebagai katalis, industri baterai kering, dan fungisida dalam pengawetan kayu. Merkuri asetat digunakan untuk sintesa senyawa organomercuri, sebagai katalis dalam reaksi-reaksi polimerisasi organik dan sebagai reagen dalam kimia analisa² Senyawa-senyawanya banyak digunakan sebagai disinfektan, pestisida, bahan cat, antiseptik, baterai kering, fotografi, di pabrik kayu dan pabrik tekstil¹²
3. Senyawa merkuri organik terjadi ketika merkuri bertemu dengan karbon atau organomercuri. Banyak jenis organomercuri, tetapi yang paling

populer adalah metilmerkuri (dikenal dengan monometilmercuri) $\text{CH}_3 - \text{Hg} - \text{COOH}$. Pada waktu yang lampau, senyawa organomercuri yang dikenal adalah fenilmerkuri yang digunakan dalam beberapa produk komersial. Organomercuri lainnya adalah dimetilmerkuri ($\text{CH}_3 - \text{Hg} - \text{CH}_3$) yang juga digunakan sebagai standar referensi tes kimia. Dilingkungan ditemukan dalam jumlah kecil namun sangat membahayakan bagi manusia dan hewan. Seperti senyawa merkuri organik, metil merkuri dan fenil merkuri ada dalam bentuk garam-garamnya seperti metal merkuri klorida dan fenil merkuri asetat. Metilmerkuri dihasilkan dari proses mikroorganisme (bakteria dan fungi) dilingkungan. Sampai tahun 1970 an metil merkuri dan etil merkuri digunakan untuk mengawetkan biji-bijian dan infeksi fungi. Ketika diketahui adanya efek negatif terhadap kesehatan dari bahan berbahaya metil merkuri dan etil merkuri, maka penggunaan selanjutnya sebagai fungisida biji-bijian dilarang. Sampai tahun 1991 an penggunaan fenil merkuri sebagai antifungi pada cat dalam maupun cat luar bangunan masih diperbolehkan, tetapi penggunaan ini selanjutnya juga dilarang karena akan terjadi penguapan Hg dari cat-cat tersebut. Sabun dan krem yang mengandung merkuri telah digunakan dalam waktu yang lama oleh masyarakat kulit hitam di beberapa wilayah untuk pemutih kulit. Pencemaran udara diartikan sebagai hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara (atmosfir) seperti debu, busa, gas, kabut, bau - bauan, asap, atau uap dalam kuantitas tertentu yang dapat menimbulkan

gangguan – gangguan terhadap kehidupan manusia , tumbuh –tumbuhan atau hewan maupun benda – benda, sehingga mempengaruhi kehidupan organisme maupun benda .

D. Uraian Spektrofotometer Serapan atom

1. Prinsip kerja Spektrofotometer Serapan Atom

Spektrofotometer serapan atom (SSA) adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya. Penyerapannya energi sinar terjadi oleh atom netral dalam keadaan gas, sinar yang diserap itu biasanya sinar tampak atau ultra lembayung (Sastrohamidjojo, 2001)

Dalam analisis senyawa SSA, unsur yang dianalisis berada sebagai atom yang netral, dalam keadaan uap dan disinari dengan berkas sinar yang berasal dari sumber sinar. Proses ini dapat dilaksanakan dengan jalan menghisap cuplikan melalui tabung kapiler dan menyemprotkannya ke dalam nyala api yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai kabut yang halus. Dengan demikian nyala api itu berfungsi sama seperti sel (kuvet) dan larutan dalam spektrofotometer serapan molekul. Untuk membebaskan atom atom dari persenyawannya dibutuhkan sejumlah energi yang umumnya diperoleh dari nyala hasil reaksi pembakaran. Untuk itu diperlukan bahan bakar gas(Noor, A.1989).

Bila hasil senyawa tertentu dimasukkan dalam nyala, maka pertama tama akan terjadi proses desolvasi (penguapan pelarut), sesudah terjadi proses desolvasi ini, sehingga yang tinggal adalah butur butir halus

padatan cuplikan. Berikutnya ada dua kemungkinan : pertama, butir butir padat cuplikan itu langsung terurai, menjadi atom atom unsur yang akan ditetapkan, atau butir butir padat cuplikan itu berubah dulu menjadi uap dan uap inilah yang kemudian terurai menjadi atom-atom unsur (Noor, A.1989).

Pada suhu kamar praktis semua cuplikan berada dalam keadaan asas. Elektron dalam keadaan asas ini dapat tereksitasi ke tingkat energi electron yang lebih tinggi oleh kalor nyala api. Keadaan tereksitasi ini amat singkat, kira kira 10^{-9} detik atau lebih pendek, kemudian akan segera kembali ke keadaan asas. Pada waktu kembali inilah akan dipancarkan oleh atom tersebut suatu kuantum energi yang sesuai dengan nilai panjang gelombang tertentu (Noor, A.1989).

2. Hubungan Absorbansi Dengan Konsentrasi

Seperti dijelaskan diatas, atom atom unsur logam dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu, penyerapan sinar ini sebanding dengan konsentrasi atom dalam nyala. Dengan mengukur penyerapan cahaya oleh atom atom dalam nyala maka konsentrasi logam dalam contoh dapat ditentukan (Noor, A.1989).

Hubungan antara penyerapan cahaya dan konsentrasi dinyatakan oleh hukum Lambert – Beer :

$$I = I_0 e^{-abc}$$

$$A = \text{Log } I_0 / I = a b c$$

Keterangan :

I = intensitas cahaya yang sampai pada detector

I_0 = Intensitas cahaya dari sumber sinar

A = Absorban

a = Konstanta absorptivitas


b = Panjang medium absorpsi

c = Konsentrasi

Dalam analisis unsur dengan panjang gelombang tertentu, absorptivitas (a) dan panjang medium absorpsi (b) telah tertentu pula, sehingga nilai a dan b dalam persamaan di atas adalah tetap. Dengan demikian maka A sebanding dengan konsentrasi (c) (Van Loon, J.C, 1980;223).

Cara untuk menentukan konsentrasi larutan cuplikan adalah dengan membandingkan nilai absorban (a) larutan cuplikan tersebut dengan nilai A dari larutan baku yang diketahui konsentrasinya. Selanjutnya dari A larutan baku tersebut dibuat kurva kalibrasi yaitu grafik hubungan antara absorban terhadap konsentrasi larutan baku yang merupakan sebuah garis lurus . Nilai absorban dari larutan cuplikan kemudian dialurkan pada grafik kurva kalibrasi tersebut sehingga konsentrasi larutan cuplikan dapat ditentukan (Van Loon, J.C,1980; 224-225).

3. Peralatan Spektrofotometer Serapan Atom



Gambar 2. Peralatan Spektrofotometer Serapan Atom (Day R.A Underwood,2002;423)

1. Sumber Cahaya

Sumber cahaya berfungsi untuk memancarkan cahaya yang akan dipakai untuk mengeksitasi atom atom dari unsur yang akan dianalisis. Sumber cahaya utama ini harus memancarkan cahaya resonan yang tajam dan interaksinya stabil. Sebagai sumber cahaya dipakai lampu katoda berongga. Lampu katoda ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan suatu anoda (Sumar,1994;234).

Katoda tersebut berbentuk silinder berongga yang terbuat dari atau permukaannya dilapisi dengan unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis. Tabung lampu tersebut diisi dengan gas mulia neon atau argon. Bila antara katoda dan anoda tersebut di pasang selisih tegangan yang tinggi, sampai 600 volt, maka mula mula katoda akan memancarkan berkas elektron yang menuju ke anoda dengan kecepatan dan energi yang tinggi. Elektron elektron yang bergerak

dengan energi kinetik yang tinggi itu dalam perjalanannya menuju anoda akan bertabrakan dengan atom atom gas mulia. Akibat dari tabrakan ini, maka atom atom gas mulia itu akan kehilangan elektron dan berubah menjadi ion ion positif. Ion ion positif gas mulia ini akan menuju ke katoda dengan kecepatan dan energi yang tinggi (Sumar,1994;234-235).

Akibatnya atom atom unsur bahan katoda (yang sama dengan unsur yang dianalisis) akan terlempar keluar dan kemudian mengalami eksitasi ketingkat yang lebih tinggi dan pada saat dieksitasi akan memecahkan spektrum pancaran dari unsur bahan katoda yang sama dengan unsur yang akan dianalisis, harus digunakan lampu katoda berongga tersendiri yang sesuai.

2. Pengabut dan Pembakar

Pengabut berfungsi untuk mengubah larutan menjadi kabut. Pembakar berfungsi untuk mengubah ion logam menjadi atom. Dalam SSA menyerap cahaya adalah atom, sehingga unsur unsur dalam senyawa yang akan ditentukan kadarnya harus direduksi ke bentuk atomnya. Oleh karena itu proses pengatoman memegang peranan penting dalam analisis ini. Proses yang terjadi dalam sistem ini terdiri dari 2 tingkat :

Pengabutan larutan agar dapat masuk ke dalam nyala, dan pengatoman unsur di dalam nyala dengan menggunakan pembakar.

Didalam pembakaran campuran gas dan bahan dinyalakan untuk menghasilkan nyala, yang akan digunakan untuk mengatomkan unsur yang akan dianalisis.

Campuran gas yang biasa dipakai untuk menghasilkan nyala ialah : udara dan asetilena; N_2O dan asetilena; campuran udara dan propana menghasilkan nyala dengan suhu $1925^{\circ}C$, dipakai untuk unsur unsur yang mudah diatomkan, misalnya Cu dan Zn. Nyala campuran udara dan asetilena ($2300^{\circ}C$) merupakan nyala standar, karena dapat mengatomkan kurang lebih 30 unsur. Campuran N_2O dan asetilena menghasilkan nyala yang paling tinggi suhunya ($3300^{\circ}C$), biasanya dipakai untuk mengatomkan unsur Al, Si dan Logam alkali tanah (Noor, A.1989).

3. Monokromator

Untuk menghilangkan gangguan yang berasal dari spektrum yang kontinyu yang dipancarkan oleh molekul molekul gas bahan bakar yang tereksitasi di dalam nyala, digunakan monokromator. Monokromator ini adalah terdiri dari difraksi dan prisma. Monokromator berfungsi untuk menyaring cahaya, sehingga cahaya yang masuk ke larutan contoh adalah cahaya tunggal (Sumar,1994;235).

4. Detektor

Detektor berfungsi mengubah energi yang diterima menjadi sinyal listrik. Detektor akan menerima dua macam isyarat yang

berselang seling dan akan diubah menjadi isyarat listrik bolak balik. Sedang isyarat kontinyu yang berasal dari nyala akan diubah menjadi isyarat arus searah itu oleh detektor akan diteruskan ke amplifier arus bolak balik (Sumar,1994;235).

5. Amplifier dan Pembacaan

Amplifier akan menguatkan isyarat arus bolak balik dan melalui mekanisme pengolahan sinyal selanjutnya akan diperoleh hasil yang dapat terbaca pada alat pencatat. Isyarat arus searah yang berasal dari isyarat sinyal kontinyu dari nyala, tidak akan diperkuat oleh amplifier (Sumar,1994;235).

4. Cara cara melarutkan Cuplikan

Karena peralatan yang tersedia mengharuskan cuplikan atau contoh yang akan ditentukan unsur logamnya berupa larutan, maka perlu diketahui cara cara melarutkan contoh. Cara melarutkan contoh akan tergantung dari susunan dan bentuk (Boes,E,1991;55).

Beberapa cara untuk melarutkan contoh dari materi biologis :

1. Melarutkan dengan air

Beberapa macam materi biologis dapat langsung dilarutkan dalam air. Namun demikian agar hasil analisis memberikan hasil yang baik dan pengatoman dari unsur yang lebih mudah, maka biasanya kepada larutan yang diperiksa ditambahkan sedikit asam nitrat.

2. Melarutkan dengan cara hidrolisis

Penentuan unsur unsur logam dengan cara ini banyak digunakan, terutama untuk memeriksa unsur unsur tersebut dari cuplikan buah buahan dan tanah (Boes,E,1991;55).

3. Melarutkan dengan cara ekstraksi

Cara ini biasanya menggunakan zat pereaksi pengompleks seperti EDTA yang membentuk kompleks kelat dengan ion logam. Cara ekstraksi ini memberikan hasil yang baik untuk penetapan unsur Co, Ni, Fe dan Cr dari berbagai contoh pada pH 6 (Boes,E,1991;55).

4. Melarutkan dengan cara destruksi

Cara ini bertujuan untuk menghilangkan zat organik dari materi biologis sehingga yang tinggal hanya senyawa anorganiknya. Ada 2 cara destruksi yang sering digunakan yaitu cara destruksi kering dan destruksi basah (Boes,E,1991;56).

a. Dekstruksi kering

Dalam cara kering, contoh dipanaskan secara bertahap di udara terbuka untuki menguapkan air, menguraikan dan mengoksidasi contoh, dan akhirnya contoh diabukan dalam tungku pemanas dalam suhu maksimum yang berkisar 450° - 550° C, yaitu bergantung pada contoh yang akan diperiksa. Namun ada juga destruksi kering dengan suhu maksimim atau suhu pengabuan mencapai 750° C atau bahkan sampai 980° C. hal ini akan mempercepat proses destruksi tersebut, dilain pihak, untuk analisis

unsure tertentu kadang kadang diperlukan suatu pengabuan yang tidak boleh terlalu tinggi misalnya hanya 300° - 320°C . Hal ini dapat dijumpai dalam analisis unsure unsur cadmium yang dikhawatirkan akan menguap pada suhu pengabuan yang lebih tinggi. Makin rendah suhu pengabuan akan makin lama pula waktu yang diperlukan untuk proses tersebut, sedangkan makin tinggi suhu pengabuan, akan makin besar pula kemungkinan kehilangan unsur analit karena terbentuknya senyawa yang sukar larut (Boes,E,1991;56).

b. Dekstruksi basah

Cara dekstruksi basah menggunakan asam nitrat sebagai pengoksidasi, dengan kombinasi asam dengan pengoksidasi yang lain seperti asam sulfat asam perklorat dan hidrogen peroksida.

Karena adanya masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan dari zat zat tersebut sehingga cara ini jarang dipakai. (Noor, A.1989)

Dibandingkan dengan cara kering, cara basah ini jelas berlangsung pada suhu yang jauh lebih rendah. Hal ini berarti bahwa kehilangan unsur analit karena penguapan akan jauh lebih kecil atau bahkan dapat ditiadakan. Di lain pihak cara basah menyita waktu yang lama dan diperlukan perhatian analisis yang besar, terus menerus di samping banyaknya uap toksik yang terjadi jumlah asam asam yang dipakai juga merupakan sumber kontaminan yang potensial (Noor, A.1989).

5. Metode kombinasi

Baru baru telah dikembangkan suatu cara yang sebenarnya merupakan kombinasi dari cara basah dan cara kering, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut (Noor, A.1989) :

- a. Mula mula contoh didekstruksi secara kering dalam tungku dengan suhu pengabuan yang relatif rendah 375°C.
- b. Kemudian kepada residu / abu yang diperoleh dibubuhkan asam klorida untuk dipanaskan sampai 90°C.
- c. Akhirnya larutan dikisarkan sampai tepat kering, didinginkan dan residu dilarutkan dalam asam encer yang sesuai.

5. Unit Penguap Merkuri (*Vapor Generation Accessory*)

a. Prinsip Dasar

Alat ini digunakan untuk menguapkan sampel atau larutan contoh yang mengandung merkuri dengan melakukan reduksi menggunakan stannium klorida.

Sejumlah sampel tertentu yang akan diperiksa diletakkan dalam bejana reaksi, dan pada saat larutan stannium klorida ditambahkan kedalamnya maka merkuri yang terkandung dalam sampel akan diuapkan dalam waktu yang singkat. Uap tersebut akan terbawa ke gas flow dalam alat pengukuran dengan menggunakan pompa dan kemudian sejumlah merkuri dapat ditentukan dengan cara mengukur penyerapan pada panjang gelombang 235,7 nm.

6. Keunggulan dan Kelemahan SSA

Keunggulan SSA

a. Kepekaan (Sensitifitas)

Metode SSA mempunyai kepekaan tinggi, karena dapat mengukur kadar logam pada tingkat di bawah 1 bpj, bahkan alat shimadzu AA-640-13 ini pada unsur unsur tertentu dapat mengukur hingga tingkat bpj.

b. Selektivitas

Metode ini cukup tinggi selektivitasnya hingga dapat digunakan untuk menentukan beberapa unsur sekaligus dalam suatu larutan cuplikan tanpa perlu pemisahan.

c. Ketelitian dan Ketepatan

Ketelitian SSA relative baik karena gangguan dalam pengukuran ternyata lebih kecil dibandingkan dengan cara spektrofotometri biasa dan cara instrument lainnya. Ketepatannya juga baik karena kesederhanaan isyarat dan ketelitian hasil pengukuran yang menjadi dasar pembuatan kurva kalibrasi.

d. Pengerjaan dan pemeliharaan alat SSA tidak memerlukan keterampilan yang tinggi.

Kelemahan SSA

a. Gangguan kimia yang merupakan hasil dari berbagai proses kimia yang terjadi selama proses atomisasi, sehingga dapat merubah

karakteristik serapan dari zat yang akan diukur. Contoh dari gangguan kimia yaitu karena terjadi disosiasi yang tidak sempurna dari senyawa.

- b. Beberapa nyala lebih tepat untuk beberapa unsur jenis tertentu, sehingga bertambahnya analit yang akan ditentukan memerlukan tidak hanya suatu penukaran sumber sinar dan setting, tetapi juga penukaran terhadap nyala, pembakar dan sumber gas.

Gangguan spectral kadang-kadang juga memberikan kesulitan yang cukup berarti. Gangguan spectral timbul bila serapan atau emisi zat pengganggu mempengaruhi atau dekat sekali dengan serapan atau emisi dari zat yang diukur (Van Loon, J.C,1980;224-225).

E. Uraian Bahan

1. Asam Nitrat Pekat (Farmakope Indonesia edisi III,1979; 650)

Nama Resmi : ACIDUM NITRUM
 Nama Lain : Asam Nitrat
 Rumus Molekul : HNO_3
 Pemerian : Cairan berasap, jernih, tidak berwarna.
 Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat
 Kegunaan : Sebagai pereaksi dalam destruksi

2. Aquadestilata (Farmakope Indonesia edisi III,1979; 96)

Nama Resmi : AQUA DESTILLATA
 Nama Lain : Air suling, aquadest
 Rumus Molekul : H_2O

Berat Molekul : 18,02

Pemerian : Cairan jernih, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup baik

Kegunaan : Sebagai pelarut

3. Asam Klorida (Farmakope Indonesia edisi III,1979; 53)

Nama Resmi : ACIDUM HYDROCHLORIDUM

Nama Lain : Asam Klorida

Rumus Molekul : HCl

Berat Molekul : 36,46

Pemerian : cairan tidak berwarna, berasap, bau merangsang.

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat

Kegunaan : sebagai pelarut

4. Raksa (II) Klorida (Dirjen POM,1979;287)

Nama Resmi : HYDRARGYRI BICHLORIDUM

Nama Lain : Raksa (II) Klorida

Rumus Molekul : HgCl₂

Berat Molekul : 271,52

Pemerian : Hablur tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau berat.

Kelarutan : larut dalam 1/5 bagian air, dalam 2,1 bagian air mendidih, dalam 3 bagian etanol p (95%), dalam 20 bagian eter p dan dalam 5 bagian gliserol p.

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat

Kegunaan : sebagai sampel

5. Besi (III) Klorida (Dirjen POM,1979;659)

Nama Resmi : FERROS CHLORIDUM

Nama Lain : Besi (III) Klorida

Rumus Molekul : FeCl_3

Berat Molekul : 162,2

Pemerian : Hitam kehijauan, bebas warna jingga, dari garam hidrat yang telah terpengaruh oleh kelembapan.

Kelarutan : Larut dalam air.

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup baik dan rapat.

Kegunaan : sebagai indikator warna

F. Tinjauan Islam

Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Sehingga Para sarjana farmasi dan ilmuwan muslim terdorong untuk menghasilkan berbagai macam kosmetika. Pengembangan produk kosmetika di dunia Islam begitu gencar dilakukan seorang dokter dan ahli bedah Muslim di Andalusia, Al-Zahrawi (936 M - 1013 M) pada abad ke-10 M. Al-Zahrawi menggunakan zat minyak yang disebut Adhan untuk pengobatan dan kecantikan. Sebagai seorang ilmuwan Muslim, Al-Zahrawi menjelaskan cara perawatan dan kecantikan rambut, kulit, gigi, dan seluruh bagian tubuh dalam batas-batas ajaran Islam. Selain Al-Zahrawi, dokter Muslim lainnya yang

berkontribusi dalam bidang kecantikan adalah Ibnu Sina (980 M - 1037 M) (Sunardi, 2008)

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di masa kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat (Sunardi, 2008)

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohani belaka tanpa mengindahkan aspek jasmania. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi (Rumaikhon, 2008).

Dalam hal ini manusia dituntut agar lebih menjaga kesehatannya dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Manusia di tuntut untuk mensyukuri nikmat atas apa yang telah di anugerahkan Allah SWT kepadanya.

Allah berfirman dalam QS. Ali ‘Imran, ayat 191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَهُذَا بَطِلًا مُّبِينًا فَتَقَاتِلْهُمْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَقْتُلْكَ فَتَمُوتَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ

Terjemahannya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Departemen Agama RI, 1971; 75)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala apapun yang diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, sehingga manusia hendaklah senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan tidak mengubah ciptaan Allah seperti halnya manusia yang selalu menjaga penampilannya sehingga mereka menggunakan krim pemutih yang dapat mengubah warna kulit mereka dari yang gelap menjadi lebih putih. Tetapi Allah dan Rasulullah sangat melarang hal tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau melaknat wanita yang menyambungkan rambut wanita lain, wanita yang minta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato wanita lain dan wanita yang minta ditato (Quraish Shihab, 1999; 373)

Allah mengutuk wanita-wanita pembuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Perkataan Abdullah bin Masud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad bernama Ummu Yaqub yang sedang membaca Alquran. Lalu ia datang kepada Abdullah bin Masud dan berkata: Apakah benar berita yang sampai kepadaku, bahwa engkau mengutuk wanita-wanita pembuat tato, wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya dan wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah, Rasulullah SAW bersabda (Muslimin Ashabul, 2011; 120):

المُعَيَّرَاتِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya :

Rasulullah SAW melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato tubuhnya, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya (HR.Muslim No.120)

Banyak ulama yang mengomentari larangan (kutukan) ini. Salah satu diantaranya adalah al-Qurthubi. Al-Qurthubi menafsirkan surah an-Nisa (4); 119 dengan menyatakan bahwa larangan ini berlaku bagi yang melakukan hal-hal tersebut secara permanen (tidak dapat di hapus) karena yang demikian menurutnya merupakan perubahan terhadap ciptaan Allah, padahal Allah melarang mengubah ciptaan-Nya (Quraish Shihab,1999; 373).

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jadi hendaknya manusia selalu menjaga dirinya dengan tidak merusak bentuk tubuhnya dengan berbagai produk seperti kosmetik pemutih yang memiliki kandungan yang dapat membahayakan.

Allah berfirman dalam QS.At-Tin, ayat 4-6 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Terjemahannya :

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (Departemen Agama RI, 1971; 597).

Jadi, sudah sangat jelas bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan dikembalikan pula ketempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga manusia hendaknya pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Bahan yang digunakan untuk tujuan kosmetik tidak boleh berbahaya bagi tubuhnya. Hal ini tidak dibolehkan baginya untuk menggunakan bahan kimia berbahaya, apakah efek yang merugikan akan terjadi segera atau di masa depan, karena Islam melarang merugikan diri sendiri (Quraish Shihab, 2006; 77).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa', ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 1971; 83)

Diantara bahan berbahaya yang biasa terdapat pada kosmetik antara lain seperti penggunaan merkuri, hidrokuinon lebih dari 2% yang sering ditambahkan pada pemutih, rhodamin B yang biasa terdapat pada lipstik. Bahan-bahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh bahkan sampai dapat menimbulkan kanker bagi tubuh. Bahan tambahan pada sediaan kosmetik seharusnya menggunakan bahan-bahan yang telah terdaftar dan boleh digunakan secara farmasetik, karena penggunaan bahan tambahan yang tidak diperbolehkan dan dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan racun dan kerusakan bagi tubuh ketika digunakan. Racun dan segala yang membahayakan jiwa telah diharamkan oleh Islam.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah, ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahannya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Departemen Agama RI, 1971; 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sangat tidak diperbolehkan merusak dirinya sendiri. Hukum menggunakan produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami yang berkhasiat mengubah warna kulit dari coklat menjadi putih telah diajukan kepada seorang imam ahli fiqih masa ini, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaiminrahimahullahu. Beliau menjawab, Jika pengubahan tersebut adalah pengubahan yang bersifat permanen maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar (Quraish Shihab, 2006; 77).

Adapun (mempercantik diri dengan) pengubahan yang tidak bersifat permanen, tetapi hanya sementara waktu, seperti mengenakan hinna` (inai/pacar yang biasa digunakan wanita untuk mewarnai tangan dan kaki) dan semisalnya, hukumnya boleh. Karena pengubahan ini hanya bersifat sementara, yang akan hilang dalam waktu yang cepat. Seperti halnya (berhias dengan) celak dan lipstik.

Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf, ayat 31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡتَكَرَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَشَرِبُوۡا وَاٰسَرِبُوۡا وَاۡلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ



Terjemahannya :

Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke masjid (atau mengerjakan sembayang), makanlah dan minumlah, dan jangan pula kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai akan orang-orang yang berlebih-lebihan (melampaui batas) (Departemen Agama RI, 1971; 154)

Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan, namun demikian berhias dan mempercantik diri bagi wanita tidak boleh di lakukan secara berlebih-lebihan, karena penggunaan kosmetik yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang kurang baik (Azhara,2011;123).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat *vapor generation accessory* (VGA), cawan porselen, corong gelas, corong pisah 250 mL (pirex®), gelas kimia 100 mL dan 250 mL (pirex®), labu ukur 100 mL dan 1000 mL (pirex®), neraca analitik, pipet volume (pirex®), pipet mikro, rak tabung, spektrofotometer serapan atom (SSA) (Varian®), dan tabung reaksi.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, asam nitrat p.a 5 M, Ferri klorida, asam klorida pekat, larutan standar merkuri 1000 ppm, petroleum eter p.a, sampel krim pemutih dan stanium klorida.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Krim pemutih yang beredar di pasaran kota Makassar sebanyak 25 merek.

2. Sampel

Sampel yang digunakan di ambil dari populasi berdasarkan rumus *simple random sampling* sebanyak 5 merek.

C. Analisis Kandungan Hg dalam Sampel

1. Pengambilan Sampel

Sampel di ambil secara acak sebanyak 5 merek krim pemutih.

2. Uji Kualitatif

Sampel ditimbang sebanyak 2,000 g dan dimasukkan dalam corong pisah, ditambahkan 25 mL petroleum eter dan 10 mL HNO₃ 5 M. Larutan dikocok lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan fase petroleum eter dan fase air. Fase air diuji kualitatif dengan penambahan 1 mL HNO₃ setelah itu ditambahkan beberapa tetes FeCl₃, maka akan timbul warna ungu kehitaman (positif mengandung Hg)

3. Uji Kuantitatif

a. Pembuatan Larutan Baku

Merkuri (II) klorida ditimbang teliti 0,1353 g dan dilarutkan dengan HCl, dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan volumenya hingga tanda batas, diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 10 mL dan dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 mL, diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 10 mL; 20 mL; 30 mL; 40 mL; dan 50 mL lalu masing-masing dicukupkan volumenya dengan air suling hingga tanda batas dalam labu ukur 100 mL. Diperoleh konsentrasi masing-masing 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm

b. Pembuatan Kurva Baku

Larutan baku 1000 ppm diatas dipipet seksama sebanyak 10 mL dan dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 mL, diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 10 mL; 20 mL; 30 mL; 40 mL; dan 50 mL lalu masing-masing dicukupkan volumenya dengan air suling hingga tanda batas dalam labu ukur 100 mL. Diperoleh konsentrasi masing-masing 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Kemudian ditambahkan SnCl_2 dan diukur serapannya dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom dan dibuat kurva baku.

c. Pembuatan Pelarut Campuran

Dipipet HNO_3 5 M sebanyak 50 mL dan dipipet HCl pekat sebanyak 5 mL kemudian dimasukkan dalam labu ukur 1000 mL yang sebelumnya telah diisi 250 mL air suling, setelah itu dicukupkan volumenya hingga tanda batas kemudian dikocok hingga homogen.

d. Pembuatan Larutan Sampel

Sampel ditimbang 2,0000 g dan dimasukkan dalam corong pisah, ditambahkan 25 mL petroleum eter p.a dan 10 mL HNO_3 5 M. Larutan dikocok lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan fase petroleum eter dan fase air, lalu fase air dikeluarkan dan ditampung dalam gelas kimia. Fase petroleum eter dikocok lagi sebanyak dua kali, tiap kali dengan HNO_3 5 M 10 mL. fase air dikumpulkan,

dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan volumenya hingga tanda batas dengan menggunakan pelarut 5% HNO_3 5M + 0,5% HCl pekat. Dilakukan pengenceran 100 kali yaitu dipipet 1000 μL sampel kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100 mL kemudian sampel tersebut diukur dengan menggunakan Spektrofotometer serapan atom metode *vapor generation accessory* (VGA)

e. Pembuatan Larutan Stanium Klorida

Ditimbang 25,0 gram SnCl_2 dimasukkan dalam gelas kimia, lalu ditambahkan 20 mL HCl kemudian dipanaskan pada hotplate suhu 70°C sambil diaduk sampai jernih, setelah jernih masukkan ke dalam labu ukur 100 mL kemudian tambahkan air suling sampai garis tanda, kocok hingga homogen.

f. Penetapan Kadar Merkuri

Larutan sampel dan larutan baku masing-masing diukur serapannya secara spektrofotometer serapan atom metode *vapor generation accessory* (VGA) pada panjang gelombang maksimum 253,7 nm. Kadar Hg dalam sediaan kosmetik dihitung berdasarkan kadar Hg yang terukur pada Spektrofotometer serapan atom dibandingkan dengan jumlah sampel yang digunakan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih yang beredar di pasar tradisional di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Data Pengujian Kualitatif Logam Merkuri (Hg)

Tabel 1 Data pengujian kualitatif logam merkuri dengan pereaksi FeCl_3

No.	Kode Sampel	Warna larutan sampel			Keterangan
		Sebelum penambahan indikator	Setelah penambahan HNO_3 5 M	Setelah penambahan FeCl_3	
1.	A.1	Kuning keruh	Keruh tdk berwarna	Keruh kuning lemah	Negatif
2.	A.2	Kuning keruh	Keruh tdk berwarna	Keruh kuning lemah	Negatif
3.	B.1	Jernih tdk berwarna	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
4.	B.2	Jernih tdk berwarna	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
5.	C.1	Jernih kuning lemah	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
6.	C.2	Jernih kuning lemah	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
7.	D.1	Jernih kuning lemah	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
8.	D.2	Jernih kuning lemah	Jernih tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
9.	E.1	Jernih tdk berwarna	Sedikit keruh tdk berwarna	Jernih kuning lemah	Negatif
10.	E.2	Keruh tdk berwarna	Keruh tdk berwarna	Keruh kuning lemah	Negatif

2. Kadar Merkuri (Hg) Dalam Sediaan Krim Pemutih

Tabel 2 Kadar Merkuri (Hg) dalam sampel sediaan krim pemutih

No	Kode Sampel		Kadar Hg (%)		Keterangan
			Replikasi (%)	Rata-rata (%)	
1	A	A.1	1,90	1,875	Tidak aman
2		A.2	1,85		Tidak aman
3	B	B.1	1,01	1,015	Tidak aman
4		B.2	1,02		Tidak aman
5	C	C.1	1,42	1,355	Tidak aman
6		C.2	1,29		Tidak aman
7	D	D.1	1,36	1,395	Tidak aman
8		D.2	1,43		Tidak aman
9	E	E.1	0,72	0,695	Tidak aman
10		E.2	0,67		Tidak aman

B. Pembahasan

Krim wajah termasuk dalam kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetic*) yang mempunyai tujuan untuk melembabkan kulit serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari (Iswari,2007;47). Namun sekarang ini produk pemutih wajah ramai diperbincangkan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena produk pemutih yang beredar di pasar tradisional perlu diteliti keamanannya untuk digunakan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdapat produk yang mengandung beberapa bahan berbahaya diantaranya adalah merkuri (Hg) (Azgara,2011;43). Banyaknya produk kosmetik pemutih lokal maupun asing yang membanjiri pasar domestik merupakan salah satu dampak dari perdagangan bebas. Ada kalanya produk asing

tersebut di negaranya sudah tidak digunakan dengan alasan demi kesehatan dan keamanan, namun ternyata dapat diekspor dan masuk ke wilayah Indonesia seperti produk obat-obatan dengan kandungan antibiotik dosis tinggi, kosmetik dengan bahan merkuri untuk pemutih kulit. Pada kulit kita banyak sekali terdapat pori, setiap pori tersebut terhubung dengan pembuluh darah. Krim yang dioleskan ke permukaan kulit tentu saja akan masuk ke pori-pori, selanjutnya terbawa masuk ke pembuluh darah dan akhirnya bisa menyebabkan gangguan sistem saraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Setelah pemakaian bertahun-tahun, merkuri dapat mengendap di bawah kulit sehingga kulit akan menjadi biru kehitaman. Hal ini dapat berujung pada kanker dan merkuri akan mengendap di dalam ginjal yang berakibat terjadinya gagal ginjal yang sangat parah (bisa menyebabkan kematian). Merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan keracunan bila digunakan untuk waktu lama. Dalam tubuh manusia merkuri anorganik dapat membentuk kompleks dengan glutathion pada hati dan disekresikan dalam bentuk kompleks merkuri-glutathion atau merkuri-sistein. Selain membentuk kompleks dengan glutathion dan sistein, merkuri anorganik juga membentuk kompleks dengan garam empedu yang selanjutnya disekresikan bersamaan dengan feces. Namun kompleks merkuri anorganik dengan garam empedu ini dalam usus besar dapat diabsorpsi kembali kedalam tubuh manusia (Idar Desriyanti,2011;16).

Analisis logam merkuri pada sediaan krim pemutih ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, krim pemutih yang dijadikan sampel dipilih secara acak

dan mewakili populasi merek kosmetik yang ada di pasaran wilayah kota Makassar (Sutanto,2010;181). Sampel dilarutkan dengan menggunakan petroleum eter dan didekstruksi dengan menggunakan asam nitrat 5 M (Moffat,A.C,1986;62). Analisis logam merkuri dimulai dengan proses destruksi menggunakan asam nitrat. Destruksi ini bertujuan untuk memutus ikatan antara senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan destruksi basah karena pada umumnya destruksi basah dapat dipakai untuk menentukan unsur-unsur dengan konsentrasi yang rendah. Agar unsur-unsur tersebut tidak saling mengganggu dalam analisis, maka salah satu unsur harus di hilangkan, dengan adanya proses destruksi tersebut diharapkan yang tertinggal hanya logam-logamnya saja, serta digunakan petroleum eter karena diharapkan senyawa nonpolar yang terdapat di dalam sampel seperti paravin, emulgator dan bahan-bahan nonpolar yang terdapat dalam komposisi krim pemutih dapat larut sehingga tidak mempengaruhi hasil yang akan di peroleh. Analisa kualitatif terhadap adanya logam dalam larutan sampel dilakukan dengan penambahan larutan HNO_3 dan beberapa tetes FeCl_3 , keberadaan logam dalam larutan sampel terdeteksi dengan adanya perubahan warna pada larutan sampel menjadi ungu kehitaman sebagai hasil reaksi antara FeCl_3 dengan logam dalam larutan sampel (Annisa,2010;15). Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada sampel tidak mengandung (tidak terdeteksi) adanya logam merkuri. Hal ini disebabkan karena konsentrasi

logam merkuri dalam sampel sangat kecil sehingga tidak terdeteksi dengan penambahan reagen warna.

Analisis logam merkuri dalam krim pemutih ini menggunakan alat ukur spektrofotometer serapan atom dengan pertimbangan bahwa alat ini merupakan alat yang dapat mengukur kadar logam dalam jumlah yang sangat kecil dengan hasil yang akurat. Dalam analisis senyawa SSA, unsur yang dianalisis berada sebagai atom yang netral, dalam keadaan uap dan disinari dengan berkas sinar yang berasal dari sumber sinar. Proses ini dapat dilaksanakan dengan jalan menghisap cuplikan melalui tabung kapiler dan menyemprotkannya ke dalam nyala api yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai kabut yang halus. Dengan demikian nyala api itu berfungsi sama seperti sel (kuvet) dan larutan dalam spektrofotometer serapan molekul. Untuk membebaskan atom atom dari persenyawannya dibutuhkan sejumlah energi yang umumnya diperoleh dari nyala hasil reaksi pembakaran. Untuk itu diperlukan bahan bakar gas. Bila hasil senyawa tertentu dimasukkan dalam nyala, maka pertama tama akan terjadi proses desolvasi (penguapan pelarut), sesudah terjadi proses desolvasi ini, sehingga yang tinggal adalah butir butir halus padatan cuplikan. Berikutnya ada dua kemungkinan : pertama, butir butir padat cuplikan itu langsung terurai, menjadi atom atom unsur yang akan ditetapkan, atau butir butir padat cuplikan itu berubah dulu menjadi uap dan uap inilah yang kemudian terurai menjadi atom atom unsur, pada suhu kamar praktis semua cuplikan berada dalam keadaan asam.


Elektron dalam keadaan dasar ini dapat tereksitasi ke tingkat energi elektron yang lebih tinggi oleh kalor nyala api. Keadaan tereksitasi ini amat singkat, kira-kira 10^{-9} detik atau lebih pendek, kemudian akan segera kembali ke keadaan dasar. Pada waktu kembali inilah akan dipancarkan oleh atom tersebut suatu kuantum energi yang sesuai dengan nilai panjang gelombang tertentu (Noor, A.1989). Dalam pengukuran kadar merkuri digunakan lampu katoda Hg berongga karena setiap logam mempunyai tingkat eksitasi yang sesuai dengan lampu yang digunakan sehingga akan memancarkan energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom (Khopkar, 2007; 274-275). Selain itu digunakan alat bantu *vapor generation accessory* (VGA) yang bekerja berdasarkan penguapan dingin karena diketahui bahwa merkuri mudah menguap bila diaspirasikan dengan uap panas. Sampel yang akan diuji dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan dengan stannium klorida sebagai reduktan yang mereduksi merkuri menjadi bentuk atomnya. Penguapan merkuri terjadi sangat singkat dan selanjutnya akan terbawa ke sel gas *flow* dalam alat pengukuran SSA dengan menggunakan pompa dan serapan akan terbaca pada recorder pada panjang gelombang 253,7 nm. Panjang gelombang yang digunakan untuk melakukan analisis adalah panjang gelombang dimana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi yang disebut λ_{maks} . Hal ini disebabkan jika pengukuran dilakukan pada panjang gelombang yang sama, λ_{maks} adalah spesifikasi untuk

setiap bahan atau zat pada kondisi yang sama dan dapat menentukan apakah bahan yang diidentifikasi adalah merkuri (Underwood,2002;421).

Hasil analisis pereaksi warna dan pengukuran dengan metode SSA (maks) menunjukkan adanya logam merkuri yang terkandung dalam setiap sampel krim pemutih yang telah diuji. Sebagaimana diketahui bahwa logam merkuri adalah salah satu logam berat yang sangat beracun. Pengaruh utama yang ditimbulkan oleh merkuri didalam tubuh adalah menghalangi kerja enzim dan merusak selaput dinding sel. Keadaan ini disebabkan karena kemampuan merkuri dalam membentuk ikatan kuat dengan gugus yang mengandung belerang (sulfur) yang terdapat didalam enzim atau dinding sel. Merkuri yang terkandung dalam krim pemutih dapat masuk kedalam tubuh dengan jalan terserap melalui kulit. Pemakaian krim pemutih yang mengandung merkuri akan menjadikan kulit putih mulus, namun kemudian akan mengendap dibawah kulit dan setelah bertahun-tahun kulit akan menjadi biru kehitaman bahkan dapat memicu timbulnya kanker (Rina M,2007;97).

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa kadar logam merkuri yang terdapat dalam masing-masing merek krim pemutih berbeda, dimana kadar rata-rata dari sampel I yaitu 1,875 %, sampel II yaitu 1,015 %, sampel III yaitu 1,355%, sampel IV yaitu 1,395 % dan sampel V yaitu 0,695 %. Adanya logam merkuri yang terkandung dalam sampel menandakan bahwa krim pemutih ini tidak aman untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI

No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik dan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik bahwa merkuri dan senyawanya adalah salah satu bahan yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik kecuali fenil raksa sebagai bahan pengawet untuk sediaan mata dengan konsentrasi 0,007 % (Badan POM,2008;1).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih yang beredar di beberapa pasar tradisional Makassar, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sediaan krim pemutih yang beredar di beberapa pasar tradisional Makassar mengandung logam merkuri (Hg).
2. Dari kelima sampel yang diteliti mengandung merkuri (Hg) berturut-turut sebesar 1,875%, 1,015%, 1,355%, 1,395% dan 0,695%. Adanya logam merkuri yang terkandung dalam sampel menandakan bahwa krim pemutih yang digunakan sebagai sampel penelitian ini tidak aman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 dan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.
3. Menurut pandangan Islam, semua ciptaan Allah Swt seperti logam merkuri (Hg) memiliki manfaat namun untuk penggunaan merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih dilarang karena dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif seperti iritasi pada kulit dan dapat memicu timbulnya kanker kulit.

B. Saran

Mengingat adanya logam merkuri yang terkandung dalam sampel krim pemutih, maka di harapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim.

Azhara Nurul Khasanah. 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Penerbit: Flashbooks. Jogjakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2008. *Peringatan Nomor KH.00.01.432.6147 tanggal 26 November Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Di Larang*. Jakarta.

Balsam, M.S., dan Sagarin E. 1972. *Cosmetics Science and Technology, Second Edition, Volume I*, Jhon wiley and Sons Interscience. New York. London.

Darmono. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. UI-Press. Jakarta.

Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Moffat A.C.1986. *Clarke's Isolation and Identification of Drugs*. Second Edition. The Pharmaceutical Press. London

Muslimin Ashabul. 2011. *Kitab Hadits Shohih Muslim [Compilation].zip*. Ebook. Bekasi

Nurul Chaerani, Annisa. 2010. *Atomic Absorbption Spectrophotometry*. Cimahi.

Noor A, 1989. *Spektroskopi Analitik*, Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia, FMIPA, UNHAS, Ujung pandang,


Palar Drs, Haryando. 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Priyanto Apt, M. Biomed. 2009. *Toksikologi Mekanisme, Terapi Antidotum, dan Penilaian Risiko*. Leskonfi. Depok Jawa Barat.


Priyo Hastono Sutanto dan Luknis Sabri. 2010. *Statistik Kesehatan*. PT. RajaGrafindo. Jakarta.

- Rina.M Sunarko. 2007. *Analisis Unsur-Unsur Toksik Dalam Sampel Krim Pemutih Wajah dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron*. Tangerang
- Ar-Rumaikhon, Sulaiman bin A. 2008. *Fiqih Pengobatan Islam : Kajian Komprehensif seputar berbagai Aspek Pengobatan dalam Perspektif Islam*, Penerjemah Tim Al-Qowam.
- Schwartz, L., dan Peck, S. *Cosmetics and Dermatitis*, Paul B. Hoeber, Inc, Medical Book Departement of Harper and Brothers. New York. London.
- Shihab Quraish. 1999. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Penerbit Lentera Hati. Tangerang
- Shihab Quraish. 2006. *Syariat Islam*. Penerbit Lentera Hati. Jakarta
- Sumar Hendayana, dkk, 1994. *Kimia Analitik Instrumen*. Edisi Kesatu. IKIP Semarang Press. Semarang
- Sastrohamidjojo, Hardjono, 2001. *Spektroskopi*, 415, Liberty, Yogyakarta
- Syamsuni Drs. 2006. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta.
- Tranggono R.Iswary.,dan Latifah. F. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Underwood A.L,Day. 2002. *Analisis Kimia Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.
- Van Loon, J.C, 1980. *Analytical Atomic Absorbtion Spectroscopy*. Departemen Of Geologi and Chemistry, Universitas Toronto, Canada
- Wasiaatmadja, S. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-Press. Jakarta
- Widowati Wahyu Dr.,Dr.Astiana Sastiono,Dr.Raymon Yusuf. 2008. *Efek Toksik Logam*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

LAMPIRAN 1 : Analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih secara spektrofotometer serapan atom.



Gambar 3 : Skema kerja pembuatan kurva baku



Gambar 4 : Skema kerja Analisa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih secara spektrofotometer serapan atom.

LAMPIRAN 2 : Perhitungan Bahan

1. Penimbangan Sampel

a. Sampel I.1

Berat cawan kosong	= 18,3344 g
Berat cawan kosong + 2 gram	= 20,3344 g
Hasil penimbangan	= 20,3345 g
Berat sampel	= 20,3345 g – 18,3344 g
	= 2,0001 g

b. Sampel I.2

Berat cawan kosong	= 51,5950 g
Berat cawan kosong + 2 gram	= 53,5950 g
Hasil penimbangan	= 53,5951 g
Berat sampel	= 53,5951 g – 51,5950 g
	= 2,0001 g

c. Sampel II.3

Berat cawan kosong	= 47,6966 g
Berat cawan kosong + 2 gram	= 49,6966 g
Hasil penimbangan	= 49,6966 g
Berat sampel	= 49,6966 g – 47,6966 g
	= 2,0000 g

d. Sampel II.4

Berat cawan kosong	= 42,2157 g
Berat cawan kosong + 2 gram	= 44,2157 g

Hasil penimbangan = 44,2157 g

Berat sampel = 44,2157 g – 42,2157 g
= 2,0000 g

e. Sampel III.5

Berat cawan kosong = 51,3569 g

Berat cawan kosong + 2 gram = 53,3569 g

Hasil penimbangan = 53,3569 g

Berat sampel = 53,3569 g – 51,3569 g
= 2,0000 g

f. Sampel III.6

Berat cawan kosong = 46,9216 g

Berat cawan kosong + 2 gram = 48,9216 g

Hasil penimbangan = 48,9216 g

Berat sampel = 48,9216 g – 46,9216 g
= 2,0000 g

g. Sampel IV.7

Berat cawan kosong = 48,7272 g

Berat cawan kosong + 2 gram = 50,7272 g

Hasil penimbangan = 50,7272 g

Berat sampel = 50,7272 g – 48,7272 g
= 2,0000 g

h. Sampel IV.8

$$\begin{aligned}
 \text{Berat cawan kosong} &= 41,9162 \text{ g} \\
 \text{Berat cawan kosong} + 2 \text{ gram} &= 43,9162 \text{ g} \\
 \text{Hasil penimbangan} &= 43,9162 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 43,9162 \text{ g} - 41,9162 \text{ g} \\
 &= 2,0000 \text{ g}
 \end{aligned}$$

i. Sampel V.9

$$\begin{aligned}
 \text{Berat cawan kosong} &= 41,4514 \text{ g} \\
 \text{Berat cawan kosong} + 2 \text{ gram} &= 43,4514 \text{ g} \\
 \text{Hasil penimbangan} &= 43,4515 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 43,4515 \text{ g} - 41,4514 \text{ g} \\
 &= 2,0001 \text{ g}
 \end{aligned}$$

j. Sampel V.10

$$\begin{aligned}
 \text{Berat cawan kosong} &= 49,8531 \text{ g} \\
 \text{Berat cawan kosong} + 2 \text{ gram} &= 51,8531 \text{ g} \\
 \text{Hasil penimbangan} &= 51,8532 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 51,8532 \text{ g} - 49,8531 \text{ g} \\
 &= 2,0001 \text{ g}
 \end{aligned}$$

2. Perhitungan HNO_3 5M sebanyak 500 mL

$$\begin{aligned}
 \text{Molaritas} &= \frac{\% \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{.1}}{\mathbf{B}} \\
 &= \frac{\mathbf{6} \% \cdot \mathbf{.1,4} \cdot \mathbf{.1}}{\mathbf{6}} \\
 &= 14,75 \text{ M}
 \end{aligned}$$

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 14,75 \text{ M} = 500 \text{ mL} \times 5 \text{ M}$$

$$V_1 = 169,5 \text{ mL}$$

3. Perhitungan Pelarut campuran 5% HNO₃ + 0,5% HCl dalam 1000 mL

a. 5% HNO₃

Volume yang dipipet yaitu

$$\begin{aligned} 5\% \times 1000 \text{ mL} &= \frac{5}{100} \times 1000 \text{ mL} \\ &= 50 \text{ mL} \end{aligned}$$

b. 0,5% HCl

Volume yang dipipet yaitu

$$\begin{aligned} 0,5\% \times 1000 \text{ mL} &= \frac{0,5}{100} \times 1000 \text{ mL} \\ &= 5 \text{ mL} \end{aligned}$$

LAMPIRAN 3 : Perhitungan Kadar Merkuri (Hg) dalam sampel krim pemutih

1. Perhitungan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Sampel Krim Pemutih

Diketahui:

$$y = ax + b$$

y : absorban sampel

a : 0,0181

b : 0,0270

x : kadar merkuri dalam sampel (ppm)

sehingga

$$X = \frac{\text{absorban sampel} - 0,0270}{0,0181}$$

$$\text{Faktor Pengenceran (FP)} = \frac{100 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} = 100 \text{ ml}$$

$$\text{Kadar Merkuri (Hg)} = \frac{K}{b} \times \frac{s_2}{s_1} \times 100 \%$$

a. Untuk sampel krim I.1

$$\text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} = \frac{0,0961 - 0,0270}{0,0181} = 3,8177 \text{ ppm}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 3,8177 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 381,77 \text{ ppm}$$

$$= 381,77 \mu\text{g/ml}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dalam 100 ml sampel} &= 381,77 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\
 &= 38177 \mu\text{g} \\
 &= 0,038177 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,038177 \text{ g}}{2,0001 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 1,90 \%
 \end{aligned}$$

b. Untuk sampel krim I.2

$$\begin{aligned}
 \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0943 - 0,0270}{0,0181} \\
 &= 3,7182 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$\begin{aligned}
 N_1 &= \frac{1 \text{ ml} \times 3,7182 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}} \\
 &= 371,82 \text{ ppm} \\
 &= 371,82 \mu\text{g/ml}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dalam 100 ml sampel} &= 371,82 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\
 &= 37.182 \mu\text{g} \\
 &= 0,037182 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,037182 \text{ g}}{2,0001 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 1,85 \%
 \end{aligned}$$

c. Untuk sampel krim II.3

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0638-0,0270}{0,0181} \\ &= 2,0331 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 2,0 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 203,31 \text{ ppm}$$

$$= 203,31 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{Dalam 100 ml sampel} = 203,31 \text{ } \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 20.331 \text{ } \mu\text{g}$$

$$= 0,020331 \text{ gram}$$

$$\text{Kadar Merkuri (Hg)} = \frac{0,020331 \text{ g}}{2,000 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1,0165 \%$$

d. Untuk sampel krim II.4

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0641-0,0270}{0,0181} \\ &= 2,0497 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 2,0 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 204,97 \text{ ppm}$$

$$= 204,97 \mu\text{g/ml}$$

$$\text{Dalam 100 ml sampel} = 204,97 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 20.497 \mu\text{g}$$

$$= 0,020497 \text{ gram}$$

$$\text{Kadar Merkuri (Hg)} = \frac{0,020497 \text{ g}}{2,0000 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1,0248 \%$$

e. Untuk sampel krim III.5

$$\text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} = \frac{0,0786 - 0,0270}{0,0181}$$

$$= 2,8508 \text{ ppm}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 2,8 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 285,08 \text{ ppm}$$

$$= 285,08 \mu\text{g/ml}$$

$$\begin{aligned} \text{Dalam 100 ml sampel} &= 285,08 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\ &= 28.508 \mu\text{g} \\ &= 0,028508 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,028508 \text{ g}}{2,0000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,42 \% \end{aligned}$$

f. Untuk sampel krim III.6

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0739 - 0,0270}{0,0181} \\ &= 2,5912 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1 \text{ ml} \times 2,5912 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}} \\ &= 259,12 \text{ ppm} \\ &= 259,12 \mu\text{g/ml} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dalam 100 ml sampel} &= 259,12 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\ &= 25.912 \mu\text{g} \\ &= 0,025912 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,025912 \text{ g}}{2,000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,29 \% \end{aligned}$$

g. Untuk sampel krim IV.7

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0764-0,0270}{0,0181} \\ &= 2,7293 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 2,7 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 272,93 \text{ ppm}$$

$$= 272,93 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{Dalam 100 ml sampel} = 272,93 \text{ } \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 27.293 \text{ } \mu\text{g}$$

$$= 0,027293 \text{ gram}$$

$$\text{Kadar Merkuri (Hg)} = \frac{0,027293 \text{ g}}{2,000 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1,36 \%$$

h. Untuk sampel krim IV.8

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0791-0,0270}{0,0181} \\ &= 2,8785 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 2,8 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 287,85 \text{ ppm}$$

$$= 287,85 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{Dalam 100 ml sampel} = 287,85 \text{ } \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 28.785 \text{ } \mu\text{g}$$

$$= 0,028785 \text{ gram}$$

$$\text{Kadar Merkuri (Hg)} = \frac{0,028785 \text{ g}}{2,000 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1,43 \%$$

- i. Untuk sampel krim V.9

$$\text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} = \frac{0,0532 - 0,0270}{0,0181}$$

$$= 1,4475 \text{ ppm}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$N_1 = \frac{1 \text{ ml} \times 1,4 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 144,75 \text{ ppm}$$

$$= 144,75 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dalam 100 ml sampel} &= 144,75 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\
 &= 14.475 \mu\text{g} \\
 &= 0,014475 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,014475 \text{ g}}{2,0001 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,72 \%
 \end{aligned}$$

j. Untuk sampel krim V.10

$$\begin{aligned}
 \text{Konsentrasi sampel setelah pengenceran} &= \frac{0,0516 - 0,0270}{0,0181} \\
 &= 1,3591 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

Konsentrasi sampel sebelum pengenceran

Dalam 1 ml sampel

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$\begin{aligned}
 N_1 &= \frac{1 \text{ ml} \times 1,3591 \text{ ppm}}{1 \text{ ml}} \\
 &= 135,91 \text{ ppm} \\
 &= 135,91 \mu\text{g/ml}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dalam 100 ml sampel} &= 135,91 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} \\
 &= 13.591 \mu\text{g} \\
 &= 0,013591 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Merkuri (Hg)} &= \frac{0,013591 \text{ g}}{2,0001 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,67 \%
 \end{aligned}$$

2. Perhitungan rata-rata kadar merkuri (Hg) dari sampel krim pemutih.

a. Untuk sampel A

Diketahui : Kadar sampel I.1 = 1,90 %

Kadar sampel I.2 = 1,85 %

$$\begin{aligned} \text{Kadar rata-rata sampel I} &= \frac{k \quad s_2 \quad I.1 + k \quad s_2 \quad I.2}{2} \\ &= \frac{1,9 \quad \% + 1,8 \quad \%}{2} \\ &= 1,875 \quad \% \end{aligned}$$

b. Untuk sampel B

Diketahui : Kadar sampel II.3 = 1,0165 %

Kadar sampel II.4 = 1,0248 %

$$\begin{aligned} \text{Kadar rata-rata sampel II} &= \frac{k \quad s_2 \quad II.3 + k \quad s_2 \quad II.4}{2} \\ &= \frac{1,0 \quad \% + 1,0 \quad \%}{2} \\ &= 1,015 \quad \% \end{aligned}$$

c. Untuk sampel C

Diketahui : Kadar sampel III.5 = 1,42 %

Kadar sampel III.6 = 1,29 %

$$\begin{aligned} \text{Kadar rata-rata sampel III} &= \frac{k \quad s_2 \quad III.5 + k \quad s_2 \quad III.6}{2} \\ &= \frac{1,4 \quad \% + 1,2 \quad \%}{2} \\ &= 1,355 \quad \% \end{aligned}$$

d. Untuk sampel D

Diketahui : Kadar sampel IV.7 = 1,36 %

Kadar sampel IV.8 = 1,43 %

$$\begin{aligned} \text{Kadar rata-rata sampel IV} &= \frac{k_{sa\ IV.7} + k_{sa\ IV.8}}{2} \\ &= \frac{1,3\ \% + 1,4\ \%}{2} \\ &= 1,395\ \% \end{aligned}$$

e. Untuk sampel E

Diketahui : Kadar sampel V.9 = 0,72 %

Kadar sampel V.10 = 0,67 %

$$\begin{aligned} \text{Kadar rata-rata sampel V} &= \frac{k_{sa\ V.9} + k_{sa\ V.10}}{2} \\ &= \frac{0,7\ \% + 0,6\ \%}{2} \\ &= 0,695\ \% \end{aligned}$$


LAMPIRAN 4 : Pengukuran Standar Merkuri (Hg)

1. Data pengukuran standar merkuri (Hg)

Tabel 3 Data pengukuran standar Merkuri (Hg)

NO.	Standar	Konsentrasi (bpj)	Serapan (A)
1	Blangko	0,00	0,0037
2	Standar 1	10,00	0,2438
3	Standar 2	20,00	0,3967
4	Standar 3	30,00	0,5639
5	Standar 4	40,00	0,7213
6	Standar 5	50,00	0,9537

2. Gambar kurva baku




Gambar 5. Kurva Baku Logam Merkuri (Hg)

3. Data Absorban Sampel

Tabel 4 Data pengukuran logam Merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih

Krim Pemutih		Serapan (A)
Merek	Kode sampel	
A	A.1	0,0961
	A.2	0,0943
B	B.1	0,0638
	B.2	0,0641
C	C.1	0,0786
	C.2	0,0739
D	D.1	0,0764
	D.2	0,0791
E	E.1	0,0532
	E.2	0,0516

4. Gambar persentasi kadar merkuri dalam sedian krim pemutih



Gambar 6. Persentasi Kadar Merkuri dalam Sampel Krim Pemutih

LAMPIRAN 5 : Gambar

Gambar 7 : Sampel krim pemutih yang diperoleh dari beberapa pasar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 8. Hasil penimbangan sampel (A) dan Proses ekstraksi sampel (B)



Gambar 9. Pengujian kualitatif (A) dan Penentuan kadar dengan SSA(B)

BIOGRAFI



Andi Ima Kusumawati Mardin, lahir di Gowa pada tanggal 26 Juni 1991. Gadis berusia 21 tahun ini adalah buah hati dari pasangan paling bahagia yakni H. Andi Mardin, S.Pd., M.Si dan Hj. Nurhayati, S.Pd. ngintip background pendidikannya, gadis belia satu ini terdaftar sebagai murid di TK Aisyiah Bone kemudian melanjutkan pendidikannya di bangku Sekolah dasar yaitu SDI Mannuruki dan akhirnya tamat pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah Limbung, selanjutnya Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA Neg.1 Bajeng angkatan 2005 dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, ia mencoba melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Program study Farmasi. Alhamdulillah berkat bimbingan para dosen, pada tahun 2012 ini Ia bisa menyelesaikan pendidikannya dan telah menyandang gelar Sarjana Farmasi.