

**PENGARUH METODE PENGERINGAN KELOPAK BUNGA
ROSELLA (*Hibiscus sabdariffa* L.) TERHADAP
AKTIVITAS ANTIOKSIDAN**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Oleh :

MUSPAHUDDIN
NIM. 70100107056

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 23 Agustus 2011

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Muspahuddin

70100107056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Metode Pengeringan Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terhadap Aktivitas Antioksidan”, yang disusun oleh Muspahuddin, NIM: 70100107056, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 23 Agustus 2011 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Abdul Rahim, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt.(.....)

Penguji III : Drs. Muh. Idris, M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A

Nip. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul **“Pengaruh Metode Pengeringan Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Aktivitas Antioksidan”**, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Musdalifah, S.Sos. yang dengan penuh kesabaran dan tidak henti-hentinya memberikan segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penguji kompetensi kedua.
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Abdul Rahim, S.Si., M.Si., Apt. sebagai pembimbing pertama dan Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku penguji pertama kompetensi dan Bapak Drs. Muh. Idris, M.Pd. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kakakku dan adik-adikku yang tercinta Maeryam, S.Pd., M.Pd., Nur Juniarti, Winanda Putri, dan Nur Septiana yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Hishar Mirsam, A. Dian Aulia Saudi, Sri Rahayu. S, Rifa'atul Mahmudah, Ayu Pratiwi, Riska Tahir, Sartika, Andi Nurul Purnamasari, Nurhasanah Idris, Sri Wahyuni, dan Reski Nurjiah Yusuf,

Musdalifah, Asriani Mustafa, A. Darnawati, Irmayanti, A. Nuryalis, Haryati Ibrahim, dan Ervina yang telah memberi semangat dan motivasi selama ini.

11. Untuk Saudara(i)ku Fithri Inayah, Nuramita Taufik, Fitriani, Fitriani'Ochink', Ahmad Awaluddin, Asriadi, Besse Intan Permatasari, Musdalifah, Ilyas Tona, Armiaty Arfah, M. Amri Lasaripi, Muhajirin serta keluarga baruku di Tibona.
12. Para Laboran Farmasi Muhammad Rusydi, S.Farm., Apt., Khisrin Mirwan, S.Farm., Apt., A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., Ahmad Irsyad Aliah, S.Farm., yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan dalam laboratorium M. Asrhah Hidayah, Sahrullah, Nurasia H., Nur Jihad, Reskiyani Azis dan Sri Rahayu Ningsih Munir, Zulfina, Widyawati, Hurria Attas, Hermawati, Akzan, Hasmira Hasanuddin, Anshari Masri dan Anniza Tri Hardiyanti.
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007 tanpa terkecuali khususnya rekan-rekan dari Farmasi B serta adik-adik jurusan farmasi angkatan 2008, 2009, 2010, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, olehnya itu penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Makassar, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	6
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	6
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. <i>Uraian Tanaman</i>	7
1. <i>Klasifikasi Tanaman</i>	7
2. <i>Nama Daerah Tanaman</i>	7
3. <i>Morfologi Tanaman</i>	7
4. <i>Kandungan Kimia</i>	8
5. <i>Kegunaan Tanaman</i>	10
B. <i>Uraian Pengeringan</i>	11
C. <i>Uraian Ekstraksi</i>	14
D. <i>Uraian Penetapan Kadar Air</i>	16

E.	<i>Uraian Radikal Bebas</i>	20
F.	<i>Uraian Antioksidan</i>	26
1.	Jenis-Jenis Antioksidan	26
2.	Mekanisme Kerja Antioksidan	28
G.	<i>Uraian DPPH</i>	29
H.	<i>Uraian Spektrofotometri UV-VIS</i>	31
I.	<i>Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuh-Tumbuhan</i> ..	36
BAB III	METODE PENELITIAN	40
A.	<i>Alat dan Bahan</i>	40
B.	<i>Prosedur Kerja</i>	40
1.	Pengambilan Sampel	40
2.	Pengolahan Sampel	40
3.	Penetapan Kadar Air	41
4.	Ekstraksi Sampel	42
5.	Penetapan IC ₅₀	42
a.	Pembuatan Larutan DPPH	42
b.	Penentuan λ Maksimum DPPH	43
c.	Pengukuran Serapan Blanko	43
d.	Pengukuran Aktivitas Antioksidan Kelopak Rosella ..	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A.	<i>Hasil Penelitian</i>	46
B.	<i>Pembahasan</i>	47
BAB V	PENUTUP	52
A.	<i>Kesimpulan</i>	52
B.	<i>Saran</i>	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Maserasi Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) ..	46
Tabel 2 Hasil Penetapan Kadar Air Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	46
Tabel 3 Hasil Perhitungan Pengukuran % Penghambatan Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH	47
Tabel 4 Hasil Pengukuran % Penghambatan Aktivitas Antioksidan terhadap DPPH	61
Tabel 5 Nilai Probit	62
Tabel 6 Hasil Perhitungan Nilai IC ₅₀ dari Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) yang Dikeringkan dengan Menggunakan Oven	63
Tabel 7 Hasil Perhitungan Nilai IC ₅₀ dari Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) yang dikeringkan Di Bawah Matahari	63
Tabel 8 Hasil Perhitungan Nilai IC ₅₀ dari Ekstrak Etanol kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) yang Dikeringkan Dalam Ruangan	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan	31
Gambar 2 Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis	33
Gambar 3 Skema Kerja Penetapan Kadar Air	56
Gambar 4 Skema Kerja Ekstraksi	57
Gambar 5 Skema Kerja Penentuan IC ₅₀	58
Gambar 6 Grafik Perbandingan IC ₅₀ Sampel Pengeringan Dalam Oven, Di Bawah Matahari, dan Dalam Ruangan	66
Gambar 7 Tanaman Rosella	67
Gambar 8 Kelopak Rosella	67



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Skema Kerja Penetapan Kadar Air	56
Lampiran 2	Skema Kerja Ekstraksi	57
Lampiran 3	Skema Kerja Penentuan IC ₅₀	58
Lampiran 4	Perhitungan	59
	a. Penetapan Kadar Air	59
	b. Penyiapan Larutan DPPH	59
	c. Penyiapan Larutan Ekstrak	59
Lampiran 5	Tabel Hasil Pengukuran % Penghambatan Aktivitas Antioksidan terhadap DPPH	61
Lampiran 6	Tabel Nilai Probit	62
Lampiran 7	Tabel Hasil Perhitungan IC ₅₀	63
Lampiran 8	Perhitungan IC ₅₀	64
Lampiran 9	Grafik Perbandingan antara IC ₅₀ Sampel Pengeringan Oven, Di Bawah Matahari, dan Dalam Ruangan	66
Lampiran 10	Foto	67

ABSTRAK

Nama : Muspahuddin
NIM : 70100107056
Jurusan : Farmasi
Judul : “Pengaruh Metode Pengeringan Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terhadap Aktivitas Antioksidan”

Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terhadap aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan aktivitas antioksidan melalui parameter nilai IC_{50} kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dalam berbagai metode pengeringan. Metode yang digunakan adalah pengukuran jumlah DPPH yang tereduksi/mengikat ion hidrogen dari senyawa antioksidan secara spektrofotometri UV-Visible pada panjang gelombang 517 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik dibandingkan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan didalam ruangan dengan nilai IC_{50} sebesar 75,85 bpj.



ABSTRACT

Name : Muspahuddin
Reg.Number : 70100107056
Major : Pharmacy
The Tittle : “The Influence of the Rosella’s Sepal (*Hibiscus sabdariffa* L.)
to the Antioxidant Activity”

It has been done the research about the influence of the rosella’s sepal (*Hibiscus sabdariffa* L.) with DPPH method. This research aims to determine the antioxidant activity by IC_{50} parameter value of rosella’s sepal (*Hibiscus sabdariffa* L.) which was dried in some drying methods. This method applied measuring amount of DPPH which was reduction/bunch hydrogen ion from compound of the antioxidant by spektrofotometri UV-Visible at 517 nm wave. The result of the research shows that rosella’s sepal (*Hibiscus sabdariffa* L.) which was dried in the oven with 50°C temperature has better antioxidant activity if it is compare with rosella’s sepal (*Hibiscus sabdariffa* L.) which was dried by sunlight and in the room with IC_{50} 75,85 bpj.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Semua ahli gizi umumnya sepakat bila konsumsi buah-buahan dan sayuran sangat baik untuk kesehatan. Bahkan orang-orang yang menganut pola makan *vegetarian* hanya bergantung pada nutrisi yang berasal dari buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran mengandung apa yang disebut *phytochemicals*, yaitu senyawa aktif yang berperan dalam mencegah dan memerangi berbagai penyakit kronis seperti kanker. Ada beberapa golongan *phytochemicals*, di antaranya adalah karotenoid, fitosterol, saponin, glukosinolat, polifenol, inhibitor protease, monoterpen, fitoestrogen, sulfida dan asam fitat. Masing-masing *phytochemicals* memiliki aktivitas yang berbeda. Misalnya karotenoid memiliki aktivitas antitumor/antikanker, antioksidan dan modulasi imunitas, sedangkan fitosterol memiliki aktivitas antitumor/antikanker dan penurunan kolesterol. Dari berbagai senyawa aktif atau *phytochemicals* tersebut, yang paling banyak dibicarakan oleh para peneliti dan ahli gizi adalah senyawa dari golongan flavonoid (termasuk golongan polifenol) dan karotenoid yang keduanya memiliki aktivitas antioksidan kuat (Subroto, M. A., 2008).

Salah satu penyebab utama seseorang dapat hidup sehat hingga usia lanjut, dikarenakan tubuh kita sendiri mampu membentuk sistem pertahanan unik dalam melawan radikal bebas. Sistem pertahanan tersebut terbentuk oleh

berbagai enzim yang dapat membantu terjadinya proses interaksi antara dua atau lebih unsur kimia di dalam tubuh. Enzim-enzim yang disebut *glutathione*, *catalase*, dan *superoxydedismutase*, yang membentuk benteng antioksidan dalam tubuh untuk menetralkan pengaruh radikal bebas. Namun karena proses pembentukan antioksidan alami dalam tubuh tidak sebanding dengan jumlah serangan radikal bebas yang terjadi sepanjang hidup maka dibutuhkan antioksidan yang lebih banyak lagi (Minarsih, 2007).

Radikal bebas atau yang sering disebut oksidan adalah molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga memiliki kecenderungan untuk mengambil sebuah elektron yang berpasangan. Radikal bebas dapat dicegah dengan antioksidan, seperti vitamin A, C, E, melatonin dan betakaroten (Harmanto, Ning, 2006).

Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian antioksidan atau peredam radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) (Sawai *et al.*, 1998 ; Senba *et al.*, 1999 ; Yokozawa *et al.*, 1998 *cit* Windono *et al.*, 2001). Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk skrining aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa (Koleva *et al.*, 2001 *cit* 11 Marxen *et al.*, 2007), selain itu metode ini terbukti akurat, reliabel dan praktis (Prakash *et al.*, 2001) (Pratimasari, 2009).

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam (Suhartono, 2002).

Antioksidan ini bekerja dengan cara menyediakan elektron bagi radikal bebas guna menstabilkan diri sehingga berhenti merusak. Oleh karena itu, berbagai vitamin seperti vitamin E, C, dan beta-karotene yang dikonsumsi, pada dasarnya berfungsi menyediakan elektron bagi kebutuhan radikal bebas, sehingga vitamin-vitamin ini juga disebut sebagai antioksidan (Pratimasari, 2009).

Dalam Islam dinyatakan bahwa, semua yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini mempunyai manfaat masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai makanan pokok ada juga yang dapat dimanfaatkan sebagai obat dengan penyakit-penyakit tertentu. Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 11, yang berbunyi :

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Depag, 2008).

Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah salah satu tanaman yang telah dikembangkan saat ini, hampir seluruh bagian tanamannya dapat digunakan. Kelopak bunga rosella ini mempunyai banyak sekali manfaat dibidang kesehatan (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah pigmen antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Flavonoid rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terdiri dari flavanols dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin ini yang membentuk warna ungu kemerahan yang menarik dikelopak bunga maupun teh hasil seduhan rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit degenerative. Antosianin pada rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) berada dalam glukosida yang terdiri dari *cyaniding - 3 - sambubioside*, *delphinidin - 3 - glukose*, dan *delphinidin - 3 - sambubioside*. Sementara itu, flavonoid terdiri dari gossypetin, hibiscitine, dan quercetia (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Intensitas dan stabilitas pigmen antosianin tergantung pada beberapa faktor termasuk struktur dan konsentrasi dalam pigmen, pH, suhu, intensitas cahaya, dan adanya pigmen lain, ion metal, enzim-enzim, oksigen, asam askorbat, gula dan sulfur oksida (Mazza, 1993; Francis, 1989).

Pengeringan adalah penghidratan, yang berarti menghilangkan air dari suatu bahan. Proses pengeringan atau penghidratan berlaku apabila bahan yang dikeringkan kehilangan sebahagian atau keseluruhan air yang dikandungnya. Proses utama yang terjadi pada pengeringan adalah penguapan. Penguapan terjadi apabila air yang dikandung oleh suatu bahan teruap, yaitu apabila panas diberikan kepada bahan tersebut. Panas ini dapat diberikan melalui berbagai sumber, seperti kayu api, minyak dan gas, arang baru ataupun tenaga surya (Hasibuan,2005).

Menurut Palamidis dan Markakis (1975) yang telah mempelajari pengaruh suhu terhadap stabilitas antosianin dalam minuman ringan dan telah menunjukkan bahwa peningkatan suhu sangat mempercepat kehancuran antosianin dalam minuman ringan. Begitupula Maccarone *et al.* (1985) juga telah mempelajari stabilitas antosianin dalam jus jeruk merah pada suhu 15° C, 25° C dan 35° C selama 15 hari dan menemukan bahwa peningkatan suhu mempercepat pengrusakan dari antosianin.

Hasil penelitian Yusri Grace Sicilia (2009) yang melakukan fraksinasi dan identifikasi ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) berdasarkan aktivitas pengikatan radikal bebas DPPH yang dihitung sebagai *Inhibition Concentration* 50% (IC₅₀) adalah 45,8 µg/ml.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian pengaruh metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) untuk mengetahui aktivitas antioksidan terhadap DPPH dari berbagai metode pengeringan dan bagaimana potensi aktivitas antioksidan yang dinyatakan dalam nilai IC₅₀.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan :

1. Apakah metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) berpengaruh terhadap aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH?
2. Metode pengeringan apakah yang baik untuk mengeringkan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh metode pengeringan yang baik untuk kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.).
2. Menentukan metode pengeringan untuk kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang baik berdasarkan aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan data ilmiah untuk metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang baik dengan tidak mengurangi khasiat yang terdapat dalam kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terutama aktivitas antioksidannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi**

Kerajaan : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Anak divisi : Angiospermae
kelas : Dicotyledoneae
Anak kelas : Dialypetalae
Bangsa : Malvales
Suku : Malvaceae
Marga : Hibiscus
Spesies : *Hibiscus sabdariffa* L. (Mardiah, 2009).

2. **Nama Daerah**

Rosella (Indonesia), *bunga stro'* (Makassar), *merambos hijau* (Jawa Tengah), *gamet malonda* (Sunda), *gamet* (Betawi), *gamet walenda* (Madura), *asam kesur* (Meranjat), *kesew jawe* (Pagar alam, Sumatra selatan), *asam jarot* (Padang), *asam rejang* (Muara Enim), *kasturi roriha* (Ternate) (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

3. **Morfologi**

Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) merupakan herba tahunan yang bisa mencapai ketinggian 0,5 sampai 3 meter. Batangnya bulat, tegak,berkayu dan berwarna merah. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, dan pangkal berlekuk. Panjang daun

6 – 15 cm dan lebarnya 5 – 8 cm. tangkai daun bulat berwarna hijau, dengan panjang 4 sampai 7 cm (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang keluar dari ketiak daun merupakan bunga tunggal, artinya pada setiap tangkai hanya terdapat satu bunga. Kelopak bunga ini sangat menarik dengan bentuk yang menguncup indah, dibentuk dari 5 helai daun kelopak, panjangnya 1 cm, bunga ini juga dilengkapi 8-12 kelopak tambahan (epikaliks). Kelopak bunga ini sering dianggap sebagai bunga oleh masyarakat. Bagian inilah yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman (Widyanto dan Nelistya, 2008).

Mahkota bunga berbentuk corong, terdiri dari 5 helaian, panjangnya 3 sampai 5 cm. Tangkai sari yang merupakan tempat melekatnya kumpulan benang sari berukuran pendek dan tebal, panjangnya sekitar 5 mm dan lebar sekitar 5 mm. Putiknya berbentuk tabung, berwarna kuning atau merah (Mardiah, dkk., 2009).

Buahnya berbentuk kotak kerucut, berambut, dan terbagi menjadi 5 ruang. Bentuk bijinya menyerupai ginjal, berbulu, dengan panjang 5 mm dan lebar 4 mm. Saat masih muda, biji berwarna putih dan setelah tua berubah menjadi abu – abu (Mardiah, 2009).

4. Kandungan Kimia

Berbagai kandungan yang terdapat dalam kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) membuatnya populer sebagai tanaman obat

tradisional. Kandungan vitamin dalam bunga rosella cukup lengkap, yaitu vitamin A, C, D, B₁, dan B₂. Bahkan, kandungan vitamin C-nya (asam askorbat) diketahui 3 kali lebih banyak dari anggur hitam, 9 kali dari jeruk sitrus, 10 kali dari buah belimbing, dan 2,5 kali dari jambu biji. Vitamin C merupakan salah satu antioksidan penting. Hasil penelitian Ir. Didah Nurfarida M.Si., mengungkapkan bahwa kandungan antioksidan pada bunga rosella sebanyak 1,7 mmol / prolox. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada jumlah pada kumis kucing (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah pigmen antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Flavonoid rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terdiri dari flavanols dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin ini yang membentuk warna ungu kemerahan yang menarik di kelopak bunga maupun teh hasil seduhan rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit degenerative. Antosianin pada rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) berada dalam glukosida yang terdiri dari *cyaniding - 3 - sambubioside*, *delphinidin - 3 - glukose*, dan *delphinidin - 3 - sambubioside*. Sementara itu, flavonoid terdiri dari gossypetin, hibiscitine, dan quercetin (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) juga mengandung sabbaretine, kalsium, magnesium, beta-karoten, fosfor, zat besi, asam organik, asam amino esensial (lisin dan arginin), polisakarida, dan omega-3. Kandungan omega-3 ini bermanfaat untuk pertumbuhan dan

kecerdasan otak anak. Asam sitrat dan asam malat menambah sensasi asam yang menyegarkan ketika kelopak diseduh. Kelopak bunganya yang mengandung protein, karbohidrat, serat, mineral, kalori, dan berbagai vitamin cocok untuk dijadikan bahan minuman pemulih stamina (Mardiah, 2009).

Senyawa kimia yang terdapat pada bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) per 100 g : 49 kalori; 84,5% H₂O; 1,9 g protein; 0,1 g lemak; 12,3 total karbohidrat; 2,3 g serat; 1,2 g abu; 1,72 mg Ca; 57 mg Fosfor; 2,9 mg Fe; Beta-karoten yang setara dengan 300 mg; dan 14 mg asam askorbat (Mardiah, dkk., 2009).

Adanya saponin, tannin, dan glikosida telah dilaporkan. Senyawa lain yang telah ditemukan adalah asam protokatekin (Mardiah, dkk., 2009; Maryani dan Kristiana, L., 2008).

5. Kegunaan

Kelopak rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) mengandung antioksidan yang dapat menghambat terakumulasinya radikal bebas penyebab penyakit kronis, seperti kerusakan ginjal, diabetes, jantung koroner, dan kanker. Antioksidan juga dapat mencegah penuaan dini. Dalam hal ini, salah satu zat aktif yang berperan adalah antosianin. Antosianin merupakan pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah pada bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dan berperan mencegah kerusakan sel akibat paparan sinar UV berlebih. Salah satu khasiatnya adalah dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, bahkan mematikan sel kanker tersebut.

Antosianin yang berpengaruh diberi nama *delphinidin 3-sambubioside* (Maryani dan Kristiana, L., 2008).

Masyarakat tradisional di berbagai Negara telah memanfaatkan tanaman rosela (*Hibiscus sabdariffa* L.) untuk mengatasi berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Pemanfaatan tanaman rosela (*Hibiscus sabdariffa* L.) ini berkaitan dengan fungsinya sebagai antiseptik, aprodisiak (meningkatkan gairah seksual), astringen, *demulcent* (menetralsir asam lambung), *digestif* (melancarkan pencernaan), diuretik, *purgative*, *anthelmentic* (anticacing), *stomathic*, serta mengobati kanker, batuk, *dyspepsia* (sakit maag), *dysuria* (sakit buang air kecil), demam, *hangover* (kembung perut), hipertensi (darah tinggi), *neurosis* dan sariawan (Mardiah, 2009; Maryani dan Kristiana, L., 2008).

B. Uraian Pengeringan

Prinsip pengeringan biasanya akan melibatkan dua kejadian yaitu (1) panas harus diberikan pada bahan, dan (2) air harus dikeluarkan dari bahan. Dua fenomena ini menyangkut pindah panas ke dalam dan pindah massa ke luar.

Yang dimaksudkan dengan pindah massa adalah pemindahan air keluar dari bahan pangan. Dalam pengeringan pangan umumnya diinginkan kecepatan pengeringan yang maksimum. Oleh karena itu, semua usaha dibuat untuk mempercepat pindah panas dan pindah massa.

Perpindahan panas dalam proses pengeringan dapat terjadi melalui dua cara yaitu pengeringan langsung dan pengeringan tidak langsung.

Pengeringan langsung yaitu sumber panas berhubungan dengan bahan yang dikeringkan, sedangkan pengeringan tidak langsung yaitu panas dari sumber panas dilewatkan melalui permukaan benda padat (konverter) dan konverter tersebut yang berhubungan dengan bahan pangan.

Setelah panas sampai ke bahan pangan maka air dari sel-sel bahan pangan akan bergerak ke permukaan bahan kemudian keluar. Mekanisme keluarnya air dari dalam bahan selama pengeringan adalah sebagai berikut:

1. Air bergerak melalui tekanan kapiler.
2. Penarikan air disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan disetiap bagian bahan.
3. Penarikan air ke permukaan bahan disebabkan oleh absorpsi dari lapisan-lapisan permukaan komponen padatan dari bahan.
4. Perpindahan air dari bahan ke udara disebabkan oleh perbedaan tekanan uap.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kecepatan pengeringan tersebut adalah:

a. Luas Permukaan

Air menguap melalui permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan dan kemudian menguap. Untuk mempercepat pengeringan umumnya bahan pangan yang akan dikeringkan dipotong-potong atau diirisiris terlebih dulu.

Hal ini terjadi karena: (1) pemotongan atau pengirisan tersebut akan memperluas permukaan bahan dan permukaan yang luas dapat berhubungan

dengan medium pemanasan sehingga air mudah keluar, (2) potongan-potongan kecil atau lapisan yang tipis mengurangi jarak dimana panas harus bergerak sampai ke pusat bahan pangan. Potongan kecil juga akan mengurangi jarak melalui massa air dari pusat bahan yang harus keluar ke permukaan bahan dan kemudian keluar dari bahan tersebut.

b. Perbedaan Suhu dan Udara Sekitarnya

Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan makin cepat pemindahan panas ke dalam bahan dan makin cepat pula penghilangan air dari bahan.

Air yang keluar dari bahan yang dikeringkan akan menjenuhkan udara sehingga kemampuannya untuk menyingkirkan air berkurang. Jadi dengan semakin tinggi suhu pengeringan maka proses pengeringan akan semakin cepat. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan bahan yang dikeringkan, akibatnya akan terjadi suatu peristiwa yang disebut "Case Hardening", yaitu suatu keadaan dimana bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah.

c. Kecepatan Aliran Udara

Udara yang bergerak dan mempunyai gerakan yang tinggi selain dapat mengambil uap air juga akan menghilangkan uap air tersebut dari permukaan bahan pangan, sehingga akan mencegah terjadinya atmosfer jenuh yang akan memperlambat penghilangan air.

Apabila aliran udara disekitar tempat pengeringan berjalan dengan baik, proses pengeringan akan semakin cepat, yaitu semakin mudah dan semakin cepat uap air terbawa dan teruapkan.

d. Tekanan Udara

Semakin kecil tekanan udara akan semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan, karena dengan semakin kecilnya tekanan berarti kerapatan udara makin berkurang sehingga uap air dapat lebih banyak tertampung dan disingkirkan dari bahan pangan. Sebaliknya jika tekanan udara semakin besar maka udara disekitar pengeringan akan lembab, sehingga kemampuan menampung uap air terbatas dan menghambat proses atau laju pengeringan (Supriyono, 2003).

C. Uraian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat yang berkhasiat atau zat-zat dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda pula dengan ketebalannya, sehingga diperlukan dengan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Harborne, J.B., 1987).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati dan simplisia nabati menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan adapun mekanisme ekstraksi yaitu pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat

aktif, zat aktif akan melarut dalam pelarut organik tersebut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dan pelarut organik diluar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif dalam dan luar sel (Harborne, J.B., 1987).

Secara umum, terdapat empat situasi dilakukanya suatu metode ekstraksi :

- a. Senyawa kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan dengan kebutuhan pemakai.
- b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya alkaloid, flavonoid, atau saponin, meskipun struktur kimia sebetulnya dari senyawa ini, bahkan keberadaannya belum diketahui. Dalam situasi seperti ini, metode umum yang dapat digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka. Hal ini diikuti dengan uji kimia atau kromatografi yang sesuai untuk kelompok senyawa kimia tersebut.
- c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan berbagai cara, misalnya Tradisional Chinese Medicine (TCM) seringkali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air dan dekok untuk diberikan sebagai

obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan tradisional.

- d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (utamanya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah untuk menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi khusus. Oleh karena itu, perlu pemilihan metode ekstraksi yang sesuai untuk biosassay dan juga mencoba mengekstraksi sebanyak mungkin tipe senyawa kimia. Secara umum hal ini dicapai dengan menggunakan serangkaian pelarut, tetapi jumlah pelarut yang digunakan harus dibatasi oleh skala program skrining. Jika hanya sedikit organisme yang diuji, dapat dibuat dengan berbagai jenis ekstrak dari tiap sampel, sedangkan dalam program skrining skala besar yang mencakup ribuan organisme, hanya satu atau dua ekstrak (biasanya dengan polaritas berbeda) yang dibuat dari masing-masing sampel (Harborne, J.B., 1987).

D. Penetapan Kadar Air

Air merupakan zat yang esensial bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Diantara air berperan sebagai materi penyusun setiap sel tubuh, pelarut, alat transpor, katalisator berbagai reaksi biologi dalam sel, dan berbagai fungsi lainnya dalam tubuh. Seluruh bahan pangan memiliki

kandungan air. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan air yang sangat signifikan terkait perannya yang begitu kompleks dalam tubuh. Selain air, bahan pangan juga mengandung zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan atau biasa disebut dengan zat-zat gizi. Zat gizi tersebut telah dibuktikan bermanfaat dalam menjaga atau mengobati satu atau lebih penyakit atau meningkatkan performa fisiologisnya (Winarno, 1990).

Kandungan air dari suatu bahan pangan perlu diketahui terutama untuk menentukan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Jumlah kadar air terdapat didalam suatu bahan pangan sangat berpengaruh atas seluruh susunan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Dengan diketahuinya kandungan air dari suatu bahan pangan, maka dapat diketahui berat kering dari bahan tersebut yang biasanya konstan (Nurhalimah, 2010).

Penentuan kadar air suatu bahan pangan bergantung pada sifat bahan pangan itu sendiri. Penentuan ini terkadang tidak mudah dilakukan karena terdapat bahan yang mudah menguap pada beberapa jenis bahan pangan, dan adanya air yang terurai pada bahan pangan, serta oksidasi lemak pada bahan pangan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan kadar air yang tepat yaitu air yang ada dalam bahan pangan terikat secara fisik dan ada yang secara kimia (Nurhalimah, 2010).

Air yang terdapat dalam suatu bahan makanan terdapat dalam tiga bentuk:

1. Air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antarsel dan intergranular dan pori-pori yang terdapat pada bahan.
2. Air yang terikat secara lemah karena terserap (teradsorpsi) pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin pati, selulosa. Selain itu air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada di dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen.
3. Air yang dalam keadaan terikat kuat yaitu membentuk hidrat. Ikatannya berifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada suhu 0°F (Anonim, 2010).

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam satuan persen. Kadar air juga merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air menyebabkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Haryanto, 1992).

Metode destilasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan kadar air suatu bahan pangan yang mudah menguap, memiliki kandungan air

tinggi, dan bahan yang mudah teroksidasi. Metode ini digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki ciri-ciri di atas agar pengeringan yang dilakukan tidak menghilangkan kadar air seluruhnya.

Destilasi dilakukan melalui tiga tahap, yakni evaporasi yaitu memindahkan pelarut sebagai uap air dari cairan, pemisahan uap cairan di dalam klom, untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih *volatile* (mengandung senyawa-senyawa yang mudah menguap) dari komponen lain yang kurang *volatile*, dan kondensasi dari uap cairan untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih *volatile* (Guenther, 1987).

Metode destilasi ini digunakan suatu pelarut yang *immiscible* yaitu pelarut yang tidak dapat saling bercampur dengan air dan diisuling bersama-sama dari contoh yang telah ditimbang dengan teliti. Pelarut tersebut memiliki titik didih sedikit di atas titik didih air. Pelarut yang biasa digunakan adalah toluene, xylene, dan campuran pelarut-pelarut ini dengan pelarut lain. Metode ini sering digunakan pada produik-produk bahan pangan yang mengandung sedikit air atau mengandung senyawa *volatile*, diantaranya adalah keju biru, kopi dan bahan *volatile* seperti rempah-rempah yang banyak mengandung minyak *volatile*.

Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas (atau uap) menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi (tekanan ditingkatkan) menjadi cairan, atau mengalami

kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut kondensat. Sebuah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan disebut kondenser. Kondenser umumnya adalah sebuah pendingin atau penukar panas yang digunakan untuk berbagai tujuan, memiliki rancangan yang bervariasi, dan banyak ukurannya dari yang dapat digenggam sampai yang sangat besar (Guenther, 1987).

E. Uraian Radikal Bebas

Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan (Minarsih, 2007). Tidak semua spesies oksigen reaktif adalah radikal bebas, umpamanya H_2O_2 & *singlet* oksigen bukan radikal bebas, tetapi termasuk spesies oksigen reaktif. Karena adanya kecenderungan mengambil sebuah elektron dan senyawa-senyawa lain, maka spesies oksigen ini sangat reaktif (Lautan, 1997).

Senyawa ini terbentuk di dalam tubuh, dipicu oleh bermacam-macam faktor. Radikal bebas bisa terbentuk, misalnya, ketika komponen makanan diubah menjadi bentuk energi melalui proses metabolisme. Pada proses metabolisme ini, seringkali terjadi kebocoran elektron. Dalam kondisi demikian, mudah sekali terbentuk radikal bebas, seperti anion superoksida, hidroksil dan lain-lain. Radikal bebas juga dapat terbentuk dari senyawa lain yang sebenarnya bukan radikal bebas, tetapi mudah berubah menjadi radikal bebas. Misalnya hidrogen peroksida (H_2O_2), ozon dan lain-lain. Kedua

kelompok senyawa tersebut sering diistilahkan sebagai Senyawa Oksigen Reaktif (SOR) atau *Reactive Oxygen Species* (ROS) (Minarsih, 2007).

Radikal bebas dianggap berbahaya karena menjadi sangat reaktif dalam upaya mendapatkan pasangan elektronnya, dapat pula terbentuk radikal bebas baru dari atom atau molekul yang elektronnya terambil untuk berpasangan dengan radikal bebas sebelumnya. Dalam gerakannya yang tidak beraturan, karena sangat reaktif, radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan di berbagai bagian sel (Muhilal, 1991).

Reaksi radikal bebas sebenarnya adalah suatu mekanisme biokimia yang normal terjadi dalam tubuh kita. Radikal bebas biasanya hanya bersifat intermediat (perantara), dan kemudian cepat diubah menjadi substansi lain yang tidak lagi membahayakan tubuh kita, misalnya hormon-hormon prostaglandin yang dibentuk melalui suatu seri reaksi radikal bebas, atau reaksi detoksifikasi racun yang masuk ke dalam tubuh yang juga mengikutsertakan radikal bebas. Tetapi jika pada kesempatan yang berumur sangat pendek ini, radikal bebas bertemu DNA atau enzim atau asam lemak majemuk tak jenuh (*polyunsaturated fats*), maka suatu permulaan kerusakan sel dapat terjadi (Husaini, 1991).

Sebab-sebab yang dapat meningkatkan atau memicu pembentukan radikal bebas:

1. Sebab dari dalam tubuh
 - a. Proses oksidasi yang berlebihan.

b. Proses olahraga yang berlebihan yang mana dapat menghasilkan radikal bebas tambahan sesuai dengan bertambahnya kebutuhan energi dan pembakaran biokimia dalam tubuh.

c. Proses peradangan akibat menderita sakit kronik atau tumor/kanker. Radikal bebas aktif diproduksi dari luka atau otot yang digunakan secara berlebihan. Termasuk juga pada penderita diabetes, bertahun-tahun terpapar kadar gula darah yang tinggi. Kondisi ini menghasilkan molekul oksigen yang tidak stabil terus menerus. Oleh karena itu, sangat penting penderita kronik atau kanker dalam hal ini menambah jumlah antioksidannya.

d. Dalam keadaan stres psikologis yang terus menerus mengakibatkan produksi radikal bebas yang berlebihan. Karena itu banyak studi yang mengaitkan serangan jantung dan kanker.

2. Penyebab dari luar tubuh

a. Menghirup asap rokok. Radikal bebas dari asap rokok masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan. Molekul oksigen yang tidak stabil dapat langsung merusak jaringan paru atau memicu lepasnya spesies oksigen reaktif dalam sel-sel tubuh termasuk sel darah putih.

b. Menghirup udara/lingkungan tercemar. Sama seperti rokok udara yang begitu terpolusi dan tercemar akibat buangan kendaraan bermotor, hasil pabrik dan pembakaran sampah bisa masuk melalui paru manusia dan radikal bebas tersebut merusak sel-sel tubuh dengan cara menembus membran sel.

c. Radiasi matahari/kosmis. Sinar ultraviolet yang kuat ini dipancarkan matahari dan dapat merusak sel.

- d. Radiasi foto terapi (penyinaran). Sinar X atau radio isotop merupakan radikal bebas yang sangat kuat.
- e. Konsumsi obat-obatan termasuk kemoterapi. Obat- obatan termasuk obat antikanker, selain menyerang sel-sel kanker, obat tersebut juga merupakan radikal bebas bagi sel-sel normal lainnya.
- f. Pestisida dan zat kimia pencemaran lain. Masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang terpapar dengan pestisida atau zat kimia pencemaran lainnya. Keadaan ini terus menerus berlangsung di saluran cerna (Tapan, 2005).

Radikal anion superoksida, hidrogen peroksida dan radikal hidroksil adalah 3 macam hasil metabolisme yang bila tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan. Substan yang paling reaktif dan berbahaya adalah radikal hidroksil (OH°) yang mempunyai kemampuan merusak sel. Zat gizi yang paling sensitif terhadap kerusakan oleh radikal bebas adalah asam lemak majemuk tak jenuh, yang dikenal dengan sebutan lipid peroksidasi. Di luar tubuh, asam lemak dalam makanan yang bereaksi dengan radikal bebas menghasilkan peroksidasi yang disebut tengik. Selain radikal oksigen, polusi kimia juga dapat menimbulkan lipid peroksidasi. Di dalam tubuh, reaksi radikal bebas menyebabkan kerusakan sel dan lapisan-lapisan pelindung yang mengelilingi sel. Akumulasi kerusakan sel-sel ini dalam waktu lama (bertahun-tahun) menimbulkan tanda-tanda tua seperti bintik-bintik hitam di wajah dan keriput. Jadi proses degeneratif terjadi lewat reaksi radikal bebas ini (Husaini, 1991).

Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh serangan radikal bebas antara lain (Muhilal, 1991) :

1. Membran sel

Terutama komponen penyusun membran berupa asam lemak tak jenuh yang merupakan bagian dari fosfolipid dan mungkin juga protein. Perusakan bagian dalam pembuluh darah akan mempermudah pengendapan berbagai zat pada bagian yang rusak tersebut, termasuk kolesterol, sehingga timbul atherosklerosis. Serangan radikal hidroksil pada asam lemak tak jenuh dimulai dengan interaksi oksigen pada rangkaian karbon pada posisi tak jenuh sehingga terbentuk lipid hidroperoksida, yang selanjutnya merusak bagian sel di mana hidroperoksida ini berada.

2. Kerusakan protein

Terjadinya kerusakan protein termasuk oksidasi protein akan mengakibatkan kerusakan jaringan tempat protein itu berada; sebagai contoh kerusakan protein pada lensa mata mengakibatkan terjadinya katarak.

3. Kerusakan DNA (deoxy nucleic acid)

Radikal bebas hanya salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kerusakan DNA. Penyebab lain misalnya virus, radiasi dan zat kimia karsinogen. Sebagai akibat kerusakan DNA ini dapat timbul penyakit

kanker. Kerusakan dapat berupa kerusakan awal, fase transisi dan permanen.

4. Kerusakan lipid peroksida

Lipida dianggap molekul yang paling sensitif terhadap serangan radikal bebas sehingga terbentuk lipid peroksida. Terbentuknya lipid peroksida yang selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan lain dianggap salah satu penyebab pula terjadinya berbagai penyakit degeneratif.

5. Dapat menimbulkan autoimun

Autoimun adalah terbentuknya antibodi terhadap suatu sel tubuh biasa. Pada keadaan normal antibodi hanya terbentuk bila ada antigen yang masuk dalam tubuh. Adanya antibodi untuk sel tubuh biasa dapat merusak jaringan tubuh dan sangat berbahaya.

6. Proses ketuaan

Secara teori radikal bebas dapat dipunahkan oleh berbagai antioksidan, tetapi tidak pernah mencapai 100%. Karena itu secara pelan dan pasti terjadi kerusakan jaringan oleh radikal bebas yang tidak terpunahkan. Kerusakan jaringan secara pelan ini merupakan proses terjadinya ketuaan. Yang ingin awet muda perlu banyak mengkonsumsi zat gizi yang dapat memusnahkan radikal bebas.

Awal terjadinya radikal bebas antara lain dari proses reduksi molekul oksigen (zat asam) dalam rangkaian elektron transport dalam mitokondria atau dalam proses-proses lain yang terjadi secara acak dari berbagai proses kimiawi dalam tubuh yang melibatkan senyawa organik maupun anorganik.

Radikal bebas yang berupa peroksil anion ini akan bereaksi dengan dua proton (2H^+) membentuk hidrogen peroksida (H_2O_2). Hidrogen peroksida dapat pula terbentuk dari air (H_2O) yang terkena radiasi dan karena proses-proses lain. Dengan keberadaan zat besi (Fe^{2+}) hidrogen peroksida tersebut mengalami serangkaian reaksi sehingga terbentuk radikal hidroksil (OH^\cdot) yang sangat reaktif. Radikal bebas yang terbentuk ini mempunyai waktu paruh yang sangat pendek, tetapi tetap mempunyai potensi besar yang dapat merusak sel. Radikal hidroksil, yang diduga dalam kehidupan kita banyak terbentuk, dianggap lebih berbahaya dibanding bentuk radikal bebas yang lain.

F. Uraian Antioksidan

Antioksidan didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif yang membentuk radikal bebas tidak reaktif yang tidak stabil. Antioksidan merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran. Dalam pengertian kimia antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi elektron, tetapi dalam pengertian biologis lebih luas lagi, yaitu semua senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim-enzim dan protein-protein pengikat logam. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas sehingga antioksidan dapat mencegah penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskular, dan penuaan (Siagian, 2002).

1. Jenis-Jenis Antioksidan

a. Antioksidan Primer

Antioksidan primer adalah suatu zat yang dapat menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. Zat-zat yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berasal dari alam dan dapat pula buatan antara lain: tokoferol, lesitin, fosfatida, sedamol, gosipol, dan asam askorbat. Antioksidan alam yang paling banyak ditemukan dalam minyak nabati adalah tokoferol yang mempunyai keaktifan vitamin E dan terdapat dalam bentuk α , β , γ , dan α -tokoferol, tapi α -tokoferol yang menunjukkan keaktifan vitamin E yang paling tinggi.

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dan dapat ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, flavanoid, vitamin C, Vitamin E, beta karoten, katekin dan resveratrol.

Antioksidan sintetik yang banyak digunakan sekarang adalah senyawa-senyawa fenol yang biasanya agak beracun. Karena itu penambahan antioksidan harus memenuhi beberapa syarat, misalnya tidak berbahaya bagi kesehatan, tidak menimbulkan warna yang tidak diinginkan, efek pada konsentrasi rendah, larut dalam lemak, mudah didapat dan ekonomis. Empat macam antioksidan yang sering digunakan pada bahan makanan adalah *Butylated hydroxyanisole*

(BHA), *Butylated hydroxytoluene* (BHT), *Propylgallate* (PG), dan *Nordihydroquairitic acid* (NDGA).

b. Antioksidan Sekunder

Antioksidan sekunder adalah suatu zat yang dapat mencegah kerja prooksidan sehingga dapat digolongkan sebagai senyawa. Beberapa asam organik tertentu biasanya asam di- atau trikarboksilat, dapat mengikat logam-logam (sekuistran). Misalnya satu molekul asam sitrat akan mengikat prooksidan Fe sering dilakukan pada minyak kacang kedelai EDTA adalah sekuistran logam yang sering digunakan dalam minyak salad.

Dalam penggunaan antioksidan, harus dipikirkan bahwa terdapat keadaan atau zat tertentu yang dapat mempermudah terjadinya reaksi oksidasi, seperti panas, cahaya dan logam. Selain itu, terdapat pula zat antioksidan yang kehilangan daya antioksidannya setelah berikatan dengan oksigen sehingga tidak berfaedah bila digunakan, terutama di dalam pemrosesan makanan dalam sistem terbuka (Arisman, 2009).

2. Mekanisme Kerja Antioksidan (Siagian, 2002)

Antioksidan bekerja melindungi sel dan jaringan sasaran dengan cara :

- a. Memusnahkan (scavenge) radikal bebas secara enzimatik atau dengan reaksi kimia langsung.
- b. Mengurangi pembentukan radikal bebas.
- c. Mengikat ion logam yang terlibat dalam pembentukan spesies yang reaktif (transferin,albumin).

- d. Memperbaiki kerusakan sasaran.
- e. Menghancurkan molekul yang rusak dan menggantinya dengan baru.

Tubuh sendiri membuat tiga jenis antioksidan yakni, antioksidan primer (*superoxidedismutase (SOD)*, *glutathion peroxidase (GPx)*, dan protein pengikat, *ferritin, ceruloplasmin*). Tugasnya mencegah pembentukan radikal bebas baru dan mengubah radikal bebas menjadi bahan yang tidak berbahaya lagi. Ada juga antioksidan jenis sekunder. Ini berasal dari vitamin C, vitamin E dan *betacarotene*. Jenis antioksidan ini bertugas menangkap radikal bebas dan mencegah reaksi berantai yang akan merusak tubuh. Sedangkan antioksidan jenis tersier (*DNA-repair enzym; methionin sulfoxidereductase*) bertugas memperbaiki kerusakan tubuh yang timbul akibat radikal bebas (Nadesul, 2006).

G. Uraian DPPH


Radikal DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*) adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ_{\max} 517 nm dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007). Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi (Pratimasari, 2009). Keberadaan sebuah antioksidan yang

mana dapat menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH (Vaya dan Aviram, 2001). Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil (Sunarni, 2005).


Metode DPPH adalah suatu metode kolorimetri yang efektif dan cepat untuk memperkirakan aktivitas antiradikal/antioksidan. Uji kimia ini secara luas digunakan dalam penelitian produk alami untuk isolasi antioksidan fitokimia dan untuk menguji seberapa besar kapasitas ekstrak dan senyawa murni dalam menyerap radikal bebas. Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas transfer hidrogen sekaligus untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas (Pratimasari, 2009).

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya CUPRAC, DPPH, dan FRAP (Widyastuti, 2010).

- a. Metode CUPRAC (Apak et al. 2007) menggunakan bis (neocuproin) tembaga (II) ($\text{Cu}(\text{Nc})_2^{2+}$) sebagai pereaksi kromogenik. Pereaksi $\text{Cu}(\text{Nc})_2^{2+}$ yang berwarna biru akan mengalami reduksi menjadi $\text{Cu}(\text{Nc})_2^+$ yang berwarna kuning dengan reaksi:



- b. Metode DPPH menggunakan *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* sebagai sumber radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan dengan reaksi sebagai berikut:




1,1-difenil-2-pikrilhidrazil

1,1-difenil-2-pikrilhidrazin

Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Prakash, 2001).

c. Metode FRAF (Benzie dan Strain 1996) menggunakan $\text{Fe}(\text{TPTZ})_2^{3+}$ kompleks besi ligan 2,4,6-tripiridil-triazin sebagai pereaksi. Kompleks biru $\text{Fe}(\text{TPTZ})_2^{3+}$ yang berwarna kuning dengan reaksi berikut:



Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian antioksidan atau peredam radikal bebas adalah *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* (DPPH) (Sawai *et al.*, 1998 ; Senba *et al.*, 1999 ; Yokozawa *et al.*, 1998 *cit* Windono *et al.*, 2001). Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk skrining aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa (Koleva *et al.*, 2001 *cit* 11 Marxen *et al.*, 2007), selain itu metode ini terbukti akurat, reliabel dan praktis (Prakash *et al.*, 2001; Pratimasari, 2009).

H. Uraian Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri merupakan salah satu cabang analisis instrumental yang membahas tentang interaksi atom atau molekul radiasi elektromagnetik (REM). Komponen pokok dari spektrofotometri meliputi sumber tenaga

radiasi yang stabil, sistem yang terdiri atas lensa-lensa, cermin, celah-celah, monokromator untuk mengubah radiasi menjadi komponen-komponen panjang gelombang tunggal, tempat cuplikan yang transparan dan detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau pencatat.


Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dan spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi (Khopkar, 1990).

Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis yang berdasarkan pada hasil interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik. Interaksi tersebut akan menghasilkan peristiwa berupa hamburan, serapan, dan emisi (Mulja, 1995).

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi radiasi UV-Vis terhadap molekul yang mengakibatkan molekul mengalami transisi elektronik, sehingga disebut spektrum elektronik. Hal ini didapat karena adanya gugus berikatan rangkap atau terkonjugasi yang mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah UV-Vis (Mulja, 1995).

Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorpsi pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak. Dalam instrument ini suatu sinar cahaya terpecah sebagian cahaya diarahkan melalui sel transparan yang mengandung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu

senyawa yang mengandung ikatan-ikatan rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diabsorpsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorpsi, tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur senyawa. Absorpsi radiasi disebabkan oleh pengurangan energi cahaya radiasi ketika elektron dalam orbital dari rendah tereksitasi keorbital energi tinggi.



Gambar 2. Skema kerja spektrofotometer UV-Vis (Mulja, 1995).

Kerja alat ini adalah sebagai berikut: suatu radiasi dikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blangko yang dapat berupa pelarut atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blangko kemudian diteruskan ke detektor, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detektor alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinyal listrik yang jika diamplifikasikan akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas kertas grafik khusus alat ini.

1. Sumber radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungstein, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hydrogen dan lampu deuterium (D_2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kekurangan lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat).

Lampu tungstein merupakan campuran dari filament tungstein gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filter-prisma-kisi(grating)-celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai.

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Sel / Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur.

I. Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuh-Tumbuhan

Agama Islam mengandung tuntunan agar masyarakat khususnya umat Islam memelihara kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit. Salah satunya dengan memanfaatkan segala macam tumbuhan yang diciptakan Allah SWT sesuai dengan fungsinya masing-masing. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya (H.R. Al-Bukhari) (Al-Bukhari).

Pencegahan penyakit dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT Hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Jika dilihat dari pandangan agama, pigmen senyawa antosianin yang terdapat pada kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dapat dijadikan sebagai pewarna alami makanan serta pencegahan kanker, hal itu dapat dilihat dari kehalalan dan kebaikan dari pigmen tersebut. Selama ini pewarna yang digunakan untuk bahan pewarna dalam makanan adalah pewarna sintetik yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan dapat mengganggu bagi kesehatan tubuh manusia. Padahal sejak dahulu Allah SWT sudah menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu memakan makanan yang halal tapi juga harus baik, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Depag, 2008).

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT mencintai sesuatu yang baik serta halal dan selalu memerintahkan kepada hambaNya untuk melakukan sesuatu hal yang baik-baik pula. Misalnya, kita diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik (bergizi, mengandung protein, karbohidrat, vitamin dan lemak) serta halal. Makanan yang baik serta halal itu tentunya tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh kita, tetapi memperlancarkan proses metabolisme tubuh dan membantu perkembangan rohani dan jasmani ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh yang memberikan efek positif bagi tubuh kita adalah kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*).

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang, sudah tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari tabib atau dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya,

sebagaimana yang diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir r.a Nabi saw bersabda; Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla (HR. Muslim) (Al-Mundziri, 2003).

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah *washilah*.

Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak, apabila Allah SWT belum menghendaki atau menunda suatu penyembuhan (Al-Ju'aisin, 2001).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Alat dan bahan yang digunakan*

1. **Alat-alat yang digunakan**

Alat-alat gelas, oven (MEMMERT[®]), mikro pipet (SOCOREX ISBA S.A), pipet volume (IWAKI TE-32 PYREX[®]), rotavapor (IKA[®] RV 10 basic), seperangkat alat maserasi, seperangkat alat perhitungan kadar air, spektrofotometer UV-Vis (GENESYS 10S UV-Vis), dan timbangan analitik (KERN ALJ 220-4NM).

2. **Bahan-bahan yang digunakan**

Aluminum foil, aquadest, bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.), DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl*), etanol 70%, etanol p.a., dan toluen.

B. *Prosedur Kerja*

1. **Pengambilan sampel**

Sampel yang digunakan berupa kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dari Antang-Makassar.

2. **Pengolahan sampel**

Kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.), yang telah diambil kemudian dibersihkan dari kotoran lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dengan berbagai metode pengeringan yaitu pertama dengan cara kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dikeringkan di bawah

sinar matahari (ditutup pakai kain hitam) selama 10 hari, yang kedua dikeringkan pada oven dengan suhu 50°C yang dikeringkan selama 5 hari dan cara yang terakhir kelopak rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dikeringanginkan dalam ruangan selama 15 hari kemudian diserbukkan, setelah itu, ditimbang sampel ditentukan kadar airnya selanjutnya diekstraksi.

3. Penetapan Kadar Air

Dirangkai alat destilasi kemudian dipipet 100 ml toluen, dimasukkan ke dalam corong pisah kemudian ditambahkan air lalu dikocok kuat dalam satu arah. Setelah itu, didiamkan beberapa menit kemudian pisahkan antara toluen dengan air, lapisan air dibuang dan toluennya dimasukkan kedalam labu alas datar yang berisi batu didih kemudian labu alas datar dipasang pada alat penyambung destilasi lalu dipanaskan. Diamati tetesan air hasil destilasi, dialat penampung. Setelah terlihat tidak ada lagi tambahan air yang menetes pada alat penampung maka destilasi dihentikan. Kemudian dimasukkan sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebanyak 10 gram kedalam labu alas datar. Labu alas datar dipasang pada alat destilasi kemudian dipanaskan lagi dengan pemanasan langsung. Diamati tetesan air hasil destilat dialat penampung. Setelah terlihat tidak ada lagi tambahan air yang menetes pada alat penampung maka destilasi dihentikan, kemudian dihitung volume air dan % kadarnya.

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{\text{Volume air yang tertampung}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

4. Ekstraksi Sampel

Sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 80 g dan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 70% sampai sampel terendam dengan cairan penyari. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3x24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas tersebut diekstraksi kembali dengan etanol 70% yang baru dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dilakukan selama 3 kali. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan cairan penyarinya diuapkan sampai diperoleh ekstrak etanol yang kental.

5. Penetapan IC₅₀ (Sihombing dan Kuncayono, 2007)

Penetapan IC₅₀ dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* Linn) (sampel) dilakukan dengan metode peredaman radikal bebas dengan menggunakan DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*) secara spektrofotometri UV-Visible.

a. Pembuatan larutan DPPH

Serbuk DPPH sebanyak 13,52 mg dilarutkan dengan 100 ml etanol p.a. dalam labu tentukur. Larutan dijaga pada suhu kamar, terlindung dari cahaya untuk segera digunakan.

b. Penetapan panjang gelombang (λ) maksimum DPPH

Larutan DPPH sebanyak 1 ml dipipet ke dalam vial kemudian dicukupkan volumenya sampai 5 ml dengan etanol p.a, dihomogenkan kemudian dibiarkan selama 30 menit pada suhu 37°C, selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh panjang gelombang maksimum DPPH yaitu 517 nm.

c. Pengukuran serapan blanko

Pengukuran dilakukan dengan memipet 1 ml larutan DPPH dan dicukupkan volumenya sampai 5 ml. Campuran dikocok dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm, dilakukan sebanyak 3 replikasi.

Besarnya persentase pengikatan radikal bebas dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Penghambatan} = \frac{\text{Absorban blanko} - \text{Absorban sampel}}{\text{Absorban blanko}} \times 100\%$$

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan regresi linear dari data % inhibisi dengan konsentrasi sampel.

d. Pengukuran aktivitas antioksidan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Ditimbang ekstrak etanol kental kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebanyak 50 mg yang dikeringkan dalam oven kemudian dilarutkan dengan 100 ml etanol 70% p.a., diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 500 bpj. Dari larutan stok masing-masing dipipet 300 μ l, 500 μ l, 700 μ l, 900 μ l, dan 1100 μ l, kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a. sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 30 ppm, 50 ppm, 70 ppm, 90 ppm dan 110 ppm. Campuran tersebut dikocok dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C . Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm, dilakukan sebanyak 3 replikasi. Sama halnya untuk pengukuran aktivitas antioksidan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dengan metode pengeringan di bawah sinar matahari dan dalam ruangan, dan dilakukan sebanyak 3 replikasi juga.

Besarnya persentase pengikatan radikal bebas dihitung dengan

rumus:

$$\% \text{ Penghambatan} = \frac{\text{Absorban blanko} - \text{Absorban sampel}}{\text{Absorban blanko}} \times 100\%$$

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan regresi linear dari data % inhibisi dengan konsentrasi sampel.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil maserasi kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang ditimbang sebanyak 80 gram dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1000 mL.

Tabel 1. Hasil maserasi kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Sampel Maserasi	Metode Pengeringan	Jumlah (gram) ekstrak etanol kental	Rendamen (%)
Kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	Pengeringan Ruangan	22,16	27,7
	Pengeringan Matahari	22,49	28,11
	Pengeringan Oven	22,91	28,64

Hasil penentuan kadar air yang didapatkan pada sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dalam berbagai metode pengeringan.

Tabel. 2 Hasil penetapan kadar air kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Sampel	Metode Pengeringan	(%) Kadar Air (v/b)
Kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	Pengeringan Ruangan	9
	Pengeringan Matahari	9
	Pengeringan Oven	9,5

Hasil perhitungan pengukuran % penghambatan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dalam berbagai metode pengeringan.

Tabel 3. Hasil perhitungan pengukuran % penghambatan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH

Konsentrasi ekstrak etanol (µg/ml)	% Penghambatan (%)								
	Pengeringan Ruangan			Pengeringan Matahari			Pengeringan Oven		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
30	6,94	11,07	16,86	24,08	22,90	24,37	25,28	25,57	30,97
50	22,65	23,31	25,29	33,38	28,63	32,49	35,23	37,22	40,63
70	32,23	32,56	33,72	40,89	32,23	35,87	38,21	41,90	42,47
90	38,68	39,01	39,67	49,30	50,08	51,90	51,14	51,28	55,26
110	48,87	50,60	51,14	61,27	60,08	61,28	63,07	66,90	70,88

Keterangan :

Rumus menghitung besarnya persentase penghambatan radikal bebas :

$$\% \text{ Penghambatan} = \frac{\text{Absorban blanko} - \text{Absorban sampel}}{\text{Absorban blanko}} \times 100\%$$

B. Pembahasan

Dalam tanaman biasanya terdapat senyawa yang bersifat sebagai antioksidan yang bisa menghambat radikal bebas yang dapat membahayakan tubuh kita. Tanaman yang digunakan adalah bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah salah satu tanaman yang telah dikembangkan saat ini, hampir seluruh bagian tanamannya dapat digunakan. Kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) ini mempunyai banyak sekali manfaat dibidang kesehatan.

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) adalah pigmen antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Flavonoid kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terdiri dari flavanols dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin ini yang membentuk warna ungu kemerahan yang menarik di kelopak bunga maupun teh hasil seduhan rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit kanker.

Kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) pertama-tama dicuci terlebih dahulu, setelah beberapa menit kemudian ditimbang setelah itu dikeringkan dengan tiga perlakuan pengeringan yang berbeda, yang pertama dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50°C, yang kedua dikeringkan di bawah sinar matahari dengan ditutupi kain hitam, dan yang terakhir dikeringanginkan dalam ruangan. Perbedaan dari ketiga metode perlakuan tersebut adalah proses pengeringannya, serta suhu yang membedakan dari ketiga metode tersebut. Setelah didapatkan hasil pengeringan, sampel dirajang kemudian ditimbang untuk dihitung kadar airnya, kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam satuan persen. Kadar air juga merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi menyebabkan mudahnya bakteri, kapang dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan.

Hasil kadar air yang didapatkan sampel yang dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C dan pengeringan di bawah matahari adalah 9% v/b, dan untuk sampel yang dikeringanginkan dalam ruangan adalah 9,5% v/b. Setelah didapatkan kadar air pada sampel dibawah 10%, sampel ditimbang untuk di maserasi masing-masing menggunakan pelarut etanol 70%. Pelarut ini sulit ditumbuhi kapang dan kuman pada saat penyimpanan serta dapat melarutkan senyawa antioksidan yaitu flavonoid (Depkes RI, 1986). Setelah itu hasil maserasi dikeringkan sampai didapatkan ekstrak etanol kental. Setelah didapatkan ekstrak etanol kental maka dilakukan pengukuran terhadap aktivitas antioksidan rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm..

Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antioksidan adalah metode serapan radikal *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* (DPPH) karena merupakan metode yang sederhana, cepat, mudah, dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat (Hanani, 2005). Selain itu metode ini terbukti akurat dan praktis (Pratimasari, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dalam oven, dikeringkan di bawah matahari dan dalam ruangan memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC₅₀ berturut-turut 75,86 bpj, 79,43 bpj, dan 117,49 bpj. Maka aktivitas antioksidan yang baik adalah sampel yang dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C.

Penelitian ini didapatkan hasil terbaik pada pengeringan rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yaitu pengeringan dalam oven pada suhu 50°C dibandingkan dengan sampel yang dikeringkan di bawah matahari dan dalam ruangan, karena suhu pada proses pengeringan sampel yang dikeringkan di bawah matahari dan dalam ruangan tidak terkontrol sehingga semakin lama proses pengeringan yang dilakukan sehingga menyebabkan sampel teroksidasi oleh oksigen dimana oksigen ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan rusaknya senyawa antosianin pada kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang ditandai dengan perubahan warna dari merah ke coklat. Seperti yang dilaporkan oleh Zaiton.H (2009) bahwa oksigen dapat menyebabkan degradasi oksidatif antosianin yang menghasilkan pigmen berwarna atau berwarna coklat. Semakin tinggi suhu pengeringan warna rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) kering akan semakin merah tua, sedangkan pengeringan di bawah matahari, suhu yang tidak terkontrol warna rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) kering semakin merah pucat. Semakin lama waktu untuk pengeringan membuat warna rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) kering semakin merah pucat.

Hasil mencerminkan kerusakan senyawa metabolis sekunder rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yaitu antosianin disebabkan karena suhu dan lamanya pengeringan yang mengakibatkan teroksidasinya senyawa antosianin dan hilangnya senyawa asam yang terdapat dalam kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) mengakibatkan aktivitas antioksidan dari rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) menjadi berkurang.

Berdasarkan nilai IC_{50} yang diperoleh dapat dihitung jumlah ekstrak yang bisa meredam radikal hingga setengahnya. Dimana ekstrak etanol 70% dari sampel yang dikeringkan dalam oven yang bisa meredam radikal bebas hingga 50% sebanyak 0,0038 mg, untuk sampel yang dikeringkan di bawah sinar matahari sebanyak 0,0040 mg dan sampel yang dikeringkan dalam ruangan adalah sebanyak 0,0059 mg. Nilai inilah yang menjadi dasar pengembangan penggunaan antioksidan alami pengganti antioksidan sintetik yang telah digunakan dalam sediaan farmasetik, kosmetik, maupun pengobatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) berpengaruh terhadap aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH.
2. Metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang memberikan aktivitas antioksidan yang baik adalah metode pengeringan dalam oven pada suhu 50°C dibandingkan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan di bawah matahari dan dalam ruangan.

B. Saran

Sebaiknya peneliti berikutnya melanjutkan penelitian ini dengan membuat formula sediaan farmasi atau membuat kosmetik hasil dari pengeringan dalam oven untuk mengetahui efek antioksidannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazhab Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid VII. Maktabah Toha Putra: Semarang.

Al-Ju'aisin, Abdullah bin Ali, 2001. *Kado untuk Orang Sakit*. Mitra Pustaka: Yogyakarta.

Agustini Sri, 2006. Pengaruh *Metode Pengeringan dan Ukuran Partikel terhadap Mutu Teh Rosella*. *Dinamika penelitian BIPA* Vol. 17 No. 29: Palembang.

Anonim, 2010. *Metode Oven*. <http://sceibd.com>. Diakses 16 oktober 2010

Arisman, 2009. *Keracunan Makanan*. EGC: Jakarta.

Departemen Agama RI, 2008. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung.

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.

Guenther E., 1987. *Minyak Atsiri Jilid 1*. Terjemahan: S. Keteren. UI Press: Jakarta.

Harborne, J.B., 1987. "*Metode Fitokimia*". Terjemahan Padmawinata Kokasih. Dr., dan Soediro Iwang Dr. Penerbit ITB: Bandung.

Harmanto Ning, 2006. *Ibu Sehat dan Cantik dengan Herbal*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta.

Haryanto Bambang, 1992. *Potensi dan Pemanfaatan Sagu*. Kanisius: Yogyakarta.

Hasibuan Rosdaneli, 2005. *Proses Pengeringan*. Program Studi teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara: Sumatera Utara.

Husain, M.A., 1991. *Proses Penuaan dan Umur Panjang*. Cermin Dunia Kedokteran: Jakarta.


Khopkar, S, M., 1990. *Konsep Dasar Kimia Analitik*, Terjemahan Saptorahardjo. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

- Kuncahyono I, dan Sunardi, 2007. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap 1,1-Diphenyl-2-Picrylhidrazyl (DPPH., D-III* Teknologi Farmasi Fakultas Teknik Universitas Setia Budi: Yogyakarta.
- Lautan dan Jensen, 1997. *Radikal Bebas pada Eritrosit dan Leukosit*. Cermin Dunia Kedokteran: Jakarta.
- Mardiah, 2009. *Budi Daya dan Pengolahan Rosella Si Merah Segudang Manfaat*. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Maryani dan Kristiana, L., 2008. *Khasiat dan Manfaat Rosella*. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Minarsih, H, 2007. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Kanisius: Yogyakarta.
- Muhilal, 1991. *Teori Radikal Bebas dalam Gizi dan Kedokteran*. Cermin Dunia Kedokteran: Jakarta.
- Mulja, M, 1995. *Aplikasi Analisis Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel*. Mechipso grafika: Jakarta.
- Nadesul, H, 2006. *Sehat Itu Murah*. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Pratimasari, D, 2009. *Uji Aktivitas Penangkap Radikal Buah Carica papaya L. dengan Metode DPPH dan Penetapan Kadar Fenolik Serta Flavonoid Totalnya*. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- R. Hermawan, E.K. Hayati, U.S. Budi, A., Barizi, 2011. *Effect of Temperature, Ph on Total Concentration and Color Stability of Anthocyanins Compound Extract Roselle Calyx (Hibiscus sabdariffa L.)*. Jurusan kimia, Fakultas sains dan Tekhnologi. Universitas islam Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang.
- Sicilia Grace Yusri, 2009. *Jurnal Fraksinasi dan Identifikasi Golongan Senyawa Aktif Antiradikal Bebas Ekstrak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn)*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Sihombing, C, N, Wathoni, N, dan Rusdiana, T., *Formulasi Gel Antioksidan Ekstrak Buah Buncis (Phaseolus vulgaris L.) dengan Menggunakan Basis Aqupec 505 hv*. Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Sumedang: Sumedang.
- Subroto, M. Ahkam, 2008. *Real Food True Health*. PT. Agro Media Pustaka: Jakarta.

- Suhartono, E., Fujiati, mic PiruvatAlfanie, I., 2002. *Oxygen Toxicity by Radiation and Effect of Glut Transmine (GPT) Activity Rat Plasma after Vitamin C Treatmen*, Di ajukan pada internasional seminar on enviromental chemistry and toxicology: Yogyakarta.
- Sunarni, T, 2005. *Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas Beberapa Kecambah Dari Biji Tanaman Familia Papilionaceae*. Jurnal Farmasi Indonesia 2 (2), 2001, 53-61.
- Supriyono, 2003. *Mengukur Faktor-Faktor dalam Proses Pengeringan*. Departemen Pendidikan Nasional Proyek Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan Sekolah Menengah Direktorat Pendidikan Kejuruan: Jakarta.
- Tapan, E, 2005. *Kanker, Antioksidan, dan Terapi Komplementer*. Gramedia: Jakarta.
- Widyanto dan Nelistya, 2008. *Rosella: Aneka Olahan, Khasiat dan Ramuan*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Widyastuti N., 2010. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode CUPRAC, DPPH, dan FRAP Serta Korelasinya dengan Fenol dan Flavonoid pada Enam Tanaman*. Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Wijayanti Puspita. 2010. *Budidaya Tanaman Obat Rosella Merah (Hibiscus sabdariffa L.) dan Pemanfaatan Senyawa Metabolis Sekundernya di PT. Temu Kencono, Semarang*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Winarno F.G., 1990. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Zaiton, H., Suzila. I., Mahir-Ahmed MMB., Salmah. Y dan chek Zaini, H., 2009. *Quality of Roselle Tea As Affected by Drying Temperatures and Storage Time*. Fakultas Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia: Malaysia.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja penetapan kadar air




Gambar 3. Skema kerja penetapan kadar air kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Lampiran 2. Skema kerja ekstraksi



Gambar 4. Skema kerja ekstraksi kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*)

Lampiran 3. Skema kerja penentuan IC₅₀



Gambar 5. Skema kerja penentuan IC₅₀ kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Lampiran 4. Perhitungan

a. Perhitungan penetapan kadar air

- Untuk sampel pengeringan dalam oven :

$$\begin{aligned}\% \text{ Kadar air} &= \frac{0,9}{10} \times 100\% \\ &= 9 \%\end{aligned}$$

- Untuk sampel pengeringan di bawah matahari :

$$\begin{aligned}\% \text{ Kadar air} &= \frac{0,9}{10} \times 100\% \\ &= 9 \%\end{aligned}$$

- Untuk sampel pengeringan dalam ruangan :

$$\begin{aligned}\% \text{ Kadar air} &= \frac{0,95}{10} \times 100\% \\ &= 9,5 \%\end{aligned}$$

b. Penyiapan larutan DPPH

$$0,343\text{mM} = \frac{3,43 \times 10^{-4} \text{mol}}{\text{L}} = \frac{3,43 \times 10^{-7} \text{mol}}{\text{mL}}$$

$$3,43 \times 10^{-7} \text{mol} = \frac{\text{g}}{\text{BM}}$$

$$3,43 \times 10^{-7} \text{mol} = \frac{\text{gram}}{394,32 \text{ g/mol}}$$

$$\text{massa} = 3,43 \times 10^{-7} \text{mol} \times 394,32 \text{ g/mol}$$

$$\text{massa/mL} = 0,0001352 \text{ g}$$

$$\text{massa/100mL} = 0,01352 \text{ g}$$

c. Penyiapan larutan ekstrak

50,0 mg ekstrak etanol 70% dilarutkan dalam 100 ml etanol 70% p.a. sehingga diperoleh konsentrasi sebesar 500 bpj sebagai larutan stok dan dibuat pengenceran larutan dengan konsentrasi 30,50,70,90, dan 110 bpj.

$$\text{Untuk } 30 \text{ bpj} \rightarrow 500 \text{ bpj} \times \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 30 \text{ bpj}$$

$$x \text{ mL} = \frac{150 \text{ bpj.mL}}{500 \text{ bpj}}$$

$$x \text{ mL} = 0,3 \text{ mL}$$

$$\text{Untuk } 50 \text{ bpj} \rightarrow 500 \text{ bpj} \times \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 50 \text{ bpj}$$

$$x \text{ mL} = \frac{250 \text{ bpj.mL}}{500 \text{ bpj}}$$

$$x \text{ mL} = 0,5 \text{ mL}$$

$$\text{Untuk } 70 \text{ bpj} \rightarrow 500 \text{ bpj} \times \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 70 \text{ bpj}$$

$$x \text{ mL} = \frac{350 \text{ bpj.mL}}{500 \text{ bpj}}$$

$$x \text{ mL} = 0,7 \text{ mL}$$

$$\text{Untuk } 90 \text{ bpj} \rightarrow 500 \text{ bpj} \times \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 90 \text{ bpj}$$

$$x \text{ mL} = \frac{450 \text{ bpj.mL}}{500 \text{ bpj}}$$

$$x \text{ mL} = 0,9 \text{ mL}$$

$$\text{Untuk } 110 \text{ bpj} \rightarrow 500 \text{ bpj} \times \frac{x \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 110 \text{ bpj}$$

$$x \text{ mL} = \frac{550 \text{ bpj.mL}}{500 \text{ bpj}}$$

$$x \text{ mL} = 1,1 \text{ mL}$$



Lampiran 5. Tabel hasil pengukuran % penghambatan aktivitas antioksidan terhadap DPPH

Tabel 4. Hasil pengukuran % penghambatan aktivitas antioksidan terhadap DPPH

Konsentrasi ekstrak etanol (ppm)	Metode Pengeringan		
	Absorbansi sampel pengeringan dalam oven	Absorbansi sampel pengeringan di bawah matahari	Absorbansi sampel pengeringan dalam ruangan
30	0,526	0,596	0,563
	0,524	0,577	0,538
	0,486	0,575	0,503
50	0,456	0,523	0,468
	0,442	0,517	0,464
	0,418	0,515	0,452
70	0,435	0,464	0,468
	0,409	0,446	0,408
	0,405	0,428	0,401
90	0,344	0,398	0,371
	0,343	0,388	0,369
	0,315	0,368	0,365
110	0,260	0,304	0,383
	0,233	0,295	0,370
	0,205	0,287	0,366

Keterangan :

- Absorbansi blanko untuk sampel pengeringan oven = 0,704
- Absorbansi blanko untuk sampel pengeringan matahari = 0,785
- Absorbansi blanko untuk sampel pengeringan ruangan = 0,605 dan 0,749

Lampiran 6. Tabel nilai probit

Tabel 5. Nilai probit sesuai banyaknya persen

	Nilai Probit									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,96	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,65	7,75	7,88	8,09

Lampiran 7. Hasil perhitungan nilai IC₅₀

Tabel 6. Hasil perhitungan nilai IC₅₀ dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dengan menggunakan oven

Konsentrasi	Log konsentrasi	% penghambatan	Nilai probit	Persamaan garis regresi linear	IC ₅₀
30	1,48	27,27	4,40	$y = 1,699x + 1,807$ $R^2 = 0,890$	75,86
50	1,70	37,69	4,68		
70	1,85	40,86	4,77		
90	1,95	52,56	5,07		
110	2,04	66,95	5,44		

Tabel 7. Hasil perhitungan nilai IC₅₀ dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan di bawah sinar matahari

Konsentrasi	Log konsentrasi	% penghambatan	Nilai probit	Persamaan garis regresi linear	IC ₅₀
30	1,48	25,78	4,35	$y = 1,684x + 1,790$ $R^2 = 0,958$	79,43
50	1,70	33,97	4,59		
70	1,85	43,19	4,83		
90	1,95	51,00	5,05		
110	2,04	62,38	5,32		

Tabel 8. Hasil perhitungan nilai IC₅₀ dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang dikeringkan dalam ruangan

Konsentrasi	Log konsentrasi	% penghambatan	Nilai probit	Persamaan garis regresi linear	IC ₅₀
30	1,48	11,62	3,80	$y = 2,056x + 0,746$ $R^2 = 0,983$	117,49
50	1,70	23,75	4,28		
70	1,85	29,64	4,47		
90	1,95	39,12	4,72		
110	2,04	50,20	5,01		

Lampiran 8. Perhitungan IC₅₀

- a. Perhitungan IC₅₀ metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dalam oven

$$y = 1,699x + 1,807$$

$$5 - 1,807 = 1,699x$$

$$3,193 = 1,699x$$

$$x = 1,88$$

$$\text{IC}_{50} = \text{antilog}$$

$$= 75,86 \text{ bpj}$$

- b. Perhitungan IC₅₀ metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) di bawah matahari

$$y = 1,684x + 1,790$$

$$5 - 1,790 = 1,684x$$

$$3,21 = 1,684x$$

$$x = 1,90$$

$$\text{IC}_{50} = \text{antilog}$$

$$= 79,43 \text{ bpj}$$

- c. Perhitungan IC₅₀ metode pengeringan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dalam ruangan

$$y = 2,056x + 0,746$$

$$5 - 0,746 = 2,056x$$

$$4,254 = 2,056x$$

$$x = 2,07$$

$$\text{IC}_{50} = \text{antilog}$$

$$= 117,49 \text{ bpj}$$

- d. Perhitungan kadar ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) pada metode pengeringan dalam oven

$$IC_{50} = 75,86 \text{ bpj}$$

Larutan stok 500 bpj (50 mg → 100 mL etanol)

$$\text{Untuk } 75,86 \rightarrow 500 \times \frac{x}{5} = 75,86$$

$$x = 0,0076 \text{ mL}$$

Kadar ekstrak etanol dalam 75,86 bpj yaitu:

$$\frac{0,0076 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 50 \text{ mg} = 0,0038 \text{ mg}$$

- e. Perhitungan kadar ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) pada metode pengeringan di bawah matahari

$$IC_{50} = 79,43 \text{ bpj}$$

Larutan stok 500 bpj (50 mg → 100 mL etanol)

$$\text{Untuk } 79,43 \text{ bpj} \rightarrow 500 \times \frac{x}{5} = 79,43$$

$$x = 0,0079 \text{ mL}$$

Kadar ekstrak etanol dalam 0,079 bpj yaitu:

$$\frac{0,0079 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 50 \text{ mg} = 0,0040 \text{ mg}$$

- f. Perhitungan kadar ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) pada metode pengeringan dalam ruangan

$$IC_{50} = 117,49 \text{ bpj}$$

Larutan stok 500 bpj (50 mg → 100 mL etanol)


$$\text{Untuk } 117,49 \text{ bpj} \rightarrow 500 \times \frac{x}{5} = 117,49$$

$$x = 0,0118 \text{ mL}$$

Kadar ekstrak etanol dalam 117,49 bpj yaitu:


$$\frac{0,0118 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 50 \text{ mg} = 0,0059 \text{ mg}$$

Lampiran 9. Grafik




Gambar 6. Grafik perbandingan pengeringan perhitungan IC_{50} dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Lampiran 10. Foto



Gambar 7. Tanaman Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)



Gambar 8. Kelopak Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Muspahuddin dilahirkan di Pompanua, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone pada tanggal 13 Maret 1989, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Tajuddin dan Musdalifah, S.Sos.

Pendidikan formal yang telah dilalui penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Pertiwi pada tahun 1992-1994. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke SDN 108 Pompanua pada tahun 1994-2001. Dan setelah lulus dari pendidikan dasar penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg.1 Ajangale pada tahun 2001-2004 dan setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atasnya di SMA Neg.1 Ajangale setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diberi julukan “Kampus Hijau”, penulis mengambil jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan.